



門武9
卷16
365

外科赤水玄珠小引

周易

生又子曰予輯赤水玄珠全集矣又次
外科為二卷者曷以故外科雖有形之
疾不淳肯察治亦不易予故集前矣已
試之方載一卷中俾專門外科者舉二
卷而披閱之症與方森然在目所守者

不約而所施者不博乎。不勞遍觀全集。
不苦於目力之難，竟而亦艱於簡寰之
携持矣。同志者幸鑒予衷焉。

赤水玄珠外科第三十五卷目錄

外科小引

五發癰疽論

背疽其源有五

疔瘡

雜瘡

癰

瘡科總論

華佗瘡疽瘡腫論

赤水玄珠外科第三十五卷

赤水玄珠外科第三十五卷

新安生生子孫一奎著輯

○外科門小引

生生子曰外科最重者莫如瘡疽最急者莫如喉風疔腫患之者生死立見其餘瘡癰皆可緩圖非若上三証急若風火也究其受病之源經曰營氣不從逆于肉理乃生瘡腫又曰膏梁之变足生太疔又曰六府不從晝結為瘡又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火大抵皆氣血虛弱蘊鬱熱毒

五發瘡疽通治方

反花瘡

婦人陰瘡

臘瘡

赫外小方略 卷之三
調養失宜之所致也予固非專門外科蓋常咨訪搘定頗知治法大駢茲採前人所論瘡疽証治載子卷首疔瘡腫瘍次之陶節庵瘡疽經薛立齋外科精要二書實外科權輿業是者不可不使之隨囊檢視能熟此二書鮮有敗事予固特舉歷試有功者掲出以告同志云

○瘡科總論

夫瘡疽瘡癰者皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒暑不調使五臟六腑之氣怫鬱于內以致陰

陽乖錯氣血凝滯而發也亦有久服丹石燥熱之藥熱毒結深而為瘡疽也夫瘡疽之疾多生於膏梁富貴之人以其平昔所食肥膩炙燭安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也瘡者壅也大而高起屬乎陽其脈浮數痘者沮也平而內發屬乎陰其脉沉數瘡者總名也癰者有頭小瘡也經云諸痛痒瘡皆屬心火蓋心主血而行氣若氣血凝滯挾心火之熱而生瘡疽之類也然所感有淺深故所發有輕重大小之不同也六

府積熱騰出於外，肌肉之間，其發暴甚，皮膚光軟，侵襲廣大者，瘡也。五臟風毒積熱攻注於肌骨，其發猛惡，初生一頭如痞癟，白色焦枯觸之而痛應心者，瘻也。熱發於皮膚之間，浮腫根小，不過二三寸者，癰也。夫瘡發於六府，若燎原之火，外潰肌肉，疽生於五臟，沉澁難療。若陶室之燧，內消骨髓，瘡則易療，惟難將息。而遲瘥，疽則難療，而易痊。夫諸瘡之中，惟背疽疔瘡最為急症。其次莫如腦疽、腸瘡、喉瘡之類，亦其急者也。至若瘰癧懸瘡、痔漏諸

瘡之類，其証可緩而治也。又有疥癬癰瘡風瘡之類，雖云俱屬瘡類，而其輕重緩急自有不同也。夫瘡疽之疾，要湏察其是虛是實，是冷是熱，或輕對証，用藥無失。先後次序，凡人年四十以上，頭項髮頤，背脊腰骨或筋骨之上所觀，不見之處，稍有瘡癥，便不可輕易待之。若視之怠慢以為常疾，每見至微至著，喪命者多矣。便宜速急治之，庶幾得救。譬之救火，初起則易救，至于燎原之勢，不可撲滅矣。其理亦由是也。凡瘡未破毒攻，臟府一毫

熟藥斷不可用此是先後次第之妙訣也夫瘡有
五善七惡不可不辨若動息自寧飲食知味一善
也便利調匀二善也膿漬腫消色鮮不臭三善也
神彩精明語声清亮四善也神氣和平五善也如
煩躁時噉腹痛渴甚泄利無度小便如淋一惡也
膿血大泄焮痛尤甚臭惡難近二惡也喘粗短氣
恍惚嗜卧三惡也未潰先黑久陷面青唇黯便污
者四惡也肩頸不便四肢沉重五惡也不能下食
服藥而嘔食不知味六惡也声嘶色脫唇鼻青黑

面目四肢浮腫七惡也更有氣噫痞塞效逆身冷
自汗無時目瞪耳聾恍惚驚悸語言頻錯皆惡訛
也五善見三則差七惡見四必危若五善并至則
吉而安七惡全見必危而死矣已上所論大綱其
諸証候治法列論于後

○五發瘡疽論

夫五發瘡疽者謂發背發腦發鼻發肩發頤是也
人之一身血氣周流而無間稍有壅聚莫不隨所
至而發焉又豈特五者哉夫發背者乃五臟風熱

六府邪毒灌于筋骨之間，發于經絡之內，榮衛虛損，氣血衰殘所致也。其發初如粟米大，最不可輕忽，後必大發也。若初起紅腫高起者，後必不為害，故曰：外形如粟中可容，外貌如錢裏可着拳，如惡毒深滿膿血交粘，用藥可痊。若膿臭穢無絲此，血敗氣衰，陽絕陰盛，必難療理。治初起或陰竭不起，便可用艾，多灸或隔蒜灸之，如痛灸到痒，如痒灸至痛此最妙法也。若痈瘡已成，亦可用火、水、裕、開瘻，則易治也。若瘡高起為瘻，則易治，平陷為

疽，則難治。瘡疽形症已具，前總論中茲不復論。至如發腦發眉發鼻發鬚發頤，地位不同，然皆由內臟伏陽結滯，邪毒上壅，隨其經絡地分而發也。其諸發瘡初起，皆宜宣散熱毒，要湏著人元氣虛實，而治之，庶不悞矣。若元氣實者，亦可用大黃之劑泄去毒氣，或用漏芦五香連翹之類，皆可用。內托十宣之類，補之亦有陰瘡寒瘍不起，雖云用炙，然亦不可服寒涼之劑，亦宜以溫藥溫之，全在活法，不可執一也。其敷貼洗藥，具方于下，隨症用焉。

外科精要曰癰疽既灸即服藥以護臟腑如護心散凡有癰疾早進數服使毒氣外出而無滯也之患否則咽喉口舌生瘡或黑爛如菌若瘡發四五日之後宜間用別藥治之

又曰護心散乃鮮金石發疽之藥若發熱焮腫作渴飲冷而嘔者宜之若發熱焮腫作渴飲湯而嘔者不宜用之蓋脾虛停痰或寒邪內侵或痛傷脾胃宜用六君子湯若喉舌生瘡或口乾作渴或小便頻數宜用六味丸大凡諸瘡作嘔若飲冷便秘

是熱毒也黃連消毒散解之飲冷便和是胃火也竹葉石膏湯清之懶食飲湯是胃虛也補中益氣湯補之大便不實喜飲熱湯是脾胃虛寒也六君子加炮姜以溫之常見脾胃虛弱者用護心散反致胃寒嘔惡其喉舌生瘡乃腎水枯涸虛火炎上其証甚惡急用加減八味丸多有得生者

又曰癰疽嘔逆是毒氣冲心非脾胃之冷當服內托散楊氏云鼻癰初愈不曾表汗毒在經絡則背大疽自肩井連腰脇腫硬如石其色紫黑以涼藥

投之終夜大嘔連進托裏散嘔止瘡潰赤水淋漓四十日而愈又有患癰者痛過轉嘔服托裏即止今有廁病不服內藥者故引楊氏之言以解世人之惑

○華佗瘡疽瘍腫論

夫瘡疽瘍腫之作皆五臟六府蓄毒不流非獨因蔽衛壅塞而發也其行也有處其止也有歸假令發於喉舌者心之毒發於皮毛者肺之毒發於肌肉者脾之毒發於骨髓者腎之毒發於下者明中

之毒發於上者陽中之毒發於外者太府之毒發於內者五臟之毒故曰壞外曰潰上曰從下曰逆發於上者得之速發於下者得之緩感於六府則易治感於五臟則難瘳又近骨者多冷近膚者多熱近骨者久不愈則化成血蟲近膚者久不愈則傳氣成漏成虫則多痒少痛或先痒後痛成漏則多痛少痒或不痛不痒內虛外實者多痛少痒血不止則多死潰膿則多生或嘔逆無度飲食無時皆瘡疽瘍然症候多端要當詳治

薛立齋曰：癰瘍生，乃肝經風熱其成漏，乃元氣虛弱其出血，乃脾虛有火，其潰膿乃元氣充實，至於嘔逆等証屬脾胃虧損所致，當調補元氣庶保無虞。

○背疽其源有五

一、天行二、瘦弱氣滯三、怒氣四、腎氣虛五、飲冷酒

食炙燙服丹藥

○治癰道用藥太綱

一初患癰疽，便服內托散，以免後來口舌生瘡。仍

用騎竹馬，或隔蒜灸。
一服五香連翹湯，如大便疎快即止，仍量入虛實，一癰疽潰後，宜服排膿內補散，若嘔逆，木香湯下。
一癰疽初作，便宜灼艾，及麥飯石膏金，四圍中留口出盡，如瘡小通，傳之既潰，用神異膏帖之。
一癰疽已潰，日用猪蹄湯淋洗，將愈之際，三日一次。
一癰疽將斂，宜用神異膏，如毒未盡，不可遽用，生肌之劑。

一癰疽將安宜用加味十全湯補其氣血庶肌肉易生

一背疽多先渴而後發或先疽而後渴不救者多矣若服加減八味丸非特杜絕渴疾抑亦大滋氣血生長肌肉

一瘡疽嘔逆有二一因初發不服內托散伏熱在心一因脾氣不正伏熱在心者則心煩身熱焮腫作痛宜用內托散三兩服之脾氣不正者則不煩熱或聞穢氣作嘔宜用嘉禾散如有寒熱

用不換金正氣散五更初兼服山藥丸以補腎

○瘡疽用香藥調治論

伍氏曰氣血聞香則行聞臭則逆大抵瘡瘍多因營氣不從逆於肉理鬱結為癟得香則氣血流行故服五香連翹湯萬金散金粉散凡瘡本腥穢又聞臭觸則愈甚若毒入胃則咳逆古人用之可謂有理且如飲食調令香美以益脾土養其真元可保無虞矣

○五發瘡疽通治方

漏芦湯 治一切惡瘡毒腫丹癰癰癧疔腫魚臍

五發癰疽初覺一二十日便如傷寒頭疼煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不

寧皮膚壯熱大便閉濈小便赤黃並皆服之

妊娠勿服

漏芦

白斂

黃芩

麻黃

枳實

去白

升麻

芍藥

炙甘草

朴硝

各一兩

大黃

二兩

右每服三五錢看虛實用水煎空心

熟服

五香連翹湯 治諸瘡疽初覺一二十日便厥喉咽

大黃

各一錢半

連翹

沈香 獨活

柴寄生 丁香 射干

升麻 射香

另研各一錢

甘草

分一錢

姜三片水煎

不拘時服

托裏護心散

治諸疔腫發背曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔吐而痛可服二三服

乳香

一兩

紫荳粉

四兩

和勻每服三錢甘草湯調服

神仙蠟礬丸

此藥不問老幼皆可服之服至一兩已上無不取效最止疼痛不動臟府委是神

仙藥也此藥不取效最止疼痛不動臟府委是神

効活人不可勝數

白礬明亮者
一兩研

黃蠟七錢
熔化

提起待少冷入礬
末不住手撓勺
右衆手丸如梧桐子大倘
蠟冷不能丸以滾湯煖之便軟每服二十丸漸
加至三四十九白湯或酒吞下如未破即內
消已破即便含如服金石發動致疾更用白礬
末一兩匙頭溫酒調下亦三五服見效有人遍
身生瘡狀如蛇頭服此亦効諸書皆稱神奇但
一日之中服近百粒則方有功此藥能防毒氣
內攻蓋能護膜也切不可欺其淺近而忽之始

終服過半斤必能萬全瘡愈後服之尤佳
一方治蛇咬只熔化白礬乘熱滴傷處痛即止毒
氣即趕出立見効驗要知白礬大能解毒也
千金托裏散 治一切瘡腫發背疔毒若氣血虛
而不能作膿或潰後膿清痛仍不減最宜服此
便能排膿止痛 黃蓍半兩 厚朴 防風
桔梗各二兩 連翹二兩 木香 沒藥各三錢
乳香二錢 當帰五錢 川芎 白芷 芍藥
官桂 大參 甘草各一兩 右為細末每服三

錢酒一盞，蓋煎三寸沸溫服。

十六味流氣飲

治無名惡瘡瘍疽疔症

川芎

當歸 芍藥 防風 人參 木香 黃芪

官桂 桔梗 白芷 枳壳 厚朴 烏藥

紫蘇 只壳 甘草各一

右作一帖水煎食服

內托羌活湯

治瓦腎生瘡堅硬腫痛大作

羌活 黃柏

酒製各二錢 防風 歸尾 藥本

連翹 蒼朮 陳皮

炙甘草各一錢桂三分 防風 歸尾 藥本

黃芩半錢

水一鍾酒半鍾煎八分食前服

清心內固金粉散

一名金花散

專治惡瘡熱

盛燒痛煩躁作渴

此藥解毒

辰砂

另研

白茯苓

人參 甘草

各三錢

蕤草粉

四兩

雄黃

一錢

冰片

白芷仁 朴硝

各五錢

射香

與冰片各一錢另研

右以參

芩草蕊為末入研藥和勻

每服一錢半蜜湯調

麥飯石膏方又名鹿角膏

白麥飯石

其石顏色黃白像麥

飯圓者研細未應用

鹿角

要生者白解者不用截作二三寸長炭火內煅令烟盡為度研末

白欵

末

右將麥飯石用炭火煅紅以研

米醋淬過如此

煅淬十次研為極細末每用二

兩白斂表二兩鹿角灰末四兩同入乳鉢乳令無害方有効驗若研不細敷上作痛若研得掉細如眼藥一般極能止痛排膿收口量藥末多寡用經年好米醋入銀石器內煎令魚眼沸却旋入前一味藥末在內用竹籠子不住手撓熬十二時火令稀稠得所傾出磁盆候冷以布蓋密勿惹塵灰每用時先用猪蹄湯洗去瘡瘍上膿血至淨以故帛挹乾以鴟翎拂藥膏塗敷四圍凡有赤處尽塗之但留中心一竅如錢大

以出毒氣膿血如瘡未潰能令內消如已潰則排膿如湍水逐日見瘡口收斂如患瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片金藥以貼瘡上但肉膜終穿亦能取安洗瘡勿以手觸動嫩肉仍忌口氣及有腋氣之人并月婦皆令忌之此方但得好帶盖鹿角好麦飯石精良修合勝用他藥多矣仍可熬取好米醋一木碗候逐日用藥於瘡上俟乾便以鴟毛蘸醋拂潤勿令累也初用湏一息一洗換十日後兩日一換

排膿內補十宣散一名十奇散
一名內補散治瘡疽瘻瘍未成者速散已成速潰敗膿自出無用手擦惡肉去不用刀針服藥後其痛頓減効驗如神

人參 當帰 黃蓍各二兩 甘草 川芎 防風 厚朴姜炒 苦梗 白芷 薄桂各一兩 右為末每服三錢酒調下日夜各數服以多為妙 服至瘡口潰更服為嘉不飲酒人濃前木香湯調下然終不若酒力之勝或飲酒不多能勉強以木香湯並酒調下全亦可

乳香黃蓍散 治一切惡瘡瘻疽發背疔瘡痛疼不可忍者或未成者速散已成者速潰不假刀砍其惡自下又打撲傷損筋骨疼痛並皆治黃蓍 當帰 川芎 麻黃去根節 甘草 人參 茯苓各一兩 嬰粟壳炙 陳皮各一兩 乳香 沒藥

錢各五 每服五六錢水煎服

黃蓍湯 治一切瘡腫瘻疽並宜服之
黃蓍 川歸酒洗各一兩 大黃 茯苓 陳皮
炙甘草各五錢 右加生姜三片水煎服

托裏內補散 專治一切惡瘡潰爛出膿之後宜服之
人參 川芎 川芍 白芍 甘草 白芷
防風 白朮 茯苓 官桂 黃蓍 金銀花
各等分水煎服

護心散 治癥氣冲心嘔吐又名不二散 炙甘草

硃砂飛各一錢 荒蕡粉炒二錢 炸細末作一帖白湯調下當歸連翹散 清熱解毒通潤大小便 當歸

連翹 桔子仁 芳藥 金銀花各一兩 黃芩五錢右每服五錢水二鐘煎十分空心溫服如欲通

太便加大黃二錢待藥煎熟入之再煎一丁沸服之

托裏散 治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脉洪
絃實數腫甚欲作膿者 當歸 桔萎根一錢半
大黃三錢 皂角刺 牡蠣 朴硝 連翹各一錢半
金銀花 赤芍藥 黃芩各一錢半 水酒各一鐘煎服
乳香止痛散 治一切瘡腫疼痛不止
乳香 没藥各一錢 丁香五分 粟壳 白芷
陳皮 麝炙甘草 水煎服

加味當歸飲子 古云諸瘡皆屬心火、鬱則發
之。當歸 生地 升麻各五錢 防風二錢半
荆芥穗 何首烏各一錢
羌活 黃蓍各三錢 紅花 蘇木 甘草各一
每服五錢生姜三片煎或沐浴取微汗効速
血氣通暢服藥應効

托裏溫中湯 治瘡為寒變而內陷者膿出清解
皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大使微溏食則嘔
氣短促吃逆不絕不得安卧時有昏憒

丁香 沉香 茴香 陳皮 益智仁各一
木香一錢 羌活 良姜炮三
炙甘草二錢 姜三片水煎服 忌生冷
猪蹄湯 治一切瘡疽并諸腫毒消毒氣去惡肉
凡瘡有口便須用此湯洗 黃芩 白芷
赤芍藥 川歸 羌活 生甘草 露蜂房
有蜂等分兒者各
水三升煮軟將汁分作二次澄去面上油并下
肉渣每次用藥一兩投于汁中再用文武火煎

十數沸去渣以故帛蘸湯溫徐揩瘡上死肉
惡血隨湯而下洗淨訖以帛拭乾仍避風忌人
口氣吹之有狐臭入及月婦猫犬並不宜入病
人房中洗瘡切忌手觸洗瘡之方甚多惟此方
極妙其用露蜂此甚有理蓋以毒攻毒也

麥門冬湯 瘰道潰後膿水不絕 麥門冬

黃蓍 五味子 人參 官桂 當歸 遠志
白芩 蒜窮各二錢 甘草三錢

姜一片東二枚水煎

天南星 草烏頭 半夏生用

四虎散 治癰疽腫硬厚如牛皮按之痛

天南星

草烏頭

半夏

生用

狼毒

各等分為細末醋蜜調敷番頭出氣

內托散 諸腫毒惡瘡一服立愈

大効

大黃

右分三帖水煎服

鐵井欄 治無名腫毒背疽以此圍之番口出氣

芙蓉葉重陽前收

蒼耳端午午前收燒存性

為末以蜜水調

五香湯 諸瘡入腹托裏

丁香

木香

沉香

正乳香各一

一人參一兩另加

射香三錢

去之加藿香

右為細末每服三錢水一盞煎六分牢心熱服
總錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方
大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶氣不通者
其餘熱結昏昧口燥咽乾大使硬小便澀者未
可與服

止痛當歸湯

治腦疽發背穿潰疼痛

當歸

黃蓍

人參

官桂

芍藥

炙甘草

生地

各一兩

每服五錢水煎服

示水火未

示水火未

金銀花散

發背惡瘡托裏止痛排膿

金銀花

無花藤葉代之四兩

甘草

錢

分為三帖酒水各半煎服

拔毒散

治熱毒丹腫遊走不定

寒水石

生用

石膏

四兩生用各

黃柏

甘草

各一兩

為細末新涼

水調掃之或油調塗之或布花上攤貼以涼水

潤之

寸金丹

二名返魂丹三名昇生丸四名追命丹

六名來甦丹七名知命丹八名得道丸非人勿

示若有入患瘧身未爛者與三丸服之燕下便

活如口噤幹閉研化灌之下喉立生治發背腦疽瘡腫遍身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重身躰壯熱射香分乳香輕粉烏金石雄黃狗寶沒藥各一
蟾酥乾用_二 狗膽全用_{一枚} 粉霜黃蠟錢各三 硝砂五錢 鯉魚胆丸荒草大小兒丸如芥子大 每服一丸病重者加三丸白丁香七枚研爛新汲水調送下被蓋

出汗勿令透風凡服藥後喫白粥瓜蘿就睡大妙頭瘡腫痛不過三服

定痛托裏散一切瘡腫疼痛不可忍如年少氣實先用疎利後服此藥川芎川歸乳香白芍藥沒藥與乳香各一錢半 官桂一錢御米壳去筋膜炒二錢水煎服

柞木飲子發背瘡疽已成未成並宜服之

乾柞木葉四兩 乾荷葉心蒂 萱草根甘草節 地榆各一兩 右為末每服五錢水煎服

早晚各進一服

內托千金散 瘡疽發皆腦疽乳瘡諸瘡未成者自散已成者即潰 人參 川歸 黃芪 川芎 防風 白芍 官桂 桔梗 白芷 甘草 拐萎 金銀花 各等分 痛甚者加當歸乳香沒藥芍藥 每服七八錢水煎服加好酒半盞溫服日進二三服若瘡口有黑血出及有汗出者此藥之功也

牛膠飲 截瘡疽惡瘡發險處服之使毒氣不致

於內 不傳惡証 牛皮膠通明好者淨洗乾秤四兩為則 右用酒一碗入膠納重湯頓令膠攪勻傾出更浸酒隨意飲尽若善飲者以醉為度亦用酒煎却浸以白湯飲盡為佳此法活人甚多 國老膏 一切瘡道俱發預期服之能消腫逐毒使毒氣不內攻功效不具述 大甘草有粉者二斤 槟榔碎河水浸一宿捺令漿汁濃去渣再用綿濾過銀石器內慢火熬成膏以磁罐收之每服一二匙無灰酒侵入或白湯亦可不拘時服曾

服丹劑燥藥亦解之或微利無妨

遠志酒

一切瘡疽發背惡毒有死血阴毒在中則不痛敷之則痛有憂怒勞氣積而內攻則痛不可忍敷之則不痛或熱蘊在內熱逼入手不可近敷之即清涼或氣虛血冷潰而不敷敷之即歟此乃韓大夫家用以救入極駁若七情內鬱不問虛實治之必愈遠志米泔浸洗去心苗

右為細末酒一盞調藥末三錢遲頃澄清飲之以渣敷病處

忍冬酒

瘡疽發背初起時便當服此不拘疽發

何處及婦人乳瘡服之皆有奇効外以麥飯石

膏及神異膏金之其効若神

忍冬藤生取

大握以葉入砂盆內爛研入好酒或生酒尤佳

調和稀稠得所金敷四圍中心搘一大竅出氣

仍用忍冬藤五兩用木槌微搗不可碎甘草節

右入砂瓶內水二碗文武火慢煎至一碗入

無灰好酒一大碗再煎半十數沸去渣分為三次服一日服盡如病勢重一日夜再進一劑服至

太小腸通利藥力乃到。若無生者用乾者終不及生者力大而効速其功勝於紅內消。
神仙截法 瘰疽發背一切惡毒預服此藥毒氣
不內攻可保無虞。真麻油一斤銀石器煎升數佛傾出令用
右以無灰酒兩碗侵入油重湯溫稍熱通口急
服一日尽之為妙或疾發數日者亦宜急服之。
佳此法乃吳侍御家云三代用之無不驗又聞
獵者云允悞中薬箭急飲麻油則藥毒不行後
於西山親見一人被虎箭穿股呻號不忍急以

此灌之良久遂定又聞鄭學諭曾用之效

黃蓍丸

治因用針破傷其經絡白濃赤汁逗流

不止

生黃蓍

八錢

川歸

三錢

木香

沉香

肉桂

乳香各一

錢

右諸香並不見火為細末用

荒草粉

生姜汁煮糊為丸梧桐子大溫水吞四

五十九

忍冬丸 療渴疾既愈之後須預防發瘡疽大宜
眼此 忍冬藤根莖花葉皆可用以無灰好酒
浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許研為

細末以酒浸酒打麴糊為丸梧桐子大每服五十九至百丸不拘時酒飲任下此藥不特治瘧疾大能止渴并治五痔諸癥等疾

援生膏

治諸般惡瘡及瘰疬風癰繩癰者點破即愈

血竭

乳香

沒藥

各一錢

金粉

雄黃

五錢射香五分

右用

薑麥稽灰或真炭灰一斗

三升淋灰湯八九碗用粟柴或桑柴文武火煎

作三碗取一碗收留二碗盛於好磁器內候溫

將前七味藥研為極細末入灰湯內用鉄瓢或

桑柳枝搗再以好風化石灰一升入藥灰湯內
攪勻取出候冷過宿盛于小白磁罐內凡遇諸
惡瘡點在當頭一日二次日又一次瘡頭食
破約五分血水出為妙恐日久藥乾將前收留
灰湯入之

烏龍膏

一名烏

一切腫毒瘧疾收赤暉

木別子

金散去壳

半夏

各二兩

小粉

四兩

草烏

五錢

右於鐵鑊內慢火炒令轉焦為細末出火毒再
研以水調稀稠得所敷毒四圍番頂出氣或以

醋調亦得

透膿散 諸瘍疽瘻及貼骨瘧不破者不必刀針
以此點之不移時其膿自透累驗
蛾口繭子出蛾有口者右燒存性以酒調服切記只
用一枚不可多用如用二三枚即有二三口也
慎之此方絕驗勿忽

通門散

一切瘡疽無頭腫痛

山梔子

錢

大黃

二兩

牡蠣

炒五錢

地龍

去土三錢

炙甘草

五錢

每服六七錢水煎服以利為度

乳香拔毒散 一切瘡腫瘧疽消盡

黃芩

各二兩

黃柏

地骨皮

乳香

沒藥

各二兩

為末涼水調攤貼腫處効

立効散 發背諸瘍癰癧乳瘡與前方間服神

效

皂角刺

不用枯者剉而久炒

桔梗

五枚取肉炒

乳香

五錢

沒藥

一兩

生粉草

二兩

右為末

每服二錢

無灰酒調下

灸法 瘰疽初發小點一二日間急以大蒜頭橫
切如錢貼其中心以小艾炷灸之五壯而止若

形状稍大以黃稜紙蘸酒全貼看先乾處為筋
脚於脚處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯而
止又法屈指從四圍尋按遇痛處是根就此
處重按深入自竟輕快即此灸之更於別處灸
若腫大即搗蒜餅焙乾蘸法醋炙熟更換頻罨
或以熨斗火於蒜上熨之逐次更換熱餅頻熨
如竟患處走散以綿帛覆蓋勿令氣泄俟少間
敷藥凡癰疽腫大如鷺之形須看頭尚上下先
灸其前兩脚次灸其尾或紅筋走緊而長從盡

處灸之湏番頭并後兩脚勿灸設盡灸之不惟
火氣壅聚彼毒無所走散反攻入裏也倘辨認
不明以白芷三分 漢椒 葉白皮各一錢
連根葱白十根 新水煎入酸醋半盞淋洗少
頃其筋即見可以辨認頭尾

萬病解毒丸 癰疽發背魚臍毒瘡藥毒草毒挑
生蛇毒獸毒諸惡瘡病 五倍子五錢 山荳根
山慈姑一兩 全蝎五錢 紅牙大戟七錢 射香一錢
續隨子取仁去油取霜各半兩 破砂 雄黃各二錢

右件先以前五味入木臼搗羅為細末次研後四味夾和糯米糊丸分作三十五丸端午七夕重陽臘日淨室修合每服一丸生姜蜜水磨下井水浸研敷患處解毒收瘡救病神妙硃砂雄黃乃癆醫五毒攻乃瘍中物也

加味八味丸 降心火生腎水治諸渴疾瘍疽未發前已瘍後渴症通用熟地黃焙二兩山藥炒微山茱萸蒸取肉焙各一兩 辣桂去粗皮五錢 漚鴻截作塊酒蘸磁器盛 雞內蒸五次剉焙 牡丹皮焙 白茯苓各八錢 五味子慢火焙乾

右為細末煉蜜候冷和丸如梧桐子大每服三十丸空心益湯下

神仙太乙膏 治瘍疽及一切惡瘍軟癰不問年月深淺已未成膿並宜治之蛇虎傷蝨蠅犬咬傷湯火刀斧所傷皆可內服外貼如發背先以溫水洗瘡淨軟綿拭乾却用紺帛攤膏藥貼瘡即用冷水下血氣不通溫酒送下赤白帶下當歸酒下咳嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹膏藥置口中含化一切風赤眼用膏捏作小餅貼太

陽火後服以山梔子湯送下打撲傷損外貼內服橘皮湯腰膝痛者患處貼之內服鹽湯送下唾血者桑白皮湯下諸痛先以鹽湯洗净諸血量大小以紙攤貼每服一丸如櫻桃大蛤粉為衣其膏可收十年不壞愈久愈烈一方久遠瘰癧同上瘡瘍鹽湯洗净貼酒下一丸婦人血脉不通甘草湯下一切瘡癧并腫痛及疥癩別煉油少許和膏塗之玄參 白芷 當帰

赤芍藥

肉桂

去粗皮

大黃

生地黃

各一兩

右剉碎用麻油二斤浸春、夏、三秋、七冬、十火熬黑色瀝去渣入黃丹一斤、青柳枝不住手撓候滴水中成珠不住手為度傾入磁器中以磚蓋口掘子窖埋阴樹下以土覆三日出火毒散服丸如鷄頭子大

神異膏 治發背瘡疽諸般惡瘡癧其効如神治癥疾先以麥飯石膏金敷俟其瘡根脚漸收故徑寸大脚用神異膏貼之收口此藥隨其人病深淺取効令時不可與婦人鷄犬猫厭穢物見

玄參 半兩

杏仁

去皮尖

一兩

露蜂房

淨炒

半兩

男子亂髮

洗淨焙乾五錢

綿黃芪

二分

全蛇退

盐水

半兩

妙

者焉

五錢

黃丹

飛細

五兩

右用

真麻油

一斤

用髮入銀

銚中文武火熬候，髮焦鎔尽以杏仁投以候變
黑色用好綿瀘去渣再將所熬清油入銚內然後入玄參黃芪慢火熬一二時取出銚子安冷
炉上半時以火力稍息旋入露蜂房蛇退二味
將柳枝急掠却移銚放火上不住手掠慢火熬至紫黃色用綿瀘過濾入清油在銚內乘冷投

黃丹急掠片時又移銚子火上以文武火慢火
熬不在手柳枝掠千餘轉候藥油變黑色滴水
中凝結成珠則是膏成就若珠子稀少時
必候其得所然後磁器內收封待用或恐偶然
火熬太過稍硬難用却少將鷄熬麻油在內以
磁器盛封蓋於甌上蒸乘熱掠調收用膏藥熬
成了湏連所盛磁器置淨水中出火毒一昼夜
歇三日方可用日換二次夜換一次熬此膏藥
極難於火候湏耐看火緊慢火猛則藥中火發

不特失藥性，又傷人面目，救助不及。千萬謹戒。
膏藥方甚多，不下數十種。治瘡之神無出此方。千
金不換株瘡尤妙。

萬金膏 治瘡疽發背諸般瘡癥。從高墮墮打撲
傷損脚膝生瘡遠年癰瘍痔漏一切惡瘡。又云
專治發背，神妙不可具言。或初瘡若做瘡，用牛
皮膠令稀稠得所，如藥化攤在毛頭上。於初瘡
處或有做瘡處貼次用軟布帕子二條，於醃米
醋內煮令熟，漉出互相放熬紙上，乘熱蒸熨不

可。令布帕冷布帕二條不可都齊，漉出當審。一
條干醋內煮候蒸熨。得一條冷時却取醋內煮
者，熨之俟冷却，又於醋內取熱布蒸熨。庶幾常
得熱布替換，即易見効。若瘡痒乃是藥攻其病，
須忍痒，不正直候膿出將尽，即濃煎銀湯候
溫，洗去膠紙。次日依前更洗。若上有膿又如前
法蒸熨。雖連數日蒸熨不妨，但要瘡中膿盡瘡
乾為度。然後用牛肌紅平散，擦在瘡上，即以萬
金膏貼。每日一上，或兩上。每用再蒸熨。並如前

先鋪膠帶于瘡上了亦如前用貫衆湯洗入膠紙ヲ 龍骨 鱉甲 玄參 黃柏 草烏
黃連 鳥賊魚骨 黃芩 白芨 白斂
猪牙皂角 水別子 當帰 白芷 川芎
厚朴去粗皮 槐枝 柳枝各四寸是
半 没藥另研各
赤色去粗皮
淨油三斤 黃丹水飛淨炒過
一斤八兩 乳香另
半 檀香水飛淨炒過
一斤八兩 清麻油四斤入
前藥熬
煎候白帝焦色去粗皮 入黃丹一半不往手撓令
微黑色更入黃丹仍撓待滴入水中成珠不粘

手為度撓溫下乳沒末撓匀磁器盛用時量瘡
大小攤紙貼之治諸惡瘡加自然銅肉桂各一
分一方無當帰

磨風膏 治頭面五發瘡腫疥癬等疾及湯泡傷
磨風止痛減瘢痕止癩 白附子 白芍藥 白芨
芩零令香 白芨 白斂 白芷 白檀
藿香 升麻 紗辛 黃芪 甘草 杏仁去皮
尖各一兩 腦子 拮萎根一兩 大桔萎二兩
去皮 黃膾
芝麻油 右前十四味剉油內浸百日於臘日

木火炭上銀石器內煎至百芷微黃色離火入
枯萎二味，着內煮百沸，重綿濾去粗，再慢火上
煉油香，下削淨黃膈，燬開為度，傾在磁器內收
貯，上摻脑子密封，旋用磨風塗之。

金絲萬應膏 治損撲傷，損手足肩背，并寒濕腳

氣疼痛不可忍，小兒脾疳，鴻癩，咳嗽不肯服藥，

者，瀝清半斤

威靈仙二兩

草麻子二百枚

黃膈去皮壳

一兩

木別子二十八枚去壳切片

沒藥

乳香各一兩

麻油夏二兩秋四兩

右先將瀝清同威靈仙下鍋熬化，以槐柳枝撓候，焦黃色，重綿濾過，以瀝清入水盆候冷成塊，取出秤二斤淨，再下鍋燬開，下麻油、黃膈、草麻子泥，不往手，槐柳枝撓勻，湊慢火滴入水中，不粘手，扯拔如金絲狀方可，如硬，旋再加油少許，如軟，加瀝清試得如法，却下乳香、沒藥末，起鍋，在炭火上，再用槐柳枝撓數百次，又以粗布漉下，入盆內，扯拔如金絲頻換水，却用小跳盛頓，如落馬墜車，被傷疼痛處穴上，炙熱貼透骨肉。

為驗連換熱水數次浴之則熱血聚處自消小兒脾疳渴病貼肚上咳嗽貼背心上

洗藥神硝散

專治痘瘡潰爛臭稔朴硝一

蛇床子研破二兩

右二味和勻每用三錢水一丁碗煎

三五沸通手洗瘡上用後藥參之

聖効散

收斂瘡口

黃柏

一兩去粗皮炒赤色

穿山甲一

炒黃色

枳榔

木香各半兩炒黃色

右為末每用少許

候太膿出尽洗淨方可乾參瘡上

阿膠飲

一切瘧疾癆毒

牛膠一兩剉鯨粉

炒成珠粉草各

橘紅五錢

分三帖水煎服

家藏神驗血竭膏

當歸酒

白芷

大黃

黃連

黃柏

木別子去臘角

杏仁

露蜂房各一

兩

乳香

沒藥

血竭各三

血余一

兩

飛丹一

斤

麻油二斤

右除乳沒血竭餘藥入油熬焦去渣熬

至滴水成珠下舟將柳樹棍不住手搗軟硬適中入乳香等撓勻即成膏矣

薛立斋云血竭

取其以盡攻盡也若惡瘀已去毒氣既消宜用
來神效當歸膏以其生肌續筋也

李氏云瘧疾不服內托散及失宜通內毒以致因喉口舌生瘡甚則生紅黑菌客入甚速當用琥珀犀角膏治之向有患此症者諸法不効與此藥一日而安

琥珀犀角膏 真琥珀 犀角 反砂飛焱各一錢
冰片二分半 人參三分 酸棗一枚 右為末煉蜜丸
彈子大 每服一丸 麥門冬湯化下
季氏云瘧疾不服 托裏之藥熱毒內攻 喉舌生瘡甚至黑爛當服犀角散以解其毒

犀角屑 玄參 升麻 黃芪 赤芍
麥門冬去心 生粉草 當帰各一兩 大黃微炒三兩
右為粗末 每服三錢水煎

薛氏云前方破血降火內疎之劑也若其脉沉寒大使秘結發熱作渴喜飲冷者屬熱蓄於內左可用之若其脉虛浮大便不結發熱作渴畏飲冷者乃屬血虛於外可用當帰補血湯若尺脉洪數而無力發熱作渴小便頻數者屬腎水不足虛火上炎宜用加減八味丸益火蓋此症多因腎

水虧虛火上炎故也

內托黃蓍丸

治針灸所傷惡寒發熱膿水不止

肌肉不生瘡口不斂八兩黃蓍八兩川歸酒洗

肉桂心一兩木香一兩沉香一兩乳香各一一兩荒蕪末四兩

右為末以姜汁打荒蕪末糊為丸白湯吞

薛氏云若肌肉傷而瘡口不斂用六君子湯以補

脾胃一兩若氣虛惡寒而瘡口不斂用補中益氣

湯以補肺脾若血虛發熱而瘡口不斂用四物

參木一兩以滋肝脾若膿多而瘡口不斂用八珍

湯或十全大補湯以養血氣經云脾主肌肉如
前藥未應但用四君歸著以補脾胃更不應乃
下元陽虛急用八味丸以壯火生土若脉數發
渴者難治此真氣虛而邪氣實也

李氏云近有數人病背疽或先寒後熱先熱後寒
或連日或間日必嘔痰大汗而止皆用柴胡悍
山不應乃脾氣不正復感寒邪痰盛而作遂先
用不換金正氣散次用排膿內補散木香湯三
日而愈若外邪既去而仍嘔不止宜用大君

子湯以補脾胃○大凡胃氣虛而作嘔者必喜溫熱毒內攻而作嘔者必喜冷治當辨之家傳不換金正氣散治感胃風寒或傷生冷或瘡瘍或癰癧○蒼朮米泔浸
炒四兩厚朴姜汁拌
炒四兩炙粉草兩橘紅三藿香葉半夏姜制
兩木香蜜燉
兩人參白茯苓各一右每服五錢加姜東水煎
服凡痘愈後忽發渴而不救者十有八九或先渴而患渴者尤為難治急用加減八味丸可免前患如能久服永不作渴亦無痘症且氣血皆壯真

神劑也

薛氏云前症屬腎水枯涸虛火上炎口乾作渴飲水無度或舌黃作裂小便頻數或痰氣上壅煩躁不寧或二三年先作渴飲水或口舌生瘡兩足發熱多痰或瘡愈三年而口乾作渴小便頻數急用前藥多有復生者能逆知其因預服前丸可免此患若兼手足厥冷真陽虛也宜服八味丸大凡瘡後審其腎水不足用加減八味丸中氣虛弱用補中益氣湯氣血虛弱用十全大

補湯，陽氣虛寒，加姜桂，如不應用八味丸。

加減八味丸

熟地黃

八兩

乾山藥

山茱萸

核

去

五味子

炒各

肉桂

一兩

牡丹皮

白茯苓

各

兩

澤瀉

切片

蒸五

次焙

三兩

右

煉蜜

為丸

梧子大

中

每服八十

丸五更未言語前，白湯下。

黃蓍六一散

黃蓍

大兩

粉草

半兩

生半

久一兩

右為末，每服二錢空心日午白湯調下。不應用作大劑水煎服。

薛氏云：忍冬丸解熱毒消渴之藥也。六一湯補氣

虛，作渭之藥用之無有不驗。

五味子湯

腎水枯涸，口燥舌乾

五味子

麥門冬

各一兩

黃蓍

炒三兩

人參

二兩

炙甘草

五錢

右每服五錢水煎服。

此方乃滋其化元之劑。設腎水既涸虛火上炎，燥渴湧。

李氏云：痘疾將安，每日當服十全大補湯以補氣

血，宜與排膿內補十宣散相間服。

薛氏云：潰瘍屬氣血俱虛，補之固當。若患腫瘍而

氣血虛弱者尤宜預補，否則潰而不歛，尤太病之後氣血未復，多致再發。若不調補，必變為他症，而危或誤以為瘡毒復發，反行攻伐，速其斃也深可戒諸。

神効托裏散 治一切瘧疾發背腸瘧

黃芪

另水

忍冬葉

當歸各五錢

粉草

二錢

右酒煎服，渣敷患處

此乃托裏消毒之良劑

神効瓜萎散

治乳瘡癰癧與立効散相間服

黃瓜萎

一枚

當帰尾

甘草節

五錢

沒藥

另研一錢

右用酒三碗煎，一碗分三次服，未成即消，已成即潰。

立効散

治瘧疾癰癧

皂角刺

半斤炒赤

粉草

二兩

乳香

沒藥

另末一兩各

黃瓜萎

五個連支研碎

右每服一兩，好酒煎服。

薛氏云：二方治瘧疾癰癧，解毒止痛，通用之良剤也。若瘻癰寒熱，焮痛腫赤，乃肝經氣病，當清肝火以養肝血。若寒熱既止，而核不消，乃肝經之血亦病也。當養肝血，以清肝火。若初如草粒，看

於筋肉色不变，內熱口乾，精神倦怠，久不消潰。
乃脾肝虧損，當健脾土，培肝木。外臺秘要云：肝
腎虛熱，則生瘻矣。病机云：癰瘻不係膏梁冊盡。
因虛勞氣鬱所致，補形氣調經脉，其瘻自消。若
悞下之，必先犯病，禁經禁矣。

綠雲散

治五發毒瘻於背腦或手足。

此方治金石發疽果

有神効鳳尾草

形如鳳尾葉，背有金星，灸一兩。

粉草

一錢

用酒一碗煎，三五沸入冷酒一碗飲之，以醉為

度。

立効

清涼膏

治一切瘡瘍，膿去後用之。

當歸

二兩

白芷

白芨

木別子

去壳

黃柏

乳香

白斂

白膠

各五錢

黃丹

淨五兩

麻油

十二

右入油煎黑去粗，入黃丹以槐柳枝不往手順

撓再煎成膏，乃下乳香等藥。

碧油膏

止痛排膿，後用此。

槐枝

柳枝

桑枝

槐枝

乳香

血竭

各五錢

黃丹

淨四兩

右用麻油十兩照常法煎成膏，入乳香等，任貼。

神効酒煎散

治一切瘡瘍，其効如神。

人參

水經 卷之五
四
沒藥 當歸尾 各一 甘草 括萎 一枚半
右以酒三碗煎二碗分四服，粗焙乾加當歸末
一兩，酒糊丸桐子大，每服五十丸，以酒下，善
消毒活血。

經驗方 治金石發瘡 黑鉛一 甘草三
右用酒一斗置磁器內，先以甘草置在一邊，另
將鉛熔投酒一盞取鉛再熔，仍投瓦度，取酒飲
醉寢即愈。

治瘡疽用生甘草為末，酒調二錢服，連進數服，自

消。前方乃清熱消毒之劑，若目膏梁積熱，金
石薈毒，血氣壅滯者最宜，如脾胃虛，血氣痞滯
者不宜槩用，恐胃寒故也。

升麻湯 肺癰胸乳間作痛，嘔吐，膿血腥穢。

升麻 苦梗 以仁 地榆 黃芩 赤芍
丹皮 甘草 各等分水煎服。

穀道前後生瘡，謂之懸瘡，粉草一兩截斷以潤
水浸潤，灸令透內，細剉無灰酒煎服，有久患此
瘡已破服，兩劑瘡即愈。

崔氏云治手足甲疽或曰修甲傷肉或曰損足成瘡潰爛上脚用瓦丸置鐵板上假色赤如金者為真沸定取出研末以鹽湯洗搽之薛氏云前症即脫疽也此方固有良驗尤當調元氣為善太抵此症先釀酒灸燙膏染厚味傷脾或房勞虧損腎水故有先渴而後患有先患而後渴者若色赤作痛自潰可治色黑不潰不治色赤作痛者先用隔蒜灸活命飲托裏散再用十全大補湯加減八味丸色黯不痛者隔蒜灸

棄枝灸亦用十全大補湯加減八味丸則毒氣不致上侵元氣不致虧損庶可保生亦有曰修手足口咬等傷者若元氣怯弱或犯勞事外塗寒涼內服耗伐損傷脾胃患處不潰色黯上延亦多致死重者湏解去當以脚力轉解周體輕拽使筋隨骨出而毒得洩否則毒筋內斷仍上潰雖云無益且偏僻之處氣血罕到藥難導達况攻盡之剉先傷脾胃反損元氣不若灸法為良重者湏解毒為善故孫真人云在肉則剜在

則截雖親之遺軀不忍毀傷然不如是則勢必至于夭歿非休親之心也况患處已壞雖解不痛又何憚而不為乎女子亦有此患多因鬱怒虧損肝脾所致治法與前同

○疗瘡四肢發黃痘中或紫黑必先痒后痛先寒后熱也

夫疗瘡者皆臟腑積變熱毒邪氣相搏於經絡之間以致血凝滯注于毛孔手足頭面各隨五臟部分而發也其形如粟米或疼或痒以致遍身麻木頭眩寒熱時日嘔逆甚則四肢沉重心驚

眼花蓋疗腫初發時突起如疔蓋故謂之疔含蓄毒氣突出寸許痛痒異常一二日間害人甚速是尤在瘡疽之上也內經以白疔發于右鼻赤疔發於舌根黃疔發于口唇黑疔發于耳前青疔發於目下蓋取五色之應五臟各有所屬部位而已然或肩或腰或足發無定處如在手足頭面及骨節間者最急其餘猶可緩也凡疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四邊十餘刺令惡血出乃敷藥力方得入于針孔中則佳若

不刺破藥力不能入又看口中嬾邊舌上有赤黑如珠子者是也諸疔名目雖多其治法畧同初起宜以針刺出毒血將蟾酥丸或迴疔錠子之類從針孔縫入之上用膏藥貼之仍服飛龍奪命丹發汗及五香連翹漏芦湯之類并清心之劑蓋諸瘡皆屬心火心清則毒氣消散而易愈矣

追毒丹 取黃去疔頭追膿毒立効

蟾酥用酒化

蜈蚣酒炙

硇砂

白丁香

各一錢無此味加巴豆

雄黃二錢 輕粉一錢 硫砂二錢 巴豆七粒去油壳
右為末用酒打糊為丸麥子大兩頭尖入於針破口內用氷沉膏貼之後用膏藥及生肌藥追出膿血毒物又有如黑陷漏瘡者四圍死敗肉不去不生肌者不可治也亦用此藥追毒去死肌敗肉生新肉愈矣小者用二粒大者加用之病輕者不必用針只以手指甲爬動於瘡頂上安此藥水沉膏貼之其瘡即時紅腫為度去其敗肉為妙用之神驗

水沉膏 將白芨末放在蓋內用冰河水下去用布貼之如用膏不可用生肌藥 凡用拈点之藥用此膏圍貼則不傷好肉

追疔奪命丹 能立取効驗使腫內消

羌活 獨活 青皮君 防風君 黃連 赤芍

細辛

甘草節

蟬退 姜蚕

金線重樓

澤蘭 金銀花各等分

有膿加 何首烏 白芷 要通利加 青木香

大黃

梔子

牽牛

毒在下加

木瓜各等分

右每服五錢先將一貼加澤蘭金銀花各一兩
生姜十片同藥搗爛好酒旋之熱服不善酒者
水煎仍以酒水各一盞半生姜十片煎至熟服
之汗出為度病退再加大黃二錢煎熱取利一
兩次去餘盡為妙

此方以藥味觀之甚若不切然効速如神万不
失一百發百中如有別証再出宜隨加減治之
若心煩嘔吐加 甘草節一錢 荒草粉一錢 酸漿
水下 嘔逆惡心加乳香草粉 甘草湯下

飛龍奪命丹 治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽，一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成者服之立愈此乃惡症藥中至宝病危者服之立安萬無失一係神人之秘方不可輕忽 血竭一錢 膳酥乾者二錢酒化 乳香 没藥
銅元 珠砂為衣各二錢 雄黃三錢 輕粉五分 膳礬
寒水石各一錢 射香 水片各五分 海羊二十一条去頭足酒炙 右為末先將海羊連壳研如泥
蜈蚣一條酒炙 和前藥為丸荒豆大或加酒打麵糊每服二十九

先用葱白三寸爛嚼吐于手心男左女右將藥包在葱內無灰酒三四盞送下避風處被蓋出汗約步行五里許再以熱酒數盞催之以汗出為度

服前藥二十九即消如汗不出重者再服二十九汗出即効三五日重者再進二十九即愈如疔走黃過心者難治汗出冷者亦死如病人不能嚼葱搗碎裹藥以熱酒吞下服此藥後忌服冷水冷物黃瓜茄子猪魚鵝鶩羊蹄麵一切發毒

動風之物不可食之及月婦狐臭人勿見之此

藥活人萬々誠外科匙鑑

拔黃藥 用真取蟾酥飛羅麵為丸梧子大可將

一丸放在面前舌下即時黃出

百二散又名護心散 治發疔煩躁手足不往發狂者

急宜服之丸在瘡疽門

蟾酥膏 治疔 新蟾酥以白麵黃丹搜作劑圓如麥顆大用指甲爬動瘡上挿入重者針破瘡頭用一粒內之仍以水沉膏貼



田瘡錠子

治疗瘡大妙

草烏頭一

蟾酥

巴豆

十個去皮射香字

右為細末麵糊和就捏作

錠子如有惡瘡透疔不竊無益者用針深刺至痛處有血出以此推之上用膏貼疔瘡四畔推乏其疔二三日自然拔出此藥最宜緊用此証太抵與傷寒頗類其中亦有可針鍊石射出血者亦有火而敗爛出膿者其間變異百端不可不慎也

內托連翹散

疗瘡出時皮色不变不疼痛按搖

不動身發寒熱便是此瘡有水疔魚臍疔紫癰疔火疔諸般疔瘡如瘡黃于黃上用針刺仍服內托散自然消散連翹生地白芷赤芍各二兩各一
大黃山梔去頂薄荷各七錢朴硝二錢黃芩五錢甘草半兩每服一兩灯心竹葉各十莖水煎服其人喘加人參少許大病只三四服愈如服下心煩嘔者以護心散止之

護心散甘草五錢茺蔚粉一兩為末分作二次

酸蘿水下

破棺丹 治疔走黃不止 川芎 赤芍藥

山梔仁 牽牛各二兩半連翹 牡蛎 金銀花
紫花地丁各二兩半京三稜 甘草各二兩大黃三兩右為末煉蜜丸大每服一丸童便化開服忌飲酒及生冷

治疗走了黃打滾將死者 牡蛎 大黃 木通
山梔子 金銀花 連翹 牛蒡子 地骨皮
乳香 没藥 桔梗 皂角刺 每服五錢牡
實者加朴硝用水一盃酒半盃煎服此乃效

奇仙方也

鐵粉散 治疔瘡經久不效用此大妙
多年生鐵炒過三錢 松脂一錢 黃丹輕粉各五分
射香一分 右為細末清油調金瘡口立効
走馬趕筵丹 治疔瘡 沒藥 乳香 蓬砂
硇砂 雄黃 輕粉各三錢 水片一分 射香一分
右為細末蟾酥汁和為丸黃米大每服一丸溫
酒送下立効

金砂散

取疔瘡道人頭

微炒一兩硇砂三錢 即蒼耳子硇砂半錢

雄黃三錢 大蟾酥以多 右將瘡四圍刺破以少
油調藥末置於瘡內緋帛封之數日疔自出

蒼耳散 治一切疔腫神效

蒼耳草根莖苗子但取一色便可用燒存性研
細末用好米醋米泔澄淀和如泥隨瘡太小塗
上厚二分乾即易之不過十度即拔根出須針
破塗之加雄黃丸妙

蒼耳與白蘿研爛貼疔上拔去根 毒氣入腹嘔
吐者搗蒼耳汁飲之立効

治疗最有効用。蟬退僵蚕為末。醋調金丹。四圍晝塗口。俟根出稍長。然後拔去。再用藥塗。海藏方。單用姜蚕為末。津調塗亦佳。

治疗危篤者。二服即愈。輕者一服立效。
土蜂房能利大小便。一小窠全此物。蛇蛻全一條。用瓦器盛。塗塊。固濟火燄。存性研為細末。每服一錢空心。好酒調下。少頃腹中大痛。止其瘡已化黃水矣。仍服后方。

五聖散 大黃一兩 生姜 皂角刺 金銀花各三兩

人瓜蔓一枚 甘草一兩 用好酒二升煎六分不拘時服。

治疗瘡最驗。蒼耳 臭牡丹 各一大握搗爛。新汲水調服。瀉下黑水即愈。單用蒼耳葉搗汁。和童便服。一日三次立效。

肘後方 疗腫垂死者。一服立効。菊花葉紫莖者 一握搗取汁一升。入口即活。此神驗。根莖葉花皆可用。蒼耳散 治疗瘡累。用神妙。蒼耳根三兩五錢。烏梅五箇。帶鬚葱三根。用酒二鍾煎至一鍾熟。

服出汙後不散然後用勝金散

勝金散 取鐵秀炒為末每服四錢或三五六錢
用蘇水滾過停冷調服不吐為佳

○反花瘡瘡有努肉凸者是也

聖惠方治諸瘡努肉如蛇頭出數寸者硫黃末敷
乏即縮

肘後方 治瘡有肉突出烏龜燒灰敷立消

又方 白朮肉杵細入蜜捏成餅貼之妙

又方 馬齒莧燒灰研末猪脂調敷

瘡突出十許根如小草或大如梅者用花腳蜘蛛
絲纏其根則漸乾而自脫落

又方 甘草半生半炒 枯允 人中白 密佗僧等分

右為細末以童便半盞用無灰酒和熬竹蓖攬
成膏塗瘡上日三五次

經驗方 胭脂丕 貝母各一錢 胡粉二錢 白硼砂

沒藥各二錢 為末先用溫漿水洗後服藥

天○雜瘡

諸惡瘡入心腹嘔逆藥食不下 荒荳粉半兩

乾胭脂錢三 定粉二 為細末新水調下共一
天泡瘡通聖散及蚯蚓泥畧炒蜜調敷妙若從肚
皮起者裏熟發外速服通聖散
天行斑瘡湏臾遍身皆戴白漿此惡毒氣永微四年此瘡自西域東流於海內但煮葵菜葉以蒜
薑啖之即止

人面瘡 昔有入左膊有瘡如面歷試諸方惟後
以貝母為末水調灌之數日乃結痂遂愈
延指內生鷄眼子用鷄胃中食揩之餘者以后

壓之立驗
天泡瘡小麥炒焦為末以生桐油調敷効若神速
治一切瘡疥神異膏 全虫去尾洗七枚 蛇床子取末三錢
皂角一錠 巴豆去壳七粒 麻油一兩 黃臘半兩 雄黃另研黑色去粗入蟬化開取出俟冷入雄黃輕粉蛇
床子末攪勻成膏每用少許擦瘡上須先以苦
參湯洗過絕妙

苦參湯 苦參 蛇床子 白礬 荆芥

各等分煎湯溫洗

治漏瘡不收口 五倍子末 血竭未填塞之效

治一切瘻瘍花散 蓼花 梔子 黃連 黃柏

各等分 百合散

治頤頰瘍一名獨骨瘍 百合 黃柏

各一兩 白芨 二錢半 草麻子 五十粒 為末朴硝水和餅

貼日三五次

面上耳邊生浸淫瘡久不愈出黃水

名痘瘍

羖羊鬚 荆芥 乾棗

去核各二錢

俱燒存性研末入膩粉半錢每用少許清油調擦先以溫湯淨洗拭乾塗藥二三次效亦治大人小兒兩脇生瘡

附子散 治冷瘡日夜發歇疼痛

附子半兩炮

研末各

七錢

川椒去目

雄黃 研末各

七錢

枯凡 半兩

右為末麻油調敷瘡上日二次

白蒺藜散 熟毒瘡癰痒心神壅躁

白蘚皮

炒去炒 白蒺藜

防風去

川大黃炒去

赤芍藥

梔子 麦冬 条芩 玄參 桔梗 前胡

炙甘草各一為末每服二錢食後薄荷湯調服

兩

七寶散 热汗浸漬成瘡痒痛不止

黃蓍 川歸 防風 荆芥穗 地骨皮

木通

各二兩

明礬

一兩

每用一兩水煎五六沸去

粗稍熟渫淋患處拭乾避風 東垣此方曾治推車客皮膚皴裂不任痛兩手不能執轍足不能履地曰製此藥與之即効明白遂行自是屢

用屢效

王女英 治瘡痒痛

滑石

五分

荳蔻粉

微炒四兩

右末之用綿包搘上妙 一方加東葉一兩連翹散 治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人血風赤斑圓點開爛成瘡痒痛流黃水

連翹

生地

川歸

括萎根

荆芥

黃芩

赤芍

麥冬

瞿麥

木通

大力子

冰防風

山梔

川芎

甘草

各半分

每服五六錢水煎

加灯心二十莖不拘時服

紫花地丁散 諸惡毒瘡腫痛如神

川帰

紫花地丁

大黃

赤芍藥

金銀花

新編卷之三

卷之三

五味

黃蓍各半

丙

甘草根錢每服一兩水酒各一碗

煎服

水銀膏

月餘瘡多在兩耳及竅邊隨月盈虛

水銀半

二錢

黃連末 胡粉 松脂各半 猪脂

丙四
兩

右先敷猪脂令薄入松脂諸藥及水銀燒全勻

磁器收先以鹽湯洗淨塗上日三五度

治甲瘡

瓦礫散

綠礫燒赤五錢

盧會一錢

射香半

俱為末以紺袋盛包患指扎定以差

為度

塗瘡生鮮取黃塗之效

卷之三

又方

湯浸芒硝冷洗之效

明礬湯洗亦妙

又方

生紫蘇擦之累効

又人乳汁敷之好

又方

乾荷葉一斤水一斗煮濃汁洗瘡上日

三

又方 無名異末水調服

代指

手指甲頭腫痛

烏毒肉井仁

研爛醋調稀入指浸之愈

升麻和氣飲

治瘡腫癰疥瘡痛

升麻

桔梗

蒼术

乾葛

甘草 大黃

燈各

一錢陳皮

二錢

當歸 半夏 茯苓 白芷 乾姜

只壳各五分半 白芍一錢 右作二服水煎服

當歸飲子 治瘡痒疥癬溫毒風燥

當歸 川芎 防風 白芍 生地 菊黎

荆芥

錢半

何首烏 黃蓍 甘草

錢各一

右作二帖水煎食遠服為末亦可

除溫散 大治一切風毒疥癬癢狀如癲風

苦參

何首烏

荆芥穗

蔓荆子

薄荷

各半兩

白芷

烏蛇

酒宿焙乾

天麻

川芎

防風各半兩

右為末每服三錢酒調下日進三次六日一浴

令汗出血氣宣通一月膚澤如故
一掃散 一切瘡疥但相對而生者便是不問乾
濕痒痛日近年深用之立效

藜芦皮

兩

雄黃

錢五

輕粉

帖十

蚌粉

水粉

各一兩

為末用大鯽魚一對入麻油煎熟

去魚搘冷調藥搽瘡

若効遲加信末少許研

杏仁十粒

近陰處勿加

消毒飲

丹溪云消毒散氣毒藥也

防風

兩

甘草

兩

荆芥穗

三兩

大力子

四兩

每服五錢水煎服

治皮膚風熱遍身生癰疹，大力子、浮萍等分
為末，薄荷湯調下二錢。日再。

東垣云：每風瘡太風病相似，好葉葉洗蒸一宿。

日乾為末，白湯調服二錢。

姜蚕散 治風遍身癰疹痛疼成瘡。

白姜蚕黃洗焙 為末，每服一錢酒調服。一日三

次立瘥。

衍義方 有久病遍身風熱細疹痒痛不可任，連
腦腔脣腹及近陰處皆然，涎痰多夜不得卧。

苦參末一兩，皂角二兩，水一大升，搗取汁，銀石
器熬成膏，和苦參為丸，如梧桐子大，每服二十
丸，濕水吞，次日便愈。

小兒面瘡通面爛無完膚，膿水流滿，百藥不効。陳
年臍猪脂不入鹽者，敷之若神。
治諸般瘡疥，加減法 腫多加白芷、開蠶，痛多
加白芷、方解石，痒多加枯丸，陰囊瘡加吳
茱萸、溫多、香油調，乾痒出血，加太黃；連豬
脂調，至多加蕪荑、錫灰、換郎藜芦斑，紅

赤水經
色加黃丹，青色加青黛，在上加通聖散，在下部多用瀉川丸下之。脚腫多出血，加血分

濕熱藥

膿胞瘡 治熱為主，帶燥濕，黃芩 黃連
大黃各三 鮀床子 寒水石錢 黃丹五

白礬錢一

輕粉 白芷

無名異各少

木香許少

加痛者

為細末，麻油調搽

虫瘡如癰狀，退熱殺蟲為主。乾疥瘡，開鑿為主。
加吳茱萸 蕃薑 黑狗脊殺蟲 樟腦錢一

松柏頭上多白礬 雄黃 硫黃 水銀
黃連 加之 方解石分 鮀床子定痒
及柏油調搽 温多加之

疥癩瘡春天發，焦疥開鑿為主，不宜孤破。

枯凡 吳茱萸各二 樟腦五
寒水石半錢 鮀床子錢 黃柏 大黃各
硫黃錢一 檵榔錢一 右為末，猪脂調搽。
治瘡瘍濕瘡浸淫日久，痒不可忍，搔之黃水出瘥。
后復發取羊蹄根去皮，細切熬熱，以大酢和先

洗净傳上一時再以冷水洗之日一傳瘡若為
未傳尤妙

外臺秘要治_外取羊蹄根和猪脂塗上或着鹽少

許即結痂愈

千金翼 治遍身風痒生瘡疥茵陳煎濃洗立効
衍義云有久患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤
甚至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可忍
以菖蒲三斗剉日乾之為末布席上使恣卧其
間仍以衣被覆之既不粘衣被又復得睡不五

七日其瘡如失應手神驗

浸淫瘡痛不可忍者發寒熱大薊末水敷瘡上乾
則易之

外臺秘要

治卒發瘡秘驗方

風化石灰和醋

漿水調塗隨手即減一法用石灰炒紅出次

氣香油調敷 千金方淋石灰汁洗之

木香散

一切惡瘡多時不斂此能生肌肉止痛

木香 檀白

黃連各半

白芷三錢

為末先

洗每日一次乾捲有水出勿訝未効再捲又

方加地骨皮先于瘡上用溫漿水洗溫拭乾上藥妙不可言槩治下疳瘡如神

洗諸瘡疥取冬瓜藤或皮煎湯洗妙

治風癩瘡黃水瘡此方神妙

用新竹筒十箇內裝黑豆一層頭髮一層數層至滿以稻糠皮火煨之於次盆內週圍固火煨竹筒內汁滴出以蓋接之鵝翎蘸掃於瘡上數

日即愈

神仙活命飲治一切惡瘡瘧疽腫毒

川山甲	蛤粉炒黃 色淨大分	貝母	去心八分	甘草節	六分
防風	去叉芦五分	淡藥	六分	赤芍藥	六分
當帰尾	一錢	乳香	一錢	天花粉	八分
陳皮	三錢	右作二服用	無灰酒一大碗	慢火煎	
令	出氣量	上下食前後服	如患人能飲酒者服		
藥	隨意飲三兩杯	為妙詩曰			
真人妙訣世間稀	一切瘡疽總可醫				
消腫	如同湯沃雪	化膿立見肉生肌			
消毒散	治一切惡瘡赤腫疼痛	搗之如神			

黃連 錢五

地骨皮 一兩

朴硝 三兩

右為末，每用三五分水一盞煎至七分，去渣停

冷，用鷄翎掃之立止。

婦人陰瘡

仲景云少陰脉滑而數者，陰中即生瘡。狼牙湯洗，

乏狼牙二兩水濃煎以綿纏筋頭浸湯瀝洗，陰

中一日三度

治陰蝕瘡，洗溻散

甘草 一兩

乾漆 一兩

黃芩

地黃 當帰

芍藥 各二兩

龜甲 五兩

右細切以水七升煮取

一半去粗以綿帛納湯中用榻瘡處良久即易，
日二度每榻湯可作十里許即搘乾捻取甘溫
散薄敷瘡上使徧可經半日又以湯搘訖如
前敷藥有一婢此疾蝕處作兩瘡深半寸用
此湯并後甘溫散不經七日平復甚妙。

甘溫散

蚺蛇胆

青木香

硫黃

鐵精

射香

臨時加入綠射碎蛇毒

右等分為末，每

取二錢井花水調

日再服先令便利了即以後

方
艾枝薰法
入下部中日丹度

艾枝薰法 取東南艾枝五七枝，將枝頭輕敲碎，綿纏之蘸硫黃末數轉，令厚，又截一竹筒，先入下部中，却將艾枝薰燒着，入筒內薰之。

仲景云蛇床子散溫陰中之主藥

蛇床子仁為末，以白粉少許和勻相得，如東尖納入戶中，自然溫散。

荳胚散 陰蝕瘡 荒荳粉 蝦蟆灰各二錢半

胭脂胚一錢二分 右為細末乾摻

沐浴長春散 男卒下无陰濕久冷，陰囊左右夜痒，抓之則喜住，之則痛成瘡，流水為害甚苦。此方極妙，及治婦人陰溫子宮久冷。

牡蛎 蛇床子 破故帛 紫梢花 乾荷葉

官桂各等分

每用一兩半水一小鍋，入葱白數

莖前八分，先薰後洗，却用後津調散。

津調散 治婦精瘡婦人陰溫瘡，膿汁淋漓臭爛。

黃連

款冬花各等分

射香少許

為細末或先以地骨皮蛇床子煎湯洗軟帛拭乾津調敷之

乾津調敷之忌生湯洗

妬精瘡

青黛

款冬花分

射香少

活蜘蛛一枚以生薄荷葉或乾者包蜘蛛燒存性爲末酒調服之妙如小兒走馬牙疳以此

唾調末藥敷

婦人玉戶疳瘡

及小兒走馬牙疳

丹溪云初起發熱者防風通聖散去梢黃加浮萍

皂角刺

羅太無何首烏散

治肺風毒攻腫遍身癬變

成癰疹搔之成瘡或肩背拘急肌肉頑痺手足皴裂風氣上攻頭面生瘡及治紫白癩風頑麻

風症

荆芥穗

蔓荆子 蔚靈仙

何首烏

炙甘草

防風 車前子

各半分爲末每服

一錢食後溫酒調下白湯亦可

癬在頸項間后延上至耳成溫癬他治不應以芦
會一兩甘草半兩和勻先用溫漿水洗癬拭乾
敷之効

一方 芦會 大黃 輕粉 雄黃 姜床子
川槿皮 檀郎 為末先刮破癬醋調塗之
乾癬積年生痴瘍搔之黃水出每逢陰雨即痒用
狼毒末金之

柏脂膏治乾癬 柏油一斤 黃臘半斤 杏仁四十粒

朴硝一石拔右件鉄器內用老生姜葱白三根一
順攪五七次前沸濾過成膏塗之

又方 山荳根末臘猪脂調塗之

祛溫散 多年濕癬大有神功 蚕沙四

薄苛半味為末摻之或用生油調擦

羌活膏 治頸癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥

羌活 獨活 明丸 白蘚皮 硫黃 狼毒

各二錢 半兩

為細末油調成膏塗之

半兩

八宝散 治風癩松皮頑癬久不瘥神效
藿香 檀郎 破故帛 大腹皮 雄黃
輕粉 硫黃 枯丸 各半分為末油調搽日
三五次痒即搽之

香疥藥 治風疥癬瘡黃水瘡牛皮癬
輕粉 水銀 樟腦各三
川椒四十粒 杏仁二十粒 大風子四十粒
用絹包於瘡上熨之黃水瘡乾搽神效
一抹散 治乾癬不瘥

天南星 草烏頭各用生者一枚 為末以羊蹄根搗
取汁調金不過三次妙絕

牛皮癬及久年頑癬神方

紅粉霜五分 明凡一錢 密陀僧三分 川槿皮一錢
杏仁去皮油一錢 為末津唾調搽一日三次三日全愈
脚瘡皮厚如癩或流黃水黃水延處即爛浸淫年
久不愈者 此方屢試屢驗瘡癩俱佳
紅棗二枚去核將皂礬一錢納棗中以羊麻繫
扎用好酒二碗慢火煮成膏不要攪動膏成

東不用以膏塗患處二三度全愈若浸淫瘡初塗時畧疼少刻便止其瘡就結乾痂妙甚

臙瘡

夫臙瘡者皆由腎臟虛寒風邪毒氣外攻三里之傍灌於陰交之側風熱毒氣流注兩脚生瘡腫爛疼痛臭穢步履艱難此瘡生於臙骨為重以其骨上肉少皮薄故難愈至有多年無已口開闊皮爛肉現臭穢可再治法當先取蟲然後敷藥如隔紙膏麝香輕粉散之類湏翹足端坐勿

多行復庶可全愈矣

隔紙膏 治內外臙瘡 當帰 白芷 黃連
五倍子 雄黃 沒藥 海螵蛸 血竭
白艾 白斂 黃藥 厚朴已上各半錢研 黃丹
乳香二錢半研 輕粉一錢 右為細末用清油紙貼
瘡敷瘡上紺帛縛定有膿水解開刮去不潔再
貼藥如此數次即愈須先用燒鹽湯洗淨片帛
拭乾待片時水氣乾然後貼藥

又隔紙膏 專治臙瘡如神務要用絹帛縛得着

實貼肉方好過兩日取抹淨翻貼之

滴乳

沒藥

各二錢

黃丹

炒紫

色

降真香

灰

各半兩

已上俱另為細末

真黃蠟

一兩

真蜂蜜

一茶盞

右將黃丹入銅鑑內炒紫色次下降香灰末撊令勻却下蜜黃蠟另熬化傾入油蜜撊令極勻然後下乳香沒藥輕粉片腦再用銅匙撊之又勻待藥稀稠得所取出磁碗收盛勿令泄氣臨用看瘡大小攤之油紙綿紙尤佳竹帛不耐藥在中紙在外翻覆貼之

治臘瘡久不愈

龍骨

半錢

乾猪糞

半兩

燒存性

輕粉

少許

梅榔

半兩

乳香

沒藥

各一錢

右為細末先以燒鹽湯洗瘡以軟絹帛拭乾清

油調敷瘡溫則捲之

秘傳隔紙膏 治年月深久臘瘡不愈者

老松香

樟腦

谷丹

炒

水龍骨

即旧瓶

石灰

輕粉

又不愈加

白芷

川芎

海螵蛸

總為細末溶化松香加少清油和之以油紙隨瘡大小糊袋盛藥夾之用水洗淨縛在瘡口上

二日定四日一換若單用白芷川芎螺蛸三味煎水洗之立効

屢驗方 枯丸三錢 墨煤煉存性一兩 研勻以生桐油做隔布膏貼之先以五倍子川椒葱三味煎湯洗拭乾貼藥一日一換七日全愈

又方 治似臘非臘 蜂蜜四兩 嫩松香二分一錢 先將蜜熔滴水成珠次入松香末攪勻如上法做貼洗亦同

又方 麻油二兩熬至滴水成珠又將蜂蜜四兩熬

至滴水成珠將油換入又將伏龍肝四兩為末入內攏勻成膏先將瘡洗净以膏塗之一日二次其効甚速

又方 冬青葉 脾猪胆 百草霜 二味和勿
將冬青葉與本人嚼爛先將瘡用椒葱湯洗净乃以胆霜敷後却敷冬青葉三四次便愈
粉麝散 治内外癰疽數十年不愈者
生龜一枚去肉取壳醋一盃炙醋盡為度蝦令百蟻尽存性以盃蓋在地出火毒為細末

入輕粉射香拌勻臨用先以葱水洗乾敷藥如

絕妙絕

又方 新起未久者甚好 玉簪花葉小便浸貼

一日一換五日愈

諸凡瘧毒惡瘡多年臭爛成坑不收口者此方極

售一十七成功

乳香

沒藥各五

天靈蓋

兩

右為極細末摻之神良鮑清溪之子患瘡後腦瘡肉爛成坑骨露不收口百藥無効敷此立効

大宮詹少溪吳馭閔校

終

