

30

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2



1

0

2m

1

0



中武  
津卷  
616  
40

赤水玄珠醫案三吳治驗二卷目錄

別駕夫人產後發熱一有發明

太夫人白帶二

吳北海令政經行四肢疊々發塊紅紫三

周芻玉白濁四

竹匠婦妊娠吐血胸腹脹痛五有發明

李妓夢遺咳嗽六

曹鏗胸鬲不暢八

沈別駕門下老僕三陽合病十有發明

祭中林內人陽明少陽合病

十一

吳九宜先生早晨泄瀉

十二

李其文

沈大官左膝腫痛不能起止

十三

沈繼庵下痢脫肛內人乾霍亂

十四

沈晴岳先生五更耳鳴

十五

潘景宇內人頭痛作瀉

十六

臧六老上吐血下瀉血

十七

臧氏婦脣邊痛下痢紅白

十八

丁耀川令堂吐血左骼肛門互換作痛

十九

丁文學令姊量厥

二十

金良美咳嗽吐紅潮熱右脇不能卧

二十一

倪五娘孕口眼歪邪

二十二

王祖泉令政頭痛惡寒汗出如兩

二十三

溫巽橋子婦滯下

二十四

溫一渠內人血虛咳嗽

二十五

溫巽橋二令媳產後右脇脹痛白帶如膿

二十六

溫天衢病目吐血

二十七

張二娘子孕七月嘔吐不止

二十八

王敬泉內眷痰嗽腹脹

二十九

溫南溪內人大便秘結三十

陳春野公令愛丁奚疳症三十一

潘敬竺令媳血下筋膜如手大者一二桶三十二

張懷赤公早晨洩瀉下元虛寒三十三

臧七房二老夫人痢三十四

蔡樂川令眷頭痛如破三十五

周蘆汀迺眷胃脘痛三十六

目錄終

赤水玄珠醫案二卷

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人余煌

子泰來全閻梓

沈三石別駕公夫人嚴產三日而腹不暢。南潯女科陳姓者為之大瀉五六次。遂發熱惡心。又用溫膳湯止吐。小柴胡退熱。服四日。熱吐四日。粒米不進亦四日。又進八珍湯加童便。服後昏

三  
遺傳  
卷之二  
六  
贛。耳聾。眼合。口渴。腸鳴。眼胞。上。下。及手足。背。皆  
有虛浮。因逆。予治。診其六脉。皆數。時五月。初二  
日也。予曰。脈書云。數脉所主。其邪為熱。其症為  
虛。法當以十全大補湯。加炮姜。進之。夜半。稍清  
爽。進粥一孟。始開目。言語次。日午時。以承值者  
倦。而藥不相接。且言語太多。復昏昧。不知人事。  
初四日。以人參白朮各三錢。炮姜茯苓陳皮各  
一錢。甘草五分。煎服。訖體微汗。遍身癢。瘡熱退  
而神爽。下午。又藥不接。又動怒。冒昧復如前。六

脉散亂。無倫。狀如解索。嘔。痙。沒。而虛。極矣。亟  
人參白朮各五錢。炙甘草。炮姜。大附子各一錢。  
連進二帖。是夜熟寢。唯呼吸之息尚促。拘六日。  
脉又數。下午。發熱不退。環跳穴。邊發。一毒。如碗  
大。紅腫微痛。未入。父嚴翁。與陳女科交譖。之曰。  
向之發熱惡心。皆此所致。由附子。乾姜。溫補誤  
也。須急用寒涼解毒之劑。予正色而諭以理。曰。  
此乃胃中虛火遊行。無制。太虛之症。非毒也。若  
作毒治。而用寒涼。速其死爾。內經云。狀者氣行。

則愈。惟者着而成病。惟大補庶可萬全。三石翁然予言急煎附子理中湯進之。日夕兩帖。參术皆用大錢。服後沸壅復出。毒散無踪。热亦退沾沾喜矣。復以參苓白术散調理而全安。皆由庠後誤用下藥致變。百出噫唏。彼不達變之專科。其可任哉。

詰封吳太夫人者。車駕湧瀾公母也。年餘六十。久患白帶。歷治不効。變為白崩。逆予治之。診得右寸滑。左寸短弱。兩關濡。兩尺皆軟弱。予曰。據脉

心腎俱不足。而中焦有濕。脉經云崩中日久為白帶。漏下多時。骨木枯。今白物下多。氣血日敗。法常燥脾兼補心腎。以既濟丹補其心腎。以斷下丸燥中宮之濕。則萬全矣。服果不終劑而愈。既濟丹方。鹿角霜。當歸。白茯苓各二石。菖蒲。遠志各一兩。五錢。龍骨。白石脂各一益具智仁錢。乾山藥打糊為丸。梧桐子大。室心白湯。下七八十九丸。

斷下丸方。

頭二蚕沙炒三

黃荆子炒二

海螵

三  
卷二十一  
三  
續

鈎磨去

樗根白皮各一

麵糊為丸下半白

湯送下六十九。二

吳北海太學令政。每月經行期之前。四肢疊々發塊。紅紫脹痛。不思飲食。胃脘亦常痛。經水多不及期。診其脉。兩手皆駛。以症脉參之。肝脾二經有鬱火也。蓋肝主怒。脾主思。多思多怒。隱而不發。鬱滯於中。故臨經繫々發紅腫於四肢也。以柴胡。川芎。香附。烏藥。白芍藥。青皮。丹參。玄胡索。鬱金。酒炒黃連。山梔子。

治之而愈。三  
吳之清客周芻玉者。豪放不拘。人言有晋人風。酒後益恣。而好男色。因患白濁。吳醫有以補中益氣湯升提者。有以六味地黃丸補陰者。有以五苓散六一散滲利者。有為降火者。有為溫補者。不效。又以草頭藥匙進之。肌瘦如削。膝軟如瘞。患有年所矣。因紹介吳太學北海而謁余。懇為治之。診其脉。右寸閏皆數。予曰。皆由酒後不檢所致也。中宮多湿。多痰積而為熱流於下。故

濁物淫滌而下。久不愈矣。與以加味端本丸服之。而瘥。白螺獅壳四兩。牡蠣苦參葛根黃柏各二兩。陳皮半夏茯苓各一兩。甘草五錢。麵糊為丸。令早晚白湯下三錢。四

丁酉夏。予寓雉城顧鄉宦宅。其門下竹匠婦懷妊五月而患心痛。究其所由起。謂由失足墜樓也。始教飲韭菜汁一盞。而痛隨止。其失又從它醫贖藥二帖歸。令煎服。服既。心復痛。吐鮮血盈盆。胃間冲々。上抵疼不可言。危在頃刻。竹匠告急。

予僕孫安。安怜之。懇予診治。六脉皆洪大。汗出如雨。喘息不相續。其婦樓居低小。予令亟移居樓下。隨與益元散五錢。令用紫蘿湯調服。又囑之曰。今夜若睡。聽其自醒。切勿驚動。汗止。即甦也。服後果睡。至晚汗斂。而胃鬲不痛。喘息亦定。再與固胎飲一帖。煎服而全安矣。先是鄰醫診其脉。謂吐血之脉宜沉細。今反洪大。而汗出喘息不休。危在今夜。及病起來。詢余曰。姪娘不得汗。不得下。不得利。小便是。謂三禁。昨日之劑悉

犯之而反獲効何哉予曰醫貴審症蓋婦之患  
非由病汗以樓居低小當酷暑而熱逼故也汗  
血去而胎失養故忡忡上拒喘息不續移樓下  
以避暑氣益元散為解暑之聖藥而紫蘿又安  
胎下氣之妙品氣下則血歸原而病痊矣此對  
症之藥法出王海藏醫壘元戎中四血飲是也  
特諸君檢閱不徧即檢閱亦不知為胎產之治  
余何能不過融會前人之法用之而不膠焉耳  
鄰醫俛首唯唯而退五

壬申秋仲予東遊攜李而王松泉吳小峯偕行小  
峰語予中秋至矣此間一妓李姓者行第七殊  
可人意須訪之晚食佐酒至則見其態度果澹  
雅風致坐少頃連咳兩聲小峰究其病曰偶耳  
小峰謂母誑孫公知人生死不啻扁鵲可求一  
診診之兩寸短濶兩尺洪滑閔絃予未語而小  
峰問脉予曰脉甚恠公可問經行否曰行僅一  
日亦僅點滴予曰此脉在良家主夢遺若不宜  
有也妓曰良然即御客時亦或遺遺則冷汗滛

公可問經行否言問經行  
未典不來也訓誤  
若少也此訓恐誤耳

卷之二

淫體倦而不能支。小峰為請藥予曰。姑置之。小峰問何故。予曰。金木相勝。心神無主。法當不治。小峰謂人尚無恙。何得便至於此。予曰。絃為清令。當金旺之時。猶然猖獗。設在卯月。木旺火相。肺金枯瘦。水之上源已竭。且腎脉洪滑。妓以慾勝。陰血既虧。淫火愈熾。書云。陰虛則病。陰絕則死。今已咳嗽。其兆見矣。可治乎。次年二月果死。

六

有老妓金姓者。其嫂三月患頭痛。身熱口渴。水瀉

不止。身重不能反側。日漸昏沈。耳聾眼合。夢多。亂語。嘉秀醫者。歷試不効。視為必死。予適吳江。歸。便道過檇李。訪南溪吉泉。二兄吉泉兄。以是症見詢。且言諸醫有以補中益氣湯進者。有以附子理中湯進者。二藥已煎成未服。幸弟至。乞為診之。六脉洪大。觀其色。內紅外黑。口唇乾燥。舌心黑胎。不知人事。予曰。此疫症也。法當清解。急以小白湯進之。猶可生也。若附子理中湯。殺乏耳。安可用。南溪兄問。小白何湯也。予曰。小柴

嘉秀醫者  
讀烏人姓名恐  
誤耳

胡。白虎湯合而一之是也。南溪兄謂瀉瀉昏沉，如此恐石膏不可用也。予曰：此挾熱下利，但使清陽上升，則瀉止，熱退而神氣自清也。服訖，夜半，神氣甦醒，惟小水不利，熱渴不退。予思仲景法，謂渴而身熱不退，小水不利者，當利其小便，乃以辰砂六一散，一兩，燈心湯調服之，兩帖而瘳。南溪兄曰：死生信乎命也。弟頃刻不至，必服理中湯。此婦不為泉下人哉。七

有曹姓，諱鑑者，九月重陽，以胃鬲不舒暢，而謁南

溪兄為治，診脉竟，予至。南溪兄起語曹，曰：舍弟高年，浼診之，診訖，未有言。而南溪私問曰：曹何如脉？予曰：不治，會易貨者沓至。予亦別去。曹果次年二月死。南溪兄問曰：向曹無它病，而弟見脈，即斷不治，何也？予曰：其脉兩寸洪滑搏指，兩關微絃，兩尺微弱，難經所謂溢脉也。九月深秋，木彌零時也，不宜絃大。大則上盛，下虛。至二月木旺，未能生火，火木性皆上升，不下，下無真陰，以相濟。是有陽無陰，有升無降。內經曰：出入廢。

則神机化滅升降息則氣力孤危是以斷曹子  
二月當嘔吐而死也。八

嘉善之妓李雙號素琴體雖肥而性冲澹態度閒  
雅端重歌調倡家推其擅場與予邑程芹溪處  
厚患痛風自二月起至仲冬諸治不効鵝母憚  
毒遂視為痼疾不為治而芹溪固懇予診之六  
脉大而無力手足肢節腫痛兩跨亦痛不能起  
止肌肉消其半日僅進粥二碗月汎兩月一行  
甚少予曰此行痺也芹溪問病可治否予笑而

應曰君能娶予能治之芹溪曰嫁娶乃風月中  
套語公長者乃亦此言予曰觀此子雖墮風塵  
寔有良家風度予故怜之且君斷絃未續而彼  
有心於君或天緣也芹溪曰誠吾素賴恐鵝母  
高其價而難與言予謂衆其病而盟之易與耳  
芹溪以予言為然乞為治之以人參白术故仁  
各三錢當歸枸杞杜仲龜板蒼耳子各二錢晚  
蚕沙秦艽防風各一錢大附子甘草桂枝黃柏  
各五分十帖而痛止腫消改用歸芍六君子加

故仁丹參紅杏石斛紫荆皮三十帖而全愈。芹溪娶之，善持家，舉族稱賢，而亦羨予知友焉。九

沈別駕翁有老僕頭痛遍身骨節痛，面色黑，發熱口渴，胷鬲脹，飲食七日不入，復感寒，人皆危之。予診其脉，左絃數，右洪大，以藿香、蒼朮防風、葛根、白芷、紫蘿、甘草、陳皮、大腹皮、麥芽、枳實，服後胷鬲稍寬，熱與痛更甚，改以麻黃、葛根、紫胡各二錢，石膏滑石各三錢，紫蘿葉、白芷、蒼朮各

一錢，甘草五分，姜三片，服後大汗出，而熱痛皆除。惟口渴，又以白芍藥當歸石膏知母柴胡黃芩、麥冬、葛根、陳皮煎服，全愈。別駕翁喜詰予曰：老僕病甚重，無不謂其必死。先生三日起之，此何症？而何湯劑？飲之使起也。予曰：此三陽合病，先為飲食所傷。予故先用藿香正氣湯加消導之劑治其本，又以六神通解散加助表之藥治其標。病雖重，年雖高，喜其色脈相對，故投以對症之藥，易愈也。翁曰：在先生然耳。若它人輕者，

且重。兇重者乎。吾未見其能起也。

蔡中林文學內人。發熱口渴舌上燥裂。小腹痛嘔吐。藥食不能入者七日。諸醫之技殫矣。皆視為禹食而不可為。吳我峰翁固邀予診。右寸脉絕不應。指閑沉滑有力。左手絃數。予曰。此陽明坐陽合病邪。熱壅於上。焦然也。非禹食法當解散。數劑可愈無恐。以軟柴胡石膏各五錢。半夏麴枳實黃芩黃連葛根竹茹人參各二錢。姜三片煎服。藥納而不吐。五更下黑糞數塊。熱痛減半。

次日仍與前藥。右寸脉至是亦起。粥始進。日用小柴胡加橘紅竹茹葛根服三帖而全安。

十一

吳九宜先生。每早晨腹痛洩瀉者半年。糞色青。腹膨脹。人皆認為脾腎洩也。為灸關元三十壯。服補脾胃之藥皆不効。自亦知醫。謂其尺寸俱無脉。惟兩關沉滑大以為憂。以人言洩久而六脉將絕也。予為診之。曰。君無憂。此中焦食積痰洩也。積膠於中。故尺寸脉隱伏。不見。法當去其

積諸公用補謬矣渠謂敢下耶予曰何傷素問云有故無殞亦無殞也若不乘時久則元氣愈弱再下難矣以丹溪保和丸二錢加倍急丸三粒五更服之已刻下稠積半桶脹痛隨愈次日六脉齊見再以東垣木香化滯湯調理而安渠稱謝言曰人皆謂六脉將絕為虛極公獨見之真而下之由公究理深邃故見之行事著之談論皆自理學中來它人何敢望其後塵十二沈大官左膝腫痛不能起止者年半太便瀉一日

三次診其脉絃緊予曰此脾虛有濕熱凝於經絡流於下部也古謂腫屬濕痛屬火用蒼朮黃柏薏苡仁為君澤瀉猪苓五加皮為臣矣甘草防風桂枝為佐木通為使四帖痛減腫消瀉瀉亦止改用蒼朮蒼耳子五加皮苡仁當歸枸杞子杜仲丹參黃柏烏藥葉酒糊為丸調理月餘步履如故十三

沈繼庵先生下痢十日腹痛脫肛後重噯氣不知飢一友用補中益氣加白芍藥腹痛愈加後

重亦甚。予脉之。右關滑大搏指曰。此積滯固結腸胃間。故後重脫肛也。當為推蕩。以其素弱多欬不敢。只為調氣而兼消導。木香山楂枳實川芎白芍藥黃連黃芩秦艽服後稍寬。次日用七傷丸二帖全愈。其內人患發熱頭痛。遍身痛。乾嘔口渴。胃鬲脹悶。坐卧不安。醫與以參蘿飲。乾嘔愈甚。又加煩躁。予診之。右手洪大倍於左手。浮數。予曰。乾霍亂症也。與以藿香正氣散減去白朮桔梗。加白扁豆香薷一帖。吐止。食

進遍身痛除。惟口渴額痛未除。小水不利。以石膏香薷滑石各五錢。橘紅藿香葛根各二錢。枳榔木爪各一錢。甘草五分。姜三片。一帖而愈。

四

沈晴岳先生。五更耳鳴。腹不舒暢。稍勞則煥然熱自汗。脈右關滑大有力。左脉和緩。原為當風睡臥而得素來上焦有痰火。午後過勞或受餓。大作眩暈。冷汗津津。再不敢動。稍動則嘔吐。此皆痰火所致。蓋無痰不作暈也。先與藿香正氣散

二十一  
丁帖以去表裏之邪。繼與溫膽湯加天麻服後。  
眩暈嘔吐皆止。次日診之右關脉仍滑。此中焦  
食積痰飲膠固已久。卒難動搖。姑以二陳湯加  
枳實黃連滑石天蒼粉天麻竹茹調理。後以當  
歸龍會丸加牛胆南星青礞石。凡數帖全愈。

五

潘景宇內人。後半夜不睡。面黃肌瘦。兩太陽及眉  
稜骨痛。大便糖稍勞動則體熱。四肢無力。其脉  
左寸洪滑。自春至秋皆然。此由脾虛肝心二經

大盛然也。先用四君子加酒連紫胡白扁豆澤  
瀉滑石調理。夜與錢仲陽安神丸數粒。燈心湯  
送下。服八日得睡。兩太陽亦不痛。繼用六君子  
加黃芪秦艽柴胡澤瀉當歸白芍。藥黃柏全安。

十六

臧六老上吐血。下瀉血。胃鬲背心皆脹。原從怒觸  
入大肉所傷。故發熱而渴。醫者皆作陰虛火動  
而為滋陰降火。曾背愈脹血來更多。予診之。兩  
關俱洪滑有力。謂曰。此肝脾二經有餘症也。作

陰虛治左矣。內經曰：怒傷肝，甚則嘔血。并下洩胃背，脹痛，瘀血使然。脾為太陽所傷，故不能統血。今誤用地黃、麥冬、黃柏知母等劑，是以脾益傷而上焦瘀血愈滯也。惟調氣、健脾、兼之消導，則萬全矣。六老曰：人皆謂勞怯，故發熱吐紅血上，吐陽絡傷也。血下行，陰絡傷也。陰陽俱傷，法當不治。公獨認非陰虛何也？予曰：脉書云：脉數無力者，陰虛也。令脉固，非陰虛。書又曰：凡陰虛之熱，發於申酉戌間，夜半而退，明白，猶是如潮。

信然。以下午乃陰分主事，故曰陰虛潮熱也。今熱不分晝夜，而症亦非陰虛，故曰作陰虛治者，左也。六老聞言大喜，曰：公誠見垣一方者幸惠。十七以生之，即與山楂香附枳實，調氣消導，為君。丹參、丹皮、桃仁、滑石、茅根化瘀血，為臣。黃連蘆根解太陽之熱，為佐。四帖胃背寬，血吐止，惟腹中不舒，仍以前藥同，丹溪保和丸與之，四帖大便下極臭，黑糞半桶，寢食俱安矣。十七有減氏之婦，原以有痰火服降火之藥過多，至秋

痰積因令氣下行而滯於大腸。脣邊有硬塊。按之甚痛。痢下紅白。八日。下惟點滴。日夜二十餘行。腹痛潮熱。口渴。小水不利。大便裏急後重。飲食不進。身重。不能轉側。予診之。喜左脉皆有神氣。即從劉守真之法。行益。則便曠自愈。調氣。則後重自除。治之用白芍。蕪滑石。桃仁為君。當歸為臣。木香。枳榔。山楂。酒。芩。連枳壳為佐。服下大便稍流利。腹中稍寬。次日仍與前藥。則滯下大行。痢減。太半。第三日用芍藥。當歸。滑石。桃

仁。炙甘草。酒。連木香。與保和丸。全服。下午大便行。上午所服丸藥隨糞而下。乃知積滯已盡。諸症悉減。惟脅邊痛未全止。以仲景小建中湯。加當歸。木香。服之。而安。

丁耀川文學令堂年四十四。常患胃脘痛。媚居十五年。日茹蔬素。其年七月觸於怒。吐血。枕許。不數日平矣。九月又怒。而吐血如前。加腹痛。至次年二月。忽裏急後重。肛門大疼。小便短澁。出惟點滴。痛不可言。腰與小腹之熱如滾湯泡者。日

惟仰卧不能側一側則左跨并腿作痛而跨原有痛小便疼則肛門之痛減肛門疼則小便之痛亦減肛門以疼之故不能坐遇驚恐則下愈墜而疼經不行者兩月往常經來時腰腹必痛下紫黑血塊甚多今又白帶如注口渴通宵不寐不思飲食多怒面與手足發虛浮喉中梗梗有痰肌肉半消診之脉僅四至兩寸軟弱右關滑左關絃兩尺濡據脉上焦氣血不足中焦有痰下焦氣凝血滯鬱而為火蓋下焦之疾肝腎

所攝腰跨肝之所經而二便乃腎之所主也據症面與手足虛浮則脾氣甚弱飲食不思則胃氣不充不寐由過於憂愁思慮而心血不足總為七情所傷故尔內經云干陽之病發心脾女子得之則不月此病近之且值太令當權之候誠可慮也所幸者脉尚不數聲音清亮尤可措手因先為開麝清熱調達肝氣保過夏令後再為驟補陰血必戒絕怒氣使血得循經而病可痊不然則倉扁亦難奏功矣初投當歸龍會丸

杜牛膝

昂天名精根

以徹下部之熱。繼以四物湯。龍胆草。黃柏。知母。柴胡。澤蘭葉。煎。吞。滋腎丸。連服四日。腰與小腹之熱始退。後以香薷石菖龍胆草桃仁滑石杜牛膝甘草梢軟柴胡煎。吞。滋腎丸。大小便痛全減。十九

丁文學長令姊常患暈厥。吐痰枕許。乃甦。十一月三五發後。又口渴。五更倒。飽腸鳴。腹疼。溲瀉。小水短濶。咳嗽。余脉之兩寸濡弱。兩關滑大。此中焦痰積所致也。先與二陳湯。加蒼木山楂麦芽。以

健脾去濕為臣。以白芍藥止痛為君。以滑石澤瀉引湿熱。從小便出為佐。黃芩為禦佐。上十帖二十陰之痛俱止。改以六味地黃丸。加黃柏知母。牛膝。服之全安。二十

有金良美者。年十八。患咳嗽吐紅。下午潮熱。夢遺。市醫進四物湯。加天麥門冬黃柏知母之類。治半年。反加左脅脹疼。不能側卧。聲音漸啞。飲食輒惡。心肌肉大削。六脉俱數。醫告投窮。因就子治。觀其面色白。又隱隱有青氣夾之。兩足痿弱。

無方予語之曰此症氣虛血熱而肝脉甚絃續  
則木氣太旺脾土受虧不能統血殆始怒氣所  
觸繼為寒涼之劑所傷以致飲食惡心肌肉瘦  
削書云脾胃一虛肺氣先絕以肺金不足則肝  
木愈不能制濁痰瘀血凝於肺竅故咳嗽聲啞  
滯於肝故左脇不能貼席而卧病勢危矣喜在  
青羊猶可措手因急用人參二錢鱉甲五錢為  
君白朮白芍陳皮茯苓通草貝母各一錢為臣  
甘草牡丹皮各七分為佐桔梗五分為使二十

帖潮熱止咳嗽減太半三十帖聲音闊亮左  
亦能貼席而卧後以大造丸調理全安矣乃囑  
之曰病愈雖可喜而絃脉未退須切忌怒氣及  
勞心勞力之事庶幾可保無虞苟不守予言而  
勞怒相觸血來必不能禦戒之防之此後精神  
日王肌體豐肥六年無事一日遇事拂意大怒  
而又結實勞心則血如泉湧頃刻盈盆上唇黑  
腫汗出淋漓急請予診脉訶無倫診畢渠語近  
侍欲大解予曰此死徵也陰陽乖離矣辭而出

未離門而氣絕。父母哭謝予曰。始守翁訓苟活六年。一旦不戒。遂如翁所料。先生雖命亦不自慎。致之其為人也。量窄而繫於財。因記此以戒世之重財輕生者。二十一

倪五娘子。以中風暈厥之後。口眼歪邪。左脚右手不能屈伸。渴小水不利。兩頰緊出。語艱澁。問之。則期期而對。不問默然。亦不思飲食。行年五十矣。諸醫不効。予治始與涼禹散加石菖蒲遠志煎湯化錢氏安神丸二顆服之。其夜太便四

行。次日神氣遂清。口眼半正。惟車頰尚瞽。未能聞聲。細察形氣。但弱也。即與六君子湯加麥門冬滑石天荳粉石菖蒲遠志當歸薄荷。服後神思大清爽。能自坐。不須人扶。語言亦稍利。改以六君子湯加麥。冬天荳粉石菖蒲當歸五加皮。薏苡仁。紅荳天麻。十帖全愈矣。二十二

王祖泉。令政。患頭疼。夜熱酒漸惡寒。汗淋漓如雨。上身熱。下身寒。渴不思飲。遍身疼。腹有一塊。大如拳。硬如石。腸鳴。小水短少。飲食俱廢。脉則右

閔滑。左絃數究所由起謂大怒後即傷於食。市醫皆以地黃門冬參連黃柏之割治之。熱愈甚。脾氣大虛。予治用平胃散加山楂麥芽砂仁香附木香川芎枳實連進四帖。中氣稍能運動。而夜熱如前。再與補中益氣湯。寒熱俱退矣。而腹痛裏急後重。予知其積滯將行也。乃與白六神丸。而腹痛後重皆除。改進以參苓白朮散加香附烏梅山楂服之。病良已。二十三

溫異橘子婦。吳車駕湧瀾公長女也。發熱惡心。小

瘡

腹痛原爲怒後進食因而成積。左脚酸痛已十日矣。南潯有陳女科。始作瘡。疫療治。嘔噦益加。又作瘡。治粒米不能進變爲帶下。裏急後重。一夜三十餘片。陳拔窮而辭去。且言曰。非不盡心。犯逆症也。下痢身涼者。生。身熱者。死。脉沉細者。生。洪大者。死。今身熱脉大。而又噤口。何可為哉。因請予治。脉之兩手皆滑大。尺部尤搏指予曰。症非逆誤。認為瘡。治者逸也。雖多白。不食。而尺脉搏指內經云。在下者引而竭之法。從

下可生也。即與當歸龍會丸一錢五分服下。去  
稠積半盆。痛減大半。不食者十四日。至此始進  
粥一甌。但胃鬲仍飽悶。不知餓。又與紅六神丸  
二錢。胃鬲舒。而小腹軟。惟兩跨痛。小腹覺冷。用  
熟磚熨之。子戶中白物綿丸下。小水短濇。改用  
五苓散加白芷小茴香白鷄冠芥紫胡服之。至  
夜。腹作疼。亟以五靈脂醋炒為末。酒糊為丸。  
三錢。白湯送下。通宵安寢。次日精神清健。飲食  
大進。小水通利矣。而獨白物仍下。耳。用香附炒

黑。存性枯礬各一兩。麵糊丸。每空心益母草  
煎湯送下。二錢。不終劑。而白物無病全愈矣。專  
科根然稱奇而服。錄其案驗而去。二十四

溫一渠內人。平素血虛咳嗽。近為飲食所傷。不知  
飢餓。專科作陰虛治。而胃鬲愈脹。予脉之。右關  
滑大。左手軟弱。法當先健脾消去飲食。然後治  
嗽。若為滋陰降火。不惟咳嗽無功。恐脾胃轉傷。  
腹脹鴻洩。變將不測何也。脾胃喜溫而惡寒也。  
即以二陳湯。加山楂麥芽枳實白朮川芎香附。

與之。一劑而胃鬲寬。再劑而飲食進。繼用桑白皮地骨皮甘草陳皮貝母瓜蔞仁馬兜鈴桔梗紫苑。十帖而咳嗽脫然矣。二十五

溫異橋。二令媳產後五十餘日。右脇脹痛。手不可近。赤白帶多下。如膿。發熱。大便燥結。予曰此惡露未盡。瘀血化為膿。治宜急也。嘗見數婦有此病。而不識治。積而成毒。有成腸瘻者。有內成腫毒。潰從腰俞出者。皆以不知治法。則瘀血無從出。故也。急用澤蘭葉山楂子五靈脂消惡露。為

君川芎當歸茯苓白芷為臣。益母草為佐。青皮為使。外與當歸龍會丸潤大便。使熱從太便去。服後次日。腹脇皆寬。痛亦盡止。又因食葷與鷄子。復作疼。但不如前之甚。隨與保和丸用山楂煎湯送下。三錢而痛愈矣。二十六

溫天衢氏。冬月病。目醫為發散太過。至春間。吐血。衄餘。及夏下午。潮熱咳嗽。胃鬲脹疼。早晨冷汗淋漓。大便溏。一日兩行。飲食少。肌肉消十之七。脉數。據症脉法。在不治里中。諸長老以其素行

端厚群然懇子措劑予以衆懇不能辭乃用瀉  
白散加五味子白芍藥貝母馬兜鈴服下其夜  
帖然而卧不嗽惟大便溏前藥加白扁豆山藥  
茯苓汗亦漸止復與瀉白散加石斛馬兜鈴貝  
母陳皮薏苡仁白芍藥山藥五味子桔梗調理

三月而全二十七

張二娘子姪七月而嘔吐不止氣壅咳嗽胃與兩  
脇皆脹不能伏枕予先與金苓丸二服以止吐  
服下立應繼與大腹皮陳皮枳壳半夏甘草竹

茹茯苓旋覆芩前胡紫苑黃芩生姜服二帖氣  
平嗽止安然睡矣二十八

金苓丸者雄黃一錢五分半夏一兩枳榔二  
錢姜汁浸蒸餅糊為丸是也

王敬泉內眷患癥嗽腹飽脹洩瀉腸鳴裏急後重  
發熱口鼻之氣如火塞以六君子湯加山楂麥  
芽紫胡秦艽青蒿白芍藥益智仁與香連丸魚  
服兩劑氣舒嗽減大便結實鼻仍塞前方加川  
芎減白芍藥而安二十九

溫南溪內人居常大便秘結面赤不思飲食頭時  
眩暈。診其脉右關尺滑大有力此癥火症也。用  
爪莖四錢為君滑石三錢枳實二錢半夏一錢  
半為臣蘿蔔子姜黃各一錢為佐兩帖愈矣。又  
教以或遇大便秘秘結每服當歸龍會丸加牛胆  
南星一錢立應三十

陳春野孝廉二令愛患下奚痺痢四肢浮腫以布  
袋丸與大安丸同服則大瀉用參苓白术散加  
澤瀉山楂麦芽瀉亦不止神氣大弱穀粒不入

口小水不利太便一日仍三五次積滯未除改  
以參苓白术散加肉荳與服瀉稍止食粥一盞  
下午因食紅棗數枚夜分發忽起其勢甚危急  
與蘿合丸服之而愈。再以參苓白术散加石菖  
蒲藿香炮姜肉荳調理全安三十

潘敬坐令媳原因經水不行醫投安胎之劑越七  
月經水忽大行內有血塊筋膜如手大者十二  
桶昏冒困憊為劇逆予治其脉右關洪滑左寸  
洪數兩尺皆洪大病形夜分咬牙亂語手心熱

口噤時手足皆冷心頭賬悶不快面色青始諸醫皆謂難治予曰無恐此濁痰流滯血海以誤服安胎之劑益加其滯夫血去多故神魂無依痰迷心竅故神昏語亂急為調氣開痰安神養血可生也即以溫膽湯加石菖蒲酒芩天麻酸枣仁丹參與服其夜子丑時咬牙亂語皆減半次日仍與前藥每帖加竹茹五錢臨睡又與黑虎丹數粒諸症悉去而愈敬參問曰藉高手病痊矣而每發於夜半何也予曰此心包絡與膽

經有痰熱故每至其時而發單治此兩經痰既消而神魂俱安也敬參曰善三十二上舍張懷赤每早晨腸鳴瀉一二十度晚間瀉一度年四十二且未有子予診之尺寸短弱右關滑大予謂此中焦有溫痰君相二火皆不足故有此症以六君子湯加破故紙桂心益智仁肉荳蔻前服瀉遂減半又以前藥加杜仲為丸服之而愈次年生子三十三

臧七房二老夫人年六十八患病痢後過食熟菱

與腐湯以致大便滑洩不固飲湯水徑直下不  
停。曾禹否悶語言無力舌乾口燥生瘡津液  
則喉疼元氣大虛而熱皆虛火所致且長蒸二  
十餘年又當痢後益知非有餘之症也脉又尺  
寸俱弱兩關滑大內經云清氣在下必生食洩  
濁氣在上必生膜脹此之謂也法當提清降濁  
補助元氣用四君子湯加葛根白芍藥黃連清  
虛熱止燥渴為君桔梗輔佐葛根升提清氣為  
臣陳皮麦芽降其濁氣以消胃禹否悶為佐如

烏梅為使上使生津下使正濁連服二劑尺寸  
之脉稍起飲食亦得停腹脹緩始有生氣仍  
以前方加白扁豆神麪糊為丸調理而安

三十四

蔡樂川令眷患頭痛痛如物破髮根稍動則痛延  
滿頭暈倒不省人事踰半時乃甦遍身亦作疼  
胃鬲飽悶飲湯水停鬲間不下先一日吐清水  
數次蛔虫三條原為怒起今或惡風或惡熱口  
或渴或不渴大便秘脉則六部皆滑大有力予

曰。此痰厥頭痛症也。先以藿香正氣散止其吐。繼以牛黃丸黑虎丹清其人事。頭仍疼甚。又以天麻藁本各三錢半夏二錢陳皮白芷薄荷麻黃生姜葱白煎服。得少汗而頭痛少止。至晚再服之。五更痛止大半。而人事未全清。予謂此中焦痰盛。非下不可。乃用半夏五錢巴霜一分麵糊為丸。每服三十丸。生姜湯送下。下午大使行三次。皆稠粘痰積也。由此飲食少進。餘症差可。惟遍身仍畧疼。改用二陳湯加前胡石膏藁本。

薄荷枳壳黃芩石菖蒲調理而安。三十五  
周盧汀乃眷。患胃脘痛。手心熱。嘔吐不食者四日。晝夜卧痛不輟。脈則兩手皆滑數。予謂當以清熱止痛為先。故先與清熱止痛末藥二錢。令服之。不一飯頃。痛遂止。而睡。家人皆色喜。予曰。夫也。此火鬱息耳。其中痰積甚固。不乘時而下。乏勢必再作。因與總管丸三錢。服下。腹中微痛。再服二錢。又睡至天明。乃寢。而腹痛亦止。木便下。痰積甚多次。日以二陳湯加枳實姜黃香附。

山梔黃連與之服後胃脘之痛全止。惟小腹畧覺脹。予謂其癥積未盡也。再與總當丸三錢。夜服之。天明又行一次。癥積之下如前。而胃脘之痛亦絕不發矣。三十六

二卷終

