

30

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

mm

赤水玄珠

醫案

四十二



KODAK Gray Scale

Kodak  
LICENCED PRODUCT

中武  
5/6  
43

水玄珠醫案新都治驗五卷目錄

兄內傷飲食外感風邪

一

程龍塙翁每行動即作熱發渴嘔惡腰與環跳穴

常痛

二

汪松崗原傷於酒夜分發熱咳嗽咯血

三

族妹經不行者八十日每飲食入腹即疼痛吐出

廻止

四

孫華野喉痛頰車腫

五

顯兄每辛苦及酒多則咯血數口

六

吳遂兄溫熟發黃七

族侄明之痰火上逆大吐痰沫因而嘔血一涌數

枕有發明

族嫂程氏肺癰九

侄媳葉氏身面四肢浮腫十

族侄孫伍仲善飲好內小便血淋疼痛十一

令眷吐紅發熱十二

亮卿令愛右目紅腫十三

太學少竹眼紅腫脹十四

一僕婦產後惡露不盡腹中作痛十五

程好吾令孫右耳後生毒腫痛十六

華岳令堂右手臂肢節脹痛十七

程兩峰令眷血痢十八

程七護兄臍腹右邊疼痛小水不利嘔吐不進食十九

程社貴兄醉後御色次早胃脘痛極二十

汪松崗令眷左脇痛咳嗽內熱二十一

贊皇令堂產後左脇痛甚二十二

許少峰中風先兆二十三

朱宅女眷熱入血室二十一

孫君一金

日光

孫熙宇肢節腫痛痰多嘔惡病多夢鬼二十五

愛泉傷風咳嗽聲啞右邊不能貼席二十六

侄婦戴氏有妊五月忽血大下午後發熱二十七

靈岳迺眷胃脘疼痛頭暈舌麻二十八

吳人峰先生內人兩脇脹急痛拒胃脘二十九

陳鉄兄內人產後腹痛發熱下痢膿血三十

程石洲迺眷因產難子死憂悶小腹有塊作痛復

因多食圓眼腹益大脹堅如石大如斗氣促不

安有發明

三十一

程嫗年八旬頭暈脚軟大便溏洩小水淋滯三十

程道吾先生令政夜驚而驚時常暈厥三十二

一僕婦瘟疫以勞食復作三十四

程方塘年六十四風癱不能步者三載腿肉盡消三十五

汪省吾瘡三日一發發於夜三十六

汪東之丈七月初旬虛陽口瘡三十七有發明

令眷姪中咳嗽三十八

吳東渠瘡後虛憊三十九

孫君一金

日光

三

吳西源令眷以艱子多鬱多思肌肉盡削皮膚燥  
揭遍身生瘡體如火燎四十

族嫂程氏環跳穴邊腫痛寒熱并發不能動止四十一  
恒宇瘡後遭跌環跳脫出不能復收四十二

侄孫女周歲發慢驚四十三

程少湖以飲生酒面浮胸脹四十四

吳斗原有腸風又感風邪發熱多痰腹痛下痢四十  
五

侄孫二水體甚肥胖患溫瘡症四十六

堪輿張錫泉先生左脇皮裏膜外疼痛四十七

族侄雲岳患偏墜臍腹腰俞脹痛四十八

一婦妙齡感風寒致成鼻淵四十九

程兩峰瘀血發黃吐出穢惡如爛猪肺狀大便色

如墨

有發明五十

予表嫂小產後腹痛暈厥五十一

陳士羨傷寒熱症漏底

有發明五十二

程松逸兄酒疸五十三

目錄終

赤水玄珠醫案新都治驗五卷

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人余煌

徐景奇

子泰來 全閔梓

新都治驗

瓊兌內傷飲食外感風邪酒淋惡寒發熱煩躁不寧已經表汗瀉吐之後小水短赤口渴腹中疼

夜不能睡。耳聾氣塞。神魂不安。懊惱不已。予脉之。兩寸滑大。左關絃右關滑。兩尺皆絃。皆七至。據此迺少陽陽明兩經合病。仲景云。渴而小便不利者。當利其小便。先與柴芩湯加竹茹進之。耳稍聰。稍得睡。熱仍不退。聞食氣即嘔。以濟生竹茹湯。加入參麦冬黃連外。與辰砂六一散三錢。服後神稍清。手足心仍熱。用竹葉石膏湯。而熱亦不退。且懊惱殊甚。合目即譫語。按仲景謂傷寒汗吐下後。懊惱不得眠者。熱在心胸之間。

宜輕湧之。以梔子荳豉湯主之。服後晚間仍不得眠。兩耳氣塞難當。改以小柴胡湯合白虎湯。進之即得睡。睡中汗出二次。耳頸通利。因進食早。又發熱口渴。舌上黃胎。此陽明餘熱復萌。乃用石膏七錢。甘草一錢。知母三錢。黃連一錢五分。百合竹茹各一錢。竹葉三十片。急進而熱全退。始得獲安。

程龍塙翁。每行動即作熱。發渴嘔惡。腰與環跳常痛。脉左沉細。右寸滑。關尺濡弱。此上焦有痰火。

新編卷之二  
下焦有濕熱治當流濕舒筋然後施補先用以  
仁三錢蒼朮歲靈仙牛膝黃柏烏藥葉紫荆皮  
各一錢紅荳桂皮防己各五分水煎服外以鹿  
茸虎骨晚蚕沙仙茅黃柏龜板蒼朮牛膝杜仲  
蜜丸服之而安二

汪松崗翁原傷於酒夜分有熱咳嗽咯血不思飲  
食左脇氣不調左寸脉芤閑澁尺弱右寸短閑  
滑此胃中痰火正旺氣血俱虛宜先清胃保肺  
然後大補麥冬知母寒水石甘草紫苑人參壯

丹皮白芍藥當歸貝母桑白皮煎服一帖紅仍  
未止加側柏葉茅根四帖而紅止過後四月又  
為怒氣所傷血又動左不能睡茺仁滑石紅荳  
當歸人參貝母山梔仁甘草香附青皮牡丹皮  
煎服而安予囑渠令子曰寄語令堂諸凡得意  
事可與尊翁知之如不得意者切不可使之聞  
也蓋肝為藏血之所况血去多肝火剝燥心主  
不足內經云主不明則十二官危不可不謹防  
之且左不得眠肝脹可知予甚為尊翁慮後三

年果為怒復乃命使迎予予固辭謝曰向曾訂  
囑今病之來非不侵所堪任也不逾旬而發二  
族妹經不行者八十日每飲食入腹即疼痛必嘔  
吐出乃止居常亦吐酸水上焦熱下焦寒大便  
半月始一行飲食不進者四十日六脉皆數左  
滑右軟弱妹能事者以其失多病且不諳世故  
由是悒悒病從思慮而得恐成膈症今大便燥  
結嘔酸乃膈之徵急宜拂慮庶藥有功先與丁  
靈丸一粒而吐止繼用溫膽湯加大腹皮姜連

痛吐全安改以二陳湯加香附條芩山梔仁丹  
參砂仁調理兩月經行大便始潤而膈症斯不  
作矣四

孫華野脉沉絃而數嘔痛頰車腫兩太陽作脹疼  
遍身皆脹痛增寒發熱乃瘧火上壅而變風熱  
將欲作毒也宜急治之薄荷甘草升麻白芷石  
膏枳壳天蒼粉桔梗大力子連翹玄參一帖而  
愈五

顯兄每辛苦及酒多則咯血數口脉兩寸皆短弱

新編卷之五  
關尺洪數。此胃中有瘀火而下焦有陰火。由半  
年酒色所傷故耳。以丹參滑石各三錢。白芍藥  
二錢。麥冬。貝母。杏仁。紫苑。牡丹皮各一錢。當歸  
七分。甘草五分。煎服而安。<sup>六</sup>

歙邑吳遂兄木商也。在吳興年七十。因冒雨勞力  
汗出。又以冷水澡浴。因而發熱口渴。心與背互  
相脹疼。小水長而赤。舌上黃胎。夜不得卧。眼目  
如金皮膚盡黃。吳興之醫見之遠走。不敢措劑。  
謂其年高不宜此病。讚勸回家。乃敦訪予治。診

得左脉浮數。右濡弱。兩手皆有七至。予曰。此濕  
熱發黃症也。病雖重。年雖高。有是症。當有是藥。  
毋用。倉惶乃以柴胡三錢。酒芩。葛根。青蒿。香薷。  
天荳粉各一錢。人參七分。粉草五分。連進二帖。  
晚得微汗。即能睡。次早熱退。其半舌胎稍淡潤。  
不焦燥矣。胸鬲餘熱作煩。身黃如舊。以竹茹。青  
蒿。葛根各一錢。人參。麥門冬。天荳粉。知母各八  
分。白芍藥六分。二帖。熱退食進精神復長。後與  
補中益氣湯加青蒿。麥門冬。天荳粉十帖。而眼

目肌膚之黃盡，釋然矣。吳興諸公悉服其精當，各錄方而傳。七

族姪文學明之，以作文過勞，痰火上逆，大吐痰沫，因而嘔血。一涌數椀，昏暈汗出，奄奄而卧，畧不敢動，稍動即嘔吐，而血隨出色鮮紅。飲食湯水皆不敢入，入即吐，而眩運即隨之。里有婺君程聞野氏音為之，胗駁而走曰：「血如涌泉，體熱脉大，眩運而藥食難入，但無佳兆，乃速予治。」予胗視畢，語其乃兄勉之曰：「可生也。」何舉家張惶若此，勉之以程言告予，予曰：「看症要圓活，勿拘泥據經。」云心主血，肝藏血，又曰：怒則氣上，又曰脉虛，身熱得之，傷暑。今左脉絃大，右脉虛大，明之不獨作丈勞心動火，且亦被怒傷肝，抑又為暑所逼以致木火上升，眩運作吐。經曰：「諸風掉眩，皆屬肝木。」諸嘔吐逆，皆屬於火。又諸動屬火，內為木火上衝，外為暑氣所迫，故吐而汗多，血隨吐出，也。醫貴識病，有是病則有是藥。予特以白丸子三錢解其暑氣，清其痰飲，抑其衝逆，則吐

新編  
卷五  
此勉之以程言告予，予曰：「看症要圓活，勿拘泥據經。」云心主血，肝藏血，又曰：怒則氣上，又曰脉虛，身熱得之，傷暑。今左脉絃大，右脉虛大，明之不獨作丈勞心動火，且亦被怒傷肝，抑又為暑所逼以致木火上升，眩運作吐。經曰：「諸風掉眩，皆屬肝木。」諸嘔吐逆，皆屬於火。又諸動屬火，內為木火上衝，外為暑氣所迫，故吐而汗多，血隨吐出，也。醫貴識病，有是病則有是藥。予特以白丸子三錢解其暑氣，清其痰飲，抑其衝逆，則吐

可止吐止氣平則血自能歸經服後果嗒然而  
睡醒則吐止食進眩暈尋已繼用滑石香薷各  
三錢甘草五分黃連白扁豆各一錢五分竹茹  
一錢四帖全安八

從嫂程氏年近五十患咳嗽吐臭膿血一日夜一  
枕餘發熱晝輕夜重肌肉大瘦六脉浮而洪滑  
且數人皆謂吐血身熱脉大法在不治予曰此  
非吐血也此係釀酒傷肺又為怒氣所觸瘀  
血濁痰滯於肺之氣竅無從而出久之化而為

膿成肺瘡也治宜開肺竅活血化痰使膿盡而  
自愈也諸人治之二年不効予教以白芨薏苡  
仁各三錢牡丹皮桔梗茜根歸尾山梔子貝母  
白芍藥各一錢甘草葶苈子各五分三十帖全  
愈後壽七十三以它病而終此疾再不復發九  
族姪媳葉氏年三十身面四肢浮腫漸而入腹脹  
大不可言眼泡腫而無縫飲食大減小水不利  
此氣滯水脹也以大腹皮茯苓皮姜黃蒼朮厚  
朴澤鴻木香烏藥陳皮服四劑而眼目能開飲

食稍進即為食傷而復腫。予改用七傷丸調理全安。

族侄孫伍仲立年善飲好內小便血淋疼痛。予以滑石甘草梢海金沙琥珀山梔子青蒿茅草根煎膏為丸梧桐子大每空心及食前燉心湯送下三錢不終劑而愈後五年因子遲服補下元藥過多血淋又發小便中痛極立而不能解必蹲下如婦女小解樣始能解出皆大血塊每行一二碗餘。如是者半月諸通利清熱之劑靡不

遍嘗不應脉俱洪數予以五靈脂蒲黃甘草梢各二錢小薊龍牙草各三錢水煎空心服二帖而痛減半血仍舊改用覆麦山梔子甘草各二錢茅根杜牛膝連葉車前草各三錢生地黃紫胡黃柏木通各一錢四帖痛全減血全止。惟小便了而不了六脉亦和緩不追前矣後以人參葛根青蒿白朮茯苓甘草白芍藥升麻黃柏知母調理萬全。

令春。辰州太守石峰公女也。吐紅發熱經水二十

日一行或一月行二次。白帶且多。胸鬲飽脹。脉洪數。以丹參生地山梔子白芍藥小薊鹿角膠水煎服。加八童便一酒盃二十劑而瘳。十二亮卿令愛右目紅腫。如腹中飽。眼乃能開。飢則眼不能開。此疳積虛寒症也。以夏枯草二錢。甘草穀精草各一錢。香附一錢。伍分煎服。四帖而安。

十三

侄孫少竹。太學生也。眼紅腫脹。余雲。谷以苦寒治時疾之劑。與之。眼愈。腫且增。兩太陽痛。前藥中

再加石膏。不惟眼腫不消。頭痛不止。且令遍身脹悶。寢食俱廢。予為脉之。絃大而無力。乃用蔓荆子桑白皮柴胡香附夏枯草甘草芽茶。一帖而痛定。兩帖腫消。四帖全瘳。十四

一僕娘產後惡露不盡。腹中作痛。且冒風咳嗽。嘔吐頭暉。脚麻木。不知痛痒。亦不能轉側。與糖越子紫蘿旋覆茶。烏藥五靈脂。茯苓川芎當歸。澤蘭葉。玄胡索。加砂糖。煎服而痛止。再進惡露行。咳嗽嘔吐皆愈。十五

上舍程好吾公令孫。右耳後生一毒。腫痛遍身生。

太泡瘡。增寒發熱。與金銀杏當歸尾甘草赤芍。

連翹姜桑大力子玄參。兩劑而消。十六

華岳令堂。年五十餘。向來小水短少。今則右背塗匙骨邊一點痛。夜尤痛。已經半月。醫治不効。展

轉加劇。即於右邊手臂肢節皆脹痛。筋皆暴起。肌肉上生紅點子。脉兩手皆滑數。右尺軟弱。乃溫熱傷筋而成痛。痺以東垣舒經湯為主。羌活

升麻桑仁麻黃紅荳當歸防風甘草獨活猪苓

黃柏防已知母。薰連兩帖。痛減。腫消。再亦不發。

十七

由溪程西峰丈。內人患血痢。裏急後重。嘔吐。不納穀。兩寸脉洪大。以竹茹溫膽湯加姜連滑石橘紅酒芩水煎服二帖。大便結實。膿血皆止。惟後重。與枳壳當歸芍藥生地桃仁條芩甘草滑石酒連四帖全安。十八

由溪程七護兄。躋腹右邊疼痛。小水短少。大便四日未行。嘔吐。不能進食。舌上白胎。面青手冷。勢

甚危急。脉之左沉伏，右滑大有力。予曰：此痰格中，焦氣閉下焦，故太小便秘而不利，氣逆嘔吐也。不急治即無救矣。與相樹東行根皮二錢，滑石三錢，杏仁青皮枳實換即各一錢，水煎服之。夜半吐心膠痰碗餘，大便未行，痛亦不減。次日改用玄胡索五錢，水煎，臨服調下。玄明粉三錢，辰刻服。下午刻，痛減太半。未刻，太便始行。右脉平，而左脉起矣。覺體倦無力，以生脈散加甘草、山梔仁、黃柏芍藥，以仁陳皮，調理如故。十九

由溪程社貢兄先醉酒後御，色次早四肢冷，胃脘痛極，脈僅四至。先醫以鬱火為治，投以寒涼，痛更增極。三日前所食西瓜仍吐出，不化，乃翁以為陰症，傷寒，欲用附子理中湯，不決，遂予治之。予觀其面色青慘，叫痛而聲不移，坐卧煩亂。予曰：此霍亂兼厥症也。先當止痛，安斂，後理霍亂，可免死也。遲則誤事矣。急用五靈脂醋炒三錢，薑木一錢五分，烏梅三枚，川椒炮姜桂心各五分，水煎飲下。痛減大半，下午以大腹皮疊香。

半夏陳皮山楂五靈脂茯苓兩帖全安二十

汪松崗令眷。左脇疼。咳嗽內熱。每咳則脇下弔痛。寢食大減。與青皮香附甘草芍藥調乎山梔子貝母茯苓柴胡菟仁滑石人參水煎飲之。熱除痛減。二十一

文學贊皇令堂產後。左脇痛甚。咳嗽痰不易出。內熱氣壅不能伏枕。予以瓜蔓仁六錢桑白皮紫蘆子杏仁半夏桔梗枳壳各一錢水煎服之而氣壅定。嗽漸除。外與保和丸及七製化痰丸。

而安。二十二

許少峰。胃中有痰。肝胆經有鬱火。心血不足。面色黑而枯燥。肢節疼痛。健忘。精神恍惚。內熱。將有中風之兆。左寸細數。關絃數。右閏重。按滑。兩尺弱。治宜清肝膽之鬱火。而養心神。消胃中之痰涎。而生氣血。使神帥氣。氣帥血。氣血周流。經絡無壅。則諸疾不期愈。而自愈矣。何中風之有哉。用石菖蒲黃連白茯苓半夏酸棗仁天麻橘紅各一兩。牛胆南星三兩。白姜蚕青黛木香各五

錢紫胡七錢五分竹懸生姜汁打神麴糊為丸。菜荳大每食後及夜茶湯任下二錢。一日二三次服完神氣大健肢節皆舒面色開而手足輕健種々皆瘳少峰曰吾生平服藥少効不期此方之神若其不惟自服有功即諸親友有疾火者服之莫不響應

二十三

朱宅女春經水行一月不止每黃昏先寒後熱遍身疼痛胸前脹悶不通必欲大喊叫嘶用手於喉中幹而吐出痰涎乃寬今且渴甚此痰飲瘧

疾今飲食不進夜如覓鬼者乃熱入血室也用小柴胡湯加生地黃丹皮陳皮杏仁兩帖後以白朮三錢何首烏二錢陳皮麥芽各一錢烏梅一枚生姜三片水煎服之而寒熱止諸症皆安

二十四

孫熙宇肢節腫痛痰多嘔惡胸中氣不暢達語言亦不清利夜夢皆亡人野鬼追陪精神慘惡驚恐不安且汗多不止飲食減三之二遠近名家醫治逾月不應數予為治胗其脉左手甚弱汗

多故也。右手滑大痰。飲濕熱而然。法當補歟。前醫皆作風治。而用竦散洩其元神。將成桑瘡。予以人參麥門冬五味子白芍藥。當歸。以仁陳皮石斛木瓜甘草白术桂枝服此。汗大歎。而神思稍清。吐亦止矣。惟飲食不思。夜夢與亡人同遊。為惡耳。改用人參黃蓍枸杞子。以仁白术各一錢五分。當歸遠志茯苓木瓜陳皮各一錢。甘草五分。水二鍾。入雄猪心血一枚。煎作八分飲之。四帖乃能睡。始夢生人。不復夢亡人矣。二十五

愛泉上年十月因傷風咳嗽。即時聲啞。繼聞父卒過憂。右邊不能貼席。而睡。醫以滋陰降火之劑治之。半年。肌肉大削。大便溏瀉。飲食減少。咳嗽聲啞。有加喉且疼痛。迎予為治。診得六脉俱絃。數此憂傷肺。思傷脾。症也。危急甚矣。以白术茯苓陳皮粉草。以仁桔梗柴胡桑白皮酒炒白芍藥。澤瀉。麥芽山楂。煎服。二日再以荆芥桔梗玄參甘草茯苓。白芍酒連扁豆山藥山楂木通。服此而右邊可睡矣。改用參苓白术散。加白芍藥。

烏梅訶子酒連山查調理而愈。二十六

任婦戴氏有孕已五月矣。忽血大下午後發戰。不  
脉俱數。左寸滑尖。右閑搏指。左閑軟弱。予以白  
芍藥二錢。生地阿膠。人參蒲黃各一錢。紫胡香  
附地榆。荆芥穗各七分。甘草五分。煎服。午後發  
寒熱。每夜凡三次。頭痛惡心。腹中塊硬。所下血  
塊甚多。心下怯力。此虛無疑也。以補中益氣湯  
加阿膠。炮姜。白芍藥。烏梅。煎服。下午右眼白珠  
發一白泡。光腫下垂。而面亦腫。此虛火遊行。無

刺之症。其夜大發寒熱。指爪皆黑。唇白。汗  
腹中作痛。牽引兩乳皆痛。仍以補中益氣湯加  
阿膠。白芍藥。桂枝五味子。麦冬。服後熱退汗止。  
渴除。神氣稍定。乃有生意。次日咳嗽而胎墮。即  
以獨參湯繼服。其夜腸鳴漏。二十次。以人參白朮  
各三錢。炙甘草一錢五分。炮姜一錢。桂心茯苓  
各五分。陳皮七分。蓮子太東。煎服。後因咳嗽。以  
四君子加炮姜。五味子。紫苑。調理而愈。二十七  
靈岳。乃春。胃脘疼痛。手心熱。頭暉。舌麻。兩大陽痛。

背心亦脹。內熱而外惡寒。必厚被蓋。覆得微汗。廻解。二陳湯加桔梗杏仁桑白皮枳壳青皮白芥子蘿蔔子酒芩煎服。兩帖。舌竟不麻。晚因食鷄過多。高上氣滯。二陳湯加蘿蔔子枳實山楂川芎香附酒連調理全愈。二十八

歙溪南吳人峰先生。內人。兩脇脹急。抵於胃脘。作痛又一陣。則汗出一畊。兩頰紅。唇口亦紅。飲食湯水飲之。立止。不受者三日夜矣。予為胗之。兩寸脉洪大。兩尺沉微。予以井水半碗。白漆湯半

碗和之。名曰陰陽湯。用此調玄明粉一錢五分。服之。不惟不吐痛減半矣。少頃大便行二次。因食豆腐及粥。太早而痛復萌。唇臉皆紅。此必有魚。故如是也。與白芍藥桂枝粉草烏梅蒼椒五靈脂杏仁水煎。痛廻定其大半。再與蒼朮厚朴山楂枳實茯苓玄胡索香附。一帖全止。但心背皮膚外疼。不能着席而睡。以川芎當歸白朮厚朴大腹皮粉草茯苓香附陳皮半夏。調養全愈。

陳鐵兄內人產後腹痛發熱。下痢膿血。裏急後重。  
川芎二錢當歸三錢。茯苓乾姜肉桂山楂陳皮  
酒炒白芍藥白朮各一錢。粉草五分。一帖而腹  
痛止。痢輕後重亦除。惟發寒熱多汗。改用人參  
白芍藥桂枝粉草川芎當歸白朮茯苓香附陳  
皮山楂。再劑而諸症如釋。

程石洲乃眷。因產難子死。憂悶。小腹有塊作痛。下  
午發熱。不思飲食。次早脈之。脉右大於左者三  
倍。且數。與芎歸湯加糖慈子澤蘭葉肉桂。次日

下午。腰腹脹痛。誌之。晌午食圓眼一斤。矣從此  
小腹漸脹。大便三日未行。早晨真渴。夜間極熱。  
口渴。脈大無緒。勢甚危急。用川芎當歸紅荳桃  
仁青皮枳殼。米山楂水煎。調玄明粉二錢。眼  
後大便稍行。結糞二枚安而就寢。醒後進粥。稍  
多。又復脹痛。腹大如斗。堅如石。氣促不安。勢危  
至此。亦已極矣。迺與五靈脂糖慈子各四錢。凌  
霄花二錢。赤芍藥一錢。服後大便通。腹軟氣定。  
始可進粥。漸有生氣。但脉仍鼓。指此。腹中積滯。

尚多不可不因其時而驅去也。用糖桂子大黃各三錢。杏仁二錢。桂心紅荳各五分。炙甘草七分水煎。臨服調玄明粉一錢五分。其夜下黑糞四次。始退。上腹雖消。臍下仍大。仍以桃仁承氣加山楂滑石紅荳煎飲之。五更大使行臍腹。脹又漸減。後與積塊丸調理全消。是役也。女流只知女科專門為役。故前發熱腹痛之時。彼專門不察虛實。即以常套十全大補湯投之。詎知圓眼肉初入腹之時。不覺少頃。漸又脹開。故腹

亦因之而脹也。且其味甘。尤能作滯。復加地黃參木寧。不塞其塞哉。由是而成太滿太堅之症。內經謂中滿者。濁之於內良。以此夫彼亦泥乎丹溪產後須當大補氣血之誤也。三十一

程宅一老嫗。年八十餘。常頭暉脚軟。擰載。上身不起。行湏人扶。否則眩運跌仆。大便溏洩。小水淋瀝。此下元虛遺所致。以人参黃芪白朮薏苡仁各二錢。山茱萸杜仲茯苓各一錢。陳皮山藥粉草各八分。八帖而愈。三十二

文學程道吾先生，李眷役為臺灣所驚，時常暈厥，精神恍惚。一日三五發，咳嗽，面色青，不思穀食。日惟啖牛肉脯數塊而已。時師屢治無功。吳渤海視為寒痰作厥，投以附子肉桂，而厥尤加逆，予為冷脈，左脉絃，右脉滑，兩寸稍短。道吾先令眷二皆卒於療，知其為傳屍療症也。不易治之，迺權以壯神補養之劑，消息調理，俟飲食進胃，氣轉始可用。正治之法，姑用人參茯苓柏子仁石菖蒲遠志丹參當歸石斛以補養神氣，以陳

太上渾元丹

霹靂出瓶丹

皮貝母甘草紫苑化痰，治嗽服半月而無進退。廻為製太上渾元丹藥用，紫河車一具，辰砂鰲甲犀角各一兩，鹿角膠燉石英石斛各八錢，沉香乳香安息香，茯苓紫苑，死牛膝人參各五錢，射香五分，煉蜜為丸，赤豆大。每早晚鹽湯或酒送下三十丸。又製霹靂出瓶丹藥用牛黃狗寶阿魏安息香一錢，虎頭骨五錢，啄木鳥一隻，獵爪一枚，敗鼓心破皮三錢，射香五分，天靈蓋一個，煉蜜為丸。雄黃三錢，為衣。每五更空心蔥白

湯送下五分。三五日服一次。與太上渾元丹相  
兼服。繩服半月。精神頓異。不似前時恍惚矣。但  
小腹左邊一點疼。前煎藥中加白芍藥一錢。服  
之十日。精神大好。暉厥再不發矣。次年生一女。  
其宅療疾從此再亦不傳。

三十三

一僕婦年三十。患瘧疾。一月餘矣。非勞復即食。復  
今則發熱咳嗽。胸脇疼。耳聾口渴。大便七八日  
不行。不知人事。迺與紫胡石膏各三錢。瓜薑桔  
梗枳壳各一錢五分。黃芩前胡各一錢。天荳粉

八分。甘草五分。黃連八分。急煎服之。人事稍  
因。大便不行。次日以大柴胡湯下之。又次日大  
便難行。熱仍不退。改以紫胡二錢。白芍藥。黃芩  
麥門冬各一錢。天荳粉。茯苓。甘草各六分。四帖  
而愈。

三十四

參軍程方塘翁年六十四。向以廻龍眼溫補。下元  
藥太多。冬月下身着單襪。立溪邊。督工受寒。致  
筋骨疼痛。肩井缺盆。脚膝踝手肘掌後及骨  
節動處皆紅腫而痛。卧床褥三年。吳中溪觀為

廻呼具反卵音血併不成口一

虛而用虎潛丸。吳渤海視為寒而用太附子肉桂鹿茸。徐東臯認為溫周鴟認為血虛。張甲認為風。李乙認為歷節百治不瘳。腿間木肉盡消。惟各骨節處腫大而疼。予適在程道吾室。迺逆予脈之。其脉絃濁有力。知其為溫熱痰火。被寒氣凝滯。固濁經絡也。即為藥劑不對。故病日加。所取者目中精神尚在。胃氣仍未全損。但小水解下以瓦盆盛之。少刻則澄結為砂。色紅而濁。兩膝下及脚指皆生大瘡。瘡靚如鉗釘狀。此皆

平昔服溫補春方所致。病雖久年雖高猶為有餘之疾。不可因高年疾痼棄不治也。迺特為先驅逐經絡中凝滯。然後健脾消痰。俾新痰不生氣血日長。最後以補劑收功。斯得矣。翁生平好補畏攻。故進門者皆務迎合。予獨反之。以新取歲靈仙一斤裝新竹筒中。入燒酒二斤塞筒口。刮去筒外青皮。重湯煮三炷官香為度。取出歲靈仙晒乾。為末。用竹瀝打糊。為丸。梧桐子大。每早晚酒送下一錢。一日服二次。五日後大便濡。

出稠粘痰積半極。腫痛消去大半。改用人參石斛。蒼朮。黃柏。以仁蒼耳子。牛膝。烏藥。葉。龜板。紅荳。犀角。胥木通。煎服二十帖。又用前末藥服三日。又下痰積如前之半。仍以前煎藥服半月。又將末藥服三日。腹中痰漸少。乃為製丸藥。以虎骨。晚蚕沙。蒼朮。黃柏。丹參。杜牛膝。莖葉。以仁紅荳。五加皮。蒼耳子。龜板酒打麴糊為丸。梧桐子大。每空心白湯送下七八十九丸。外以丹溪保和丸。食後服半年全愈。腿肉復完。步履如故。三十

汪省吾暮秋患瘻。三日一次發於夜。迨次年仲春猶不能止。遍身疼頭疼。背脊疼。百治不應。即灸亦僅止得一日。次日仍發。面色青。肌肉瘦。以症參之。邪在足太陽經。用麻黃一錢五分。人參桂枝白芍藥粉草知母各一錢。陳皮貝母各七分。姜棗煎服。諸疼減半。而瘻未止。以何首烏。白术各五錢。青蒿一錢。烏梅一箇。陳皮二錢。生姜三大片。水煎。臨發日五更服。尋常以六君子湯加

黃耆柴胡五味子。爲梅草果。調理而愈。三十六  
汪東之丈。十月初旬。自浙歸。連日與客爭譚過勞。  
口中生瘡。醫以香薷飲。清胃湯。瀉黃湯。三黃丸。  
黃連解毒湯。白虎湯。涼禹散。凡治上焦熱症之  
劑。竭寒涼而進之者。十日矣。口瘡日甚。一日  
不但飲食不進。即藥亦難下咽。因瘡延及於喉  
也。逆予為胗。其脉六部俱豁大無力。胗罷有外  
科陳氏者。自稱喉舌專門。衍其口瘡敷藥之妙。  
予曰。汝試為口中一洗。看是何狀。總開口見涎。

沫迷漫。不能得見肉色。陳以荆芥湯洗而引之。  
攬出稠涎一二碗餘。傾於地上。偶有二鷄爭啄  
之。二雞立斃。其毒何如。此亦疾之奇者。予囑陳  
曰。汝用藥只可吹入喉中。切不可敷其舌。必俟  
喉中全好。然後敷舌。待舌好。再敷口唇。甚毋得  
緊敷。恐毒無出路。反攻入喉。極為悞事。陳曰。諸  
予對乃翁曰。令郎之疾。迺虛陽口瘡也。翁曰。當  
用何劑。予曰。附子理中湯。煎熟。待冷飲之。可救  
如它藥不能立功。翁曰。瘡乃熱症。况其身已熱。

又天時酷暑大熱之劑其敢進乎。予曰此陰盛格陽之症初未嘗如此因服寒涼過劑激之使然爾翁不看其兩足膝下皆冷乎。翁用手探足下果冷乃欣然聽用入參白朮各三錢大附子炮姜炙甘草各一錢水煎冷與之服後即鼾睡達旦次早便能食粥半盞足膝下漸暖藥仍如前早飯後予與二三友散步山溪午刻歸來乃見舉家大慟於地見予至哭語予曰不可為矣本是熱病誤服寒藥今舌腫大塞滿口中不能

言語死在頃刻柰何柰何予駭然應曰安得有是不祥語也今晨脈與昨不二適忤迄不過二時許何條爾有此大變乎待予再脉決之及脈六脉漸歟較昨大有神氣面色亦和獨舌脹大予心知為陳寒涼敷藥所致也廻詰陳曰我別後可用敷藥否陳點首曰已二次矣予撫翁及諸人曰無慟立看予為翁消之急取官桂研末五錢用生姜自然汁調金舌上綿塗上但見眼泪雙流鼻中涕出口內涎垂舌頭納去語近

觀  
觀之俗字觀音  
坦同視也

新舊互考

侍曰。我無事矣。諸環侍者。男婦不下。六十皆而面相覩。以為神奇。予曰。可。即取粥與食。使厭之。庶虛火不再升。適舌脹滿者。乃敷藥寒涼閉其毒氣。毒無從出。故作脹耳。桂皮乃辛熱之物。又以姜汁調全。取辛散之義也。諸人皆服其論。三十七

東之夫令眷。始已六月。為傷風。咳嗽。腹中弔疼。痰壅。喉音不清。頭且眩運。脉左滑數。右寸弱。閏滑。左尺有力。右尺弱。予以人參白朮陳皮貝母茯

苓桔梗桑白皮紫蘿粉草黃芩前胡四帖而愈。

全愈三十八

吳東渠年五十有七。因上年患瘡胸痞。作脹。肌肉大削。因連服攻尅。太虛脾胃敗壞。膝及踝踝皆浮腫。遍身發熱。口渴。小水短赤。舌上黃胎。舌心焦燥。乾燥誤服寒涼。大使連瀉五六次。目不能開。手足無力。倦於言語。予診之。六部俱浮。大按之。豁然空虛。飲食不進。此中氣大虛。元神俱脫。可畏之甚。即以人參白朮茯苓粉草。香葛根。

酒炒白芍藥水煎服之。連進二帖，始能開目，漸出聲言語。後以六君子湯去半夏加葛根白扁豆山藥藿香以仁白芍藥石斛調理而愈。三十

九

吳西源令眷因未有子多鬱多思。肌肉漸瘦皮膚燥揭遍身生瘡體如火燎胸鬲脹痛而應於背。咳嗽不住口醫治十越月。僉以為瘵疾不可治。知予在程方塘宅中。迺逕予治。得右寸閑俱滑大有力。左絃數予以爪裏仁四錢蘿蔔子貝

母枳壳調氣化痰。間齋為君。桑白皮草藤子黃芩瀉肺火為臣。甘草前胡為使。三十帖全愈。仍以千金化痰丸調理。向來年又至冬月。則咳嗽痰喘不能睡。自此後遇冬月痰喘再不復發。四十

族嫂程氏。環跳穴邊腫痛。增寒發熱。不能動止。寢食俱廢。頭重惡心。上身熱下身冷。天明乃退。口乾舌上白胎甚厚。以柴胡防風桂枝解其寒熱。以蒼朮黃柏五加皮菟仁赤芍藥治其痛木通。

利其濕熱且引火下行。甘草調和諸藥使各得職。一帖而痛止。大半再進。寒熱除。三帖痛全減去。改以小柴胡湯加牡丹枳壳桔梗二帖而舌胎脫然。四十一

上舍恒宇先生。原因生楊梅瘡後。偶遭一跌。環跳脫出。不能復入窠臼。疼痛殊甚。兩足因長短不齊。予思不能復入窠與者。以瘀血流入窠臼。占渺故竅致骨。不得復入也。今但消去瘀血。必以行氣活血之劑為主。以下行嚮導之劑佐之。庶

可復原用。陳牛窖中磚瓦。洗净煅過。四兩生地杜牛膝骨碎補丹參赤芍各一兩五錢。自然銅三兩。蒲黃車前子蘿木各一兩。鹿角二兩。玄明粉五錢。各為末。以茅草根一斤。紅荳四兩。煎膏拌晒。前藥再以煉蜜為丸。梧桐子大。每空心及食前酒送下。八十九丸。未服此藥之前。病足長二寸餘。服此丸藥後。只差半寸。設再製。又服必能萬全。惜渠素畏藥中道而止。故功虧一簣也。豈勝嘆哉。四十三

族姪孫女。一週歲時發慢驚。眼閉手拳目不動移。脚指微動。先自頸門後遍身如火。喉中痰癥口  
中痰沫。腹脹放屁。大便亦行。先以牛黃丸蘓合  
香丸進之。不効。及各治驚。治痰等藥與之。皆不  
受。即從痰沫流出。用通閑散吹入鼻中。亦不作  
寢。自申時至戌時。猶不能醒。面色素青而白。氣  
稟甚弱。因婢者抱而偶失跌。受驚發熱。此驚氣  
乘虛而入。在法已無生路。但不忍坐視。姑以人  
參三錢。生姜自然汁。拌炒煎湯。頻支用匙挑入。

口中初二三四匙皆不受。後又與五六匙。偶能  
入一二匙。下喉便覺痰聲稍緩。因此頻又與之。  
十匙之中。有二三匙入腹矣。喉中氣轉。目便能  
動。始有生意。再以六君子湯。加天麻石菖蒲姜  
桑澤鴻薄荷。煎服至鷄鳴時。乃畧啼一二聲。方  
識。吮乳次日咳嗽。語声不出。小水短少。以辰砂  
益元散一錢。用灯心湯調下。熱退声出。惟嗽不  
盡。止改以四君子湯。加陳皮五味子。麥門冬桑  
白皮桔梗杏仁薄荷。一帖全愈。四十五

程少湖因飲生酒食硬乾豆腐以致次日面上浮腫。胸中作脹。今經半年。腹中腸鳴。四肢浮腫。兩腿及陰囊皆腫。口乾。大小便俱不利。年四十六矣。夜卧氣喘膝下冷。先以人參薯朮陳皮蘿蔔子半夏麵葛根厚朴枳實破故紙大附子茯苓煎服二帖。氣喘稍定。腹中仍鳴。加白荳仁白芥子桑白皮。小水頗利。浮腫漸消。四十四

吳斗一夫。歙溪南人也。八月初旬。自新都往湖州。途次偶感風邪。發熱多痰。且又腹痛下痢。裏急

後重。原有腸風下血之疾。又以舊年乃翁痢疾發於卒於湖州。心甚恐怖。予脉之。兩關滑大。有分寸俱不足。乃以白芍藥。一半生。一半酒炒。五錢止痛。為君。當歸。活血。酒連。酒芩。柴胡。桔梗。清熱。升提。陽氣。為臣。枳壳。槐花。兼治腸風。為佐。益元散。木香。以實大腸。山楂。以消瘀血。調肝安脾。為裨佐。一帖。熱減半。痢稍輕。次日。仍用前藥。外與丹溪保和丸。調理五日而出戶。四十五  
侄孫二水。年三十。體甚肥胖。夏月常浸在溪中。且

於松陰之下。至八月大發寒熱於巳午間至天明乃退。不能起床飲食亦不進。嘔吐黃苔胆汁。胸鬲脹悶。舌上乾燥生芒刺。沉香色強硬。不能言語。必含冷水漱之。始能說一句。若再語三語必三噙水而後可。惟西爪新藕是啖。先發寒熱之日。吐血一口。今則大便下血症甚危惡。且咳嗽。此溫瘡症也。由醫失解散。遽用黃蓍以閉邪氣。致成大禍。今法當清解止吐。俾飲食進然後庶可保其生也。紫胡知母各三錢。石膏七錢。葛根二錢。橘紅竹茹各一錢。伍分酒芩枳實各二錢。甘草貝母各五分。水煎服之。三帖而吐止。改用二陳湯加紫胡枳實。黃芩黃連。天荳粉鱉甲。白朮。何首烏。調理而愈。迺囑其不可食葷。食葷早恐復發也。四十六

堪輿張錫泉先生患左脇皮裏膜外疼痛。有惡寒發熱之狀。以白朮一錢。五分川芎。紫胡。桔梗各一錢。桂枝。甘草各五分。水煎飲之。當愈其半。次日以八珍湯加黃芩。為君。木香為佐。紫胡為

新卷五  
使一帖全愈四十九

族侄雲岳患偏墜脣腹腰俞俱脹而痛左閔脉絃大鼓指用小茴香甘草蒼朮益智仁防風各五分荔枝核橘核糖慈子紫胡各一錢山梔子青皮各七分服後其痛如舊脉且轉數恐作囊瘡急為解毒爪蔓五錢當歸甘草節金銀杏各一錢連翹柴胡青皮各七分水煎服之痛定睡消因食雞魚太早次日脣腹又作脹痛發熱不能眠昨日囊消後絃脉盡退今復絃矣改以山查

爪蔓各二錢金銀杏柴胡連翹各八分甘草節黃連當歸各五分青皮七分兩帖而愈四十八丁婦時方妙齡表虛易感風寒致成鼻淵流清涕不正便覺頭運兩太陽常作疼且多噴嚏脉之兩寸洪大用秦艽酒芩桑白皮馬兜鈴各八分白芍一錢滑石石膏各二錢枳壳蔓荆子各五分甘草三分四帖涕止病愈四十九程兩峰大偶與乃侄稍有介蒂其晚飲於侄家歸覺腹中脹還嘔噦不寧次日眼珠面色皆黃惡

寒發熱時當仲秋正癰痢為癘之候醫作瘡治五心加熱下牛潮熱煩躁但嘔不嘔且鼻効腹痛大便黑如墨吐出黑血如爛豬肺者然約枕餘有謂所吐之物如此大便之黑又如彼但有中蠱之象心疑乃怪毒之也正欲與乃侄爭辯予仲子泰來適在渠宅徐語渠諸郎君曰尊翁症尚可起顧不為救症而務與人鬭何含量而圖輕耶渠家素不急予仍迓所親信者率相視之見目珠如金面若薰橘腹大如斗其中有塊

大如棟堅如石兩足下皆浮腫四肢且冷小水赤飲食不思莫不面面相覲辭而不藥舉家聞言通宵號泣惟欲攘臂爭鬥仲子泰來又語之曰家君固不敢其知識量不出諸公下昨自華陽歸逆而胗之當必有說舉家忻然數予求胗其脉左澁右滑予曰擾滑脉主瘡飲澁主有瘀血也今所吐所下皆瘀之徵斷非蠱也使得早從事曷有此猜忌此號泣哉兩峰曰吾生平頗謹疾瘳自何致予曰內經云怒則傷肝甚則嘔

血不嘔則積，積而瘀於經隧，滿而溢也。兩峰曰：若謂從怒而致，則此語恰當。吾病源矣。敢請劑。予用當歸尾三錢。赤芍藥、牡丹皮、川芎各一錢。五分。玄胡索、五靈脂、桑仁各一錢。滑石、苦根各二錢。水煎飲之。所下黑物甚多。腹中仍痛。塊猶未軟。前方再加青皮、山楂酒、大黃服之。太便行三次。黑瘀及痰不計其數。從此腹漸寬。塊漸鎔。面色稍轉。而黃日退。飲食津丈有加。四肢微溫。有生氣矣。惟兩足浮腫不消。改用六君子湯。

加炮姜、茜根、滑石、青蒿、調理而黑糞全無。一月精神復舊。里中謂予此役匪獨認病投劑為足。稱且俾二宅。釋猜疑。排忿爭。其雅誼尤足重也。

五十

予有表嫂。小產後。腹痛暰厥。冷汗淋漓。遍身麻木。心怔怔動。左脉絕。不應指。虛極故也。以當歸三錢。川芎一錢五分。人參。荆芥穗。灯火燒存性。各一錢。益母草。澤蘭葉。各八分。甘草五分。水煎飲之。腹痛減。惟怔怔不寧。以四君子湯倍加黃芪。

為君當歸香附益母草為臣川芎為佐炮姜為使兩劑而安。五十一

陳士美。孤子也。年弱冠。由夢遺後。患頭疼發熱。時值仲夏。醫治不瘳。凡市中有名者。率延致轉治。轉熱反加。水瀉口渴。日夜不得眠者旬日。衆視為危時。有俞氏者。用參著白朮為其飲。汗止瀉而汗瀉愈劇。呻吟不間晝夜。勺粒不入口。咳嗽胸痞躁悶。不寧。又四日矣。渠親邵瓊林交予。因免邵。遂予為治。診其脉。左絃長。右洪大。俱七至。

舌胎焦黃體若火燎。神昏氣促。予曰。此仲景傷寒熱症也。邪在陽明少陽二經。其危不啻風中屬。胡時師不認症。察脈徒以夢遺受病率投補劑。無恠乎。轉治轉劇也。幸予至。設遲一日。大事去矣。用石膏五錢。柴胡知母各三錢。灸甘草。白芍藥枳壳桔梗黃芩天荳粉各一錢。粳米一撮。急煎飲之。夜半。熱稍退。神稍靜。脈之仍數甚。繼以前劑進。天明乃得睡覺。而熱退。神清。瀉止。鬲寬。惟口尚渴。再用柴胡一錢。五分。白芍藥。麥門

冬知母各一錢。石膏三錢。甘草五味子各五分。  
人參七分服之。舌潤渴止。餘熱盡退。粥飲始入。  
漸向安矣。次日忽兩足指前一截痛如犬齒。不  
能耐以野蓼一握。入明礬四兩煎湯薰洗。痛勢  
稍緩。又以薏苡仁三錢。木瓜二錢。黃柏牛膝各  
一錢。漢防已三分。一下帖而愈。後又乾咳嗽晝夜  
不住口。喉且疼。胸脹而體畧熱。此為誤服參木。  
太早之過用。馬兜鈴百部。御米壳各用蜜水製  
過。一錢五味子。甘草各五分。百合二錢。四帖而

愈

五十二

程松逸兄患酒疸。遍身皆黃。尿如蘋汁。眼若金裝。  
汗出沾衣。如染胸鬲痞滿。口不知味。四肢痠軟。  
脉濡而數。以四苓散加厚朴陳皮糖慈子麦芽  
葛根。倍加青蒿。水煎。臨服加萱草根自然汁一  
小酒杯。四帖。其黃渙然脫去。五十三

卷五

三五

