古今名醫類案

卷六

首風附頭痛　心脾痛　膀痛
中氣虛損心腹痛腹鳴
腰痛　脇痛
膝腫　脚氣附腫痛
脚發　脚弱　諸氣
疝癩　不寐　多夢
消中

特別
ヤ9
517
6

9 貳ヤ 門 醫 卷 ス 17 6

名醫類案卷之六

明 新都 篁南 江瓘 集
長子 應元 校正
次子 應宿 述補

首風

附頭暈頭痛

苗川王病召臣意診脉曰蹙上爲重頭痛身熱使人煩懣臣意卽以寒水拊其頭刺足陽明左右各三所病旋已病得之沐髮未乾而臥診如前所以蹙頭熱至肩史記

魏王操苦頭風作輒心亂目眩華佗針膈隨手而愈魏書

有人每頭眩則頭不得舉目不能視積年華佗悉解其衣且倒懸頭去地者三寸以濡布拭體令周匝視諸脉盡

出五色仍命其徒以鈹刀決脉五色盡視赤血出乃下膏摩被覆汗出周匝以蓐盛散飲之旋愈三國志

一人稚年氣弱於氣海三里穴時灸之又老成熱厥頭痛雖嚴冬喜朔風吹之其患輒止少慶煖又近烟火其痛輒作此灸之過也東垣治以清上瀉火湯尋愈

一婦人疇昔有脾胃之症煩燥閒顯留膈不利而大便秘結時冬初外出晚歸爲寒氣拂鬱悶亂大作此火不得伸故也醫漫投疎風九大便行而其患猶爾繼疑藥力微益以七八十九下兩行而其患猶爾且加吐逆食不能停痰甚稠粘而湧吐不已眼黑頭旋心惡煩悶氣促上喘無力心神顛亂兀兀不休口不欲言目不欲開如坐風雲中頭痛難舉身若山重四肢厥冷寢不能安夫前證胃氣已損復兩下之則重虛其胃而痰厥頭痛作矣以白术半夏天麻湯方載卅溪

近代曹州觀察判官申光遜言家本桂林有官人孫仲敖寓居于桂交廣人也申往謁之延於卧內冠簪相見曰非慵於巾櫛也蓋患腦痛爾即命醇酒弥餘以辛辣物泊胡椒乾薑等屑僅半杯以温酒調又於枕函中取一黑漆筒如今之筆項安於鼻竅吸之至盡方就枕有汗出表其疾立愈蓋鼻飲蠻獠之類也玉堂閒話

羅謙甫治栢參謀年踰六旬春患頭痛晝夜不得休息詢其由云近在燕京初患頭皆悶微痛醫作傷寒解之汗

後其痛彌篤乘汗之不甚其痛矣遂歸每過郡邑必求治療醫藥大都相近至今痛不能已且惡風寒而不喜飲食羅診之六脉弦細而微氣短促懶言語內經云春氣者病在頭年高氣弱清氣不能上升頭面故昏悶爾且此症本無表邪汗之過多則清陽之氣愈受虧損不能上榮亦不得外固所以頭痛楚而惡風寒氣短弱而憎飲食以蕭芪錢半人參一錢炙甘草七分白朮陳皮當歸白芍各五分羌活麻柴胡各三分細辛蔓荊子川芎各二分名之曰順氣和中湯食後進之一飲而病減再飲而病却

呂元膚診一貴者兩寸俱浮弦夫浮為風弦為痛且兩寸屬上部告之曰明公他無所苦首風乃故病也蓋得之沐而中風當發先一日則厭厭欲吐而後已渠曰然余少年喜沐每迎風以晞髮故頭痛之疾因之而起誠如公言乃製龍腦芎犀丸七七年大漸燥結雙目赤腫眩運凡載人治十婦頭偏痛五十餘年療頭風之藥靡所不試且頭受針灸無數載人診之急數而有力風熱之甚也此頭角痛是三焦相火之經乃陽燥金勝也燥金勝乘肝則肝氣鬱肝氣鬱則氣血壅氣血壅則上下不通故燥結於中尋至失明以大承氣湯投之八河水煎一兩加芒硝一兩頓使飲三五服下泄如湯且二十餘行次服七宣九神切丸以潤之菠稜

葵菜猪羊血以滑之三劑外目豁首輕燥澤結釋而愈按此所以治之症既已多年不解豈非風濕熱三氣鬱滯膠固而然耶故其所施之法雖峻而於中病之情則得也

祝仲寧治耿榮酒病頭暈翕翕發熱淅淅惡寒醫以爲感冒投辛甘發汗之劑汗出不已腹滿作瀉讝語發躁醫繼以爲暑所中祝曰此非一時寒暑可致乃積濕熱在足陽明太陰經故疹乃見投以除濕熱補脾胃瀉陰火之劑而愈

秦鳴鶴侍醫也高宗苦風眩頭重目不能視召鳴鶴診之鶴曰風毒上攻若刺頭出少血即愈矣太后自簾中怒曰此賊可斬天子頭上豈試出血處耶上曰醫之議病理也不加罪且吾頭重悶甚苦不堪出血未必不佳命刺之鳴鶴刺百會及腦户出血上曰吾眼明矣言未竟后自簾中稱謝曰此天賜我師也賜以繒寶

裕陵傳王荊公偏頭痛禁中秘方用生菜葡汁一蜆殼仰卧注鼻中左痛則注之右右痛則注之左或注之左右皆可數十年患皆二注而愈荊公云曾愈數人矣

俞子容治一婦人年踰五旬病頭痛歷歲浸久有治以風者有治以痰者皆罔效脉之左沈寸遲而乾曰此氣血俱虛乃爾用當歸二兩附子三錢一飲報效再飲其病如失

薛已治尚寶劉敦齋慈則太陽作痛用小柴胡加葱茶山梔以清肝火更用六味以生腎水更不復作

一人舊服苓蘭醫鄭叔能見謂之曰苓蘭不可久服多令人暴亡後其人無疾而辛又一婦以腦風而久服苓蘭其死亦如之張杲云此二事皆渠所目擊者筆談

潔古治一人病頭痛舊矣發則面頰青黃暈眩目慵張而口懶言體沈重且兀兀欲吐此厥陰太陰合病名曰風痰頭痛以局方玉壺丸治之更灸俠溪穴尋愈玉壺九亦載正傳

子和治一僧頭熱而痛且畏明以布圈其巔上置冰於其中日數易之此陽畜熱故也乃灼炭火於煖室出汗痛

吐三法併行七日而癒

一婦人患偏頭痛一邊鼻塞不聞其臭常流清涕或作臭氣一陣治頭痛之藥靡所不試問効人莫識其病有以為腦癰者偶一醫但服局方芎犀丸不數十服忽作嗽涕突然出一鍱猶膿疾愈

一人患頭風自顖下左右有如兩蚯蚓徐行入耳復從耳左右分上頂左過右右過左頂上起疙瘩二塊如指腰然前後腦如鼓聲鼕鼕然冷痛甚須重綿帕包畏寒甚四肢俱不為用醫効罔奏後得一方用四物各一錢皂角刺一錢蔔薛四兩猪肉四兩作一服水六碗煎四碗去查其藥汁併肉作三四次服服至二十劑減十之三

抑青丸一服即時熟睡醒後諸症如失仍服補中益氣
調理而痊

程文彬治一婦人患頭風雖盛暑必以帕蒙其首稍止略
見風寒痛不可忍百藥不効蓋因曾受風寒氣血兩虛
氣不能升故藥不効令病人口含冷水仰卧以生薑自
然汁少許灌入鼻中其痛立止遂與防風羌活藁本川
芎甘草數服而愈

江少微每治火症頭痛用白蘿蔔心自然汁吹入鼻中即
止有兼眼目不明者加雄黃細末調勻如左患滴右耳
右患滴左耳又有頭風兼胃骨痛者用活龜一個用新
瓦二片置龜於中四圍鹽泥固濟烈火煅出清煙為度

四十劑減十之六百劑乃安愚詳此證非頭風也其人
曾患黴瘡頭塊墳起皆輕粉結毒故革藥為君四物養
血皂針為引用多服取効也

江篁南治從嬸年四十冬月產後以傷寒發熱自汗兩太
陽痛上連於腦徹痛甚日夕呻吟不得安寢以補中益
氣湯加蔓荊子川芎當歸細辛少許一服痛減再服乃
安

翟文炳治陸母年七十頭響耳鳴頂疼目眩面麻腮腫齒
蘇唇燥口苦舌強咽腫氣促心驚膽怯胃滿痰滯脇腫
腰痛足軟膝疼已二年矣近二月來至不得眠惟人扶
而坐稍稍欹卧即垂絕翟診視知氣挾肝火而然先與

待冷去腸殼用四足併腹肉入小口餅封固如遇此症
先吹蘿蔔汁一次以龜米吹入鼻即愈又予每勞後失飢
則額頭痛用補中益氣湯立愈

東垣治一婦人重娠六箇月冬至因慟哭口吸風寒忽病
心痛不可忍渾身冷氣欲絕曰此乃寒犯胃故胃脘
當心而痛急與草荳蔻半夏乾生薑炙甘草益智仁之
類或曰半夏有小毒重娠服之可乎曰乃有故而用也
岐伯曰有故無損故無損也服之愈

羅謙甫治江淮漕運使崔君長子年二十五體豐肥奉養
膏粱時有熱證友人勸食寒涼及服寒涼藥至元庚辰
秋病瘧又不除醫投以砒霜等藥新汲水送下禁食熱
物瘧病不除反加吐利脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴
時復胃脘當心而痛憂易醫罔効至冬還家百療不差

延至四月間因勞役煩惱前症大作羅診之脉弦細而微手足稍冷面色青黃而不澤情思不樂惡煩完食少微飽則心下痞悶嘔吐酸水發作疼痛冷汗時出氣促悶亂不安須人頻相抵而坐少時易之內經云中氣不足溲爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則爲痿厥心悗又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得炅則已炅者熱也非甘辛大熱之劑則不能愈乃製扶陽助胃湯方以炮乾薑錢半人參甘草官桂白芍各一錢陳皮白朮吳茱萸各五分黑附子炮去皮二錢益智仁五分作一服水三盞薑三片棗二枚食前温服三服大勢皆去痛減過半至秋先炙甘脫三七壯以助胃氣次炙氣海百餘壯生發元氣滋榮百脉以還少丹服之則善飲食添肌肉潤皮膚明年春炙三里二七壯乃胃之合穴也亦助胃氣又引氣下行春以芳香助脾復以育氣湯加白檀香平治之戒以懲忿窒慾慎言節食一年而平復

滑伯仁治一婦人盛暑泄瀉泄厥逆惡寒胃脫當心而痛自腹引脇轉爲滯下嘔噦不食醫以中暑瘴亂療之益劇脉三部俱微短沈弱不應呼吸曰此陰寒極矣不亟温之則無生理內經雖曰用熱遠熱又曰有假其氣則無也於是以薑附温劑三四進間以丹藥脉稍有力厥逆漸退更服薑附七日衆症悉去遂以丸藥除其滯下

而安

丹溪治一人以酒飲牛乳患心疼年久飲食無礙雖盛暑飲食身無汗醫多以丁附治之羸弱食減每痛以物拄之脉遲弱弦而濇大便或秘結或泄又苦吞酸時七月以二陳湯加芩連白朮桃仁郁李仁澤瀉每旦服之屢涌出黑水若爛木耳者服至二百餘貼脉濇漸退至數漸添純弦而漸充滿時冬煖意其欲汗而血氣未充以參芪歸芍陳皮半夏甘草服之痛緩每旦又一二作乃與麻黃蒼朮芎歸芔草等藥繳下頃忽運厥須臾而甦大汗痛止

許文懿公因飲食作痰成心脾疼後觸胃風雪腿骨痛醫

以黃牙歲丹烏附等藥治十餘年艾灸萬計又胃寒而病加膀難開合脾疼時膀痛稍止膀痛則脾疼止初因中脘有食積痰飲續胃寒濕抑遏經絡氣血不行津液不通痰飲注入骨節作往來如潮湧上則為脾疼降下則為膀痛須湧泄之時秋深而以甘遂末一錢入豬腰子內煨食之連泄七行次早足便能步後嘔吐大作不食煩燥氣弱不語金匱云病人無寒熱而短氣不足以息者實也其病多年鬱結一旦泄之徒引動其猖狂之勢無他制禦之藥故也仍以吐劑達其上焦次第治之又中下二焦連日用瓜蒂藜蘆苦參俱吐不透而藏燥愈甚乃用附子尖三枚和漿水與蜜飲之方大吐膏痰一大

桶以朴硝滑石薫草石膏連翹等二斤濃煎置井中極冷飲之四日服四斤後腹微滿二溲秘脉歇至於卯酉時夫卯酉爲手足陽明之應此乃胃與大腸有積滯未盡當速瀉之群醫惑阻乃作紫雪二斤服至五兩神思稍安腹亦減安後又小溲閉痛飲以蘿蔔子汁半盂得泄立通又小腹滿痛不可捫摸神思不佳以大黄牽牛等分水丸服至三百丸下如爛魚腸二升許神思稍安診其脉不歇又大溲迸痛小腹滿悶又與前丸百粒腹大絞痛腰膀重眼火出不言語瀉十穢物如柏油條一尺許肛門如火以水沃之自病半月不食不語此方啜稀粥始有生意數日平安自嘔吐至安日脉皆平常弦

一童子冬瘧方愈十日而心脾疼六脉伏痛稍減時氣口緊盛餘皆弦實而細意其宿食詢之果傷冷油麪食以小胃丹津燕十餘粒禁飲食二日凡與小胃丹十二次痛止後與穀太早忽大痛連脇乃禁食亦不與藥蓋宿食已消新穀與餘積相併而痛若再與藥攻必傷胃氣所以不與藥又斷食二日至夜心饋索食先以白术黄連陳皮爲丸熱湯下八九十丸以止其饋此非飢也乃餘飲未了因氣而動遂成饋雜耳若與食必復痛詢其纖悉未甚快然常思食又與前丸飢必繼以腸間蒲悶今雖子二十日夕不飢而昏睡後少與稀粥減平日之半兩日

嗣後禁其雜食半月而安

一婦因久積憂患後心痛食減羸瘦渴不能飲心與頭更換而痛不寐大溲燥結與四物湯加陳皮甘草百餘貼未効朱曰此肺久爲火所鬱氣不得行血亦蓄塞遂成汚濁氣壅則頭痛血不流則心痛通下痛也治肺當自愈遂效東垣清空膏例以黄芩細切酒浸透炒赤色爲細末以熱白湯調下頭稍汚十餘貼汗漸通身而愈因其膝下無汗瘦弱脉濇小溲數大溲澁當補血以防後患以四物湯加陳皮甘草桃仁酒芩服之

一婦春末心脾疼自言腹脹滿手足寒時膝須綿裹火烘胃畏熱喜揪露風涼脉沈細濇稍重則絶輕似弦而短渴喜熱飲不食以草薑丸加黄連滑石神曲爲丸白术爲君茯苓爲佐陳皮爲使作湯下百丸服至二斤而愈

一老人心腹大痛昏厥脉洪大不食不勝一味攻擊之藥用四君加川歸沈香麻黄服愈

龔恒德治一男子年三十五胃脘作痛久矣人形黄瘦食少曾中常苦食飽求治與加味枳术丸不効而日漸大痛叫號聲徹四隣自分死矣與桃仁承氣湯作大劑與之連二服大下瘀血四五碗許困倦不能言者三日教以少食稀粥漸次將理而安

福唐梁緜心脾疼痛數年不愈服藥無効或教事佛久之

夢神告曰與汝良劑名一服飲可取高良薑香附米等分如本條修製細末二錢温陳米飲送下空心服爲佳不煩再服已而果驗後常以濟人皆効類編百一選方云二味須各炒熟然後合和同炒即不驗

張思順盛夏謁官都城苦熱食氷雪過多又飲木瓜漿積冷於中遂感脾疾藥不釋口殊無退證累歲日齋一道人適一道人曰但取藿梗二十一粒浸於漿水盌中一宿漉出還以氷漿吞之若是而也張如所戒明日梗才下腹即脫然更不復作

崔元亮海上方治一切心疾無問久新以生地黄一味隨人所食多少搗取汁搜麪作飥或令冷淘食之良久當利下蟲長一尺許頭似璧宮後不復患

劉禹錫傳信方貞元十年通事舍人崔抗女患心疾垂氣絶遂作地黄冷淘食之便吐一物可方一寸以來如蝦蟆狀無目足等微似有口蓋爲此物所食自此頓愈麪中忌用鹽本事方

汪石山治一婦人年三十餘性躁多能素不孕育每發躺畏飲時或心痛春正忽大作或作或氣而用香燥或作痰而用二陳或作火而用寒涼因糞結進潤腸丸遂泄不禁小便不得獨利又發寒熱熱則欬痰不止寒則戰慄鼓頷肌肉瘦削皮膚枯燥月水不通食少惡心或煩躁而渴或昏昏嗜卧或小腹脹痛諸治罔効汪診右脉浮

大弦數左胍稍斂而數寒來脉皆沈微似有似無經言脉浮爲虛脉大必病進丹溪謂脉大如葱管者太虛也經又謂弦脉屬木見於右手肝木尅脾土也又以數脉所主爲熱其症爲虛左脉稍斂者血分病輕也今患素畏飲者是胃氣本弱也心痛即胃脘痛由脾虛不運故胃脘之降礙滯而作痛也瀉泄不禁小便不得獨行者蓋陽主固且經言膀胱者津液之府氣化則能出矣今陽虛不固於內故頻泄也膀胱氣虛不化故小便不得獨行也又寒熱互發者蓋氣少不能運行而滯於血分故發熱血少不得流利而滯於氣分故發寒仲景陽入於陰則熱陰入於陽則寒是也寒則戰慄鼓頷者陰邪入於陽明也熱則欬痰不已者陽邪入於陰分也此則陰陽兩虛故相交併而然也肌肉胖虛食少故瘦削也皮膚枯燥者經曰脾主身之肌肉脾虛不能運行津液灌溉於肌表故枯燥也行其津液脾虛不能運行津液灌溉於肌表故枯燥也月水不通者經曰二陽之病發心脾男子少精女子不月二陽手足陽明腸與胃也陽明虛則心脾皆失所養而血不生故不月也食少惡心躁渴嘈酸皆脾胃所生之症也小腹腹痛者乃陽虛下陷使然也經曰陽病極而下是也乃用人參五錢黃芪四錢白朮三錢爲君升麻八分柴胡一錢猪苓澤瀉各七分爲臣砂米五分香附七分爲佐歸身七分麥冬一錢爲使煎服三貼不効

一醫曰此病不先驅邪一主於補所謂閉門留賊一曰此屬陰虛火動今不滋陰降火而徒補氣將見氣愈盛火愈熾矣所謂不先去邪者因其寒熱往來也然去邪不過汗吐下三法今病自汗吐痰泄利三者備矣雖有何法而可施乎且病有實邪有虛邪虛可補而實可瀉今病屬虛而以實邪治之所謂虛虛之禍也一謂當滋陰降火因其月事不通病發於夜且服降火藥遂小腹脹而大便泄是不宜於此矣殊不知滋陰降火皆甘寒苦瀉之劑今病食少泄利明是脾虛且脾胃喜温而惡寒今泥於是寧不愈傷其胃而益其泄乎吁危哉故不得不辨

江汝潔治會中夫人病心氣痛甚劇醫治不効江視其症乃心脾疼也夫心主血脾裹血二經陰血虛生內熱耳以阿膠一錢五分滋二經之虛白螺螄殼火煅一錢五分以瀉二經之火二味爲末好酒調服一二盞即愈

臣掌科夫人年三十餘病胃脘連脅脇痛日輕夜甚兩寸關弦滑有力醫皆以積滯凝寒用發散及攻下之劑不効繼用鐵刷散四磨飲等方並莫應及用湯水皆吐而不納經曰不食痛益甚一醫謂五靈脂沒藥素用有効試用酒調病者到口便吐隨吐出綠痰兩碗許痛即止納飲食此蓋痰在膈上攻下之不去必得吐法而後愈

江篁南治一婦患心脾疼弱甚醫以沈香木香磨服之其痛益增且心前攲痛又兼小腹痛甚其夫灼艾灸之痛亦不減江以挫仁承氣湯去芒硝投之一服而愈

江應宿治中年男子患心脾痛積十年所時發則連日呻吟減食遍試諸方罔效診之六脉弦數予曰此火鬱耳投薑汁炒黃連山梔瀉火爲君川芎香附開鬱陳皮枳殼順氣爲臣反佐以炮薑從治一服而愈再與平胃散加薑炒黃連山梔神曲糊丸一料刻其根不復舉矣

予長子年三十二歲素飲食無節性懶於動作丙戌秋從三子自燕都郎家舟行飽餐多晝寢有時背脹腹微痛初冬過蘇州夜赴酒筵後脫衣用力次早遂覺喉口有酸水腹脹腹痛一日忽大痛垂死欲人擊打又炒熱鹽熨之稍寬快頃刻吐紫黑血二碗許連日不食食入即吐痛止即能食食飽又復痛諸藥不應遍發遍愈六脉弦而搏指此食傷大陰脾虛氣滯與香砂橘半枳术丸灸中脘膏肓禁飽食兩月而愈

腹痛

華佗治一人病腹中攻痛十餘日髮髮墮落佗曰是脾半腐可剖腹治也使飲藥令卧破腹就視脾果半腐壞以刀斷之割去惡肉以膏傳之即差 獨異志

元豐中丞相王郇公小腹痛不止太醫攻治皆不効凡藥治熱如附子硫黃五夜叉丸之類用之亦不差附馬張都尉令婦人油頭髮燒如灰細研篩過温酒調二錢即時痛止 良方

羅謙甫治眞定一士人年三十餘肌體弱左脇下有積氣不敢食冷物得寒則痛或嘔吐清水眩運欲倒目不敢開惡人煩宂靜卧一二日及服辛熱之劑則病退延至初秋因勞役及食冷物其病大作腹痛不止冷汗自出四肢厥冷口鼻氣亦冷面色青黃不澤全不得卧扶而坐又兼咳嗽咽膈不利故内經云寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注於大經血氣積留不得行故宿昔而成積也又寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也諸寒在内作痛得熨則痛立止與藥則吐不得入口無如奈何遂以熟艾半斤白紙鋪於腹上紙上攤炙又以慈葱數枝批作兩半置艾上數重乘以白紙熨之以慢火熨斗熨之冷則易之覺腹中熱腹皮暖不禁以綿三條多縫帶繫之待冷時解初熨時得暖則痛減大暖則痛止至夜得睡翌日乘與對症藥服之良愈

李子豫治豫州刺史許永之弟患心腹痛十餘年殆死卻一日夜間闇昇風後有鬼謂腹中鬼曰明日李子豫從此過以赤丸殺汝汝其死矣腹中鬼曰吾不畏之於是使人候子豫豫果至未入門患者聞腹中有呻吟聲及子豫入視鬼病也遂以巴豆赤丸與服須臾腹中雷鳴彭轉大利數行遂愈(按神試方見鬼症門)今八毒丸方是也

虞恒德治一婦年五十餘小腹有塊作痛二月餘一醫作死血治與四物加桃仁等藥不効又以五靈脂玄胡索乳香沒藥三稜莪朮等丸服又不効其六脉沈伏兩尺脉絶無予曰乃結糞在下焦作痛耳非死血也用金城稍暖燒灰淋濃汁一盞服之過一時許與枳實導滯丸一百粒催之下黑糞如梅核者碗許痛遂止後以生血潤腸之藥十數貼調理平安

一男子壯年寒月入水網魚飢甚遇涼粥食之腹大痛二晝夜不止醫以大黃丸下不通又與承氣湯下糞水而痛愈甚診其六脉沈伏而實面青黑色虞曰此大寒症及下焦有燥屎作痛先與一丁附治中湯一貼又與炙氣海穴二十一壯痛減半繼以巴豆流香木香作丸如菉豆大生薑汁送下五七丸而愈

丹溪治一老人腹痛不蠲下者用川芎蒼朮香附白芷乾薑茯苓滑石等劑而愈

一人於六月投淵取魚至秋深雨凉半夜小腹痛甚大汗

脉沈弦細實重取如循刀責責然與大承湯加桂二服
微利痛止仍連日於申酉時復痛堅硬不可近每與前
藥得微利痛暫止於前藥加桃仁泥下紫黑血升餘痛
亦止脉雖稍減而責責然猶在又以前藥加川附子下
大便五行有紫黑血如破絮者二升而愈又傷食於酉
時復痛在臍腹間脉和與小建中湯二服而愈

一少年自小面微黃夏間腹大痛醫與小建中湯加丁香
三貼不効加嘔吐清汁又與十八味丁沈透膈湯二貼
食仍不進困卧痛無休止如此者五六日不可按又與
阿魏丸百粒夜發熱不得寐口乾不渴脉左三部沈弦
而數實關尤甚右沈滑數實遂與大柴胡加甘草四貼
下之痛嘔雖減食未進與小柴胡去參加芍藥陳皮
黃連甘草二十貼而愈

一婦年四十患腹膨痛常燒薰艾灸之面胷畏火氣六脉
和皆微弦苦夜不得寐悲憂一年衆作心病治遂覺氣
復自下衝上病雖久形不瘦此肝受病也與防風通聖
散吐之時春寒加桂入薑汁調之日三四次夏稍熱與
當歸龍膽丸間與枳朮丸二月而安

一人中脘作疼食已口吐血紫黯色二關脉濇乃血病也
跌仆而致治以生新去陳之劑吐出片血碗許而安

吳茭山治一婦患臍下虛冷腹痛用川芎歸身炙方炒延
胡下皮乾薑服之効

張至和吳郡人精於醫嘗治人腹疾爲庸醫誤用熱藥張知不可療辭之其人別延周濟廣不再藥而愈乃遣從者市肴羞故令迂路經張門張問之曰吾主疾愈置以謝周某者張笑曰亟回家此當大使下咽若恐不又見矣果然

程明佑治王汝恭夜御內詰旦前寒腹痛醫投五積散熱甚又投斗門神湯小柴胡湯嘔噦程教以飲冰一醫曰病得之入房內有伏陰復投以冰必死及二飲腹不痛再飲至三斗病已所以知汝恭當飲冰而解者切其脉陽盛格陰熱入厥陰也

汪石山治一人年五十餘形瘦而黑理疎而澁忽腹痛午後愈甚醫曰此氣痛也治以快氣之藥痛益加又曰午後血行於陰分加痛者血滯於陰也以四物加乳沒服之亦不減汪診之脉浮細而結或五七至一止或十五至一止經論止脉漸退者生漸進者死今止脉頻則反輕疎則反重與脉經實相矛盾汪熟思少頃曰得之矣止脉疎而痛甚者以熱動而脉速頻而反輕者以熱退而脉遲故病屬陰虛火動無疑且察其病起於勞欲勞則傷心而火動欲則傷腎而水虧以參爲補脾爲君熟地歸身滋腎爲臣黃柏知母麥冬清心爲佐山查陳皮行滯爲使人乳童便出入加減惟人參加至四五錢遇痛進之則愈或曰諸痛與瘦黑人及陰虛火動參芪在

所當禁今用之顧効謂何曰藥無常性以血藥引之則從血以氣藥引之則從氣佐之以熱則熱佐之以寒則寒在人善用之耳況人參不特補氣亦能補血故曰氣血弱當從長沙而用人參是也所謂諸痛禁用參芪者以暴病形實若年高氣血衰弱不用補法氣何由行痛何由止經曰壯者氣行則愈是也

一人體弱色脆常病腹痛惡寒發熱嘔泄蹉卧時或吐蟲至三五日或十數日而止或用丁沈作氣治或用薑附作寒治或用削尅作積治或用燥烈作痰治俱不効診其脉或濡小近駛曰察色診脉觀形乃氣虛兼臟熱也遂用參芪并酸寒之劑令犯之何也曰病久屬臟臟則生熟又氣屬陽為表之衛氣虛則表失所衛而賊邪易入外感激其內臟故痛大作今用甘温以固表則外邪莫襲酸寒以清內則臟熱日消病由是愈

一人面色蒼白年四十六素好酒色犬肉三月間因酒兼有房事遂病左脇痛甚後延右腹續延小腹以及滿腹皆痛日夜叫號足不能屈伸即不能仰汗出食阻自用備急丸利二三行而隨止痛仍不減汪診其脉皆細駛右脉頗大於左獨脾脉弦而且滑扶起診之右脉亦皆細數恐傷酒肉用二陳加芩查藥進之不効再用小承氣湯仍不利蜜兼導之亦不利乃以大承氣湯利二三行痛減未除令其住藥只煎山查湯飲之次日煩躁嘔惡渴

飲涼水則覺惡止爽快詰朝診脉皆隱而不見四肢厥冷煩躁不寧時復汗出舉家驚愕疑是房後陰症擬進附子理中湯汪曰此治內寒逆冷也活人書云四逆無脉當察症之寒熱今觀所患多屬於熱況脉日脉皆細數面色近赤又兼酒後而病六脉雖絕蓋由壯火食氣也四肢者諸陽之本氣被壯火所食不能營於四肢故脉絕而逆冷也此類傷暑之症正合仲景所謂熱厥者多寒厥者少急用大承氣湯下之之類向雖下以大承氣其熱尚未盡難以四逆湯症與此今用附子熱藥寧不助火添病耶如不得已可用通脉四逆湯尚庶幾焉以其內有童便猪膽汁監制附毒不得以肆其虐也連進二服脉仍不應逆冷不回渴飲煩躁小便不通糞溏反頻腹或時痛更進人參白虎湯二貼燥渴如舊更用參术各三錢茯苓麥冬車前各一錢五味當歸各五分煎一貼脉漸見如蛛絲汪曰有生意矣仲景論絕脉服藥微續者生脉暴出者死是也左手足亦略近和不致氷人右手足逆冷如舊但口尚渴便尚溏一日夜約十餘度小便不通汪曰渴而小便不利者當利其小便遂以天水散冷水調服三四劑不應再以四苓散加車前山梔煎服二貼小便頗通但去大便而小便亦去不得獨利汪曰小便未利煩渴未除蓋由內熱耗其津液也大便尚溏者亦由內熱損其陽氣陽氣不固而然也準

用參朮各二錢茯苓錢半白芍車前門冬各一錢山梔七分五味五分連進數服至第九日逆冷回脉復見諸症稍減漸向安

一婦人年近五十病腹痛初從右手指冷起漸上至頭如冷水澆灌而腹大痛則遍身大熱熱退則痛止或過食或不食皆痛每常或一年二年發近來二三十日一發遠不過六七日醫用四物加柴胡香附不應更醫用四君木香檳榔亦不應又用二陳加紫蘇萱蔻又用七氣湯等劑皆不應汪診脉皆微弱似有似無或一二至一止或三五至一止乃陽氣太虛也獨參五錢陳皮七分煎服十數貼而愈夫四肢者諸陽之末頭者諸陽之會經曰陽虛則惡寒又曰一勝則一負陽虛陰往乘之則發寒陰虛陽往乘之則發熱今指稍逆冷上至於頭則陽負陰勝可知矣陽負則不能健運而痛大作痛作而復熱若物極則反也及其陰陽氣衰兩不相爭則熱歇痛亦息矣況脾胃多氣少血經也氣能生血氣不足則血亦不足仲景曰血虛氣弱以人參補之故用獨參湯服而數年之痛遂愈矣

江篁南治一婦年四十餘常患腹疼先從心前痛小腹既而腰俞盡痛兼吐清水或吐食每吐而後愈合眼則覺麻木其經水將行之前腰腹作痛行或帶紫凝結兼有白帶或一月再至初用二陳合四物除地黃加烏藥香

附三服不驗乃投東垣當歸附子湯四服稍愈遂加分兩作九服之

薛已治唐儀部胷內作痛月餘腹亦痛左關弦長右關弦緊此脾虛肝邪所乘以補中益氣湯加半夏木香二劑而愈又用六君子湯二劑而安此面色黃中見青

李儀部常患腹痛以補中益氣加山梔即愈一日因怒肚腹作痛胷脇作脹嘔吐不食肝脉弦緊此脾氣虛弱肝火所乘仍用前湯吞左金丸二十丸而愈此面色黃中見青兼赤

太守朱陽山因怒腹痛作瀉或兩脇作脹或胷乳作痛或寒熱往來或小便不利飲食不入嘔吐痰涎神思不清此肝木乘脾土用小柴胡加山梔子炮薑茯苓陳皮製

兼連二劑即愈

陽山之內素善怒鬱膈不利吐痰甚多吞酸噯腐飲食少思手足發熱十餘年矣所服非芩連枳實即檳榔厚朴左關弦洪右關弦數此屬肝火血燥木乘土位朝用六味丸以滋養肝木夕用六君加當歸芍藥以補脾土不月而愈二年後因大怒吞酸噯腐腹脹滿旬日或用二陳石膏治之吐涎如湧肌熱如灼將用滾痰丸下之脉洪大按之無力薛曰中氣虧損而發熱脾弱而涎泛溢耳用六君加薑桂一服即睡覺而諸症如失

儒者沈泥丈內停飲食外感風寒頭痛發熱惡心腹痛薛用人參養胃加苦芷麴蘗香附桔梗一劑而愈次日仍作腹痛以手重按痛即止此客寒裹虛而作也乃以香附六君子加木香炮薑服之睡覺痛減大半去二香再服飲食少進加黃芪當歸少佐升麻而愈

徐道夫母病胃脫當心痛劇右寸關不應指左微而似絕手足厥冷病勢危篤察其色眼胞下青黯此脾虛肝木所勝用參朮茯苓陳皮甘草補其中氣木香和胃氣以行肝氣吳萸散脾胃之寒止心腹之痛急煎數沸即進之煎熟繼進諸症俱減向使泥其痛無補法用攻伐之劑禍不旋踵

一婦人懷抱鬱結不時心腹作痛年餘不愈諸藥不應用歸脾加山梔而愈

陳子直主簿妻有異疾每腹脹則腹中有聲如擊鼓遠聞於外行人過者皆疑其作樂腹脹消則鼓聲亦止一月一作經十餘醫皆莫能明其疾一婦人有孕腹內鐘鳴醫莫能治偶一士人携一方書其門有一方能治此用鼠窩前畚土研羅爲末每服二錢射香湯調其疾立愈

腰痛

淳于意治濟北王侍者韓女病腰皆痛寒熱衆醫皆以爲寒熱也臣意診脉曰内寒月事不下也即竊以藥旋下病已病得之欲男子而不可得也所以知韓女之病者診其脉時切之腎脉也嚮而不屬嚮而不屬者其來難堅故曰月不下肝脉弦出左口故曰欲男子不可得也

郝允治殿中丞姚程腰脊痛不可俛仰郝曰穀獨氣也當食發怒四肢受傳爲太小絡中痛而無傷法不當用藥以藥攻之則益痛須二年能俛仰二年能坐三年則愈果然

東垣治一人露宿寒濕之地腰痛不能轉側脇搶急作痛

月餘腰痛論云皆足太陽足少陰血絡有凝血作痛問有一二證屬少陽膽經外絡脉病皆去血絡之凝乃愈經云冬三月禁鍼只宜服藥通其經絡破血絡中敗血以漢防己防風各三分炒曲獨活各五分川芎柴胡肉桂當歸炙草蒼朮各一錢羌活錢半桃仁五粒作二服酒煎服愈

韓悉治一人患腰疼痛以胡桃仁佐破故紙用鹽水糊九服之愈

丹溪治一貧夫年六十餘因墜馬腰疼不可轉側六脉散大重取則弦小而長稍堅朱以為惡血雖有未可驅逐且以補接為先遂令煎蘇木湯煎參芪川芎當歸陳皮甘草服至半月後散大漸斂食亦進遂與熟大蕭湯調下自然銅等藥二月而安

王紹顔信効方云頃年得腰膝痛不可忍醫以腎風攻刺諸藥不効見傳相方有此驗立製一劑神効方以海桐皮二兩牛膝一兩羌活地骨皮五加皮薏苡仁各一兩甘草五錢生地十兩右㓁洗焙乾細剉生地黃以薑刀子切用綿一兩都包裹入無灰酒二斗浸冬二十七日夏七日候熟空心飲一杯或控乾焙末蜜丸亦可

戊戌秋淮南大水城下浸灌者連月王忽臟腑不調腹中如水乳數日調治得愈自此腰痛不可屈折雖沐亦相妨徧藥不効凡三月此必水氣陰盛腎經感此而得乃

灸腎俞三七壯鹿茸丸而愈醫學綱目腎部

脇痛

丹溪治一人年三十六虛損瘦甚右脇下疼四肢軟弱二陳湯加白芥子枳實薑炒黃連竹瀝八十貼安

項彥章治一人病脇痛衆醫以爲癰投諸香薑桂之屬益甚項診之曰此腎邪也法當先温利而後竭之以神保丸下黑溲痛止即令更服神芎丸或疑其太過項曰向用神保丸以腎邪透膜非全蝎不能引導然也其性熱非芒硝大黃蕩滌之後遇熱必舉乃大泄滯數出病已所以知之者以陽脉弦陰脉微濇弦者痛也濇者陰邪有餘也腎邪上薄於脇不能下且腎惡燥今以燥熱發之非得利不愈經曰痛隨利減殆謂此也

虞恒德治一人年四十餘因騎馬跌撲次年左脇脹痛醫與小柴胡湯加草龍膽青皮等藥不効診其脉左手寸尺皆弦數而滿關脉尤急數右三部唯數而虛虞曰明是死血症用抵當丸一丁劑下黒血二升許後以四物湯加減調理而安

橘泉治一老人八十餘右脇大痛腫起如覆盃手不可近醫以爲滯冷投香桂蘆黄推氣之劑小腹急脹痛益甚翁曰此内有伏熱瘀血在脾中耳經所謂有形之腫也然痛隨利減與承氣湯加當歸芳藥柴胡黄連黄柏下之得黒瘀血二升立愈

張戴人治一人病危篤張往視之其人曰我別無病三年前當降暑時出村墅有以煮酒饋予者適村落無湯器冷飲數升便覺左脇下悶漸作痛結硬如石至今不化鍼灸磨藥殊無寸効戴人診之兩手俱沉實而有力先以獨聖散吐之一涌二十三升氣味如酒其痛即止後服和脾安胃之劑而愈儒門事親

張文仲則天初爲待御醫時進蘇良嗣因拜跪便絶倒文仲候之曰此因憂憤邪氣激也若痛衝脇則劇難抶自蹇至食時即苦衝脇絞痛文仲曰若入心即不可療俄而心痛日肝而卒

薛已治一婦人脇下腫痛色赤寒熱用小柴胡加芳藥山梔川芎以清肝火而愈但經行之後患處仍痛用八珍

湯以補氣血而安若因肝膽二經血燥所致當用小柴
胡加山梔膽草芎歸主之久而脾胃虛弱補中益氣爲
主若兼氣鬱傷脾間以歸脾湯朝寒暮熱飲食少思須
以逍遙散爲主

瘁生馬伯進之母左脇連脇作痛似瘡毒狀薛曰此鬱怒
傷肝脾與六君加桔梗枳殼柴胡升麻彼另用瘡藥其
痛甚乃請治其脉右關弦長按之軟弱左關弦洪按之
滿滯果肝脾之疾飲食之毒七情之火也仍用前藥加
以大補四劑脉症悉退再加芎歸全愈

一人年近六十素鬱怒脾胃不健服香燥行氣飲食少思
兩脇脹悶服行氣破血飲食不入右脇脹痛喜用手按
彼疑爲膈氣痰飲內傷薛曰乃肝木剋脾土而脾土不
能生肺金也若內有瘀血雖單衣亦不敢着肉用滋化
源之藥四貼諸症頓退彼以爲愈薛曰火令在通當健
脾土以保肺金彼不信後復作另用痰火之劑益甚求
治左關右寸滑數此肺內潰矣仍不信乃服前藥吐穢
濃而死

一婦人飲食後因怒患癪嘔吐用藿香正氣散二劑而愈
後復怒吐痰甚多狂言熱燄胃脇脹痛手按少止脉洪
大無倫按之微細此屬肝脾二經血虛以加味逍遙散
加熟地川芎二劑脉症頓退再用十全大補而安此症
若用疎通之劑是犯虛虛之戒矣

一男子房勞兼怒風府脹悶兩脇脹痛薛作色欲損腎怒氣傷肝用六味地黃丸料加柴胡當歸一劑而愈

石山治一人客維揚病脇痛醫以爲虛用人參羊肉補之其痛愈甚一醫投龍膽瀉肝湯痛減汪診弦濡而弱曰脾胃爲痛所傷尚未復遂以橘皮枳朮丸加黃連當歸服之而安越五年腹脇掣痛彼思頗類前病欲服龍膽瀉肝湯猶未汪診之脉皆濡弱而緩曰前病屬實今病屬虛非藥可治也以人參爲君芎歸芍藥爲臣香附陳皮爲佐甘草山梔爲使煎服一帖餘貼痛止食進

夥縣縣丞年踰五十京回兩脇肋痛醫用小柴胡湯痛止續後痛作前方不効汪診之脉皆弦細而弱按之不足曰此心脾爲酒所傷肝腎爲色所損兩脇脹痛相火亢極肝亦自焚經曰五藏已虛六府已極九候雖調者死此病之謂歟尋卒

休寧金上舍環海自述云曾因送嬪忿饑過勞患腰肋連脇腫痛不能轉側醫治不効有一儒者診視曰此肝火也投龍膽瀉肝湯當歸龍會丸而愈

膝腫

徐可豫治吳興沈仲剛子膝腫痛右先劇以熱熨則攻左熨左攻右俱熨則腹雷鳴上胷已而背悉若受萬箠者獨元首弗及發則面黧色脉罔辨昏作旦輟日旰弱甚醫望色輒郤謂弗救徐視脉竟曰是濕淫所中繼服驚傷膽疾雖劇治可即令以帛纏脅少選探咽喉間湧青白涎沫幾斗許涌定徐曰今茲疾發至腹則弟上面而弗青矣至昏膝痛仍如熨鳴果弟及胷止三斛已定皆如徐言越三日皆不復作遂痊

鶴膝風

州守張天澤左膝腫痛胷腹痞滿飲食少思時作嘔頭眩痰壅日晡殊倦用葛氏熨法及六君加炮薑諸症頓退飲食稍進用補中益氣加蔓荊子頭目清爽肢體康健間與太防風湯十餘劑補中益氣三十餘劑而消一婦人發熱口乾月經不調半載後肢體倦怠二膝腫痛作足三陰血虛火燥治之用六味地黃丸兩月餘形體漸健飲食漸進膝腫漸消半載而痊

脚氣

附腫痛

有人病兩脚躄不能行舉詣佗佗望見云已飽針灸服藥矣不須復看脉便使解衣點背數十處相去或一寸或五分縱邪不相當言炙此各十壯炙瘡愈即行後炙處來春一寸上下行端直均調如引繩也漢書華佗傳徐之才治一人患脚跟腫痛諸醫莫能識徐曰蛤精疾也由乘舟入海垂脚水中疾者曰實魯如此之才爲剖得蛤子二大如榆莢大故事有范光禄得脚腫不能飲食忽有一人不通名徑入齋中謂曰佛使我來理君疾也光禄廢衣示之因以刀針腫上候忽間頓針兩脚及膀胱百餘下出黃膿水三升許而去至明並無針傷而患漸愈齊諧錄

王蕤守會稽董貫時方用事貫苦脚氣或云揚梅仁可療是疾蕤良五十石獻之後擢待制揮麈錄

道士王裕曰有忍患脚心如中箭發歇不時此腎之風毒瀉腎愈

董守約苦脚氣攻注或教之摧數螺傳兩股上便覺冷氣趨下至足踰時而安類編

唐柳州慕死三方云元和仲春得乾脚氣夜半痞絶左脇有塊大如石俎死因大寒不知人三日家人號哭榮陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下三次氣通塊散用杉木節一升無葉以皮代木腹檳榔七箇

合字碎之童使三大升共煮二升半分二服若一服得
快利停後服已前三者皆死矣會有教者皆得不死事
方

童系治安國軍節度使程道濟患腰脚疼痛將二年服湯
藥皆薑附硫黃燥熱之藥中脘臍下支住十數無効愈
覺膝寒胃冷少力多睡食少神減群醫曰腎部虛寒非
熱藥不能療及自體究亦覺惡寒喜煖但知此議為是
因諮於董董曰腎經積熱血氣不通故也程不甚見信
試用通經凉藥但見臟腑滑利伏困愈甚棄而不服後
因陳五行造化勝負之理方始不疑再用辛甘寒藥瀉
十二經之積熱日三四服通利十餘行數十日後覺痛
減飲食有味精力爽健非昔之比心神喜悅服藥不輟
遂運覺熱自後服餌皆用寒凉數年之間疾去熱除神
清體健

蔡元長知開封正掾按治事忽如有蟲自足心行至腰間
即隧筆暈絕久之方甦椽屬云此病非俞山人不能療
趣使召之俞曰此氣脚氣也法當灸風市穴一壯蔡
憂然復常明日病如初再召俞曰除病根非千支不可
從其言灸五百壯自此遂愈

仲兄文安公守姑蘇以鑾輿巡幸虛府舍暫徙吳縣縣治
卑濕旋感足痺痛製不堪服藥弗効乃用所聞灼風市
肩髃曲池三穴終身不復作

僧音清苦此二十年每發率兩月用此灸三七壯即時痛止其他驗者益衆良堅志

一人患脚轉筋時發不可忍灸脚踝上二壯內筋急灸外筋急灸外

顧安中廣德軍人久患脚氣筋腿腫行褥不得因至湖州附舩舩中有一婦物爲腿酸痛遂將腿閣熨上微覺不痛及筋寬而不急乃問稍人袋中何物應曰宣木瓜自此脚氣頓愈名醫會

衍義治一人嗜酒後患脚氣甚危乃以巴戟半兩糯米同炒米微轉色去米木黃一兩剉炒同爲末煉蜜爲丸溫水送下五七十丸仍禁酒遂愈

東垣治一朝貴年近四十身體充肥脚氣始發頭面渾身支節微腫皆赤色足脛赤腫痛不可忍手近皮膚其痛轉甚起而復卧卧而復起日夕苦楚春間李爲治之其人以北土高寒故多飲酒積久傷脾不能運化飲食下流之所致投以當歸拈痛湯一兩二錢其痛減半再服腫悉除只有右手指末微赤腫以三稜針刺指爪甲端多出黑血赤腫全去數日後因飲食濕麪肢體覺痛再以枳實五分木黃酒煨一錢當歸身一錢羌活錢半名曰枳實木黃湯只作一服水二盞煎一盞溫服空心食前利下兩行痛止夫脚氣之疾皆水濕之爲也麪滋其濕又添支節煩痛內經云風能勝濕羌活辛溫透關節

去濕故以爲主血留而不行則痛當歸之辛溫散壅止痛択實之苦寒治痞消食故以爲臣木黃苦以導赽之濕熱治諸老血留結取其駛快故以爲使也

丹溪治一婦足腫用生地黃黃柏蒼朮南星紅花牛膝龍膽草川芎治之

一人兩足酸重不任行動發則腫痛一日在不發中診脉三部皆大搏手如葱管無力身半已上肥盛蓋其膏粱妄御嗜欲無窮精血不足濕熱太盛因用益精血於其下清濕熱於其上二方與之或言腳氣無補法故不肯服三月後痛作一醫用南方法治不効一醫用北法治之即死於溺器上吁業歧黃者虛實之辨蓋可以忽乎哉

項彥章治一人足病發則兩足如柱潰黃水踰月乃已已輒發六脉沈緩沈爲裏有濕緩爲厥爲風此風濕毒俗名濕腳氣是也神芎丸主之數十劑而愈

一婦腳底如錐刺痛或腫足腕亦痛而腫大便泄滑裏急此血少又下焦血分受濕氣爲病健步丸主之以生地一兩半歸尾白芍陳皮蒼朮各一兩川膝萊菔條各半兩大附子三錢桂枝二錢爲丸每服百丸以白朮通草煎湯食前下之

戴人治一人病腰腳大不仁偃僂蹙蹙而行已數年矣服

藥無功止藥却愈因秋暮涉水病復作醫用四斤九其父求治於戴戴曰近日服何藥曰四斤九曰日昏赤未其父驚曰日正暴發戴曰宜速來否則失明矣既來目腫無所見戴人先令湧之忽下三十行兩目頓明乖湧泄能認字調十月令服當歸丸健步而歸

子和治息帥腰股沈痛行步坐馬皆不便或作脚氣寒濕治之或作虛損治之皆附乳沒活血壯筋骨之藥無不與之即能襲鑠矣

魏德新因赴冬選犯寒而行真元氣衰加之坐卧冷濕飲食不節以冬遇此遂作腎痺而不用兩膊似折面黑如炭前後腰痛痿厥嗜卧徧問諸醫皆作腎虛治之乃先以玲瓏窻熨蒸數日次以苦劑上涌寒痰二三升下虛上實明見矣次以淡劑使白朮除脾濕茯苓養腎水官桂伐風木寒氣偏勝則加薑附否則不加又刺腎俞大谿二穴二十日二十刺前後一月半平復如初

毘陵馬姓者鬻酒爲業者患腎藏風忽一足發腫如瓠自腰以下鈹細通爲一律痛不可忍欲轉側兩人扶方可動或者欲以鈹力決之張曰未可此腎臟風攻注脚膝

也乃以連珠甘遂一兩木鼈子二箇一雄一雌爲末猪
猪腰子二箇批開藥末一錢摻勻濕紙裹數重慢火煨
熟放温五更初細嚼米飲下積水多則利多少則少也
宜軟飯將息若病患一脚切看左右如左脚用左邊腰
子右脚用右邊腰子藥末只一錢辰巳間下膿如水晶
者數升即睡痛止一月後尚拄拐而行再以赤烏散傘
塗貼其膝方愈十年相見行步自若

商州有人重病足不履地者數十年良醫禪技莫能治所
親置之道傍以求救者遇一新羅僧見之謂曰此疾不
藥可救但不知此土有否因爲之入山採取乃蔵蠭仙
也使服之數日能步履其後山人遂傳其事海上方著

其法云採之陰乾月餘搗末酒和服二錢匕利空心服
乏如人參性殺藥可加及六七錢匕利過兩行則減之
病除延停服其性甚善觸諸藥但惡茶及麪湯

羅治中書粘合公年四旬體幹魁梧春間從征至揚州偶
脚氣忽作遍身肢體微腫其痛手不能近足脛尤甚履
不在穿跣以騎馬控兩蹬而以竹器盛之困急東垣曰
内經有云飲發於中胕腫於上又云諸痛爲實血實者
宜決之以三稜針數刺其腫上血突出高二尺餘漸漸
如線流於地約半升許其色紫黑頃時腫消痛減以當
歸拈痛湯一兩半服之夜得睡明日乘服而愈

孫少府治韓彦正暴得疾手足不舉諸醫皆以爲風鍼手

足亦不去痛孫曰此脚氣也用檳榔末三錢生薑三片乾紫蘇葉七片陳皮三錢水一大盞煎七分熱服數服而愈

薛已治一婦人腿患筋攣骨痛諸藥不應脉緊用大防風湯二劑頓退又二劑而安

江應宿治一婢春初患脚氣腰脚赤腫壞起疼痛難於步履予曰此因飲食傷脾不能運化濕熱下注之所致也利水行濕消導食滯用平胃散加茯苓澤瀉意苡米成山查來芽神曲二劑腰脚消而能步再以米通白术湯送保和丸而愈

予友人佘近峯賈秣陵年五十餘患脚痛即不能起年餘腿與腿肉俱消邑醫徐古墟昔患痺疾治愈求其成方初用當歸拈痛湯二十服效次用十全大補湯加枸杞子防已牛膝革薢朝用六味地黃丸加虎脛骨牛膝川萆薢鹿角膠服三年躩鑠如初徐書云久久服之自瘳木益華勿責効於旦夕信然

宿曰今人謂之脚氣者黃帝所為緩風濕痺也千金云頑弱名緩風疼痛為濕痺大抵脚氣無補法乃風毒在內不可攻故當先瀉之皆濕熱之為也

腳發

薛已治閻老靴介菴腳指縫作痒出水腫熱而數止痒之藥不應服除濕之藥益甚薛診之曰陰虛濕熱下注也用六味地黃補中益氣而愈

大叅李北溪足赤腫作痛先用陽起石飲活命散一劑痛頓止灸處出水赤腫頓消次用托裏消毒散四劑灸處出膿而愈

一儒者脚踝腫硬色白兩月餘矣用大防風湯及十全大補兼服而消後塌屋不利飲食勞倦症復作盜汗肉熱飲食不化便滑肌瘦復加頭暈或頭痛痰湧此腎不納氣用八味丸益氣湯二百餘劑而安

一男子脚心發熱作渴引飲或用四物芩連黃柏知母之類腹痛作嘔煩熱大渴此脾胃復傷先用六君炮薑數劑而脾胃醒再用補中益氣加茯苓半夏而脾胃健乃以加減八味丸兼服半載而愈

一儒者脚心發熱作痒搔抓滾水浸漬而出水肌體骨立作渴吐痰用益氣湯六味丸年餘元氣復而諸症愈

少宗伯顧東江面黧作渴薛曰此腎經虧損當滋化源以杜後患顧公不信次年九月左足腿即輕瘡出血水七日腿沈重用陽起石灸三十餘壯足腿乃輕而消色仍黯時顧將北行賀萬壽薛診之曰脾脉衰憊陽氣虧極不宜遠行公曰予得夢屢驗向夢群仙待我

此壽徵也至河間驛聚仙堂病頤嘆曰數定於此立斃豈能我留孱宰

江應宿治程文學子脚腿墳起如瓜勢猶頑痛楚難支予用廣膠四兩入麝少許熔如稠膏攤油紙貼之外用好醋黃丹綿布三片乘熱貼膏外輪適更換腿舜如蛆頃刻盡消而愈

薛已曰脚發色赤腫痛而潰膿者屬足三陽濕熱下注可治微赤微腫者膿清者屬足三陰虧損難治若黑黯不腫痛不潰膿煩熱作渴小便淋瀝者陰敗未傳惡症為不治其法濕熱下注者先用隔蒜灸活命飲以解壅毒次服益氣湯六味丸以補精氣若赤黯不痛者着肉灸桑枝灸以行壅滯助陽氣更用大補湯八味丸壯脾腎滋化源多有生者若專治瘡復傷正氣誤人多矣

脚弱

一士人得脚弱病方書羅列積藥如山疾益甚張杲曰汝當盡屏去但用杉木爲桶濯足又令排樟腦於兩股間以脚襠繫定月餘而安健如初南方多此疾不可不知

邵庵選齋閒覽

孫琳治一少年娶妻不久得軟脚病疼甚醫以爲脚氣孫聞之曰吾不必診視但用杜仲一味寸劖片析每二十兩用半酒半水合一大盞煮六分頓服之三日能行又三日而愈孫曰第宅寢處高明衣褥燥結無受濕之理乃新婚縱慾致然杜仲專治腰膝以酒行之則奏効易矣

諸痛

子和治一婦人勞苦太過大便結燥咳逆上氣時喝喝然有聲唾喘鮮血以苦劑解毒湯加木香漢防已煎服時時啜之復以木香檳榔丸泄其逆氣二月而安

莊先生治喜樂之極而病者莊切其脉爲之失聲佯曰吾取藥去數日更不來病者悲泣辭其親友曰吾不久矣莊知其將愈慰之詰其故莊引素問曰懼勝喜可謂得玄關者

石山治一婦瘦弱年四十餘患走氣遍身疼痛或皆腹痛或脇痛或一月二三發發則嘔盡所食方快飲食不進久伏床榻醫作氣治用流氣飲或作痰治用丁薑二

陳病甚汪診之脉皆細微而數右脉尤弱曰此恐癉君憂傷脾而氣鬱也理以補脾散鬱以人參三錢香附黃連甘草砂仁各五分黃芪二錢歸身錢半川芎八分乾薑四分煎服十餘貼脉之數而弱者稍緩而健諸痛亦減仍服前方再用參芪川芎香附山梔甘草以神曲糊丸服之病除

蕭司訓年踰五十形色肥紫病氣從臍下沖逆而上睡卧不安飲食少精神倦汪診之脉皆浮濡而緩曰氣虛也問曰丹溪云氣從臍下起者陰火也何謂氣虛汪曰難執定論丹溪又云肥人氣虛脉緩亦氣虛今據形與脉當作氣虛論治遂以參芪爲君白朮白芍爲臣歸身熟地爲佐黃栢甘陳爲使煎服十餘貼稍安彼以胃脘不利陳皮加作七分氣沖上仍守前方月餘而愈

一人遍身皮底渾渾如波浪聲痒不可忍抓之血出不止名氣奔用人參苦杖青鹽細辛各一兩水二碗煎取清汁飲之而愈

疝癪

齊郎中令循病衆醫皆以爲屬入中而刺之臣意診之曰湧疝也令人不得前後溲循曰不得前後溲三日矣臣意飲以火齊湯一飲得前溲再飲大溲三飲而疾愈病得之內所以知循病者切其脉時右口氣急寸口乃氣口之也脉無五藏氣右口脉大數數者中下熱而湧左爲下右爲上皆無五藏應故曰湧疝中熱故溺赤也史記火齊湯即黃連解毒湯

齊北宮司空命婦出於病衆醫皆以爲風入中病主在肺刺其足少陰脉臣意診其脉曰病氣疝客於膀胱難於前後溲而溺赤病見寒氣則遺溺使人腹膜出於病得之欲溺不得因以接內所以知出於病者切其脉大而實其來難是厥陰之動也腹之所以腫者言厥陰之動也脉來難者疝氣之客於膀胱脉結動動則腹腫臣意即灸其足厥陰之脉左右各一所即不遺溺而溲清小腹痛止即更爲火齊湯以飲之三日而疝氣散即愈

安陵阪里公乘項慶病病臣意診脉曰牡疝牡疝在下上連肺病得之內臣意謂之慎毋爲勞力事爲勞力事則必嘔血死慶後蹴踘要寒汗出多即嘔血臣意復診之曰當旦日日夕死即死病得之內所以知項慶病者以其脉得蕃陽入虛裏慶旦日死一蕃一絡牡疝也史記

索隱曰脉病之名曰番陽者以言陽脉之翻入虛裏也

羅謙甫治火兒赤紐隣父患疝氣復因秋間饑飽勞役過飲漳乳所發甚如匆匆面色青黃不澤臍腹陣痛攅撮不可忍腰曲不能伸熱物熨之稍緩脉得細小而急內經有云任之爲病男子內結七疝皆積寒於小腸間所致也非大熱之劑則不能愈遂製沈香桂附丸以沈香附子川烏炮去皮臍炮薑良薑茴香炒官桂呉萸湯浸去苦各一兩醋丸如桐子大每服五十丸至七八十丸空心食前米飲溫酒送下日二服忌冷物間服天台烏藥散以烏藥木香茴香炒良薑炒青皮各五錢檳榔二箇川練十箇巴豆七十粒微打破同川練用麪炒候麪黑色去麪爲末每服一錢溫酒調下痛甚者炒生薑熱酒調下服此二藥旬日良愈

趙運使夫人年近六十三月間病臍腹冷痛相引脇下痛不可忍反復悶亂不得安卧乃先灸中庭穴在膻中下寸六分陷者中任脉氣所發灸五壯或二七三七壯次以當歸四逆湯以當歸尾七分炮附子官桂茴香柴胡各五分芍藥四分茯苓去皮胡川練子酒煑各三分澤瀉二分水煎溫服數服而愈

許學士治歙縣尉宋自甫膀胱氣作痛不可忍醫以剛劑與之痛益甚溲溺不通三日許視其脉曰投熱藥太過

適有五苓散一分爲三易其名用連鬚葱一莖苗香及鹽少許水一盞半煎七分連服之中夜下小便如黑汁一二升劑下覺得睡明日脉已平續用調砂丸數日愈蓋是疾本因虛得不宜驟進補藥邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實故先滌所蓄之邪然後補之本事方

滑伯仁治一婦病寒爲疝自臍下上至心皆脹滿攻痛而脇痕遽不進飲食脉兩手沈結不調此由寒在下焦宜亟攻其下毋攻其上爲灸章門氣海中脉服玄胡桂樧佐以滾木諸香快艾青皮等十日一服溫利九聚而散之也果效

一老人病臍腹疼痛醫爲溫中散寒辛無驗診之脉兩尺搏堅而沈曰此大寒由外入也寒喜中下故爲疝治宜在下加沈降之劑引入下焦數服尋愈

巴下七字衍文也

一人病氣發則臍下築築漸上至心下嘔涌痛憊筭足青喉中湟湟而痒眉本疼痠目不欲視頭不欲舉神昏昏欲睡而不寐惡食氣罩九控引小便數而短年未三十形脊若衰老人狀不自持診其脉沈弦而濇曰是得之憂欝憤怒寒濕風雨乘之爲肝疝也屬在厥陰故當脉所過處皆病焉厥陰肝也張從正云諸疝皆屬肝肝欲散急以辛散之遂以吳萸佐以薑桂及治氣引經藥兼製面陳等九十日以溫利之三月而愈

丹溪云予舊有甘橘積後因山行幾甚過橘芋食之橘動舊積芋復滯氣即時貼次早神思清氣至右丸腫大寒熱先服平胃散一二貼胃氣疎通經絡而愈

一人虛損潮熱腎偏墜小腸氣四物加小茴香吳萸胡蘆巴各五分枳子青皮山查漸愈

一人病後飲水病左丸痛甚灸太敦以摩腰膏摩囊上抵橫骨灸溫泉穴痛即止一宿腫亦消

汪石山治一人年二十餘因求中父立過勞病疝痛痛時腹中有塊起落如滾浪其痛尤甚診之脉皆細弦而緩按之似滑曰此血病也考之方書疝有七皆不宜下所治多是溫散之以氣言也茲宜變法治之乃用大承氣加桃仁二十枚而已曰已得之矣今以指探吐出令盡而痛解矣則弦大重則散滑屢之莫得其說魯食何物曰食雞蛋二枚而已

一小兒八歲癩疝陰囊腫脹核有大小汪令燒荔枝核灰苗香炒爲末等分食遠溫酒調服二錢不過三服

一兒六歲陰囊腫大如盞莖皮光腫如泡一醫爲之滲濕行氣不効汪診視脉皆濡緩曰脉緩無力者氣虛也經曰膀胱脫者津液之府氣化則能出焉氣虛不足無能運化而使之出矣宜升陽補氣可也遂以人參黃芪白朮茯苓半夏升麻陳皮甘草稍煎服一二貼囊皺腫消三

貼全愈

程比部羅雲公乃郎年十五歲疝痛何醫官按以蕃葱散四服而愈此童幼之年從積治

羅山人年四旬居憂怫鬱致胷膈凝聚月餘流於肋下漸下墜入陰囊不時作痛謁試諸方二年餘不効獨撿奇効良方聚香飲子一匕而豁然如失此七情所傷從氣治

祠部黃新陽公夙有脾泄便血脚痛六脉滑數曾用酒煮黃連爲君佐以參朮等而泄血止越二年餘患狐疝晝出囊中三夜卧入腹不時疼痛吳心所投以鬼潛丸還少丹而愈此始爲熱中又爲寒中藥物寒熱迥別而俱効久

病從虛治也

江少徵自患狐疝用八味地黃丸而痛止繼服打老兒丸而愈時年五十餘此衰弱之軀正氣旺而邪無所容矣

幾致殞殆羅診之六脉沈緩遂投竹茹温膽湯自午服一盞熱氣至心下而不至心上晡時一盞熱氣至臍下而不至臍上戌初又一盞熱氣不復上升矣次日早間以擣椰疎氣之藥調之太府遂通而愈

呂滄洲治一人病無睡睡則心悸神慌如愛孤壘而四面受敵達旦目睒々無所見聞雖堅卧密室虚牕未嘗交也諸醫罔効呂切其脉左關之陰浮而虚察其色少陰之支外溢於目皆即告之曰此得之膽虚而風諸公獨治其心而不祛其膽之風非法也因投禁方烏梅湯抱膽丸日服遂熟睡比寤病如失

汪石山治一女年十五病心悸常若有人捕之欲避而無所其母抱之于懷數婢護之於外猶恐恐然不能安寐醫者以為病心用安神丸鎮心丸四物湯不効汪診之脉皆細弱而緩曰此膽病也用温膽湯服之而安

多夢

錢丕少卿忽夜多惡夢徂就枕便成轉通夕不止後因赴官經漢上與鄧州推官胡用之遇同宿驛因言近多夢慮非吉胡曰昔掌如此懼甚有道士教戴丹砂初任辰州推官求得靈砂雙箭鏃者戴之不涉旬驗四十五年不復有夢至今秘惜因解髻中一絳紗囊遺之即夕無夢神魂安靜眞誥又他道書多載丹砂辟惡信然

宿述夢者因也書之所思夜之所夢至人無夢以其恬澹虛無少思寡慮何夢之有

羅謙甫治韓子玉父年踰六旬病消渴至冬添躁熱須裸袒以冰水噴胷腹乃快日食肉麪數四頓時即饑如此月餘羅診得脉沈細而疾羅以死決之子玉兄弟跪泣曰病固危篤君盡心救之則死而無恨羅曰夫消之爲病其名不一曰食亦消中曰宣疾此實染之所致也陽明化躁火津液不能停自汗小便數故飲一溲二胃熱則消穀善飢能食而瘦王叔和云多食亦饑盡是也此病仲景所謂春夏劇秋冬差時制故也令專令當差之時反劇乃腎水乾涸不能制其心火而獨旺於不勝之時經曰當所勝而不能制名曰眞強乃孤陽絶

陰者也且人之身爲主天令爲客此天令大寒尚不能
制其熱何藥能及內經主勝逆客勝從正以此也設從
君治療徒勞而已固辭而歸遂易醫與灸數日而卒
吳茭山治一老人年踰七十素有痰火過思鬱結固得消
中之患晝夜飲食無度時時常進則可若少頃缺食則
不安每服寒涼俱罔効人皆以年老患消中危之吳詮
其脉左寸關弦右寸關弦滑尺浮大府燥結吳疑之此
木腸移熱於胃胃火內消故善食而不發渴也斷曰消
中善食而飢肉削消脉虛無力者不治此痰火內消肌
色如故依法治之可生也遂用白虎湯倍入石膏服之
胃火漸平飲食漸減次以坎離丸養血四物湯調理二十

月而安

江汝潔治介塘程漣六脉舉指俱弦長重指俱大而略實
二尺盛於寸關經曰弦者陽也長者陽也實大皆陽也
又曰下堅上虛病在脾則知陽勝而陰虛足陽明太陰
俱有火邪是以土得火則燥厥生發之源失轉運之機
上焦不行下脘不通濁氣下流肌肉銷灼日久失療漸
成下消之候良醫弗爲也治須滋足陽明太陰之營氣
兼發散土中之火邪俾得以行乾健之運則陰陽升降
氣血調和也以甘草六分白芍二錢人參三錢升麻乾
葛各一錢半水煎服數劑而安

名醫類案卷之六