

30


20

10

0

JAPAN
TAMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19





名醫類案卷之十一

明新都華南江瓘集

長子應元校正

次子應宿述補

經水

太倉公治一丁女，病腰背痛，寒熱，衆醫皆以寒熱治。公診之，曰：內寒月事不下也。卽竄以藥旋下，病已。病得之，欲男，予不可得也。所以知其病者，診其脉，時切之，腎脉也。嗚而不屬腎，而不屬者，其來難堅故也。月不下，肝脉弦，出左戶，故曰：欲男子不可得也。蓋男子以精爲主，婦人以血爲主。男子精盛，則思室；女子血盛，則懷胎。夫肝損血，

者也厥陰弦出寸部又上魚際則陰血盛可知矣

東垣治丁夫人病寒熱月事不至者數年矣又加喘嗽醫

者悉以蛤蚧桂附等投之李曰不然夫人病陰爲陽所搏大忌溫劑以涼血和血之藥服自愈已而果然

一婦人年三十歲臨經預先臍腰痛甚則腹中亦痛經有二三日以柴胡錢半羗活一錢丁香四分蝎一個當歸身一錢牛地一錢都作一服水一盞煎至一盞去渣食前稍熱服

一婦年三十餘因每洗浴後必用冷水淋通身又嘗大驚遂患經來時必先小腹大痛口吐涎水經行後又吐水三日其痛又值至六七日經水止時方佳百藥不効診

其脉寸滑大而弦關尺皆弦大急尺小於關關小于寸所謂前大後小也遂用香附三兩半夏二兩茯苓黃芩各一兩半枳實玄胡索牡丹皮人參當歸白朮桃仁各一兩黃連七錢川練遠志甘草各半兩桂參錢吳茱萸錢半分十五貼入薑汁兩錢殼熱服之後用熱湯洗浴得微汗乃已忌當風坐卧手足見水并哭生冷服三十貼後全愈半年因驚憂其病復舉腰腹時痛小便淋痛心惕惕驚悸意其表已解病獨在裏先爲灸少冲營宮嵐俞三陰交止悸定痛次用桃仁承氣湯太下之下後用醋香附三兩醋蓬术當歸身各一兩半醋三稜玄胡索醋大黃醋青皮青朮香茴香滑石木通桃仁各一兩

鳥藥甘草砂仁檳榔苦練各半兩木香吳茱萸各一錢分作二十貼入新取牛膝濕者二錢生薑五片用荷葉湯煎服愈

一婦頭痛口乾經行後身痛腰甚痛以生地黃一錢白米芍藥各一錢川芎歸身尾各五分炒柏炭甘草各三分一婦年二十餘經閉_年一年食少乏力以黃連一錢白米錢半陳皮滑石各一錢黃芩五分木通三分桃仁十個炙甘草少許

滑伯仁治一婦年三十每經水將來三五日前脣下病痛如刀刺狀寒熱交作下如黑豆汁既而水下因之無娠脉二尺沈濇欲絕餘部皆弦急曰此由下焦寒濕邪氣

搏于衝任衝爲血海任主胞胎爲血室故經事將來邪與血爭而作病痛寒氣生濁下如豆汁宜治下焦遂以辛散苦溫理血藥爲劑令先經期十日服之凡三次而邪去經調是年有孕

呂滄洲治一女在室病不月諸醫療皆不得其狀視之腹大如姪求其色脉卽怪語之曰汝病非有異夢則鬼靈所憑耳女不答趨入卧内密語其侍嫗曰我去夏追涼廟廡下薄暮過木神心動是夕夢一男子如暮間所見者卽我寢親狎由是感病我慚赧不敢以告人醫言是也嫗以告呂呂曰女面色正赤乍白者愧也脉乍大乍小者祟也病因與色脉符雖劇無苦乃以桃仁煎下血

類豚肝者六七枚俱有竅如魚目病已

汪右山治一婦年踰三十無子診視其脉近和惟尺部覺洪滑耳曰子宮有熱血海不固也其失曰然每行人道經水卽來乃喻以丹溪木補丸加山茱萸白龍骨止瀉之藥以治其內再以亂髮灰白攀灰黃連五倍子爲末以治其隱廁果愈且勿予

丹溪治一婦年二十歲兩月經不行忽行小腹痛有塊血紫色以白芍白术陳皮各五錢黃芩川芎木通各二錢炙甘草少許

一婦氣滯血淤脉不適經不調或前或後紫色苦兩太脹外廉麻木有時痒生瘡大便秘滯以麻子仁桃仁去皮

尖芍藥各二兩生枳殼白术歸頭歲靈仙訶子肉牛地陳皮各五錢木黃煅七錢爲末粥丸

一婦年四十八歲因有白帶口渴月經多初來血黑色後來血淡倦怠食少臍上急以白术錢半紅花豆大陳皮白芍各一錢木通枳殼各五分黃芩砂仁炙甘草各三分共九味煎湯下保和丸三十粒抑青丸二十粒

一婦年十五脉弦而大不數形肥初夏時倦怠月經來時多此稟受弱氣不足攜血也以白术錢半生芪陳皮各一錢人參五錢炒柏三分

一婦年四十餘月經不調行時腹疼行後又有三四日淋瀝皆鐵不可渴面黃倦怠無力以白术一兩歸身尾六

錢陳皮一錢黃連三錢木通二錢牛膝黃芩各二錢炙甘草一錢分作八貼下五靈脂丸四十粒食前
一婦月經不勻血紫色來作痛倦怠惡寒爲人性急以青皮五分川芎黃芩牡丹皮茯苓各一錢乾薑一錢炙甘草五分

一婦年二十歲月事不勻來時先腹隱疼血紫色食少無力以白术四錢黃連陳皮各一錢半牡丹皮二錢木通黃芩人參茱萸各錢半炙甘草五分分作四貼水二盞煎取小盞食前服

一婦年二十餘形肥痞塞不食每日卧至未飲薄粥一盞粥後必吐水半碗仍復卧經不通三月矣前番通時黑

色脉沉時寸滑皆有力午後關滑寸則否詢之因乘怒飲食而然遂以白术兩半厚朴黃連枳實各一兩半夏茯苓陳皮山楂人參滑石各八錢砂仁香附桃仁各半兩紅花二錢分作十貼每日服一貼各入薑汁二錢數間三日以神祐丸神祕沈香丸微下之至十一日吐止食漸進四十日平復如故

一婦年五十餘形瘦亦痞不食吐水經不通以前藥方加參术歸爲君煎熟入竹瀝半盞薑汁服之但不用神祐丸下之亦平復或咳嗽寒熱而經閉者當于效門濕痰條求之

子和治一婦人月事不行寒熱往來口乾頰赤喜飲旦暮

醫學綱目

間咬一二聲諸醫皆用蜜蠍水蛭乾漆硇砂芒青紅娘子沒藥血竭之類子和不然曰古方雖有此法柰病人服之必躋腹發痛飲食不進乃命止藥飲食稍進內經曰二陽之病發心脾心受之則血不流故不月也既心受積熱宜抑火升水流濕潤燥開胃進食乃涌出痰一升下泄五六行濕水上下皆去血氣自然周流月事不爲水濕所隔自依期而至矣不用蜜蠍水蛭有毒之藥如用之則月經縱來小便反閉他證生矣凡精血不足宜補之以食大忌有毒之藥偏勝而成夭閼一婦人年三十餘經水不行寒熱往來面色痿黃唇焦頰赤時咬三兩聲向者所服之藥黑神散烏金丸四物湯

燒肝散鼈甲散建中湯寧脉散針艾百計轉廬家人意倦不欲求治子和憫之先涌痰五六升午前湧畢午後食進餘症悉除後三日復輕涌之又去痰一二升食益進不數日又下通經散瀉訖一二升後數日去死皮數重小者如麩片大者如葦膜不一月經水行神氣清健吳茭山治一婦行經時著氣惱經過半月後得心腹腰脹痛不可忍醫作氣治以香燥止痛之劑服之愈不安診其脉弦急不勺早間行經著惱乃瘀血作痛也遂以四物入桃仁紅花延胡索莪朶青皮之類數服血通其患已矣

一女子經水過多行後復行面色痿黃人倦無力遂以歸

身炒芍熟地川芎荆芥續斷煨乾薑炙甘草數服而安
一婦經事欲行臍腹絞痛臨行血虛以四物入延胡索檳榔青皮香附子之類數服痛除

一婦行經色淡若黃漿心腹嘈雜此脾胃濕痰故也以二陳湯合四物入細辛蒼朮數服即止

一女子經水下如黑豆汁此絡中風熱也以四物加黃芩川連荆芥穗蔓荆子數服血清色轉

一婦經來適斷寒熱往來以小柴胡湯二服寒熱即止繼以四物湯數服而安

一婦經血過多得五心煩熱日晡潮熱諸藥不効以四物加胡黃連三服而愈

俞子容治一婦寡居鬱結成疾經事不行體熱如火忽吐血若泉湧醫用止血藥不効俞以菊花根搗汁濃磨沈香服至五錢許日以釀醋貯瓶內火上炙熱氣冲兩鼻孔血始得降下吐血不復作經事乃行

莫強中一侍人久病經阻發熱咳嗽倦怠不食憔悴骨立醫往往作瘵疾治之勢甚危莫曰婦人以血爲本血榮自然有生理因謝衆醫專服四物湯其法㕮咀每慢火煮取清汁帶熱以啜之空腹日三回服兩月餘經通疾如失

潘璵字溫叟名醫也診屯由郎中張謹妻年四十餘而天癸不至潘察其脉曰明年血潰廻死旣而果然

石山治一婦瘦小年二十餘經水紫色或前或後臨行腹痛惡寒喜熱或時感寒腹亦作痛脉皆細濡近滑兩尺重按略洪而滑汪曰血熱也或謂惡寒如此何謂爲熱曰極熱似寒也遂用酒煮黃連四兩香附歸身尾各二兩五靈脂一兩爲末粥丸空腹吞之而愈

一婦經行必渴三日然後行診其脉皆濡弱曰此脾虛也脾屬血屬濕經水將動脾血已先流注血海然後下流爲經脾血既虧則虛而不能運行其濕令作參苓白朮散每服一錢一日米飲調下二三次月餘經行不渴矣一婦產後經行不止或紅或白或淡病踰八月面色黃白性躁頭眩脚軟醫用參芪補藥病益加用止瀉藥不効

汪諺之右脈濡弱無力左脉略洪而駛曰右脉弱者非病也左脉偏盛遂覺右脉弱耳宜主右脉治以涼血之劑遂以生地白芍白朮各一錢黃芩阿膠歸身各八分陳皮香附川芎椿根皮茯苓各六分柴胡甘草各五分煎服二十餘劑而愈

一婦年逾四十形長色脆病經不調右脉浮軟而大左脉虛軟而小近駛掌時經前作泄今年四月感風咳嗽用湯洗浴許多因泄一月六月復因洗浴發瘡六七次瘡雖止而神思不爽至八月盡而經水過多白帶時下瀉泄遂覺右脚疼痛舊曾閃肭脚跟今則假此延痛臂腿腰脇尻骨脛項右邊筋皆掣痛或咳嗽一聲則腰眼痛

如腰扎日輕夜重叫號不已。幸痛稍止飲食如常今詳月永過多白帶時下日輕夜重瀉泄無時亦屬下多亡陰宜作血虛論治服四物止痛之劑益甚九月汪復診視始悟此病乃合仲景所謂陽生則陰長之法矣夫經水多白帶下常瀉泄皆由陽虛陷下而然命曰陽脫是也日輕夜重蓋日陽旺而得健運之職故血亦無凝滯之患而日故輕也夜則陰旺而陽不得其任失其健運之常血亦隨滯故夜重也遂以參术助陽之藥煎服五七貼痛減此亦病症之變治法殊常故記之

一婦年二十一歲六月經行腹痛如刮難忍求死脉得細軟而駛尺則沈弱而近駛汪曰細軟屬濕數則爲熱尺

沈屬鬱滯也以酒煮黃連半斤炒香附六兩五靈脂半炒半生三兩歸身尾二兩爲末粥丸空心湯下三四錢服至五六料越九年得子又越四年經行兩月不斷腹中微痛又服前丸而愈續後經行六七日經止則流清水腹中微痛又服前丸而痛亦止又經住只有七八日若至行時或太行五六日續則適來適斷或微紅或淡紅行後掌流清水小腹大痛漸連遍身胷背腰腿骨裏皆痛自己至酉乃止痛則遍身冷熱汗大出汗止痛減尚能飲食自始痛至今歷十五年前藥屢服屢效今罔効者何也汪復診之脉皆洪滑無力華其尚有精神汪曰此非舊日比矣舊乃鬱熱今則虛寒東垣曰始爲

熱中終爲寒中是也經曰脉至而從按之不鼓乃陰盛格陽當作寒治且始病時而形斂小全則形肥大矣醫書曰瘦人血熱肥人氣虛豈可同治耶所可慮者汙大泄而脉不爲汙衰血大崩而脉不爲血減耳其痛日重夜輕知由陽虛不能健運故亦凝滯而作痛以症衆脈宜用助陽若得脉減痛輕方爲佳兆遂投參芪歸朮太劑加桂附一貼來早再診脉皆稍寧服至二三十貼時當二月至五月病且愈蓋病有始終寒熱之異藥有前後用舍不同形有肥瘦壯少不等豈可以一方而通治哉

丁婦年逾四十七形色頗實常患產難倒生經水不調或時

遍身骨節疼痛食少倦怠自汗汪診之兩手脉皆不應惟右關輕按隱隱然微覺動也凝脉出部以指尋按經渠列鈕穴亦不應甚怪之乃叩其夫曰有孕時醫診亦言無脉後服入物湯華爾易產而得丁子汪曰此由稟賦本來脉不應也無足怪可見天下事變出無窮果難一一以常理測也如脉經所謂但道其常而已兩手無脉不復其生又不妨于胎孕豈脉經所能盡耶脉或兩手出部或一手出部見之多矣兩手無脉而人故如此亦理之所無事之太變故記之

丁婦有病汪診之右脉緩濡而弱左手無脉再三尋之動于腕臂外廉陽谿偏歷之分乃語之曰左脉離其部位

其病難以脉知以右脉言之似屬于脾胃不足也尚當
言其病焉告曰每遇經末行前咯血數口心嘈不妥食
少懶倦汪以四君子加山梔陳皮麥冬牡丹皮煎服數
貼而安

薛已治一婦人發熱口乾月經不調兩腿無力服祛風滲
濕之劑腿痛體倦二膝浮腫經事不通薛作肝脾腎三
經血虛火燥症名鶴膝風用六味八味二丸兼服兩月
形體漸健飲食漸進膝腫漸消不半載而痊前症若脾
腎虛寒腿足軟痛或足膝枯細用八味丸若飲食過多
腿足或脣內癰脹或浮腫作痛用補中益氣加茯苓半
夏主之

一婦人經候過期發熱倦怠或用四物黃連之類反兩月
一慶且少而成塊又用峻藥通之兩目如帛所蔽薛曰
脾爲諸陰之首目爲血脉之宗此脾傷五藏皆爲失所
不能歸于目矣遂用補中益氣濟生歸脾二湯專主脾
胃年餘尋愈

一婦人兩鬚稜痛後及太陽面青善怒薛作膽經風熱用
選奇湯合逍遙散加山梔天麻黃芪半夏黃芩而愈此
症失治多致傷目或兩耳出膿危矣

一婦人年四十素性急先因飲食難化月經不調服理氣
化痰藥反肚腹膨脹大便泄瀉又加烏藥蓬朮肚腹脹
脹小便不利加猪苓澤瀉痰喘氣急手足厥冷頭面肢

體腫脹身中生火指按成竈脉沈細右寸爲甚薄曰此脾胃之氣虛寒不能通調水道下輸膀胱滲泄之令不行化生之氣不運卽東垣所云水飲留積若土之在兩中則爲泥矣得和風暖自水濕去而陽化自然萬物生長喜其脉相應遂與金匱加減腎氣丸料服之小便卽通數劑腫脹消半四肢漸溫自能轉側又與六君加木香肉桂炮薑治之全愈後不戒七情飲食卽爲泄瀉仍用前藥加香附子五分而安

一婦人素有頭暈不時而作月經遲而少薛以中氣虛不能上升元升而頭暈不能下化而經少用補中益氣湯而愈後因勞而仆月經如湧此勞傷火動用前湯加五味子

一劑服之卽愈前症雖云士血過多氣無所附實因脾氣虧損耳

一婦人年四十勞則足跟熱痛薛以陰血虛極急用聖愈湯而痊後遍身搔痒誤服風藥發熱抽搐肝脉洪數此乃肝蒙血虛火盛而生風以天竺膽星爲丸用四物麥冬五味芩連炙草山梔柴胡煎送而愈

一婦人兩足發熱日晡益甚小便自遺或時下利薛以爲肝熱陰挺不能約至午前用白朮茯苓丹皮澤瀉各五分乾山藥山茱麥冬各一錢熟地四錢酒炒黑棗柏七分知母五分不數劑而諸症悉愈若用分利之劑愈損真陰必致不起

一婦人月事未期而至發熱自汗服清熱止汗之劑反作
頭痛手掉身麻此因肝經風熱用柴胡炒參連炒山
梔歸芍生地丹皮各一錢參芪各一錢五分川芎
七分甘草五分二劑其汗全止更以補中益氣而愈凡
發熱久者陽氣亦自病須調補之

一婦人經行後勞後失調忽然昏憒面赤吐痰此元氣虛
火妄動急飲童便神思漸爽更用參芪各五錢芎歸各
三錢玄參柴胡山梔炙甘草各一錢一劑又用逍遙散
加五味麥冬稍定但體倦面黃此脾土真虛之色也又
以十全大補加五味麥冬治之而愈若投以發散之劑
禍在反掌慎之

一婦人多怒經行或數日或半月卽止三年後淋瀝無期
肌體倦瘦口乾內熱盜汗如洗日晡熱甚用參芪歸木
茯神遠志棗仁麥冬五味丹皮龍眼肉炙草柴胡升麻
治之獲愈此症先因怒動肝火血熱妄行後乃脾氣下
陷不能攝血歸源故用前藥若胃熱無津液而經不行
宜清胃若心火尤甚者宜清心若服燥藥過多者宜養
血若病久氣血衰宜健脾胃

一婦性善怒產後脣腫內熱用清熱敗毒唇白腫脹日晡
熱甚月水不調用降火化瘀食少作嘔大便不實脣出
血水用理氣消導胃膈痞滿頭目不清脣腫經閉用清
胃行血肢體倦怠發熱煩躁涎水湧出欲用通經之劑

薛曰病本七情肝脾虧損數行攻伐元氣益虛故耳法富補陰益陽遂以加味歸脾湯加味逍遙散補中益氣湯如法調治元氣漸復唇瘡亦愈後因怒寒熱耳痛脣脹悶唇焮腫甚此是怒動肝火而血傷遂用四物合小柴胡加山梔頭愈後又怒脇乳作脹肚腹作痛嘔吐酸涎飲食不入小水不利此是怒動肝木克脾土乃用補脾氣養肝血而愈又因勞後怒氣飲食失時發熱喘渴體倦不食去血如崩脣腫熾甚此是肝經有火脾經氣虛遂用補中益氣加炒黑山梔芍藥丹皮而愈此症每見但治其瘡不固其本而死者多矣

一婦人停食飽悶發熱或用入參養胃湯益甚再用木香

檳榔丸泄瀉吐痰腹中成塊飲食少思又用二陳薰連厚朴之類前症益甚腹脹不食月經不至中氣虧損用補中益氣加茯苓半夏三十餘劑脾胃健而諸症愈又二十餘劑而經自行前症若脾虛不能消化飲食者宜用六君子湯補而消之虛寒者加砂仁木香炮薑溫而補之其食積成形者以前藥煎下保和丸大抵食積痞塊症爲有形所謂邪氣勝則實真氣奪則虛惟當養正鬪邪而積自除矣雖然堅者削之客者除之胃氣未虛或可少用若病久虛乏者則不宜用

一婦人飲食後或腹脹或吞酸服枳术丸吞酸益甚飲食日少晝膈痞滿腿內酸痛畏見風寒又服養胃湯一劑

腿內作痛，又二劑，腿浮腫，月經不行，此鬱結所傷脾虛，濕熱便晨用四君芎歸二陳，午後以前湯送越鞠丸飲食漸進，諸症漸愈，又用歸脾八珍二湯兼服兩月餘而經行。

一婦人月經不調，晡熱內熱，飲食少，思肌體消瘦，小便頻數，服濟陰丸，月經不行，四肢浮腫，小便不通，曰此血分也，朝用椒仁丸，夕用歸脾湯漸愈，乃以人參丸代椒仁丸，兩月餘將愈，專用歸脾湯五十餘劑而痊。

一癰婦月經不調，小便短少，或用清熱分利之劑，小便不利，三月餘，身面浮腫，月經不通，曰此水分也，遂朝用葶苈丸，夕用歸脾湯漸愈，乃用人參丸間服而愈，已上二

日作脾虛，水氣用分利等藥而沒者多矣。

一婦內熱，作渴，飲食少，思腹內近左，初如鷄卵，漸大四寸許，經水三月，一至肢體消瘦，齒頰似瘡，脈洪數，而虛左關尤甚，此肝脾鬱結之症，外貼阿魏膏，午前用補中益氣湯，午後以加味歸脾湯，兩月許，肝火少退，脾土少健，仍與前湯，送下六味地黃丸，午後又用逍遙散送歸脾丸，又月餘日，用蘆薈丸，二服空腹以逍遙散，下日晡，以歸脾湯，下其謹疾，調理年餘而愈。

一婦人腹內一塊，不時上攻，或痛，作聲，吞酸痞悶，月經不調，小溲不利，二年餘矣，面色青黃，此肝脾氣滯，以六君子加芍，歸柴胡炒連木香吳茱各少許，二劑却與歸脾

湯下蘆薈丸三月餘肝脾和而諸症退又與調中益氣加茯苓牡丹皮中氣健而經自調

熱入血室

許學士治一婦病傷寒發寒熱遇夜則如見鬼狀方經六七日忽然昏塞涎響如引鋸牙關緊急瞑目不知人病勢危困許視之曰得病之初曾值月經來否其家云經水方來病作而經遂止得一二日發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從日昨不省人事許曰此乃熱入血室症仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則明了暮則譖語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者不曉以剛劑與之遂致腎膈不利涎潮上脫喘息息高昏冒不知人當先化其痰後除其熱乃急以一呻散投之兩時頃涎下得睡省人事次授以小柴胡湯加生地三服而熱除不

汗而自解矣

一婦人患熱入血室，症醫者不識，用補血調氣藥治之數日遂成血結胷，或勸用前藥，許公曰：小柴胡已遲不可行也。無已，刺期門穴，斯可矣。予不能針，請善鍼者治之，如言而愈。或問：熱入血室何爲而成結胷也？許公曰：邪氣傳入經絡，與正氣相搏，上下流行，遇經水適來，適斷邪氣，乘虛入于血室，益爲邪所迫，上入肝經，肝受邪，則讒語而見鬼復入膻中，則血結于胷中矣。何以言之？婦人平居水養木，血養肝，方未受孕，則下行之爲月水；既孕，則中畜之以養胎，及已產，則上壅之以爲乳，皆血也。今邪逐血，併歸于肝經，聚于膻中，結于乳下，故手觸之，則

痛非藥可及，故當刺期門也。

虞慎德治一少婦，夏月行經，得傷寒，似瘧，譖語狂亂，諸醫皆以傷寒內熱投雙解散，解毒湯，服之大汗如雨，反如風狀，次以牛黃丸金石之藥愈，投愈劇，一日延虞診視，脉弦而大，虞思：傷寒內熱，狂亂六陽俱病，豈不口乾舌黑，况脉不數，病體捫之，或熱或靜，其腹急痛，意必有內傷，在前傷寒在後，今傷寒得汗，雖已內傷，則尚存故也。因細問之，患者曰：正行經時，因飲食後，多汗，用冷水抹身，因得此症，方如冷水外閉其汗，內阻其血，邪熱入室，經血未盡，血得邪熱乍靜乍亂，寒熱譖語掉眩，類風癩，得玉燭散下之而愈，下後譖語已定，次以四物小柴胡

湯調理五時熱退身涼其患遂瘳

衍義云一婦人溫病已十二日診之其脉六七至而濶寸
稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病數
日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必
死乃按其症與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加
桂乾薑一日寒熱遂止又云臍下急痛又與抵當丸微
利臍下痛痊身漸涼脉漸勻尚不了了乃復與小柴胡
利次日心下痛又與太陷胃湯半服利三行次日虛煩
不寧時妄有所見復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛
不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至晚

薛立齋治一婦人經行感冒風寒日間安靜至夜譫語用
小柴胡加生地治之頓安但內熱頭暈用補中益氣加
蔓荆子而愈後因憤怒寒熱譫語冒脣脹痛小便頻數
月經先期此是肝火血熱妄行用加味逍遙散加生地而
愈

一婦人因怒寒熱頭痛譫語日晡至夜益甚而經暴至蓋
肝藏血此怒動火而血妄行用加味道逍遙散加生地治

乏神思頓清但食少體倦月經未已蓋脾胃統血此脾氣虛不能攝血用補中益氣治之月經漸止

一婦人懷抱素鬱感冒經行譖語服發散之劑不應用寒涼降火前症益甚更加月經不正肚腹作痛嘔吐不食痰涎自出此脾胃虛寒用香砂六君脾胃漸健諸症漸退又用歸脾湯而全愈

江應宿治西村金氏婦年二十一歲五月中患熱病發熱頭痛渴欲飲冷六脉緊數經行譖語用小柴胡湯病家疑病人素壯健藥有入參未敢服過三日病轉劇腹痛急脹已經八九日不更衣仍以小柴胡加大黃四錢利去黑糞熱退身涼而愈

龍虎

東垣治一婦時冬患暴崩不止先因損身失血自後一次縮十日而來其後暴崩不止其人心窄性急多驚必因心氣不足飲食不節得之診得掌中脈沈細而緩間帶數九竅微不利四肢無力上喘氣短促不調果有心氣不足脾胃虛弱之症胃脘當心而痛左脇下縮急當脰有動氣腹中鳴下氣大便難虛證極多且先治其本除症可安心定志鎮墜其驚調和脾胃大益元氣補益養神以太熱之劑去其寒凝在皮膚少加生地去命門相火不令四肢痿弱以黃連二分生地三分炒曲陳皮桂枝各五分草豆蔻仁六分黃芪人參麻黃帶肺各

一錢當歸一錢五分杏仁五個另研一服而愈胃脘痛者客寒犯胃也以草豆蔻九十五丸痛立止并與肝之積藥以除其根遂愈

一婦人血崩不止以當歸蓮花心白綿子紅花茱萸各一兩剉細以白皮紙裹定泥固燒存性爲末加血竭爲引用酒下不正加輕粉一錢又不正加射干爲引酒下遂止

一婦患崩漏醫莫能効數其症有四十餘種以調經升麻除濕湯治之愈湯見醫學集成

丹溪治一婦三十餘歲墮胎後血不正食少中滿倦怠煩躁脉沈大而數重取微弦作怒氣傷肝感動胃氣以二

陳湯加川芎白朮砂仁二十貼安

王汝言治一婦患胎漏忽血崩甚葷去服童便而醒血頓復葷急服荆芥隨醒隨葷服止血止葷之藥不効忽又嘔吐王以其童便藥汁滿于胃膈也卽以手探吐之未後吐出飲食及菜碗許詢之曰適後飯後着惱少頃遂崩不止因悟曰因飽食胃氣不行故崩甚血既大崩胃氣益虛而不能運化宜乎崩葷不正而血藥無効也急用調理脾胃遂用白朮五錢陳皮麥芽各二錢煎一服葷止再服崩止遂專理脾胃藥服十數服胃氣始完後加血藥服之而安若不審其食滯而專用血崩血葷之藥豈不誤哉

一婦年踰五十血崩久不止諸藥不効以豫斗蒼耳草根
二物燒存性用四物湯加白芷芍花乾薑煎湯調服其
經血自此而止再不行矣

予和治一婦年五十餘血崩一載僉用澤蘭丸黑神散保
安丸白薇散補之不効戴人曰天癸已盡本不當下血
蓋血得熱而流散非寒也夫女子血崩多因大悲哭悲
哭過甚則肺熱而心系爲之急血不禁而下崩內經曰
陰虛陽搏謂之崩陰脉不足陽脉有餘數則內崩血乃
下流舉世以虛損治之莫有知其非者可服火齊火齊
者黃連解毒湯是也次以棟香附子二兩炒白芍藥二
兩倍當歸一兩炮三味同爲細末水調下又服檳榔丸

不自日安

一老婦血崩不止涓涓不絕滿床皆血伏枕三月矣腹滿
如孕作虛挾瘀積汚血治之用四物四兩參术各一兩
甘草五錢以治虛香附三兩半夏半兩茯苓陳皮枳實
宿砂玄胡各一兩以破瘀積汚血分二十貼每貼煎乾
荷葉側柏葉湯再煎服之服盡良愈不復發

汪右山治一婦年踰四十形色蒼紫忽病血崩醫者或用
涼血或用止瀉俱罔効診其六脉皆沈濶而緩按之無
力以脉論之乃氣病非血病也當用甘溫之劑健脾理
胃庶幾胃氣上騰血循經絡無復崩矣遂用補中益氣
湯多加參芪兼服參芩白朮散崩果愈

一婦身瘦面黃舊有白帶產後憂勞經水不止五旬餘間或帶下心口熱上身麻下身冷背心脹口鼻乾額角冷小便頻而多大便溏而少食則嘔吐素厭肉味以書來問汪曰雖未見詳其所示多屬脾胃不足令服四君子湯加黃芩炒陳皮神曲歸身二貼紅芷白減繼服十餘劑諸症悉除

江汝潔治葉廷傑之內十月病眼若合卽麻痺甚至不敢睡屢易醫漸成崩疾江診得左手三部舉之略弦按之略大而無力右手三部舉按俱大而無力經曰血虛脉大如葱管又曰大而無力爲血虛又曰諸弦爲飲又曰弦爲勞據脉觀症蓋由氣血俱虛以致氣不調運而成

麻痺時醫不悟而作火治藥用寒涼過多損傷脾胃陽氣失陷而盛崩矣以歲運言之今歲天衝主運風木在泉兩水符合木盛而脾土受虧是以半陷而行秋冬之令以時候言之小雪至大雪之未亦十日有奇太陽寒水主令厥陰風木客氣加臨其上木火勝矣經曰甚則勝而不復也其脾大虛安得血不大下乎且脾裏血脾虛則血不歸經而妄下矣法當大補脾經爲先次宜補氣祛濕可得漸愈矣以人參三錢黃芪二錢甘草四分防風荆芥白朮各一錢陳皮八分水煎食遠服二劑分作三服不數劑而安

薛已治一婦人久患血崩肢體消瘦飲食到口但聞腥臊

口出津液，強食少許，腹中作脹，此血枯之症，肺肝脾胃虧損之患，用八珍湯、烏賊魚骨圓，兼服兩月，而經行百餘劑，而康寧如舊矣。

一婦人面黃或赤，時覺腰間或臍下作痛，四肢困倦，煩熱不安，其經若行先發寒熱，兩肋如束，其血如崩，此脾胃虧損，元氣下陷，與相火濕熱所致，用補中益氣加防風芍藥炒黑，黃柏，間以歸脾湯，調補化源，血自歸經矣。一婦年五十歲，辛壬患崩，諸藥罔効，壬寅八月，身熱肢痛，頭暉涕出，吐痰少食，衆作火治，轉熾絕粒，數日淹淹，伏枕僅存呼吸，薛診之謂脾虛虛寒，用八味丸料一劑，使急煎服，然胃虛久始下咽，翌早遂索粥數匙，再劑食倍。

熱減痛止，兼服八味丸，良愈。

歸大化之內，患月事不期崩血，昏憤發熱，不寐，或謂血熱，妄行投以寒劑益甚，或謂胎成受傷，投以止血亦不效，乃延薛診之，曰此脾虛氣弱，無以統攝，故耳，法當補胃而血自止矣，用補中益氣加炮薑不數劑而効，惟終夜少睡，驚悸，另服八物湯，更不効，復叩諸先生，曰襍矣，乃與歸脾湯加炮薑以補心脾，遂如初。

西園公不知何郡人，曾治一婦人，年六十上一歲，患血崩不止，以黃連解毒湯四貼後，服涼膈散合四物六貼，即愈。此婦因悲哀太過，則心悶急，肺布葉舉而上焦不通，熱氣在中，血走而崩，故効。

醫鑑

江鑑南治一婦血崩兩月餘服諸寒涼止血之藥不効且
痰喘乃以人參黃芪各五錢防風麥冬各一錢更加荆
芥總升麻五味附子一服喘崩減半二服減十之八繼
以豁痰調經之劑治之愈

江應宿治崑山顧氏年四十餘患崩漏兩月餘形瘦唇白
診得氣口緊實乃食傷太陰中焦氣鬱阻滯而然化食
行滯乃愈

龔水部宜人年四十餘患崩漏泄瀉發熱頭痛盜汗自汗
倦怠羸瘦已踰二年醫藥無功遂予診視六脉浮滑弦
數重按豁然無力此氣血俱虛元氣下陷脾虛不能攝
血歸源內虛寒而外假熱投補中益氣人參三錢黃芪

五錢蜜加炮薑蔓荆子川芎蒲黃阿膠數劑汗與頭痛
俱止五十餘劑良愈

東垣治一婦白帶常下久矣諸藥不効診得心胞尺脉極微白帶尋流而不止叔和八裏脉微脈經云崩中日久爲白帶漏下多時骨木枯言崩中者始病血崩不已久下則血少復亡其陽故白滑之物下流不止是本經血海將枯津液復亡枯乾不能滋養筋骨以本部行經藥爲引用爲使以太甘油膩之藥潤其枯燥而滋益津液以太辛熱之氣味補其陽道生其血以苦寒之藥泄其肺而收其上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥爲佐而益元氣名曰補經固貞湯其方柴胡根一錢炙甘草一錢乾薑細末三錢陳皮二錢人參二錢白葵花七箇

剪碎郁李仁去皮尖另研如泥一錢同煎生黃芩一錢另入右件除黃芩外以水二盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至一盞空心帶熱服之候少時早膳壓之一服而愈

韓飛霞治一婦年三十餘十八胎九癆八夭又驚憂過甚遂昏不省人事口瘡舌皆瘡或至對喉下部虛脫白帶如注如此四十餘日或時少醒至欲自縊悲不能堪醫或投涼劑解其上則下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥薰蒸其下則熱暈欲絕韓診之曰此亡陽症也急以鹽煮大附子九錢爲君制以薄荷防風佐以薑桂芎歸之屬水煎入井水冷與之未盡劑鼾鼻熟睡通宵覺卽能

識入衆詰其獲効之故。韓曰：方書有之，假對假耳，上乃假熱，故以假冷之藥從之下，乃真冷，故以真熱之藥反之。斯上下和而病解矣。繼後主以女金丹錯綜以二三方，不但去疾且調元氣。後生二子，所謂女金丹卽勝金丸也。得之異人倍加香附而視氣血之偏者，又加薑黃條芩倍川芎之屬，取効甚多。

此披治病有法用藥有權可謂知通變者也。韓氏醫通。

溪治一老婦患赤白帶，一年半只是頭暈坐立不_安睡之則安，專治帶愈，其眩自止。

老婦好濕麪，至此時得帶下病，亦惡寒，淋瀝，醫與荷花

鬚等藥發熱所下愈甚。又與砂仁、荳蔻藥以其食少也。
腹脹滿氣喘，又與葶苈不應。又與禹餘糧丸增劇，又與崇土散，脉兩手洪濶輕則弦長，而滑實至是喘甚，不得不卧。此是濕麪釀成濕在足太陰陽明二經，水穀之氣爲濕所抑不得上升，遂成帶下淋瀝，理用升舉之劑以補氣和血，次之而工。反與燥濕宜其輒轉成病，遂與人參、生肺之陰以拒火毒，白朮以補胃氣，除濕熱行水道，桃仁去污生新，郁李行積水，以通草佐之，星角解食毒，消腫滿，檳榔治最高之氣，作濃湯調下保和丸，又以素參養，有肉積加阿魏小丸同煎之，四五日後氣漸消，腫漸下，又加補腎丸以生腎水之真陰，漸有向安之勢，得睡食有味乃加與點丸驅逐肺家積熱而愈。

子和治一婦病帶下連綿不絕已三年矣診其兩手脉俱滑大而有力約六七至當上熱痰飲敗運時嘔酢水知其實有寒痰在胃中以瓜蒂散吐訖冷痰二三升皆酢水也間如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水丸攻以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其小便數日而愈

一婦病白帶下如水窈漏中綿占不絕穢臭之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷用石硫黃薑附之藥重重燥補汚水轉多戴斷之曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水不禁固故如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃漏瘀水二三升次日下污水十餘行二次

汗出周身自明旦病人云汚已不下矣次用寒涼之劑服及半載產一子

吳茭山治一婦人久患白帶瘦削無力倦怠欲睡腰痠腿痛飲食無味面黃日晡煩熱小便淋瀝以歸身茯苓各一錢炒芍藥地骨皮白朮川芎人參各八分黃芩鹿角膠各一錢其膠若濕者入五茶匙炙甘草熟地黃車前子各五分棗二枚入水煎服數服而愈後治數婦皆驗程明祐治一婦病帶下不止醫投調經劑血愈下復投寒涼藥遂下泄肌肉如削不能言四肢厥逆程診其脉細如絲曰陽氣微而不能營陰法當溫補陽生則陰長而血不下漏遂以人參二兩附子三片濃煎一服手足微

卷之十一
二十一
溫再服，思食繼服，八珍四十劑愈。

薛立齋治一婦人年踰六十內熱口乾勞則頭暉吐痰帶下或用化痰行氣前症益甚飲食愈少肢體或麻恪服祛風化痰散肢體常麻手足或冷或熱日漸消瘦薛曰症屬脾氣虛弱而不能生肺祛風之劑復損諸經也當滋化源遂用補中益氣加茯苓半夏炮薑二十餘劑脾氣漸復飲食漸加諸症頓愈。

一婦婦腹脹脇痛內熱晡熱月經不調肢體痠麻不時吐痰或用清氣化痰喉間不利帶下青黃腹脹脹用行氣之劑胃膈不利肢體時麻此鬱怒傷損肝脾前藥益甚也朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣夕用加味逍遙散

以生肝血清肝火兼服百餘劑而諸症愈。

一婦人頭暉吐痰胃滿氣喘得食稍緩苦于白帶二十餘年矣諸藥不應薛曰此氣虛而痰飲也飲愈而帶始愈遂用六味地黃丸不月而驗。

一婦耳鳴胃痞內熱口乾喉中若有核吞吐不利月經不調兼之帶下薛以爲肝脾鬱結用歸脾湯加半夏山梔升麻柴胡間以四七湯下白丸子而愈。

一婦人吞酸胃滿食少便泄月經不調服法製清氣化痰丸兩膝漸腫寒熱往來帶下黃白面黃體倦此脾胃虛濕熱下注用補中益氣倍用參术加茯苓半夏炮薑而愈若因怒發熱少食或兩腿赤腫或指縫常濕用六君

加柴胡升麻及補中益氣

一婦年踰六十帶下黃白因怒冒膈不利飲食少思服消導利氣之藥反痰喘脅痛大便下血薛曰此脾氣虧損不能攝血歸源用補中益氣加茯苓半夏炮薑四劑諸症頓愈又用八珍加柴胡炒施予而安

仲問曰婦人年五十所病下利數十日不止暮積熱小腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以知曾經半產瘀血在小腹不去何以知之其症唇口乾燥故知之以溫經湯主之以吳茱萸三兩當歸川芎芍藥人參桂枝阿膠牡丹皮生薑甘草各二兩半夏半升麥冬一升以水一斗煮取三升分溫三服亦主婦

人少腹寒久不受胎兼取崩中去血或月水來過多及至期不來

丹溪東垣渝洲有帶下按附在便濶條中可參看

張子和治一婦爲室女時心下有冷積如覆盆按之如水聲以熱手熨之如冰于歸十五年不孕其夫欲黜之張曰可不必出若用吾藥病可除孕可得從之診其脉沈而遲尺脉洪大有力非無子之候也乃先以三聖散吐痰一斗心下平軟次服白米調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月而孕二子張嘗曰用吾此法無不子之婦信然

一婦年踰三十夜夢鬼交驚怕異常及見神堂陰府舟楫橋梁如此一十五年竟無姪娠巫祝禱無所不至鍼灸多內孔穴萬千黃瘦發熱引飲中滿足腫張曰陽火

盛于上陰水盛于下鬼神者陰之靈神堂者陰之所舟楫橋梁水之用兩手寸脉皆沈而伏知胃中有痰實也凡三漏三泄三汙不旬日而無夢一月而孕張曰予治婦人使有孕真不誣哉

少傳潁陽許相公年五十八歲如夫人年近三十從來十二年不孕相公欲其有子命宿診視六脉和緩兩尺大而有力告曰此宜子之象也嘗診相公脉沈而緩知精血欠充實耳宜服大補精血藥市得麋鹿二角煎膠製斑龍二至丸一料服未週年而孕次年生公子

尚寶少卿徐孺東公年五十餘有寵九年不孕聞前藥效亦命製前丸服之十個月而孕得一子後以此方與高

年難子嗣者服之多効

宿曰此雖偶中實有至理存焉月令仲夏鹿角解仲冬麋角解鹿以夏至隕角而應陰麋以冬至隕角而應陽鹿肉燔以陽爲體麋肉寒以陰爲體以陽爲體者以陰爲末以陰爲體者以陽爲末者角也故麋茸補陽利於男子鹿茸補陰利於婦人王樹所著甚明今合二角爲二至乃峻補精血之良藥男婦俱可服此以血補血非一切草木之可比也男子精盛則思室女人血盛則懷胎安得不孕

《妊娠》

附男女辨驗

博陵醫之神者曰郝翁士人陳堯蓮妻病瘧醫以爲勞傷郝曰亟屏藥是爲妊娠且賀君得男子已而果然又二婦人妊娠一咽嘿不能言郝曰見胎大經壅兒生經行則言矣不可毒以藥一極壯健郝診其脉曰母氣已死所以生者反恃兒氣耳如期子生母死

孕婦不語非病也聞如死者不須服藥臨產但日服保生丸四物湯之類產後便語亦自然之理非藥之功也

一婦暴渴惟飲五味汁名醫耿鴻診其脉曰此血欲凝非疾也而果孕古方有血欲凝而渴飲五味之症不可不知也

知也

徐文伯從宋後廢帝出樂遊苑門逢一婦人有娠帝以善
診之曰此腹是女也問文伯曰腹有兩子一男一女男
左邊青黑形小於女帝性急便欲剖脐文伯惻然曰若
刀斧恐其變異請針之立墮便渴足太陰補手陽明胎
便應針而落兩兒相續出果如其言

潘環診虞部員外郎張咸之妻孕五歲南陵尉當昌齡妻
孕二歲圍練使劉彝孫妾孕十有四月皆未育溫叟視
之曰疾也凡醫妄以爲有孕爾於是與破血攻毒作大
劑飲之虞部婁妻墮肉塊百餘有眉自狀昌齡妻夢二童
子色漆黑倉卒怖悸疾走而去孫妾墮大蛇猶蜿蜒未
死三婦皆無恙

壘仙翁治湯總兵夫人妊娠病痢不止翁診其脉虛而滑
兩關若繖由此胎氣不和相火炎上而有熱似痢實非
也乃用黃芩白朮以安胎四物生地以調血數劑而安
陳斗嵩治葉南洲妻經閉五月下白或赤午後發熱咳嗽
嘔吐醫以爲勞瘵陳視之曰兩尺脉皆實此必有孕外
受風邪搏激故耳飲清和之劑而安未半年生一子
薛立齋治一姪女三月其經月來三五次但不多飲食精
神如故此血盛有餘兒大能飲自不來矣果然
一姪女六月每怒氣便見血甚至寒熱頭痛脇脹腹痛作
嘔少食薛謂寒熱頭痛肝火上衝也脇脹腹痛肝氣不行也作嘔少食肝侮脾胃也小便見血肝火血熱也用

小柴胡加芍藥炒黑山梔茯苓白朮而愈。

一婦人每怒發發熱脇脹小便淋瀦每月經行旬餘未已受胎三月因怒前症復作朝用加味道逍遙散夕用安胎飲各二劑而安五月又怒復作下血如經行四日未止仍用前藥而愈。

一姪娘飲食後惱怒寒熱嘔吐頭痛惡寒胃腹脹痛大便不實面色青小便頻數而有血薛曰當清肝健脾爲主不信乃主安胎止血益甚問薛曰何也薛曰大便不實而或青此是飲食既傷脾土而兼木侮小便頻數而有血此是肝火血流于胞而兼挺瘻也用六君子加枳殼紫蘇山梔二劑脾胃頓醒又用加味道逍遙散加紫蘇枳

殼二劑小便頓清更節飲食調理而安。

一姪娘每至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面此是脾肺氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈凡治姪娘母泥其月數但見某經症便用某經藥爲善。

一姪娘因怒吐血塊四日不止兩脇脹痛小便淋瀦此怒而血畜于上部火炎而隨出也脇脹腹痛小便淋瀦肝經本病也用小柴胡合四物四劑而止却用六君子安胎飲調理而安。

一姪娘氣喘痰甚諸藥不効詢之云素有帶下始于目下溌兩月餘其面亦然此氣虛有痰飲也用六味丸料數

齋而愈

王敏治婦人患月事不下醫謂蟲者敏曰是當娠與之保胎之劑果得男

吳丞妻孕而驚遂病悸醫以爲病在中神越焉無可爲沈宗常以爲膽傷耳俾服抱膝丸愈

薛已治一姪婦悲哀煩燥用淡竹茹湯爲主佐以八珍湯而安

程文叔治孕婦七個月脣脢飽悶氣喘忽吐出一物如小腸寸許舉家驚疑其胎爛程至診得寸口脉洪滑知其一氣盛血少胎氣湊上中焦有濕熱濕生痰知所吐之物乃痰結聚病名子懸以紫蘇飲加芩連貝母十劑獲

痊宿述世俗有家業薄而厭子嗣多懷孕而用打胎藥殊不知瓜熟蒂落打胎毒藥損壞正氣然後瘦落如生薑未成熟強摘猶刀割臍腸大傷氣血多致喪命戒之戒之

痊

轉胞

丹溪治一婦年四旬孕九月轉胞小便閉三日矣脚腫形
瘁左脉稍和而右澁此必飽食氣傷胎系弱不能自舉
而下墜壓膀胱偏在一邊氣急爲其所閉所以水竅不
能出也當補血養氣血氣一正系胎自舉以參术歸尾
芍藥帶白陳皮炙甘草半夏生薑濃煎服四貼在其呌
號次早以四貼相作一服煎頻飲探吐之小便大通皆
黑水後遂就此方加大腹皮炒枳殼青葱葉砂仁作二
十貼與之以防產前後之虛果得平安產後亦健

一孕婦七月小便不通百醫不得利轉加急脹脈細弱乃
氣血虛不能乘載其胎故胎壓膀胱下口所以溺不得

出用補藥升起恐遲反加急漏遂令穩婆以香油抹手
入產戶托起其胎漏出如注^名張急頓解却以參芪升麻
大劑服之或少有急漏再托如前^{予聞一法將孕婦到}
^{堅起胎自墜轉其弱}漏出勝于手托多矣

丹溪曰轉胞病胎婦之裏受弱者憂悶多者性急躁者食
味厚者大率有之古方皆用滑利疎導藥鮮有應効因
思胞不自轉爲胎所墮展在一邊胞系了矣不通耳胎
若舉起懸在中央胞系得疏水道自行然胎之墜下必
有其由一日吳氏寵人患此脉之兩手似濇重取則弦
然左手稍和曰此得之憂患濇爲血少氣多弦爲有飲
血少則胞弱而不能自舉氣多有飲中焦不清而溢則

胞知所避而就下故墜遂以四物加參术半夏陳皮生甘草生薑空心飲隨以指探喉中吐出藥汁候少頃氣定又與一貼次早亦然如是與八貼而安此法初疑偶中後屢用皆効仲景云婦人本肌肥盛頭舉自滿今反羸瘦頭舉中空胞系了戾亦致胞轉但利小便則愈宜服腎氣丸以中有茯苓故也地黃爲君功在補胞或腰腹痛亦屬腎虛宜下裁牡丹皮服之

(交腸)

丹溪治一婦人年五十嗜酒痛飲不醉忽糟粕出前竅尿溺出後竅脉沈濇與四物湯加海金砂木香檳榔木通桃仁八貼安

一婦患此破漆紗帽燒灰米飲下愈
一人患前症用舊幞頭燒灰酒調下五分愈

惡阻

丹溪治一婦孕兩月嘔吐頭眩醫以參木川芎陳皮茯苓服之愈重脉弦左爲甚而且弱此惡阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎氣參木之補大非所宜以茯苓湯下抑青丸二十四粒五服稍安脉略數口乾苦食則口酸意其膈間滯氣未盡行以川芎陳皮山梔半薑茯苓煎湯下抑青丸十五粒而愈但口酸易饑此肝熱未平以熱湯下抑青丸二十粒至二十日而愈後兩手脈平和而右甚弱其胎必墮此時肝氣既平可用參木遂以初方預參木等補之防墮胎以後之虛服一月而胎自墮却得平安矣

一婦孕三月吐痰水并飲食每日寅卯作作時覺小腹有氣冲上然後膈滿而吐面赤微燥頭眩卧不能起肢疼微渴蓋肝火挾衝脈之火冲上也一日甚二日輕脉和右手寸高藥不効者將二月餘偶用沈香磨水化抱龍丸一服爾寬氣不上冲二三服吐止眩減退而安一孕婦七月嘈雜吐食駁聲心下滿塞氣攻肩背而時背痛要人不住手以熱物摩熨得吐稍踈脉大以炒條芩二錢半白朮半夏各二錢炒黃連炒梔子炒枳殼當歸陳皮香附蒼朮各一錢人參茯苓各錢半砂仁炙甘草各五分生薑七斤服二貼後嘈雜吐止心滿塞退但于夜間背肘之痛用摩熨遂與抱龍丸水化服之其疾如

失

汪右山治一婦形質瘦小，面色近紫。產後年餘經水不通，首夏忽病嘔吐，手指麻痺，拳不能伸展，聲音啞，小便不出聲。醫皆視為風病危之。汪診脈皆細微，近滑。曰：此姪惡阻病也。衆謂經水不通安有姪理？汪曰：天下之事有常有變。此乃事之變也。脉雖細微似近于滑，又尺按不絕，乃姪娘也。遂以四君子加二陳治之，諸症俱減。尚畏粥湯，惟食乾糕香燥之物而有生意。

給事游護溪夫人病新愈月餘，經事不行，嘔噦眩暉，飲食艱進，醫以爲二陽之病發心脾。女子不育法在不治。筆南診之，尺脉雖小，按之滑而不絕。此姪而惡阻非凶候。

也六君加砂仁數服而安。後產一女。

薛已治一婦孕三月嘔吐惡食，體倦嗜卧，此惡阻之症。用人參橘皮湯二劑漸愈，又用六君加紫蘇二劑而安。一姪娠吞酸惡心，欲作嘔吐，此飲食停滯，用六君加麴蘖炒黑子芩枳殼香附治之而愈。

胎水胎腫

一姪婦腹脹小便不利吐逆諸醫雜進溫胃寬氣等藥服之反吐轉加脹滿湊心驗之胎死已久服下死胎藥不能通因得鯉魚湯其論曰姪婦通身腫滿或心胷急脹名曰胎水遂去姪婦胷前看之胷肚不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消脹去方得分娩死胎此症蓋因懷姪腹大不自知覺人人皆謂姪娠孕如此終不知胎水之患也

濟生方

一婦年三十八姪娘水腫以鯉魚湯加五苓散人參濕加荳朮一錢厚朴陳皮五分蘿葡萄炒車前子滑石各一錢作一貼若喘急加苦夢蘆小便不利加木通燈草甚

者車前子滑川散其濕毒自消已治腰已下濕熱腫如內傷胃弱者不可用也

胎漏

丹溪治一婦人年二十餘三介月孕發癰疾後淡血水下腹滿口渴以白朮白芍茯苓各一錢黃芩歸尾川芎陳皮各五分炙甘草二分

一婦年三十餘孕八九箇月漏胎不止胎比前時稍寬收小血色微紫有塊食減平時三之一腹微痛無情緒以人參白朮白芍各一錢陳皮川芎茯苓縮砂太腹皮各三分香連藤七葉同煎食前下三勝丸五十粒

江喜字明遠婺人以醫名家先是城東有古木鶴巢其頸有年矣明遠一日見人緣木得所伏二卵而下就買之且飲食之俾復以歸于巢微傷矣其鶴每歸雄鳴雌和

忽連日無聲江登樓望惟見雌伏又越二三日聞其和鳴則雄歸矣越月而雛生忽二鶴俱飛至藥局遺一草而去江取視之紅藤纏繞根葉猶潤乃值之適夏四月香會有零遊道入見所植驚曰此漏胎藥也海外方有乏安所得此乎及寶祐間診御脉公主下嫁后得漏胎疾江以藤和劑果効先是鶴遠取以纏破卵也

江應宿治王祠部安人孕三月腰腹遍痛漏下不止氣湧脹悶速予診視六脉弦數平昔脉極沈細此必怒動肝火挾相火而生內熱喜脉不滑未至離經猶可保矣以條芩白朮枳殼香附茯苓阿膠白芍當歸陳皮煎調鹿角煅酒淬細末一錢更進抑青丸一服痛已數服平復

一姪娘六月體倦食少勞役見血用六君加當歸熟地升
麻柴胡而愈

墮胎

丹溪治一婦有胎至三ヶ月左右卽墮其脉左大無力重
取則濇乃血少也以其妙年只補中氣使血自榮時正
初夏濃煎白朮湯調黃芩末一錢服之至三四兩得保
全而生

一婦年三十餘或經住或成形未真其胎必墮察其性急
多怒色黑氣實此相火火盛不能生氣化胎反食氣傷
精故也因令住經第二月用黃芩白朮當歸甘草服至
三三月盡止藥後生一子

一婦經住三月後尺脉或濇或微弱其婦却無病知是子
宮真氣不全故陽不施陰不化精血雖凝終不成形至

產血塊或產血胞

一婦腹漸大如懷孕至十月求易產藥察其神色甚困難與之藥不數日生百克半搘蓋由婦之元氣太虛精血雖凝不能成胎而爲穢腐蘊積之久濕化爲熟濕熱生蟲理之所有亦須周十月之氣發動而產終非佳兆其婦不及月死濕熱生虫譬如之溝渠污濁積久不流則諸蟲生于其間矣

石山治一婦長瘦色黃白性燥急在三十餘常患墮胎已七八見矣診其脈皆柔軟無力兩尺雖浮而弱不在尋按曰此因胎墮太多氣血耗甚胎無滋養故頻墮譬如之水涸禾枯土削而木倒也况三月五月正屬少陽火

動之時加以性燥而急發之故墮多在三五七月也宜太補陰湯去桂加黃柏黃芩煎服仍用研朱蜜丸服之庶可保生服半年胎固而生二子

錢仲陽治一孕婦病醫言胎且墮錢曰娠者五藏傳養率六旬廻更候其月偏補之何必墮已而母子皆全陳斗嵩治一婦有胎四月墮下逾旬腹腫發熱氣喘脉洪盛面赤口鼻舌青黑陳診之曰脉洪盛者胎未墮也面赤心火盛而血乾也舌青口鼻肝既絕而胎死矣內外皆曰胎墮久矣復診色脉如前以蛇蛻煎湯下平胃散加芒硝歸尾一倍服之須臾腹鳴如雷腰腹陣痛復一死胎墮下病亦愈

程仁甫治一婦年近四十，稟氣素弱，自去其胎五日內，漸漸腹脹如鼓，至心前上吐，不能食用。補藥不効，診六脉微弱，但尺叫脹死。此乃損傷脾氣而作脹，雖然當急則治其標也。若泥用丹溪方法，恐緩不及事矣。用桃仁承氣加朴實倍硝黃煎服四分，吐去其一，至次日早仍不通，事急又服琥珀丸三錢，至申時大通脹減，但體倦四肢無力，口不知味，發熱，再用參芪歸芍木陳杏煎服八劑而安。

薛立齋治一姪，五月服剪紅丸，而墮腹中，脹痛，服破血之劑益甚。以手按之，益痛。薛曰：此峻藥重傷脾胃，受患用八珍倍入參黃芪半夏乳香沒藥，二劑而痛止，數劑而全愈。

一婦素怯弱，四月生女，自乳患癰瘡，年餘不愈，遂致羸困。五月，勉強執姑喪禮，旬月每欲取卧，一日感氣忽患心脾高腫，作痛手不可按而嘔吐不止。六脉微細，之極醫以爲肺雖虛而病形則實誤，認諸痛不可補氣，乃用青皮香附吳茱萸等藥而愈。繼復患瘡，且墮胎，又求理氣行氣之劑，病去元氣轉脫，再投參芪補劑，不應矣。六脉如系，欲絕。薛診云：皆理氣之劑，損真之誤也。連投參芪歸木附子薑桂六劑，間用八味丸五日，眠食漸甘，六脉全復。薛云：心脾疼痛時，即當服此等藥，瘡亦不作矣。

江寧南治一婦人墮胎後，血不止，食少，中滿倦怠，煩燥，脉

沈大而數重，取漸弦，乃作怒氣傷肝，感動胃氣，以二陳湯加川芎白朮砂仁二十貼而安。

江應宿治汪鎬妻，年三十五歲，厭產誤服打胎藥，下血如崩漏，旬餘腹痛一陣，卽行或時鼻衄，諸藥不効。予診得六脉數而微弦，乃厥陽之火泛逆，投四物換生地，加阿膠炒黑，山梔子蒲黃一劑而愈。蓋孕至三五月，上屬少陽，相火所生，易墮不然，何以黃芩白朮阿膠等爲安胎之聖藥。

胎產併病

政和中蔡魯公之孫婦有孕及期，而病，國醫皆以爲胎症，傷寒懼胎墮，不敢投涼劑。張銓視之曰：兒處胎十月，將生矣，何藥之能敗？卽以常法與藥，且使倍服之半日，而兒生病亦失去。明日，婦大泄，而喉閉，不入食，衆醫復指其疵，且曰：二疾如冰炭，又產蓐甫近，雖司命無若之何。張曰：無庸憂，將使卽日愈。乃取藥數十粒，使吞之，咽喉卽通，下泄亦止。及滿月，魯公酌酒爲壽，曰：君術通神，吾不敢知，敢問一藥而愈二疾，何也？張曰：此于經無所載，特以意變之。向者所用乃附子理中丸裹以柴雪爾。方喉閉不通，非至寒藥不爲用，旣以下咽，則什消無餘，其

得至腹中者附子力也故一服而兩疾愈公大加嘆異

夷堅志

愚嘗聞一婦寒月中產後腹大痛覺有塊百方不治一人教以羊肉四兩熟地黃二兩生薑一兩水煎服之一二次愈

胎熱

一婦將臨月兩目忽然失明不見燈火頭痛眩暈項脣腫滿不能轉頸諸治不差反加危困偶得消風散服之胎產須病減七八獲安分娩其眼吊起人物不辨乃以四物湯加荆芥防風更服眼科天門冬飲子一方間服目漸稍明大忌酒麯煎炙鷄羊鵝鴨豆腐辛辣熟物并房勞蓋此症因懷姪多居火間衣著大熗伏熱在內或酒麯炙燙熱物太過以致胎熱也

石山治一婦懷姪八月嘗病腰痛不能轉側大便燥結醫用人參等補劑痛益加用硝黃通利之藥燥結雖行而痛如故正診之脉稍洪近駛曰血熱血滯也宜用四物

卷之十一
四十五
加木香乳沒黃柏火麻仁煎服四五貼，痛稍減，燥結潤復。加發熱面赤或時惡寒，仍用前方去乳沒黃柏，加柴胡黃芩服二貼，而寒熱除，又皆心覺寒，腰痛復作。注曰：血已利矣，可予前方加入參一錢服之而安。

江篁南治一婦姪娘三個月，因門挫傷胎腰痛，小腹疼，下血，內有熱，用當歸白朮黃芩上熟地川芎防風砂仁中艾葉上香附下，右用水煎服，血止，小腹不痛，去砂仁，又用雞子黃三個，以酒攬化煮熟食之即痊。

難產

淳于意治菑州王夫人懷子而不乳來召，臣意意往飲以良礪藥一撮，以酒飲之旋乳，意復診其脉，而脉躁躁者有餘病，卽飲以消石一齊，出血如豆比五六枚。

滑伯仁治一婦人產難七日而不乳且食甚少，伯仁視之乃以涼粥一孟擂碎楓葉煎湯調啖之旋乳或詰其理，滑曰：此婦食甚少，未有無穀氣而能生者。夫楓葉先生先落後生，後落故以作湯飲也。

丹溪曰：此之難產者，往往見于鬱悶安佚之人富貴奉養之家，若貧賤辛苦者無有也。方書只有瘦胎飲一論，而其方爲湖陽公主作也，實非極至之言。何者？見有此方。

其難自若。予族妹苦于難產，後遇孕則觸而去之。予甚憫焉，視其形肥而勤于女士，構思旬日悟曰：此正與湖陽公主相反。彼奉養之人，其氣必實耗其氣使和平故易產。今形肥知其氣虛，久坐知其不運而其氣愈弱。久坐胞胎因母氣不能自運，耳當補其母之氣，則兒健而易產。今其有孕至五六箇月，遂于大全方紫蘇飲加補氣藥，與十數貼，因得男而甚快，後遂以此方隨人之形色性，稟參以時令加減，與之無不應者。因名其方曰木達生散。

龐安常治一婦將產七日而子不下，百治不効。龐視之，令其家人以湯溫其腰腹，自爲上下拊摩。孕者覺腸胃微

痛呻吟，間生一男子。其家驚喜而莫知所以。龐曰：兒已出胞，而一手誤執母腸，不能復脫，故非符藥所能爲。吾隔腹捫兒手所在，針其虎口痛，卽縮手，所以遽生無他術也。取兒視之，右手虎口針痕存焉。

一婦累日產不下，服催生藥不効。龐曰：此必坐草太早，心下懷懼氣結，而不行，非不順也。素問云：恐則氣下，蓋恐則精神怯，怯則上焦閉，閉則氣逆，逆則下焦脹，氣乃不行矣。以紫蘇飲一服，便產。及婦人六七月子懸者，用此往往有效。不數日胎便下。其方紫蘇葉一兩，大腹皮人參川芎陳皮白芍各五分，當歸三分，甘草一分，細切分作三服，每服以水一盞半，生薑四片，葱白七寸，煎七分。

空心服

四十七

陳良甫治一婦有孕七箇月遠歸忽然胎上沖心而痛坐卧不安兩醫治之不效遂言胎已死矣已用草麻子研爛加射香調貼臍中以下之甚危急陳診視兩尺脉絕他脈平和陳問醫作何症治之答曰死胎也陳曰何以知之曰兩尺脉沈絕陳曰誤矣此子懸矣若是胎死却有辨更面赤舌青子死母活面青舌赤母死子活唇口俱青母子俱死今面不赤舌不青其子未死是胎上迫切宜紫蘇飲治之至十貼而胎乃下

吳兆山治一婦產難三日不下服破血行經之藥俱罔効

吳製一方以車前爲君冬葵子爲臣白芷枳殼爲佐使

已服半產衆醫異之吳曰本草謂催生以此爲君毛詩
襪芣苢以防產難其詳諸症
辨疑可考

盛起東爲御醫侍禁掖忽夜半召入宮錦帳中出手按脉盛曰六脉已離經此必母后將分娩祖子抱母心非針不能下且難兩全中使具狀聞上曰俟母后商之后曰得子可安天下全我何爲命用鍼鍼出卽生太子是爲

宣宗

劉復真遇府判女產不利已斂劉以紅花濃煎扶女于凳上以綿帛蘸湯過之連以燒帛上以器盛水又燬又淋久而甦醒遂生男子蓋遇嚴冬血冷凝滯不行溫則產見亦神矣哉

薛立齋治地官李孟卿娶繼室年方十五孕處其難產與
加味芎歸湯四劑備用果產門不開服之乃產
西賓費懷德之室下血甚多產門不開兩日未生服前藥
一劑卽時而產後育胎並無此症費傳與服者皆效
一婦人分娩最易至四十二姪娠下血甚多產門不開亦與
前湯一劑又用無憂散斤許丁劑煎熟時時飲之以助
其血而產

一醫宿客匠值店婦數日不產下體已冷無藥甚窘以椒
橙茱萸等煎湯可下手則和臍腹人門處皆淋洗之氣
溫血行遂產

石山治一婦常患橫生逆產七八胎矣子皆不育汪診脉

皆細澀頗弦曰此氣血兩虛兼熱也或曰氣血有餘方
成姪娠氣血既虧安能胎耶汪曰觀其形長瘦而脉細
濡屬於氣血兩虛色青脉弦屬於肝火時熾而兩尺浮
滑似血虛爲輕而氣虛爲重也宜以補陰丸除陳皮倍
加香附參芪蜜丸服之常令接續踰年臨產果順而育
一子

胡陽公主難產方士進枳殼四兩甘草二兩爲細末每服
半錢一錢匕如茶點服自五月後一日一服易產仍無
胎中諸患此與富室安逸奉養厚者宜耳

于法開善醫術嘗行暮投主人妻產而兒積日不墮開曰
此易治耳殺一肥羊食十餘鬻而針之須臾羊管異兒

出精妙如此

焦氏類林

盤腸產

趙都運恭人每產則子腸先出，然後產子。產後其腸不收，甚以爲苦。名曰盤腸產，醫莫能療。偶在建昌得一老婆，施法而收之。其法以醋半盞，新汲冷水七分，碗調停，嚥產母面，每嚥一縮，三嚥收盡。此良方也。

宿按：盤腸產乃中氣虛，努力脫出，與脫肛同。宜於懷孕時，多服補中升提藥。庶幾可免。若脫出，共取蘇油抹之，勿令見風。以草麻子四十九粒，去殼搗爛貼產婦頂心，服補中益氣加升麻勝。於冷水嚥面，多矣。

胎肖胎忌

鑿昌高八舍家軒墀間畜龜數年生育至百餘其家產子四五人皆龜曾偃僵蓋孕婦感其氣所致

至正末越有夫婦二人於大善寺金剛神側縛葦而居其婦產一子首兩肉角鼻孔昂縮類所謂夜叉形蓋產婦依止土偶便稟得此形古人胎教不可不謹

陳白雲家離落間植決明家人摘以下案生三子皆短而跛而王氏女甥亦跛予皆識之又會稽民朱氏一子亦然其家亦嘗種之悉拔去罪雪錄

房室之戒多矣而天變爲尤月令先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶

災謂其瀆天威也今人之生子而形殘體缺者又安知其不犯斯禁耶爲人父母者宜識之噫迅雷風烈必變豈有是哉雜記

胎婦飲食忌

鷄肉合糯米食令子生寸白蟲食犬肉令子無聲
鱠鯉同鷄子食令子生瘡多瘡兔肉食之令子缺唇
羊肝令子多厄難鼈肉令子短頸鴨子與桑椹同
食令子倒生心寒鱠魚同田鷄食令子瘡症雀肉
合荳醬同食令子面生雀斑黑子食螃蟹橫生食
子薑令子多指生瘡食水漿冷絕產食雀肉飲酒
令子多婦無耻食茨菰消胎氣乾薑蒜鷄毒胎無
益粘膩難化傷胎食山羊肉子多病無鱗魚勿
食菌有大毒食之令子風而天食雀腦令子雀自

藥物忌

蛇斑水蛭及蠶蟲烏頭附子配天雄
野葛水銀井巴豆牛膝薏苡與蜈蚣
三稜代赭芫花麝太戟蛇蛻黃雌雄
牙硝羌硝牡丹桂槐花牽牛皂角同
半夏南星與通草瞿麥乾薑蟹甲爪
硼砂乾漆兼桃仁地膽茅根莫用好

起居忌

勿亂服藥勿過飲酒勿妄針灸勿向非常地便勿舉重
登高涉險心有大驚犯之產難子疾病勿多睡卧時時
行步體虛腎氣不足生子解願腦破不答宜溫補脾胃
不和榮衛虛怯子必羸瘦自家及隣家修造動土犯其

胎氣令子破形殞命刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣有此等驗如影響切宜避乏便產須知

胎死作喘

呂散洲治經歷哈散侍人病喘不得卧衆作肺氣受風邪治之呂診之氣口盛于人迎一倍厥陰弦動而疾兩尺俱短而離經因告之曰病蓋得之毒藥動血以致胎死不一奔迫而上中非風寒作喘也乃用催生湯加芎歸黃二十三升服之夜半果下一死胎喘即止哈散密囑曰病妾誠有懷以室人見嫉故藥去之衆所不知也衆慚而去

洪州曾通仕爲豐城尉家有猫孕五子一子已生四子死腹中腹脹啼叫欲死醫教以朴消爲細末一錢溫童便調下死子卽下猫得不死後有一牛亦如此用此法亦

活此本治人方用以治畜亦効後以治人常驗信効方

(產後)

丹溪治一婦面白形長心襟半夜生產侵晨暈厥急矣氣海十五壯而甦後以參术等藥服兩月而安此陽虛也一產婦因收生者不謹損破胞而致淋瀝不禁因思肌肉破傷在外者尚可完補胞雖在腹恐亦可活診其脉虛甚蓋難產因氣血虛故產後尤虛試與峻補以參术爲君芎歸爲臣桃仁陳皮黃芪茯苓爲佐以猪羊胞煎湯熬藥汁極飢飲之一月而安蓋氣血驟長其脬卽完卽恐稍遲亦難成功也

一產婦陰戶一物如帕垂下或有角或二歧俗名產癩宜大補氣以升提之以參芪术各一錢升麻五分後用川

歸方藥甘草陳皮調之

一婦年三十餘產二日，產戶下一物如手帕，有二尖約重一斤餘，此胎前因勞役傷氣成肝癥所致，却喜不甚虛，其時天寒急與灸黃芪白朮朴麻各五分參歸各一錢，連與三貼，卽收上得汗通身乃安。其粘席凍乾者落一片，約五六兩蓋脂膜也。脈濇，左略弦形實，與白朮芍藥當歸各一錢半，陳皮一錢，薑一斤，二三貼，養之。

一婦產後陰戶下一物如合鉢狀，有一歧，此子宮也。氣血弱，故隨子而下。用朴麻當歸黃芪大劑服，二次仍用皮工之法，以五倍子作湯洗濯，皴其皮後，覺一響，而收入但經宿，著席破落一片，如掌大，心甚恐。朱曰：非腸胃比。

也肌肉破尚可獲完，以四物加入參數十貼，三年後復生一子。

一產婦年三十餘正月間新產，十餘日，左腳左手發搐，氣喘，不眠，面起黑氣，口臭，脈浮弦而沈濇，右爲甚，意其受濕，詢之產前三月時常喜羹湯茶水，遂以黃芪荆芥杏香滑石、蒼白朮、檳榔、陳皮、川芎、甘草、芍藥四服後加桃仁又四服，而漿滌有聲，大下水晶塊，大小如鷄子黃，與蝌蚪者數十枚而愈。乃去荆芥、檳榔、滑石，加當歸茯苓、調理其血四十貼而安。

一婦產後胃虛哭多，血乘下身潤，脉沈以當歸白朮各三錢，陳皮芍藥川芎生乾薑各二錢，炙草少許，分二貼。

丁婦因憂慮墮胎後兩月餘血不止腹痛此體虛氣滯惡物行不盡以白朮二錢陳皮芍藥各一錢木通川芎各五分炙草二分作湯下五芝丸六十粒食前

滑伯仁治一產婦惡露不行臍腹痛頭疼身寒熱衆皆以爲感寒溫以薑附益大熱手足搐搦諸目攏診其脉弦而洪數面赤目閉語喃喃不可辨舌黑如焰燥無津潤脣腹按之不勝手蓋燥劑搏其血內熱而風生血蓄而爲痛也曰此產後熱入血室因而生風卽先爲清熱降火治風涼血兩服頗爽繼以琥珀牛黃等稍解人事後以張從政三和散行血破瘀三肉服惡露大下如初時產已十日矣于是諸症悉平

丁婦新產受寒四肢逆冷脉沈弱亟令附子大丸三四粒

餌之立効

丁婦盛暑月中產三日發熱其脈虛疾而大惡露不行敗血攻心狂言叫呼奔走攀捉不住以乾荷葉生地黃牡丹皮濃煎湯調下生蒲黃二錢一服卽定惡露卽下遂安

一產婦鬱冒脉微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出乃大便堅嘔不能食小柴胡湯主

之卽暈
驚冒

汪右山治一婦產後滑泄勺水粒米弗容時卽泄下如此半月餘衆皆危之或用五苓散平胃散病益甚汪診之脉皆濡緩而弱曰此產中勞力以傷其胃也若用湯藥愈滋胃濕非所宜也令以參苓白朮散除砂仁加陳皮肉荳蔻煎薑棗湯調服旬餘而安

一婦產後時發昏瞀身熱汗多眩暉口渴或時頭痛惡心醫用四物涼血之劑病不減復用小柴胡病益甚汪診之脉皆浮洪搏指汪曰產後而得是脈又且汗多而脈不爲汗衰法在不治所幸者氣不喘不作泄耳其脉如是恐爲涼藥所激也用人參三錢黃芪二錢甘草當歸各七分白朮門冬各一錢乾薑陳皮黃芩各五分煎服

五劑脉歛而病漸安

吳楚山治一婦人產後去血過多食後著悶頭疼身痛寒熱如瘡左手弦大微有寒邪右手弦滑不勻飲食痰火也二者因虛而得宜養正祛邪遂以茯苓補心湯去地黃加羌活青皮葱棗三服汗出身涼其患漸差然後以八物湯調理半月後全愈

一婦產後面赤五心煩熱敗血入胞衣胞衣不下熱有冷汗恩但去其敗血其衣自下遂用烏豆二合炒透然後燒紅鐵秤錐同豆淬其酒將豆淋酒化下益母丹二丸胞衣從血而出餘症盡平

一婦產後利未至月滿因食冷物及酒冷熱與血攻擊滯

卷之十一
下純血，經墜急痛，其脉大無力，口乾遂用黃芩方藥湯，三服而安。

一婦產後四肢浮腫寒熱往來，蓋因敗血流入經絡滲入四肢，氣喘咳嗽，脣脛不利口吐酸水，兩脇疼痛，遂用旋覆花湯，微汙漸解，頻服小調經用澤蘭梗煎湯，調下腫氣漸消。

一婦六月產後多汗，人倦，不敢袒被，故汗出被裏，冷則浸漬，得風濕，疼痛，遂以羌活續斷湯數服而愈。

一婦產後血風四肢痺痺，以小續命湯數服而安。

一婦產後三日起早，況氣血未定，遂感身熱，目暗如風狀，

卽以清魂散二服得微汙而愈。

一婦產後惡露未盡，瘀血入絡，又感寒邪，寒熱如瘡，卽以生料五積散五貼，惡露自下，而寒熱除。

一婦產後惡露未盡，因起抹身，寒氣客于經絡，乍寒乍熱，脈緊而弦，以葱白散二貼而安。

一少婦初產四日，冷物所傷脾胃，但覺身分不快，嘔逆飲食少，思心腹滿悶，時或腹脇刺痛，晨惡寒，晚潮熱，夜則恍惚譖語，晝則抽搐，頗類風狀，變異多端，諸醫莫測，或作虛風，或云血凝實熱，用甘溫而行血以寒涼，退實熱如此半月，不効，往至見醫滿座，亦跼蹐，診其脉弦而緊，遂令按之，小腹急痛，知瘀血未盡也，思患者大勢惡露已下，未必還有餘血，偶因寒涼所傷，瘀血停滯下焦，日

久客于經絡所以變生諸症須得大調經散倍以琥珀化諸惡血成水其患方愈遂合前藥服之五日後行惡水斗許臭不可近患人覺倦病勢漸減然後以入參養榮湯數十貼月餘如初

一婦產後患鬱氣食下卽滿悶以四七湯入香附神曲之類服後氣順痰下食進病除

一婦產後血上冲心閉悶欲絕先以乾漆燒煙熏鼻次以卷荷散三服服之甦醒惡露漸下

卷荷散出諸症辨疑

一婦產後未經滿月因怒氣血流如水三日方止隨又勞苦四肢無力睡而汗出日晡潮熱口乾五心如炙諸醫皆用柴芩薄荷之類其熱愈熾診其脉弦大無力此葛

勞也以四物湯一兩入胡黃連秦艽青蒿各半錢數服熟退身涼後以黃連八珍丸一粒而安

一婦產後血逆上行鼻衄口乾心燥舌黑蓋因瘀血上升遂用益母丸二丸童便化下鼻衄漸止血漸通

俞子容治一婦新產後七日爲將息失宜腠理不密因風寒所侵身熱頭痛兩眼反眴手足癟痙名曰風寒用荆芥穗一味新瓦上焙乾爲細末豆淋酒調下一錢其疾卽愈古人珍祕此方隱葉其名故曰舉卿古拜散蓋用韻之切語舉卿爲荆古拜爲芥曾公談錄謂之再生丹亦神之也

奉化陸叢治新昌徐氏婦病產後暴死但胷脇微熱陸診

之曰此血闕也用紅花數十斤以大鍋煮之候湯沸以木桶盛湯將病者寢其上熏之湯氣微復進之有頑婦人指動半日遂甦此法與許胤宗治王太后之意同遠作裨史

一婦人產後腸中痺不可忍以針線袋安所臥褥下勿令人知之乃愈本草

一婦人產後腸中痺取箭幹及鍼安所臥席下勿令婦人

知本草

一婦產當冬寒月寒氣入產門脰下脹滿手不敢犯此寒症也醫欲治之以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服仲景羊肉湯少減水服遂愈本草

杜壬治鄰質子婦產四日癰癰戴眼弓背反張壬以爲牽病與大豆紫湯獨活湯而愈政和間余妻方分婉猶在蓐中忽作此症頭足反接相去幾二尺家人驚駭以數婢強拗之不直適記所云而藥草有獨活乃急爲之召醫未至連進三劑遂能直醫至卽愈矣更不須用大豆紫湯古人剴方神驗屢矣金三卷

丁婦產後有傷胞破不能小便常淋瀝不乾用生絲絹丁尺剪碎白牡丹根皮白芨各末一錢水丁碗煎至絹爛如餳空心頓服不得作聲作聲卽不効

丁婦產後水道中出肉線一條長三四尺動之則痛欲絕先服失笑散數次以帶皮薑三斤研爛入清油二斤煎

油乾爲度，用絳燒起肉線，屈曲于水道邊以前薑裏之冷，則熨之。一日夜縮其大半，二日即盡，入再服，失笑散芎歸湯調理之，如肉線斷，則不可治矣。

一婦人產後日食茶粥二十餘碗，一月後遍身冰冷數塊，人以指按其冷處，卽冷從指下上應至心，如是者一年，諸治不効，以八物湯去地黃加橘紅，入薑汁竹瀝一酒鍾十服，乃溫。

薛立齋治一產婦陰門不閉，發熱惡寒，用十全大補加五味子數劑而寒熱悉退，又用補中益氣加五味子數劑而歛，若初產腫脹或焮痛而不閉者，當用加味逍遙，若腫消而不閉者，當用補中益氣湯，切忌寒涼之劑。

一婦人脾胃素弱，兼有肝火，產後陰門腫痛，寒熱作渴，嘔吐不食，數太黃等藥，服驅利之濟，腫及于盤脛，症癰起此，真氣虛而作，先用六君子以固脾胃，乃以補中益氣湯升舉，不數劑而消。

一產婦失治，腫潰不已，形體消瘦，飲食少，思朝寒暮熱，自汗盜汗半年矣，用補中益氣加茯苓半夏以健脾胃，腰水漸少，飲食漸進，用歸脾以解脾鬱，共五十餘劑，元氣復，而瘡亦愈。

一產婦陰門不閉，小便淋瀝，腹內一物攻動，脇下作脹，或痛，用加味逍遙加車前子而愈。

一婦人子宮腫大，二日方入，損落一片，殊類猪肝，已而面

黃體倦飲食無味內熱晡熱自汗盜汗用十全大補二十餘劑諸症悉愈仍復生育

一產婦腹痛發熱氣口脈大虛以爲飲食停滯不化乃破血補虛又寒熱頭痛嘔吐涎沫又用降火化痰理氣四肢厥冷泄下墜始信謂薛曰何也曰此脾胃虛之變症也法當溫補遂用六君子加炮薑二錢肉桂木香一錢四劑諸症悉退再用補中益氣元氣悉復

一婦產後腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不甘懷抱又欬患燥啞寐而盜汗如雨竟夜不敢寐神思消懶薛曰氣血虛而有熱用當歸六黃湯內黃芩黃柏炒黑一劑汗頓止再劑全止乃用歸脾湯八珍散兼服元氣亦

一產婦小腹作痛服行氣破血之藥不効其脉洪數此瘀血內潰爲膿也以瓜子仁湯二劑痛止更以太乙膏下膿而愈產後多有此病縱非癰患用之更効

一產婦小腹疼痛小便不利用薏苡仁湯二劑痛止更以四物加桃仁紅花下瘀血而愈太抵此症昔因禁衛不調或瘀血停滯所致若脉洪數已有洪脉但數微有膿脉遲緊乃瘀血下之即愈若腹脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大使出宜用蠟礬丸太乙膏及托裏藥家人婦產後小腹作痛忽牙關緊急灌以失笑散良久而甦又用四物加炮薑白朮陳皮而愈

復

一產婦兩手麻木，服愈風丹天麻丸，遍身皆麻，神思倦怠，晡熱作渴，自汗盜汗，此氣血俱虛也。用十全大補加炮薑數劑，諸症悉退，却去炮薑，又數劑而愈。但內熱，此血虛也，用逍遙散而痊。

一產婦牙關緊急，腰背反張，四肢抽搐，兩目連劄。薛以爲去血過多，元氣虧損，陰火熾盛，用十全大補加炮薑一劑而甦，又數劑而安。

薛在吳江史萬湖弟將入更時聞云：某家人婦忽仆，牙關緊急，已死矣。詢云是新產婦，出直厨，意其勞傷，血氣而發瘓也。急用十全大補加附子煎滾，令人推正其身，一人以手挾正其面，却空開其口，將藥灌之，不喫藥已冷。

食側其面，尚之仍正，其面復灌以熱藥，又冷又灌，如此五次，方嚥下隨灌以熱藥遂甦。

一產婦太便不通七日矣，飲食如常，腹中如故。薛曰：飲食所入雖倍，常數腹不痛，服用八珍，加桃杏仁仁至二十丁，腹滿欲去，用猪膽汁潤之，先去乾糞五七塊，後皆常糞而安。

一產婦太便八日不通用通利之藥，中脫作痛，飲食甚少，或云通則不痛，痛則不通，乃用蜜導之，太便不禁吃逆，不食，念日，此脾胃復傷，用六君加吳茱萸肉果骨脂五味數劑，喜其年壯，否則不起。

一產婦惡寒發熱，用十全大補加炮薑治之而愈，但飲食

不_甘_多肢體倦怠用補中益氣而安又飲食後犯怒惡寒發熱抽搐咬牙難候其脉視其面色青中隱黃欲按其腹以手護之此肝木侮脾土飲食停滯而作用六君子加木香一劑而安

一產婦惡寒發熱欲以八珍加炮薑治之其家知醫以爲風寒用小柴胡湯薛曰寒熱不時乃氣血虛不信仍服一劑汗出不止譴語不絕煩熱作渴肢體抽搐薛用十全大補二劑益甚脉洪大重按如無仍以前湯加附子數劑稍緩再服而安

一產婦咳嗽聲重鼻塞流涕此風寒所感用參蘇飲一鍾頓愈六七乃與補中益氣加桔梗茯苓半夏一劑而痊

又與六君子加黃芪以實其腠理而安

一產婦朝吐痰夜發熱兼之無寐泥用清痰降火肌體日瘦飲食日少前症益甚薛曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味逍遙散加味歸脾湯以次調補不月而痊

一產婦咳嗽痰盛面赤口乾內熱晡熱微作無時此陰火上炎當補脾腎遂用補中益氣六味地黃丸而愈

產婦瀉痢發熱作渴吐痰甚多肌體消瘦飲食少思或曾膈痞滿或小腹脹墜年餘矣此脾胃濕朝用二神丸夕用六君子湯三月餘乃痊

一婦產後泄瀉兼嘔吐嘔酸面目浮腫此脾氣虛寒先用

六君加炮薑爲主佐以越鞠丸而疎酸愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃健

一產婦瀉利年餘形體骨立內熱晡熱自汗盜汗口舌糜爛日吐痰三碗許脉洪大重按全無此命門火衰脾土虛寒而假熱然痰者乃脾虛不能統攝歸源也用八味丸補火以生土用補中益氣兼補肺金而脾胃健

一產婦腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不進與死爲隣此脾胃俱虛用四神丸十全大補而愈但飲食難化肢體倦怠用補中益氣湯調理而康

江寧南治一貴婦產後四五日患心腹痛醫用行血之劑痛益甚常俯卧以枕抵痛處甚則昏暈江曰此極虛也

蓋產後亡血過多暴虛經隧行瀦故作痛耳以入參五錢黃芪三錢當歸芍药炒黑乾薑玄胡二劑愈

江應宿治一婦三十餘產後三月崩漏不止用八物湯加炒黑乾薑荆芥穗阿膠珠敷劑愈

上金匱公宜人產後因沐浴發熱嘔惡渴欲飲冷水瓜果證語若狂飲食不進體素豐厚不受補醫用清涼熱增廁診得六脉浮大洪數予曰產後暴損氣血孤陽外浮內真寒而外假熱宜大補氣血與八珍湯加炮薑八分熱減大半病人自知素不宜參芪不肯服過一日復太熱如火復與前劑潛加參芪炮薑連進二三服熱退身涼而愈

宿按丹溪云產後當以大補氣血爲先雖有他症以未治之須問臨產難易去血多少如產難及血去多者病致寒熱頭疼脉虛數大或虛浮緊者勿誤認作外感是陰血既亡而陽氣外散而未復也名爲正虛當用八物加炒黑乾薑能於肺分利肺氣入肝分引血藥生血然必與補血藥同用若產易及惡露不通腰腹疼痛致寒熱頭疼者當去惡血若腹滿者非惡血也切不可發表有素稟血熱因產重傷遂致血病偏虛潮熱脉弦數口舌生苔雖有惡露惟宜清涼勿犯溫燥防其血傷熱極漸成勞瘵

師尼真傳

許學士治一尼患懶風倦怠乍寒乍熱面赤心怔忡或時自汗是時疫氣大行醫見其發熱作傷寒治之用大小柴胡湯襍進數日病急許診視告之曰三部無寒邪脉但厥陰弦長而上魚際宜服抑陰等藥治之以生地二兩芍藥一兩柴胡秦艽黃芩各半兩爲細末蜜丸如梧桐子大每服三十丸烏梅湯吞下日三服良愈

薛立齋治一寡婦因怒致不時寒熱久而不已肝脉弦緊用小柴胡加生地治之而愈但見風寒熱仍作此是脾胃氣虛用加味歸脾補中益氣二湯兼服而止

一室女寒熱左手脉弦長而出寸口用小柴胡加生地烏

梅治之而愈既嫁而諸症悉痊

一放歲官女年踰三十兩膝作痛肉色不變太小便中作
痛如淋登廁尤痛此瘀血漬入隧道爲患乃男女失合
之症也難治後潰不斂又患瘻瘍而歿此婦爲人妻夫
常在外可見此婦在內久患憂鬱及歲外又不如願是
以致生此疾愈見瘻瘍流注乃七情氣血損傷不可用
攻伐皎然矣按精血篇云女人天癸既至踰十年無男
子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血
不出新血誤行或潰而入骨或變而爲腫或雖合而難
乎合多則瀝枯虛人產乳衆則血枯殺人觀其精血思
過半矣

江寧南治一貴婦寡居月候不調常患寒熱手足或時麻
木且心虛驚悸或心頭覺辣諸治不効診其肝脉弦出
左寸口知其鬱而有慾心不遂也乃以烏藥香附二味
投之二服諸症俱減

宿按男女精血盛則思慾室女媚婦有所思不得則
氣結而血瘀血男思女不得則血精其理一也精血
已離其位漬入隧道故變爲寒熱肝脉弦出寸口者
夫腎主閉藏肝主施泄今肝火不泄逆而上行乃知
男女失合

名醫類案卷之十一終

