



孝如先生医诀

武  
523



青州先生醫酒談

紙  
第 123  
卷

青州先生醫訣目錄

癰疽 肺癰 肺癰

脫疽 癰疽

痔疾

結毒

癰瘡

流注

眼疔

紅疾

破傷風濕

金瘡

反花

疔

癰瘡

梅毒

淋疾

附骨疽

諸疔

諸口瘡 缺唇 咽喉

諸疔

鎖鼻吻 疔瘡

打撲

竹木刺



整骨放平  
失榮委中毒  
婦人諸症

火傷  
天刑  
雜症

青洲先生医談

瘰癧 腸瘰癧 囊瘰癧

胞  
瘰癧ハ痛ハ五テ少ク甚重ク覺ルル一病人ノ肩ノ下ニ瘰癧大如小桃  
尤怪症ナリ大後五六壯ニ大破汁刺之數處出血不癒スル一二三壯  
破敵先鋒大青童師ヲナリ瘰癧ハ瘰癧ナリ右胸腋ニ出ルモノハ至  
テ腸ニ近ク要シ一人腸ノ見ユルモノアリ必死也腋ハ皮厚ク左テ内ニ  
遠キナリニ実ハ腸瘰癧ノ名ハ下レ瘰癧ク何モ腸ニ出ルモノハ水久重ニ  
ニルナリ脊骨内ニ近キナレトモ骨ナトアリテ瘰癧也腸瘰癧杯ハ必死脚  
ニ引ナリ痛ムトアリ何レ経絡ニヒク故ニ未奈前ニ早ク膿管ヲ探  
リ刺ス一キシ多ク水許出ルモノニ膿ハ初ニ稀シ一人脊骨ニ尽ク出レ  
モノニ其二ニ大矣惣体瘰癧ハ表皮ハ死物ニナリテアル故ニ灸ノアツキヲ  
不覚者ニ覺ユルニ至レハ必死ノ症ヲ免スル

下アト瘻他ノ緒意ト大ニケカヒテ至テカタク痛モ少クモノニ  
 膿ノナキ者大ナルニ至テ八十文字様ニ切テ其二三灸スルニ疔ハ瘻  
 劇ナリタル様者其内瘻ハ実ニ屬スル故高ク腫出疔ハ斷ル方  
 ナリ何レニモ肉ノ張出テハタノ白クナル実ニテ直ル者也瘻ノ内藥ハ當  
 湯類ノ血ヲメクラス者ニテ可シ甚ク下ニハ不及シ外ハ膏藥ニテ收ル  
 故内劇シク收ルニ及スシ腸瘻疔ノ是ノ膏藥タルハ當建ノ差ニテ  
 可シ瘻ハ脊間ヲ大島トスルナリ瘻ノ脊間ニ膏藥者甚クテレキ者  
 老人初メ發スル中ニワツルニ寸許ノ大サ成レニ十ヨリ經テ見レハ疔  
 八寸許シテ横ハ四寸許ニナレリ其内寸許云云凸クナルトシヨリ灸スル  
 位テニケカス其内厚メ七八歩モアリ其皮ノ間ノ腐肉膜ハ横ニ剪  
 ナリ其間ニ破敵膏ヲサシムニ不燃ハ中々膏藥ヲ行トモ間  
 ニ右スシ破敵ニテ肉ヨリハ腐肉トナリ上ヨリハ灸或燒テ手ナトテ

燒時ハ上下ヨリメ皮ウスツケリテ取ルナリ其内ウスキ処ヲ切テ  
 可シ灸サレハ出血多クメ脱スルモノナリ如何ニモ毒ヲ行テ治テ施  
 サスト種治ニナルニ或ハ握サ茶ナトスニレ  
 瘻ハキリイル克腐ナリ故ニスツト切テレサスルハ膿出止ニ量  
 業業色ニナル者ニ量テテハ寸許ナト切り取レシヨリ灸テイ  
 タスニ皮ノ処ハ出血スレ内ハ腐肉アル故ニ血ハ出ヌ者ニ灸ハ日ニ  
 兩度スニ切破ト内沸前スル毒外ニ出ルニ傷處ニニ黃液ニテ発ス  
 スルモ因義ナリ其亦ニ灸スニ量ノ廣サニカハル処ヲハ又切テテキ  
 ニ灸スニ隔蒜灸モ透分可シ握サ茶モ透分少レ可用人ノ肥  
 瘻ニヨリテ淺深アレハ大抵六七分位刺スニ差シキリイルノ  
 奥迄切リ過ルニ出血メ不止コ得レシ又切リテ不ニ腫則差置  
 日ヲ經ルヤテニナルナリ又灸日過レハ焔肉焔サテ灸スルヤウニ

ナル者必灸ヲ止リシム

瘡ハ葛木附根用ルイアリ茂故削テ用ルイナリ

大抵湯スル者ハ石羔ノ湯ニ非ズ津液ノ尽ル故ニ昔茂建中ノ用

一レ舌ノ出カタキホトニナリテ湯スル者ハ不治シ口中和メアル

者ハ随分可シ膿后ニハ火ニ鳥頭削ヲ用ルト膿大来止シ矢張茂

故削可シ決大不可用タトヒ附子ヲ用ルモ茂故ヲ兼用スルニ

瘡ハ初葉背重ク覺テ葉ヲ棄テ粟粒ヲナス

圖ノ如シ十文字ニ切リテアルリハ鉄ニテ切リ毛引ニテハサニ切レシ艾

葉ニキリタル内ニツマテ火ヲツクシシタハ少ツク痛カト覺ラレヌヤアノ

葉ハ十キニ段々灸テ腐肉ヲ去ルトキハ火ニイタクアツキ勿覺シ其收

ハ止シ其後ハ左葉ヲ付ルヤウニスルシ又灸スル程ニ因テ大抵少サクイ

タル灸ヲ用ルイアリ又中ノ少高キ処ハ灸ナリ膿管ヲ生テ膿ノ

出ル者アリノ葉ノアルタテ漏蓋灸ヲ用レシ又流注大瘡ヲナルハハク

リニイナリシ上頭廣クナレハ病勢劇キモノシテ高ク付クニ握葉葉

知ヨリ葉中近アツク握又シ燒燬火灸ヨリ者シ劇キ中ニハ用レシ

瘡ハ少高クホニホリトナリテアリ初メ汁スル血出痛故ニ余程見定

タル処ナケレハ致シ難シ思ヒ切テキル一シ皮膚ハ痛トモ内ハ無モノシ又瘡

ノ生ニタルヲ知ラズニテ置テハ後ニ蜂窠ヲテレキルナリ白キ腐生タル

惡候シ先生家ニハ切テテ後ニ灸スル故ニイツレモ痛ヲサレシ痛ニ至リ正宗

ノ説ハ切ラスト云ノ故ニ灸シ生肉多キ灸メ後ヨリ痛ヲケレシ其各々灸

メ腐肉ノ処ニ至テ必ス痛ヲ覺テヌシ不腐肉ノ多キ者ハ始ハ甚ク痛

スメ段々灸タル内ニ生肉ノ処ニ至ト痛ヤアフニナル者也

瘡ハ中次ヨリノ後ニ危候アル者ナリ元ヲ付レシ腐后ニ石遂ノ症候

瘡スルモノ多ク灸タル者ナリテ常ニ二級ノヨリハ病勢ノクシテテ来ル者

名スル無キ者ナリ其ノ度トハ初ヨリヲ熱ヲ見ルモ矢張各スルアリ然  
シレハコト輕キ者ナリ後セズニ切リ甚ク出血ノ爲キ然レ又急症ニ切  
ルモアリ可見合其内燒燬ナラテ表皮ヲ取テモアリ切片ハ文字ニ廣  
ク切止レ中後後者亦切テ可用

灸スル内ニ大尚煩躁アルハ直ニ止ム

對口疔ハ傷ルヲ忘ルモ神經ノ對口疔故ニカナトモ必ス刺ス(キ)方書  
ニ肺癰ノミヲ癰ニイ(氏)在藏ノ何レモ有者其処ニ因テ見ルキナリ肺  
癰ニ生スル者アリ肺癰ノ起ル必是ニ引付ルアル者先ツ大壯ノ毒ヲ用エ  
シ膿出テ来ルヤアニナレハモハヤ當歸劑可シ

腸癰ハ漫ニ切ルカラス一人療セシニ網膜ノ起ル者アリシカニ刺ス(キ)ナリ  
脈癰ハ外ニ膿スルナリ

疔癰モ疔ハ四シキアアリ切取レシ然レ濕キ者ハ急シカケ切止レ何レ切ラ

子ハナラヌ様ニヌレ

腸癰ハ腸外ニ生スルニヤ皮一近ハ外ニ膿潰シ腸ニ迫ケレハ大便膿潰シ  
外ニ漏ラサハ急或ハ刀ニテ切レシ又疔ヲサス(キ)モアル(キ)シイツレ疔ヲサスト脱スル  
者(キ)死ヲ付(シ)膿癰モ先同(シ)切斷セハ僻疔ヲアル(キ)膿ヲ淺クセハ補(キ)  
溼クセハ濕ナリト魚肝補腎ノ藥ハ急ニ淺深ヲ(シ)

肺癰生テ乳七空ノ毒ヲ用シ白散ヲ而シ度用ル(キ)アリハ分許モ用エ(シ)  
疔ニ止者故多ハ用ヒ難シ其内白散ニテ又切テ得タリ

本方排膿散 治肺癰在熱咳似疥癬者 トトロカツラ 荏苒子<sup>エ</sup>

此女粟子 荏苒子 杏仁 右水一分 壯筋一合 丁攪取清水二合内

諸藥各取一合  
囊癰ニ事九斗ニ成テアリシニ清肝養濕湯ニ左藥ニテ愈シ(キ)アレ然  
大ニ用糖アリ一様ニハコトナリ

由皮膚癢ニ疑ハレルシ痛ハ肺節ヨリ下リ腋部ヨリ且肺癰ヨリ膿血  
ヲ以テスル一多シ甚シキニ至テハニ升モ及フナリ此方ハ肺膿散也白散  
ニセシ  
癰ニ吃逆ヲ生スル者ハ難治ナリ何病ニヨラス此症ヲ癒スル者ハ死期近  
シト云ヘシ

腸癰初起者ハ先足ヲ引ナリ少腹如砂者アリ肺ハ節ハリ聖化ニ流ク  
氣味アリ腸癰ハ節ハリ人如キアレハ聖化ニ引カス塊ノ如シ大黃牡丹  
湯ヲ用レ膿潰ニテハ聖散劑ヨリ兎角腐肉ニ成レ膿ニテハ何レ腐  
肉ニ成レ膿ニ成ルニ自ナリ

疔

疔ハ急卒ノ者ニテ年ニアルモノ直ニ足ニ腫レ痛ニ出ル者何ニ出カ  
要スルニ聖化黃連解毒湯ノ要ヨシ

疔ハ極テ痛キヲ強キシ爲ニ切テ内ニカケテナリテ出スヘシ  
疔ハ鼻辺ニ生シテ直ニ背ナト流スルアリ早ク刺シテトラスハ后ニハ  
スルト腫レテクルアル者ナリ或ハ白水ノ如キ者針鋒ヲ出テ死ニ至ル者

脱疽

脱疽痛者ハ未タクサテナルシ痛ヲ不知ハ腐リタルナリ  
脱疽鶏骨ノ辺ヨリ来ル大患ハ不治ノ骨ヲ切ル也ハ生肉カケテ切レシ  
瘰癧ノ甚シキ者早ク切レシ不然則腐爛メテカ又ナリ一婦人中指ノ  
カニサルト半年疼痛不止指頭及花甚大遂并后云爪缺腐去テ而  
疼痛退ルテ瘰癧ニテ指ノ腐ルナト早ク取ヌト腐去指ニ及フ  
瘰癧ハ極テ痛キク爪甲毀腐蝕スル破傷風ニテモ能ハタルア  
レシトハ其俗ニテ中黃下消ニシ是ハ痛モ少キ又本ヨリフトクナルハ  
指指ト云大抵瘰癧ニ似テアル者ニ治ハ同シト



甲疽也凡ノ肉ヨリ湯水入り腐肉ニナリ或ハ黒腐ニナル痛劇ク甚者  
ニ俗指スキト云天蛇毒ヲツマハテニト云胎疽ヲ本フト云又代指疽  
ト云

脱疽多クカケタクキレヌトアリ大ニ節カキルナリ其ヨウナモノ本ヨリ浸  
ニ切止<sup>カ</sup>ニテ失血スルナリ其内浅ケレハ止ラレハ深キモノハ謹テ切カラトメ  
種キモノハ矢張糸ヲカケテ置<sup>レ</sup>ニ種ニ愈<sup>テ</sup>イタレヨキモノアリ多クニテ  
切レル内ニ愈<sup>テ</sup>来ル者アリ氣ヲ自板毒ニテモスコレツムル<sup>レ</sup>レ物体  
腫物ノ上愈スル者ハ氣ヲ行ヌト再愈スル<sup>レ</sup>  
甲疽ハ天蛇毒ニ似レテ疼痛甚シ或ハ痒痛ヲナシ或ハ痒痛ヲナシ  
或熱痛ヲナシ大ニ昼夜寢食セサルニ至ル者ハ破敵被毒ヲツク矢  
蛇毒ハ一名蛇頭疥爪ノ肉ヨリ發濕<sup>レ</sup>テ腫痛ヲナス俗木下  
云瘰癧ハ指先腫<sup>レ</sup>テ痛ヲナス治法同シ

瘰癧

瘰癧ハ初發ニ夏枯草或海藻湯<sup>ヲ</sup>用テ消スル者<sup>也</sup>若夫ニテ消散セ  
ヌ者ハ破針<sup>ヲ</sup>刺<sup>テ</sup>拔<sup>テ</sup>紐<sup>ヲ</sup>拵<sup>シ</sup>ク<sup>レ</sup>シ若<sup>シ</sup>瘰癧<sup>シ</sup>タル者ハ茶<sup>ヲ</sup>用<sup>テ</sup>瘰  
ノ核<sup>ヲ</sup>拔<sup>取</sup>ル<sup>ト</sup>アリ

賈氏曰瘰癧ニ夏枯草<sup>ヲ</sup>用<sup>テ</sup>下<sup>ス</sup>者ハ克<sup>切</sup>アル<sup>也</sup>此血下<sup>ス</sup>ル<sup>ハ</sup>  
后<sup>ハ</sup>版<sup>ヲ</sup>止<sup>ム</sup>一劑<sup>ヲ</sup>一日<sup>ニ</sup>用<sup>ユ</sup>ル<sup>ハ</sup>食<sup>ル</sup>一<sup>日</sup>モ<sup>ナ</sup>キ<sup>ト</sup>故<sup>ニ</sup>止<sup>ム</sup>テ<sup>ハ</sup>得<sup>ズ</sup>ト<sup>ス</sup>  
日<sup>ニ</sup>用<sup>ル</sup>テ<sup>ハ</sup>モ<sup>ア</sup>リ甚<sup>ニ</sup>凝<sup>固</sup>甚<sup>ニ</sup>堅<sup>キ</sup>モノハ<sup>ハ</sup>針<sup>ヲ</sup>應<sup>ズ</sup>ル<sup>也</sup>初<sup>ニ</sup>發<sup>シ</sup>テ<sup>ハ</sup>治<sup>ス</sup>  
モ<sup>其</sup>治<sup>テ</sup>後<sup>ニ</sup>任<sup>テ</sup>タ<sup>ル</sup>モノ<sup>ハ</sup>効<sup>ナ</sup>キ<sup>様</sup>ニ<sup>思</sup>ハ<sup>ル</sup>也<sup>也</sup>  
真<sup>ニ</sup>瘰癧<sup>ハ</sup>至<sup>テ</sup>六<sup>ケ</sup>レ<sup>キ</sup>消<sup>散</sup>ス<sup>レ</sup>ハ<sup>ヨ</sup>ク<sup>止</sup>レ<sup>バ</sup>大<sup>カ</sup>タ<sup>甚</sup>シ<sup>キ</sup>者<sup>ハ</sup>板<sup>ス</sup>メ<sup>内</sup>  
致<sup>ス</sup>ル<sup>カ</sup>但<sup>シ</sup>板<sup>ス</sup>メ<sup>ノ</sup>内<sup>ニ</sup>膿<sup>漬</sup>ス<sup>ル</sup>ヤ<sup>ウ</sup>ニ<sup>ナ</sup>リ<sup>テ</sup>モ<sup>瘰癧</sup>シ<sup>テ</sup>死<sup>ニ</sup>至<sup>ル</sup>モノ<sup>也</sup>  
何<sup>レ</sup>大<sup>ナル</sup>者<sup>ハ</sup>難<sup>治</sup>ナ<sup>リ</sup>

瘰癧ハ初<sup>ニ</sup>發<sup>シ</sup>テ<sup>ハ</sup>成<sup>テ</sup>内<sup>ノ</sup>腐<sup>肉</sup>ニ<sup>テ</sup>ル<sup>者</sup>アリ克<sup>切</sup>開<sup>キ</sup>タル<sup>所</sup>ノ腐<sup>肉</sup>ヲ

取らざる直ニナル者ハ腐葉ヲ瘞シ  
瘰癧ニ夏枯草ヲ用テ其血スル者不應ノレレシ又夏枯草並ヲ  
收シ終ニ克食スル者ハ應スルノ旨歟

痔疾

痔漏ヲ割テ出血不止者ニ決勝ナトニテモ其効如何トスルカラス也硫黄  
ノ油ニテキルリ血ヲ患ル者ハ此ノ内四物加牛皮消シラフテハ克止ルモノナ  
リ血ヲ止ルテ何任手術ニテル

麻疹后ニ痔漏或瘰癧ヲ患ル者甚多シ也少崩ル者ト見ユ先  
年此症ヲ治シタリ瘰癧ヲ患テ后廿六日ニテ瘰癧ヲ瘞タル者ハ故ニ解毒  
劑ヲ用テ効ヲ得タリ

及花痔ハ也 此外堅キ者善症ナリ如圖及花ヲナサスト患痔滑ニハ且管  
アリテ膿汁出者ハ腐葉或ハ切トリテモ愈何程形大ニナリテ恐ルテ勿レ

最モ其能弱ヲ許リテ治フ難ス

鼻痔大ニル者其瘞取者ハ二度ニモ三度ニモキル一レ其内ニヤリセツトシカキ  
鼻痔及花シタル者亦ヨリ外一出血長大ニナリタル者其ヲウカツニ刺シハ  
出血不止者ハ故ニ鉄罐膏ヲ紙ニ一テ其根ヲ巻キ其上ヨリ血ヲカケ  
レシトシメ切シ連ニ切ントスル寸ハ出血ス其根ヲ取レシ又鼻痔初起ハ  
カクリ鉄ニテ切リ毛引ニヒツカケテ取レシ而大跡一セツトシテ用ヒ紙ニ條トナ  
リ夫ニシテ刺ス一レ出血不止者ハ決勝ナリサス一レ大抵七日位ニ取テ止者  
ニアトハ白雲可シ最難破散毎度サレテ可シ

痔漏肛門内一面ニ腐ハ患レ一度ニ切一カラスイタタヒニモ切一レ一度ニ切新  
スハ変症ハカリ瘞レ後々スレハ誤ルナレ凡テ何ニテモ漏而ノ抜テ有  
ヤ者ヤト見一レ糸ニテ縛リ切ハ痛大ニ過ナレヒスニテ切レハ痛セテスニ  
ヤナレハ出血ノ止難キナリ能々考一レ

痔瘻及花より形千敷る子、如ク赤シ肛門ノ口ニアリ腸痔ト相  
似タリ切リ取テ金ニ

痔漏元虚ナ新肉難生者難印左突可貼

痔漏ヲ療シテ后始終風寒ヲ畏リ慎一レ不然ハ風濕瘡口ヨリ  
龍名ノ破傷風等ノ大患ヲ發ルリ予已ニ三人瘡病ヲ愈セシ  
トスル者ナリ

痔漏ヲ加后疼痛ヲ發スル者ハ左突ニ割皮ヲ加一貼スレ

痔漏管ノ使ハ様一日ニ二度ニ及テ者ハ常ニハ常ニハ常ニ生肉ノ  
生シタル先ヲ突崩サヌヤフニ漸クニ別ニ減アラスニハ一ニ痔物ノ往  
物ノ往モ因此得テ一ナリ肛門ノ中ニ痔ノ出ルニ使スル下膿ノ出ル  
トアリ内痔ノ突シ其内一種深ニ出ル臍部ト云者ナリ是ハ突  
難治ナリ其内痔突ハ左突トスレ

一人痔ヲ帯テ后ホリ、ト血未ニテ不<sub>レ</sub>痔角差ニテヤニシニマ月症  
テ元ノ如ク出テヤズ其症ニ血ノ出ニ何トナク如クニワキアリテ大  
元ノメクリ<sup>レ</sup>出レク滞リケント思ヒ其或<sub>レ</sub>向テラ一ニ克<sub>レ</sub>奪メ再ニ出テ  
ザリシトソ<sub>レ</sub>死<sub>レ</sub>タレ

痔ト下管系ノ附ヤフニ大ニ治不<sub>レ</sub>後多<sub>ク</sub>アルトカリニ血<sub>ノ</sub>出<sub>ル</sub>セ又ヤ  
スニ突痔<sub>ノ</sub>出<sub>ル</sub>セ本<sub>ノ</sub>出<sub>ル</sub>ト放<sub>ル</sub>アリ本<sub>ノ</sub>直<sub>ニ</sub>サ子ハ治<sub>ス</sub>ニ最<sub>ニ</sub>痔ノ<sub>ノ</sub>出<sub>ル</sub>ニ  
ハツカケテ引<sub>キ</sub>出<sub>レ</sub>置<sub>キ</sub>コリニ切<sub>レ</sub>シ<sub>レ</sub>トニセツト<sub>レ</sub>痔<sub>ノ</sub>出<sub>ル</sub>ニ最<sub>ニ</sub>出<sub>ル</sub>ニ  
シニヨリ指<sub>ニ</sub>テ推<sub>シ</sub>出<sub>レ</sub>置<sub>キ</sub>最<sub>ニ</sub>ヨリ<sub>ト</sub>ラ<sub>レ</sub>シ<sub>レ</sub>ト<sub>レ</sub>アル

痔<sub>ノ</sub>出<sub>ル</sub>ニ<sub>レ</sub>出<sub>ル</sub>ク<sub>レ</sub>肛門ニ<sub>レ</sub>徹<sub>セ</sub>ヌ者ハ只<sub>ニ</sub>痔<sub>ノ</sub>出<sub>ル</sub>ヲ<sub>レ</sub>切<sub>テ</sub>新<sub>ニ</sub>セ<sub>ス</sub>ハ<sub>レ</sub>愈<sub>ル</sub>ナリ  
又<sub>レ</sub>ト<sub>レ</sub>肛門ニ<sub>レ</sub>通<sub>ラ</sub>ス<sub>レ</sub>ハ<sub>レ</sub>通<sub>カ</sub>子<sub>ハ</sub>ナ<sub>ラ</sub>ヌ<sub>ト</sub>モ<sub>レ</sub>アル<sub>ニ</sub>見<sub>ル</sub>ハ<sub>レ</sub>

最<sub>ニ</sub>痔<sub>ノ</sub>ハ<sub>レ</sub>株<sub>ナ</sub>ラ<sub>ス</sub>シ<sub>テ</sub>數<sub>ニ</sub>テ<sub>レ</sub>モ<sub>レ</sub>有<sub>ル</sub>者<sub>ハ</sub>其<sub>ノ</sub>根<sub>ヲ</sub>切<sub>レ</sub>シ<sub>テ</sub>其<sub>ノ</sub>痔<sub>ヲ</sub>毛  
引<sub>キ</sub>ニ<sub>テ</sub>サ<sub>シ</sub>ラ<sub>キ</sub>鉄<sub>ヲ</sub>ナ<sub>ラ</sub>ズ<sub>レ</sub>但<sub>シ</sub>大<sub>ニ</sub>抵<sub>テ</sub>引<sub>キ</sub>ト<sub>レ</sub>分<sub>ニ</sub>シ<sub>テ</sub>長<sub>ク</sub>ナ<sub>リ</sub>也

たつて各州旅行処を知らずカキナリカマニス奥ニテ也レ此レ奥  
一面ニハ是ヲ度トシテ止ム其内ヨク死ヲ付テ有モテ見ルレ

腸痔ノ大便通マ后出ルル処加ルレ其内肛門不切アリアルハ蓋蓋スレ  
痔ニ劣スルレ亦ノカミニ生スル者世ニ便毒痔ノ者ニ多ク其甚西レ  
痔ハ高業ヲ附ルヲ甚クツリレ克キワタテ又ト決大直止者アルス  
其内何瘻ニテモ亦ヤキスノ多キハ其内一ツ主ト大其治テスレソレカ  
一ツ愈ルト亦瘻大又外愈ヤキ一一度々々ニ直サント思ハレテ  
ツリキンタリハ亦三ツアラハ其内一ツ主ト必ス先膏ヲ後ニ  
付レテハ少々膏ヲ附ヤウレク其先一ツ一ツ愈レハ亦瘻大直止者  
キレニツ一処ニ直サントスレハカキレテ必ス先膏ヲ付ルヲ主ト大直止者  
アルニ先直止者其外能毒ノ者ニテモ其通リニテヨレ死ヲツケ膏  
ヲ附レテ瘻ニ主察ハレテ其方カキテ主膏ヲコレラニ直ス

瘻毒ハトテモ亦出レテ其身ニ入リテ痔ノ如ク多ク密着ル者ニ非スニ  
三年モ後ニ来レバ或ハ大瘻散ヲ肛門ヨリ入レテツレ外瘻ニテハ  
膏ヌキテ瘻毒ヲカルキレ人深ナトトテ

腸痔ニ疣痔ニ並レ者アリ又截リ割見之則或ハ巨黒學止者アリ  
是毒根ニ日流シ蔓大穴膏ヲ入甚色赤色瘻漏ノ遺アリ今形  
状ヲ以テ右ヲカレシ中々難敷

痔漏ヲ切テ后痔痔ヲ棄スル者ハ左突ニ致波ヲ加レ也スレ  
腸痔者ハ小兒ニ血毒子一味為霜年々メ有効

痔漏ニキリテ后落腹ヲ氣ヲ付先出シ急ヲカリレ其キンタルキン  
則愈疾切断スレ又亦ハ甚多クモ瘻亦ハ必一ツ且又亦七ツアラハ其遠  
キ亦ヨリ先キリ愈スレ此才ニ落亦ノ皮ヲレ  
「先此処ヲ知り西在経  
ニ次ニ臨取ニテテ手續アリ其内深キハ六ヶレキ」  
知者一ノ

ノ頑肉ノ成ノミタキタル者アリ。液肉高キ処ハカラアンスニテトリ其カトヲキリ  
落ルニ及テナリ。落ルノチキハ絶テナキ。ナキハ一医ノ程。后必棄ス。故ニ所ニ  
及ハシテ急ルナシ。又至テ此ノシカタキ者ニ拔ヲナシ置具。直ルナリ。後ハ  
此ノ直スモセアリ。又真ニアキテ此ヨリ急概難キアリ。是ハ久字ニテ切止シ  
虫痔並茶方 雄黄 一錢 芥葉 五方 苦楝皮 三方 右箱ノ内ニ火ヲ入レ茶ヲ入レヤリ  
其箱ノ蓋ノ上ニ穴ヲアケ其穴ヨリ薰スル。虫必死ス。痔漏膿アリニアリクモ過  
ル後。友テアシ。又フキタラヒテハカヌ。其内少シハフキタラスト云位ニテ過  
スル者痛不出。其肉色不變者。痛苦々。難ク或常ニ出血多キモアリ。瘰  
瘡石減緊札而坐。不許奉動。不然血併出。大浪華ヨリ来ル。病人知脱肛而守。餘  
モ出テ不收。危極。並ニ湯蒸ニヒタシ和テ呼吸。隨ヒ収ハ蛇ノカヲ綿ニ  
包ミ此ヲ下テ下テ下シタル。茶ハ赤石脂ヨシトイ。リ先生家ニ一医。毒亦在腸。  
一人痔ノ十年餘。モイタレリ。肛門一面ニ腐リタリ。切テ愈タリ。血出ニ不共。

川燒コテヲ吟ヨ。トアテル。ノ  
痔ナト久花スルヤウニテト難治。切テ取モアリ。旁スルテモアリ。肛門ヨリ膿  
如キ子。バキモ出ルアリ。是ハ父メリニ膿ニテハ痔ナトニ出ル。此恐ルカテス  
腸痔ヲ切テ大ニ脱血。激治。此膿ニ至ルモアリ。痔ニ大便ヲ禁ス。シソノ内裏ク  
毒ノツツリタルモノハ痛モス。クテク血モ大ニハ出ヌ。  
先生曰。腸痔名出テ金。破傷。湯石出テ準。應  
蜜泡鏡ハアリ。用ルテモアリ。腸痔大ナル者。イクツモ糸ヲカクシ  
モアリ。腸痔杯ニ用ルテモアリ。腸痔大ナル者。イクツモ糸ヲカクシ  
痔ニ老アリ。牝牡酒肉。極シ。又痔漏ト云フ。此術ニ此ヤウニス。レ血出ル位ニス  
ハ過ル。レフキス。キルト。奇。葉ヲ。點メ。真ニ痛ニス。一。心。得。アリ。一。ガ。論。ス。カ  
ラス。下。午。ニスル。此ハ。卷。及。ニ。ル。者。梅。氣。ノ。タル。者。ハ。愈。ル。ト。ソ。レ  
痔ニ重痔ト云ハ。知モ下ニ瀉アルナリ。エヲキリテ。后。下。ヲ。セ。キ。ル。ハ。シ。然。レ。婦。

リシトモセノ故ニ始ナヨリ久字ニテ下ツラモキルレハ膠骨辺迄モ漏ノルモノ  
ナリ又落宿ノ主タル処ヲ瘡シ置其支穴ニ流シテ行ク故ニソノ源ヲ絶シテ  
ケハ遠方ノ穴ニテ手標ア又灸ニテ攻テ膿ノサハケルアリカタクテ別ニ  
ニ重穴ノ如クニ枝穴ヲ生テ一モアルモノ故ニ灸ニテ攻テ膿ノサハケルアリ

腸痔ナリノ系ハ麻ヨレ消ハモツレ易シ痔漏ハキヌテラテハ肉中ニアルヤウニ痛  
者ニ正症ニ因テ按クモツツケルイモアリ腸痔ニハ腐葉ヲツケス後肉ニテ  
キレカクキ者葉線ヲ用

痔ナトキリテ血ノ度ニ出ルイアリ不苦シ  
痔ノ唇葉ヲサスニ傷ル処ニアタラヌヤウニスレハ肛門ノ方ヨリ入ルソレヨリ  
腸ノ方ヨリササ下痛シ肛門ハ脊ノ方ニアルモノ

脱肛ハ枯葉水荷葉ニテ及シヤワラケキヨリ收ムレハ呼吸ニ從ハ道  
ハカタキニ一ノキニテ入ル処ヲイテヌヤウニササワルレハ枯葉煎汁ヲ

ツケルニ甚妙制シ納テ后大便通シカタクハ瘻並導引或ハ鏡ニテメノレシ  
納腸ハ術ハ本ヨリアルシ然レハ大抵同シヤウノ心術ナリ鼻痔ヲ治ムハ后細  
砂散ヲセントシノ后ニ附ルイアリ

痔ノ反花腐葉ヲ用ルイアリ  
鼻痔ノ深キ者ハ喉ヨリ指ヲサシ鼻ヨリサクリ指頭ト相合レテ切レシ  
クツレ鼻ヨリセテハナク又其内面ニ度モ休ミテハサントル指ニ咽ノ腫ル故ニ

口痔ニ婦人辛條ヲ衣ノ枝由裏ニ生レ根ハ細大如圖六六切ハ出血不止トス  
縮ニテ札リ落タル跡金鎖七黃連湯  色紫色ノ細路ニトフテアリ  
痔ニ逆メ耳鳴目カスニ髮脱タル程ノイアリ又痔ヲ切レ后ハ必ヤ便閉スルイアリ

是ハ道守水管ニテ取  
瘻瘡ハ缺ニテ切ルレ中ヨリ出ル者アリ又内ニ出ル者モアリ  
痔瘻ハ一種ノ瘻ナリ瘻キ者アリ此ニ草及ノキヲ生薑汁ニ和シ煎スレハ又一種

痔瘡人其類ヲ自カニ搥破セテ后梅木湯ニテ洗フニ  
痔漏膿管ヲ見ニは板アリ左右十程アル膿管在ルニ穴ナラハ  
キ者直腸ヲ克見分ニ治ヲ能スニ然セサレバ却テ害ヲ招クニ挫リニ  
シテ藥水ヲサクリ誤テ直腸(可刺)ニ入リテ其分ニ後肛門ニ  
切リ込ニ余ハ後  
腸痔ヲ療スルニ血出ル者ハ実症ニ水血交リ出ルニ虚候ニ

徵毒

梅毒ヲ疑ニ疑者或ハ浮腫ナトアリテ頭痛スル者梅毒本疾の細毒汚  
風湯ニ消毒毒為根加テ本病ヲ治セヨシ  
疔瘡痔瘡トノ痒ニアルハアレ然レ痛ヨリハシシニ痒ニモ有アリハ  
高クハ痛ハ不癒其内平ニナリテ痒キハ愈ルナリ  
疔瘡終ルニ大カク便毒ニシテ又トクハ先便毒ニナルトアルニ要丸別

ニ腫出ルニモアル者ニ梅毒ト付テ之キ置ニシ后ハラテアニコ杯ヲモサシ  
若直ニキルト血甚刺出テ不止メ死ニ至ル者ニ

梅毒ニシテキタルモ下根ニアキタルハ直リカケル水漏ル故ニエソノアキタ  
ルニ毒ナケレハスナイヨセテヨキモアリ

梅毒耳下杯ニ凝血ニ破敵ニ膿潰セス腐ニシ程ヨク取テハカテ  
ヲサレ置ハ破敵ニ加メ取ルモ少シシ難クハ瘻管ニ至リ漸クニ  
取ル者ニ瘻管ニ至ルキモ

師曰下疳腐爛甚ク臭気不可近様ハ大毒ニハ下疳創並七宝等ニ  
無治驗時ハ薑茶ヲ用ルアル人問曰下疳臭甚下疳ナレハ下疳アリ薑  
茶トアレハ上計ナリ然レハ逆治ノ様思ルナリ如何曰善哉向不審ハ尤  
ク下疳腐臭甚クメ諸藥無効位ニハ必死ヲ付可見上計一毒氣攻  
衝ニ或ハ揚梅毒力或面目差明或鼻中乾燥力又ハ咽喉カ論症類

症之及三部ノ攻毒ハ薑葉ヲカケ工部ニ取リ腐臭ハ下部ニテ下解毒  
湯ヲ取リ上下毒氣ニツクテ下毒スル心持ナリ聲言ハ結毒毒水府ヲ  
クテ内毒氣ヲ動シ外毒氣ヲ解スニ味力種及者ハ鉄ヲ切リ破リ  
破敵ニテ毒氣ヲ吸取ラズ孔味ト何異志ナラニヤ夫察諸音家葛根  
加黄ヲ下疳等ニ用ヒ甚奇説ニ方意解レカク東潤子ニツクテ  
ス大用ヒナリ無効者故ニ梅毒丸ヲ服用メ無症ニ下ス余ハ取ラズ虎骨  
解劑ニシクハナキナリ  
下疳瘻ヲ造ル人辨症ニ凝血ニ考ル乱刺メ骨ヲ中黄ヲ貼スニ梅毒丸ノ  
薑葉ハ毒ノ猛烈ノ勢ヲ折モノニメ餘効ヲ得ルハナレ梅毒瘻腔ト云モノ  
皆敗液粘膜中ニ溜リテ毒ニ先ト見ナリ

結毒

結毒丸ニ至毒水府ニ消毒スル漸ク瘦高腕ニ結毒治セヌモノアリ之ハ  
毒アレトモ血氣正ニ虚シタルナリ攻撃ニ及ムト内不生故ニ生レ内ノ生ス  
ル奇良湯毒難湯ノ毒ヲ去ルニ必効アリ梅毒物言杯公專ニ此意  
ヲ考テコレ法當ル最ノ藥汁ニシテ毒水府ノ行ク処ヲ知ルナレ其レヲ  
知テ其レヲ不知

諸毒膿水尽テ后久ク肌肉ヲ生セサル者ハ蒜ヲ摺リ膏泥毒処ニ貼シ其上  
ヲ燒淨ニテ律々履スル若シ蒜ナキハ葱白ニ代ルモ亦可結毒毒瘻  
久年不愈者及テ治療イタシヨキヤウアリ毒動リ又故ニ新ニ梅毒得  
ル者ハ毒動アリテ及テ処在ヲウツスレ度々内通リアテハ必効ナ  
一ニスレ石ハ愈ルルナキ者切タルトモ克高毒ヲ入レトエ愈イタレ  
切ラサカルヤウニナル者其内瘻美ハトカリエ愈メセヌヤウニスレ切ラ  
サカルヤウニナル者ニ梅毒ヲ付ナクシ其内ニ乳道ニ甚近處ハ用捨スレ  
結毒丸ニ出テ楽寐程ノ如ク出テモ諸毒アラハ直レニ穴穿瘻程ニ



梅毒後ニ非ス

梅毒ニ齒齦ニ毒ノ及テ者ハ口瘡ニ流レ易シ流毒ハ齒齦ニ生ルル知リ口瘡ハ齒齦及肉ノ形ナリ

咽喉結毒ハ喉癰湯ヲ用之ニ初メニ五宝丹ヲ用ルトハヤク愈テ要キ日ヲ一ニ必五宝丹直ニラレ者ナリ

張囊ノ結毒ニテクケ突出スルモノアリ此毒抜トスリテ破敵ニテ包クニ此毒才ニ少クナルモノナリ決テ取ルヤウノ莫ハナラヌモノニ丸ニ取

ルナラヌ者ニ少クナリ又ラ又愈多ナリ  
十版ニテ腐リレ梅毒ハ端の九位ニ生シハアケテ峻削ヲ用ヒ共

可ナリ  
咽喉結毒ハ六五宝丹ヨロレカラス后ニヤルニ耳ノ中ナトノイタク覺ルモノ

大カク咽ニ瘡ノ出来ニトアハレモノ

梅毒頭痛ハ數年治セ又者ナリ甚クハ裂カ知シ多ク不治ノ者トモ方ハ

毒本加細辛鷹鐘丸ヲ用スニ  
結毒ニテ新毒ノ如ク凝モナリ然レ凝滞シタル塊何トクナリ凝

流ノモノ多クアルヤナリ氣味アリ新毒トハ午當リ堅軟ナル氣味アリ  
多量トハ大ニ異ナリ流毒ナラハ及花ノ后チ未及肉セサル前ニ解毒劑

淋疾

ヲ用及肉后ハ毒本所消毒丸  
播州ノ淋疾ヲ患フ甚難治ニ大毒弱下ニ向シ水通セズ色々沈澱ニ

臣石菴ニ據層海ノ辺一穴ヲアケ夫ヨリ水取搗ニ大返シタリ又海囊ト  
苦ノ間ニ赤ヲアケ掃シタルモノアリ毎日三四度モ水溜ル寸ハ其術

ヲ施シテ少水ヲ通シ取ルニ  
愈後所據ニテ少水閉ル者ハ伴呂丸可シ特一男リ命張ヲウツテ其腫尿

管渠之水通之... 逆ニ下利水劑ヲ投シタル故其水何少シハ膀胱ニ一日ヲ経テ又如前ノ  
シムニ臨テハ利水劑ニテハ効ナシ因テ尿管ヲ刺テ通セシメタリ此術  
先賢本草ノ術輕易ノ吏ニ非可慎

石淋ハ會陰ニ溜ル者ニ非ズ淋莖中ニ生スル者ナリ又ハ腎ノ口ニ在ル者多  
ク下ヨリ切開キ少クシテ若シ莖中ニ在リ切開キ尿管ヲ取ル者ハ  
其後愈ス年段ハ鶴ノ羽ハ大ナルシテ中ヲ抜キ管ヲ作リハ守ニテナリ  
尿管ニヤシク入ルニシテ愈ス年段アルナリ

石淋ハ大ナルモノハ毛引ニテサシテモソレトシ又モソノ中ニ錐ニテ穿ラセ  
シニ毛引ヲ通シサシテヒクシテ否則カカリテイタシ難シ石淋ニモ色  
々アリテ子仁ニタルヤアナ石モアルモノ

石淋ノ患一ノ通路ニハナツシ遊ニ在テ流タル者シテ大ナルハ根柢ノ  
株ノ如クナリ中ナルハ大石ノ如クナルアリ少シ者若シ如ク推出テ  
ハ前ニ玉ノ者ナリ患ノ邊ニ押シ移ルハ口ニロケルト治分少シ者シ患  
切出ス中ハ縫合ノ后ハ水道少シアサクナツテ通路アルニ支故ニシテ  
不切前日<sup>近</sup>又者ハ淋莖中ノ方ヨリ横ニ切出ス其ノ水出ルハ  
無ルニテ故ニ師家ニ二膏ナリ其ノ水ヲモラテ全ク愈スニ得スモ  
石淋アリ漸消アリ廣年故少キ石ハ出ルニ如シ大ニ出カバ故ニ石ノ  
中ニ穴ヲ穿テ碎テ出セシテ妙ト移スニ又一澤人梅山ノ産處士ノ  
娘也又石淋ヲ患ル者七年十六石大ナリ茶碗重サ七十二支アリ  
石淋疾ニハ鮮毒ニ夏枯中加倍ス膿淋ニハ大鮮ヲ羊紙一枚ニ包シ程  
大劑ニ水升ヲ六石ハ各ニ並シ一日ニ用ヒツクハ血淋疼痛難耐者若  
草有十湯夏枯中加倍スルナリ

淋病ニハ小便閉スル者ハ正教ノ藥汁ニテ朱雀散ヲ服スルニ克ニ

滋陰散 自利者ハ參芪湯加附子ヲ用テ効アリ

滋門後自利者ゾラシト味ニ湯内ニ洗之蟾蜍一ツ附子劑加用也

少便ノホソリテ通シカスルモノハ其中一白雲ヲサス又赤雲モサス湯ハ

石淋ハ湯内ヨリ切開出スレト縫フト少便自利ニル者ニ然レ腸中ニ等

縫カダマカ別ニ針アリ日ヲ過ルト傷口愈テ凡ル故又端ヲ切テ縫フニ

一尋ハ墜胎胎竹残リテ其白リ少便出テ其竹ハ右ヲトテ三

年許モ不愈者アリモ右ノ通リ切リ開キ出シタリハ胎ハ自自然然

体竹本劑杯必トテ早ク出スレ其内腐木根造方大ニ切ヌト出難キ

者ハ下ニ切ヤテ術アリ経路ヲ横切ニス(カラス血出不止)タテ中ニ止

キハ造方宜キ)物何ニテモ此口造アルニ

淋疾瘳子ヲ花毒トメ十八日ニ至ル務テ瘳シ應鐘死蓋版大少モ瘳

瘳

血瘳ハ瘳中ニ血充満テ動脈アル者)根本ヲ摩シ其根ハシ金瘳付

ニ瘳脚錠ヲ添テ其穴ニサス(モト)針ヨリサシ大ニ絞ヲサス(シ昔程向

置テ又ニ條モトサセハ腐葉膜貼テキ)又十日程モ又二三條モ刺

若膜瘳各人ハ五六條モサス(シ夫モ瘳々見定テ后ニス(シ在ノ糸每

日シタルトキハ自然下血ノ通ヒ之クナリテ血紫黒色ニナリ(シ其タレ

カラアニエヲサスニモ動脈各處ヲ見定テ刺ス(シ若動脈或ハ血脈ニ

サスハ至テ膜貼甚キ者)初ヨリ終迄糸許ニテ仕エル(シ肉中ニ其

瘳ノ根脚ノ肉残ル寸ハ必ス其切タレ斷ヨリ又反花スルヲアリ(シ破

敵ニ振毒ヲ貼ス其肉中根脚ヲ見定テ採取ル(シ手術長ニテ得

雅キヲアリ(黄毒)解毒其症ニ透テ用(シ

此散瘳ニ瘳アリ(瘳)神經不循壞大瘳水溜ルニ(シ汁スル寸ハ唯清水ニ

出者着見之則又溜山二日目ヨリ必在起大腕三三日テ死ル迄療ハハシメ  
各々水ノ溜ラヌヤテニ焼クシテ症ハ皆骨ノ上或腕成リルニ少者ハ蘭  
人ノ説トテ相違ナシシテハ脊骨ニ行テ生スル者ハ又方下ニ生スル者モ  
リ又出生時ヨリ頸ニ生テ大ナル者アリ或出生三四日ニ大ナル者アリ  
是ニ症ハ出症ハ青蛇ヲ數日傷メハ克消散メ成ル  
目上痛帯掩目見テアハハテ手拳之別眼克視ルカヲ以テ割テ出  
其核ハ大ナル如桃以法縫葉ヲ傷ルテ鉄唇則知ク又毒者ニテアリ  
眼胞菌毒即ニ葉ヲクハ白色ノ者殺テ肉ノ如キ者ハ如キ者ハ四塊ヲ出  
ス勿論出シキルニ碎ケルハ后耐焼ヲ温テ洗ヒ縫テ三針ハ止テ付ハ  
痛テ止早ク愈ス効ルニナリ縫タル上ヲ名異雜子白ニ付五六日  
スキテニ毒ヲ其ス  
又同症多クハ上胞ノ内ニ生テ漸々大ニテリ胞ヲ大高ク痛ハ如クナル者甲

蟬ノ如シ目ニ生シ毒ヲ毒キリ甚シキハ眼目痛ヲナス者ナリ胞ヲ及シ視レ  
ハ裡スルヲ及筋ニテ切テ内ヨリ粉脂ノ如キ者ホク克殺リ出ス  
大ナル者及テカハワラス矢張エヨリ切ハ白雲ヲ其ス  
氣痛ノ時ニ因消長スルハ動アル者ニテ痛アル者ハ出血大者ハ年有  
一カラス  
大和出障ニ面痛出血少ク新リセハカ落スハシト思ヒ少ク葉ヲクハ一ニ竊  
ニ親者ヲ汗不流ハ症ナルハ先不日ニ大隣家ニ行テ少ク出血散ヲ以テ拭之暫ク  
大出血飛泉ノ如ク精丸大腕大頓死スル症丸癩ハ不可下手難治ハ以  
葉治スル者ニナリ  
陽内痛ハ大サ障囊ヨリ生テ此者アリ中ヨリ針ヲ糸ヲ通シ兩端ニリ  
ハルニキレメ一按毒カラフアニエウサスハシ  
瘡ヲ探置ト后及花メ死タリ血痛ハ甚々大ナル者ハ難取シ大体ハ天テ置

多上片カクニシテ又モノハ年ヲ下サスに可ナルニ移痛ハ大体ニ寸半位  
ヨリ大ナル者見接ス脂痛ハゴホト大ナルモノニシテアリ

咽中ニ大ナル痛出テ飲食ノシカクモナリ白色ノ刺ヲ無出サレモナラハ口  
中ニ推出シテキ切止レ乱切ラレ又處ナリモ腫レテナルハ元身ノ上又  
ヤテニ止ルニ又ヒツカケテカケ鎌ニテキリ愈

或人痛ヲ取テ百日ヲ根ノシサニテ又モアリシハ葎葉ニテカフレル故ニ愈サレテ  
シレテ多ハ如何ナラテ攻ルモ在カタルノ様ノ処ニハ人常ニツケテ上ニ要薬ヲ  
ツケルニ

膈ノ痛ヲ切テ后膈ノ内高サテ寸餘タテ寸ハ五歩分リアリシテ一鉄ニテ  
切タルハ膈膜クハツト少ナリ多ニ全創ノ況ニ從テモ名異ヲ知ス

二十六年前傷冷ノ后大ニ風生シ髪落ノ処痛ヲナシテアリシ大ニ引ク事カ  
アリシキ事

骨痛七類ニ生セルモノハ口中ヨリサシニテ取リヤスケレハ外ニ生セルハ強取リ

カクニ人眉上ニ出シニ刺テ止レ疾セシテモアリト云骨痛ハ骨ノアタリ薄キ  
膜アリ汚水ノ多ルニ骨痛ハ決メ痛ニテハ骨又ナリ切斷ニ在リ

一女子十歳餘者軟白痛ヲ生テ先生ヨシニテキリケルニ難抑如ク萬  
膜ニ包ニケル指ニ破リシ肉ノ如キモノタコリテアリ其後ハ全瘻ノ状ニ

進メシ後骨迄腐リケレリト云后ハ能ニテ膿ヲ去ルニ先骨曹ノ  
者ニ全体骨痛ハ瘻ヤフニ肺起ル者ニ非ス瘻ノ如ク枝アルトモアリ

者ノ麻沸后黄連解毒湯ヲ投服スレシ骨痛ハ歎又ハ投也一スルナリ  
骨ト薄膜トノ間ニ瘻液タコリテ瘻ナ

長崎豊后所<sup>分</sup>ヤ又ニ在門ト云者脊ノ大ニ痛アリテ是ヲヒテキ金蝎  
ノ如キ白虫ニ足出テ生テアリト云タ一人股ニ痛ヲ生シ是ヲ割リ

是賊骨ノ如キ骨出ト云

腸胃痛 血痛のワリモノアリ是モ葉藻ヲ中テ取シトナリ腐  
葉杯モ肩背程ハヒ助又シ脊骨間ハ大ニヒキテ胞ヲ下登スル  
トモアルヤハリ流注スル故ニ兎角腐葉ヲサシ加減必用檢ス  
スレバ頃絶湯ニテ耳后ノ肉痛ヲ取ルニ隨テ生ス后先生乳岩治ニ  
隨テ治ス

疼痛ノ云ハ粉痛ノ萎ナリニ粉脂痛ノ文字ヤテキリ引ニ中膠取  
血痛ノ背ニ出テ形狀枯草ノ如ク出タルアリ試ニ少シ汁大ニルニ血  
逆テ止ラズ位ノ勢ニコレハ血ヲトメテキカラフニエウツサスニ必寒熱  
ヲ發スルヲアル者ニ全体血痛ニ取難者ナルヲトル故ニ六ツキニ一ニ瘰  
ロヨリ及花メ血痛ノ如クニ出タル者アリトニ出血甚キ故ニ天張  
カフアニエウツサスルニ

粉痛ハ皮薄者ナレバ層ヲキ者マナ有ニ其ハ血痛ニ混ニ治スル

氣ヲ引レ脂痛ハ粉痛ヨリヤワカニコラスモノ刺ハ膿ノ如キ白膏ナキ  
者出シ其内ニ膠ニ係アル者ニ其袋ノ傷ニ位ニ刺テハ出ヌ者ヲタビヒ且  
出レバ依者ヲトラヌト亦水ヲ畜ル故ニ隨テサレテ膿ヲ膿潰メ取リキニ輕ハ  
カレテトモナケレ何レ熱ノ出ル位ノハアル者ニ可心得シ血痛ナリ是ハ  
折在テ後サス凝テアル者ニサレ血痛ナトニ疑ハナキ血痛ハ粉痛ノ  
アルモノアリ隨テ取レテ切取ルニ血ヲトメテ毒ニ血痛ニ根アリテ少  
シニ移テヌ者ナリ

江凡其骨耳下ヨリ歡骨ノカケ下ニ腮ニ及テ其大如橙者ヲ生ヌ耳下ハ  
堅硬ニ歡骨ノ方ハ少シ軟シ生シ瘰癧之曰ク粉痛ノ附骨ニ運轉  
セズ不治トテ辞ス

粉痛ハ背脊脇ニ多ク或ハ首第等ニ多ク粉痛ハ年長ニ多ク淺ク第  
一ニ生シ肉痛耳ノ前後肩井辺ニ多ク生シキリケルノ集テ生テリ血痛面

初等死尸上野ニ多シ皮至薄ニシテ骨痛甚定久而無運轉膜ト骨トノ  
間ノ液液ノクシテ生スル者也此才ニ長大ニシテ隨骨トモカニカニ者  
変化在端ナリ在痛ハ之レサレ者ナリ

免痛ハニ症片ニ消長アリ氣ヲ附見一ト早ク不可下難治也然此以湯液  
治者何々有之テ全流氣久ニヨリ髪腐ハ別物ニテエヤハリ肉痛ニメ毛  
髮ノヒント欲大由施環ケル者

浪華ハ故女骨痛類骨ニ生ス先生ヨリ針シ上解根ヨリ内一サ文ニ瘡液  
ヲ出セ凡骸骨ノ高キハ幸ノ如シ即チ手術ヲ以テ平ニ押付視本錦ヲ致シ  
卷本錦ノシク一敷十日ニ大愈然此久年大痛ヲ包ニ皮故愈テ后皮下垂  
テ顔子ニナリ是ハ大奇方敷月用テ顔血常ニ復シ今年斗ニ大再ニ養  
婦人或其妙可漢科

凡痛ノ痛ノ中ニ此ヲ生シテ多クハ女傷寒ノ后物身患ケ凡生スニ但夜ニ痒

多膏投食ヲ禁タルニ診ルニ髪落ニ少サキ瘡アリ也ニ至テ痒キニ頭ニ疥瘡  
大ニ加テ筋ト梅ハハハト粉瘡ノ如シ披針ニテ押出シタルハ白キ凡幸餘イテタリ  
取后大粉輕シ基タルニ愈ス其後如ク病人逐ニ不未試ニ古今稀ニ症ナリ  
脂瘤粉ニ痛ハ餘ノ痛ハ異ナリ先痛ノ致チ文字ニ旁内ノ痛ヲ毛引  
テ引出スニ最痛ハ有セ膜取テ下ニ愈ナリ

痛ヲ引ント欲セハアタテ敷負向テ取后スニ不熱ハ后日反花トナリ世ニ痛ヲ  
誤治シテ反花セシ者多シ也其初發是肉ヲ取后サレ故ニ

附骨疽

足ハ甲ニ附骨疽ヲ患テ時々自然ト出血スル者アリ是足ノ甲湯明鍾ニ  
至氣多血ノ過故ニ出血スルニ至タル者可察

胸版ノ五臟ノ近キ附骨ニ能ヲサスニカラス膜瘡ヲ見ハナリ  
瘡瘡等類ハ五年ニ流瘡セシハ切ナキ者也其内一種石炭ノモノモアル者也未方

毒海多ヤル骨ニ毒スル故難治也

梅毒口甲上唇ニ腐骨出テ鼻近ニ微チリ先骨切トモ引トニテガミツ切  
出シ遂夫丸骨出タリ腐骨ニナリタラハ早ク出スニ由リテハ肉生ニ難シ  
甚痛ニナラヌ者其内未タ生骨ヲ離レテハ肉生ナリソレハ生ク久出  
カキテ故腐骨タテノ切リトハ直ルニキナトノキナトノ肉生薄キ処ナラハ  
切ラキニモ取出サレトシハ肉深キ処ハケレキニ腐骨切ニテ腰ノアタリ  
成ククアリ骨カ出テハトシモナラヌ又アレハ腰ノケタリハ肉ノ至テ深キ者故ニ  
切ラキ難キニモ本腐骨ニテ有腐骨ノ出ル近見死スニトモモ腐  
骨出テニナラヌナリ其内腐骨ニテヌ者アルナリ大カク深キト腐骨ニナリテ  
アル者又骨槽風ナトナリニヤハリ骨槽風ニヤフニ骨ノ出ル中色  
ニ変スルモナリ

骨上ニ流シ流シ能レテ右毒骨ノ骨ニト級スレハ骨生ル者ハ丸血而産ナリ  
骨ニ味ヲ有テ毒ニ敷テ其ニ艾灸大陽氣ヲ助リニ  
骨痛症々ノ骨ノ出ルハ何モ歩行ニサワラス者大ナル者出テ行テ不  
ナリ又骨ノ痛テ少シモナリ者ナリ強テ立時ハ骨ヨク故ニ折リ知  
ルナリ骨ヤ脱版ヨリ骨ノ出ルニモアルナリ

流注

凡腫物流注ノ状ヲナス者因テ論古ス教本邦ヨクニ一ニ匡ナリ正宗ニ云流  
注ハ甚稀ニ何レ流注ノ状ヲ見テ其身體ニ瘰癧ニ有之丸ヲ分テ見  
止レ正宗ノ説トハ大ニ異ニ

唯水血凝リ滞リ腫痛シ動搖ナラセハ場致和肉或強悍湯可ナリ早膿丸  
少ニテモ老若長幼劑ノ一ナリ  
凡テ疔瘡ノ流注或ハ破濕ヨリ流注ニ及テ者強悍本島ニ虎杖草ヲ以テ  
流注散スル也



流注之患下腫痛痛皆月一ヨリ左年ニ秘在ノ足ニテモ凝リテアリセ流  
注下腫症ニハ參朮芪烏ノ劑直ニ三里ニ灸テ幸日斗不愈后流注  
ニハ八鞭骨ノ腫ヲナシテ毒クナル故托裏ヲ用テリ師幸因ニ製テ藥  
用ニテ遂ニ消散セリ

諸毒

凡濁腫塊動丸有テ年ニ應スル者針スカラス  
小兒胎ニ滯蓋腫大ニ者リ先生梅木湯ヲ与テ火吹筒ヲ以テ頓ニ張蓋ノ  
軟ク次シメタレハ愈タリ也術本草中ノ所カニ出タリ  
夏月瘰癧ニ患テ生ルアリ燒酎ヲ以テ温メ丹凡少斗攪洗スニ  
凡諸腫物膿ヲ克推出スニ然テ亦ハ又大ニ腐ル者又腫物一以引テ  
重テ止痛ヲ藥ニハ再ヒ膿ヲナスニ  
諸毒潰后面色青白蓋汗出ル者元氣大虛ナリ

眼疾

凡眼ノ初起ハ眼睫ヲ疼痛忍テカクテ頭痛劇シク往來寒熱スルニ此  
時早ク治テ施セハ克愈

凡眼張破テ出血不著者犀角地黃湯ニ黃芩芍藥用テ治スルニ出血止  
テ后痛猶不著。因脈四通湯可也外蓋藥ヲ施セハ治スルニ  
天行風眼疼痛人其腫甚キ者四物加草決明効アリ  
真風眼者風眼アリ案里節烏睛ニル者權方或下ヨリ七ハ下劑等ニ  
テ散テ一キ者アリトヨリ下ルハ不流必睛突出ス  
眠セ努内カレテテリ元ツ所ニ

一人眼ヲ突テ眼外ヨリ薄キ膜ノ眼珠ノ如クニ出タルアリ少サキ口ヨリ雜印  
ヨリ大ナル物ノ出ルモノニ中々アカキカレシ是ハ呼吸ニ從ヒ少々ツハ入ルニ又  
眼ニ針メタキト年ニ流注ニ知テ又者アリ唯眼病ノヤウニ思ヒアリレニ亦テ

又故却了見ハ五歩ノ竹アリキ

眼胞ノ疾ニ前衛ヲ見ルギリニ血ノ赤ヲ加用ス

友人ノ語ニ眼丹モ眼肉ヨリサスニシルニ向ヨリサレ者色ハ必内ヨリサスニ

シツクヤスニシ口申ノ差モ是ナリ又大ナル者ハ却テ種子ハ直ラヌヲモアレハ大抵

自ラ年ヲ経テ成者ハ菌毒モ披針ニ切ルニシモ内ヨリ返シルニ

又菌大ニヨリソラス位ナリ其大ナルハ痛ナリ内ヨリ粉痛々ナリ者出ルニ

白眼申血終ニ切ルニナリ然レハ血ヲ取タル位ナリテハ先張血ヲ送リテモ

益ナシ

内障ハ荒光スル者ハ不治ナリ白ク見ルニハ必用シテ可也モ其内刺<sup>刺</sup>テ其見

「ナルモノハトテモ不況」

瞳子有疾者神水不出則不流神水出則失明瞳子有疾者十日或十五

日可使自不流

目ニ上指ヲ生スル者ヲ瘰癧云々極常ニ目ヲ掩フ不可見<sup>見</sup>ニ以テ手足ヲアケレハ克物

ヲ見下シ以テ切割其核ヲ出大如桃多后及有餘又不能見全ニ術<sup>術</sup>縮

皮而メヨリ見<sup>見</sup>テ其核出ニ及鉄唇<sup>唇</sup>立方<sup>方</sup>用テ愈故ニ眼胞ノ疾他病

ヲ不用鉄唇<sup>唇</sup>立方<sup>方</sup>ニ從フ

眼辺或唇<sup>唇</sup>ニ槐アルハ内ヨリトルニシモ先主<sup>主</sup>ニ術<sup>術</sup>

眼胞菌毒ハ多クハ上胞ノ内ニ生メ漸ク大ナリ胞ヲメ高く痛ノ如クナル最

大ナル者ハ田螺ノ如シ目モ厥里シテ高く赤クナリ或甚シキハ眼目痛

赤<sup>赤</sup>ニ瘰癧<sup>瘰癧</sup>ハ胞ヲ及シ見<sup>見</sup>ハ重<sup>重</sup>ニアルシテ及鉄<sup>鉄</sup>ニ切ナリ内ヨリ粉<sup>粉</sup>脂<sup>脂</sup>ノ

如キ者出ル夫ヲ克ク絞リ出スニ大ナル者ハ及テカ、ラ又先張上ヨリ

切ナリ路ハ白雪ヲ出ス

倒睫拳毛ハ破折ヲ以テ眼ノ上下ヲ括ニ出シ切リ縫フナリ

諸口疾鉄唇<sup>唇</sup>咽喉

小兒發瘡年針細美ニテ維一ニテ筆ハ不用四歳ヨリ一用トシ  
若痘所升瘡ハ針ニ不法ノ者然レ在痘ハ近年上吏シ數人ヲ救テ  
シ後タリ所升瘡齒瘡ニ至テハ未タ治法ヲ爲久何レ腐葉々々ニハアテ清  
鮮創直シ

上脘漏<sup>一不</sup>漏<sup>二</sup>切<sup>一</sup>出血不<sup>止</sup>者ハ指<sup>一</sup>指<sup>二</sup>押ル<sup>一</sup>故<sup>一</sup>ニ方<sup>一</sup>ヲ製<sup>一</sup>メ其<sup>一</sup>方<sup>一</sup>  
ア<sup>一</sup>クカル<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>ニ硫<sup>一</sup>黃<sup>一</sup>桂<sup>一</sup>枝<sup>一</sup>各<sup>一</sup>五<sup>一</sup>分<sup>一</sup>如<sup>一</sup>攪<sup>一</sup>テ口<sup>一</sup>ニ含<sup>一</sup>メ<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>ハ其<sup>一</sup>克<sup>一</sup>也<sup>一</sup>  
一人上脘瘡<sup>一</sup>ア<sup>一</sup>膿<sup>一</sup>水<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>常<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>擠<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>之<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>推<sup>一</sup>セ<sup>一</sup>膿<sup>一</sup>水<sup>一</sup>イ<sup>一</sup>タ<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>弊<sup>一</sup>ノ<sup>一</sup>揮<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>キ<sup>一</sup>  
是<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>漏<sup>一</sup>内<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>一<sup>一</sup>七八分<sup>一</sup>主<sup>一</sup>方<sup>一</sup>甘<sup>一</sup>露<sup>一</sup>久<sup>一</sup>旦<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>身<sup>一</sup>漏<sup>一</sup>上<sup>一</sup>脘<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>ア<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>上<sup>一</sup>齒<sup>一</sup>跟<sup>一</sup>  
ニ<sup>一</sup>擠<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>膿<sup>一</sup>少<sup>一</sup>モ<sup>一</sup>漏<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>何<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>其<sup>一</sup>余<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>切<sup>一</sup>板<sup>一</sup>セ<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>愈<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>者<sup>一</sup>口<sup>一</sup>中<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>是<sup>一</sup>液<sup>一</sup>  
ノ<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>故<sup>一</sup>甚<sup>一</sup>愈<sup>一</sup>易<sup>一</sup>キ<sup>一</sup>也<sup>一</sup>故<sup>一</sup>少<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>刺<sup>一</sup>タ<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>位<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>忽<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>愈<sup>一</sup>シ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>故<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>塵<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>切<sup>一</sup>板<sup>一</sup>  
ヤ<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>七<sup>一</sup>年<sup>一</sup>術<sup>一</sup>親<sup>一</sup>君<sup>一</sup>メ<sup>一</sup>見<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>  
口<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>上<sup>一</sup>脘<sup>一</sup>ノ<sup>一</sup>少<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>眞<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>年<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>狀<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>及<sup>一</sup>花<sup>一</sup>肉<sup>一</sup>ノ<sup>一</sup>形<sup>一</sup>アリ

一婦人五十餘歲舌<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>舌<sup>一</sup>傍<sup>一</sup>少<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>友<sup>一</sup>肉<sup>一</sup>ノ<sup>一</sup>形<sup>一</sup>アリ<sup>一</sup>而<sup>一</sup>齒<sup>一</sup>銀<sup>一</sup>ノ<sup>一</sup>辺<sup>一</sup>及<sup>一</sup>タ<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>  
先生<sup>一</sup>モ<sup>一</sup>已<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>治<sup>一</sup>期<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>失<sup>一</sup>セ<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>故<sup>一</sup>辞<sup>一</sup>セ<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>病<sup>一</sup>者<sup>一</sup>飛<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>諸<sup>一</sup>流<sup>一</sup>故<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>其<sup>一</sup>及<sup>一</sup>向<sup>一</sup>ア<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>  
如<sup>一</sup>一<sup>一</sup>セ<sup>一</sup>マ<sup>一</sup>ト<sup>一</sup>シ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>其<sup>一</sup>友<sup>一</sup>肉<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>板<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>竹<sup>一</sup>筧<sup>一</sup>黃<sup>一</sup>連<sup>一</sup>湯<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>用<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>舌<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>ノ<sup>一</sup>毒<sup>一</sup>盡<sup>一</sup>金<sup>一</sup>二<sup>一</sup>兩<sup>一</sup>  
一歩<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>董<sup>一</sup>セ<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>其<sup>一</sup>身<sup>一</sup>泉<sup>一</sup>下<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>鉅<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>少<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>思<sup>一</sup>ヒ<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>難<sup>一</sup>キ<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>思<sup>一</sup>フ<sup>一</sup>治<sup>一</sup>シ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>ウ<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>  
其<sup>一</sup>日<sup>一</sup>數<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>斗<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>七<sup>一</sup>旬<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>至<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>其<sup>一</sup>金<sup>一</sup>治<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>未<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>口<sup>一</sup>中<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>見<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>居<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>毒<sup>一</sup>尽<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>其<sup>一</sup>  
其<sup>一</sup>師<sup>一</sup>ノ<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>合<sup>一</sup>葦<sup>一</sup>口<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>サ<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>シ<sup>一</sup>甚<sup>一</sup>妙<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>  
舌<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>上<sup>一</sup>軟<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>者<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>毒<sup>一</sup>ヨ<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>未<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>堅<sup>一</sup>固<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>レ<sup>一</sup>者<sup>一</sup>眞<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>舌<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>毒<sup>一</sup>盡<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>者<sup>一</sup>也<sup>一</sup>  
易<sup>一</sup>シ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>看<sup>一</sup>法<sup>一</sup>口<sup>一</sup>控<sup>一</sup>アリ<sup>一</sup>

舌<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>因<sup>一</sup>梅毒<sup>一</sup>而<sup>一</sup>發<sup>一</sup>者<sup>一</sup>其<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>形<sup>一</sup>凹<sup>一</sup>陷<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>若<sup>一</sup>泥<sup>一</sup>眞<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>舌<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>必<sup>一</sup>及<sup>一</sup>向<sup>一</sup>ノ<sup>一</sup>勢<sup>一</sup>アリ<sup>一</sup>  
治<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>深<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>穿<sup>一</sup>潰<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>上<sup>一</sup>腐<sup>一</sup>肉<sup>一</sup>アル<sup>一</sup>者<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>其<sup>一</sup>腐<sup>一</sup>肉<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>切<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>セ<sup>一</sup>ト<sup>一</sup>シ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>生<sup>一</sup>肌<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>至<sup>一</sup>重<sup>一</sup>葦<sup>一</sup>  
中<sup>一</sup>葦<sup>一</sup>豆<sup>一</sup>並<sup>一</sup>口<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>サ<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>シ<sup>一</sup>合<sup>一</sup>也<sup>一</sup>  
懸<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>風<sup>一</sup>俗<sup>一</sup>云<sup>一</sup>齒<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>齒<sup>一</sup>根<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>生<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>漸<sup>一</sup>々<sup>一</sup>腐<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>銀<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>及<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>甚<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>シ<sup>一</sup>キ<sup>一</sup>者<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>某<sup>一</sup>

涼隔散 厚地 甘露 人中白 セツトシ

蛙候ハ懸ハ無ノ長クアルヲツラシテ色常ヨリ白ニ日三ニ寸七長スルハ水礪  
散付テ消タリ一ツハ扎野取レタリ

舌症ハ木舌ノ如ク腫テ堅ク及肉状ノ如ク甚稀ナル者ナリ硬キ所ニ針  
メ多ク刺リ金鎖也竹茹黃連湯

重舌ハ舌下ニ少サキ舌ノ如ク上ル者生ルナリ一疹状ニ似タリハ多ク疾癒  
ハ丈ニ舌下ハ又ル如キ者何レハ鉄ニテ切り金鎖也又甘露多ク内  
服メ盡

木舌ハ腫キ所ニ針メ多ク刺リ金鎖也又甘露湯

吻瘻ハ吻ニ生スル瘻ヲ云ヒ是モ一種ノ者ナリハ法違テ散付シ  
舌症ハ凡ソシハ丸ヲ出スルハ然レモ毒齒齧及フ者ハ不潔ニ先是ヲ治ス  
ル術ハ腐肉ヲ去リ生モ齒齧ハ其端ヲ愈ス者ナリ

舌上ハ深ク穿潰ナ上腐肉ヲ切削テセムシク瘻生シハ薑葉中ニ葉巨並ヨ  
リト口ウヲ念量シムハ此種瘻ニカフアニスヲサテハ一度ニ交クサス亦瘻眩

ニ瘻種也故ニ由ニ本サスハ此ニ本サシテ瘻瘻甚シキ者ハ一日休セテ又サスハ  
鉄唇ヲ縫ヒ克左右針上下セヌマウニ丸ヲ付シ其内唇ノ長短ヲフハ

多ク瘻ニ針ヲサシ上下サテ瘻ヲナリソレテヨロキ

鉄唇ニニツ切レルハタトシ中ニ残りタル肉ヲ削リテソレニ縫フナレ  
也レニカフハレ金糸又ニカフ縫ハレ一度ニナラヌモナリニハ症ヨリ

ニ多クヨリ種キアリヨリサタキト肉ノツカ又云ハ瘻ハ筋骨向ヲ切テモ  
ヨクハ針回ヲヨクイカクハ切レルハ害ハナシハ瘻ヲ生スルナリシカ

レハケレキモハ瘻ニ抱テ深クカリシ瘻キ物ナシハ如何ニモ  
薄ク浅クメ律ナリ

鉄唇而咬者其多ク者先瘻ヲ治シ不然必ス平均ナラズ鉄唇ナシモ

此兒天秋鼻口瘡之者ハ秋鼻口瘡也天秋治ヲ施スレバ則或腫潰  
スルヲアツカシ

鉄匠アタリ肉薄キ段々ニ厚クナル者アリ一人此ハ薄キ者アリ  
百六十日大抵自ノ如ク肉モ厚クナルアリ

瀝候風干ノ少高ノ穴ニ角針ニ刺ナ血ヲ止ム必愈  
齒痛葛片連葉多ク用之奇効アリ

口瘡ハ齒齦及肉ノ形アリ  
口中出血止方 アカレシエ紅黃精古ルニ味合ナリ

驚言瘡ニ全額ニ可シ古クカニ切リシニ全額ニ治ナリ可シ  
鉄匠ノ破傷湯ヨリ脱ヒクキニ當テ大腫ヲナスモノハ救本所

古症候ハ肉固候ハ筋軟向ノ肉ニ生テ初ヨリ及肉北ヲテ生テ不化シ  
古症者牙齦ニ腐肉ニ生テハ是難治ノ腐甚者舌ヲ半分モ切テ

アリユクノ分ルニ一切ハ血出甚シキナリ

紀州日高郡赤石門者患舌疔有年先書曰是不治ノ者也先可普進  
湯或ハ竹葉茶返湯后以昆布水ニ浸シ舌上ニシキ以燒鏝慰之數回ナリ如ク

スルト三四日ニシテ疔莖葉ニ削病勢少衰  
真ノ舌疔里ク疑テアル処前テ其痕ハ河竹葉茶ヲ付リ其上ニ昆布ヲシキ

燒鏝ヲアテテ數回毎日如キト云  
舌疔梅毒ヨリモ来ル其症舌疔舌疔或舌傍ヨリ生テ腐リ四方ナ

リ甚シキハ羊分クサレナリ  
咽喉解毒ニ初劑ヲ施クナリニ愈候ヨリアル者ハ齒齦ニシク下地

瘡疔ニ皮薄クメテワシタル者ナリ針斗ニテハ口塞リテ數回又溜  
故ニ常切テ溜ラヌヤウニスレ

蘭匠ハ上物重ク高クニテ似タリ故ニ名テ腫テ痛ヲナス切ハ出

此二名正書云行瘰癧一種ナリ黃連解毒樺皮巴豆ヲスリニ也  
効アリ

古候先克虚寒寒熱ヲ辨然レシ由ケルハ虚ニ赤クヌニメリトスルハ虚寒  
血黒ハ実積粉ノ如キ也

銀ニ種ヲ生テ大ヤ枕庚ノ如シ痛アリ衆医割テ血ヲ出ス一一杯許ニ如  
空ニテ數度ニシテ消レ亦曰ノ如クナリ食スル一テラス先生葉原ヲカテ置  
テ十五日ニテ落チ血モ多ク不出ト云

骨槽風ハ齒齧ル處ニ生テ痛劇者ハ寢食セサルニ至ル腐リ膿ニテ及フ  
アリ羊面ニ七有テ見タリ古方葉ハ破殼ヲ内ヨリ取ス疔深ケレハ三枝  
針ニテ外ヨリ剪破リ外ヨリ亡膏ヲ貼スルナリ清湯散ヲ湯ヲ内服スレ

走馬疳ハ十歳以下ノ者ナリ寒症ハ若シ虚症ノ人ハ疳治多クハ死スル者ナリ  
利後后カ大疫ノ后杯ニ生テ有テ大抵懸疳風ニ似テ劇異ナリ加味清中散

加速竟ニ犀角又其管前痛久ニ人中白散滯腫眼ハ小兒ノ涎ヲ流シ口辺赤ク  
ナルヲ云シ天南星ヲ煉リ湯中ニ煮テ

舌疔ハ古ヨリ治スル者ナレ先生葉葉ヲ作リ治スルヲ得タリ或ハ俗疔ハ不  
治ナリ治者ハ舌疔ニ非ス舌疔ハ辺リ硬大固澤少ク痛モ駭馬ニ似テ耐毒ノ舌  
疔ハ辺リ硬ト雖真ノ舌疔自厚ナリ并潤沢ニ様見ルナリ是前治ノ疔

魚雁疔ハ喉痺ノ急卒ニ登テ以テスルニ一候ニ咽嚥ヲ絶塞キ喉嚨ニニハキ  
テ録ニ唇モ不通也六日或ハ九日ニテ大略死スル者ナリ種々ノ吹葉刺能考モ知  
ナレ礪砂ヲ用テ効アリ

蛙喉ハ懸壺ノ長クナルヲ云モ常ヨリモ少シ由シ一日ニ二三寸モ長スルナリ冰  
硼散ヲ付テ消シタリ一ツハ縛ヲ取タリトナリ

鉄盾面裂裂ハ中ノ者短ク唇口トモ違ヒ成者ハ夫故中ノ物ヲ折違ヒノ  
様ニ切テ其毒ヲ方ヲ引付テ瘻一ニ先ニ方ツ、瘻一ニ其口ハ蟻酥ヲ塗

テ後之其正ヲ燒酎ニテ洗ヒカヌカ一膏ヲ付シ  
缺唇ヲ瘳スルノ凡二百人ニ及レ其申向使ノ者ニ千人許有リ小兒生テ聖  
朝直ニヌイシテマアリ又卑一歳ニル者ヲ繼シテモアリ少兒腹中ニテ大  
枵ヲ出シテ推リ居ニ當ル故ニ缺唇ニ成ナリヨツテ切テリ薄皮復止モ  
テ是及一リ

上脘痛頭痛スルモノハ不治頭痛セサレ者ハ治ス腹葉ハ加味清膏散或甘露  
飲及肉セサレ者セツトシ膏ハ破敵或ハ左突ヲ貼ス

咽喉ニ逆キ處ハ腐葉ヲ施シ難ハ咽喉ニ塞リ飲食通リ難キハ救術ナシ

乳疾

和列ニ條甚者ノ母乳當テ患フ初メ易クニ核ノ大ヤ梅核ノ如ク臍下ニ塊  
リテ葉ヲ脹スルヲニ時許ニメ切リ核ノ重サハ五六分扱ハ日ヨリ養熟見  
大脘痛ヲナス固テ致本核ノ爲メ轉ス是即破傷濕ナリ服スルテ六七貼ニテ

甚効アリ又乳ノ固ニ赤葉ヲレ脹ト赤固色左手腕丸ヲ生ス是即流注ノ証  
ニテ致本島ノ症ナリ餘症并諸瘡瘍共ニ如左症アリ余々外諸者ノ真ニ皆

主之凡破傷濕ニ致本島ヲ用テ妙ナリ

又右ノ上症ニ似テ紛レ易キ症アリ即瀉腹所ニ止癰ハ臍下及ハ臍ノ辺

ニ赤腫生雲ノ如クノ横ニ瀉腹其赤色ノ掌中ニ瘰癧數多生シ瘰癧ニ黃色ノ

膿ニアルカ知シ難ク膿ハ水丸出シ此瘰癧痛ヲナク肉中淫癰或骨中ノ

痛者ナリ是破傷濕ノ別ナリ刺防救毒散ニテ妙シ乳毒ノ瘳出ル後ニ

折々止癰ヲ瘳スルナリ或ハ癰濕ヲ瘳スル者アリ瘳症多シ

乳毒多ク首ヨリ垂ラカテ赤ニキ高キ者ノ乳房一両方ノ端ヲ食セシ

ヲ后ニマシタル処ノ大推ニ假点ヲ付テシテ三ニ折リ假点ガコト標ノ

唇ル処ニ食シテヨリ其人ノ高指ノ中ハ節ノ子ヌナリ其点ヨリハ方ノ  
点ヲ用テ都合九ニナル固ヨリ初起ノナリ

乳岩初起原于平愈之来年又再發其形及肉大寸杏ノ如ク線ニ根ヲ攀  
乳三稜針ニ透ルルニ密陀錠ヲ久四五條ニ大腐リ取ルリ此等ノ一定  
ノ術ニテ之ヲ乳岩再發スル者アリ難治ナリ乳岩治后凡當スルト病氣ナク  
リ以下瘡癩不能愈者多ク虛状ノ症ニ隨テ之ヲ用エテ之ヲ聖胡善  
湯ナトノ場合ナリ一本聖胡善湯トハ異ナリ

乳岩患之婦人淫行ヤキヤウニシテハ瘡治タケシキニ淫行アルモハ難治スレハ  
後平ニ大ニテナリ

乳岩ニ散聚湯ヲ試功スルニ夏林草精汁ニ煎服スルニ甚克應スル者或碎巖  
散聚湯ナリ

乳岩再發スル者ハ凡百日斗ニ大腫ル者アリ或一年七六聚ル者アリ或三年  
五年ハ九年ニ再發スル者アリ其三年五年ノ再發スル者ハ散聚湯碎巖散ノ  
聖帝ニ克用スレニ再發スル者ナリ然レニ再發スル者聖帝ニ保善食ノ不食ニ

乳癰一婦人患之其源ヲ鼻ルニ五年以前乳癰ニテ久石湯遂ニ漏トナリ衆医治  
スレモ無効ナキヲカケ切開キ見ニ漏内ニ皮ク半ス尿道ノ如クナシテアリ凡  
癰ハ乳癰ノ治術ノ抄キヨリ成モノナリ

婦人乳癰ヲ治スルニ吾意東洞翁著如吾ヲ用テスレハ克愈ルナリ予常ニ吾  
根加石ヲ用ルニ其効大ナリ強在亦不穩トモ同ニ其然ラサルヲ以テ是ヲ用テ  
ハ石加石ヲ用テモ可シ且和蘇湯方中ニ葛根加石ヲ配セリ予斷曰秘ニ生  
藥胡加石ヲ用ルナリ

乳岩治テ治スルニシキニ石タニテ並ニ方アリ試之瘡熱ヲレテ膿癰ヲ瘡大岩狀  
ニ增長メ死スル者ナリ

乳漏膿汁久シク不愈難愈者ハ先破敵ニ治ノメイヤヲサレ后ニハた突或  
ハ金瘡油或ハサニ善ニ補ヒメイヤヲ刺シ終ニ葛根水治ニ効的ヲ奏用ス  
ルニ又大壯白州散ヲ用ル症ナリ



私岩、瘰癧、以内治ヲ専ラス、レニ口大腫ヲナス者、破傷湯一リ、以轉ナ毒色ヲ  
下レ、腫九ナスモノハ、流注ニ

私核ハ、初起、岩ニ治レ、湯ニ熱シ、ヒクツ、トナトマテ、ニ案ニアル者、岩ハ堅硬不  
如、私核ハ、散聚ノ劑ヲ用レ、ハ散ル者ナリ。

私岩、腫下ニ凝ル有ハ、再聚ノ徵、又少シテモ、平漫シテ、腫キハ、再聚ノ徵、石蓋、私モ  
用、場モ有者、私岩ニ、重聚ヲ用レ、リ、再聚ヲ防ク為、亦、夏、枯中ヲテ

ニキ、ニカケ、露ヲ取リ、大ニ、青皮、甘、赤、末、四、服、何レ、岩ノ、割、后、ハ、散、聚、湯、者、是  
脈、大、更ニ、逆ラ、サレ、ハ、再聚ノ、シ、カ、リ、私岩ニ、重聚ヲ、用レ、リ、故ニ、予、亦、ニ、カ、近

ニ、身、作、メ、赤、タリ、克々、可、考、中、々、薑、茶、有、友、者、ラ、ス、サ、レ、モ、其、症、状、ハ、私核、ノ  
所、出、シ、割、テ、見、之、即、タ、テ、ヨ、ク、ニ、経、絡、ニ、入、テ、有、之、見、之、即、散、キ、形、ハ、更、ニ、是、者、

腫、大、岩、核、打、撞、キ、見、ハ、草、木、ノ、根、ノ、ヤ、エ、コ、ノ、エ、ニ、有、様、ナ、者、ナリ、經、年、日、ヲ、隔、更、  
ス、ル、寸、ハ、色、々、変、テ、ス、カ、ト、見、テ、カ、ニ、割、取、リ、シ、ク、ハ、ナ、レ、私岩、ヲ、出、ス、ル、ニ、キ、エ、タ

鉤吻草、ニテ、蓋、ス、方、ナリ、裁、之、ニ、毒、熱、ハ、脈、應、下、テ、岩、ノ、増、長、メ、死、ス、ル、者、  
私岩、以、瘰癧、后、四、日、目、ニ、雜、子、白、ヲ、止、メ、前、衝、ヲ、然、レ、七、日、目、ハ、至、テ、折、シ、一、婦、人、膿、

成、難、ク、七、八、日、呈、血、許、出、タリ、夫、ヨリ、能、ク、止、メ、三、番、許、メ、三、日、血、止、メ、膿、ニ、成、タ  
リ、是、ハ、經、ヲ、シ、テ、内、ハ、生、肉、ヲ、イ、タ、メ、タ、モ、ト、見、エ

諸症

瘰癧、ノ、水、ヲ、按、テ、世、医、ノ、克、知、ル、效、ナリ、唯、一、時、人、快、シ、トル、ニ、全、効、ナ、レ、  
世、医、ハ、管、針、ヲ、以、テ、水、ヲ、ト、リ、是、也、キ、術、ト、云、シ、長、崎、ニ、テ、蘭、人、ノ、教、ル、処、皆、管、針、ニ、テ

是、ヲ、治、ス、ル、ニ、術、アリ、先、畢、ノ、所、在、ヲ、見、究、テ、其、サ、テ、キ、也、ヲ、克、見、定、テ、按、針、ヲ、下  
其、作、テ、添、テ、至、モ、カ、リ、テ、針、ヲ、按、溜、水、ヲ、サ、レ、シ、如、テ、サ、レ、ハ、區、轉、ナ、針、ヲ、矢、又、扱、テ、溜

水、ト、テ、右、左、実、能、ク、カ、シ、テ、蓋、ニ、シ、テ、近、前、十日、七、烏、頭、湯、ヲ、用、ヒ、テ、石、水、氣、溜  
リ、シ、テ、針、ヲ、下、ス、レ、扱、流、シ、施、ス、ル、一、兩、日、経、内、ニ、大、熱、護、諸、ヲ、養、シ、區、寒、腫、ハ、シ、メ、シ、倍、ス

驚、カ、カ、シ、其、時、清、所、者、瘰癧、根、用、之、ハ、其、熱、解、ス、ル、者、又、キ、毒、胡、加、量、服、シ、モ

アリ根葉腫爛痛腫ニシテ又毛引クニシテ腫ニ添テ入レ腫ヲサスニ腫居而後又  
能クサシ置テ針ト入レ患處ニ透レ清肝養血湯ニ轉スレ九五六十日ニ  
シテ肉膜化メ痊愈

癰疽癩癧ニシテト欲スルニ必ス熱スル者ニ忌時節至ニ却テ清涼湯ヲ用テ之  
サナリ又烏頭湯ヲ用テ之其毒ヲ却スル

癰疽ヲ刺テ清水先カ膿ニ替リ以テ瘻ヲ切シ血水交出ルニ必ス針アリ患處ニ  
成心節アリ者ニ膿臭腐ニナル者ハ其六ヶ敷ニ大毒ニ況テ年段アリ全ク血斗出レ  
者ハ見分スレ

癰疽ニ針セトスルハ先畢カテ遠ク離メ刺メ寸ハ水出テ少シ側ヲ刺スハ水  
出ルマシ海裏ニ引テウラノヨリ水ヲ取テリ

癰疽ヲ試シニ莖木横骨ノ側ヲ刺ニ穴ニ者指ヲ入テ深ク入ル者ハ患處ヲ梅セハ  
患處中ノ水腫中ニ入レニ患處ニ即腸ノ大ニ毒ハ患處ヨリ大便出カ

是ハ慢ニ針スニカラス即腸癰ニ可換

陰一季作降恐非張脈少脈近キリ或指引ノルニハ芥附ヨシ又此症ニメ水ヲリ  
ニカ其<sup>中</sup>膜アリ大ヲ縫テ以テ腐ラシテ前ヲ子ハ又再々スリ

亦ハ腸癰ニシテ是合ルハ先梅毒ニテ患處ニ引痛ニ腸癰ハ血塊ニ似テ者醫釋  
セズ上和下聖手丸

癰疽大カ南ルハカクカク凝リタルニ三角針ヲ寸斗アレシニ凝血ニテ血出又患處ノ  
本ノレ和ナル処ヲ刺スニヤハリ血ナリ少シ薄キトニ其全治ヲサスニ準例スルヤ  
ウノトモアハレシ上リヲ畜一トニ

一程癰疽ニ似タルモノニ大腸ノ患處中脱シテ下リテリ其微ニハ患處ヲシテ蓋汁  
出ルナリ此症ハ必ス莖根ニ空凹ノ処アリ他人症ハ不然者ナリ所州ノ人ニ其凹処ニ  
丸ヲ珠カキモノヲコシテ其凹処ニ當テントレ平痺ニテクテリテコケ其間脱シ  
不下ト云柯<sup>レ</sup>難治<sup>シ</sup>又張脈少脈出テ夜ニ多シトニ年ニ揉ミ入レハ多ク患處中

ニル老ニシテ又腸積疝実ハ水丸ノアリテ出ナリイツレタレキ其内癰疝疝  
疝トモ初起ニ老加防牡苗ヲ用テアリ克消散スルアリ然レモ兒向ノ一  
癰疝ハ張莖囊中ニ入テアル者

疝ニ張莖者リ水ノ出ルアリ水ノ漏リキニホレハ水出ル水疝ト云キ  
又腸ノ老者モ腸ノタレテナリ又腸ノタレモ糞汁ノ未ルカハレ子何レ張莖  
ニハ大腸より近キハ張莖ノ結毒ト糞臭ノ有リ腸ノ出ル者決メ  
刺ス一カラス刺テハ死ス疝ニ疝傍絞痛タル者モ疝ヲ其効アリ  
疝莖ハ張莖ノ偏大ニナル者ハ其張莖ノ寸ニ取張根ヨリ上ニテ其極  
ル処ニ点シ兩傍ニヒクテ一寸ノ灸スルテ七日位ニ灸テ疝ノ教ニ奇効ヲ奏ス  
差不應者ハ張莖ヲ針シテ能クサレ置ケルルレカレ其莖ヲサシテ大莖  
ヲ瘞スル者ニテ多ク瘞カヌル者何モ命ニヤルハナシ  
一疝血外ノ主タルニテ疝ヲ瘞タル者疝甚キ者ハ深ク刺一カラス一人刺メ

其口ヨリ白ク爛レヌ花ヲ瘞スルニ至レカレ何モ針ノメテ非ステテキタレ  
自然ニ膿潰メ死ス者辞メ治セサルニレカス及テ疝ヲ汚ス者ナリ  
癰疝ハ水血腐肉ニテリ腐肉ハ痛アル者針スレハ水ノ知キ者出テ死ニ至ル  
トヒ針セズニ自ラ出ル様ニナル者又交リ出ル皮膜ノ血ヲ囊中ノ血ヨリ分別  
シヨリ臍腐ニシハ必在疝ヲ瘞スルニ在復命尚有効ト見ユ若ク壯陽ニテ  
汎ス大人ハナラズ近ニテ不潔  
血疝ハヤリノ癰疝ヲ考テリ也ケルニ便毒ノ一名ヲ血疝ト云ハレナレカレ  
疝ニ母ニテ張莖者ニテテ便毒処ニ有テウタカイ名付タル者亦名可兼ス  
疝ノ大サモ膿錯ノ如レ披針ニテ刺シタルハ血射出ルハナシモ疝大ニ能ク  
カス置置者メニ抜タルハ微ク膿氣ヲナス亦能クサレテ疝格別クサラス漸々  
疝ノ疝ヲ瘞シ囊ハハレメニ倍セリ何レ不潔者ト云  
癰疝ヲ瘞セント欲セハ老其瘞者ヲ知レ張莖偏盛自若トメ漸々膿大

凡此流瀉之術以施之得震震也アリテ消長之痛ハ脈ニ引者出者  
按之少毒少脈有テ腸ヲ推ヨリテ大腸再震一下垂スル者ト見テ予  
老年此症ニ術ヲ施シ大便針ニ隨テトリ臭丸堪一カラサリレテアリ必是症  
ニ術ヲ施スル勿レ腸中ニ積ル故次才ニ腕脈ヲ見シ遂ニ余ヲ損スル至  
ルニ種厚偏盛ノ症ニ大衝氣ヲ出シ遂ニ脈内ト成者其脈内ハ剪刀  
ニ割或ハ積毒ノ毒ニテ腐スレハ治スル其軟ナル処ハ餅ヲ以テ次ヲ施スレ  
聖唐菓ノ甚ハ克瞑眩スル処故毒ニ治ヲ施セハ誤ルテ有リ慎ムレ

破傷風 并 濕

先言破傷風ハ多ク瘡治者ノ角才及諸ハ不治初ハ項背拘急戰慄スル  
者輕症高根湯無毒子虎杖並用ス妙ナリ症口痛楚者先鋒或中黃可  
症ニ至テハ如聖散ヲ用テ左應スル者又右右ニ針ナ多効アリ  
破傷風初ハ項背拘急或言驚寔院或寒慄スル内ハ可治方流在湯輕症ハ高

根湯或羌活湯如毒馬子虎毒スル者ハ如聖散ヲ用テ應スル者奇方又方  
輕子ハ毒馬子虎杖並用ス妙ナリ症口痛楚者先鋒或中黃可  
梅風古名ナレバ實ハ破傷風ニ在苗トト一年七二年七不愈或突出高ク腕  
アリ治方常ハ破傷風ニ因レ高ク腕ヲ水ヲクレノ如ク有ハ青蛇跡左突或至雲  
破傷濕破傷風流注ハ自テ別ナリ破傷濕ハ濕或ハ金創或針子批毒ヨリ濕凡  
テ下注丸僅シ之便不利者ハ或脾本府標ヨシ破傷風ハ衝中症或竹木刺金創ハ  
勿論ノ在ノ如ク風ノレニコニ塔背能語言寔寔四肢拘急甚ハ角才及張兜角  
心下ニ衝アリ元氣自是迫スル者症ニ隨テ葛根湯加急毒子虎杖或加羌活或  
知照聖散或羌活湯或桑白根症アリ其中中劑ヲ用テレ在甚用湯所大事  
甚及ハ茶餅不<sub>下</sub>百湯之効者ノ合右ニ針スルテアリ知レテハ茶餅克進者  
破傷風ニ是様ニ通アリ毒氣脈部ニ攻ルハ甚ケレ経路内ニ有テヤ隨分驟  
アリ故ニ右ニ杯サガハ卒効ヲ得テアリ又流注ハ何レニモ丸血凝滞ナリ生ト

胃の下(甚誤) 余宗不然( 實事: 微アハ時ハ各々多ク試驗陸實功流注) 圖ハ  
誠ニ可笑( 甚キ) 余ノ家ニハ流注ト云ハ何足指或ハ症カ未出シレニ水丸ヲ各ニ症  
只全愈テ二十日許而眩或昏或肩或手肘ニ有漫腫多致最初往來寒熱之於  
痛不可忍者( 其後疼痛頓ニ止是ニテ口ヨクナシ極ニナリ膿水在腐爛ハ中々  
凡匠ノ眼ニ見出ル、者ニ冰ノ膿ト膿管ヲ見方下被針ニ刺寸ハ膿水甚多ニ二  
升斗リモ出虚脱シ為キ者ナリ故ニ元ノ内托ノ劑ヲ用テヨシ刺サルマニ病今  
看守ニ后妻ノ義ヲ莫シテ置シ不慈格ニ医者ノ誤流トソシリヲ愛ル者ノ  
右手ニ症アレハ毒丸流注シ右手処々一流シ注ク者( 是モ眞ノ流注ニ陳実即ノ圖ノ  
如キハ可笑彼ハ内症ト取ル故) 余宗ニハ右ノ三症区ニ外症者ノ者ナリ其年  
膿液流注アリ又瘡流注骨ニ在リ審病症區施之勿誤紙ニ瘡區留驗ハ別府  
録ニ記ス 鎖鼻 鎖吻 鎖肛 鎖舌  
鎖陽ハ人モリテ皆異ナリ者( 是ノ各々ヲ用テ剪刀ヲ以テ之ノ膿ヲ出) 下ヨリ切  
或一皮アルアリ或鼻ニ薄皮アルモアリ或鼻ノ膜ニ在アリ或尿道如  
キレ孔ナリ其孔ニ刺ニ重ノ少キ瘡( 大豆ヲ入次オニツナ三時ナリキ  
引出スニ内ヨリ皮出タリ其ヲ切テ以シタリ)  
大切ニ婦人瘡レニ是ハ一度キリ指ニ挿リレニナクノ膜アリ( 瘡身白  
初指一本ニ破リ去ヨリ二本ニ本ニナリナリ) 瘡身ヲ近ルニ張質ニ白雲  
ヲナリヤヌクク( 尿道ト肛門ニ薄皮ニ重ニテ漏ルニ一ニ暴卒ニ術ヲ施セ  
ハ誤アル者) 克々丸ヲシツメ治瘡スレシ  
鎖陰モ鎖肛ノ如ク被針ヲ以テ切割レシ何レ指ニ本位モ入位ニテモレシ  
前例ヲ指シ二本位入克々擇リ明レト隨石孔大キナル者( 是モ其子官  
迄モツテリ) ナモ六ヶ敷( 餘程腫セサレハ治瘡必死又者( 是ハ水道管ヲ  
サレヲキ肛ノ方モツトキ餘管ニサレテキ其切誤ニテナレハニ手張切向( 其  
サレタル者) 切指シテ( 此ハ瘡實ニ被敵ヲ塗差ヨキ尿道ハ濡門故隨石孔ヲ切)

或一皮アルアリ或鼻ニ薄皮アルモアリ或鼻ノ膜ニ在アリ或尿道如  
キレ孔ナリ其孔ニ刺ニ重ノ少キ瘡( 大豆ヲ入次オニツナ三時ナリキ  
引出スニ内ヨリ皮出タリ其ヲ切テ以シタリ)  
大切ニ婦人瘡レニ是ハ一度キリ指ニ挿リレニナクノ膜アリ( 瘡身白  
初指一本ニ破リ去ヨリ二本ニ本ニナリナリ) 瘡身ヲ近ルニ張質ニ白雲  
ヲナリヤヌクク( 尿道ト肛門ニ薄皮ニ重ニテ漏ルニ一ニ暴卒ニ術ヲ施セ  
ハ誤アル者) 克々丸ヲシツメ治瘡スレシ  
鎖陰モ鎖肛ノ如ク被針ヲ以テ切割レシ何レ指ニ本位モ入位ニテモレシ  
前例ヲ指シ二本位入克々擇リ明レト隨石孔大キナル者( 是モ其子官  
迄モツテリ) ナモ六ヶ敷( 餘程腫セサレハ治瘡必死又者( 是ハ水道管ヲ  
サレヲキ肛ノ方モツトキ餘管ニサレテキ其切誤ニテナレハニ手張切向( 其  
サレタル者) 切指シテ( 此ハ瘡實ニ被敵ヲ塗差ヨキ尿道ハ濡門故隨石孔ヲ切)



大海ヲ清リ膏ヲ膏ヲ金合ニ様ニ鍊シテ其髮際ニ引込ニテツケリ日  
々膏ヲ其メ三旬許ニ大愈タリ或箱口ト云フ程ナリ

金創

金創ヲ洗フニ燒酎ニテ先創ノ血ヲ洗ヒ去リ創ヲ洗フ様トスニ此創<sup>在</sup>羊刀  
位ニ移スレ長クサス丁ハ愈クニ<sup>得</sup>シニ三日指ヲ痲氷居サシハ取テ可  
也膏ニカフトムアリ也大突<sup>能</sup>ヲ用ニト欲セハ雞白少<sup>レ</sup>煉<sup>テ</sup>石炭<sup>ト</sup>シ市  
雲<sup>ト</sup>ニ代<sup>ル</sup>モ可<sup>ナ</sup>リ

又石ノ症ハ前術ヲ用ヒ難<sup>レ</sup>故ニ市雲<sup>ニ</sup>決勝ヲ煉<sup>テ</sup>金<sup>ニ</sup>前術<sup>ニ</sup>代<sup>ル</sup>又市雲  
ニ卵白ヲ煉リ交リテ可<sup>シ</sup>如此<sup>ニ</sup>是<sup>者</sup>ハ白雲<sup>ニ</sup>モカフル<sup>ニ</sup>ナリ

金創家服中量色ヲ甚<sup>ク</sup>者ハ血瘡ノ微ナリ又曰吐逆<sup>上</sup>ニ逼<sup>ル</sup>者乾薑  
煎連<sup>黄</sup>三<sup>分</sup>尚<sup>克</sup>應<sup>ス</sup>ル<sup>者</sup>ナリ

跌ノ症ハ洗フ用ヒカルヨシ若<sup>ク</sup>用ヒテハ隨<sup>分</sup>減<sup>ク</sup>サス<sup>レ</sup>又膿<sup>ノ</sup>少<sup>ク</sup>シテ洗<sup>ハ</sup>ル

奇方アレバ今不用<sup>テ</sup>キヌテヒヲ用ヒ膿<sup>ノ</sup>症ハ前術ヲ用<sup>テ</sup>分<sup>ハ</sup>キリセテ  
末<sup>ト</sup>シ加<sup>ス</sup>シ<sup>テ</sup>膿<sup>ノ</sup>症ハ手早<sup>ク</sup>洗<sup>ヒ</sup>縫<sup>ハ</sup>シ<sup>テ</sup>若<sup>ク</sup>膿<sup>ノ</sup>ナ<sup>ク</sup>ニ<sup>テ</sup>燒<sup>酎</sup>創<sup>中</sup>

ノハ必<sup>ズ</sup>膿<sup>ヲ</sup>テリ<sup>ハ</sup>口<sup>ノ</sup>出<sup>シ</sup>レ<sup>バ</sup>若<sup>ク</sup>膿<sup>ノ</sup>中<sup>ニ</sup>膿<sup>ニ</sup>ナ<sup>ル</sup>者ハ異<sup>ニ</sup>去<sup>テ</sup>蜂<sup>毒</sup>ニ<sup>テ</sup>救<sup>ハ</sup>セ<sup>ル</sup>也  
胸<sup>ノ</sup>喉<sup>ノ</sup>孔<sup>道</sup>ヲ<sup>テ</sup>洗<sup>ハ</sup>ル<sup>者</sup>治<sup>テ</sup>得<sup>ル</sup>ト<sup>モ</sup>アレ<sup>バ</sup>羊<sup>刀</sup>長<sup>創</sup>アレ<sup>バ</sup>終<sup>ニ</sup>ハ<sup>黄</sup>泉<sup>ノ</sup>

案<sup>ト</sup>ル<sup>ニ</sup>金<sup>創</sup>ノ<sup>症</sup>ハ羊<sup>刀</sup>位<sup>ノ</sup>ニ<sup>テ</sup>洗<sup>ハ</sup>ル<sup>者</sup>治<sup>テ</sup>得<sup>ル</sup>ト<sup>モ</sup>アレ<sup>バ</sup>羊<sup>刀</sup>長<sup>創</sup>アレ<sup>バ</sup>終<sup>ニ</sup>ハ<sup>黄</sup>泉<sup>ノ</sup>

都<sup>テ</sup>肺<sup>部</sup>ノ<sup>症</sup>ヲ<sup>瘡</sup>ス<sup>ル</sup>ニ<sup>隔</sup>膜<sup>ヨリ</sup>上<sup>ノ</sup>症ハ若<sup>ク</sup>治<sup>テ</sup>知<sup>ル</sup>レ<sup>バ</sup>如<sup>ク</sup>淺<sup>症</sup>不<sup>苦</sup>在<sup>隔</sup>膜<sup>ノ</sup>

リ<sup>ハ</sup>下<sup>ノ</sup>症ハ隔<sup>膜</sup>ヲ<sup>モ</sup>治<sup>シ</sup>鉄<sup>炮</sup>茶<sup>先</sup>腐<sup>ラ</sup>ズ<sup>ニ</sup>創<sup>口</sup>初<sup>ハ</sup>乾<sup>咽</sup>大<sup>合</sup>痛<sup>者</sup>

金<sup>創</sup>家<sup>服</sup>中<sup>量</sup>色<sup>ヲ</sup>甚<sup>ク</sup>者<sup>ハ</sup>血<sup>瘡</sup>ノ<sup>微</sup>ナリ又曰吐逆<sup>上</sup>ニ逼<sup>ル</sup>者乾薑  
煎連<sup>黄</sup>三<sup>分</sup>尚<sup>克</sup>應<sup>ス</sup>ル<sup>者</sup>ナリ

陽<sup>經</sup>ノ<sup>症</sup>ハ若<sup>ク</sup>治<sup>テ</sup>知<sup>ル</sup>レ<sup>バ</sup>如<sup>ク</sup>淺<sup>症</sup>不<sup>苦</sup>在<sup>隔</sup>膜<sup>ノ</sup>

大<sup>屈</sup>伸<sup>ニ</sup>難<sup>キ</sup>者ハ可<sup>ラ</sup>ズ<sup>ニ</sup>其<sup>本</sup>筋<sup>至</sup>ノ<sup>循</sup>ス<sup>者</sup>ハ<sup>其</sup>本<sup>筋</sup>ニ<sup>シ</sup>テ<sup>ハ</sup>十<sup>ニ</sup>專<sup>ラ</sup>氣<sup>ヲ</sup>運<sup>ス</sup>

ラ<sup>ズ</sup>ニ<sup>氣</sup>充<sup>運</sup>ス<sup>ル</sup>之<sup>ニ</sup>從<sup>テ</sup>運<sup>ス</sup>氣<sup>血</sup>復<sup>セ</sup>サ<sup>ル</sup>者ハ<sup>一</sup>カ<sup>ラ</sup>ズ<sup>ニ</sup>血<sup>脱</sup>ス<sup>ル</sup>者<sup>ニ</sup>本

折刺ヲ移之ハ腸員腸勝スル故アリ

実刺ハ二寸以上者可縫以下ハ不可縫アリ

腹刺ハ縫ヲ用之ハ必非其苦ク之ヲ以テ刺刺之可シ

腸刺者腸ヲ移之ハ硬メ入り難シ以テ焼耐克洗之ハ乃速ニ入之當ニ腸ヲ縫之可縫

余不則腐大ニ大便出

箭刺鏡刺ハ以テ洗變刺ト同シ克洗之難即左突ヲ貼難者ハ箭刺ヲ貼之

重者ハハルヤナリ用

鉄炮瘡ハ以テ焼耐洗之ハ左突能入之四日若瘡膿々尽則厚鉄炮瘡手術ヲ

段々ニ倉卒述及レ難シ

鉄炮ノ至不能者其後置之レ若不能レハ不苦又四五日過ルハ破肉腐肉ノ膿

ニテリ其時擇ハ至少トモアリ能ハ血毒モ打トク可縫諸箭刺四者皆縫之刺

ハ焼耐ヲ以テ洗之或縫杯スルハ后必破傷也ヲ生ス

咽喉ノ瘡血氣道ニ流レ入テ氣道ヲサカリ氣絶スルコトアリ是ハ急ニ手術ヲ

以テ克シサレハ之縫終テ后云亦氣候ニ血流コトアリ其術ヲ行ハ克洗之者

手是ノ刺動脈血脈ニ當リ出血ス守世医ニ守斗エテヲ扎レハ血亦止

サルコトアリ思フニ委中尺沢十ヨリ血ニ取ルニテヲ扎レハ克洗之理ヲ考シ

凡金創出血ヲ止ル其理ヲ窮メ其動脈ヲ知守ハ不止ナシ

金創ヲ洗フニ焼耐六分ニ口サハト四十分一テ用ルコトモアリ又山中ニ焼耐

中ハ諸白ニテ洗フテモヨシ

金創家醋酒茵ノ毒去草也幸ノ毒去之ハ慣然房事モ慎シシサセテ

木ノ子毒松茸推草ト云フ

灸道少ク有瘡者可灸羊有瘡者死灸道羊有瘡者可灸創金瘡后トク

多ク用レハ凡三日斗癩水尽テ后ハ不用血ノ毒出内ニ勢ヲ見テ早ク按セ

ハ昔昔ノ毒シ密シ后ハ毒トシテハ不止



倒腹ハ斜カド多クモスト甚ル多キ処ナリ且虎ツキカメシ皮ヲヨク見斗  
ヒヨキエトニ切レシ不然ハ或ハ眼閉ラレヌヤウナル者(松別)ニモツ葉クニ  
ルイナラヌ(眼皮ナリナルホトアル者)竹ニククルハ至テナヤウ者故アシ、

腸内産物破裂シタルヲ縫ケルニ糸ヲ三糸カクタル時口ノ糸ノ辺ニ紙ヲ厚リ  
折テ添ラレケル如何ト云ニ或曰其縫タル処ノ糸一方ニ深クヤリ一方ハ浅ク  
カリ故ニ紙ヲ厚ク多ク向ノカリシ方ハサミシ内ノ糸又後トトサレトナ  
レラハ外ノ糸モ紙ヲ厚クシ一人曰実ニ先生ノ一方ハ浅ク一方ハ深クカリ故  
ニ其後引伸ハシワリテ切口ヲ相添ヌモノ故ニ厚ク紙ヲハサケテ其ヲカト  
知ラロソカシムル(何モ因ノ切レ故ニ然ルニ非ス若シ其エラハ三糸厚ク  
布クシ其上ニ肉ノ切レヌ為紙ヲシク者)一枚ノ紙ヲ用ヒテ不厚スルテ  
縫ヤウハ皮ノ薄キ処ハ二分トモエニルヤクニ凸如此高クナルテ縫レモ其後  
此如ニ相合メ鉄履ノ如クヌフ寸ハ愈タル后ハ地面ヨリ早ク丸(凸)縫テク寸

ハ愈テ后地面ヨリ高クナルヤクニ成テ甚ヨクシキ(此ニタトヒ皮薄キ処ナリ是  
如クニ縫故ニ付タル)

一婦人淋瀝ニテ張門ニモレシニ上ニ云通り創口木綿糸ヲ入れカケ引出シ縫  
フ(先生ハ縫シ糸ヲ引長クシテカレシレモ常々引出シ糸ニサワリテ  
寫シ夫ヨリヤリ木綿糸ヲ敷シキテ夫ヲ引出シ糸ヲ切レシカレ木綿糸ヲ引  
出シ創口ヨリサシテハ創口廣キ故寫シ創口外ヨリサシ抜出シキソレヨリ又  
創口外ヨリサスカヨロシキ)

一人曰ニテ張門ヲツカレシ婦人アリ顔肉ニテ腫タリ后愈  
脊骨ノ根ハナレタル者ハ必ス死ナリ必キ豆ノ痔スル者ナリ  
突傷キニ縫テ深クサスト及テ大ニ腐爛スニテアアリ浅クサストニ又症ニヨ  
リテ深クサストナリ

金創ニ腫中黄色ハ見スハ脱血ノ徴

額三寸と瘡ハカスルヲ用エ不縫而可也自瘡口舌各開左取一寸  
眼胞瘡ハ者細糸ヲ以テ可縫而以雞卵調フ毒在裏ヲ貼ス四日ヨリ前後  
加キリシ血貼ス

鼻瘡ハ者ハ當瘡之時ニ針或ニ稜奇可緊縛之否則后必存喘斜血  
氣道ニ入者神氣氏ノ胃脈忽絶可考絶不愈人者瘡之后以治術行血ニ  
絶時血外出故血ニ氣道若入氣道而氣絶者急以法瘡在隔膜上者不違  
速必死血在膈上者重之又右腹者近臟腑故不用針

瘡若カレテ膿特ハ皆膿ヲ瘡口ハレトシ立瘡ノ取ヤハ出血多トスナレト曰  
リ瘡々上枚ツハ年トシレ取様ハ片午ヲ瘡ヲ柳一ト四辺ヨリソラトトシレ此  
取寸ハ必正有瘡ニモ又盡スルナリ

金創膏不大便不利扱ハ必四日モノ后ニ生スル者  
饅頭粉ハ小麦粉ノ上品ナル者ナリカスカイ膏ニ用之カスカイハ克カハクニテ

押テ居ルニシ

胸ノ瘡ハ公ツカシ咳ト出ル者ニテレメシイリコレヲ白リサフクニ用エサフクニハ  
胸中鬱積ヲサク或ハ産后疫症昏冒譫語スル者用ル此ハ愈<sub>臣下</sub>脱文  
瘡瘡一寸ノ瘡ハ一針又スレ能ハロウサイ一リエニテ白レシ凡テ金瘡ハバシリ  
カレカブルトアリ金創油トテ用カケキ

瘡瘡メイキヤニカブル者ハ金創油ニ椰子油ヲテリセ入レシ  
結喉処ハ即氣衰アル処ナリ氣道ハサク食道ハ大ニメ氣道ヲ包テアリ鼻  
上ノ瘡ハ一方ヨリレムル也ハ鼻ニカハ様ニレ者<sub>臣下</sub>故ニ昔如法ニ多ヲカケル也  
一方ヨリレメスレテ両方同様ニソラトタルヨキ<sub>臣下</sub>金創油ヲ一タル創燒  
付テ洗ハ新タニ切ム様ニ血ノ出ルモアリ古キ創ニ血ノカケルハ毛引ニテ  
モワタニテモ肌カタル血飛ハレム其肌ハ指ニテ押トクニ他家ニテ血止ヲ  
或ハ燒酎ヲテ或ハ搦手ヲ以テ洗フモアレ夫ニハ年キニ膿ニナルモノ故ニ

始大洗工世ニシテ洗工ニ似レ敗物ヲ降ク近ナリ吉雄アタリニモ焼鑊ヲ用  
松本モ焼鑊ヲ用トシ故ニ多ク死不死トモヤクト云義ナシ又血産止者ハヌフテ  
止シ先出血ノエヲヌフシモレシニモ難者ハ其血ノ出ル上底ヨリ下底ヨリ  
深クカレハ血止ナリ余ニ油ヤ蠟ヤ雜白ヲ又ルト云ハ非シ其内雜白ハニタシシ  
油ハ其基アレハ只余ニ津液ヲ塗カヨシ一寸餘ノ創ナレハ維五歩ホトサレ置シ  
能ニ左突ヲ行ルノ位膏茶ニケルレハ全創油ヲツクニ肉ノ厚キ処ハ五  
六歩モカクシ餘リ淺キト切ルニ創大ニナレハ肉ヲカクルモ厚クヌシ創ノ一ハ  
ヌヤウニ縫工ニシロヲ合メテハ口ヒラクヤウニナル者ハ余ヲホソクカレモアレハ  
餘リ廉キモアレシメルニモ後急アリト針スルト通ニ全創油ヲ用ルヲアレハ  
今ハ不用卵本綿ノエニ先鋒ヲモ前衝モヨシ本綿ノ上ニ蓋ニシシ風寒  
ヲサテトクノ膏ヲナリ置テ見ルナリ能モ左突ヲ用ヌナリ糸出血産止者ニ  
テ翌日ナリ替ハ卵本綿ウケリヌヨウニトルニ膚ニツヒテアル本綿ニ血ニテウル

ホヒアレハ其本綿ヲトラス直ニ其ニ新ニルニ差カキハテ血ナケレハトリテナリ替  
テヨシ三日メハ大抵血留ル者ナリ四日メハ膏茶ヲ用テ卵本綿ヲ用ヒス前衝ヲ  
ツカ成ハ決勝ヲナリセツクシエレニテハ膏茶ニケルヲナシ膏茶ニケルト  
ツ高ハ大抵五六日ニテハ糸ヲヌクキニ膏茶ニケルト膿ナカレニテ創カ芽  
ノロフレルナリハシメヌフタル也ハレヨリヨケレハ六日ナリ糸エルハ此ハ膿未  
ルトヤク創口アレフナルニ故ニ可シ六七位ニナルトクサルヤカニナルニ必肉ツカヌエ  
ニ殆ク膏茶ヲナリ置三日位ハ此ニ膏茶ニカレト云フヲレシニ其基シリナルト  
口ニカレレ故ニナルニ六七日メ位ニモ引ニテ糸ヲ引テクハト克ニルハヨクツ  
キタルニ糸ノ動カヌハタ肉ノツカヌニタトヒ克ツクハ糸ヲエウノクニ度ニナシ  
兩ニ度モトルシ縫ヲ創ノ内ニ水氣カケルエソレヲヌカヌ膏ハナリテ膿ニナル  
ニ故ニ元サアレハ早くヌクシ糸ヲヌクニタムハ下午ノシワサナリ産布キル也ニ  
肉ナクキレシサレハイタメスニタ患ニ症ヲ養スルナリ直視上膏創口ノ乾ナリ

面色赤ク 諸証手足搐搦又張名スルハ元ノメクラスニ常氣カイナリナリナリ  
ルニ下利モ非ナリ

眼胞モ皮ウスキ故ヌイヤウ第一ノ糸ニ縫名莫血竭ヲ用シモレ脱子ニカ  
ル守ハ神水出テ明ヲ失スルニ至ル故ニコレヲ膿潰ノセヌヤフニスニ両目共ニ  
閉テニスト両眼共ニ盲スルヤウニナル者ナリテ方腐ハ一方ニ膿行テ明ヲ失スル  
可<sub>レ</sub>寫湯

耳ノ痒<sub>モ</sub>傳授ナリ内薄<sub>モ</sub>髑骨ニクル先耳ノ外ツテノ処ヲヌイヤウキノノアトニ  
テ如常ニスレ名則カタヒニナリテ相合セヌナリ鼻モ別ナレシカレ中ノ骨アリ  
テヌイカタキ故ニ故ニ糸ヲシメルテハ内端ヨリ同シヤウニヌクシ又金創ニ  
内ノ及出ノヨウ又者アリ一特ニシムレハ必キレニナリ故ニ先セ右ホトシカチキ  
ニメ外ノ糸ヲ引ヨセテ才ニシメヨスル寸必ヨルモノ  
カスカイモ七日位ニ持ルモアリノモ位ノカチサニ子ルニ其内兩額ノ処ハ出血スル

救<sub>ニ</sub>イタレカタレ横創ニテモカスカイノ膏ヲ貼ス  
額ノ代<sub>ニ</sub>キス骨ノ損スルヲ知ラント欲セハワラレ(ナトヲカチシムルニクヒキルニ不  
能又行テ合モヒキ額ニ達ス

金創ハ全体不大便アリ(一)小便不利脈ニ大數全体ヤワラカナルニキ  
シ赤面黃眼ヲテレ、額上ノ汗唇ニテ萎レ振レ振疾スルハ痲病ノ形(其寒  
戦ヲナス者ハ必發熱ス毎日米ル内ニ后ホト服モ重クナリ死ニ至ル痲症ノ  
一病)ニテタル后血氣ニセテアリ葉ヲノマス(童便サケテニ杯ヲ交ル者  
ハ宜シ)一步ハケルハ急処ナリ一步ワカラヌ(兩手ノ脈血ノ見タ出ル処)  
頸ハ神經ノ湧出ル処ナリ(一)夕漢ニハ諸湯ノ會スル処ト云神經カチ知覺  
スルト云アマカチ出ルモノニ筋骨ニ來ル者六十筋頸ヲキリテモ横ニ  
キリタルハ不死前後ニワルト死スルニ時ニカレ故ニ其腦出テモ瘡治アリシカ  
レ腦方腐ラヌヤフニスレ眼耳ヨリ腦出ルヤウナリ又代<sub>ニ</sub>葉創ノ葉モリ

サラヌヤウニス一シ大木折レテ頭骨ノ出ルアレモ治スルヲリ前年脚ヲ斬ル  
ニ致ノ骨ワレヨミテ肉ハチキレテアルニコレヲ正ス

石木ニ押シタルハ縫タル跡甚若シキ内損タル故ニワザリ易レ切リトルニ  
ヒリルニシトウチ打撲等アリ取砂ノ入タル處モアリ袋創ニ内ノ鋒ノ破  
タルモアリ夫ヲステ置ケハ戦慄スルヤフニルナリ竹中合ニ刺ナリ又元統委  
ヲカニキルノナラヌハ骨ノ損ナアルナリモレ損セスハフニ瘡ス一カラス

戦慄ノ米ハ別ニ瘡ヲ治スル方アリ腦ノ出タルニ用ル奇方アリ小兒ノ妻  
亮復セヌ大使ニ草紙解末ヲ大分ニ塩ニ漬レ置  
突目モ奇薬アリ是モ内服ニ針シタル后ノ法ノ如ク七日オモ七兩目ヲサカレ  
ツクニレ

是是ノ痔動血脈ニ當リ出スル守世医ニ守ナリエヲクレモ血ノ出テ止  
サルヲクリ思フニ委中尺沢ナトヨリ血ヲトルニテヲ導レモ克出ルニ是ヲ以テ

可考

余翁ノ痔川如此ニル此ハ常ノ如ク一創ニ三針ヲ縫テハ皮タラヌ様ニ  
ルナリ故ニ三創共ニ如ニ縫レタリ先例ノ如ク中安ヨリ縫ヒ初メニツキ先  
一処ニスルニ時如ク又ハ皮ノタラヌヲナキ

鼻ノ下ノ痔針ハモ種キ者其狀口中ヨリスルノ如クハ糸ノ兩ハレニ針ヲ  
ツケ方口中ヨリ刺シ鉄盾杯ハキレ離レテ有モノ故ニ其様ノ一ニテハナラヌ  
克其糸ノエカマヤウニ見合セテフ故ニ矢張外ヨ動ス一ニ縫様ハナシ  
アアル位ニ皮ヲ引ヨセ子ハ何レモルニ糸ルモ一ニ口アリヤフニル者

一男子乳下ヲ鐘ニテキリ時師療之逆血不止歷一日而先生ヲ迎フ立地  
ニ血ヲ止テコレヲ縫シ一夜誰語ヲ奉テ死  
驟ノ症ハ手早く洗ヒ縫エシ兼腦ナリニ症アリテ燒腐腦中ニ入ニ必膿ニナ  
ルナリ口傷一ニ兼腦中膿ナリ者ハ莫ク變ノ一蜂在ナ不可救ナリ



高キ処より墜或打撲ニテ骨ヲ折レ者、衝肝キレル故、新目ヨリ六  
動搖其外ノ一モ変リシテモテ下ハ血氣不通故動搖不自由ニテ脚モ  
カス大不便共ニ不通者、下劑ヲ投スレハ下部シテリナラシテ其出ルヲ不知  
是所謂西洋人ノ神經切テ壞テサレリ又痿痺ヲ患ル人ニ骨ノ屈伸セ  
シ者ハ治スルニモ骨免傷カス者、是又屈伸ノ神經ノ切テサレテ故ナリ

反花

反花藤ハ腐草ニテ治スルニ先難病、先生一男子腰骨ノ辺ニ血塊ヲ生シ  
一医治テ誤テ羊面反花セリ予腐草ニテ腐ラシテ取タレモ眼胞ニ至テハ眼ヲ失セ  
ニテ予治テ喜ムノミニ術ヲ施セテ是能トシテ殆常眼ニ異ナラサルホトニ治シ  
タリ醫治セタニ年ヲ経テ亦ハ眼胞ヨリ又少シ反花セリ則テ又左ノ術ヲ  
施メ又治シタレモ五年ヲ経テ又反花シテ死シタリ

反花スル者ハ以テ其因ニテモキリトシ、**結**則テ又必反花スルナリ、**醫**者

ナト權子ノ知ツ反花スル者アリ、指ナリニテモ反花スル者必知ルニシ  
黒子大ニ大要者スル者ハ毒リニ不可取別々反花者アリ、竟黒子ノ根  
内ヲ取后セハ不毒一病人十五年以前腐草ヲ取之漸々反花大如櫻実  
トシテ治シテカカラフアンズヨリ後衝テ取スタト、治スレバ又反花セントス反  
花者、其故輕キ者多ク又其毒アリ、  
反花者、其毒先ニ結ビニテ内ヲツケ、其毒ハ血ヲ去スザレ、腐草ノ毒ハ血ヲ  
止シ、其毒ナレバ、其毒ハ血ヲ去ス。

竹木刺

南信ニテ高処ヨリ墜テ竹ノ株ニテ十廿六推ノカケリヨリ少腹ニケケシ者アリ  
ニ背ニケケハ逆故ニ少腹一又キ出シケルニ故ナク、血ヲ去ルニ、  
又牛ニ會湯ヲ突破レシ者、其毒甚深クアリシ、雖テ十日シテモアリ、其毒不  
便ノ通セ又ヤウノ者ハ、其候ト知レ

一人如知、真似、針ヲ呑咽ニク、リタルヲ青州先生外咽ヨリ切テ出セシ  
トアルヨシ然レ外ヨリ針ノアル処知レヌテハ難シ

針ヲトノ折込タル初メタル如ヨリ切テ後テアル者故痛ハ処ヲウテ所在トス  
シレカウカ、ヒ差一、シ漫佛口ヨリ切カラス

一人眼ヲ突テ眼ヨリ薄キ膜ノ眼珠ノ如ク、出タルアリ、レキ口ヨリ難卵ヨリ  
大ナル物ノ出レ者故ニ中々入カテキ者ナリ是、年及ニシタカヒ少レツ、アルニ中々  
急ニ入カテキテス、歳度モ入レシ又眼ノ針ノタチテ年ヲ経テモレラヌ者アリ只、  
眼病ノヤウ、患ヒテアリ、直ニ又故ニ見レハ、五歩斗ノ針アリレト

整骨放平

キヲタカヒテアル世ノ人或ハ本病トメ骨節ノタカヒテアルヲ知ラス、試ニ年ヲ  
ヲ動セテテ動カヌル者ナレバ、タカヒテアルハ少シキモ、又者ナリ、ソレニ左右  
ノ肩ヲ、エテ、三、四、ハ、タカヒテアルト、高低ノタカヒタル者ナリ、術ヲ可行

少兒四五歳外邪在左肩脱不能举動先王整骨ノ術ト板ヲ腋下、アテ木  
綿ニテク、レリ

不斗勝ノメテ十年斗アル僧權州ヨリ至ル麻沸ヲカケ瘰癧セシカレ不愈ニ  
瘰癧后ト放平ノ術ヲ用ル、ソレ、高骨症ナリ、テ、レ、又トモ、サリ、放  
平ノ術ヲ行フ、カラス

放平膝蓋骨不動者難治風濕或腐骨症ノ差ニテキス有者ハ、米人沈  
シ、ク、シ、候、疾、少、シ、モ、ナリ、痛、腫、採、アル、モ、シ、隨、テ、治、ヲ、行、テ、リ、ソ、レ、ル、者、アリ、先  
膝蓋骨ヲ診スル、テ、カ、ル、テ、一、向、ニ、膝、動、カ、サ、ル、者、アリ、難、治、ト、思、フ、シ、先、年、放、術  
ヲ、行、ニ、ト、欲、セ、ハ、本、病、消、ヲ、用、ナ、リ、四、五、日、前、ヨリ、並、明、油、ヲ、ヌ、リ、術、ヲ、下、ス、右、足  
ヲ、徐、々、ト、兩、年、ヲ、以、テ、動、搖、シ、其、年、ニ、シ、ク、ト、應、ス、ル、者、ハ、治、シ、易、シ、若、一、度、ニ  
テ、行、ハ、サ、ル、者、ハ、二、度、モ、麻、藥、ヲ、モ、テ、キ、テ、下、ス、シ、候、ニ、キ、由、ラ、日、ニ、動、搖、サ、ス、シ  
病者、其、痛、苦、堪、サ、レ、臣、ソ、レ、テ、カ、テ、ハ、ス、節、ス、シ、始、メ、術、ヲ、行、テ、ト、出、シ、其、狀



ハフテト放平蒸葉ニテ兩手ヲ以テ動スニ圍ノ如クニ向テアケ持テ一レ  
回ラセテ一度ニ強ク屈スルト外骨折テシニ一治ヲ誤レテ只其治不  
ハ自ラ我ニ應スルニモアリニテ可スカラス

放平シ療スル初痛ルレハ蒸葉或蒸葉ナトイハル其痛ト云ハ鍾毒アトナリ其  
毒ヲ逆テ折シ施スニ否則術ヲ施シタル后ニ腫来ニシテ瘡治目難クナリ

放平一度ニテナキニ以タルヤ見ルアレ、而シ度モ併シ用テ位ナラズ種  
放平術ソシテ少シモ動カス不消ニ臥サレ大魚目ニテ術ヲ用ニ放平探ハ

ソルト三度位ニ直スレシ度術ヲ用テ痛腫ノアル内ニスカラズ腕痛止  
ツテナリ又術ソシテ又二度目ヨリハ又格別ニハレル者ニ非ズ放平ノ術ニ腕

物后ト六百至百中ナリ其中膝車ノウケヲモハ術ハ用ヒラレ又ニ腕物后  
ニ心克氣ヲ使レ

放平トハ腕伸キ不届クテ正字後石トハ手腕屈曲ノ血筆トハ臂肘強直

ノ血

今ノ人手是レ皆放平ト云ハ誤リニ備放平油ヲ患者ニ擦込テハハントヤ筋  
膜ヲ緩ムルニ妙ナリ又武置平登ハ專ラ敷ヲ主トス

火傷

火傷ニ因テ木ノ手ノ指四指皆傷ム處有タリ即茶ヲ用テ四指ヲ切押シ  
白雲ヲ以テ丸木ヲ手ヲ甲ヲ四指ヲ結ビテ置ニ此生肉赤クナリテ及  
肉ニ青蛇ヲ貼ス愈タリ

火傷ニテ膝臂ナト引付タル者ナトシレハハント此ニ浮ニ引付タルヨウ  
ナレ漢メサヨウニハハントハ下ニ有ニ是ヲ切レハ甚ク六々敷ニ産鬚

カニテ先は切ニハントヲ隨分切ニカテ皮ノニヲ切リ和ニ手ヲ以テ引付  
ハハントハ自ラ伸ル者

治火傷法雖難ク在テ后痕高ク者アリモハ金ク最初ノ治療西キニ

レリ先被針シテ乱刺ト被毒ツケテ大去トシ蓋ヒ三四日異ハ自癒ト皮腐リ爛ルリ其收愈方ヲ貼ル

又班點モ同シ皮腐リテ下ニ又皮点腫アルハ又被毒ヲ布テ破散シ貼ニ下ノ血ニトリタルハ愈々膏ヲ貼スル也此病ハ深キ者ニ非ス然レモ七葉不治アリ皇クシ高クハ治レ易シ也<sup>無</sup>ニテ紫色タルト黒色タルトハ不況

### 失采毒中毒

失采毒中毒丸瘰癧ノ如ク至テ瘰癧ヲモ未タ發覺スルノナレ又此瘰癧ノ如何トスニキナレ予カ此毒其形狀ト症候トヲ發覺シ出テ誤ルノ勿ク今ノ医ヲ見ルニ其瘰癧トシテ知ラズ危<sup>臨</sup>テ救ハレサルヲ覺シ初テ誤ルヲ覺シ厚敷ニメ其毒ヲ掩ハレトシテ多シ予ニ三年前和州女毒候近エ其者左ノ歟下ニ瘰癧ノ如キ者ヲ養シテ人連来テ治マセ醫士診テ後ニ此毒ニ其連来者ニ云フ此病所謂失采ニメ古来ヨリ之ヲ治スル人ナシ恐クハ后ニ出血大死ニ

至止レ瘰癧ク連飯リレソカニ家人ニ告テ曰病者ニ聞ス一勿レト云レハ從者大ニ驚キ飯ル后三日ヲ経テ出血大死ス失采ハ必死也其在ハ極テス矣然レ瘰癧ノ者又漸々ニ至レトモアル也大カク動クル者ナレハ又動ノナキモモアル也失采ハルテ上部ニ生シ堅硬ニ石ノ如ク連轉スルメ痛キアリ外塊ト大ニ異ナリ后ニ血氣者ノ穿潰也如シ黄汁出血テ死ニ至ル者也先年予ハ此症ニシテ此ノ水茶ニメ用ヒテタリレニ膿眩甚ク久患者其痛若不可言腫消スレハ又本ノ如クテ過ニ死ス

毒中毒ハ鮮血出ルヤウニナル者ニ至テ瘰癧ニ其内毒ヨリ生ルハ輕ニ毒中毒ノ初發足ノ中アリハ痛アル内ニ毒中毒因テハアレクダアリ痛ハ極ニル也動カタク老當更シハヤルシ或ハ烏炭仰ヲヤルシモアルシ膏ハ大去トモ貼テ置クシ又服シテ自癒ヲ得シレ不圖下血ト大愈ルモアルシ米大石可刺ス足込ノ血ト腫物ノ固テ引ツリ年ノ興ラズヤフノ者也

レコレハ血スル処ニシテ治ヲ施サカヨキ切テ愈ス大カク可治ナレト先  
用格スレト毒中毒ハ毒中漫腫シテ疼痛不可忍后黒腐ニナリ膿汁出テ  
膿ニナラズ又膝脛腕肉次チメ骨トナル者ハ時毒ナトシテ毒中漫腫シ痛  
ク有レト脱肉セス及テ膝脛腕ニ有ル者ハ急ニ省過スルカク  
失洋ハ肩ヨリ下ニ生セス多早ト及取也ニ生スル初起核ヲ推テ漸ク大  
キクナル其種ク是ヲ推スニ向運轉セテ后ハ自然ト口ヲキ膿汁出テ膿  
ハ去痛ヲナス者ハ其花スルニ及テハ殆ト乳出石ノ及花ト同シ

天刑

天刑ヲ治セシト欲セハ先難治ノ病ヲ知シル年ノ肌腐潤テナク枯燥乾  
已者又眼中黄色ニシテ精神ナク或又滯血者又肩背ニ毒ヲ聚シ或腕  
肉トシ者皆難治ナリ白眼喘斜スル者アリ又合谷脱肉スル者如キハ難治  
又治ニ困テ陰毒カタル者ナリ

天刑ニ各治法無漏原ノ毒皆毒ナシ不可行温毒ニ治スル者ハ治シ易キ症ト  
患及テ難治ニ至ル者血ハ予七教人ニ誠公ニシテ毒別ニ治シ近出ル者ニ  
レト又毒及リテ益ナリ脱血ニ及者ナリ又頑癬ノ如キ者ハ乱刺丸腫  
散ノ毒ヲ敷テ補天丸服スルニ吐乳ヲ備テ思サレ者ハ酒ニテ送ス下ニ  
吐者ハ生薑黃連甘中湯ク並汁或冷水又羊隻湯ノ煎服ニテ服ス  
一レは應スルニ云リ又白梅花ノ並汁ニ毒効アリ又桐子ヲ用テ膿乾スルアリ  
癩三種ニ足杯ニ瘰癧ヲ生テ面白クシモ不瘰者アリ是ハ及テ愈カキ  
者ナリ面部ヨリ生シ者及テ愈ルナリ其足杯ニ生瘰癧ニ通リ上ハ瘰癧ヲ  
フルコト見レ指トモ丸ナリ且合谷内ハ瘰癧ナリ

婦人諸症

産后瘰癧初起膿ヨリタルナリ言説瘰癧シテ兩手ヲ握リ及瘰癧スル  
破傷風ト全ク同ク月経ナリテ后及瘰癧ス主方ハ小龍犀湯或高根湯症

三隨手撰用スレ又劇症アリ為根湯美豆之千金大補加附子荆芥ノ度  
治法多シ念谷ニ付レテ奇効ヲ得ルコトアリ是秘ナリ

産后症病胞衣不下内ニ三度位ハ治法ヲヨリスルハ治スル前日戦慄ヲ奏  
ナ今日甚丸分ヨレト云テ起尻ヲ不快感ニ常リトスルハ又前日発ル時方  
ニ必奏ス者コト方ハ荆芥湯等ニ付サケシ甚妙ナリ産后戦慄ノ症必輕布  
ニレリ勿レ五六卷スルトト上戦慄止是諸症皆起メ救フ不能ニ至レ治療  
手段アリ産后戦慄ノ症ニ至テハ世ニ醫學アヤシム先生之症ニ於テハ治法論説  
巨細ハルコトアリ実ニ可究理ナリ

産后症病キリリトメ手推テ口禁者ハ治ス又口ノ開者ハ不口口禁スル者  
忽然トメ危ル奇術アリ先年鋸田村ニ症病ヲ奏スル者アリ先生一  
奇術ヲ施メ所推ノ手息ヲ刺ク所謂左右ノ合后ニ針大后鬚際ニ付レシ  
產后十味自利者神經ノ循環セラル故ナリ世間門ノ冬茂加附子湯ヲ与レシ

方中益香ヲ倍スル

産后戦慄ハ血氣不和邪乘虛也是調護ヲ失スル故ニ先其不和ハ血ヲ治  
スルヲ主ス戦慄四五卷唯治ノ兆ト知レ先四五卷向早ク荆芥湯ヲ与ル  
千金大補加荆芥炮姜或ハ症ニ隨テ加考附子ノ症モアリ十補湯此方今  
千金産后心腹ヲ治スト云々出タリ千金方ハ若菜薑黃湯ヲ与ルト血  
ニ作ル形ハ誤リト云ン産后心腹痛モ克治スル何レ産后熱戦ハルニ荆  
芥ヲ加テ可ナリ

産后子宮腫テ血塊ノ如キ者アリ護リニ桃承或大粒トノ破血劑ヲ以テス  
一カニテ十補加金銀花或益母草モ可シ克腫ヲ消スル子官腫ヲルニ荷  
葉ヲ湯ニ浸シ子宮一當レハ克ルト云ト云アリ交接ノ内出血ハ者ニ医三カ  
内鹿脂霜ヲ加テ治ル者ナリ  
瘀血ノ脈梗滿ニシテ者ニ抵當丸一更斗大粒ヲヤリテ下血シ后ハ死タリ

乾血ノ症ハ必破血劑ヤルニカラス四物劑ノ者ヲ平服シ或ハ益母草湯子散漿  
ヲヤルニ山椒ノ鹽甲劑モヨシ

産后血上行スルハ芒硝一味ヲ湯ニ用ユ

産后戰慄ノ奇方當歸四逆加吳茱萸生薑附子

雜症ニ胎ヲカケク按ル者ハ子宮腔ヲ生メ産后血塊ノヤクニ立テリ

某者問曰一婦人産産不月脱以回生術救之日ヲ経テ舒快シ而産中及

胎門ヨリ下血シ又胎門ヨリ一物突出テ漸々ニ長大ニテ其色黄ニ軟弱后

ハ紫色ニ変シ是所ノ故ナリトシ不知其由也ト問テ先生曰是ハ胎核也

先年一婦人逆胎内弟某者瘵之引按テ首ハ腹中ニ残リ先生往テ見テ取

出タルニ胎衣不ト努カスルハ内ヨリ一物ヲ出ルアリテ推込テ胎衣ヲ取

ニトス知是三日許又遂ニ死セリ又一婦人産带下六年其臭凡他ニ異

ニテ不可用見ルニ胎中ニ腐肉アリ乾固人キテ引キキルニ則キルニ録シ

以テ胎心ニ臭氣ヲ發キ沈タリ又一婦人産中ヨリ如前ニメ出ルヲ余ヲカケキ

リ以テタリ澤テ紫色ニ変スル者ハ切テ

婦人久ク頸癭ヲ患フ諸藥ヲ用テ無効ニ桃葉ヲクニ并用桃花散甚寛應

スル又桃仁沖テ患ル必ニ敷スルモヨシ

産后發熱者ハ酒芍天麻湯トシ

崩漏ノ症ニ鹿胎霜ヲ用ルハ急難ヲ救者己左効ヲ得ル者ニ非ズ

産后血熱ハ胎ヲ直テ痛者ハ失笑散ヲ可用実症ノ者ハニ黄芩湯ニ湯或ハ

柚実霜効アリ是ニ胎ニ迫ル者ニ蛇ヲ蝕ル者アリ其難ハナリ

産后惡露滯スル者アリニ三日ヲ経ルト難キ者アリ早クニ三行ノ内ニ用ル

ヲ用ルハ速ニ効アリ澤中ハ効ナレ前方ヲ用テ汚利止テ之ニ下痞止

不食スルハ甘中温湯可ナリ又男婦皆ニ加味断齋子加ルナリ

胎衣不下者早ク是ヲ下スニシテ子宮不開故ニ必振寒ヲ養ス

産后虚弱スル者ハ孤風散ヲ用シ之四服厥後血淨分不引ナリ  
婦人胎中腹痛スル者ナリカタキ者ナリ凉藥湯火湯ヲ用シ洗散ニ投  
洗フレ

一婦人咳大特々馬熱シ肺傍ニ塊アリ昼夜ニ三行微利ス驚甲削ニ並硝  
石大内ニ百粒ヲ貼ス愈ス從ニ乾血痰ト云脹滿ナリ  
ル子ヲ引出スナハ胎門ノ分ハ不可引前ニ引出スレ難産ニテ破裂シタ  
ル者早速洗滌スカラス大抵百日位モキテ瘵スレ缺唇法如シ

雜症

三本附者本附ハ血トシテマクワサル故血存ユル者血ノ凝結ヲ行ラス  
効アリ故ニ痛ニ強ク亦亦急考ニヨシ

三本附ノ毒トキテ氣マクワサルナリ氣マクワシルヲ循ラス効アリ故ニ疔瘡  
癰疽諸毒ニヨシ

三本附水濕ノ溜滯ヲ解シ循ラス効アリ故風濕痛痺痛ニ考一  
三本附氣血共ニ凝滯シ兎角氣ト血トキテ不迴ナリ或痛者モアリ又  
不痛者モ目眇モアリ其不痛者モ目眇アリト云ハ予法每ナリニ於  
ト下ヲ考ルル人身中ニ血氣ト血トナリサヨケレハ血同トナルナリ然レニ於  
同トナルハ血氣ノ凝滯ヲ不循故ナリ先諸毒者三本附ヲ用テ菜口及  
ハナル処ハ鉄ニテ割裂シ破敵トナリ其レ破内ヲトリ血ト氣トヲ循スルハ  
全キ人トナルヤナリ<sup>者</sup>宜クモ考<sup>ツ</sup>シ予家所謂三本附ノ附子ハ名  
代烏頭者効多シ  
瘵弱ハ血氣ノ不和トシテ氣マクワサル者ナリ故ニ痛痺ハ和今レ  
拳動ナリ難シ洗滌ハ血ヲ和シ氣ヲ行スヤクニスレ三本附但キナリ  
幸急ハ瘵弱ト名リモハ氣ノ暢サレヨリ瘵スル者故ニ拳動ハ少シナリ痛  
痛和ラセリナリ又痛痺ハ危覺ト云幸急ノ甘キモアリ尤モ瘵弱

拘束大痛公如之引カナリニ症は之種々変症アリト云大抵血ト丸ト克ク  
来トホナリ事急ニハ方甘附可

消渴病七味白朮散方中ハ瓜根根母去心ヲ加(黄芩)解毒散益用ナ  
食蟹ヲ克スルハ克食心又食養ハ蓮根常食ニ飯上湯ヲ二椀程フ、  
用ヨキ前方ヲ久服スルハ克食トイリ消渴症ハ上焦中焦下焦皆アリ  
此ヲ克食スニ

不食痢ニ抑肝散扶脾湯柴胡ヲ倍シ三鞭義水ヲ加(辰砂散或左金丸ノ  
姜益用メ効アリ

大佛膜眩甚メ不醒者菴香肉ヲ与テ大ニ効アリ

世ニ脹滿ト稱スル者一ノ菌説アリ肺ノ大管ニ或白痞採ノ如キモ生シテ  
ソレヨリメ腹身体ノ循環アレクナル故ニ右消渴建胃散ヲ用テ用テ管  
ヲ微トス一キナリ脹滿ヲ患ル人死ヲ火葬シメ一塊残リテ者ナリ是ヲ見ニ

坚硬如石者等ノ者ヲ以テ一逆者膚トスシ瘡水多出ル者ハ脱ルニ又破  
血出ル者アリ是ハ水少クシ出ルニニ夕誰ノタラスメホモアリ

水脈ニ射スルハ會厥ヲ撲ニテカチイテ用ヒラレ者ニ用ル術アリ先生三人  
ヲ瘡セリ皮ヲヨクタシシメ用スニ

麻痺眩暈甚者即骨ニ高クシテアリアザニ赤紫色ニテシタルモ  
右ノク凸敏シテ難ノハカチ見タル者ハ心脈ニ其内を穿ル者ハ取  
レカタル黒色ニメ毛ナト生ズルモノハ大カク高ク起リテアル者ニテ直リヤスレ

火傷トシテ痕高クナルモノアリ何レモ乱刺メ拔毒ヲ賦シ火傷ハ大毒破  
敵オトククシテ克直ル者ト云フニテ劑ラズニ可ナリ其腐タルヲ見レハ  
即チ愈シ膏ヲシリキヤシ葡萄疫ハ流行スル者ナリ水泡ヲナシ寒熱ヲ

ナレ周身ニ染ス諸症ナト云ス班ヨリ大ナル者ナリ  
夏ナリ班ヲ染シ班ヨリ血ノ出ル症アリ温疫ノ症ナリ血分ノ症ナリ白虎湯

養班の危篤ニルキリニ其班ノ幸ニ症ハ舌或ハ齒根ヨリ出血スルヲ考  
牛角必厚角一切ル者ナリ瘰癧凡ハ姜代用ス夫ニ効驗アリ火ニテ炙リ削  
テ用ユ

曰羊角是ニ耳鳴等ノ症ハ多ハ瀉ル者アリカレ、症ハ少オ胡加荻茹克應  
田虫白茅ノ秘方アリ本方高根特取ニ後肢ニシキカセ口ニ敷茶ス浪花ニ四  
十餘白子久ク瘰癧ヲ患テアリシニ眼瘻ヲ收ニ生セシヲ或ニ疔橋本瘰癧上  
様ニ見ナレテ灸ヲ進ル夜ニ進々腐ニリテ雞卵骨ニテ包フハイテ日ハ主  
人骨ニ灸セシコトシテ止サリレバハヤクシエス其苦ヲ受レニ不日ニレテ死  
カレ誤治ヲエテ死スル人モアリキト歎セリ橋本宗老紅毛宗ニテハ見テ得  
レ人ナレニカリ誤リレテモアリキ其餘ノ人ニ如何ナルヲカイタサント思ハル  
霜燒ニ断水ヲツクレハ愈 各傷火傷  
カニテハ可シ  
凡刺膿脫去脂在下ノ今一寸ハ脂皮間ニタテリタル水ヲトルリ四五歩ニテ

水去一五位及薄中效二然リ

七味清脾湯ハ心下痞メ時々痛ヲ自率ト大用スレ兒ノ後發熱或爛喉ハ  
痺テノ虫ニ症或嗜飲勞症滋陰降火湯ノ場合ノ如キ者ニ用テ可シ又時  
疫亦瘰癧瘰癧ノ諸語或ハ咳ヲ並テ膿空ニ諸葉是効者ニテ方ヲ用  
テ神ナリ是モ其症ヲ目的ナスレ東洞先生ニ方ヲ秘メ常ニ用レトナリ  
又七兒ノ七便數ニテ類數ニ程ニリ牛膝ニ者ハ參芪湯ノ症ナリ  
脹滿ハ寒症ニハ劇劑ノ應スル如ノ目的ハ用テ神效ヲ示ス者ハ此スル  
北ナリ此汁ヲ止ケルニハ十全大補湯ニ加神曲姜芽物ニ止者ナリ劑病ハ初  
起葛根湯ヲ用テ養表スルハ直ニ利病ハ兎角下ル者故ニ早ク養表イタ  
サ子ハ極内ニ陷テ劇症ニ至者ナリ克養表イタス時ハ利數大ニ成セ  
不美消散ノ効アリ蝦蟇瘰癧流注等ニ用テ消散スルニテ其効ヲ知レ滋養  
子ハ膠痰ヲサハク故ニ喘痰ヲ治スルニイテリハ汚液ヲサリ虫ヲ殺スル効アリ



刺芥ハ血方ノ形ヲ考テリ。瘧疾等ニ用ルニテ其効ヲ知レ  
薄荷ハ此火逆スルナリ立方ニ加味大用ニ

時疫ニ下血シ狂言振スル者桃葉ノ証ナリ是ハ二夜ニ三行位ル者干姜辛  
芍連人ク湯ヲ并用ス一夜ニ茶ナニ三匙ヲ服スレ黄生湯ノ症ハ數日下ル  
一夜ニ二度位若ニ度ニ下ルト小脈下陷ナ次才ニ脱スナリ桃葉ヲ三匙ヲ用  
ヒ下血少々止者ハ以スレ止不著ハ難治トモ又ニ三匙ヲ服テ下血止者ハ調  
合杯クシキ故ナリ又桃葉ノ下血實ニ屬ニ黃生湯ノ下血虛ニ屬ス

黃疸ノ前兆ハ心下痞大食不進セ便赤湯食ハキソウニイカス又眼重ヲ  
不レ見ルニ黃色ヲ養スル者如是者早ク見付湯ヲ施セハ其西五匙ニ  
下血湯ヲ用テ不愈ニル者其遂ノ瞑眩ナリ甘中湯ヲ用テ下血止ルナ  
三行ハ下血ヨリ吐血ニ効アリ吐血下血ハ氣鬱滯ヨリ生ズルニ生薑湯ハ  
水瀉大乾吐共ニ

升陽散大陽ノ症ハ赤黄色ニ中央少々薄ヒ腹重ニ燥屎ナリ衾衣摸所  
スレテ

黃連解毒ノ症ハ舌黑服ニ衾衣摸所譫語スル中ニ第ニ燥屎ナリ或先  
血ニ是熱心中ニ迫ルノ症ニ様子ニヨリテ九葉ニ下スナリ

瓜蒂散方中赤カ豆ハ上劑ニ非ス瓜蒂性テ柔ケルナレシ瓜蒂ノ瞑眩ハ  
水ヲ用又射考モヨレ瓜蒂ヲ用テ不レ止ナリ湯ヲ用テヨシ  
又不吐ハ身ノ相ニテ探リ出スレ用法ハ三分或五分用ルナリモアリ  
此症ハ一切更回ヲ食スルヲ禁スルニ若食スレハ腹痛ナ茶又ハ吐血ナトメ死  
心考又風寒ヲ堅奇慎

輕粉ヲ用テ浮腫スレハ粉ニタサレテリ瞑眩ハ非ス防己蒼朮湯ナリ  
托裏消腫散ハ赤膿別消散又既ニ膿スレ者ハ潰トテハ以前或本方ヲ用テ  
其毒ヲ大抵ニ折キ其後ニ是ヲ用レハ赤膿ハ別消散ナリ既ニ膿スレ者ハ度

二十リ。脚氣神心セトスル者ハ初ヨリ小腹脱々ル者ナリ。其症ハ必爾ニ入ル者ニ丸ヲ  
付テ可知

誤テ身體ヲ撲或ハ汚穢ニ因テ腸中ヲ揉振イタレタレ者后ニ私氣ヲ養テ  
熱患寒脈中微痛如度或譫語狂乱如有神靈ノ症ニ加減テ胡湯ヲ用テ有  
神驗

甚患此仁ハ一味ヲ用テ克消スル者ナリ。腸瘕ニ用テ之モ効不テ可考。又排  
膿ノ効モアル  
案内ハ脐ニ塊在テ準的トシテ可用

瘕更ハ準準ハ小腹ヨリ脐ニカケテ痛ハ在連ハ心下疼痛ノ中ニ悸ヲ嘗テ  
少連中ハ脈中疼痛シテ在悸  
瘕更ハ其ハ腰辺リ迄ハ目的。瘕更ハ其ハ腰連ヲララハス。温性益元湯ハ

表症ニ患寒者。瘕更ハ自汗或盜汗スルニ用テ  
有表大瘕湯ハ時疫解テ后心丸不定。譫語妄言ニ用テ是所謂藏燥  
七箇方ハ脈中痛テ三月背一疑トテカ目的ナリ

玄五散ハ烏附劑ヲ用テ疼痛甚シキニ用テ疼痛甚シキハ烏頭ノ根  
ナリ。奇良附ハ結毒瘕狀。酸膿汁ヲ少クニ用テ  
一日先生招訪内生曰。有一男年七十許。脈象數古乾燥。口渴。小便濁。時々  
腹痛。大瘕ヲ患テ。其者。瘕塊ノ所。崇。瘕皮。如烏頭。又用テ瘕ヲ雲母  
並テ以テ瘕之塊漸々減テ。似得効。然レ方ノ内。當セタル。以テ全快。至是等  
若瘕之何ノ症ト告ニ試ニ方ヲ処。若若肺瘕。或為疝。筋々。此方ニ其音  
擊ニ當テ。名因テ問之。先生曰。消滯ノ症ニ非ス。小腹ノ塊ハ全クホニ。塊ニ非ス。水  
文膀胱ニ充テ。如是故ニ。年ヲ以テ瘕之。則小便少。通テ前ニ。主支。如烏頭。雲母  
並テ附テ。塊減テ。決者方當テ。ストイ。所。瘕。ハ。三。因。内。ニ。レ。三。付。テ。小便。通

利之塊去散スルナリ。難治ナレバ猪苓湯黃連解毒湯ヲ益服セバ効ヲ得ル  
一七アアニカ。

妻更加厚朴ノ喘ハ水沍迫ルノ喘ニ非ス表症ヲ下スノ故ナリ邪内留ラズル  
ノ喘ナリ。

陰主和甘ノ症ハ氣沈クニ因テ頭眩スルナリ故ニルテ頭眩ノ症ハ脉緊沈ル  
者ナリ若ク昏冒スル者脉浮ナレハ必死ス

方甘所ノ症ハ脚重急欲伸スレハヒツハリテ不伸腰痛ノ大惡寒ナリ  
方甘少ノ症ハ亦急スレバ不痛又急惡寒

身重ナリ者甘ナレバ重ナリ不伸不痛  
若ク陽ノ舌ハ少滋ヒアリテヌクメ白胎ニナサレ黄ヲ汚又譫語微利アリ  
手脈中鳴動スル者ニ用テ効アリ

病病后桃系或ハ黃連解毒ナトノ症ニ至テアツヒナト云煖撫ヲ至ス者ニ極  
子子姜湯ヲ並用メ大ニ効アリ

妻支本酒ヲ用テ盜汗或下利スル者ハ用テコラス必脱スル者ハ若ク又下利スル  
者ハ妻支加芍藥瀉子ヲ用テ妙ニ止シ

桃葉右ハ赤メ冬芒刺脱ヌマナリ又黃胎ニナサレ里ヲ帯ル者ナリ傷寒ハ  
命曰肺浮虚者宜發汗スレハ表氣虚ナル者故ニ發汗スレハ逾虚スル故ニ

發汗ハ致サレヌ者ハ克察メ治スルニ  
東東垣浮虚者ニ益氣湯ヲ用テアリ

六氣運轉赤少皇湯加茵陳山椒ニ黃柏ヲ黃芩月疑且月ヲ克治スルニ  
頭痛有吐氣以涎沫者吳茱萸湯ノ主治スル方

破傷風ハ脉ハ脈涉ニテハ者ハ克氣ヲ付シモト順氣ナラサレ故ニ治ナリ若ク  
ヲ見ハトカニ痛如アル者ハ引ナリテ痛故ニ去脈ヲ見ヌ

瀉泄ヲ見ヌ大便瀉スル者ハ黃芩湯ヲ用テ下利ヲ止后ニ少葉胡用ニ小  
五三八

陽病在汗血ヲ動メ其數ヨリ血少者アリ口ヨリ沫者ハ瘧疾也其數地  
黃ヲ用者アリ其地少陽病ハモトヨリ下利アリ者ナリ故ニ大柴胡トハ遠慮  
慮スレバ陶節若カ地黃黃連湯ヨリ古ハ赤キ里キニ下利膿血ハ中煩  
不渴則黃連阿膠湯血ヤマサハ苦ヲ加フ血虛ニハ芍藥ヲ加フ  
後世所勝湯黃連 阿膠 臣子 黃柏 是モ方今症ニ用テ虎効アリ  
吳茱萸湯ノ症ハ上逆ハ逆ニ頭痛モアリ地黃上逆ノ甚キニ至野ハ自ラレテ午  
足厥冷煩躁メ口下ニ少瘡ナル者方ヲ用ズルノ秘事ナリ臣ハ三日便ノ不  
通ノ者或チ兒ニ至案内ナトヲ用ルト不堪苦力ノ味ヲ以テアル者ニコレ案内ノ  
瞑眩ナリ  
老老ハ疼心経ニ入テ養スルナリ清濕化痰湯主之  
蝦蟇夜ナリ中ヲカリ一飲食共ニ不下者アソノ一霜或ハ霜ノ霜ノ  
ヒルノ霜白湯ニ下ス

一男子傷風ニ肺緊脈弦滿大便秘塞不可堪一医投方亂投不得  
其肯聲一医又投大煎氣湯大便不可以水鏡灌肛門滿湯通然而諸症  
依然諸治於先生々々論之按之察之病毒之所着也必以附子種姜湯用  
二貼而大便通諸得羊臧烏先生曰是不堪劇劑而脈氣不順  
黃連湯之劑疾禁口劑ニナリテ并洋薑クナリタルニ効アリ  
脱疽ト瘰癧トノ差別ハ何レハニ楚痛ニハ膿汁ヲ生シ脱疽ハ膿  
汁ヲ不生汚水許ナリ  
消之藍 主治後拘急止痛發熱ニ氣益積心便服者覺通劑経内並有  
催生之功此物專為肺臟之要藥 產后血暈 戰慄 崩血 版痛 其効  
甚  
的里世何如消毒 中風痲症風邪狂乱眩暈氣昏頭痛版痛下便  
泄涕經水不順自汗盜汗及胎前諸蟲咬傷癩癧瘡毒無不該在

脹不快者右何レ任大効アリ一匙或ニ匙用

於久里加年喜里 七便不通淋疾小便不利右酒ニ七分許用エ

葉茂ノ瞑眩ハ口下痞スル者シテ劇ニ用テ下ヲトリテシ

五六年以未限瘵ス者アリ其支加童骨牡蛎一日ニ炙雀一羽之食シテ

飯ノ湯ニ梳フノ用エ

毒箭常リ或毒草ヲ服タシ其毒ヲ解スハ新汲水ニ之サレ者ナレ隨所

多服サスシ其症煩渴スル者毒箭ノ症ハ冷水ニテ洗ヒ瘵スシ葉胡加石ハ

胸腹ノ一非ス頭目ノ痛ニモヤル葉胡ハ血凝氣ノ聚リヲ散ス右葉ハ使凝

ヲ解キ或ハ解散トモニ概メ云ハ此方凝テ腫ヲ下スヤウノ処ヲ刺者シ葉胡

ハ連壳ノ場合ニ似レ任連壳ハ血氣ノ凝テ腫痛シニ浸膿セントスル処ニ

シ葉胡ハ此症ノ前ニヤル又葉胡ハ熱氣ヲ立ル故ニ下部ノ病ニ之カス多クハ

上部ニシクノ下得之ニ三日以上ニ中煖ナ不得臥ト云葉連殼ノ主症ニ非ス心

中煖ナ上ニ下利膿血ノ四字脱スル此方下利膿血ヲ主病トモ子ハ効ナレ仲景

氏再生シタリ任此説ニ從ハ昔日畜血アリレ病人不利シ中煖ナ不得臥或ハ口中

乾燥スルニヤリテ不日ニ愈タリ

少青童ノ症ハ文ニ喘沫ヲ吐スルヲ没食子ヲ加テ用エ

又喘咳舌上生胎ノ者ハ牛舌石加没食子効アリ

右白胎ニ咳止ニ可レハ參桂芍加五味子

茯苓ヲ降氣ノ症ハ頭アラツキ上ニツリニテ下タル等ノ症ニ効アリ洎夫藍

ハ胸中府痞ヲ解スルノ効アリルテ血氣上升ヲサハ効アリ血症ニニ用ル

ト思ハ甚ハ非ナリ

遺精ハ燥血ノ毒ナリ

其本府ヲ用ル症ニ本流汗利カアレハ用ラレ又下利ニ支湯ハ生毒ヲ

于毒代用ニ盜汗ニハ葛根湯ヲ用エ

送食子公亮中ノ膠痰ヲサハクモアリヤ青竜湯或ハ公香散在湯杯  
配シ投スルハ十匙ヲ過スメ効アリ若キ匙ニテ効ヲ不見モ人ノ不症ニ不可  
与

浮腫湯腹候ハ膀胱ニ拘牽アリテ前症ニ比スレハ刺痛甚メ且心下及背一  
引テ痛ヲナシ其脈云當為比スレハ堅クメホ水赤澁或微湯ナトノ餘症  
白散ハ肺辺ノ痰ヲ吐ス掌金丹ハ肺中ノ痰ヲ吐ス部位上下ノ違ヒ且淺  
深ノ別アリ

其ハ干姜湯ハ毒心下ニ迫リテ自汗盜汗出スルモノ用ユ又胸腹痛ヲナシ  
左ニ段ハ左痛ニ右ニ段セハ右痛ノ等ノ症ヲ見スモノヲ治ス是皆毒心胸  
ニ迫テ所致ナリ宜此方ヲ与エシテリ世医モ方ノ乾汗ヲ治スルヲ不  
知シコノ方ノ乾汗ヲ治スル所以ハ毒ヲ内ヨリ外發至シ壁巨ハ胆胆病  
胃家ノ症ヲ自汗盜汗ヲ治スルニ補石大黃ノ輩ニテ專得レハ其汗自

ラ出テ理ト同シ此方ノ妙ハ毒ノ外發ナシ胸ニ閉カスニテ不可不知  
任量肝ノ乾血ヲ止ムル者ナリアルメニヤ固ニ是ニ易用

黃土湯ハ血溢摩爛メ下血或吐血スル者ヲ治ス

二黃湯ハ氣ヲ主トス故ニ其条下ニ心下不疋ナリ栝葉湯ハ血ヲ主ナリ故ニ  
其条下ニ下血不止ナリ血ヲ主トメ動搖スル者ナリ是三方辨ナリ

鷹胡菜ノ症ニ及テ逆道大受カレ者ナリ硫黄一七ヲ加レハ藥汁ヲ受ル  
ルノ神妙ナリ一兒下利后夜ニ四辛行腹中物チキカ知ク手足微寒者

運脈動ト速連ヒトレカラス且口舌乾燥ス即山椒ノ葉湯ヲ与テ  
蛇虫ニ下ナリ茶下メ治ス四逆湯ノ症ハ舌乾燥ナク脈不微細ナル者ナリ

ニ又異状ノ症脈ヲ見ハス症四ツアリ脈中蛇虫ヲ生スルモノ胃中ニ宿食  
停滯大者寒痰胸中ニ凝滯スル者又中ハスル前三十日ノ藥スルニ此

四因ニ過ス者ナリセコフ琴山翁ニ傳ス其ニテ是ナリトシ中ハ新脈ハ

未試ト云リ

麴胡菜之症ハ肝診其見著ナリ版脘脘之常ナクスルヤウナセク  
リ明徴ナリ

麴古采極毒ヲ解スル者ト梅ルニ是ニ濕熱ナキ者ナリ細受ニ濕熱ニヨリ生  
スル者ナリ

善治湯下ニ心下滿微結トナリ消スル者微結甚<sup>高規</sup>如何シテ診湯  
シ常ナリ<sup>琴</sup>山翁ニ所入ニ翁曰是甚規難ニ進脘也ニ於テ命性高キ者ハ

其心下微結スル者ナリ<sup>聲</sup>言ハ何流ノ如シ其工ニ巨石杯ア守ハ其下必激  
動ス其理ト相似タリ其<sup>聲</sup>見スモノハ万病考セ方ヲ如シ効ヲ差ス

梅毒之年不應者採此單方ヲ用テ奇効ヲ得ル<sup>テ</sup>奉テ教一カクシ  
世間ニテ凡キウナト云ル者尤奇驗アリ

當歸四逆湯ニ當歸中湯ニ當歸散セニ方ヲ三等分シテハ當歸四逆湯

湯ハ尤輕淺ニ四肢麻痺スルト云症ニ應ス身足厥寒ト云必ヨリ証ヲ  
推テリ當歸散中湯ハ少腹拘急ニヨリテ四五更平急考テ目的トス用

ニ當歸四逆湯ヨリ一等湯キナリ當歸散方ニ夜ハ散湯ク面色痿黃版  
中知有物而按之非塊何トナク初テ包タシ如クウリトシタル如ク一用テ

甚奇効アリ寧竟ハ血滯リタニカク水亦滯先者ナリ交接ノ時出  
血スル者ニ補中益氣湯方中鹿胎霜ヲ加テ克ク治スナリ

高血下利ノ病ニ逐之痰前ヲ用エカテ丹ルモノアリ版候及舌候トニテ  
可考不知メ幾ク稍量劑ヲ投スルニ死ニ至ル者<sup>レ</sup>此症ニ千金ノ黃連

湯ニ黃連解毒湯ヲ兼用メ効アリ

予カ家ノ立有茶ハ其名唐<sup>李</sup>清カ陳尚ニ擬故所名ノ意ヲ知ハ則膏  
ノ効モ亦自ラ知ルナリ

右ニ術ハ毒残リテ欲愈不應者ニ貼スエヨリメ押ス効アリ

青蛇ハタシ効アリ左突ニ合スルハ克膿ヲ吸効アリ  
中黄ハ解世解毒ノ効アリ

先鋒ハ熱ヲ解シ毒ヲ消散ス又此膿早く膿サント録スルハ中黄ニ左  
突ヲ付テ克早く膿方アリ

白雪ハ新癰ニ用ス火傷杯ハ牡蠣ヲ加フ

大赤ハ毒ヲ火傷湯傷ヨシ

前鋒ハ金創ニ主シ何レ新癰ニ貼ス肉ヲ長スル

水勝ハ牛用ハ血効一味或血効名名異ニ味甚厚日致段ヲ容ス

大玄ハ左突破敵ノ輕キ此推克破敵膏肉ノ有ヨシ

遊奕ハ蓋毒ヲ疑血ヲ散ス

破敵ハ有寒肉者ニ貼ス名寒肉寸ハ肉ヲ生レシ故ニ左突ヲ貼ス

馬牌風津吸促進赤湯逆流形驚風ノ如シ十歳以下ノ者ニ多シ文合ハ

名者ハ内葉葉金田ノ杏甘石湯ニ没食子自トナリ劇ニシハ易救  
シ安リ見ニ者ハ反テ治シ難シ

馬牌風津盛壅塞如何用ス一キ様ナキニ白柳匠砂等分以並葉汁

或白湯頻逆下取全部

氣腔ハ多膿ニ生テ潰テ膿ヲ流シ又日間テ膿出ス如志スル一七八度ヨリ

桃仁蒸氣ニ杜仲ヲ加用ニ十貼ヲ置タリ瘡口ノ明タルハ口中ヨリ括ヲ入

見ハ六貼ヨリ筋ヲ引張居ルニ夫ヲ剪刀ニ切取砂蜜ヲ棟白ル

外ニ後術ヲ貼ス

癰癤ノ人他ノ病アル可ク葉用エルニ其後癰癤不愈トナリ中年ノ癰

癰ハ難治ナリ

癰癤ニ眼目堅篤スル者腫子散大スル者不洗ナリ

解癰ハ二三才逆ニ多シ神聖ノ病ニ一頭決才ニ大ナル者初起搗楸子庵



愈后十四日、内ニ大陽アタリ青筋アリテ。一ルノ夕子ツキツナリカ  
ニシテ一ノ夕杯ハルヤウニ内ヨリ表方ニ但ニツノ一ノ夕内タルハ不潔ナリ  
初老葛根水煎湯ニ薬用ナリ但又背ヤ腰下トニ解廉カ様ニ斑斑ナ  
ルガ有テ脱ル者ナリ年幾解廉ト同シ方ニ初老ノ者ハ己ニ教人ヲ洗  
方リ七八年已前一人乞洗セテ見ニ解廉己ニ解目上ノ鬲ニ勢危救テカ  
テ又改治ヲ拒メ強テ計セテ予予辞メ白今針刺ヲ試ス若老ニ針  
セハ反テ在期ヲ促シ彼者曰一匡ヲ轉スルノ教人皆不治トス先生若老ニ刺  
メ不洗云余ナリト云テ強テ予予逆ニ針スル一丁許ニメ黄水逆出者舞  
少減スレ脱カヲ見ヌ故ニ急ニ飯サレハ后二日ニメ逆ニ死ス  
頭痛歴成不止者瓜蒂末以管吹鼻中又刺太陽穴也  
真頭痛者並香蕪散加石菖蒲辛ヲ瓜蒂末散ヲ用  
頭痛ニ三等アリ水ニ属スル者ハ其文加者本湯或瓜蒂極鼻湯並用之

此ニ属スル者ハ黄鐘ヲ並用又一種ニ氣ニ属スル者アリ暗日ニ歩行スレハ痛  
ト是甚難治其治法ヲ得ヌ一日山林見宜ノ著症ヲ見ニ此目見火  
則痛者トアリ即九味羌活湯ニ此理ニ因テ天暗日ニ頭痛スル者ニ羌  
活湯ヲ与テ奇効アリ后毎々驗アリ又損毒ニ因テ頭痛スル者ハ先六物  
解毒湯ヲ与テ雄黄一味掛目一分ヲ七九トナレ一日ニツル穴用ニ症ニ因テ隔  
日ニ用ニ大抵此等外ニ不出花外症トニ因テ頭痛スル者ハ先例ニテ其  
頭痛ト云者アリ必止テ重止者ニ即其葉葉陽ノ症ニ水ニ属スル頭痛ニ症詳  
痛ニ属スル頭痛ハ危夜ノ別ナリ殊ニ夜ニ甚ナリ  
危胸ニ属胸加甘ナリ用ニ  
狂亂ノ者ハ吐下灌水ノ術  
痲症ニテ甚ニテ頭冷物身ハ汗ノ出シヤウナルハ其重葉湯ノ症ナリ  
滋毒ニ山椒一味水並一立方物解毒湯瓊瑤躑躅一味水並並用同蘆

方棉実之長筒煮一方本薑煮口〇又方二屏前 嬰孩疳積 在二味酒  
去白茅根並汁送下此方在氣毒瘡口久不愈時之藥也諸藥者主之  
腎囊風之經行時之胎之者此病生ト云禁殺生之曰經行之男女之  
ヲ七其兒登極成去張此毒アリ或養滿之胎所ヨリ亦有月迄之有  
者之非又内菜ハ銀荆湯并洋洋ヲ加一臺門丸ヲ并用消毒或ハ茶湯散  
去黃帝方ヲ可也

瀕死ハ心下腫中々アリニ暖クアリ或ハ浮波線ノ如ク通ル者ハ生ヲ先  
ヲ克セカサセテ活メテシ面色赤クナル者天ヲ仰ニ臥臍上養塩ヲ置キ艾  
灸ヲ大キクメ性クシ次才ニ覺覺ハ能シ茶ハ在差沃酒湯ヨシ何レ利水  
ヲスレ

小兒火丹吐里ノ穴ヲロニテ吸血ヲ集メ針ニ刺リニ所ナリ臨ニテ中薑ヲ  
貼ス内菜ハ大連丸飲

丹毒ハ亂刺メテリヤカヲ可用

痧赤遊丹毒ニ似タルモノアリ心ヲ紅シレハハ痧節ヲ見ス者ナリ製礪  
砂法二十年モ経タル馬ノ尿ノ桶ヲ見ハ和タリ有ナリ夫ヲ取テ日ニ干シ  
直ニ水少シ入蒸霽籠ニトシレ其後茶碗ニテ上ニ蓋シテ泥汁レ日  
張ラレテ霜日ニ張地ニ埋ニ米三日ニ至テ見ハ上ニ水止者ハ別是ナリ  
小兒生テ産弱死生不明者ナリ其時死生ヲ分ニト欲セハ先ツ臍ノ紐ノ汁  
根ヲシテト楯ニ候フニ動氣有ハ生活スルニ在ニ胎ノ濕ニメ少シ者ノ毒ヲ可  
ト大ニ臍ノ動脈ヲ目的トスレ

久咳新痰ヲ吐スルニ枯薑煎実湯ニ加竹瀝并汁効アリニ又臥不能起  
ト下ノ症ハ奎匡ノ皂莢丸三分檄栲榔三分ト用テヨシ  
滑痰ノ急迫スル者菴荏甘草大麥湯新根ニ引ナリ痰沫ヲ吐スルニ甘草干  
薑湯

脚氣在背ト大不差一層甚レリ御白セント欲スルハ諸方發アリトモ格  
別ノ名方モ有リ本ノ症ニト欲スル前ニ千金本草湯加石並用之可  
肺癰臭氣不可近者或ハ風ト声唾者從症處方多ク存此一奇方アリ  
汚白散方中加淫羊藿茅根三元斗運服セシム一福丹經驗遠溺不  
此者諸藥之無効者臣根ノ尾ト有必ハ香臭ヲ服ナキ日十ノ多ク許  
加之一日ニ二匙平ツ白湯ニ送下有奇効良只佐野惟時方  
耳中巨ノ入テ一向出種キ者アリ衆人彼是トスレ迄段々ト奥ノ入テ甚  
大ケキ者ハヒカケテ以テ矢新ニ耳中ノ出  
男子ノ風油ハ雅流婦人ハ易流ト云之方防風ト迎聖加側柏葉隨症或正  
案ノ神應ニ養真丹ヲ用セ又効アリ

油風ニシ小兒七八歳ノ時ヨリ頸髮脫スルモ其時直ニ瘡治スレハ治ス日ヲ經  
ハ雅流ノ脫落甚者ハ一夜ノ内ニ大ニ脫ス海艾湯ヲ洗ヒ養真丹ヲ用ハ

附不レ

或人曰ル世近所雅ハ只吐ハ劇症隨其症投小羊隻加花卷湯或ハ花  
卷州之劑而雅奏効者吉師福丹帝ニ愁之自亦一奇方名之謂三聖  
湯即主治啓聲胸膈鬱氣吐涎以減克進飲食尤吐之聖劑也方

紅花 檳榔 沙根

乾口爛且令服七湯奏効

酒渣鼻ハ古人ノ説ニ飲酒ノ人ニ有ト云テ之不飲酒ノ人ニモアリ也

赤ヲ形容スル故酒ノ字ヲ入ル者トアリ

酒渣鼻ハ古亂刺ト瓜蒂ヲ末ヲ水ニテト敷一レ汚水出テ愈ルアリ

凡脚辺ニ毒ヲ生カハ脈殺ヲ見ル者ナリ不可不知

大便日ニ兩三行ナル人アリトシテ除中ト云必其人腸痿スルモノアリ也症ニ調胃養

氣湯ニ散當九ヲ一日ニ三匙家用スレハ愈多アリ

湯具ニ控涎丹五分ヲ入レテ効アリ用テ二三日モ瞑眩ニ食氣毛ハ不應ニ  
不可服

高葉、瞑眩ハ湯ヲ生レ飲食不應、宮夜ニ發熱等ノ症ヲ有ルニ甚レキニ至  
レハ炊湯燐向ヲ添レ毒心下ニ迫リテ逐ニ年ヲ換スル者ナリ、不可由新早  
ク黃連解毒湯或甘遂石膏加薑芫散陽和ヲ用ユレシ

麻沸ヲ用ニト欲セハ先羊脂膏ヲ用テ口下ヲスカレテ后用ユレハ克應スレシ  
ノ葉ハ散ニシテ用レハ勢難ク早ク瞑眩シ吐出スル者ナリ並湯ニ用レハ瞑  
眩緩クハ應シ江出スルヲモナレ又人ニヨリ瞑眩ハ應速アリ大抵一過リハ三  
用テ二時位ニ醒スニ至用テハ翌朝迄モ不應ナリ瞑眩スレハ脈必シレリ  
血色モ星ク枯ル者ナリ

又曰散葉ハ二葉用テ克瞑眩スレハ散葉ヨリ瞑眩應ニ故ニ分量ニ異ル  
ノ葉ハ諸病ニ出テ定用ル人少シ予始テ用テタリ世医事ニ裁奪事故ニ  
之佛ヲ用ヒト欲セハ訪察ヲヨクヌレシ血氣不凝、胃中滯痰、宿水以下積、難ノ  
者ハ米メ不可用先服神ヲ療メ后ヌレシ

六佛湯ハ氣血凝結ヲ一時ニシメルナリ大抵十ノ物共ニカシメト見ユルニ  
大抵時ハ灰

痼疾ヲ治スルニ粉劑ヲ投セトセハ後々ト長服スルニ難ラサレハ上走リ大疾  
ナレ時膏ハ八復日炎天ニ至室ノ水ヲ一度ニ地ニ灌カ知レ但上ノニ濁テ底ニ及  
カレ又室ノ水ニヤリヲ少シレシ地ニシ、ノ寸ハ自然ニ潤ヒ底透ル理向シ  
産後ノ后ノ崩漏急ニ不救レハ年ヲ換スルニ至レナリ早リ鹿胎霜ヲ白湯ニテ  
送り下スレ無版上分又一膏方アリ龍氣ノ腸ヲ去リ紅花ヲソメ有霜白  
湯ニテ用ルト又克應スレナリ

白駭尾ト云者アリ大ニ白駭尾ニ至ヌ駭尾ハ癰疽ノ症ニ大ニ白駭ノ斑文アリ不  
可不在之癰疽ト云方異ナリ

一、医家之著、廉リ方、不可不涉、腕、此、氏、書、七、詠、三、法、アリ、儒、者、ノ、歴、史、ヲ、  
能、カ、ス、レ、ハ、假、令、教、百、卷、ノ、書、ヲ、讀、了、ス、ル、イ、ト、モ、以、術、ニ、盡、下、ニ、先、方、后、ヲ、  
讀、ニ、ト、欲、セ、ハ、患、者、ノ、診、ス、ル、ヲ、去、ス、ト、ス、一、シ、而、仲、景、ノ、后、ヲ、規、則、ト、シ、レ、外、甚、千、  
金、ヲ、引、去、ス、門、等、ノ、后、ニ、至、ル、三、一、廉、リ、涉、腕、ス、一、シ、應、一、ハ、今、水、腫、ヲ、患、者、  
以、之、特、ハ、外、甚、千、危、等、ノ、水、腫、門、ヲ、ヨリ、引、合、セ、テ、詠、一、シ、サ、ス、レ、ハ、被、三、后、ニ、無、  
命、リ、去、后、ニ、ハ、又、去、命、ル、ト、テ、ヨリ、記、憶、ス、ル、ト、如、キ、レ、テ、教、卷、ノ、后、ヲ、詠、  
教、百、人、ノ、患、者、ヲ、診、ス、レ、ハ、大、ニ、以、術、ニ、盡、リ、ト、其、言、ヲ、去、却、ス、レ、ト、シ、レ、タ、  
歴、史、ヲ、ヨ、ム、如、ク、ス、レ、ハ、此、法、カ、ル、ト、テ、空、者、過、メ、其、病、者、ヲ、知、ラ、サ、レ、ト、然、  
レ、困、暇、ア、レ、情、見、ヲ、勤、メ、異、症、ニ、逢、ハ、其、方、廟、押、写、ス、一、シ、其、其、大、方、ナ、リ、  
産、后、水、自、利、ス、者、及、神、經、ノ、順、環、セ、サ、レ、故、ナ、リ、甚、者、加、附、子、湯、ヲ、与、一、  
シ、方、中、益、智、ヲ、倍、メ、可、シ、又、一、奇、方、以、烏、一、羽、腸、ヲ、去、リ、紅、花、ヲ、以、大、燒、テ、性、  
ヲ、存、シ、末、ヲ、レ、固、シ、テ、逐、下、ス、テ、亦、去、ニ、方、ヲ、与、テ、教、人、ヲ、治、セ、シ、テ、アリ、

凡、外、利、ヲ、セ、シ、ト、欲、セ、ハ、先、由、テ、精、ス、一、シ、不、然、ハ、以、術、ニ、盡、テ、今、此、之、藥、  
瘍、ヲ、患、ル、人、ナ、リ、診、之、相、虛、ノ、者、ナ、リ、血、虛、ノ、者、ナ、リ、氣、血、虚、ニ、盡、ス、ル、者、  
リ、是、ヲ、診、察、ス、テ、術、ヲ、施、シ、テ、患、者、ヲ、救、ス、レ、ハ、其、常、ニ、復、ス、ル、ト、速、ク、若、不、  
知、メ、唯、外、利、ノ、一、ニ、シ、テ、療、病、ヲ、治、ス、ル、寸、膚、一、日、ヲ、經、ル、ト、身、任、愈、難、シ、且、  
此、ノ、一、ニ、非、ス、レ、任、難、ト、メ、通、一、命、ヲ、救、ス、ル、ニ、至、ル、者、ナ、リ、一、医、タル、者、其、氣、  
虚、タル、血、虚、タル、ト、テ、診、視、メ、不、可、不、知、是、ヲ、氣、ハ、内、治、ヲ、精、メ、レ、非、レ、ハ、得、  
カ、タ、レ、  
根、毒、ハ、我、用、ニ、テ、シ、大、根、草、ヲ、根、毒、ニ、ア、ツ、レ、レ、是、者、説、不、分、明、糖、毒、ト、名、ル、程、ノ、  
猛、烈、ノ、者、ニ、非、ス、者、丹、牛、山、海、人、蔘、草、ヲ、根、毒、ニ、ア、ツ、レ、レ、是、又、不、得、  
胸、中、部、停、ル、者、鉄、粉、四、兩、餘、ヲ、用、テ、効、アリ、  
痢、或、ハ、中、世、ニ、テ、口、眼、喝、斜、ス、ル、者、不、遂、一、方、ハ、サ、カ、リ、不、遂、セ、サ、レ、方、ハ、引、上、ル、者、  
蘭、人、氣、者、ヲ、列、者、ニ、鐵、湯、ノ、鉄、ノ、如、キ、者、ヲ、以、テ、核、ヲ、ハ、サ、シ、印、リ、取、ル、ト、云、リ、

如是凡六連死スルナリヤ蘭人云大ニ虚言アリ

自ラ常ニ出ラシタク、スル者ハ胆虚ナリ甚者ハ三年全ク云

胆虚ヲ患ル者アリ仰臥セシタニ二箇斗密ヨリ見レハ腹大満大腹見

唯満ニ大氣氣即六百匙ヲ用テ治シタリト

腹内ハ水ノニニ積ヲナス物、非ス腸中ニ氣籠リテ腹ヲ成シ水ヲ含シ腸

ヲ成ハ治易キ、氣ヲ積テ腹ヲ為ハ治シ難シ

胆虚ヲ切テ手足先辛痛メテ伸不自由ナル者ハ蚯蚓油ヲ塗テ其本原ヲ

用テ治シ其血氣ノ後セサル内ハアレ

大頭瘧或蝦蟇瘧ニシテ其胡馬加石差ヲ用テ其効アリ傷寒傳習册

篇ニ耳ノ前後腫ル、症アリテ本方ニ石差ヲ加テ用

此蛇虫ヲ患ル者、麝胡菜湯ヲ用テ効ナキモノハ竹葉石差湯

林一鳥口家方湯水湯其方六名處方選ニ出別ニ味ノ加法アリ則野

蕃薇実ナリモ以高水ト云モ高水湯ノ因所、野蕃薇未熟者臣云

滋養精方谷川干午石味糊丸又久年足膝節時々水氣ヲ生ズル者此

方ヲ用テ之愈之又危瘧中ニモ遺精スル者モ治ス

梧州村上玄齡克粹皮ヲ用テ之腹痛ニ用テ之和散吸氣和中湯或午金

茅根散扱ニ加テ此中ニテ麝胡菜ヲ受サレ者ハ理中女蛇杯ニ加テ用申中ノ水

飲テ之愈テ意アルト患差和中湯ニ樺皮ヲ加テ碎樺皮一兩 薑一兩 散一兩 散一兩

一男子腹滿ヲ患テ大氣氣、數十炊テ之、蓋腹滿大便不通ヨツテ塩湯ヲ

以テ其腹内ニ入テ之、腹ヲ按レ腹中ニテ又氣氣ヲ入ルテニ患於是前

ニ用ルル者、其汁薄々廻リ来リ頃刻ニ之、又便利スル者、其方ヲ如テ教示

アリ是難娠胎ノ至斜メテ便不利スル者、整服ノ術ヲ施テ其胎尊利ノ

術ヲ示レハ、通スルノ理ト同シ体大腸上ニハ腰ヲ痛テ、痛テ自由ナル者、故

ニ上口ニ燻床ノル者ハ、枳實厚朴ニテ氣ノ運動ヲ助メ、心ハ歸自張統

糞漸下及下り大腸下口ハ皮厚ク落張不自由故承氣ノ美ヲ其効又  
オイトニテ下ヨリ流氣ヲ灌クシ其効密導ニ勝レリ上口ハ其治方アリ  
ト能臣間ニ壅塞スル者ハ葶力及カタルレ固以テ慰方ニ通セシメタリ

神仙病古今治方ナシ香川子モ神仙病ハ病ニ非ス草根木皮如何治之云  
一リ長洲赤馬園工村勝助ニ云アリ婦人居ニテ下リ姓ニ画ニテナリ近國其病  
高シ其婦人者曾テ患テ症似莖実ヲクニ食全丹高麗根以テ四カニ  
和公運弄氏ニ云リ号ニ効長カシ福田殿介赤園ヲ過ル其家治方ナシ  
ア診ト曰ク治シト乃下痰血涕ニナクシテ身長少進六七ナク腹左快  
セリ其所以ヲ問テ其脈ヲ按スルニ崎傍ニ粟子ノ如キ塊アリ梅スルハ少痛  
ハ文遊是スルカ見ニ少モ不効是金ニ連麩虫丸奉下ナリ有乾血者若將下  
有ニ瘰癧ハ其食スル者論中曰人ニ年裡瘰癧七八日肺多治教者可下之  
假令已下肺數不解合熱則膏是善錢是六七日本大便有痰血厚抵

當陽此瘰癧ノ後ス一キアリ且モツハ其乾スルヲ辨タリ林某西遊即  
其家ニ談志是ニ及一リ大ニ感メ飯田ノ節中川修亮ニ告タリシハ  
西遊ノ土産此事ニ足レリト云テ早クテ賞答書ヲ送テ送レリ村  
井氏ニモ此事ヲハナシケレハ前治ヲ誤リタルヲ悔ヒ其エテ感心セシメタ  
リ瘰癧モト飯末ヲカリシニ村井氏ノ世伝ニテ近井氏ノ渡リ其用ヒ  
初メタル人ハ心付及テ老人治方ニ及一リ頗ル稀沙氏ノ書ニ載セル人  
ト云レシ

灌水ナクヨリ其傷アリテ和真術ヲ行テ灌湯其傷ナシ南菽園村  
公判遊テ其門人田中信藏探其術ヲ習テ施セリ世ニ云中実時々下利収  
痛トトシ者克効アリト云其法未詳尚試者ノ傳ヲ待シ  
一男子丹中ニ入丹ヲヤラシメ折節上ヨリ石落リ其其人頗ル氣ノ利ト  
ル者一早速た石ノ子ニ其石ヲ受留を何處ニアカルニ忽精氣困潰

大石知人定受癰病スルカ如シ治ヲ南涯先翁ニ乞投スルニ桃圭承氣  
ヲ以テス數服ニテ神氣醒然諸瘧一掃ナリ其意ヲ按ニ是打撲シテ  
ラスト實初メ石ヲ受タル守努刀自経路ヲ損スル意アリ且其瘻部ニ  
因テ急ニ血経路ニ迫リ是瘻ニ四肢痿弱スル者ヲシ凡テ桃承氣ニ  
血ノ経路ニ迫ル者ヲ救ニ其意ニテテ地法膀胱其人如狂血自下下者愈  
アリ

凡有形者古胎ヲ見スルニ大承氣少承氣ハ有形ノ病ナリ故ニ必里  
黄ヲ見スルニ大承氣ハ水氣ノ衰ニシテ者ナリ故ニ腹滿ヲ見スルニ  
因テ三承氣辨ニキ

水氣ニ大承氣ヲ用ニ症アリ胸下或心下ニ常テ水塊ヲ結テ患々ナリ  
即其微ナリ其甚キニ至テハ塊積テ結タル者ニ應タルニ三承氣ニ  
一男子築穀ト大指頭大ニ痛テ余ニ他症ナレ甘辛一味膿並ニテラフ

此ニテ愈タリ其意白ニヨル者見タリ

小産ト脱血トテ差別スルニ日経水止ニ七歳ノ姪姫トシハ娠ノ目的アリ  
何トシハ一子宮中ニ先胎存ト胸ト一番ニ歩来ルナリ因テ脱血ト即克  
々索搜メ尋見シ中ニ葡萄菊実ヲシテ見ル如キ白ノ者アリ是ヲ引  
上テ見ルニ秀明ナリ此ヨリ日重ルニ從テ右ノ如キ者段々大キリナルニ姪  
ニテカハ准血ノニテアトウ実ノ如キ者ナリ血塊ヲ又塊ナキ血許下ル  
皆瘻雜効者補中益氣湯加按柿立方炮姜一片生薑一片並シ露宿  
服セシム

此血止ル者ハ泊夫藍后三黄湯ニ犀角地黄湯合方

青州逸談 尾



北越北平先由海濱留學西國學堂  
居居海濱北平書信

天保十三寅歲

冬黃鐘下四日夜五更

北越人

江口良齋寫

