

瘍科瑣言

地天

十部
524



鼻出血	牙縫盜	血箭	血痔	鵝掌風	腎囊風
腫瘡毒	血風瘡	頑癬	膿瘡瘡	凍風	火丹
天泡	肺風粉刺	竹木刺	油風	白屑風	耳病
酒皸鼻	發瘡	咬傷風	癩癬瘡	疥癩	疥癩
癩風	濕腫	走破裂	大傷	女面生瘡	鈕印風
枯筋箭	脚了	走破裂	眼丹	黑子	眼胞菌毒
體氣	白禿瘡	奶癬	蟻撲頭	尪遺毒爛班	蟻姑串
小兒痘風瘡	赤遊丹	走馬疔	重舌	胎疔	鵝口瘡
痘瘡	痘疔	黃水瘡	大人破	臭田螺	牛程躑
僵螂蛙	田螺泡	酸痛	張風	葡萄疔	百病入身
惡虫咬	誤吞針	硬咽喉	中批毒	張毒	失榮
未中毒					

瘍科瑣言

瘡疽

瘡者壅也。フサリト訓ス。因狀ニメ六府ニ屬スルモノ。血凝滯スルト。雖氏氣ヨクメクル故其形々高ク腫上リ頂ニ粟粒ノ如キモノツ。フクト出其根或赤或紫色ノ暈四邊ニ蔓ス痛ニ甚シク。此筋骨ニ徹スルホトニハシ毒ノ所在淺キニ膿ニ汚リ易ク。其形初起傷寒ノ如ク寒熱甚シク。煩熱シ肺浮數ニナリトカク。暴ニ奈スルモノ。疽ハ沮ト訓ス。張狀ニメ五臟ニ屬スルモノ。毒深クメ死血氏ニ病ニユ。其形初起高隆セス。粟米ノ如ク。出テ痛ヲシラス暈ハ廣ケレ尺。龜甲ノ如ク。色却テ瘡ノ暈ヨリハ薄ク毒淺キ様ニ見ルモノ。全体光澤ナシ是即今張。然ル故ニ唯其重ニ貫目ナリ物背ニ負タル様ニシホ。初起

寒熱スレモ格別甚シカラズ兎角諸症後キレニニ初心在
ハ平生ノ腫物ノ様ニ思ヒ治ヲ失シテ人ヲソコノフテアリヨリ經
レハ痛ニ筋骨微シ精神昏潰メ口ハ氣ムツカシク面色青黃
ニハ腕状ヲ見シ府内リ難ク斂リ難キモノ又膿モ清稀ニハ臭
穢アルモノヲ生ス之且陽陰ノ可ト宗ニモ詳ニシテアレモ其勢後
ノ捷徑ハ痘症ノ陽陰ノ完ヲ以テ知ルニ亦治法モ各相準スルモノ
之是早ク覺ラシムルノ言ニ膿管ヲ開テモ痰水出テ粘膿出
テサルモノハ陽状ニ是即其又膿管ヨリ粘膿早クヨク出ル
モノ陽状ニハ即癰ニ化シ癰疽ヲ出スルハ多ク肥脾ノ或膏梁
厚呆ノモノヲ食スルニヨリテ血氣凝滯メ患ル之又五善七惡ト
テハツノ善症七ツノ惡症アリ正宗ニ詳カナレハ是ニ畧ス七惡ノ
中神氣昏亡スレハ極惡症ト心得ニ膿后ハ二ノ惡症見レタ

リ此治ヲヨリ施セ救ハレハ膿潰スルヤセ又中ハ一症ヲ見ハレテモ
油タニハオラヌニ膿后ハ二使レニ少キハ常理ニ津液固ルモノユ一
舌モ少乾燥スル者ニ然レ至リテ乾燥ノ甚シキハ腕症具毒裏ハ
陷ル之又使頻數大便下利ハ腕症ニハ腫物皮肉紫黑色ノ分ハ是
非此府内ナリ手術ヲ施サズ自自然然腐爛メ取ルニ加ルニ邊ノ
生肉モ少シツハ共ニ腐ルモノ之併シ腫物ノ上ハ腐ルハ毒深シ知
ルニ下辺ハ膿流レ溢ル故ニ非腐ルモノニ大常ニ是モ血元ノ
虛弱故也故ニ治法モ膿后ヲ用エキナシ又腐肉取レテ赤肉ニテリ
次才ニ愈キニ及テ辺黑色ニテリ又白膜ヲ生スルテアリ正宗ニ
白衣ト云テ漆滌帛ノ如キモノ赤肉ノ上ニカハリ紫黑點ヲ起スモノ
アリ皆惡症ニ其カリシ白衣ヲ取リテモ又翌日本ノ如ク生レテ
スクイ取ホトツハ凶滅ニテ長肉セス教日如者邊ニ腕スル之又腐

肉ヲ取シアト數數ノ皮ヲ剥シ如キモノモアリ唯純然メチヨト
石榴実ノ如ク長肉スルヲ若北トス又腐肉ノニニテ膿少シモ不出モノ
リ又膿ハ大肉出テモ腐肉取レ難キモノアリ何レ初起ヨリ七八日
以去高クハレ十四日大ニ膿氣ヲ見分モノヲ若北トス十四日以後迄
モ膿ナキモノハ難症ノ最重キ症ハ十八九日迄モヤハリ高腫スルモノ
アリ此ホノ症ハヨリシレサテ外術ハ先其中央粟をメシク膿氣ヲ
令公脱ヲ瘻^{キリ}テ文字序ニ割裂キ其肉ヲ缺ニテ丸クヤリ抜キ取ル
レ其瘻口一面ニ灸灸スルニ壯毅ハ宗ニ云ル如ク痛ムモノハ痛マ
サルマテ灸シ不痛モノハ痛マテ灸スルニ勿命病者余リアツク
思ハ強テ灸ス一カラス其時ハ左ニ灸モナレモ其衣大熱煩悶ハ
ルニ又何種灸ヲモ熱ヲ不覺モノハ雷火針^{ニ宗ニ}ヲ用テ^{見テ}又燒燻^{マク}
燒酒ニ度ツ漬テ用レテアリ又木綿ヲ燒酒ニ浸シ上ニ布キ

其ヨリ燒トモアリ末膿清ヤサル前ニ燒耐ヲ温メ蒸スヤアリ其代リ
ニ雷火針ヲ用エルモヨシ最雷火針ソレハ膿清シタル時モ毒氣ヲ
早ク針投シ去シメカカ用レテアリ是モ隨分火氣ヲ過セシ様ニ日
ニ度ニ日ニ三度三日ニ度ホ用テ^レ瘻口ヲ燒クウケ^レ腐和ラカ
ニ變留^ル所アリ是ハ腐抜テ是肉ノ所ニ若火氣過レハ變ヲ生ス
ルニ生肉長スルヲ知ラズ頻ニ燒ケハ生肉モ腐肉ノ様ニ爛ルニ是レ
腐肉生肉トノ差別ヲ知ラント欲ハ二日位雷火針ヲ用ニ腐肉猶
深キモノハ一二日休ム^レ生肉ナレハ赤肉次第ニ長シ腐肉ナレハヤハ
リ紫色^シ何レ雷火針ハ初心ノモノハ穢リニ用テカラス又病ニヨリ
腫物甚タ方カニメ病人温氣ヲ好ムモノアリ其時ハ桑木ヲ乾シキ
油ヲヌリ火ヲ付テ腫物ヲ照シ温ム^レ是ハ火氣ヲ助クルノ手法ニ
宗ノ對口瘻門ニ詳ニサテ毀項以上ノ腫物ニ灸雷火針^ニ取テ

紫雲ヲ貼テニ
ニ合ハモチリ痕
皮ノ色此赤キ
ヲ速カニ治スニ
ニ速カニ治スニ

忌ムレ致ハ少陽ノ會スル所神經ノ出源故火氣ヲ燻フ又腹部ノ
癰疽毒深ク腐リユモノナトモ薄ク灸スルヲ忌ムレ高リ
腫アカルモノ苦レカラスニ宗ニ未下カノ前ニ灸スルヲアレ是ハ一
切腫物ノ熾痛スルモノニハ直レケレ疔瘻ニ尋常ノ腫物トナカレ
切リ破リテ后火氣ヲ入ルハ腐潰レ易レ止切開ケハ毒氣外發
メ始終ノ治療大ニ速ニ正宗ニ十日ニ針スルヲアレ甚ニ速ニ治特
方ニハ專テ内托スルホトニナケレハナラヌ少ク期ヲ誤ルカニ膏ノ
藥ハ初テヨリ破敵ヲ貼スレ次オニ腐肉去リテ赤肉ニテフバ左突
代フニ又腐肉ヲ早ク取テ思フ寸ハ敵破ニ胆若ク未ヲ去テ貼ニ
他家ニテハ始終左突ヲ用テ輕キモノハ去ニテヨケレ氏重キニ至リ
テハ手スルリハ中ニ腐肉取レカスルニ若膏ハ始終光鋒ヲ用テ是ハ
腫物暈一ハニ貼ニ生肉長メ既ニ愈肉止時瘻痕アルハ妙貼
散疔瘻ニテ毒止レ止諸瘍勢劇レクニ追テ蔓レ疔瘻瘻茶ヲ外
圍ニ敷ニシ方ハ色ニテリ瘻科方笈ニ出ヌ又世ニ瘻瘻瘻藥洗茶
スルアリ是ハ破レサレ前ニハヨクレケレ疔傷ニテ后ヤモスレハ破傷
ニテハ破傷湯ヲ名王守泰
ニテハ準繩ニ見ヘタリ 或流注ニテハ流注ナル者ハ都テ瘻狀ノモノニ
テ所謂瘻ノ腐肉ナリ唯膿血ノミニシテ長肉セントスル時ニ至リテ
手足所ニ腫痛スル者ニ流注ニ流注スル者必死スルニ次オニ脫疔見ワ
スニ時ニヨリテ洗藥蒸藥スルヲアレ其時風寒ヲ忌甚瘻瘻ニ
猪蹄湯ノ姜ニ故ニ余ハ櫻リニ用ルヲナシ或蒸藥ハ浮萍汁ヲ用テ
洗藥ハ燒酎ヲ用テ耐ハ汚血ヲ去リ新血ヲ生切アリ故ニ瘻瘻ニ
代ルアリ又膿汁盛テハ瘻血辺ニ膿汁流レテカフルモノ其時
ハ辺ヲ燒耐アタメテヨク洗テ淨クニ並湯ハ初テハ葛根湯
或敗毒散十散ノ姜ニテ瘻汗スレ古方者流ニハ大青龍ヲ用

酥

石膏角腫瘍ハ石膏ヲ忌ム石膏ヲ搥大用ニシイカホ
トノ粘膿ニテモ石膏ヲ用之ハ水膿トナル其時ハ著者所創シ用ユ
レハ亦粘膿トナルシテ少ク汗ヲ取りテ后ハ陰湯強弱ニ拘ラズ葛
根本附ニ伯州散ヲ益用スレモ甚キ症ハ大集命丹テリヤアカ
蟾酥丸ヲ用之爵批ハ便秘スルモノハ大柴胡内又ハ黃連解毒加
荆防ナトシ用之便通レハ速ニ後服ヲ止公痛強キハ大柴胡散
或托裏消毒欠ノ方中乳没ヲ加用之盜汗アレハ黃芪建中十
補各ノ類見合用ニシサテ十四首ニ至リ腫モ不高膿モ不出脉微細
ニ身冷ルモノハ神効内托加鹿茸黃耆建中加附子湯或鹿
茸附子酒又伯州散ノ角石ヲ鹿茸ニ代用スレモ佳ク何レ附子
劑ヲ手強ク用之レハ吐氣アルニ正宗ノ六君子平生善治其
テホカクキハ吐門ノ加減理中ヲ用之レ又湯アリト亡アリニ石膏

ヲ用之カラス已ムヲ得サルハ竹葉石膏ナト少ク用之レ何膿
潰后ニ古乾燥シ湯甚キハ患症ハ吐逆ノ出ル最モ凶ニ色ニ哥方
アリ別府ニ記スル腐肉トレテ後變症ナキハ著者所傳中人冬
養菜或理中湯ヲ用之レハ膿汁尽ニ長肉ノ生キ夫ハ後少變
症ヲ生ズルモノハ附劑ヲ手強ク用之レテ補分ナシ矣補ニ鹿茸ヲ
加用スレ何潰后ハ甚歟劑ハ離レサルニサテ老人ナト大瘡ヲ
患レ后ハ健忘ニ或忌語スルイアリ然レ血氣セヨク調ハハ自ラ治
スルニ其瘡ヲ後半時或一年モ著高麦油ノ養ヲ食フカラス
或人三寸ナリノ瘡ヲ患レ百日ヲ経テ著高麦ヲ嗜食セヨク翌年
又寸ナリノ瘡ヲ瘡レテ死ス又一人全愈セサル内ニ著高麦ヲ食テ
忽チ瘡リ返リタルモノアリ入門ニ肥肝久地黄丸ヲヨク服スレ瘡
ヲ瘡ト云虚語ナラス返クモ瘡ハ著高麦油ヲ禁スレ

腦疽

腦疽ハ俗ニ云對口疽之靈柩云發頸名曰天疽而元大發消腦高項
名曰腦燦三宗ニ天疽ト云テアリ是恐クハ誤リナラン内經聖女
ノ註ニモ云一ツ云一リコレ類ノ天柱ノ穴ニ當ル故天疽ト名クルナル
ベシ天疽ハ今云對口疽ニ毒深キハ腦中ニ腐肉潰スルハ門云
古所謂發腦發鬚發眉發頤發背也五者者痛ノ至テ險症ニ云云
サテ腦疽ニ内因ノモノアリ外因ハ嫩拙劇痛高腫シ
テ其色紅活ニ内因ハ不治腫モ少ク暈大ニ赤紫黑色稀膿臭氣強
ク乾キ不食或黃泡疣瘡ノモノ發スルニ腐肉深取レ難キハ拔法ヲ
用テ如キ症六ツカシキト知レシ毒氣強ク痛甚キモノニ即ベシ
トツサナト用レテアリ或柔膏ヲ用レシニ柔ニ柔位ニ処ニ大尺程ノモノ
ナラハ一度ニ用テ根リニ三稜針ヲ用テ數度取テ片ナカレ丈ニ人
度

味

ヲ誤レテ見及リ毒解キニ三宗蟻蛛也或三宗大集命丹用之又
菲余ナドモスレアリ又大便不通極甚シモ内疎黃連湯杯ニテツク
ヲ進スル免角相喉近キ故力發背ヨリハ吃元アルモノニ其法ハ清心劑ヲ
用テシル腦疽ノタクハ嫩拙劇痛甚シキ症先輕シ是皆濕ニ屬ス故
ニ着膿潰シテ痛ノ并ルモノハ惡シ何程嫩痛シテモ漫膿スルハ痛
止ハ順ニ三宗者法ニ詳シ可考
一又夫榮ノ様ニ耳下迄モ堅腫シテ大ニ腐潰セシモノアリ又玉枕骨ノ瘡
ヲ發スルモノアリ是腦疽ノ輕キ症ニ玉枕瘡ト名クルモノニ皆上癩疽ノ
治法ニ隨フニシ

疔

疔ハ釘ト訓ス其痛甚クメ釘ヲ打タル如ト云義也又云疔ハ釘ヲ打
ニタル形ナリト云テ疔ト名ク初起粟米粒ノ如キ小泡ヲ生シ三角
六

十
米リタルモノ四九分ホト四方ニ赤黒ノ瘡ナルコト又漫腫ノ尺ニ及モ
ノアリ逆瘡ニ悪寒ヲ瘡ハ瘡ノ常状ニシテ其中ニ熱ハ分レキモアリ
手足ホト厥冷スルモノハ惡瘡ニ宗赤論ナル外ニ瓜藤瘡アリ多々面
部ニ生ス粟粒無数輩ヲ生メ半面ニ延蔓スルモノ最四九粒ホト
テ所々ニ叢テタルモノ即圖ニ明ニス其叢ヲナシタル所是ク
楸ニエテ針シテヨシ重キハ其度ニ針メ昏憒スルモノアリ水ヲ
心胃ニ灌キセヤスレ即覺ルンサテ瓜藤瘡出シ方ノ髮脫
落シテ後ニ十日計ニメ又一ケノ髮モ抜ケレテアリ毒ノ深キ
ヲ知レテ針アト中黄ヲ炒ス又テリヤカシク用テヨシ惡瘡ニ瘡
ヲモアリ紅糸瘡ハ足ニ生シテ其血ヲ疥也迄モナリキニ生メ大膿
下ノ血迄モナリ面部ニ生ス大指喉迄モナリモノナリトテ其是レ所
血筋ヲ引テ速ニ針スレ先其筋ノ上ニ針シ治牙ニ刺レ下スレ

シ重キ瘡其間六七所ニ刺スレ輕キハ三ヶ所位ニテ針シヨロシキ
コ其針アト青蛇ヲ瘡ニ刺テ其毒決メ膿氣出ル膿氣稀ニナリタル
ハ其毒ノ勢イリケケタルト心得レ火焰瘡ハ其面部鼻トトハ
間ニ生シ毒勢烈テメ火焰ノ如シ其形千莖ツモノヨリト出ル中
一點ノ紅黄ハ泡アリテ兎角熱毒烈シキモノニ紫蒸瘡ハ
火焰瘡ニ隣ニ生キモノ是ハ瘡スルト勿テ紫蒸瘡ヲ見レ所在ハ
不定ニ右ニ瘡共骨ノ青蛇ヲ食ル瘡痛至リテ甚シク忍ビ難
キモノ先鋒ヲ點スフケハ中黄或ハ硫黄ヲ用テフスヨハルニ毒氣
ハ分レキモノハ破敵ニ點石ヲ少シク和フ是即拔瘡ノ法也又拔瘡
散ヲ用レテ肝胃ノ油タシスカラス以上ノ瘡ニ宗ニ其形ヲ見セリ
瓜藤瘡ハ古人所不言ニ兎角瘡ハ迅速ノモノニテ死生朝夕ニ
アルモノ殊ニ面部ニ生スル瘡ハ油タシスカラス瘡アルトナリ

又疔疔愈^注テ后、疔毒ノ流注スルモノアリ日久メ無根ノ遍身
疔疔ナリ或眼脚ニ流注シ腫塊ヲ生シ散不腫ナキ寒熱色ヲ去
シ老ルニ本患一タル也 中^注已愈有痕白癩必黒色ニナリ疼痛
スルモノハ敷^注牌^注柴^注湯^注ニシテ内^注並^注用^注或^注桃^注花^注散^注ノ者^注ニテ大^注下^注
若^注腫^注塊^注不^注消^注メ道^注ニ大^注膿^注ヲ^注ナ^注ス^注モノハ流^注注^注治^注法^注ニシテカ^注フ^注又^注毒^注
甚^注シキ^注モノ^注故^注腹^注ニテ^注護^注誅^注スル^注コ^注リ^注鮮^注毒^注湯^注ニ^注蟾^注酥^注丸^注即^注考^注鮮^注毒^注
ノ^注敷^注ハ^注油^注タ^注ニ^注シ^注用^注一^注ギ^注疔^注ハ^注ル^注元^注膿^注シ^注セ^注ス^注ハ^注ヨ^注シ^注キ^注モノ^注ハ^注夏^注月^注
ナ^注ト^注夜^注中^注吻^注ニ^注灰^注ス^注ル^注モノ^注ナ^注リ^注是^注問^注之^注疔^注ヲ^注灸^注シ^注テ^注死^注ス^注ル^注モノ^注ハ^注又^注
疔^注毒^注ト^注見^注誤^注ル^注コ^注リ^注疔^注疔^注毒^注治^注法^注ニ^注詳^注ニ^注ス^注且^注疔^注ノ^注夏^注月^注多^注メ^注
冬^注月^注ハ^注少^注キ^注ヤ^注コ^注見^注ス^注ル^注治^注法^注ハ^注針^注シ^注テ^注血^注膿^注ヲ^注吸^注ラ^注オ^注ノ^注治^注療^注
ト^注ス^注或^注最^注初^注ヨ^注リ^注血^注ヲ^注取^注ル^注モノ^注ナ^注リ^注破^注リ^注テ^注后^注青^注蛇^注ヲ^注貼^注ス^注痛^注強^注キ^注
ハ^注先^注鋒^注ニ^注代^注一^注換^注ス^注ル^注モノ^注ハ^注中^注黃^注膏^注ニ^注或^注ハ^注ス^注ラ^注キ^注ニ^注テ^注ス^注 紅^注色^注膏^注ニ^注代^注
中^注ニ^注リ^注

吉兆

此^注リ^注又^注針^注ヲ^注挿^注テ^注者^注アリ^注拔^注疔^注散^注ヲ^注疔^注口^注ニ^注吹^注メ^注毒^注ヲ^注拔^注ク^注ニ^注也^注決^注大^注
ス^注ニ^注カ^注ラ^注丹^注サ^注レ^注コ^注秘^注主^注刺^注心^注和^注起^注寒^注熱^注頭^注痛^注ニ^注ハ^注味^注鮮^注毒^注或^注加^注黃^注
黃^注連^注黃^注芩^注ヲ^注コ^注シ^注口^注燥^注煩^注悶^注心^注氣^注恍惚^注謹^注誅^注ス^注ル^注モノ^注ハ^注疔^注
毒^注ノ^注心^注ヲ^注入^注ル^注モノ^注ハ^注心^注宗^注ノ^注黃^注連^注解毒^注加^注大^注刀^注子^注件^注陰^注ヲ^注去^注リ^注加^注櫻^注
桃^注ヲ^注置^注シ^注其^注方^注以^注毒^注ト^注名^注付^注テ^注治^注諸^注疔^注疔^注有^注在^注者^注若^注
治^注左^注ニ^注アル^注者^注ハ^注獨^注治^注ヲ^注加^注フ^注ト^注云^注リ^注此^注言^注甚^注思^注尤^注極^注ナ^注リ^注ナ^注レ^注也^注
先^注輩^注ノ^注傳^注ナ^注ル^注故^注ニ^注隨^注フ^注ニ^注衆^注醫^注年^注ヲ^注更^注テ^注タル^注疔^注毒^注湯^注ヲ^注使^注シ^注
一^注晝^注夜^注ニ^注三^注三^注十^注貼^注ニ^注テ^注疔^注膿^注ヲ^注見^注ス^注モノ^注ハ^注生^注リ^注各^注サ^注ハ^注死^注ス^注最^注紫^注膿^注
出^注ル^注モノ^注ハ^注甚^注非^注也^注以^注氣^注ヲ^注交^注ル^注モノ^注ハ^注惡^注兆^注也^注又^注身^注熱^注煩^注悶^注ス^注ル^注モノ^注ハ^注
大^注毒^注就^注大^注毒^注年^注丹^注蟾^注酥^注丸^注或^注テ^注リ^注ヤ^注カ^注ヲ^注服^注サ^注シ^注メ^注又^注疔^注毒^注湯^注ニ^注
ス^注ル^注コ^注リ^注甚^注妙^注也^注或^注誤^注リ^注テ^注灸^注シ^注テ^注疔^注痛^注タ^注シ^注モノ^注ハ^注味^注鮮^注毒^注治^注
葉^注ヲ^注ク^注ハ^注或^注震^注杖^注等^注加^注フ^注火^注逆^注ヲ^注治^注ス^注ル^注法^注ニ^注サ^注テ^注其^注所^注ニ^注テ^注或^注

医高根加本治。七宝丸ヲ毎々四日大死シタルモアリ。医タルモノ
慎ムシレテ亦ハ初創ハ用レテハ忌ム。諸醫大便秘閉或極元
分ケレ申モノハ調胃承氣ヲ用レテアリ又極ツヨク是非共下サテ
バテヌテアリ如ク疾ハイキ、意ヲ注シテ治瘡ス。下劑ヲ与
テ熱大ニ解スルヨリ又毒元バケレリ。氏曰。憤スルモノ蟾蜍丸ナト。差
頻ニ用ニヨシサテ亦ツ患ルモノ沐浴スルテハ忌ク忌ムナリ
不忌ハ大害ヲサスモノ也

脱疽

聖人所謂在肉者割在骨者剝之是也。脚背背去又脱疽
トモ云。暴卒ニ奪セズ漸々ニ奪スルモノ此毒脚元ノ様ニ足脛ナ痛
三月日ヲ経テ奪スルモノ初起指先ヨリ赤ク豆粒ノ赤赤色泡ヲ生シ
極テ刺カカク痛ニ骨ヲ衝キ漸ク燥爛シテ次ハ指一ウツル

モノ如ク指一本ニ出タラハ先早ク生肉上腐肉ヲ見究大節ヲ
リ去レシ。脚元一ウツルモノ切レズ故腐肉ノミヲ挾ニ切レリ又右
ノ足一ウツラノ足一移ルモノアリ其難治ノモノ何レ腐肉ノ廣ク
深キハ治療セヌ。又癩病ヲ疑似スルモノ生レ脱疽ハ玉痛
脱疽痛ハモノ又梅毒ヲ患レ化毒ヲ用テ治シテ後五六十年大
凡濕状ノ如ク脚痛大寒摠アリ三十七八日諸醫年ヲ尽シテ不治
ヨツテ治ヲ余ニ請フ余診スルニ股脚過半腐リテ色灰ノ如ク腐外
ル分ハ兎角生肉ヨリ等厚ツナリ脛辺ハ尤不知痛痒寒ニ皆腐肉ニ
諸醫不知之凡濕トシ思ヒシニ予之ヲ告ル氏曰。信セサル様ナ
レ途ニ曰。若痛ニ忍ビ難キト思フナラハ即止ニ不苦ト思ハ。瘡治ス
ベレ去テ以テ病人ヲ難ク難堪ヲ以テノ故ニ治ヲ余ニ請フ是。於
テ生肉腐肉ノ間ニ針シタルニ汚水ヲ出ス。一升ハカリアリ。予又

七宝丸
消毒丸

医背尚根加本治。七宝丸ヲ每々四日大死シタルモアリ。医タルモノ
慎ムシルテ疾ハ初創ハ用ルルハ忌ハシ。謹言大便秘閉或は元
分ケシ中モノハ調用承元ヲ用ルルアリ又抑ソヨク是非共下サテ
分ケヌテアリ如是疾ハイコノ意ヲ注シテ治瘡スレシ下劑ヲ与
テ熱大ニ解スルアリ又毒元ハケレク氏自憤スルモノ蟾蜍丸ナト差
頻ニ用ニ自シサテ疾ヲ患ルモノ沐浴スルルハ忌ク忌ムナリ
不忌ハ大害ヲ与スモノ也

脱疽

脱疽人所謂在肉者割在骨者劇云是也。脚背背去又脱疽
トモ云暴卒ニ至ス漸々ニ至スルモノ此毒脚元極ニ足脛ヲ痛
三月日ヲ経テ至スルモノ初起指先ヨリ赤ク豆位ノ赤色泡ヲ生シ
極テ劇クカク稱ニ骨ヲ衝キ漸ク燥爛シテ次ノ指一ウツル

モノ如是指一本ニ出タラハ先早く生肉上腐肉ヲ見究大節ヲ
リ去ルニ斷堤一出タルモノ切レテ故腐肉ノミヲ挾ニ切レリ又右
ノ足一出于左ノ足一移ルモノアリ其難治ノモノ何レ府肉ノ廣ク
深キハ治療セヌ一又癩病ヲ疑似スルモノ生レ脱疽ハ玉痛
脱疽痛ハモノ又梅毒ヲ患レ化毒ヲ用テ治シテ後五六十年大
凡濕状ノ如ク脚痛大寒摠アリ三十七八日諸医年ヲ尽シテ不治
ヨツテ治ヲ余ニ請フ余診スルニ股脚過半腐リテ色灰ノ如ク腐外
ル分ハ兎角生肉ヨリ等厚ツナリ脛辺ハ尤不知痛痒漢ニ皆腐肉ニ
諸医不知之凡濕トシ思ヒシニ予之ヲ告ル氏家内信セサル様ナシ
氏途ニ曰若痛ニ忍ビ難キト思フナラハ即止ニ不苦ト思ハ療治ス
ベシ云ヲ以テ病人モ餘リ難堪ヲ以テノ故ニ治ヲ余ニ請フ是於
ニ生肉腐肉ノ間針シタル汚水ヲ出ス一升ハカリアリ予又

紙修入テ先水止メル中ニ最早脱症ヲ見ル患寒ナト出テタリ針
ササレ前ニ神缺調合シ置キ先コレヲ患テ翌日又是ヲ見ル股
内腐レル方ハ湯火傷ノ形ノ如ク水泡ヲ發シタリ色ニ補劑ヲ
患メタレ遂ニ死シタリ又一人前脛劇痛スル一日久クメ不愈也
ナトコレニ七日許リ引籠居ル中ニ痛忽チ足ノ大指ナリ赤豆
ノ皮ヲ湯ニ煮タル白ニナリ煩ニ痛ニ足ハ次指ニ移リ足ト移リ四
肢ニ遷展シテ少指一本残りテ外ハ跡半方欠テ腐落タリ大ニ
腕脈虛數遂チ出ツ即チ補劑加附テニ大後ニ知度草ヲ患テ凡
一年餘ヲ服シテ愈タリ其後遂チ壯健ニナリ今ハ高野テ工師ヲ
業トセリ兎角腕脈モノ故ニ補劑專要之其初症ニ其指ヲ切
ルハ肝要ナレ凡人ニヨリテ瘡ヲモケリ雷火針或ハ宗ノ霹靂
火等用シテ初造方攻メテ毒ヲ抜クハ肝要ニ蟾酥丸本集金丹下

後五七至
四

酥

ヲ用シ之ニ六十補欠又桂枝加朮附子湯毒丸ナトテ並用スレテ毒ヲリ
ニ方ニテ其六用ニカラズ急ニ多ク用テ寸ハ却テ少クバレリテ効
ナキニ日久ク少シク用テ消毒化濁ニテ効ナキモハ他毒丸用テ
シ粉ヲ用テ腫來ル者ハ不^レ_レ也亦ハ破鼓ヲ貼リ腐肉取レテ
痛出テタラハ左癩藥丸ノ類又後衛ヲ貼スルモヨシ又毒甚シキハ
一時ノ計畧各コレヲ蟾酥丸中ニ入り辺ハ中者ニ辰砂又片腦ヲ加ヘテ
貼スレト煩人足ノ指痛ナリ共六ヶ月次第ニ其痛跡ニ上リ漸々脛
ニナリ指ノ痛ハ却テ知ラス皮色紫ニ変シ際ノ辺ニ及セ次第ニ色黒ク
ナリ脈虛數舌上乾裂衣白点生シ跡上針ヲ覺ハス腕候ノ見セリ
今尾精神ニキナリ如キ下^日卒^日死ス是腕瘡ナリ可恐ク

癩瘡

頭項出ニ出ツ針スレハ必澤出ツヨク取ル

其初起頭項ニ生メ累々應々珠ノ懸ナリ如ク或左或右或在裏

十

アリは傳針灸の必也也。大腸經の近所ナレハ針スルハ大ニ出スル者也。可心
消也。

腸癰、瘀血ノ留滯ニヨリテ生ス。故ニ婦人ニハ多ク見テ男子モ貴人ニハ少ク平生
疾^上疾^下ニ肉食ヲ大過スル人カ或常ニ大ニ努カスル人ナト腸ニ瘀物生スル
カ故ニ婦人産后瘀血汚滯シテ生疾ヲ患ルニ初起ハ初ナトテキルニ
腸癰ハ腫タル所ニ熱シ且痛上下ニ引レ使シテ淋疾ノ様ニテ
ルニ引レ尻ヲト違ヒ下ニサシムト云様ナラナレ又烏頭湯湯
子種ヲ湯ナリノ症紛レ易シレ腸癰ハ腹痛ハ常ノ痛ト違ヒ
是非是カ上ニ引レ手ニテ押シテ少シサワリテモ大ニ腫テ其塊極シ
テ和ラカレバニテ腸モ腫レ膿ヲサント欲スルナラ腫トリ便秘ノ膿
トナラント欲スハ腸ニ腫レ膿ヲ故腹ニ張アリテ按スレハ底堅ク覺テ
其癰ニ腹ハ一パイニ引ツリ痛ナリ此時大黃牡丹皮湯ヲ用スレハ益

大黃牡丹皮湯

痛ニ強クナレハ便膿血ヲ下セハ痛カルクナルニ初ナレハ下無シトハナキ
宗ノ大黃牡丹皮ト大凡^引レ腸ノ多クハ外ハ肉潰スレモ又内ハ潰スレモアリ漫
ク又之ヲ用レハ腸癰ハ多クハ外ハ肉潰スレモ又内ハ潰スレモアリ漫
腫レテ生膿潰スレウナレハ大黃牡丹皮湯ヲ用スレハ必脱スレハ此ハ正
宗ノ牡丹皮散ヲ用スレハ又角力取カ或滯下后ノ腸癰ハ痛少異也
其痛必凝結ヲ散熱シ針シテツクヤウノ痛ニ奪脉状ニメ上下ニ引リ
且膚枯燥スレハ此症ハ甚ク治子敷^敷將散ヲ用スレハ蓋飯ハ排
膿ノ切アリト云症大黃牡丹湯ノ症ニ比スレハ腹和ラカニ産後瘀露
鳴癰腹癰^鳴走^鳴三四日モ経テ腸癰トナラントスル者活血散ヲ湯ナト効
アリ大黃牡丹湯月事不順血塊ノ状ニ數年ヲ経テ腸癰トナレキ
コレ又腸癰ノ後症ハ腹ニ面ニ不痛腫レカレハ痛ニ按之ハ
大ニ痛也大壯^{伯州}ヲ每服スレハ且二三日痛強メウヲ下スモノ

アリ傳針灸必忘之ニ大陽經近所ナレハ針スルト大ニ出スル者也可也
海也

腸癰、瘀血ノ留滯ヨリテ生ズ故ニ嬪人ニモ男子モ貴人ニモ少シ平生
疾^疾ニ肉食ヲ大過スル人カ或帝ニ大ニ努カスル人ナト腸ニ瘀物生スル
カ故ニ婦人産后敗血汚滯シテ生ズ是レニ初起ハ初ナトテモキル、
腸癰ハ腫タル所ノニ熱ニ且痛上下シテ便シテリテ淋疾ノ様ニテ
ルニシレバ和ナト違ヒ下(サ)ニ云様ナラハナシ又烏頭湯附子
子種湯ナトノ症紛レ易シレ腸癰ハ腹痛ハ常ノ痛ト違ヒ
是非足カ上(引)ナリ手ニテ押シテシツサワリテモ大ニ痛^痛フ其塊^塊ニ
テ和ラカナルニテ腸モ腫レ膿ヲナサント欲スルナト腫ナリ便秘^{便秘}ニ
トナラント欲^欲ハ腸ニ腫レ膿ヲナサント欲スルナト腫ナリ便秘ニ
其^其癰ニ腹一^一ハ^ハシツリ痛ナリ此時大黃牡丹皮湯ヲ用エレハ益

大黃牡丹皮湯

痛ニ強クナレバ便膿血ヲ下セハ痛カルナレハ下セズトハナキ
ニ宗ノ大黃牡丹皮ト大^大明^明シ場^場々^々ニテ便^便數^數ハ腹^腹法^法硬^硬ニ肉^肉色^色カ
ク^ク又^又疔^疔ニ用^用ル^ル腸^腸癰^癰ハ多^多クハ外^外一^一府^府肉^肉潰^潰スレモ又内^内一^一潰^潰スレモアリ漫
腫^腫レテ生^生膿^膿潰^潰スレウナレハ大^大黃^黃特^特選^選湯^湯ナト用^用エレハ必^必脫^脫スレハ此^此ハ正
宗^宗ノ丹^丹皮^皮散^散ヲ用^用エシ又角^角力^力取^取力^力或^或澄^澄下^下后^后ノ腸^腸癰^癰ハ痛^痛少^少異^異也
其^其痛^痛必^必凝^凝結^結々^々厥^厥熱^熱ニ針^針ニテツクヤウ^ウ痛^痛ニ奔^奔豚^豚状^状ニメ上下^{上下}引^引ナリ
且^且膚^膚枯^枯燥^燥スレハ此^此症^症ハ^ハ黃^黃苳^苳散^散ヲ用^用エシ蓋^蓋苳^苳ハ排
膿^膿ノ切^切アリ^リ也^也疔^疔大^大黃^黃牡丹^丹湯^湯ノ症^症ニ比^比スレハ腹^腹和^和ラカ^カ産^産後^後瘀^瘀露
不^不走^走メ三四^{三四}日^日モ経^経テ腸^腸癰^癰トナラントスル者^者活^活血^血散^散瘀^瘀湯^湯ナト効
アリ大^大黃^黃牡丹^丹湯^湯月^月事^事不^不収^収血^血塊^塊ノ状^状ニメ數^數年^年ヲ経^経テ腸^腸癰^癰トナレ
ヨシ又腸^腸癰^癰ノ後^後症^症ハ腹^腹二^二面^面ニ不^不痛^痛腫^腫レ^レカ^カル^ル處^處アリ^リ痛^痛ニ按^按之^之ハ
大^大ニ痛^痛也^也大^大壯^壯伯^伯州^州ヲ每^每服^服スレハ且^且二^二三^三日^日痛^痛強^強メ^メウ^ウ下^下セ^セノ

消散スレテ又利急候重痢疾ニ似テ膿ヲ下シ又膿水交リ
 下リ惡寒ナトスルハ至リテ難症之又内外両方膿ノ出ルヤウナモ
 八枚コレザル之外膿元モノ其候ニテスニ又モノイモ左突ヲ
 用七深クサスカラス五方一寸位サスニ深クサセハ脱ナ且痛ヲ去者
 自然ト膿口ノ大ナルモノハマイヤニ不及又小産後少腹痛ニ
 膿アリモハ胞ノ腫ルニ大黃牡丹湯ヨリ産后ニ瘀カト疑
 似スル処ニハ其虚状ルモノハ十全大補湯ニ益母汁ヲ加一用スル痛止
 ンテ誤テ桃核承気ヲ用スル勿レモ此症潰レハ張門ヨリ膿ヲ
 出ス之何レモ初起ニハ大黃牡丹湯ヨリ虚状ノモノハ手ニ按セハ
 和カニ病人心ヨク思フ実状ハ痛下トモキ拘ル氣味アリ膿潰
 宗ノ收膿散ヲ用テ十日モサ日モ膿不尽モノハ大牡伯州ナ
 六用ニカラス脱シ場キ脱状必汗出時惡寒ナクハ併發

敗桃

○痛

症ハ半年モ膿ニルモノ内膿一カリモ便秘スルモノハ下ハ抑テ蓄又
 又膿腐スル膿ヲ二三度下シテ止モノハ原シ腸癰ニ痛ニ發作ア
 アレモ食スレハ益スルモノアリ又小産后刺テ外發ニ於テナリ
 腎殿目眼ハ出レテアリ多クハ膿ニ赤ニ腐ルモノ又内股ニ赤リテ腐ルモノ
 毛見タリ小産后刺テ有蓋ヲ吹味スレ何レモ膿后治法ハ膿
 ナカクルトナスレ又大便秘結ハ膿血ヲ大ハ膿毒ニ誤ルカラス膿毒
 膿血ハ膿汁血水出後重カサアリテ又大
 便ハ通レ難シ又燥屎血塊ニ毛紡レ易シ燥屎血塊ハ極大見レ皮ヲ
 離テアルモノ腸癰ハ皮ニ付テアリ初腫レテ膿ニテラセ先鋒ヲ
 付置ビレイ多ク膿ニテラントスレハ火出スルモノ
 一方 芪 穿山 天瓜粉 皂刺 桑葉 川 甘草 毛入ヨシ
 石水ニ合テテ一合ニ並シ用スレ又上腫スハ膿水大便ニ下ルモノハ

辨

消散ハシラフニ又利急候重痢疾ニ似テ膿ヲ下シ又ハ膿水交リ
下リ惡寒ナトスルハ至リテ難症ニ又内外両方ハ膿ノ出ルヤウナモ
ハ救フレザルニ外ハ膿ヲモハ其候ニテスニ又モシクイモ左突ヲ
用テ深クサスニカラス五方寸位サスニ深クサセハ脱ナ且痛ヲ去者
自然ト膿口ノ大ナルモノハマイ午ヤニ不及又ハ産後少
ニルアリモハ胞ノ腫ルニ大黃牡丹湯ヨリ産後ニ瘀骨ト疑
似スル処ニハ其虚状ルモノハ十全大補湯ニ益母汁ヲ加一用スル痛止
ムニ誤ニ桃核承気ヲ用スル勿レモ赤濁レハ張門ヨリ膿ヲ
出ス之何レモ初起ニハ大黃牡丹湯ヨリ虚状ノモノハ午ニ按セハ
和カニ大病人心ヨク思フ実状ハ痛下トモキ拘ルニ味リ膿浸
后ハシ宗ノ收膿散ヲ用テ十日モサ目モ膿不尽モノハ大牡伯州ヲ
六用ニカラヌ脱シ場キ脱状必汗出時ニ惡寒ナトスルニ併發

痛

疾ハ半年モ膿ニルモノハ一潰(カ)リモ便秘スルモノハ不_下ハ拙ヲ畜又
又膿腐スルニ膿ヲ二三度下シテ止モハ原レ腸癰ニモ痛ニ發作ア
アルモノハ食スレバ發スルモノアリ又ハ産後刺テ外發ニ於テナリ
腐出ルアリ多クハ腐ニ赤_ニ腐_ニモ_シ又内股ニ赤_ニ腐_ニモ_シ腐_ニモ_シノ
モ見_ルリハ産後刺テ有_テ赤_ニ味_スニ何レモ潰后ノ治法ハ膿
ヲカクルトヨクスニ又ハ便秘結_ニ膿_ニ血_ニス_ルハ臟毒ニ誤_ルニカラス膿毒
ハ膿_ニ血_ニス_ルハ膿汁_ニ血_ニ水_ニ出_ル後_ニ重_ニ白_ニアリ_テ又_ハ大
便_ハ通_ルニ難_シ又燥_ル屎_ハ塊_ニモ_シ紡_ル易_シ燥_ル屎_ハ塊_ニモ_シ見_ルレ_ハ皮_ヲ
離_レテ_ハアル_{モノ}ハ腸癰ハ皮ニ付テアリ初腫_レテ膿_ニテ_ハ先_ニ鋒_ヲ
自置_レシ_イ多_ク膿_ニナ_ラント_スレ_ハ灸_テ治_スル_{モノ}ヨ_シ

一方 芪 穿山 天瓜粉 皂刺 桑葉 川甘_ヲモ入_ルヨ_シ
右水ニ合_テ以_テ一合ニ並_シ用_スレ_シ又上_ニ腫_スハ膿_水大便_ニ下_ルモノハ

蒼朮附子收膏散ヲ与レシ牡丹散モヨシ諸胎^右大便不^下胎^辺ニ微
腫アリテ坐塊アルモノアリ大黃牡丹湯ヲ用テハ血下^レハ腹痛^痛不
便不利シテ膿ヲナスモ若^クアリ又膿^下下スモアリ^ハ瘀血^{或ハ}豆汁^ノ
如キヲ下スモアリ是腸^凡ト云腸^凡ハ腹^ニトナシ腸^凡ハ腹^ニ比^テ冷^感
スル者ニ人膿ヲナスモノニ非^ズ思^ハ凡^ハ湯^ハ可^シ一婦人^ハ産^后腸^凡痛^ニテ格
別痛^モナク又^ハ堅^キ凝^モナク^レテ漸^々膿^潰シ^テ胎^{ヨリ}膿^出タ^リ維
ズレテ見^ルニ三寸^モ入^{タリ}不^目ニ死^{タリ}必^脱ス^ル此^ハ牡丹皮散^ヲ用
ニ^シテ角^力板^辛或^シ湯^下后^ノ腸^凡痛^少異^ル其^痛所^凝結^ス大^効也
シ針^ニツク様^ニホ^ク奪^胎ノ^性其^下引^リ且^膚コ^リト^スル^ニ是^症
ハ蒼朮附子收膏散ヲ用^テシ^ルテ蒼朮^ハ排^膿ノ^功アリ^モ症^大
黃牡丹皮湯^ノ性^比シ^ハ脈^和ヲ^カシ^産后^露惡^不下^スニ^四十日^経テ
腸^凡痛^下ス^トス^ルモノ^后血^散於^血湯^ナト^効アリ^大黃牡丹^ハ月^支不^順

塊ノ状^ニシ^テ數^年ヲ^経テ腸^凡痛^下ス^ルモノ^ニヨ^シ又腸^凡痛^ノ後^症脈^和
一面^ニイ^タク^ス腫^{アル}所^許按^之大^痛ニ^大黃^{牡丹}ニ^伯州^ヲ並^版ス^ハ
一旦^ニ三日^強ク^血ヲ^下ス^{モノ}ハ消^散シ^テ仕^ラズ^又利^急後^重利^疾ニ^似
似^テ膿^ヲ下^シ又^膿ハ水^交リ^下リ^寒ニ^トス^ルハ至^テ難^症又^内外
両^方膿^ノ出^ル様^ノモノ^ハ不^救之^外渡^レモ^ノ其^マテ^ハス^モシ^ク大
イ^チヤ^ニ左^突ニ^用ヒ^浮ク^刺ス^カフ^ス五^分寸^位其^マテ^ハ深^ク若^ハ脱
シ^テ其^痛ヲ^ナス^シ自然^ト膿^口欠^{ナル}モノ^ハイ^チヤ^ニ不^及又^ハ産^后腹
痛^ハ腸^凡痛^ニテ^{アリ}モ^ハ胎^腫ル^ニテ^リ大^壯湯^ヨシ^産后^ニ瘀^血ニ^疑似
ス^ル症^ニ其^虛症^{ナル}モノ^ハ大^全大^補ニ^益母^羊ヲ^加用^スレ^ハ痛^苦ヲ
アリ^深リ^テ桃^核承^氣ヲ^用ス^ルヲ^ナカ^シ症^潰レ^ハ陰^門ヨ^リ膿^ヲ出^ス
之^何ニ^モセ^ヨ初^メハ^大黃^{牡丹}湯^ヲ用^ヒハ^血下^ルシ^ハ腹^疼痛^少便^不
利^不膿^メス^レモ^ノアリ^又利^急後^重大^痢疾^ノ如^キアリ^或自^臭汚^物

下之寒熱ノ變アルモノアリ又膿血ヲ下スモノアリ又赤血豆汁ノ如
キヲ下スモノアリ是ヲ腸風ト云腸風ハ腸ノ風冷ヲ感スルモノハ膿
ヲ下スモノトラス腸風湯食一類ノ産后腸癰ニ格別ノ痛モナク
又堅キ凝モナク漸ク膿液大腑ヨリ膿血出タリ注ヲ入テ見ルニ
三寸モ入タリ不日ニ死セリ。

臟毒

外科正宗ニ云レ所ノ凶状ナルモノハ皆脫肛ノ種類之甚連陰濕湯
ノ条ヨリ云ルモノ真ノ臟毒ハ肛門中ニ腫痛シ十日モ不大便シ
レ痰水膿血ヲ出スモノハ極痛モナク利急後重メ惡臭ノモノヲ下レ治
ス寒熱ニテ骨状ナリ肛門中蝕スル様ニナレハ不治也又切レ痔ニ疑似
スルモノ多クハ大便秘閉シテ支レ故後門裂ルモノ又一種痔ニメ不
痛血カカリサツト下ルモノアリ是ハ瘻ニ臥サシメ肛門ヲ閉キテ

見レハ列衣テアルモノ是ヲ痔瘡ト云膿毒ハ痛モナク黒血ニ下リ小腹
ナト硬満大便ハ硬濡ト常ク如クメ通シ難シ肛門ノ奥ヨリ血下ルモ
ノ或ハ便淋瀝シ劇シケレハ小腹ニチチサレテ様ニ痛クモノ腐
リテ赤クテ又穴痔ニ近似スルハ肛門中肉ノケル腐ル様ニテハ不治シ
疔癰ノ大治スレバ大壯湯可シ若シ疔癰セズメ痛ト出レモノハ赤石脂湯
餘糧ヲ末トシテ白湯ニテ用テ煎湯ハ薑土湯可シ又後門裂タルモ
ノハ油葉ヲ紙糞ニテリケルニ疔ヨリテ羊脂ニ膏餘糧ヲ用テ
蛛酥 ヲリ又政葉ニ蟾酥性真珠散ト用テ用テモアリ又一術アリ酒
ノキ樽ノ中密ヲ入鍋ニテ湯並メ温レハ中ヨリ湯元出ル也其湯元ニ
テ後門ヲ入シ痔ト膿毒ハ相似タル病ニハ膿毒ヲ痔ト思テ治療ス
レハ大ニ誤リ汚名ヲ取ルヲアリヨクハ介辨診察スレバ宗ニモ腸痔
ノ腫痛スルモノハ膿毒トシテ治テ施ス混贖ヲ記セリケ様ナク故ニ其

一腫毒ヲ見誤シ

痔

痔崎也クイヤト訓ス凡九亦中向ヲ突起スルモノヲ痔ト云眼痔耳
痔肛痔鼻痔等之耳痔ナト其六ツカシモノ之後三耳聾トナルモノ
肛門内皮ニ重ニナリタル処濁血瘀物由滯ナ痔トナル之をリ云凡

肺脈

人畧療治ノ差別ニテ分ル肺痔肛痔腸痔血痔ノ
漏ニ雜冠痔鬪花痔ハ皆梅毒ノ形状梅毒鬪冠者謂ヲ以テ名ツケ

疹瘡或疹后ニ肛門内皮一疔ノ發スルナリ版中妨向煩渴ナ痛透
ス腸疔ナリ痔ト思フテ油メニスレハ今余ヲ換ス誤止カラス又麻疹后
ニ發スルナリ是ハ漫腫ナ疼痛寒極全舛ノ勢大異ナリ凡テ痔ハ血
脈ヲ傳フモノニテ親カ痔ヲ患レハ子モ亦患ルモノ多シ肺痔ハ酒痔牡
痔ト云モノ之是ハ肛門痔毒ニヨリテ大便秘シ其故ニ切テ痛血下ル

キ尾血格別々クハ下ニ横ニ臥サシメ肛門ヲ開キ見ニ少列各痔ルモノ
之故ニ肛門痔クメツカノホキモノ出ナリ其列各々タル亦蝸牛由ツナリ
用ニシ野猪油モ自之版各々ハ加味解毒湯以テ血痔格別痛モノハ
只下血者或一升ツモアリテ服包青黃ニル症ニ是ハ其歸膠
艾湯丹丹參ヲ加テ用ニシ牡痔ハ疣痔ノ一青蛇ヲ付ケハ一具ハ
引上モ根治セ又モノ之糸ヲクナリ肉切リニテハサニ取ルハニ腸痔ハ世
云脱肛痔ノ一之是療治ハ古今テ云モノナシ先年時湯吉雄家ニテ二人近
療治シテ即死セルヨシニ圖及リ腸痔ノ治療ハ予カ發明ニメ在リ
此發タル術之他ノ外療家ニ決シテ知ラサルニ切實ノ脱肛ト云テ
ハ頑人難産ノ時ニキナリ出ヌ痢疾後或出ルニ多キモノ之是肛門
翻飛リ出ル者ニテ三四寸モ出ル者ニコレハ痛人ヲ臥サシメ粘着糸ヲ
肛ニヨクスリ午ニテヨク押シテ収メテ調和煎ヲ袋ニ入テ蓋シ

一腫毒ヲ見誤シ

痔

痔ハ崎也クイヤト訓ス凡九疝中向ヲ突起スルモノヲ皆痔ト云眼痔目
痔疝痔瘻等ニ耳痔ナラハ其六ツカシモノニ後ニ耳聾トナルモノ
肛門内皮ニ重ニナリタル処一濁血瘀物由滯ナ痔トナルニ委リク云凡
ハ色ニテ先大畧瘰癧ノ差別ニテ凡ハ腫痔ハ痔腸痔血痔ノ
漏ニ雜冠痔鬚花痔ハ皆梅毒ノ形状梅毒鬚者謂ニ
毒ニ宗ニ詳ヤヲ以テ名ツケ
タルニ又疹疝ニ肛門ノ辺ニ疥ノ瘡スルナリ版中妨向煩渴ナ痛透
ス腸疝ナリ痔ト思フテ油タニスレハ今余ヲ換ス誤ルカラヌ又麻疹疝
ニ至業スルナリ是ハ漫腫ナ疼痛寒極全解ノ勢大異ナリ凡テ痔ハ血
脈ヲ傷フモノニテ氣力痔ヲ患レハ子モ亦患ルモノ多シ腫痔ハ酒痔牡
痔ト云モノニ是ハ肛門痔毒ニヨリテ大便秘シ其故ニ切テ痛血下ルニ

キ尾血格別多クハ下ニ横ニ臥サシメ肛門ヲ開キ見レ少列各瘡ルモノ
ニ故ニ肛門痔クメツカレホキモノ出ナリ其列各タル亦一蝸牛由ツナリ
用ニシ野猪油モ自ニ版タニ加味解毒湯飲シ血痔格別痛モナク
只下血者或一升ツモアリテ服包青黃ニレ症ニ是ハ苦歸膠
艾湯ニ丹參ヲ加テ用ニシ牡痔ハ疣痔ノ一青蛇ヲ付ケハ一具ハ
引トモ根治セヌモノニ糸ヲクナリ肉切リニテハサニ取ルハニ腸痔ハ世ニ
云脱肛痔ノ一ニ是瘰癧ハ古今テ云モノナシ先年時湯吉雄家ニテ二人近
瘰癧治レテ即死セルヨシ聞及リ腸痔ノ治療ハ予カ發明ニメ在リ
此瘰癧タル術ニ他ノ外瘰癧家ニ決レテ知ラサルニ切實ノ脱肛ト云テ
ハ頑人難産ノ時ニキナリ出ヌ痢疾後或水沈ニ多キモノニ是肛門
翻リ出ル者ニテ三四寸モ出ル者ニコレハ痛人ヲ臥サシメ粘着糸ヲ
肛ニヨクスリ午ニテヨク押シテ収メテ調和煎ヲ袋ニ入テ蓋シ

レ此種信唯右其午ノ裏ニ妙アレハ患者ノ苦ニモエラスヨク治スルノ元痔漏
ノ病人所状ニテ自汗盜汗寒熱集脈散ニテリ且痔漏孔ノ辺紫黑色
水膿多キ疔ハ必出瘰癧スニカラス是不治ノ廢物也先ツケ様ニハ云傳レシ
實ハ門ニ入テ親炙スルノ三年ノ日ヲ積サバ其妙ヲ親アトアタフク是
客ヲケル中ノ痔漏ヨリ出出セシ素麵ヲ寸ワ切リシ如キ出ル
モ疔肛門至テクサキモノ又痔ニ漏キナク肛中ノ痒ク出テ下スモ治法因
シテ大凡七八日ヒテ愈シ金匠ノ針ノ筒甲湯ヲ服レ薑葉ヲ用レ
此治法モ傳アリ入門ノ可受

下疳

下疳陰莖ノ瘻ニテ是ハ多ク房変ニテ汚元ニ浮テ生ルノ痒キモノ毒
浅ク痛強キハ毒深シ必痒ヨリメ痛ニ至ルハ中黃左突或破敵
ヲ煎並湯ハ解毒ニテ端的ヲ並用スレシ通ノ下疳ハ口フサト口又

テニテラカレレイナトノ洗茶ハ用テカテス長崎辺ニ多ク洗茶
ヲ用レ此是治瘻工又ナシト云レ蠟カケル下疳ノ腐爛濕キナト
ハユアラウトロニ洗ヒ珍珠散ナト用シテアリ或連綿メ至愈長ビク
モノニカレレイナト用レト決シテ初起ノ内ニ用レハ及テ便毒骨痛或
目耳ナト不測ノ変症ヲモルモノツシムレシ又イケヒヤクシナトモ用テ
内茶ハ本治劑梅肉或生芋ト用テリ甚効ナシ下疳ハ大黃劑ヲ
強ク用テリ肝毒又薑葉ヲ用テヨシ大解毒端的ニナル事ニ
又半年モ長キテ愈々タル疔ハ生室丹化毒丸ナト用レテアリ陰莖ニ
結毒スルノニ用テヨシ形下疳ナレバヨク見ルハ各異又淋ヲ毒丸
下疳ハ小解毒湯ハ正散ナト用テシ如精瘻ト云アリ其ハ房変ニ
ヨラス自然ニ生スルノ輕キ疔初起粟米粒ノ如キモノ四ツ五ツ
出テ大ニハビヨラス且骨痛ニモ至ラス其後治スルモノ疔瘻ノ治法モ

脛スルモノハ、味丸ヲ用又痲ヲ裏一腐出膿若ク升ソモ毎日此
ト云様ナル症ハ必死ニ又腐肉突出シタルニ腐棄ヲサシ療治スルアリ
又痲疔ニテ膿囊ナリ大ニ腫タルニ管ニテ水ヲ絞リ世固ニテスルト是其
水ヲ取タル中ハ快ヨケレバヤカテ又本ノ通り水々ナリテ大ニナルハ
別治術ノ一傳アリ先考親炙傍觀セズニハ湯ガタシ入門ノ北軍ハ委
シク此術ヲ理會シテ行ハシ不尔ハ大ニ人ヲ誤ルシ又湯液創ヨリ肉突
出シテ毒ノ如クニモシモノナリ是ニ數年不癒モノシ同リ入門テ其後微
妙ヲ得テ可施治又毒ヲ以テ治スルモノアリケレバ治効ハ急ニタサル

癰疽瘡

會張俗ニ蟻ノ子渡リト云ルニ生シハシメ束或蓮子ノ如ク突腫シテ
痛ニ深ク赤色ニナリ焮熱シテ數々大ニナリ遂ニ膿ニ化シ甚クハ下ニキ
疔ヲ示シハ消狀ニナリ不救ニ至ルモノモアリト云宗ニ輕キ中ハ漏トナル

トアルハ瘡ヲ見アヤサリタルモノナラニ平初起ハ大牡ニ伯州ヲ並用ス
シ膿ニテラズニハ針スルナカレ膿熱シテ針スル中ハ口中ヨリ少シ後口
唇ノ方ヨセニ針サスレ前ヨレハ此道ニ近キ故漏ニ成リ易シ破敵
ナイヤサシ先鋒ヲ貼スレ大氏ニ瘡ト治法同シ去リナカラ大黃劑ヲ
濕ク用テシ腫淋毒ヨリ生スルモノアリ是ハ必局ニナルモノ也是即淋

疔瘡

疔瘡疔門ツイテ

疔瘡ハ瘡ノ類ニ長リニシテ毒毒ト發似スルシ本レハ深毒ハ初起痛ナリ
大便秘小便不利ニ餘ホト腐出痛ニシテ故病人自ラ覺テ又モノシ後
ニ深茎根腐リ漫腫大痛強クナリ其痛守張茎起リ痛モカルハ張
茎スルヲ異トス此疔膿ヲ又ケル甚具孔溼クメ四音ノ中ニ腕ニテ死ス
ルニ西人モ誠タリト莫ノ懸危モ毒深クメ腐リ膿ニ及アモノハ疔アキ
小水モルモノシ文壯ニ伯州並用スベシ腐肉取レタラハ端のヲ用スベシ

腕スルモノハ、味丸ヲ用又疔ヲ裏一腐出膿若クハ升ソシモ毎日出ル
ト云様ナル疔ハ、死ニ又腐肉突出シタルニ腐棄ヲサシ療治スルアリ
又癰疽ニテ膿囊ナリ大ニ腫タルニ管ニテ水ヲ抜テ世固ニテスルト是其
水ヲ取タルハ快ヨケレバヤカテ又本ノ通り水々ナリテ大ニナルハ是ハ
別治術ノ一傳アリ先考親炙傍觀セズニハ治カタシ入門ノ北軍ハ委
シク此術ヲ理會シテ行ハシ不アル人ヲ誤ルシ又清後創ヨリ肉突
出シテ毒ノ如クニモシモノナリ是又數年不癒モノシ同リ入門テ其後微
妙ヲ得テ可施治又毒ヲ以テ治スルモノアリテ治効ハ急ニタカサル

癰疽

會張俗ニ蟻ノ産渡リト云然ニ生シハシメ束或蓮子ノ如ク突腫シテ
痛ニ浮ク赤色ニナリ嫩熱シテ數々大ニナリ遊ニ膿ニ丸ニ甚クハニキ
疔ニテ赤ニ赤状ニナリ不救ニ至ルモノモアリト云宗ニ輕キハ漏トナル

トナル疔ヲ見アヤマリタルモノナラニ平初起ハ大牡ニ伯州ヲ並用ス
シ膿ニテラズニハ針スルナカレ膿熱シテ針スル中ハ口中ヨリ少シ後口
唇ノ方ヨセテ針サスシ前ヨレハ尿道ニ近キ故漏ニ成リ易シ破敵
ナイヤヤサシ先鋒ヲ貼スベシ大氏ニ瘡ト治法同シ去リナカラ大黃刺ヲ
濕ク用テシ腫淋毒ヨリ生スルモノアリ是ハ必漏ニナルモノ是即淋
漏ニ大牡ハ正散ハ毒効アリ又痔漏ナレ是非共痔管肛門ツイテ
アリヨク氣ヲ付見ルシ又膿毒ヲ疑似スルシ本レハ膿毒ハ初起痛ナリ
大便秘小便不利ニ餘ホト腐止處痛ニナル故病人自ラ覺テ又モノ後
ニ膿莖根腐リ漫腫ニ痛強クナリ其痛守張莖起リ痛モカルハ張
莖スルヲ異トス此疔膿ヲ又ケニ其自乳溼クメ四音ノ中ニ腕シテ死ス
ルニ二人モ誠タリト莫ノ懸危モ毒深クメ腐リ膿ニ及テモノハ疔アキ
小水モルモノニ文壯ニ伯州並用スベシ腐肉取レタラハ端のヲ用スベシ

此所ニ奉スル腫物、痔漏淋瀝懸癧、射テ陰毒ノ救場所ト云ヒ形状ト云ヒ未熟ノ輩ハ鑑定シカタレヨク一診察スレバ右左方取、異ナリ所アリ

腎癧

右左ニカキラス初粟米粒ノ如ク黃泡ヲ養シ限ク高隆シテ暈ヲナス
トヨリ血氣ノメクリ思キ所ニ思ハ外大ニ腐リ且膿ナリ雅キモノ
アリ手澤ク附刺此刺ハ爲コシ補瀉可シ初起便秘セバ下劑ヲ用シモヨシ
外術ハ癧背俗云ハ輕クスルト心得テヨシ或切ラズニ灸シテ膏ヲ
貼スレモヨシ破敵ニテ膏肉取レカキモノハ腐藥ヲ煉リ灸テ貼シ
ニ芍薬大黃并湯伯州散ヲ用シテヨシ又ハ産后刺々癧テ
腎腐潰スルモノアリカシクハ漫腫スル腸癧ノ部ニ詳ニ正案ニ
涉重ヤロキ腎癧ハ限レテニアラズ真ニ癧状ヲモノ共テ寸
大サノモノハ重キトニ發目分リノ物ヲ負ルニ様ニ思フモノハ腎ハ血

氣ノメクリ思キ所故眠癧ハ少ナク多ク是所ニ生スル眠癧ハ俗ニ云
床スレトシ是又ク卧シ由ヲオサテ其所血氣カタルト能ハル故ニ腐ル
ニ并ニ眠癧ハ毒ノアリテ腐ニハラス

楊梅瘡

綿花瘡砂仁瘡ト云々外名多クハ此等ノ形状ヲ以テ名ツクル
モノ初起父鮮腫端的丸瘡ノ様ナルニ主支和米酒七厘ノ葉ヲ
用シト反テ色々ノ変ハ起ス先初癧ハ癧表ヨロシ骨痛ト云
真ノ骨痛キ又肉中ノ痛キヲヨリ分ツシ附子ハスニ古ク
淨キ毒ノモノニ用ルル初起ニ用シト反テ害ヲナス甚ク多クモ
初起ノ中ニ反テ思シ又癧セトト癧シヤスルニ奇方アリ無糖
子木固甘等分石水並服スレ又粉茶煎服スル方黃連解毒ニ石
槿皮李枏子甘中加一用ルル又口甘ニテ即蓋花水口ヲ洗フ

又口スワートル 白イビテノ花露ニ

破的タイヤヲサスニ漏テリタル所ハ系ヲカケル年又鏡ニテキリ
 膏ヲ貼スニ腐肉取レ難キニ腐肉用ルニスニ腐肉ハ血氣
 滞リテ滯ラレテ者ニ因テ湯藥ノ氣ヲ遠シ難シ故ニキリサキ膏
 膏ヲカテ腐肉ヲ取ルニ是亦療捷徑ニ又一等深キモノハ星化毒
 膏用之ニ等深ク骨節腐爛者ヲ取ルモノハ天水丸ヲ用テ咽喉症毒ハ大
 氏ノモノハ喉癰湯ニ癰癩丸ヲ兼用シテ治スニ等深キモノハ星
 丹ヲ用テ金靈丹トクニ是ハ三四劑ヲ押テ用テサレハ効立難シ是
 ヲ用ルト一旦アヒクテ一劑ヲ押テ用レハ効アリ紫金丹モ長ク用
 ヒサレハ効見ヌモノハ星化毒ハ咽喉ニ効薄シ其外ノ結毒ニ王
 五宝
 別書ハ文ニシテ
 一ニ飛白麵トクトアルハ銀白霜トクニ麵粉非ス
 銀白霜生者注所ヨク湯シ寒風ハ山出シノ銀ヲ由ニシリ墨キ上
 ヲリ又墨ヲ以テ蓋ヒ密封マケテ肺ノ湯湯丸ニ蒸テ銀ニ白キ

サト出ルソレヲコサケテ用ルニ銀白霜トクニスレハ輕粉ヲ代リニ用ル
 一ニ氏製家法口傳トクハ輕粉アリ薑法モ効速カナルモノナレ氏調護不
 空モノハ再發スルニ且ノ効ハアルモノナレ氏必再發スルニ是モ甚ク用ル
 所ニツイテ幾微ナリアリ觀後ニテ可待其妙也

咽喉

咽喉ハ食道也唯喉氣道也何レ欠食音聲吐納ノ道ニシテ甚大効
 ナル所故別シテヨク氣ヲ付ケ隨分早ク治テ施スニ乳翳鳥トクハ中ニ
 子ヨホリト翳鳥ノ乳ノ如ク赤色ノモノ生スルニ一方ニ出ルヲ單翳鳥
 長而方ニ出ルヲ雙翳鳥ト云又松子乳トモ云皆其形ヲ以テ名也是
 何レ食道ニカレト回春ノ配凡解毒ニ石膏ヲ大ニ加テ用テ外面腫
 多キモノハ牽胡加石匠ニ又椒栝一葉モ効アルモノニ纏喉風ハ咽一面ニ
 腫直長クシテ纏白ナルニ息スルヲ治ス欠食下ルヲ治スシテ

破的イキヤヲサスニ漏テリタレテハ系ヲカケル年又鏡ニテキリ
膏ヲ貼スニ腐肉取レ難キニ腐肉用此ニスニ腐肉ハ血氣
滞リテ積テサレ者ニ因テ湯藥ノ氣モ達シ難シ故ニキリサキ膏
膏ヲカテ腐肉ヲ取レシ是原標捷徑ニ又一等深キモノ書生集
方用之ニ等深ク骨節屈伸ヲキルモノハ天水丸ヲ用テ咽喉諸毒ハ大
使ノモノハ喉癰湯ニ殺菌丸ヲ兼用シテ治スニ等深キモノハ空
丹ヲ用之金靈モカキ是ハ三四劑モ押テ用ヒサレハ効立難シ是
ヲ用ト一旦アシクサレハ一劑モ押テ用レハ効アリ空金丹モ長ク用
ヒサレハ効見ヌモノハ星化毒ハ咽喉ニ効薄シ其外ノ諸毒ニ王
クホシルモノハ空丹中ニ飛白麵ヲ兼用トアルハ飛白麵ハ麵粉非ス
飛白麵製法酢ヲヨク沸シ寒風ハ山出シノ鉄ヲ宙ニシリ置キ上
ヨリ又置ヲ以テ蓋ニ密封ナクハ麻ノ湯湯元ニ蒸テ鉄ニ白キ

サト出ルソレヲコサケテ用ルニ鉄白霜製法ニスレハ輕粉ヲ代リニ用ル
アハ氏製法口傳ニ依リ輕粉アリ薑法モ効速カナルモノナレハ調護不
宜モノハ再發スルニ且ノ効ハアルモノナレハ必再發スルニ是モ甚ク用ル
所ニツイテ幾微クアリ觀テシテ可得其妙也

咽喉

咽喉ハ食道也唯喉氣道也何レ欠食音聲吐納ノ道ニシテ甚大効
ナル所故別シテヨク氣ヲ付ケ隨分早ク治テ施スニ乳製鳥咽中ニ
テヨホリト鷓鴣鳥ノ乳ノ如ク並色ノモノ生スルニ方ニ出ルヲ單鷓鴣乳
ニ云兩方ニ出ルヲ雙鷓鴣乳ト云又松子乳トモ云皆其形ヲ以テ名也是
ニ何レハ食道ニカレト回春ノ配此解毒ニ石膏ヲ大ニ加テ用テ外面腫
多キモノハ牽胡加石匠ニ又椒栝一果モ効アルモノニ纏喉風咽一面ニ
腫直長クシテ纏白ナルニ息スルヲ治ス欠食下ルヲ治スシテ

物惡寒者推ナトモアリ甚惡者先ニ穢ニテキ破リ金銀匙シ以
風解毒加石或清酒利湯湯云參鮮毒陽ノ者ヲ可用至テ篤劇
尤者咽ノミ出ルレハ危セ又ノ肩井ニ取テカケテ取止レ或ハ午ノ
木指少商ノ穴ヨリ血ヲ取止レ喉痺ノ咽イサカレ肉クノ懸ニ重一少
キモノ出テ既々腫レ塞止レ針又鑷ニテキリ破リ金銀匙冰硼散ヲ吹
レ解湯ニ字ノ麻隔散ヨリカスレ急喉痺ニ礪砂辰砂朱ヲ
吹レ又青橘核出粉ノ味ヲ霜メ服サレシ又丹蒼白姜菴ノ
末ヲ用テ索胡加石ヲ主トメ椒攪ヲ加用又梅肉ニ代テモヨシ山豆根
射干モ効アリ其他奇方多クアリ別ニ記ス苦酒湯ナトモ効アリ
喉癢ハ初起ニ尋常ノ咽喉病ノ状ニ漸々大腐爛ニ至ルニ翻肉
スル様ニナルモノ初起ロヲ開カセニレ咽中ニ腫見サレモノ咽腫
テアレハ喉癢ニアラスニ宗ニ疼涎ヲ吐出ストアレハ吐スルモノニテハ

ナレ元列ナルヲ以テ押ニテレハ又二種。舌ノ奥ヨリ陰ノ腐ルモアリ
喉癢ノ後起ニ結毒者ニ然ル者結毒ノモノハ外皮腫痛セサルヲ以テ
分ツレハ咽喉病ハ梅毒ニカキテ大正丹ニニサル者ナレ喉癢ナト
ニモ用ルテアリ梅核氣ハ何カ咽中ニモノアリアル様ニテハレカリ覺ハ
吐ケ出不出若ク不降コロロルル鬼ノ種子ヲ清氣湯燻化カテ兼用ス
取リ燻化カテ用テ燻ルモアリ又羊年モ一年モ長クモナリ羊年
厚朴湯集

時毒

時毒ハ俗ニ云蟻蟻瘡ニテカハサニハエト云天行ノ時氣ニ感ニレテ生レ多
ク毎ノ前後ニ生ス後ナル症ハ馬刀歴ニ疑ハスルニ初起傷寒ノ如ク至テ
寒熱頭痛口乾舌堅腫ニ腫ル也鮮弱キ人ハ至シカヌル故長ビク
敗毒散在利大黃湯葛根加桔梗牛蒡若連湯ナトモ効アレハ百中ノ方

上云ハ赤胡加石又面邪(フツ)水泡出ルモノハ膿ニナラス消散スルモ
下利スルモノモアリ苦ミコフス押テ赤胡加石ヲ用テ之レ又軍アリテ
母毒疑似スルモノアリ^レレ^レ症ニ必水泡出ルヲ以テ別ニ之レ便秘モハ
調胃散氣湯^ヲ兼用^スレ又^レ敗^レ疔^ノ白^ノ腐^ノト^ノ病^ニレ^レ又^レ疔^ノ口^ノ
^ニ其^レハ^レ膿^ハレ^レ檀^ルモ^トナリ^レ破^レ傷^温下^見テ^レ鐵^錒ヲ^用テ^レ是^非
^レ全^ク効^ハテ^レ不^効ハ^レ是^大敗^瘡也^世法^防凡^レ通^聖散^ヲ用^テ是^功キ
モノ^ニテ^レサ^レレ^レ赤^胡加^石膏^湯ヲ^用テ^レ如^クナ^レ

癰疽

癰疽^ハ湯^状ノ^{モノ}ニ^テ形^大ニ^テ且^動氣^{アル}モノ^ノ痛^ハ甚^シク^モノ^メ
色^白ク^テ不^痛モノ^ノ癰^ハ胸^膈ヨリ^上ニ^生テ^下部^ニ生^ルト^ナレ^レ氣^癰ハ

疔

疔^ハ及^放也^又八^洞疔^ノ左^右ニ^生又^是ハ^ツニ^針ス^カフ^大謀^リテ^針ス^レ
^レハ^出血^不止^シク^ハ血^痛ホ^トハ^出血^セ又^モノ^服糸^ハ消^通或^ハ字
^ノ金^流氣^欠ニ^テ三^四人^モ治^シタ^リ別^ニ齊^方アリ^丸散^錒ニ^出ス^又
葛^根加^木屑^ニ七^宝煎^用シ^テ治^シタル^{モノ}毒^ヲ食^テ後^毒ニ^再ヒ^ア
又^ニ治^{タル}モノ^ナリ^十全^流氣^欠モ^四五^十始^モ用^テ少^ク知^テ見^ルモノ^ノ
甚^モ何^レモ^消長^本也^{アリ}ア^リワ^{カル}ス^レヨ^クタ^キツ^レバ^白砂^糖ノ^様ニ
ナ^リソ^レヲ^痛ニ^付ル^ト七^日ニ^メサ^レ膿^ヲ取^ルハ^筋又^自然^ト膿^ニ
ナ^リテ^破ル^ハ治^スル^ニ皆^入湯^目也^ハ精^痛ハ^レツ^カリ^トレ^{タル}モノ^ノ
内^ニ白^キ豆^腐ノ^様ノ^様ナ^レモ^ナリ^針ヲ^サレ^テレ^ボリ^出ス^レ中^ニ
袋^{アル}モノ^ノ其^袋ヲ^取テ^サレ^ハ又^アツ^ルモノ^ノ取^テ難^キハ^腐ヲ^サ
レ^テ取^ルハ^疔ノ^様ニ^似テ^大キ^ナラ^ハ取^ルト^キカ^レ筋^種ヲ^取ル^ニ
モノ^ノス^キノ^キナ^リテ^生ス^ルハ^腐ヲ^サレ^テ取^ルト^キカ^レ筋^種ヲ^取ル^ニ

三無アル時ハ痛出ル也癆ニ痛ナキニ元癆ハ癆トハナカツテ無シ
エ者コレニ血癆ハタレ下止者アリ金瘡針ニテニ如ホサシテ其針口ハ
カラアニカウヲ手早クサスレキ又ルケレハ出血シテ不_レ止_レ針口ヲヨケテ
雀_レツソケハ血止ムモノナリ腐_レ余_レ膿_レハ_レ黄_レ連_レ解毒_レ甘_レ連_レ石_レ差_レ加_レ龍_レ豆
ニ_レ腐_レリ_レ取_レル_レナリ腐_レ余_レ膿_レハ_レ黄_レ連_レ解毒_レ甘_レ連_レ石_レ差_レ加_レ龍_レ豆
ヤ_レナリ_レ差_レ用_レス_レシ_レカ_レク_レ云_レ氏_レ南_レハ_レ初_レ心_レモ_レハ_レ奇_レリ_レ治_レヲ_レ施_レス_レカ_レス_レ門
ニ_レテ_レ口_レ授_レ面_レ年_レ日_レ成_レト_レ

肺癆

肺癆ハ初メ咳強ク喘_レシ胸中_レ痛_レ腫_レキ_レ痰_レ沫_レヲ_レ吐_レシ_レ或_レハ水_レ涕_レヲ_レ吐_レシ
風邪ニ感_レ大_レ咳_レス_レモ_レニ_レ似_レ寒_レ熱_レシ_レラ_レ肺_レ癆_レニ_レナ_レリ_レ常_レ状_レニ_レナ_レル_レモ_レノ_レ肺_レ癆
ノ_レ痰_レ粘_レリ_レシ_レク_レ臭_レフ_レ又_レ水_レ涕_レヲ_レ吐_レシ_レ外_レ邪_レノ_レ病_レト_レ異_レナ_レル_レ咳_レス_レル_レ毎_レニ
膿_レヲ_レ吐_レシ_レ或_レハ_レ血_レヲ_レ吐_レシ_レモ_レナ_レリ_レ難_レ治_レ初_レ起_レ桂_レ枝_レ白_レ散_レヲ_レ以_レテ_レ大_レニ_レサ_レシ_レ

シ_レハ_レハ_レ愈_レル_レ或_レ七_レ室_レ年_レ々_レ乳_レヲ_レカ_レ排_レ膿_レ散_レヲ_レ與_レズ_レ又_レ更_レ有_レ桂_レ枝
湯_レモ_レ効_レアリ_レ又_レ乳_レ癖_レヲ_レ用_レル_レ方_レモ_レアリ_レ或_レ又_レ方_レト_レ口_レシ_レス_レヲ_レ日_レニ_レ五_レ厘_レツ_レ
用_レス_レル_レ生_レク_レ乳_レニ_レ方_レ在_レ癆_レニ_レ支_レセ_レツ_レ方_レテ_レ漆_レコ_レシ_レ紙_レハ_レ色_レニ_レ雪_レ水_レモ_レ右
ニ_レテ_レ散_レス_レ雪_レ水_レナ_レキ_レ中_レ甘_レ燭_レ水_レ長_レ流_レ水_レニ_レテ_レ用_レル_レモ_レ可_レシ_レモ_レ多_レキ_レ服_レシ_レテ_レ又
ル_レモ_レハ_レ生_レク_レ乳_レニ_レ味_レヲ_レ糊_レ丸_レナ_レ日_レニ_レ五_レ厘_レツ_レ白_レ濁_レニ_レテ_レ用_レス_レレ_レ便_レ秘_レス_レル
モ_レハ_レ生_レ宗_レ田_レヲ_レ一_レ分_レ種_レ用_レス_レ且_レ之_レ等_レニ_レテ_レ不_レ治_レモ_レハ_レ奇_レ方_レ也_レ盧_レ若_レ茶_レ以_レ
甘_レ右_レ二_レ法_レ濃_レ煎_レシ_レテ_レ用_レス_レ最_レ劇_レ効_レハ_レ甘_レ柔_レ丸_レ六_レ七_レト_レシ_レ雪_レ水_レニ_レテ_レ用_レル_レ
アリ_レ胃_レ腕_レ癆_レ咳_レモ_レレ_レ左_レホ_レ不_レ具_レ胸_レ膈_レ痛_レモ_レナ_レリ_レ肺_レモ_レ肺_レ癆_レホ_レハ
散_レニ_レテ_レス_レ心_レ下_レ腹_レ滿_レス_レル_レ全_レ体_レノ_レ勢_レ又_レテ_レ甚_レキ_レ様_レニ_レ見_レ寒_レ熱_レシ_レ吐_レシ_レ
咳_レシ_レ膿_レ血_レヲ_レ吐_レス_レル_レモノ_レニ_レ重_レ門_レ丸_レニ_レテ_レ下_レシ_レ排_レ膿_レ散_レ蓋_レ以_レテ_レ治_レテ_レ收_レ留_レ散
ノ_レ差_レヲ_レ用_レシ_レ又_レ白_レ散_レニ_レテ_レ吐_レス_レレ_レ又_レ膜_レ外_レニ_レ屬_レシ_レテ_レ外_レ膿_レ潰_レス_レル_レモ_レアリ
也_レ癆_レ膿_レアリ_レト_レ見_レ八_レ建_レニ_レ破_レル_レニ_レ是_レ癆_レ癆_レ痰_レ不_レ出_レ也_レ外_レ癆_レ多_レ施_レス_レレ_レ

瘰癧ノモノハ甘小治子湯ヲ用テ之レ膏、先鋒ヲ貼スレ之レ又且疼止ニ大
半散テ再ヒ勢ソクモノハヨク見レ病ニ少シテモ膿アルモノハ散ラ
シ三所モ潰ルモノハ初メツヨリニツメニツメハ熱ナク膿ヲオサ又様ニ見レ
ヨク見レ病ニ少シテモ膿アルモノハ右方劑早クオメ伯
州散用テ之レ膿ヲラサレ前ニ必鍼スカラス膿ニテラハ彼鍼メ彼散或左
突スイヤオサレ先鋒ヲ貼スレ膿尽サルモノハ千金内托散治子ハ
物湯ヤト用テ之レ至テ熱退キモノハ半葉胡トモ用テ之レアリ又膿状
ニテリ水膿出テ益汗ナトアリテ劣状ニナルモノハ著者歸達中ヲ補欠
ナト用テ之レ凡テ膿ハ早ク尽クルモノヨシ昨日共合今日四合明日三合
ト云様ニ區々減シ四五日ニ尽ルハ吹シ共九ヶ所モウツアリ三四ヶ
所モ一度ニ針入レル、様ノ病ハヨシ日數ヤリテ手間取ルモノハツカ
レ黄水虫索色肉虫ハ瘰癧之本瘰癧瘰癧ノ患ト過半愈テ流注ス

ルモノハ大膿後ニ又大膿オチヌモノス一タクハ腕ニテ死スルモノニ瘰癧瘰
流注スル者ニ別初ルモノ其病初ヨリ瘰癧異
ヲ患テ其毒流スルモノハ是瘰癧ニハアラス所謂瘰癧ナルモノニ其病初ヨ
イ形状大ニ異ナルモノニ都テ二日ニテ九日モメ針ヲ入ル様ナレ
瘰癧ハアシ又數日膿出ル内ニ雞肉ヲ食スレハ瘰癧口ヨリ虫血
シト花スルニ雞肉ヲ食セシムル病ハ毒尽テアリ氏愈肉ノ
生ズヤ一糸モオシキ病ニ用ルニヨク、該瘰癧スレハ瘰癧後敗
血流注シタル散レ難シト宗ノ通經道湯湯桂之加木湯ヲ効ニ爲
シテアリス一テ瘰癧ハ著者歸劑ニヨシ大黃牡蠣湯ナトハ用テカカ
併体壯ニメ毒氣尽テ瘰癧口半半モ不愈モノハ大壯ヲ用ルニカアレ氏
潰后決メ用テカラス古方者流ニ所ヲ知ラスメ誤リテ多シ打撲ノ流注
ハアラントニテムレ瘰癧ヲ散レ烏頭ヲ用其於血散ラヌメ膿ヲモシ
ト欲スルモノハ常法ノ如クスレ又一種ノ瘰癧又金瘡ヨリ瘰癧曰高

腫大次第ニハビヨリ腐リ行クモノニ由破傷^{シツ}越得加本附湯ヲアハ
一先鋒ヲ貼ス^レニ早速痛ミ止^ル又草鞋瘡^ニ硬傷^ニ濕多クアル^レニ元座
候ノモノニ鹿茸ヲ用^ルテア^リ鹿茸ハ大瘡瘍瘻石^等不^レ潰^ル口^ノ斂^リ
難キモノ^カ功^{アリ}又鹿頭ヲモ代^用ス

乳癰

乳癰ハ乳汁^熱張^テ生^レ結^ス腫^スル^レ子^{アリ}テ生^スル^レ外^吹云^ニ妊娠中^ニ
生^スル^レ内^吹云^ニ初起寒熱^ニ往來^ニ腫色^ハ痛^ム癰^疔ナ^ルニ^ハ違^ヒ
速^ニ腫^ル日^數長^クキ^ソフ^テモ^ノハ^藥ヲ^用テ^乳汁^ヲ止^ルレ^ハ難^義ス
ル^レ少^シ則^チハ^物湯^ニ神^麩麥^牙ヲ^用ス^レ又^別ニ^奇方^{アリ}初起^葛根^加
桔^梗更^石羔^或ハ^桑胡^加桔^梗葉^橘葉^散ヲ^用ス^レ凡^テ乳^病ニ^橘白^ク
ク^心ス^ルモノ^ハ膏^ハ先^鋒ヲ^用テ^散ラ^ズハ^大壯^ニ伯^州散^ヲ兼^用ス^レ是^非
ウ^レ膿^ニテ^レハ^透膿^散ヲ^用ス^レス^テ妊^娠中^ハ散^シ易^ク産^後ハ

散^シ難^シ又^乳孔^塞リ^テ腫^ルハ^麥門^通草^ヲ加^一用^ス又^瓜萐^萐乳^者
者^共善^酒ヲ^以テ^送下^ス葱^白湯^ニテ^乳房^ヲ蒸^スレ^テ又^乳汁^ノ
年^リタル^ハ露^降房^一味^服ス^レモ^ヨシ^又乳^癰ハ^メイ^キヤ^ヲ不^ハ大^腐
肉^ヲ取^リソ^クナ^ハ乳^滴ト^レル^レ破^歌ク^メイ^キヤ^ヲレ^腐肉^ヲ取^ル
ベ^シ或^口ワ^サワ^{トル}テ^シキ^テル^メヲ^以テ^洗フ^ル毎^度洗^スカ^{ラス}
或^膏中^ニ丹^蒼ヲ^加用^ス並^湯ハ^大壯^ニ伯^州散^ヲ兼^用ス^后白^膿少^シ
シ^ハ出^テ赤^肉ヲ^見ル^レ伯^州散^ヲ并^葛根^加本^附粉^丸端^的ヲ^用ス^レ
補^メイ^キヤ^ヲ後^クノ^メイ^キヤ^ヲサ^レレ^テモ^不差^イハ^切テ^取ル^レ乳^滴ニ^三
身^不愈^膿水^不尽^モハ^治療^別ニ^手匠^{アリ}内^ニ入^リテ^親灸^スル^レ非^レハ
其^術ヲ^得ル^テア^タワ^ス或^腐ハ^名ヲ^撰ル^カ大^壯ハ^毒アリ^テ膿^ヲナ^キニ^用ス
併^シ盜^汗を^熱テ^アレ^ハ用^スカ^{ラス}初^發梅^核ノ^如キ^{モノ}出^テシ^ツカ
リ^ト復^リ半^年モ^シテ^不痛^モハ^后漸^ク文^ニテ^ル油^ヲス^カラス^必乳

若し他ノ症ハ必痛ク年又ハ半年モシツトシテ居ヌモノハ乳核ハ山石ト違ヒトゴヤラ軟シク又シク消セヌ折々腫痛ハ心又膿ニナラヌモノハ夏草^結並ヨシ又乳房ニ小核ニツニアモ少ク乳^腫下云是モ夏枯草並ヲ用ニシ乳病ノ一委クハ別ニ乳岩^結準^結附^結乳病方^結等見エ

附骨疽

三宗三足ニ限トアレ骨ニ治テ生スルモノ皆附骨疽ニシテ手足多ク背脊ハ少ク初起漫腫シテ大ニ痛シク烏頭湯ニ其内ヲ兼用スニ或哉婢如不消更シ俄ニ散シ難シ或出血スルモヨレ初起寒熱強キハ麻黄^結左佐湯更シ膿アラハ速ニ針ヲ入ルニ左スレハ骨近ハ腐ラヌモノハ膿管ヲヨク察シテ早ク針ヲササレハ骨ニ腐リ穿テ入漏ナリテ^結治^結ナル者^結歸^結刺ニ鹿茸^結加^結用^結之^結腕^結スルモノハ大^結防^結風^結湯^結トモヨシ膿ニテラ又前ニ竜門丸^結梅^結肉^結七^結宝^結桂^結枝^結加^結木^結附^結ヲ用^結セハ^結斂^結リ^結易^結シ^結膿^結后^結漏^結ニナルモノハ^結難^結治^結セハ^結滑^結石^結ヲ^結加^結

寸モ腐ルモノハ不治之漏ニナリテ久年ノモノハ口ウサハトルコニキテ^結腐^結前^結者^結モ^結ツ^結ク^結用^結ト^結マ^結ラ^結乳^結者^結ニ^結テ^結洗^結ス^結膿^結口^結新^結シ^結キ^結モノハ^結洗^結ス^結カ^結ラ^結ス^結新^結シ^結キ^結モノ^結ハ^結洗^結ス^結ハ^結浮^結腫^結ナ^結ト^結出^結テ^結害^結ヲ^結ナ^結ス^結又^結ハ^結破^結傷^結濕^結ノ^結如^結ク^結ナ^結リ^結及^結テ^結腐^結リ^結廣^結ク^結テ^結ル^結モノ^結ハ^結其^結時^結ハ^結越^結婢^結加^結木^結附^結ヲ^結用^結ス^結シ^結洗^結ス^結ハ^結桂^結枝^結加^結木^結附^結ニ^結消^結毒^結ヲ^結用^結シ^結テ^結左^結突^結メ^結イ^結ク^結ヲ^結入^結レ^結テ^結又^結シ^結ク^結養^結生^結ス^結ル^結ハ^結治^結ス^結ル^結者^結ハ^結潰^結テ^結后^結膿^結盛^結ナル^結中^結ニ^結雞^結肉^結ト^結食^結ス^結カ^結ラ^結ス^結必^結大^結ニ^結出^結血^結シ^結テ^結死^結ス^結ル^結膿^結大^結抵^結ニ^結尽^結テ^結脱^結状^結ニ^結テ^結ニ^結三^結年^結モ^結久^結シ^結ク^結長^結肉^結セ^結サ^結ル^結モノ^結ハ^結少^結シ^結ツ^結用^結ス^結ハ^結必^結過^結度^結又^結カ^結ラ^結ス^結流^結注^結モ^結同^結シ^結テ^結ハ^結膝^結道^結風^結信^結テ^結膝^結頭^結少^結シ^結者^結ハ^結腫^結ノ^結下^結ニ^結引^結テ^結痛^結ク^結モ^結ナ^結リ^結烏^結頭^結湯^結ノ^結前^結ニ^結蒸^結ス^結ス^結ニ^結毒^結不^結尽^結膿^結不^結止^結内^結ニ^結安^結リ^結ニ^結屈^結伸^結ス^結カ^結ラ^結ス^結及^結テ^結痛^結出^結腫^結腐^結瘻^結ク^結ル^結ナ^結リ^結是^結屈^結伸^結ス^結ル^結甚^結見^結合^結ナ^結リ^結損^結傷^結ナ^結ル^結ヲ^結枝^結微^結ヲ^結使^結ナ^結リ^結可^結慎^結又^結一^結種^結瘻^結状^結ニ^結腎^結腰^結ノ^結間^結ニ^結飄^結ノ^結如^結ク^結漫^結腫^結ス^結ル^結モノ^結有^結中^結ニ^結水^結交^結リ^結膿^結アリ^結ト^結彼^結ト^結且^結快^結ク^結テ^結モ^結四^結五^結日^結ス^結ル^結中^結ニ^結大^結ニ^結腕^結ス^結ル^結ニ^結是^結近^結殺^結人^結ヲ^結試^結ル^結ニ^結尽^結ク

死セリコヲ破カス内ニ參芪桂附ヲ用テ而用カハ且シカラズ他亦生
セズ腎腿ノ間ニ限ルモノハ虚脱ノ疝ヲ漫腫シ漏膿シテ羊年七年毎
不消膿者針ヲ以テ膿ヲ用カス別術ニテ自然ト口開ク様ニイタス
肝要ノ口傳アリ五毒ヲ燒キハコヨリ出
ル油ヲラシクシテハ口開ク云
鶴膝脚ハ脚ノ内外大ニ腫レ流ク咬エトリク痛寒熱シニ此才ニ股ノ辺
肉脱スルニ桂走加木附湯七宝ノ交脚膝也又様ニ長服スルニ亦膝蓋
骨以下痛痛少ナ腫ヌケテリ此レハ不叶且痛ナシ是腫物
ニ非ルヲ知ルニ又肘尖ニ出スモノアリ又膝癢ニ蓋骨腫痛在之又膝腫毒
ハ成者以テ危シクハ毒也毒ハ右ノ諸疝ノワラニ腫疝ニ寒熱ナク兵ノ毒ニ
様々タタリニ其ノ即毒中ノ成ニ蓋骨ノ下リ肉脱シ黒腐ナリ其ノ腐トフ
間ヨリ膿以西年身元アリ又蓋骨ノ下ニ寒熱ナル疝アリ此ハ疝癰ノ
類ニ毒也毒ニテクハ毒ニシテ診察スルニ

陰疔瘡

陰疔瘡ハ陰中ニ瘡ヲ生スルニ多ク漏道アリ下ニ出ルニ初起陰門中大ニ腫
瘡ナルニ清肝養運湯ヲ此レ漫腫ニテ甚久痛ハモノハ何レ破針
ニテ惡毒ヲヌキ青蛇ヲ貼スルニ疼劇キモノハ桃核承氣湯ヲ用ル
トアリ又柴胡姜桂ノ疝アリ膿出リニテハ治シ難シ折々破血ス
ルニ毒毒毒瘡ハレガヒス又一種疔瘡又甚難疔アリ家方割好湯或ハ
蛇床子ニテ洗フニ又龍膏ニ端的消毒ヲ兼用シ坐薬ヲ用ルニ又檀腦古
若ニ味ヲ紙ニ包ミ陰中ニ入ルモノレテ瘡瘡ニ梅毒ノモノ多ク又帶下ニ
テ瘡中ニ痒キモノアリ帶下治スルハ自ラ治スルニ或ハ宗ノ漏瘡湯ニテ洗
フニ又坐薬ヲ用スレ方ハ虫痔ノ薰茶ト同シ亦一種虫ヲ患ルモノ
アリ洗茶ヲ用治セサルハ樗黃薰宜シ宗ノ銀杏散モ効アリ原道
ノ上ニ菌子雞冠子トノ如キモノ出ルアリ又別ニ乳ヲ穿テ其内ヨリ蠟ニ

三歩長五歩後、白至リテ赤キモノ出シテリ。又一人尿道ヨリ石ノ紫キモノ出シテリ。紫キモノニシテ切リセツトシテ白不日ニ治シタリ。切逆ハ絶テ
 仍歩ヲカカリシカ切リトリテ后ハ一日ニ十里ヲ歩行テ支宿道ノ近ニ大
 乳ノ如キモノクツモアリ是等ノ皆臨痔ニ青紫ヲ貼シ又紫線ニ切
 ルニ是モセツトシテツケ清肝養陰湯ヲ用テ之ニ又尿中突出スルモノニ
 白字ノ雄黃散紫華散ヲ用テ一人切テ治タリ又一種形状無異唯少シ
 腫アリト云々痛ニ不可忍シテ交合ナラサルモノアリ必若下タル者
 ナリ是多クハ淋毒ナリ淋治法ニ從テ之右ノ症ニ坐車ノ一奇方アリ
 別ニ記ス座車ニ尿門彼列名ニタルニ白雲ニ馬油ヲ交テ附ルニ又附提ナル
 モノ私家ニ多シ子宮ヨリ肉突出ニシテ時アリト云々長スルノ門ノ初乳門
 沃蘭華散ニテニ三人モ治シタリ又子宮ノ口ニ乳ノ時々出ルリ是ハ出注不
 治ノモノ又淋ニ尿中ニ大ニ腫痛スルモノアリ大抵此テ痛不共柴胡姜

桂貝レ兼行蒸葉ヲ用テ之レ方ハ別后ニ記ス

一老婦無徵氣尿中痒ク次第ニ腐爛シ水ヲ流シ臭氣難堪ク流ノ能スルガ
 如ニテリ粉劑ヲ敷リテ用テ之レセテ遂ニ死セリ
 一處女尿中大腫痛不大便寒熱ヲ勞必ヲオス諸治効ナシ大承氣ヲ與燥
 屎ヲ下レテ痛ニ半ヲ減ス又枳椇散氣ヲ與痛ニイコノヤスレ腫面不
 消直連敷用ヒレニ遂ニ膿ヲナレテ愈タリ
 一婦人尿孔ニ穴アキテ其中ヨリ大乳ノ如キモノ生レテ三年余リ歩行スル
 不能麻葉ヲ用テ剪リ一旦治シテ又穴ニ消糸ヲククリキリセツトシ
 少付テ遂ニ治ス

傷寒各願

一名寒毒伝又傷毒ト云々后毒不化齒隙メ生ルニ願ニ不限耳前後
 ニモ骨槽風脈蟻瘻ニ妨ルニ初起腫痛進ク色不変形濕痒腫ノ如キ

消毒ナドモ用エ腸癰ニモ効クタルハ腹癰ハ表位ニアリテ腫高ク
シテ重出ルニハ將ニ寸許リニ穿スルヲ衝疔中癰疔云又ハ腹癰ヲ衝
疔云説アリシ宗ニハ將下ヲ腹癰ト云

瘍科瑣言

鶴口疔

此腫物ハ尾抵骨ノ辺ニ生レテ多ク瘡必シ大陽状ノモノ少シハ肉ノ脆キ如ク
僅成ルモノト思フチモ必深ク腐ルモノト初起ニ寒熱ヲ甚シク夜方ニ痛
強シ或ハ潰テ后出血スルモノアリ難治ニシテ宗ニ及テ成漏ト云テハ必シモ
痔ナラハ甚毒管アルモノト痔漏ノ治法ヲ以テスレバ亦鶴口疔ノ治法ハ先
一画リハ根ヲ研膏トナレテ其毒ヲ去スレ初起ニ寒熱湯ヲ差患處ニ花
刺者ニ補タズ桂皮加木防己等見合用スレハ肉内脆キ如クニ
ニサクルカラズ壯年ノモノハ治スレバ老人トハ多クハ難治

龍泉疔疔毒

龍泉疔ハ人中ニ出ル疔毒ハ口下ニ出ルモノト其勢行毒ノ如クニ天張
疔ノ差ニハ藤疔ト云ハニ生シ蔓延シ半面ニ及ビ烈ト云カハモノト云ノ

類皆是治之... 如リバケレ或ハ暈倒スルアリ版
藥ニ櫻子加天黃湯解毒湯ノ數ヨレ便秘スルモノ内疎兼連湯ヲ用
之ニ膏ノ先鋒ヲヨク痛ヲ止ルニ又膿成リテ遲ク疼ニ止ルモノ抜疔
散ノ敷高藥ヲ用テテリ膿潰後見右症ニ隨テ内托劑ヲ用ベシ

花柳症

其状赤豆ノ如ク聚リ生シ黃泡ヲ發シ痒々痛々モノ亦在ハ不限凡
多クハ赤豆ノ如ク附疔發シ治ルニ長カラテ疔發ハ山ヲアケテ針スニ
スカラズ赤豆中黃ヲ始テ膿成テ疔發先鋒ヲ發シ或ハ四五ニ疔發
散ヲ敷ベシ

穿踝疽

外踝ヨリ腫出シ痛劇シク膿ヲナレ大ニ腐ルモノハ是モヤリ附骨癰
ヲ初起烏髮湯ヲ常用益用ニ或婢婦人附骨ヲ用ニ或刺テ度ニ骨

取ニ癰血尽テ消スルモノモアルニ消散セズ勢アリハ伯州散ヲ用テ膿ヲ
リト見ハ深ク針シテ一所ニ膿ヲ抜クニサスハ外ハ多ク腐ラヌモノハ後疔
有藥或彼敵維ニ木桂支加架治ヲ用テニ腐ノ深キモノハ拔毒カテト
杯指ニ腐ラレ板ルニ始終消毒丸並用スニ膿疔ニ盜汗出ルモノ
ハ桂支加毒膏又當歸黃芪建中ノ數用ニ風濕体ノモノハ浮萍草
ニ並用スニ穿踝疽ノ蓋蓋アリ瘍科方筌ヲリ

大疔風

一醫學六要ニ癩疾俗ニ大疔風ト云トアリ是癩疾ニ天刑ニ人推治クモノ
ハ水疔仁等ハ先毒淺キ方ニ湯藥ヲ服シ善食生ヲヨクスレ治スルニ面癩
手足癩泡ヲ發シ或ハ遍身如癩モノモ浮腫升ナクハ治スレ眉毛脫
落或ハ口眼喎斜等モ治スレ云ナカラキヲ一光樣ニ成リテハ不治又
手足ニ不限一処不潰シテ結毒ニ治ルニ疔アリ然レ疔發毒ニ痛アリ癩

疾ニ痛ナシ桂支架附ニ心鐘道毒或ハ化毒老先乳ナド並用シテ
食禁ヲヨリシ房事ヲ早ク禁ムニ毒淡キモノハ防如通照毒
時ニ膏門丸ヲ並用シテ治効アリ眉毛脱落シタルニハルサムコソハ
白濁糟ノ霜ヲ解キ食禁スルナリ又赤ノ火傷ニ眉毛脱落シモノ
三稜針ニ細ニ乱刺シテ破リ其毒ヲ去テ貼スレハ生スルニルテ
大風ハ毒中足込ヨリ折々血ヲ吸リテ毒ヲ何レモ肉脱甚シキモ
ハ難治ト云々別ニ神驗ノ奇方アリ

翻花毒瘡

此毒ニ種ノ腫物ノヤウニ云ハ氏血毒或痛其外諸瘡瘡治レソチハ皆
翻花スルナリ又腐深クシテ翻花スルモノモアル初起大豆ノ如ク隆々
大キク成ルニ針スレ鮮血出ルモノナリニ針スレカラス物觸レテモ破レ
アリ治法ハ先拔毒ヲ少シク指シ次身ニ腐テレ斷ハ仙人或ハ破敵テ

一レ拔毒ノ眼眼ニモ色ノ変起ルモノ甘草若者陽ニ菜豆ヲ
加テ用テシレテ毒ハ脆ナルモノニ疔ニ隨テ内補スレ又腫テ根
細キモノハ茶葉ニテ結ヒ切レモアリ下疳ハ翻花ハ手強ク解毒
一レ薑葉スレテ可ニ治法手強ク親灸シテ得レシ

膿瘡眼瘡

膿ノ下リ出ス瘡ニ状ハ疔ニ似テ方ハ通リ一石夾瘡ト云先毒膏ニ似テ少
異ニ瘡ヨリハ腫高ク膿濃シ易ニ初起十皮ヲ用ヒ伯州ナドヲ用テ
スレモアリ又鏡ニテ切取ベシ膿瘡ノ方ハ痛甚シキモノニ或腐瘡
鮮血多ク出ルモノアリ是ハ不治ノ疔ト心得レシニ疔終始温補ニ
宜シ蘭説ニ疥癬ハ皮膚胸膈ノ間ニ膿ヲナストイハリ梅毒瘡ノモ
ハ多クハ疔瘡ニテ治シ疥癬ニ成ルモノハ灸アリ灸ヲ付テ見レ何レ
治シ易クサカサレト云

潰ハ破敵ヲ貼
或腐瘡トシテ
者ハ

脚府

鼻痔

世俗ニ云鼻痔ノノ_ノ鼻中_ニ葡萄_ノ熟_ル如_キモノ出_テ位_々大_キクナ
レ_ル初_ニ起_ル輕_キモノ瓜_蒂ノ末_ヲ吹_入ルハ水_ニ成_リ愈_レテ_ハリ重_キモノハ鉄_ヲ
切_テ取_リ根_ヲサ_クリ蠟_ヲテ_テ引_キカ_ケ能_ク取_リ尽_スレ_ル患_多ク出_ルモノハ
風_池風_府ヲ_テ三_稜針_ヲ刺_シ可_ク取_ル患_多ク止_ムニ_テ宗_ノ確_砂散_吹込_スニ
又_ハ麝_香肉_取ル_ル益_ルモノ_ハ宗_方ノ_中ト_シテ_ハ紙_條ニ_テ塗_リテ_ハ接_サシ_カニ_テ服_ス
宗_ハ始_ニ終_ニ末_ニ黃_清柿_名ニ_テコ_シ然_レ尾_ニ是_術也_リ行_フテ_ハ初_ニ
ノ_モト_シト_シノ_類ヲ_用テ_ハ痔_治シ_テ后_項或_ハ頭_ノ辺_ニ大_ニ腫_痛シ_後
膿_ヲナ_レ救_ヒ難_キ病_ニナル_{モノ}アリ_レ彼_彼傷_濕ノ_如キ_{モノ}ニ_テ可_ク慎_然ノ
ニ_テナ_ラス_初學_ノ人_ハ是_方ヲ_行フ_テハ_鼻モ_治ヤ_ス却_テ色_々ノ_變証_ヲナ_シ
ス_テアリ_可慎_方
○現_痔ハ_三稜_針ニ_テ切_リテ_ハ其_處一_片ヲ_テメ_ニ折_リ升_セツ_テ貼_シ

内_鼻梁_骨ノ_方セ_ツト_シテ_ハ天_樣ニ_テ入_レシ_漫リ_ニ至_スハ_鼻梁_骨腐_落
ル_{モノ}アリ_快レ_ル又_ハ接_骨等_ニ亦_ノセ_ツト_シテ_ハ塗_リ指_シ置_キ過_手無_ク
以_テ鉛_ノ管_ニ水_銀カ_シテ_ハ交_差リ_指カ_シ暫_左ニ_通リ_スレ_ル是_術親
美_シキ_妻ヲ_見聞_{タル}ニ_テハ_行フ_テハ_口ス

骨槽風 一名穿脣毒

銀_ノ管_ノ外_耳ノ_前ノ_方出_ル腫_物ニ_テ格_別ニ_テ腫_モク_色モ_カレ_テ
ス_先吊_ヨリ_腫レ_テハ_口キ_難ク_其ヨ_リ時_々痛_生ス_ルリ_多ク_齒
ノ_痛ヲ_採アリ_テ后_齒拖_レテ_ハ後_未忘_テ成_スト_見タ_リ是_術如_右
或_ハ宗_ノ清_陽散_火湯_ヲ手_強ク_用テ_ハ膿_ニテ_ハ深_ク腐_ルル_{モノ}
膿_ハ膿_ノ上_ニ甚_ク見_分難_キモノ_ハ膿_{アリ}ト_見ハ_速ニ_針ヲ_破敵_ノ難_ク
入_レニ_等腐_深キ_{モノ}ハ_外一_穿ヲ_ナル_孔一_枚毒_ヲサ_スレ_ルニ_宗ニ_テハ
レ_カリ_是ハ_宗ニ_テハ_治シ_難シ_多ク_宗ニ_テハ_腐肉_ヲ尽_スレ_ル也_ト

生ス糸ニテクリ根ヨリ切り若西貝散ヲ塗リ正字ノ加味ニ陳湯ヲ用
テシ齒根齒漏皆齒根ヨリ膿出シ若大抵同シモノ懸痲風俗ニ
云ハクシ銀腫ニ白ク爛ルニ患毒風ハ上ア腫テ雞卵ノ如ク成レシ
棟牙凡銀ノ臭ヨリ腫レテ口中燒クカ如ク覺エルモノ何レモ出
血ス口トシテ洗セ人中白散ヲ吹スニ又背肩一渾ク凝ルモノ三黃
加甚痛ヲ用テ其外症ニヨリ湯中散汚湯竹葉石羔湯ナト見
合用之ニ銀齒ハ仙人草ヲ塩ニ揉ミ痛ム齒ニ許リ吹スニ他
齒ニ患スカラス暫クシテコレヲ和タケハツケル

爛漏一名鼻淵

頭腦ノ風邪ヨリ生スニ白晝中ヨリ濁涕或ハ黄水ノカクニルモッ
出ルニ在再トメ愈ナキモノニ此症木府消毒ノ類ヲ用テ補中益元
藿香ヲ大ニ加テ甚効アリ又芍藥胡加芍藥石羔モ宜シ又一方芍藥

桔甘草 右五洋水並梅毒ヲ並北モノニ大甘草 桔梗砂 右六味
水九合ヲ以テ三合ニ並用ニ食酢ヲ以テ少ク忌ムニ塩氣類モ又禁スニ
高方アリ然レモ一傳一難キ一
アリ暫ク料めルナリ

破傷風

此症ハ打撲損傷及金瘡ヨリ凡ハ元氣衰入寒熱ヲ奪シ甚シキハ
ハ口禁シ角子及張シ涎沫ヲ吐スルモノニ症ハ乾固スルハ破傷風ノ
微之破傷風ノ初起脈微シテ欲絶状ニシテ舌荒テ言語出カ
タク振慄ノ如アルモノニ是ヨリ諸症蜂起スルモノ又流注ニテ所
在ヲ移シ腫物起ルモノリ物隔一辺リ自汗出ルモノハ必死ニ者
根架治ニ索尤ヲ並用ス或ハ漬年湯漢附子用エルナリ赤
沈没スルニ種ニ成レシ能氣ヲ消シ的里亞加或ハ自夫監ヲ童便ニ
テ用テ之破傷風ハ症ヨリ湯水入テ大ニ腫痛スルニ去リナリ此症

龍肉シ易キモノニ半年モ腐不止痛ニ昼夜不絶モモアリ是ハ
腐草ヲ以テ治スル術アリ然レモ初ハ人行カケル

サ綱唐

上唇ニ出テ狀チ大豆或ハ蠶^{サ綱}如ク腫痛至テ劇シキモノニ誤テ針
ヲ入ルハ血出テ不止モノニ血痛ト云リテモノサレモ此症ハ痛アルヲ
以テ有テシ出血不止身体高熱瘦シ煩燥トナルモノ不治ノ症ニ黃連
解毒湯ヲ用ヒ申蓋シ然スレバ瀝^{サ綱}唐ハ小兒疳疔或ハ長病后ニ唐
突腫シ爛シテ未消水ノ如キモノヲ流カスモノニ此症ハ傳アレトサ綱唐
ハ至テ^{サ綱}唐

瘡癰

瘡癰ハ所謂積聚之瘡ニ將傍ニ當テ膜中(生メ外ニ出ヌモノ)モリテ
カテ巨々腫モシ先鋒ヲ駐シ大量血丹は湯ヲ用テ膿ヲ催スヲニナレハ
腕スルモノニ敗醬散ナト見合用スレロ一男子肺弱ヲ患フ腹中有塊桂枝
加朮湯ヲ與テ之痿弱顔ル宜シク塊ハ次チニ大キナリ后ハ大膿ヲ成メ死ス
ル事カ多ク附初ヲ與テ誤レシ

天蛇毒

蛇頭赤トモ牙指頭ニ生レ赤腫劇痛寒熱ノ妻アルモノニ大抵瘰癧^{瘰癧}ノ症ナト
同シ出此ハ先鋒ヲ駐シ丑物大黃湯ヲ服膿ニテリカキモノハ膿管ト云フ外
一灸スレバスレハ大ニ腫痛スルモノニ日蝕瘡ハ指頭大ニ腫痛既ニ水泡ヲ
成メモノニ若差ヲ敷スレバ又系ニ京墨ヲ塗リ泡中由ニ入ラヌ程サスレバ水出テ
痛頓リニ愈スルモノ

頭痛

瓜蒂散原砂ニ添フ白蜜中一吹ニシ痛劇キハ白虎湯梅毒ノモノハ大解加之骨皮
合石毒

用此ノ方深ク有所考也百中ノ奇方可秘

腎囊風

土 俗云クニキ田中ニ蛇床子散荆芥湯ニ洗ヒ大黃膏ヲ貼スニ腹業
四本 龍膏大解ノ如ニテヨシ又雄黄四樟腦四雞子黃三煉リト油
ニ和シ塗ルニ劇レキモノハ極南春ニ下スニ又陳茶並湯ニ洗フ

疥瘡

俗云セセニ遊風瘡膿泡瘡ト云フ初起發表スニ子ツ在由狐白ヲ安
食スハ能瘳スルニ面邪法如ノ四辺辟テ塗リ出シ茶ヲ二黍チリ此
次ニ茶湯ヲ三煮シ又貼茶モヨ三而攻テテ元急喘消スルモノハ山椒
煮豆湯ニ橙桮汁ヲ益用ニスニ水煎ニ成ヒモノ散婢加水附南

癩瘡

俗云ハキカサニ初起輕中内ニ者有秋ニ起リ者ハ自愈ニ又七月

原ニキルト瘳スルモノハ面豆外側ニ出ルモノハ甚シキモノハ四指ヲ不瘳手
足及七股ノ辺ニモ出テ痒ニ甚シ皮肉腐ルヤウ成ヒハ痒モ甚クノ
破針ナ患可有り中黄ニ貼スニ劇レテ汁ヲ出スモノハ青木香ヲ
搽ニテ出スト末葉ツツ若ク蒸テ貼スルニ愈ニ奈ハ不可成内攻ス
ルモノハ劇ニキモノハ生方乳ノ燒滓ノ極多ヲ在止ニシ且痛ニナト出ル
ナニ膿水多ク出テ愈レモノハ各法ナト直レカテスニ宗ノ蠶紙錢ヲ花
固布ニテハ蜈蚣油ヲ稱シテ之油ニ合蜈蚣ノ長寸位ナルモノ三葉ナト上
四十日ナリナレヨケハ脱ケルニ愈テ瘳ナト愈スト妙ナリハ一婦人腰以下
豆甲並劇シク腐爛スルモノ中黄五葉四蜈蚣油三攪テ貼スルニ大効
並湯ハ浮萍加天蓋ヨシ又別ニ楊梅皮煎好湯ト云奇方アリ
湯科方在見之

血風瘡

俗云血未止之初起不疔所在ニキヒヨリ少シクニシテ赤色ヲ發シ
甚痒キモノハ極キ破レハ黄水ヲ分ケテ天刑ノ初ノ如シ入内ニ淫水通
赤感^{カシ}風邪^{カシ}眼目^{カシ}同途不知人^{カシ}多^{カシ}其者^{カシ}滿面^{カシ}皆生^{カシ}赤班^{カシ}去リ^{カシ}是^{カシ}數
ニ産後^{カシ}人感^{カシ}冒^{カシ}三^{カシ}日^{カシ}ニ^{カシ}アリ^{カシ}破^{カシ}針^{カシ}ニ^{カシ}惡^{カシ}血^{カシ}ヲ^{カシ}取^{カシ}リ^{カシ}中^{カシ}黄^{カシ}ヲ^{カシ}赤^{カシ}シ^{カシ}腐^{カシ}爛^{カシ}
セ^{カシ}左^{カシ}突^{カシ}ヲ^{カシ}出^{カシ}ス^{カシ}レ^{カシ}並^{カシ}刺^{カシ}ハ^{カシ}防^{カシ}風^{カシ}通^{カシ}聖^{カシ}浮^{カシ}萍^{カシ}大^{カシ}黄^{カシ}ヲ^{カシ}加^{カシ}或^{カシ}膏^{カシ}上^{カシ}防^{カシ}風^{カシ}
十^{カシ}用^{カシ}之^{カシ}一^{カシ}婦^{カシ}人^{カシ}産^{カシ}后^{カシ}此^{カシ}疔^{カシ}發^{カシ}既^{カシ}ニ^{カシ}是^{カシ}聖^{カシ}聖^{カシ}堅^{カシ}ニ^{カシ}成^{カシ}リ^{カシ}タ^{カシ}リ^{カシ}結^{カシ}是^{カシ}レ^{カシ}
真^{カシ}ノ^{カシ}癩^{カシ}之^{カシ}者^{カシ}根^{カシ}湯^{カシ}ニ^{カシ}抵^{カシ}當^{カシ}丸^{カシ}ヲ^{カシ}煎^{カシ}テ^{カシ}治^{カシ}ス^{カシ}后^{カシ}又^{カシ}發^{カシ}シ^{カシ}タ^{カシ}リ^{カシ}此^{カシ}疔^{カシ}癩^{カシ}六
防^{カシ}風^{カシ}通^{カシ}聖^{カシ}三^{カシ}粉^{カシ}刺^{カシ}ヲ^{カシ}並^{カシ}レ^{カシ}ハ^{カシ}治^{カシ}ス

頑癬

少^{カシ}少^{カシ}錢^{カシ}カ^{カシ}サ^{カシ}ト^{カシ}云^{カシ}大^{カシ}ナル^{カシ}ヲ^{カシ}用^{カシ}出^{カシ}ト^{カシ}云^{カシ}其^{カシ}形^{カシ}初^{カシ}起^{カシ}丸^{カシ}生^{カシ}是^{カシ}暈^{カシ}ヲ^{カシ}成^{カシ}シ^{カシ}至^{カシ}テ^{カシ}
痒^{カシ}キ^{カシ}モノ^{カシ}之^{カシ}破^{カシ}也^{カシ}夫^{カシ}大^{カシ}黄^{カシ}葉^{カシ}ヲ^{カシ}塗^{カシ}ル^{カシ}劇^{カシ}シ^{カシ}キ^{カシ}モノ^{カシ}ハ^{カシ}胆^{カシ}凡^{カシ}ヲ^{カシ}少^{カシ}シ^{カシ}加^{カシ}ハ^{カシ}服^{カシ}重^{カシ}
ハ^{カシ}防^{カシ}風^{カシ}通^{カシ}聖^{カシ}萍^{カシ}或^{カシ}大^{カシ}黄^{カシ}蟬^{カシ}退^{カシ}ヲ^{カシ}加^{カシ}一^{カシ}用^{カシ}七^{カシ}粉^{カシ}丸^{カシ}並^{カシ}用^{カシ}ス^{カシ}レ^{カシ}浮^{カシ}萍^{カシ}通^{カシ}風^{カシ}

散^{カシ}ナ^{カシ}ト^{カシ}モ^{カシ}用^{カシ}テ^{カシ}効^{カシ}アリ^{カシ}或^{カシ}積^{カシ}考^{カシ}加^{カシ}大^{カシ}黄^{カシ}ト^{カシ}接^{カシ}骨^{カシ}木^{カシ}湯^{カシ}並^{カシ}用^{カシ}

膿瘻瘻

一名^{カシ}黃^{カシ}烟^{カシ}瘻^{カシ}又^{カシ}疔^{カシ}瘻^{カシ}ト^{カシ}云^{カシ}初^{カシ}起^{カシ}痒^{カシ}ニ^{カシ}甚^{カシ}レ^{カシ}ク^{カシ}極^{カシ}ケ^{カシ}レ^{カシ}テ^{カシ}黃^{カシ}水^{カシ}出^{カシ}ル^{カシ}
カ^{カシ}ハ^{カシ}膿^{カシ}ト^{カシ}云^{カシ}其^{カシ}方^{カシ}ハ^{カシ}此^{カシ}瘻^{カシ}生^{カシ}ハ^{カシ}自^{カシ}膿^{カシ}ト^{カシ}云^{カシ}是^{カシ}ハ^{カシ}矢^{カシ}張^{カシ}種^{カシ}ニ^{カシ}シ^{カシ}カ^{カシ}レ^{カシ}セ^{カシ}ヨ^{カシ}
ハ^{カシ}膿^{カシ}多^{カシ}ク^{カシ}自^{カシ}元^{カシ}高^{カシ}レ^{カシ}其^{カシ}ツ^{カシ}三^{カシ}年^{カシ}モ^{カシ}長^{カシ}ク^{カシ}モ^{カシ}ノ^{カシ}ヤ^{カシ}シ^{カシ}テ^{カシ}粉^{カシ}ヲ^{カシ}用^{カシ}カ^{カシ}
ケ^{カシ}高^{カシ}根^{カシ}加^{カシ}大^{カシ}黄^{カシ}大^{カシ}黄^{カシ}丸^{カシ}ト^{カシ}粉^{カシ}凡^{カシ}ヲ^{カシ}並^{カシ}時^{カシ}ニ^{カシ}極^{カシ}高^{カシ}ヲ^{カシ}下^{カシ}ス^{カシ}レ^{カシ}浮^{カシ}萍^{カシ}并^{カシ}加^{カシ}
大^{カシ}黄^{カシ}ト^{カシ}三^{カシ}日^{カシ}取^{カシ}キ^{カシ}モノ^{カシ}ハ^{カシ}正^{カシ}散^{カシ}ヲ^{カシ}用^{カシ}ス^{カシ}レ^{カシ}浮^{カシ}腫^{カシ}アル^{カシ}モノ^{カシ}ハ^{カシ}裁^{カシ}婢^{カシ}加^{カシ}木^{カシ}附^{カシ}ヲ^{カシ}
用^{カシ}ス^{カシ}レ^{カシ}疔^{カシ}疔^{カシ}瘻^{カシ}瘻^{カシ}ノ^{カシ}治^{カシ}法^{カシ}ニ^{カシ}テ^{カシ}録^{カシ}ス^{カシ}モノ^{カシ}

痔瘻

俗^{カシ}云^{カシ}ヤ^{カシ}ケ^{カシ}ニ^{カシ}冬^{カシ}分^{カシ}ニ^{カシ}限^{カシ}リ^{カシ}年^{カシ}足^{カシ}浮^{カシ}腫^{カシ}シ^{カシ}至^{カシ}テ^{カシ}痒^{カシ}ニ^{カシ}劇^{カシ}シ^{カシ}ケ^{カシ}レ^{カシ}ハ^{カシ}黑^{カシ}腐^{カシ}爛^{カシ}
ハ^{カシ}膿^{カシ}多^{カシ}ク^{カシ}出^{カシ}ル^{カシ}初^{カシ}發^{カシ}ニ^{カシ}破^{カシ}針^{カシ}シ^{カシ}テ^{カシ}血^{カシ}ヲ^{カシ}取^{カシ}リ^{カシ}中^{カシ}黄^{カシ}ヲ^{カシ}赤^{カシ}シ^{カシ}膿^{カシ}多^{カシ}ク^{カシ}モ^{カシ}ハ^{カシ}
破^{カシ}針^{カシ}ヲ^{カシ}其^{カシ}ス^{カシ}レ^{カシ}又^{カシ}初^{カシ}起^{カシ}生^{カシ}姜^{カシ}ヲ^{カシ}並^{カシ}テ^{カシ}洗^{カシ}テ^{カシ}香^{カシ}藥^{カシ}散^{カシ}

ヲモ之水ニ解キ貼スニ又蝮ノ老汁ニテ洗フニ毎年患ルモノアリ
桂皮加水酌シ早ク用テ可ナリ

火丹

正宗曰纏腰丹又帶腰瘡ト云準繩ニ火帶瘡ト云モ是ニ此症
矢張丹毒ノ種也初起腋下ノ辺ヨリ腰ニ及ビキモノ有
ホト出次才ニ蔓リ痒痛スルモノニ午ニ強ク搗セハ痛クス
衣敷ナトニサレハ劇ク痛モクニ搗ハ黄出テ爛レ治才物ニ身ニ蔓
ニ刺芥散毒ナ味散毒加大黄ヲ敷テ服ニ中黄ヲ貼スニ蛇蝎ソ
搗リソケレ此毒不能愈ルト云ニリ云云

天泡

赤

錢カサカク又癰疽ノ白ニ成リ痒ミアレ水泡ヲ成スモノニ五分ニ多
シ準繩ニ火氣瘡於皮膚層而不肉外馳血液能生泡上如豆之瘡根又
或ハ瘡ニ鐘加粉花ヲ用テニ
肺風粉刺酒飯鼻

肺風粉刺酒飯鼻

多白 素問曰諸曰瘡風汗出以色鮮然自時咳屋屋愈夜甚肩上色白
ト云リ周身ニ黒白色ノ小瘡ヲ發スルニ甚痒アリ粉刺ハ佐三云ニ
キモノトシ防通ヲ服シ天花粉ヲ塗ルニ内ノ白キ心ヲ抜カ子ハ愈テ
后瘡更ク成ル○酒飯鼻ハサリ口鼻ニ鼻ヨリ起リ面赤ニ及ビ瘡
黒色ノ筋アルモノニ其毒(録)又血ヲ取リ臨(録)毒ヲ塗ルニ方ハ
瘡科方登ニ見エ蓋湯ハ二字ノ毒差清肺欠又防通又甚痒加
大黄ニ消毒蓋用スニ或ハ丹而臣修モ効アリ出典ニタルト搗毒
在トモアリ心傷ニシ

崔珏

皆云アリハカスニ刺テ瘡ハ女子ニ見苦シキモノニ正宗ノ玉容丸ヲ

洗七生肌散ヲ塗止レシカラズウリノ核ヲ煮ニメ海老ヨシ又紫草水
並シテ洗フモヨシ淫膚ノ枯燥スルモノハ六果丸ヲ服シテ可シ葶苈
加黄芩モ又可シ

油風

俗ニ云茶瓶天窓ニ壯年ニテモ髮落眉ナトモ赤ケテ癩癬ニ凝
似スルニサレモ若ハ疥癩ニハ止サラズ此ニテヨシ又車牛穀ノ油ヲ塗止
ベシ又桐葉霜ヲ油ヲ燒合ルテ本年ニ出タリト宗ノ醫膝如門神
應養養真母ヲ又服スレハ効アリ多房ノモノ髮落ニ核又加黃骨壯
筋湯多ク之原ヲキルニ其他奇方アリ冬ク用テ有効白髮ヲ黒リ
ス方方核桐子ヲ生ミシ桐リツフニ此ニシ縮ニ髮ハ南産ノ乳曝シ
テ洗テシ又奇方茶ノ油度椿木實ノ油ニ味合科ニ塗止レシ

白屑風

フケノ下ノ葛根如大葉ニ苦薑散劇中モノハ童門也下スレ又防風
モ効アリ其由豆ノ末ヲ髮頂ツケ癩癬リ交セ貼スルモ佳ナリ

身痛病

停身ハ初起癩癬好リ或ハ腫痛シテ膿汁多ク出ルモノナリ劇クナ
レハ癩癬トシ椰子油ヲ少シク入レ薑刺子散或葛根如大葉ニ苦薑散
用スレ劇シキモノハ水鏡ヲ以テ口ウサウトロニ洗フニ此レガシ癩癬モノ
オラセヌ下シ先世氣ツクモノニニニ度洗ヒ節椰子油又入レシ又アトシ
イミテ洗フトモアリ脂茶ノ以テアリ山鳥ノ尾ノ霜ヲ椰子油或
ハ刺寄奴草油ニ煉リ出ルニ又麝香麝粉ノ椰子油ニ煉貼ルニ
厚瞬ト云ハ垢ノ多ルトニヨ耳草草上云ハ即身痔ノ身内生肉大如菜
核痛不可忍病ニ薑刺子散防風通聖散ヲ用ヒカモメリヲ入ル
梅毒ニ疔腫身ノ如ク成止モナリ初ハ水声聲鳴ヲヤセ膿汁タマリ

多分不坐毛ノリハ痛頭眩ヲカケルモノニ桑葉清肺欠山牛黄等ト
三知チキモノ桂枝和芍湯ノ類天蓋六ノ應鑿散を用ス或單毒
化毒ノ見合セ用ヒ夫チモ不消モノハツヒルニト用スレ又五宝丹
ニテ治スル症アリ何レ痛熱身テトニ痛モナリ汁モ不消マワニ成リテハ
不消或ハ傳ニ云梅毒身熱身ツモノ皆太鳥霜ヲ考黃散ニ加レシ麦
兜湯並汁ニテ用ヒテ愈ナリト云

漆瘡

漆瘡ハリニ愈シテ痒ヲ止スニカラス内攻スルニ灰也硝苦楝根皮等ノ煎汁
ニ類クシ洗シテ患湯ハ為根加天黃糲如加天黃陳久ニ愈一確キモノ
ハ膏内丸ニテ下スニ内攻スルモノハ防通班粟ヲ作スアボノ木ノクハタヨ
並シ洗フ又山解多ヲ搗ツテ貼又餅米ヲ搗リツフレ貼ルモヨシ又毎ニ感
スル人アリモ古キ陸若ヲ多ク焼キ薰シ大ニ感セシレハ再ニ感セザリ

竹木刺

竹木ノ類身ニ刺テソケ出テアルハ毛引ニテ取レシ奥ニアルモノ針ニテ白ヲ
切リ蘭キ引カケテ取レシ口ハ燒酒ニテ洗ヒ跡一金漆油ニテ乾キモ
ハ雞子ノ左足ノ肉ヲ革ニテ子ノ油ニテ解キ此ヲ針刺タニハ麩ヲ齧
ニ碎キテ貼シ魚骨ノ唾ニ立タルニハ麩ノコケノ霜ヲ白湯ニ融ス又
ソケノ刺タルハ蟻蚋ヲ取リ貼ルモ妙ナリ

疔瘡瘡

本ニ物ニ瘡ハ子アトノ如キモノ瘡ハハアセホニ素問生乳通天論ニ曰
汗出而逆ニ生疔瘡。註證發微曰此提凝結遂成瘡瘡云。正
宗ニ説ハハセホニ惣身ニ粟粒ノ如ク先ノ尖リシモノ出テ膿モテテ
瘡瘡スルモノニ浮萍加天黃或ハ防風通聖散ヲ服シ貼蓋ハニ守
鶴黃散ヲシ又西瓜汁ニテ天花粉ヲ付シモヨシ

疥癩

皮膚ノ癩ニ出シ膿ヲ成ス前ニ熱濕クテ痒状ヲ成スモノニ時時膿毒ニ先
鋒ヲ欺ス未加石モ吾シ膿ヲラハ白皮スシテ宗ニ天行病ノヤウニ云
一氏是多食批ヲ登スルモノニ外感ニ一トニアラス

疥癩

舌ノ下ニソ豆粒ノ如キモノ出テ水泡ニ成ル痛ニアリテ不能言語
モノ針ヲモロク入テ白キ指ヲ出ス權切刺シ金環ト或ハ硝砂ヲ吹テ
ヨレ膿毒ハ蓮蓮解毒湯ヲ用テシ

癩風

癩癩ノ方ニ暗キ処ニ樟腦或ハ若ク燒テ照シ見ルニ体中毒アル
如ク宗色ヲ養ス治法ハ前ニ見エ

濕腫

至テ少キ腫物ニ所在ヲ不疾メ流注ノ如ク蔓延腫不止ニ先鋒ヲ欺シ
烏頭湯ニ白州散ヲ兼用シ膿成テハ早く移ム

咬傷

人ニ咬レタルニ毒其甚キモノシ血脈ハ在明異或ハ血竭ニテ留ムニ
痛甚キニハ毒ヲ欺スニ一等劇シキニ急ルサハ金瘡油ヲ存セリニ
痛ヲ止テ妙ナリ黒砂糖ヲ存セリテモアリ少兒母ノ乳ヲ替ムタル救法
因レ馬ニ咬レタルモ因テナリト宗ノ蟾蜍毒モヨシ又疔ヨリニ毒湯ニ
テ洗フテモアリ又鼠毒ニ時敗内加甘菊根ニテ研ツテ青路烏ヲ食セシム

風天傷

風火ニ咬レタルニ劇シクナレ毒死衝心腹脹シテ寒熱スルモノニ赤
豆在平ノ毒ニ觸ルテ急ニシ蟾蜍ノ生肉ヲ作シ浸シ瘡ハシメ
疔ノ人毒ヲ畏キ毒ス或ハ雄黃ヲ中黃ニ交シ膿又破敵ヲ吹ス

難冠

此モアリ刺防毒皮加雄黄敬婢加木内烏頭湯三葉山並用ス又黄
連解毒ニ犀角木鼈子ヲ加一用ニ木鼈子ヲ用テハ腥膻ク在ノ
知クナルニ傳レレノ高都匠傳雄黄者根ヲ取テオホ刺防毒最極
汁ヲ送下具事ヲ考テ油ヲ煉リ粘ニ貼スト云リ又蠟蟻カクナ鱗ナガト云
女人面生物也馬班
是ハ前ノ雀班ト治法同レヤリソバカスナリ

鈕叩風

疥癬ノ類ニテ甚々痒ク搔ケハ爛レテ次オニヒコルモノニ疥癬ハ指
ノ腹ニ生ス是ハ疥ノハ生セヌコト分ルニ消風散浮萍加艾黄ノ類ヲ服シ
艾葉善ク出ス又疥癬ハ茶湯ニテ浴スルモヨシ

枯筋筋

俗ニ草ノ目ト云モノニ多ク西乳ノ間ハ此ノ甚ニ甚ニ以テ多ク服スレ日

徑レハ被傷スルヤリ被敵者多ク服ス取リ難キモノ茶葉ニテ切レレ
疣痔ノ治法ニ隨フニ

脚氣

婦人ニ限ラズ行脚家スル人ニ多ク出ルニ俗ニ云イキレト初起指ノ間ニ出
テ痒ク搔ケハ爛レテ汁出燻キ難キモノニ此宗ノ枯若旅ヲ煎レ白
雲姜ナトモヨシ甚シキモノハ猪油ヲ又レシロ旅行ニ旅者ヲ懐中ス
レハ此患ヲキテ妙シ

手足破裂

俗ニ云アカキレト足ニ傷付ト出キルモノニ搗杏仁凡ニ似タレモカサ
レテモノニ甚シキハ出出レト茄子根ヲ並レテ洗フレ洗舞又固肌ナト
貼之レ服茶ニ加味道遠ニ刺并地骨湯ヲ加一用スモ在平毒豆袋
ヲ着ケテヨシ又豆皮ノ白敷肉ヲ入レハ此患ヲレト云一リ

眼丹

初起輕翳ノ如ク目ヲ午目カレラハ生スルニ先鋒ヲ貼劑内遊毒櫻
茹契黃ヲ貼スレ體氣アラハ早ク刺スレ然ラサレハ漏ニ成リテニ年モ
愈テモノハ鼻根加木屑粉劑ヲ兼用シテ久服スレ治スレニ難内刺
スレハ鼻ノ内曰は症初起瘡ヲ瘡レハ體消大速ニ愈ルト云リ俗ニテ
モノモテイ又ノモル目ト云トナリ

黒子

三稜針ニテニ如ホト刺シセツトニテ瘡生リ其上ヲニイニテ蓋セオク
二三日内中ニ消スモノハ婦人ナト針ヲ恐ルモノハ治瘡者必ニテ子ヨイニヤ
キ其跡也ト云フ瘡生ルベシ大ナルモノハ梅毒ヲツカフノモアリ又高キ
モノハ蜘蛛ノ糸ニテククリ頂ニセツトシテ貼スレハ落ルニ一奇方萬葉
ヲ殺瘡ニテトキ貼スレハ即チ抜ルト云未試

眼胞菌毒

引カニテ 是則眼痔ナリ下目ヲケニ生メ痛痒キモノハ内ヨリ切レ外ヨリ取レ
一カヤト云レキ少橋核ノ大サノ如シ大ナルモノハ手鏡ニテ切レシ

體元

眼鼻ノクニ銅錫ニテ酢ヲヨク並シ眼下ヲヨク洗ヒモアルモノハ刺
止レ其跡ハ眼蓋ツスレシ瘡ハ僧明若輕粉膿凡陽起石若毒
若等分細末ニシテ水ニテ煉リ貼ルニ字ノ眼蓋モ効アリ又一方
海嵐ニ味錫ニハレ汁ヲ煮出シ滓ヲ去リ乾若ツ大膠ノ如クシテ眼
下ニ貼ルハ其人鼻水ヲ止レシ治スモノ

白瘡瘡

俗ニ云レテクモナリヤ兒ニ多シ瘡化ノ油ヲ瘡リテヨシ又白雪ヲ
貼シテ為根加大黃又防通ノ粉ヲ散サレ大劇ニキモノハ梅肉ニ

手時々下スレ又難子白和メ付

奶癩

小兒頭上三面エカノ如ク出テ劇シケレハ周身ニ及セ甚々痒ク是ヲ
搔クハ汁出テ短シ難キモノ也又連壳欠ニ端の丸ヲカケ時々空肉ヲ
以テ下スレ又馬州湯ヲ用テ或ハ的里亞加ヲ用ヒテ治セシモノアリ
古キ羊袋ヲ霜ニシテ木ノ実ノ油ヲ貼スレ古先告曰母姓娘中五
辛ノ数ヲ多食スレハ其兒之疔ヲ患ヒ且知モ薄シト云リ試シ
タク知リ

蟾拱頭

一存胸襟体云云字ノ小兒胎毒ニテ頭上ニ生レ多ク膿ニナルモノ
膿ヲ催セテ直ニ皮色変スルモノ也破針シテ先鋒ヲ貼スレ服
茶首白根加七黃文連壳欠或藥子降元湯ヲ用セ赤山ヲ用テ

下スレハ軟毒ノ類ニ翠平雲ガ腐ヲ貼スレハ毒カゲニナラズ左葉
蛇皮ヲ交ハ貼スレハ瘡痕高クナラサルモノ也

小兒遺毒爛班

俗言此疔胎毒ト云ナラフ也此疔ハ其母梅毒ヲ患ヒテ妊娠
セシニ因テ兒其毒ヲ受テ眼目及肝門張囊ナラ爛ルモノ也小兒ハ
服多シカナルモノ素問竟ハ數ニテ時々下スレハ人中黃ヲ用テ
奇効アリ又煎好湯ニ洗ハ白雲ヲ貼スレハ服多ハ天解毒藥
的或ハ化毒丸ヲ用テシ

蟻姑串

病源候論ニ九漏ノ目アリ瘰癧氣漏蜂漏蟻姑漏蛇蟻漏
蝮蟻漏浮疔漏瘰癧漏轉筋漏也疔疔ハ其ツナリハ流注漏丹
疔其外久年疔疔モノ皆漏ニナル也各其狀ヲ以テ名ク蟻姑ハケ

テ中ノ切リタル如クニ成リ桂皮加木油ニ精劑ヲカケテ治スルニ寒熱
ナルモノハ附劑ニ心ヤス脱スルモノハ蒸餾劑ニ心

小兒痘疹之瘡

小兒痘後灌湯早キカ又風邪ヲ受テ疹瘡ノ如ク周身紅
カナルモノ出テ甚痒キモノハ天連堯灸又苦浮萍湯或或焮焮加附
子用七厘々索肉用スレテ又刺并散蛇床子湯ニ心治スルモノ
ニ是ニ腫瘡ノ如ク登スルモノハ破血中量ヨク其大推草昆莖其
外食禁ヲ多ク慎ムニ

赤遊丹

此丹ハ赤遊丹ノ名ニ限リテニエテクテ周身ハ赤班ヲ登レ最
呼短促シ登播シテ治速ヤカニセサレハ衝心シテ卒死スルニ先ツ子ノ
血重ヨリ出血スレテ又甚シキモノハ委中尺沢ヨリ破血スレテ且毒所

毒ヲ能ク見テ刺スレシ〇一奇方又毒ノ治方連甘湯主々毒方石ハ
味ヨク研リ碎キ水ニテ煉リ貼ルニ腫痛ハ調胃承氣大柴胡又
フソヨリ如ク之ヲ登スレテアリ疹瘡ノ血辺ニ伝々ハセ
ヨリ赤ク又赤遊丹ニ升ル毒根湯ヨリ升ル白木湯ノ方効アリ内
攻シテハ平治ノモノハ柴胡加石七用スレ

走馬疳

此疳小兒ノ病ニシテ甚毒ノモノハ初登口中至テ臭気アリ而丹銀
腐蝕スルモノハ又少婦ノ劇劑疳疔疫疔ニ突クシテ口中腫ク
シテ膿は紫黒色ニナリ次チニ唇鼻ヲテモ腐蝕モ極々連ナル
モノハ二三日内ニ死スルニ十日モ経ルハ至テ後疔ナリ走馬疔ヨリ

テ重ノ切リタル如クニ成リ格支加本治ニ精劑ヲカケテ治スルニ應撫
テルモノハ附劑ニ心カス脱スルモノハ甚敏劑ニ宜シ

小兒痘風之瘡

小兒痘後瀉湯早キカ又風邪ヲ受テテ瘡ノ如ク周身細
カナルモノ出テ甚痒キモノハ天連羌芩又羌活湯或散婢架陷
ナト用テ隨々索肉ヲ用スレテ又刺并散蛇床子湯ニテ治スルモノ
ニ是ニ腫瘡ノ如ク發スルモノハ破血中童少壯大推茸菟絲其
外食禁ヲ多ク慎ムニ

赤遊丹

此丹赤遊丹ノ名ニ限ルコトニテチクテ周身ハ赤斑ヲ發シ散
呼短促シ發熱播シテ治速ヤカニセカハ衝心シテ卒死スルコト先ツテ
此重ヲ出スルニ又甚シキモノハ委中尺沢并破血ニシテ且毒所

在ヲ能ク見テ刺スニシテ一奇方又毒ノ治令連甘瀉圭々方右ハ
味ヨク研リ碎キ水ニテ煉リ貼ルニ腫痛ハ調胃承氣大柴胡又
消毒犀角湯ノ如ク雪丹ノ類ヲ用スレテ芭蕉根ノ搗汁ニ洗テ可
ナリ又痰アリテソヨリ如ク之ヲ發スルコトアリ痰ハ血辺ニ隨々ハセ
コルコト分ツレバ痰瘡ヨリ發スルモノアリ虎杖莖並散スルハ毒
ヨリ赤ク又赤遊丹ニ升六白湯根湯ヨリ升六白湯ノ方効アリ内
攻シテハ平治ノモノハ柴胡加石七用スレ

走馬疳

此疳小兒ノ病ニシテ甚酷毒ノモノハ初發口甲至テ鼻負アリ而身銀
腐鏽蝕スルモノハ又少婦ノ劇劑疳疔疔疔ニ突々シテ口中腫ク
シテ銀は紫黒色ニナリ次チニ唇鼻ヲシテモ腐齒モ枚々連ナル
モノハ二三日内ニ死スルコト十日モ経ルハ至テ後疔ナリ委中尺沢ヨリ

連三四服止レシヨ治案ノ方 兩桂大棗明礬若者 黑燒又炭服
草黃連解毒加犀角ニ消毒丸梅白散ナト並用スレ又人中白
散ナトモヨシ又方丹若杏仁酢ヲ以テ煎ス

重舌

俗云小舌ニ小兒ニ多ク出ルモノ小キモノハ出血ニ可ク切取ルモ
ヨシ至テ大ナルモノハ葉露ニテククリ切ルテモアリ連花風ト云フクツ
モ出ルニ針スルニ至テニ中ヲ刺スニ左ナケレハ出血止モノニ症
ニ如言諸スルノ其能モノ何レモ切リ取リニ既一金銀七水糊散
敷テ吹テ身口ヲ閉ワリトルニ洗テ服案ハ黃連湯ニ石羔或
ハ芒硝見末藥ニ服ス木舌モ治方同シル多ク症ハ出血非レ効取
リ難シ

胎痛

小兒生テ一二月ノ間ニ生スル痛ヲ云自ラ潰事ノニ母リニ針スカ
ラスサリナカラ胎痛粉痛ノ類ト曰利セハ其治法ニ從フニ左ナキ
モノハ青蠶蟻蝻レヲクニ自ラ潰止又自然ト萎テモアリ小兒胎中
ヨリ翻花ニハルモノニ人ヲ見タリ是青蛇ニヤハス稀ニ腐案ヲ以
テ取ルモノアリ是ハ名チテナケレハ術ヲ施シ難シ

鵝口瘡

小兒舌上及上腭總テ口中ニ赤粉ヲ産リタル如ク一面ニ白ク成ルニ
又乾燥シテ刻衣ヲ血ナト出ルモノアリ此ハ木綿ヲ新汲水ヲ以テヨク洗
ト或ハ口ウサワテルニテ洗ヒ其面一金銀七水糊散ヲ吹クニ腫案
ハ加減涼膈散黃連解毒湯皆連大黃湯ノ類擇ニ用テレ黃連
湯ニモ可ナリ

痘瘡

瘡癩ノ灌湯早く落痴ノ後解毒アツリテ知在定毒スル瘡ハ
骨より生スルモ故免角浮ク腐リ骨ニ及フモノニ膿アリト見ハ早
ク刺スニ初起ハ毒表ノ刺ニ且シ骨根加テ大黃十味散毒ヲト用ヒホホ
山並用スニ浮ク腐ルモノハ左突隆ニ且ク臭臭退炒事ニ左突ニ
交點スル能愈ルニ瘡ヨリテ初起瘡浮腫者故解毒加テ用テ用

瘡疔

賊瘡疔云瘡中粟ノ粒ノ如ク色紫黒ニ大煙極大痛甚漫腫セヌ
之レハ赤ノ沿沿ニ隨フニ破針メ惡血取レ雅キモノハ毒乳ソツヒ
ルヲ針口ハハノヤリニ通リ青蛇ニテヨシ毒毒解毒湯ヲ用テ之ヲ
子刺ニ毒毒惡ニ不可用初起痛甚ニキテアリアカ又ハカ久ニ辰砂
ヲ加(照ス真珠ヲ加ルモヨシ

雀水瘡

俗ニ水瘡^{キクウ}ハ云ニ瘡面及ヒ^{キクウ}厚^{キクウ}一虫黃脂水ヲ流シ粟并ノ如クシテ一
面ニハヒコルモノニ通リハ中黃ニテヨシ乾キ雅キハ白雲ヲ貼スニ一処凝
リテ生スモノハ破針メ白雲ノ粉散ヲ付シ服茶ハ防通散天連
若兒ヲ清上防風湯此浮萍加テ大黃十ト撰テ用テニ

大人口破

舌上及唇ニ小瘡ヲ生シ乾燥破裂裂スルニ破針メ金鎖七水礬散ヲ
自レ口ウサウニテニ洗フモヨシ服茶ハ黃連解毒散通散散
尚多者甘連石美湯ヲ用テニ

臭田螺

臭ノクツヒテラノ上折カメノ知(出ル)初起白ク腫レテ疼痛甚シク瘡汁ナ
ト出テ甚タクサキモノナリ臭水ヲ出スヤウニテハ惡寒毒極スル口
ウサウトトルフテントウエニテ交テ洗スニ一等疼痛甚シキモノハ

蛇床子散或刺苒湯にて洗フ。二宗ノ真君妙點散ヲ自ルモヨシ
版葉八十味散毒臭水多ク出ルモハ葛根加大黃湯ヲ用テシ

牛程躑

足心ニ小豆ノ大サノ如ク俗ニソコメト云。頰内出赤ク陰々大キリ皮
剛クナリ頰肉ト生肉トノ間ニ腐水タズルニ頰内ヲ取ラント思ハバ
サムコツハイヲ塗リヨキニ日程経テコヒスヲ以テ頰内ノ分ヲ切ル
ニレ其ニ中ニアル凝滞シタル根ヲヨクトルニ一レ跡ハ金瘡油ヲ塗リ
左突ヲ取シ置ス

僵

僵脚蛙

俗ニ云本ツケヨト云テ手足ノ指ノ節腫レ日ヲ経ルニ隨テ痛劇
レクナリ薄キ膿出テ荏苒ト大愈難キモノナリ半年モ経レ骨
ニ腐レコムニ甚レキモノハ灸治スルニモアリ左突石鼓湯ニ煎

五物大黃湯類ニ端的ニ用ス。都テ一切ノ瘡痛ニ泥鰌霜ト大黃
ノ末ヲ左突ニ煉リ交點シテモヨシモ腐肉アリテ甚レクニテ日久
不治モノハ腐棄スルニ治スルアリ

田螺泡

又曰蝕瘡凡モモ僵脚蛙ノ如ク手足ノ指ニ瘡ニ初ヨリ痛薄ク大ニ
腫レ水泡ニ成リ後ニハ劇シク水膿ニ成ルモノニ破針シテ先鋒ヲ貼
シ版葉ハ莖連解毒湯

酸痛

酸痛ハヒノクニ多ク手足ニ出ルニ袖ノ汁ヲ敷ルニ且シ差ハ潤肌又劇シ
キモノハ地氣ヲ催スニ當建ヲ用ヒテ効ナキ者莖葉ヲ用エニ梓荷
葉取統栢右以焼酎煎シ蒸スニ右ノ莖葉諸瘡物痛劇シ
キニ用痛風鶴膝風ノ類ニモ可ナリ

張虱

張虱之虱ノ生スル之甚シキモノハ腋下及七眉毛(後止)モヲリリ大テ
廿凡輕粉樟腦三味ヲ酢ニテ燻リ付又洗々ノ方百部根露蜂房
右之味水ニ合テ以テ一合ニ煎シ頻ニ洗ヒ其油(黃柏ニ炙輕粉ニ煉
唐砂ニ方三味ノ末ヲ塗リ貼ス)シ又毎夜敷モ可ナリ

葡萄疔疫

平時ニ流行スルモノ多クハ小兒ニアリ初起寒熱甚シク面部(大豆
粒ノ如クツク)ト聚リ出テ少シ痛モアリ水泡ニナリ後ハ爛ルニ昇
シテ水ヲ取リ中量ヲ貼シ平血飲者根加桔梗十數ノ數見合セ用テシ

百虫入身

諸虫身中ニ入テ不出モノハ小キモノハ其終ヲキテモ害ニナラズモ
是ニハ椰子油ヲ入テ大ナル虫不出唐ヲ入モノハ雄黃ヲ艾ノ中(入テ燻

キ煙ニテ蒸タト出ル)若不出モノハ虫身中ニ存ス

惡虫叮咬

蜂ニサレタルハ中黃ニ雄黃燻燻燻リ交結ス膿多クシテ劇シキモノハ
出血スルモヨシ又燻燻ヲ亦ニテ燻リ付シモ可シ蜈蚣モ同シ○蟻咬毒ハ
一切油酒ノ類ヲ禁テ柿葉ヲ亦ニテ燻付又萬葉ノ霜ヲ効アリ滿
腫大痛劇キモノハ烏魯桑根ヲ用テ之ニ膏ハ中黃ヲ加(貼シテ之
○鼠毒ニ葉根一味濃煎シテ用テ之)如何ホト劇シキモノモ治ス
之又寒熱性毒ニテ咬處燻シ痛クモハ十枚ニ葉根ヲ加(用テ又煎
連解毒ニ鼠尾子ヲ加(用ヒテ効アリ)紅毛ノ若石五分ヲ又四度ニ煎サ
シムルハ腹眩シテ効アリ○或傳云生馬ヲ狼風犬ニ咬レ先ニ春檉ノモヤシ
末ヲ以テ大患スレハ即効アリトナリ

誤吞針鍼骨硬咽喉

魚骨の燭ニ立タルニ配一合ヲ妾位ニ並大服カレハ又鶴ノ腹ノ内ニル
虫ヲ取乾シ置キ末ニメ少シ用テ又袖実霜一味ヲ用テ奇妙シ又鳳
仙白花鬼灯皮実右霜ヲ酢ニテ解キ用テ解ノ燭ニツヅケリタルハ
胡ノ他一味令服又酢ヲ濃並ニシテ用テモヨシ○鉄針ナド肉中入テ
不出ハ磁石ヲ末ニメ瘡口ニ貼スレハ即時ニ抜ル

中破毒

破毒ニアタリ惡寒ヲ全無シ劇シキモノ攻心ニ録豆大黃甘草水
煎服又薑連鮮毒湯十沸ノ數ヲ用テモアリ河豚毒並並ニ味
ニ黒砂糖ヲ腫リ立一服スニ劇シキモノハ屎尿角ノ數効ナレ奇
方白砂糖一斤即時液尽セシメシ其功如神是聖人秘傳ノ方ニ
少後ナルモノハ楊梅は獨重ニ用テシ其功勝他方ト云々惡テ皮膚
シ腫スレハ出スルモノシ其他奇方多ク

淫毒

稀ナ止死ニ會淫道ヨリ小服ニテモ腐ルモノアリ一僧本持アリ卒然ト
大會淫ヨリ淫毒ノカリ痛忍フカテス時ニ奈シ時ク去登スハ淫
差突起大場ヲ作テ之ヲ蓋セハ暫ク止告之ヲ熟視スルニ會淫ニ膿瘡
アリ刺シテ惡臭ノモノヲ出ス隨テ出テ隨テ脱ニ四五日ニ死ス僧ノ
病忘淋毒ナレハ凶ニシテ腫カカル痔ナレハ肛門ノ方ニ向テ瘡アリ
懸瘡ナレハ瘡ノ如ク腫シテ痛ニ寒熱アリ微ヲトリ介辨ス
是淫毒ナリ○又一人途中ニテ會淫痛テ歩行スカラ又駕馬大處ニ帰リ
疼痛甚シク懸瘡ニ似タリ諸医在処スルニアタフス三日ニ死スリ
破シテ出血不止才ニ腐リ擲リ拳ニ死スリ是亦淫毒ナリ

失榮

是皇京曆治ノ病ナリ身ノ前後皇極眉上ナトニ奈ク又元氣虧ヨリ生

ト見初起は骨痛ニ付テ痛ニ也モ付カス骨痛ニ付テモ少シハ動モ
アルモノニ軟硬難シモアリ石ノ如ク堅硬ナルモアリテ痛ニモシク
痛ト異ナル時アリテ消長スルニ付テモ付カス色ニ付テモ少シハ
出シ寒ニ付テモ自汗盜汗ナト出テ瘰癧ト見レテ死スルニ生々乳ヲ
ツヒルノ類ヲ用テ一旦治スルヤカナレバ又一人夏枯草ヲ用ヒツマテ
十全流気欠テ服ス薄テ脂水ニテ羊年詩ニテ全治ス防通加海澤
為根加木消毒丸ノ類見テ用テ

李中書

初起寒熱ニ付テ甚痛薄ク藤頭ニ及テ次第ニ瘦セ委中血辺見腫人如腫
テ日ヲ経テ八里腐ニ成リ出血甚其紫黑色トナリ後ニ膿モ出シテ
漸ク脆シテ臭気不可近終死スルモノ古今不治ノ症ト定ム不得也ハ大
黃牡丹湯ノ類思シカランヤ治劑ノ一ニテハナキヤカニ思ハルナリ也若

年ヨリ医事ニ研究スルノ不常既為心思其術者得テモ不少先賢未
發ノトモ諸君知ルナレバ相失床委中毒ニ症ニ才イテハ無所尚矣

一

五

天保十二年

霜月十五日寫之

生員 孫 孫 孫 孫 孫
孫 孫 孫 孫 孫

天保十二年
霜月十五日寫之



