



西洋方論

武
39



武庫
第 839
卷



疥癬	驚留熱	痢	胸水	三日熱	流注痛	效
蛔	失苟兒陪苦	腸嫩衝	吐	黃疽	間歇熱	咽喉嫩腫
	焚壞疽	狂躁焚	霍亂	水腫	春瘧	胸脇痛
	梅毒	衄	下利	鼓脹	秋瘧	肺嫩衝



右到調勻シ水煮四分時濾過去滓取煎汁三百匙以服之
原方ターテル子
ハ匙アリ

第五十三号飲劑第十六号茅二十一号劑モ亦單方純一

ニシテ和胸ノ善効アリ其効相近シ宜ク擇ヒ用エヘシ

其劑水ニテ浸出シコレニ可乳汁ト蜜ヲ加ヘ患者ノ好

ニ随テ數々多ク與ヘテ日ク胸痞ヲ治ス若シ契アリ渴

去シ甚シキハ焔硝少許ヲ加フ

第五十三号方

白蜀葵葉二

白蜀葵根八

亞麻仁二

右水適宜ニシテ煮ルヲ四分時濾過去滓三百匙ヲ取

シコレニ淨焔硝一匙淨蜜九四匙ヲ加フ

第十六号方

野麴

竜芽菜

連錢艸

ギエルテニル一テ劉寄奴ノ一種菊山云キニクワ各等分

右沸湯ニ浸出シ服ス秋ノキリニソク

第二十一号方

黄山蘿蔔厚母々々小連竟穂各一

連錢草可艸連錢公連錢公連錢公

右細勻沸湯浸出シ用エテ禁ス

敷劇ク困難即以灸眠リヲ妨クル者小夜ニ於テ催睡劑ヲ用エ

未止即ハ灸以灸眠リヲ妨クル者小夜ニ於テ催睡劑ヲ用エ

酷后大心傷冷毒ハ日リ発スル症ハ諸般ノ緩和劑ヲ与フヘ

酷后大心傷冷毒ハ日リ発スル症ハ諸般ノ緩和劑ヲ与フヘ

酷后大心傷冷毒ハ日リ発スル症ハ諸般ノ緩和劑ヲ与フヘ

此即チ本條拳ル所ノ劑ナリ
或ハ胃中ニ汚物鬱滯シテ発スル症アリ此症ハ舌汚苔アリテ
口苦ク食ヲ惡ミ喜ニテ吐セント欲ス如此ハ吐劑或ハ下劑ヲ
用テ治スヘシ

咳嗽飲食

飲食ハ酒鹽藏ノ品酸味ノモノヲ禁ス
輕キ魚類ニ米或ハ大麦ヲ加ヘ煮テ與フヘシ
或ハ新鮮ノ乳汁ニ雞子黄ヲ加ヘ煮テ与フヘシ

咽喉焮腫

咽喉トモニ焮腫劇痛シ呼吸飲食ヲ妨ケ大ニ苦悶シテ声音出
ルヲ能ハサルハ甚危篤ニ入リ動モスレハ速ニ死ス之ヲ最モ險
症トス
右ノ症ハ速ニ尺沢ニ刺絡シテ點ク浮血シ又速ニ全頭花ニ吮
ニ乾吸角ヲ施スヘシ針ヲ用ヒテ吸角此ニ依テ此症忽チ輕快
ヲ得ルナリ

或云咽喉焮腫ノ危篤ナルハ手足ニシハ刺絡シ又第

十一号灌腸法ヲ頻リニ施シ斷ヘス下利也此ハ頭胸ヲ

正直ニシテ呼吸窒塞スルヲ防クヘシ

而後第一号劑ヲ過ニシテ斷ヘス口中ニ含ムヘシ

或云無花果煎汁ニ乳汁ヲ加ヘコレニ硝砂精各數滴ヲ

効アリ
飲液少シ咽ニ下ラハ第一号劑百枚ヲ淨燻硝二十餅ヲ烱化シ
半時ニ一盞ツ、与フヘシ

以上述ル所ノ咽喉腫ハ次ニ説ク症ニ以スレハ最モ危險ニシ
テ又窄レナリ
巴旦杏腺懸壅後ノ两侧ニアル腺ノ花ニ懸壅焮赤腫痛シ或ハ
其疼モ耳底ニ連リ腫一面日モ退カサレハ左右ノ巴旦杏腺有
久腫痛スル症アリコレ前症ヨリハ輕シトス

治法某劑ハ其症ニ随テ前後参考シテ撰用スヘシ
脈強ニシテ數小便平常ニ以スレハ較赤色ナルハ速ニ刺絡ス
ヘシ尔後焮赤腫痛減セズ飲食ヲ嚥ミ下スニ未夕艱難ナルハ
再ニ刺絡スヘシ

脈平常ノ如キ者ハ多血家ニ非レテ刺絡区カ取スヘシ
患者睡リ難キ者ハ第一号劑ヲ半時毎ニ半盞昂温服スヘシ
青ハ第四号劑方ニテハ
引其焮接骨木花引其焮接骨木花ニテハ
引其焮右水適宜密封ノ磁罐ニテ煮ルハ少間ニシテ冷定テ洋
湯ニテ去リ煎汁ニ百枚ヲ取リコレニ接骨木糖十二枚洋燻
硝四十餅ヲ烱化シ貯スルハ
接骨木糖方局
接骨木汁三百枚到三水二浸シ
右煮テ蜜ホドニ煎燮ス
又第五号劑ヲ温クテ頻リニ漱キ且以鼻中京會中ニテ刺出
第五号劑方

接骨木花

玫瑰花各四

洋焰硝一

右調勻シ用ルニ臨ニテ此劑一撮ヲ取り沸湯ニテ浸出シ用エ

其翌日適宜ノ下劑ヲ与フヘシ尔後痲減セオル者ハ復タ下劑ヲ与フヘシ

尔後ハ第四号劑第五号劑ヲ連服シテ遂ニ飲食妨ケズ咽痰赤色消スル迄與フヘシ

此痲右ノ法方ヲ施サスシテ既ニ三四日ヲ経或ハコレヲ施セ

レ其痲腫烈シクシテ消散セサル者ハ必ズ膿ヲナクナリ如此者ハ初発ヨリ三日余ヲ経テ喉内ノ痲赤腫起少シニ減セズ依

然トシテ退カサルナリ如此症ハ第七号飲劑ヲ温メテ絶ヘス口中ニ含ミ或ハコレヲ水鏡ニテ徐々ニ咽痰ニ注クヘシ

第七号劑方

某品秤量同三号劑

右合劑三十二匙ヲ取り水適宜煮ルヲ四分時ニテ濾

過シ煎汁三百匙ヲ取ル

又第八号糊劑ヲ温メテ昼夜頸ヲ貼スヘシ

第八号糊劑方

第七号劑ノ煎汁ニ亞麻仁粉亞麻仁油各十六匙ヲ加テ

糊泥ト為ス

右ノ劑ヲ用テ其腫軟柔ニナル時ハ膿ヲ為ス処白色ニテ隆起セル斑丘ヲ見ハスナリ如此者ハ速ニ刺シ破リテ膿ヲ泄ス

ヘシコレ最モ切実ノ法ナリ

既ニ潰破セハ速ニ第九号漱劑ヲ以テ頻リニ含漱スヘシ此ニ

依テ速ニ瘡ニ

第九号漱剂方

玫瑰花^三溢

菴芽菜^二溢

右剉調勻シ沸湯ニテ浸出シコレニ蜜少許ヲ烱シ漱剂トス

咽喉腫ニ依テ数日飲食下ラスコレカ為ニ衰弱スル者ハ可乳汁百匙大麦煎汁四十八匙合シテ灌腸法トシ二時毎ニコレヲ腸内ニ灌入シ腸内ニ長ク持留浸潤スルヲ良トス是ニ依テ患

者ヲ滋養シテ膿潰ヲ持ツヘシ
一種ノ險惡ナル喉焮腫アリ其症初發輕緩ニシテ必ス瘡ヘキカ如ク見ユ故ニ輕忽ニシテ治療ヲ怠ル中ニ漸ク滋蔓シテ熱焦枯ノ如ク腐壞シ惡臭甚ク且ツ巴旦杏腺懸壅頰顎内唇ノ裡

面ニ多少ノ白斑或ハ黄斑叢シコレカ増劇スレハ変シテ黡黯色トナリ其周圍ハ赤色ニシテ疼ニ尋常ノ喉焮腫ニ比スレハ其腫峯起セス顯著ナラス熱ヲ兼ルヲ希ナリ
右ノ症ハ第十号劑ヲ烏羽ニ浸シ毎日六度其斑ニ塗ルヘシ

第十号劑方

薔薇蜜^四錢

海塩精^二十滴

右調勻

又接骨木花ノ浸劑水ニ浸漬シ茶ニテ類リニ含漱シ又接骨木花ノ沸湯浸一二碗ツ、毎日四度温服スヘシ
其斑目ニ滋蔓シ惡臭モ殊ニ甚キハ第十号劑中ノ塩精ノ分量ヲ増スヘシ此症右ノ劑ヲ勉メテ用レハ大抵速ニ治ス
此病既ニ減シ飲食下ルト虽凡食ヲ寡クスヘシ米湯大麦煎ノ

呼吸ニハ差減スルヲ覺ヘ或ハ呼吸ヲ止ルノ一瞬時ナレ其
疼減ス
脈強ニシテ數ナルノ諸々替留莖ニ歎衝ヲ兼ル者ノ如シ然レ
此病已甚シキ者ニ至テハ刺痛モ亦大ニシテ患者敢テ自由ニ
呼吸スルヲ欲セス是故ニ脈モ亦微弱ニシテ顔色青黯氣息
殆ント窒塞セントスルリ如シ
或ハ歎嗽日夜休ムル歎スル毎ニ疼ニ増劇シテ堪ヘ思ヒ難シ
故ニ患者勉テ歎ヲ忍フ

胸肋痛着法

乾咳アル者ハ歎シテ疼唾ヲ吐スル者ニ以スレハ惡症トス
此病ノ刺痛胸内ノ膜側ニ在ル者多シ然レ胸ノ全圍元ニ表裡
周リ刺痛スルハ胸膜元ニ肋間筋周リ此病ニ羅ルト知ヘシ

此病總テ肋膜或ハ肋間筋ノ歎衝ト名クレレモ持テ此部トシ
非ハ其故ハ此病大抵咳シテ痰ニ血ヲ交ヘ或ハ汚濁ノ粘物ヲ
吐クエヘニ肺モ必ズ此病ニ罹ルヲ知ヘキナリ又此病ニテ
死スル屍ヲ解剖シテ屢々徴スルニ皆猛烈ナル肋膜歎衝ノ肺
ニ連ル者ナリ曾テ肋膜歎衝ノミナル者ヲ見ズ所謂尋常ノ
肋膜歎衝ハ皆表分ニ在テ肋ノ裏面ノ膜或ハ肋間ノ筋内ニ在
ルナリ此ヲ假胸肋痛ト云フ劇盛ナル真大胸肋痛ニ至テハ皆
肺ニ連著スル故ニ全治スル者曾テナシ故ニ真ノ肺歎衝ト真
ノ肋膜歎衝トハ絶ニト差別ナキニ似タリコレ其歎衝ノ肺中
ニアルト肺ヲ被包セル肋膜ニアルトノ差別ノミナレハナリ
是ヲ以テ其治法モ亦異ナラズ尚且劇キ肋膜歎衝ハ毎ニ之ニ
次テ肺歎衝ヲ弁スルカ故ニ此篇ト肺歎衝篇ト相通シテ参考

スヘキナリ
肺嗽衝ハ此病ニ由スレハ脈必ス微小ニシテ最モ危険トス
胸ノ表分疼痛ニ手ヲ按スニ其疼増ス者ハコレ假脇痛ト云
フ但シ治法ハ真假ノ別ナシ

此病初發ノ良法ハ厥左方ニアル者ハ左手ニ刺絡シ右方ニアル者ハ右手ニ刺絡シ浮血過多ナルヲ肝要トス血ノ量少キモ百髮ヨリ減スヘカラズ壯實ノ者ハ弥々其量ヲ増スヘシ

此病刺絡ノ即効アルヲ徴スルニ其血送出スル中ニ患者カラヲ用テ呼吸ヲ為シ或ハ歎スルニ其疼既ニ減スルヲ覺ヘ或ハ頓ニ治スルヲアリ
呼吸不利ノ症ハ浮血黑色稠厚ナル中ハ弥々浮出シ鮮

紅色ニ至ルニテ浮スヘシ

刺絡シテ昏暈ヲ恐ル者ハ患者ヲ安卧セシメテ之ヲ施シ血ヲ十分ニ浮スヘシ失気昏暈ハ却テ刺絡ニテ治ス
其故ハ浮血ニ依テ血脉ノ卒急荒ニ壅塞ヲ疎通解散スレハナリ
刺絡シテ一二時ヲ経テ第十一号灌腸法ヲ施ス下肝要タリ

第十一号灌腸法方

第七号劑 十六錢

右水適宜煮ル下四分時濾過シテ百錢ヲ取リテ以テ淨

凡ソ諸部ノ嗽衝唯一所ニ留着シテ変移セサル者ハ初發ヨリ消散スル迄清冷ニスル下劑ヲ必要トス然レハ肋膜嗽衝ニ

肺欬衝ハ多ク痰唾ヲ吐スルニ由テ治スルカ故ニ下劑ヲ与レ
ハ却テ吐痰ヲ減シ妨クルヲアリ若シ之ヲ用じハ精ク其症ヲ
察スヘシ自然ノ順路ヲ妨碍シテ治法ノ要樞ヲ失フカレ
大便秘結甚シク且ツ胸肺ニ血大ニ浸積シテ苦悶ヲナス者ハ
毎日一兩度灌腸法ヲ施スヲ肝要トス此ヲ以テ却テヨク痰唾
ノ咯出ヲ進メ起スナリ如此苛烈ノ症管苗シテ八九日ニ至ル
者モコレニテヨク抑制シテ其勢ヲ逞フセサレシム
第十二号熨劑ヲ毛布ニ浸シ温メテ患部ニ不断蒸濕スヘシ

第十二号熨劑方

第七号劑 二十
四錢

右水適宜煮ルヲ半時濾過シテ四百錢ヲ取りスレニ石
臑十六錢ヲ烱化ス

右ノ劑夜中數々換更ルヲ能ハサルハ蜀葵膏 名ヲ貼スヘシ翌
朝又其上ニ右ノ熨劑ヲ施スヘシ
患者眠ルヲ得サルハ第十三号飲劑ヲ四分時毎ニ一七ツ
与ヘ每版第一号飲劑百錢毎ニ蜂蜜八錢ヲ加ル者一茶碗ヲ用
ユヘシ 一匙ハ四錢ナリ第一号
劑ハ效篇ニ見ヘタリ

第十三号飲劑方 其方ハ
本草卷之六ニヤリ

洋燭 二錢 刺蝟石 二錢 白罌粟 八錢 舍利 六錢
名 右調勻ス

刺絡ニ依テ其疼大ニ減シ或ハ全ク治スル者モ初発其症劇盛
ナルニハ動モスレハ復タ再発スルヲアリ如此者ハ再ニ刺
絡スヘシ然レ初次に刺絡ホトニ多ク浮血スヘタラス尔後復

夕刺疼スル者ハ第三回ノ刺絡ヲ行フヘシ尔後其刺痛烈クシ
テ歇ナルハ又第四回ノ刺絡ヲ施スヘシ
腕ニ一二度刺絡シテ後其痛復々再發スル者ハ第三回
ノ刺絡ハ足ニ施スヘシ尔後刺絡スヘキ者モ足ニ施ス
ヘシ此ニ由テ胸部ノ血ヲ速ニ導キ降クナリ又患者ノ
強弱諸症ノ輕重ニ從テ毎夜註干灌腸法ヲ行フヘシ此
症多クハ毎夜其熱荒ニ疼痛増劇スレハナリ
其疼ニ僅ニ残ルノニテ呼吸モ甚タ妨ケサル者ハ更ニ復々
刺絡スヘカラス如此症ニ大ニ刺絡スレハ患者ノ精力脱缺ニ
テ尔後衰弱久ク復セサレハナリ
然レ患者未夕噴嚏シカタキ程ニ劇痛シ且ツ其脈モ甚タ疾數
ナルハ更ニ刺絡スヘキノ確徴トス

或ハ其疼處轉移スルトアリ是甚タ善徴トス便チ腋下鎖骨肩
胛背脊等ニ移ルカ如シコレ大抵初發ヨリ第六日ヨリ多シ如
此者ハ必ス刺絡スルト勿レ特患處ヲ徐々ニ摩循以テ蜀葵膏
名ヲ塗ルヘシ
刺絡シテ後其疼ニ鎖骨肩胛轉移ニ或ハ背脊ニ連引
スルハ最モ佳兆ニシテ死スル者ナシ
食料ハ淡薄ナル羹汁查タル菓麥茶大麦麥糜粥ノ類ヲ与フヘシ
平日ノ飲料ハ第一号煎劑或ハ大麦煎汁ニ新乳汁四分ノ一ヲ
加ヘ与フ
大便秘結スル者ハ第十一号灌腸法見テ引數々行フヘシ
患者漸ク呼吸シ易ク其疼モ減スル者ハ第十三号煎劑ヲ一時毎
ニ一匙ツハ第一号煎劑一茶碗ニテ温服送下スヘシ

或ハ敷度刺絡スレバ其疼ニ去ラス特ニ胸中喘鳴痰飲梗阻シ
テ吐キ難キ者ハコレ肺ニ痲毒汚液浸積スルナリ此症ハ速ニ
両脚ニ芫菁膏名ヲ貼シ發泡シテ痲毒ヲ泄スヘシ
或ハ敷度刺絡スレバ其焮衝甚ク減セサルハ大ナル芫菁膏名
ヲ患所ニ貼シテ奇効アリ
或説ニ云此痲ニ於テハ患者精力衰弱シテ脈小弱ナル
ニ非レハ芫菁膏ヲ施サズト然レバコレノ説ニ拘ラス之
ヲ貼シテ大効アルト左ニ引証スル諸説ノ如シ
此痲ハ初次刺絡スルノ後芫菁膏大十一掌腕前横紋ヨ
リ中指端ニ
至許ニシテ速ニ疼所ニ貼スヘシ或ハ當時刺絡後ニ非
ズハ遲滯スルトナク速ニ之ヲ貼シ或ハ未夕刺絡セサ
ズハ其ル者モ之ヲ貼シテ劇痛ヲ免セサラシム又再疼ニ滋蔓

シ或ハ他所ニ轉移セハ其部ニ之ヲ貼スヘシ
初次刺絡ノ後速ニ芫菁膏ヲ疼所ニ貼スレバ痲患ノ長
キヲ短促スルノミナラス敷度刺絡シテ黥ノ血ヲ失フ
ノ損ナシ又胸肋膜中ノ壅塞ヲ疏通シ其勢ヲ消解ス然
レ患所ニ非ズシテ其傍辺無恙ノ所ニ貼スレバ却テ刺
痛ヲ起シ痲患ヲ増ス
肋膜焮衝ニ輕キ肺焮衝ヲ兼ルヤ少ク刺絡シテ大ナル
芫菁膏ヲ疼所ニ貼スレバ屢々コレナシニテ治ス
肺焮衝ニ同ク之ヲ貼シテ大効アルト肺焮衝篇ニ記ス
凡ソ内部ノ焮衝其疼ニ一処ニ留着シテ變移セズ脈疾
數ナル者ニ芫菁膏ヲ患部ニ貼スレバ痲必ク減シテ脈

緩和ス又他病ニ於テ正脈小弱ナル者ハ之ヲ貼シテ能
血液ヲ健運ス

此病元ニ總テ炊衝ヲ兼ル病ハ患者ノ随意ニシテ室内ヲ温
莖焚爵セズ爽涼ニシテ新鮮氣ヲ納ルヘシ

此病某劑ヲ用テ漸ク治スルノ時ニ當テ尚一ニ新症ヲ發ス
ル更アリコレ潛伏セル病毒漸次ニ体中ヨリ發洩スルナリ故
ニコレヲ障阻セズシテイヨク排泄スヘシ其症左ニ記ス

此病痔疾發シテ血ヲ浮スルハ良兆トス故ニ之ヲ障阻
スルヲ勿レ

小便過多ニシテ稠厚ニナリ又白色或ハ微赤色或ハ赭
色ヲ帯ル滓墜アルハ病毒排泄スルノ善徵トス故ニ飲
劑ヲ多服シテイヨク小便ヲ通スヘシ

諸症一二ヲ減シ胆汁ノ如キ黄色ノ大便ヲ通シ患者差
狂快ヲ覺ルハ甚タ良候トス然レモ病ハ初発ニ如此大
便ヲ利スルハ惡候トスコレヨリ惡症ヲ發スルヲアリ
歎ヨリ痰ヲ吐テ諸症輕クナリ或ハ痰過多ニシテ刺痛
減シ或ハ痰日ク變シテ膿ノ如キ者ハ尤モ善兆トス
痰粘膠稠結シ少シ血ヲ交テ赤色ヲ帯ルヲアリ必ズ驚
クヲ勿レ毎ニコレヨリ痰ニ減シ熱解シ呼吸ニ狂利ク
ルナリ如此ハ復タ刺絡スルヲ勿レ斯ノ如ク自然順路
ニ赴クヲ障碍スレハナリ
痰黄色ニシテ血縷ヲ帯ルモ惡候トセズ却テ病毒排泄
ノ善徵トス
大抵歎ヨリ總テ痰ヲ吐クハ良トス毎ニコレヨリ熱退

キ疼之減シ呼吸快利スルナリ
凡ソ右ニ云フ如キ善徵タル疼ヲ吐ク者ハ第十三号劑
ヲ止メテ第十四号劑ヲ半時毎ニ二匙ワ、徐々ニ嚥下
シ次ニ第一号飲劑一茶碗ヲ温服スヘシ

第十四号劑方

可巴旦杏油 新有十六支若シ
無ク杏仁油ニ代フ 雞子黄 一

右融研合シテ淨白蜜ハ匙ヲ加ヘ調勻ス

疼ノ吐出頓ニ止シ胸喉喘鳴シテ苦悶心煩スルハ大ニ

危候トス此症ハ芫菁膏ヲ速ニ脚腓股ニ貼シ又第三十

九号劑ヲ用エヘシ如此ニシテ疼復多ク吐出シ胸中寬

快スル迄勉テ連服スヘシ尚肺焮衝吐疼ハ条ト参考ス

ヘシ

第十五号劑方

第三十九号劑
代用見テ水腫

耳ノ辺或ハ身体下部ニ腫瘍ヲ生シコレヨリ胸痛減ス

第六ル丁アリ如此腫瘍ハ速ニ第八号糊劑或ハ如此劑ヲ貼

テ膿熟セシメ鉞針ニテ開破シ膿汁ヲ泄シ他人潰瘍

治法ノ如ク治スヘシ

此病ニ於テ耳後或ハ自餘ノ諸部ニ膿瘍ヲ生シ其膿白

色ヨク熟スル者ハ良候然レテ貴要ノ貯藏ヨリ病毒自

然ニ洩スルノ候トスルハ大ラズ此症初発ニ法ノ如

ク適當ニ治方ヲ施サズ刺絡スルキ時ヲ失ヒ或ハ全ク

刺絡セサルノ候ナリ

此病適當ノ諸劑ヲ施セテ病勢猛烈ナルニ由テ病毒分疏解散
セズ且ツ体外諸道ニ將輸導泄セサル時ハ焮衝變シテ膿瘍ト

ナル是毎ニ危険ノ症トス其故ハ其膿ヲ速ニ泄除スルヲ能ハ
サルヲ以テ遂ニ全キ勞瘵トナレハナリ
既ニ膿瘍トナル者ハ未夕初發ニシテ輕淺ナリト魚凡其疼ニ
一処ニ留着シ頑固ニシテ移ラズ乾咳体ス疼強ヲ吐クヲナク
或ハ稀薄ニシテ水ノ如キ不熟ノ沫液ヲ吐キ脈疾數ナルヲ其
痲ノ如ク或ハ食後或ハ夜中唇頰赤熱ニ或ハ壯熱ヲ發ス或自
洒淅惡寒ニ或ハ盜汗ヲ發シ小便泡沫多ク或ハ豎滯色又全身
外削シテ甚夕虛脱ス
或ハ其膿ヲ咳ヨリ吐スル者アリ故ニ疼強漸ク膿ヲ帶ル中ハ
第十六号劑ニ蜜ヲ加テ寸差トシ半時毎ニ一碗ヲ与フニシ

第十六号劑方

野藪

竜芽菜

連錢艸

劉寄奴 蘭山秋ノキ

右等分沸湯浸出シ服ス
右ノ如ク效唾吐膿ニ依テ幸ニ治スル者アリ然レ動モスレハ
其膿中ニ留蓄シテ適宜ニ吐セサル者多シ故ニ勉テ諸法方ヲ
施シテ其吐出ヲ進ムヘシ
胸肋中膿ヲ成ス部位ハ初發嫩衝ノ時疼痛最モ甚ニキ所ナリ
故ニ初發預シメ其所ニ小ナル粘硬ノ膏菜ヲ貼シテ標記シ尔
後果シテ膿瘍トナルノ候アラハ其処ニ瘰癧劑ヲ貼シテ潰破
シコレニ膿ヲ釀成スル劑ヲ施シテ膿汁ヲ排泄シ瘡口ヲ瘡ル
ナカラシムヘシ又既ニ膿ヲ成ス片ハ初發最モ疼痛セル所
者ハ速ニ截破シテ其聚リタル膿ヲ尽ク泄シ瘡口ヘシ遲延セ
ハ大ニ害アリ然レ如此者ハ大抵胸肋膜ト胸肋ノ皮肉トノ間

膿蓄積シテ尤モ表分ニアル症ナリ
眞胸肋痛ノ膿瘍トナル者ハ毎ニ皆肋膜ト其表部皮肉トノ間
ニ其膿滲留ストノ思フヲ勿レコノ嫩衝ノ烈キ者ハ大抵肺
嫩衝或ハ肺ノ外膜ノ嫩衝トナラホルヲナシコレカ膿瘍トナ
レハ肋膜ト肺膜ト附着シ其両膜ノ間ニ膿瘍ヲ生スルナリ之
ヲ胸膿病ト謂フ便チ胸中ノ潰瘍ナリ膏菜ニ膿ヲ蓄積スル
如此膿瘍既ニ表部ニ潰破セハ水鏡或ハ綿挿絲ヲ以テ其膿ヲ
導泄スヘシ或ハ欬ニ就テ肺ヨリ泄シ除クナリ

或曰一患人此症アリテレハニテハナヲ煎熬シテ挿刺
鏡ノ形ニ作り毎日胸ノ潰口ニ刺ス患人初メハ口味佳
ナラサルヲ覺ヘ且ツ肺ヲ衝動シテ欬ヲ發ス尔後挿刺
鏡ノ片碎ヲ咯出し日ヲ経テ全愈セリ

或ハ其瘡孔終ニ瘳瘡トナル者アリ
或ハ患部ニ縛法名ヲ施シ創口ヨリ夥ク膿ヲ漏泄シテ屢々大
知ヲ得ルヲアリ
右ノ膿汁表部ニ漏泄セオルハ自ラ内部ニ蓄滿シテ肋膜胸
腔内ニ膨脹シコレカ肺ヲ壓テ大ニ煩悶ヲ發スコレニ依テ遂
ニ肋膜破裂スレハ其膿自ラ胸腔内ニ溢泄シテ肺ヲ壓テナシ
故ニ諸々煩悶患苦疼痛頓ニ消ス然レハ尔後其膿蓄滿スレハ復
前説ノ諸症ヲ全スルナリ又此症詳ニ肺嫩衝篇ニ記ス
右ノ如クナル故ニ膿瘍タルヲ察セハ患部不全ノ如
ク見ユルト魚尾速ニ其部ヲ截破リコレニ腐蝕劑ヲ貼
シ或ハ縛法ヲ施シテ膿ヲ引泄シ屢々奇効ヲ得ルナリ
但シ患部全ク腫起ナク少シモ指示スヘキ痛ヲ覺ヘナ

ルハ其中ノ多分困難ヲ覚ユル所ニ大ナル緯法ヲ施シ
テ大効ヲ得ル莫アリ
然レ如此胸痛ヲ患ル後ハ動モスレハ骨際枯瘦契ヲ生
シ欬嗽休マズ疲困ノ盜汗ヲ発スルヲアリ此病ハ速ニ
緯法ヲ施シ且ウ消熱皮^名ヲ与テ速ニ全愈セリコレ緯
法ニテ膿多ク排泄スルニ從テ漸ク消耗汗^{惡症ノ盜減}
シ日ヲ経テ全ク止ミ欬痰モ漸ク消シ終ニ骨蒸契モ退
テ全愈セリ然レハ緯法大膿^{諸症全治スル迄断テ}
泄除シテ乾ス^{勿レ}
右ノ如ク膿汁既ニ胸腔内ニ溢泄シ横膈上ニ滲留スルニ至テ
ハコレヲ除キ去ルヘキ道路ナシ故ニ此症ハ摘預セズ速ニ鑽
助法^名ヲ施シテ膿ヲ漏泄スルヨリ他人ノ術ナシ否レハ患者惨

酷ナル諸症ヲ発シ体軀消耗枯瘦シテ死スレハナリ
若シ右ノ術ヲ施サハ第十六号沸湯浸劑ヲ勉メテ用ユヘシ
患者眠ルヲ得サルハ第十七号乳劑九十六号白蟹粟舍利
別^名ハ或ハ其症ニ從テ多少加ヘテ夜中ニ与フヘシ
第十七号乳劑方
胡瓜仁^四 杏仁^八 桃人^二
右細カニ搗キ大麦煎汁百戈ヲ注キ日夕搗テ汁ヲ絞ル
之ヲ乳劑トス

此病ハ危篤ナリ胸肋膜嫩衝ニ以スレハ更ニ險惡トス動モス
レハ肋膜嫩衝ヨリ此病トナレハナリ又肋膜嫩衝ノ劇痛ニテ
呼吸ヲ長久忍ニテ自由ナラサル者殊ニ肺ニ傳ヘ易シ合點前
其症呼吸不利胸中促迫困重シテ暫留契ヲ兼ルハ肺嫩衝トス
然レ疼痛ヲ覺ヘス或ハ疼アレ凡甚タ微ナリマレニテ肋膜嫩
衝ト分リヘシ又肋膜嫩衝ハ吸気スルニ就テ劇ク刺痛スルヲ
覺ユ

此病ハ危篤ナリ胸肋膜嫩衝ニ以スレハ更ニ險惡トス動モス
レハ肋膜嫩衝ヨリ此病トナレハナリ又肋膜嫩衝ノ劇痛ニテ
呼吸ヲ長久忍ニテ自由ナラサル者殊ニ肺ニ傳ヘ易シ合點前
其症呼吸不利胸中促迫困重シテ暫留契ヲ兼ルハ肺嫩衝トス
然レ疼痛ヲ覺ヘス或ハ疼アレ凡甚タ微ナリマレニテ肋膜嫩
衝ト分リヘシ又肋膜嫩衝ハ吸気スルニ就テ劇ク刺痛スルヲ
覺ユ

此病ハ嫩衝ナレ凡肋膜嫩衝或ハ他ノ諸嫩衝ノ如クニ脈強ナ
ラスニテ軟弱ナリ

此病烈キ者ハ患者精力速ニ虚脱シ脉小弱ニシテ搏度ソロハ
ス呼吸不利短促欬嗽少モ休ス煩悶シテ氣息窒塞セニテヲ恐

ル故ニ患者臥スヲ得ス臥葦ニ靠リ顔面眼唇舌頰赤色ニシテ浮腫シイヨク痲増劇スレハ苦悶マズク甚フシテ堪カタク竟ニ精神錯乱シテ死ス

此痲脈強実呼吸輕利シヨク偃臥スルヲ得顔面眼唇甚ク腫レズ赤色ナラサルハ狂症ナリ

此痲ハ早ク治療スヘシ否レハ速ニ險惡ニナリテ治セサレハナリ

其症烈シカラスシテ患者稟賦ノ血脉柔軟弛緩ニシテ初発ヨリ適當ノ某劑ヲ用ル者ニ非サレハ此痲衝ハ夕ヤス夕介疏消散スヘカラスト知ルヘシ

肺痲衝治法 无肺痲衝ハ尺沢ニ刺絡シテ多ク浮血スヘシ此ニテ苦悶退カス呼

吸利セサルハ數々刺絡スルヲ肋膜痲衝ニ云フ如クスヘシ

刺絡ノ血ヲ盤盂ニ受ルニ尋常刺絡シテ出ル血ニ以テ

レハ温煖ニシテ半時許り過レハ速ニ冷テ凝結スルハ

血ノ痲衝セル候ナリ如此ハ刺絡シテ良ナク

刺絡ノ血稀薄ニテ稠粘塊結セズ又刺絡シテ呼吸狂利

セサルハ惡候トス其故ハ血ノ稠粘ナル所ハ肺ニ苗結

ニ其稀薄ニシテ換流スヘキ血ノ肺血脉ヨリ運行シ

テ刺絡ニ依テ浮出スルノ微チレハナリ故ニ肺ニ苗結セル稠血ハ去ラスシテ稀薄ナル所ノ浮泄スルニ由

テ此症刺絡シテ益ナキナリ

刺絡スル後一二時过テ第十一号灌腸法ヲ施スヘシ

葦劑塗劑膏茶ヲ温メテ胸ニ外敷スルモ良トス然レ肋膜痲衝

ノ如クニコレニ頼テ良知ヲ必要トセサルナリ
此病ハ肋膜焮衝ニ由スレハ発泡法ノ効寡シ然レ刺絡
ノ后ニ芫菁膏ヲ初メニ背ニ貼シ尔後ハ胸或ハ両脇ニ
貼スレシ凡ソ之ヲ胸腹或ハ腕臂或ハ足脚ニ貼スレハ
胸ヲ寛解シ疼ヲ吐セシム此病ニ元必ス称拳スヘキ治
法ナリ
又綿布或ハ水綿ニ温湯ヲ浸シ臍口ニ當テ温ナル蒸気
ヲ肺ニ吸引シテ甚タ良ナリ
食料ハ肋膜焮衝ト全シ就中此病ニハ淡薄ナル稀キ羹汁ヲ良
トス
飲料ハ第一号劑或ハ大麦煎汁ヲ平日ノ飲料トスヘシ或ハ大
麦煎汁百錢ニ淨蜜四錢ヲ加テ良トス

患者睡ルヲ能ハサルハ第十三号劑ヲ四分時ニ一七ツ分与ヘ
毎服第一号劑一碗ツニ温服スヘシ
某劑ヲ与テ煩悶退キ呼吸輕利シ熱減シ脈勢力ヲ生シ搏度奇
ト或ハ全身四肢ニテ温暖平等シ普達シ珠ニ皮膚滋潤柔和ナ
ルハ焮衝ノ勢挫ケテ漸ク分疏解散スルハ善候トス故ニ今日
ノ勉テ某劑ヲ用ユヘシ
此病咳シテ疼啞ヲ多ク吐スルニ依テ治スル者多シ專ラコレ
ニ意ヲ用ユヘシ故ニ疼啞吐出セサルハ惡徵トス呼吸不利蹇
難ニシテ胸肺中喘鳴スルハ殊ニ凶候トス
咳シテ疼啞吐シ易ク且ツ粘稠ニシテ過多ナルハ良徵ナリ或
ハ痰黄色ニシテ血縷ヲ帯ルヲアリ驚クヘカラスコレ惡候ニ
非ス終ニ全ク白色トナルナリ

痰ヲ吐クニ從テ胸中苦悶緩解シ呼吸シ易ク半時毎ニコソ
一匙ニヒツ、徐々ニ飲下シ每次ニ第一号飲劑ヲコソ
一碗ワ、温服スヘシ如此長ク服シテ他莫ナク保養スヘシ此
症ハ刺絡下劑發汗劑皆害アレハナリ
患者冷氣ヲ被リ或ハ冷飲等ヲ嚴シク戒ムヘシ若之ヲ侵セハ
吐痰頓ニ止テ忽チ危症ヲ発スレハナリ
若シ痰唾俄ニ止ム大ニ煩悶ヲ発シ肺中喘鳴スル者ハ速ニ芫
青膏ヲ脚ニ貼シ第三十九号劑ヲ身ニ其間ニ第一号劑ヲ夥ク
裝服スルヲ肋膜燦衝ニ云フ如クスヘシ又温湯ヲ蒸氣ヲ絶ヘ
ス鼻口ニ當テ吸入スヘシ
此症ニ第一号劑或ハ引キヒケルスレバリナリ
此症ヲ子ヘテ神經ヲ輕ク衝動シテ肺ノ運動ヲ熾起シ

テ痰ヲ吐セシムヘシ
吐痰ノ止ム者ニ吐劑良効アリ胸中粘液留滞スルヲ
泄除スレハナリ之ヲ用ルヲ時ニ適スレハ其効他ノ諸
劑ニ勝レリ
此症數日暫留スル後黄色ニシテ膽液質ノ大便ヲ自ラ通利シ
其後速ニ快復スルヲアリコレ病毒汚物ノ自然ニ通泄シテ治
スルナリ此症又肋膜燦衝ニモアリ参考スヘシ
小便過多稠厚ニシテ滓渣アリ其渣初メ赤色ナル者後ニ白色
トナルハ善候ナリ如此ナルハ飲液ヲ多服シテ其小便ヲ日
々多く通利スルヲ肋膜燦衝ニ説ク如クスヘシ然レ病毒コノ
小便ノニテ除クベカラサレハ唯痰唾ヲ數ク吐クニ依テ此
病最日ク治スルヲ多シト知ルヘシ

痰唾ヲ吐クニ依テ胸中姪利スル者ハ醇厚多養ノ姜汁ヲ少ク
、数々与ルヲ良トスコレヲ一度ニ過用スレハ醗酵ノ足ラサ
ル夥多ノ乳糜ヲ脆弱ナル肺ニ重滞スレハナリ
或ハ大ニ衄血シテ病患後解スルノアリ然レ希ニアルナリ
此病初発日十四日マテモ右ノ如キ衄血ナク其熱大ニ強ク
シテ稽留シ乾欬止マズ脈疾數軟弱ニシテ波濶ノ蕩搖スルカ
如ク或ハ戰慄振寒ヲ發シ呼吸塞難唇類赤色夜々其熱増発スル
ハ肺ノ嫩衝漸ク膿瘍トナルノ明徴ナリ
右ノ諸症ニ次テ乾咳暫クモ休ス大ニ食後或ハ少ク勞動スル
後ハ欬嗽増劇シテ其痛左肺ニアル者ハ右脇ヲ下ニシテ臥ス
ノ能ハス右肺ニアル者ハ左脇ヲ下ニシテ臥スノ能ハス脈管
首熱ノ如クニシテ時々浮數ニナリ飲食後或ハ勞動スレハ殊

然リ又頰額赤色ニナリ食ヲ欲セズ飲液ヲ嗜ム或ハ盜汗ヲ発
シ胸ト額ニ多ク発ス小便泡沫多ク總身羸瘦シテ精力脱却ス
ルノ諸症ヲ見ハスコレ肺ノ膿瘍全ク成ルノ確徴ナリ
肺ノ膿瘍潰破セシテ肺中ニアル中ハ其痛日々増長シ膿瘍
ナキ分ノ隻肺ヲ壓迫シテイヨク呼吸ヲ妨ケ大ニ苦悶ヲ生シ
テ呼吸壅塞セントス故ニ如此症ハ早ク潰破シテ其膿ヲ泄除
スルヲ肝要トス
或ハ此膿瘍潰破シテ其膿自ラ胸腔内ニ溢泄シ横膈の上ニ蓄
満スル者アリコレヲ胸膿痲ト云フ此症ハ必死トス其膿胸腔
内ニ溢泄スルノ候ハ患者輕キ昏暈ヲ発シ徒来困々所ノ苦悩
ノ諸惡症頓ニ退キ却テ欬ヨリ膿様ノ痰唾ヲ吐クノナシコレ
徒来肺囊ニ充ル膿汁所謂ル膿囊ナル者膨脹壓迫セリヨリ起

ル諸症其潰破スルニ依テ速ニ退クカ故ナリ然レ其胸腔ニ溢
出スル膿日々ニ増益留積スルニ依テ虧敗シテ酷后トナリ復
タ速ニ危多ノ所患險危ノ諸症ヲ免スルナリ
肋骨間ヲ穿漏シテ孔ヲ作シコレヲ以テ胸腔ニ滲留セル膿汁
ヲ除ク法アリ之ヲ孔肋法ト名クコレモ亦右ノ症ヲ治スルノ
一術トス然レ此ニテ其膿汁ヲ胸中ヨリ尽ク泄シ除ケ凡肺藏
其潰瘍ニテ既ニ腐蝕セルヲ以テ治スル者少ナシ多クハ此術
ヲ施ス後死ス
肺癆自ラ潰破シテ其膿日ク气管ニ出テ数ヨリ吐出スルハ此
症ノ大幸ニシテ最モ希フナリ然レコレモ亦危症ナシト云
ヘカラス其故ハ膿汁涌泄スルノ過多ニシテ一奇ニ气管ニ聚
滿シテ壓迫スレハ呼吸ヲ遮遏シテ忽チ窒塞スヘキハ危懼ア

レハナリ
或ハ气管ニ出ルノ膿自ラ数シテ容易ニ多ク吐出スル者ハ幸
ニ死ニ免ル、ナリ然レ凡此症モ多クハ肺癆ノ常療トナル
ノ恐レアリ
前ニ説ク所ノ諸症候ニ就テ診察シ膿瘍必ス肺中ニ隠伏スル
ヲ確知セハ其膿ノ尿管ニ導出スルヨリ外ニ良策ナキカ故ニ
之ヲ導出スルニ水綿ヲ温湯ニ浸シコレヲ不断口鼻ニ當テ並
気ヲ吸入スヘシコレニテ气管弛柔寛濶スルナリ
又適宜ノ厚脂ノ羹汁ヲ作テ夥ク与フヘシコレニテ胃膨充シ
テ横膈ノ低垂ヲ支撐シ肺ノ膿囊ノ腫脹セルヲ壓搾シテ其膿
上湧シ易カラシム
又温醋ヲ鼻下ニ當テ敷テ増発シ或ハ高声ニ叫呼シコレニテ

肺中膿囊ヲ破裂セシム然レ凡テ労働ノ衰ハ精力衰へ又者
ニ非サレハ爲シ難シ又其膿潰破スルノ期モ預メ知ルヘカラ
サレハ右ノ諸方法ヲ勉メテ施スヘシ
或説ニ云一患者肺瘍ニテ久ク伏枕シ毎夜睡ルヲ得
ス故ニ看病人勉テ諺於滑管解頤絶倒ノヲヲ説治シ
患者大笑ヲ発シ因テ肺ノ膿腫破決シ其膿夥ク数日リ
吐出シ此症漸ク愈ユト
如此考按少ナカラス然レ或ハ其潰破ノ時忽チ呼吸窒
塞シ死スル事アリ預メ意ヲ用ユヘシ
其膿瘍潰破シ欬ニ由テ膿様白色ノ痰ヲ吐キ熱減シ渴止ニ食
漸ク進シ大便結成スル者ハ治スヘシ
其吐スル膿新色ニシテ惡臭アリ熱退リ又或ハ退クレ復タ発

シ渴止マズ食糲加ヘサルハ大抵死症トス
咳日リ痰ヲ吐スル者ハ其食料ハ米或ハ大麦ヲ煮テ少許ツ、
与フヘシ一頓ニ過用スルヲ勿レ
飲料ハ第十六号劑ニ乳汁三分ハ蜜少許ヲ加ヘ与フヘシ
又第十八号散劑ヲ毎日三度與フ
第十八号劑方
没薬^{十五} 蝦石^半
右爲極細末
毎日数嗽甚シキニ依テ肺大ニ衰弱憊困ニ故ニ毎夜其欬ヲ静
止スルニ催睡劑ヲ与フヘシ
大便少シ秘スルハ害ナシ然レ数日秘閉スルハ第十一号灌腸
法ヲ施スヘシ

吐痰漸ク減シ食挽絶ヘス精力益シ痰全ク解スルハ回復ノ候
トス
或ハ膿様ノ痰ヲ吐スルノ夥フシテ患人皆ノ精力消耗スル様
ニ見ヘ或ハ少ク食スレバ食后甚ク痰熱シ大抵食消シ胃空虚
ナル迄其痰ヤメス或ハ痰熱微少ニシテ小便清澄汗多クシテ
休メス但シ痰熱ノ以前ヨリ痰熱中ニ其膿多少肺ヨリ血中ニ
傳輸シ痰退ク后コレヲ小便ニ通利スル者アリ凡ソ如此諸症
ハ近來ノ諸名家消痰皮茗ヲ用テ衰弱ヲ強壯ニシ熱ヲ制控ス
皆々大ナル膿瘍並ニ如此症ニテ衰弱スルニ用テ奇効ノ劑ト
ス或ハ外傷ノ膿瘡瘍ノ膿外泄セシテ内攻シ血中ニ逆流シ
テ発スル諸患症ニ必要最勝ノ薬トス
吐痰甚ク多カラサルハ第十八号散劑无ニ第十六号劑ヲ用ユ

ルノナク但第二十号劑ヲコッヒ一匙ニ三匙ツ、毎日三度与
〜每次第二十一号劑三コッヒ一匙ヲ服セシム〜良驗アリ
欬嗽夜中ニ劇ク困難ナルハ催眠劑ヲ連服ス〜若シ應セサ
レハ後服ヲ止ム
肺ノ膿瘍吐痰ニ依テ漸ク清除スル者俄ニ其吐痰止ト未ハ復
タ危篤ノ新症ヲ発シ喘急胸中苦悶ヲ発ス如此ハ或ハ冷気ニ
胃触シ或ハ大ニ思慮ヲ勞動シ忿怒恐驚スル等ヨリ発スル者
多シ此症ハ救治ス〜甚ク危険トス
右ノ症ハ温湯ヲ不断鼻口ニ當テ吸入シ又第十号劑ヲ夥ク
温服セシメ又第九号劑ヲ以テ胸中寛快ヲ覺ヘ痰復吐出ス
ル迄与フ〜然レ如此ヨク効ヲ得テ後ハ第九号劑ヲ止ム
〜

○一本有
速字

肋膜嫩衝篇ニ云フ如ク此症ニ芫菁膏ヲ脚ニ貼シテ良効アリ
 或ハ肺ノ膿汁自ラ血脉ニ滲入シテ身体各部ニ輸リ此ニ由テ
 上部或ハ下部ニ腫瘍ヲ発シ膿潰スルノアリ此ニ依テ忽チ胸
 中寛快ヲ覚ユルナリ此病ハ肋膜嫩衝ニ云ク療スヘシ
 外部ノ嫩衝変シテ頑硬腫トナルカ如ク内部ノ嫩衝ニ頑硬腫
 トナルノアリ便チ肺嫩衝ノ後動ニスレハ肺中ニ頑硬腫ヲ生
 スルノアリ此ハ必ス肺ト肋膜ト生合瘡着スルナリ此症ハ病
 治スレハ生涯呼吸困難咳嗽ヤメス食飲後或ハ労働後殊ニ甚
 シ故ニ此ハ肺中膿瘍隠伏スル徴トモス此症ハ全ク治スルノ
 ナシ
 凡ソ肺嫩衝ノ甚メ酷烈ニシテ諸薬ヲ効ナキ者ハ必ス肺中ニ
 悪疔ナル腐壞ノ寒壞焦ヲ発スルナリ如此ナリテハ患者煩悶

堪忍ニ難ク精力缺脱シ脈甚メ數ニシテ弱ク且ツ間歇シ吐痰
 黒青色或ハ惡臭アリ此症ハ徒ニ死期ヲ俟ツノニ他ノ療法ナ
 シ

第二十号剖方

ハルサモ コツハイハ 半 雞子黄 个

第二十一号剖方

右針ニテ攪合シコレニ淨蜜ハ匙ヲ加ヘ用ユ
 款冬 山蘿蔔 小連壳 各一
 寸中屑 八
 右合シ沸湯ニ浸出スルノ茶ノ如クス

此疾ハ骨動ノ後或ハ温暑煩熱ニ就テ率キ冷氣ヲ吹ケル且ツ衣
ヲ脱キ裸体ニテ冷処ニ坐卧シ驟雨ニ遇テ衣服ヲ更テテ能ハ
サル等ニテ多ク発ス此疾ハ骨節ノ間ニ於テ生ズル也
春秋ノ昼暖ニシテ夜冷ル以テ之ハ如キ病ハ因テ為ス
初發惡寒振慄シ次テ發熱煩渴困惱シテ安カラズ一兩日ノ中
肢体各部ニ劇痛ヲ發シ其疼一処ニ住セズ手臂或ハ肩胛或ハ
膝脚其他諸部ニ發ス其部疼痛止メハ赤色腫起ス
此病ヲ寒熱ノ二種ニ分ツ熱症ハ嫩衝発熱ヲ兼ス寒症ハ大抵
如此症ナシ
關節ノ筋ヲ被包スル腱質ノ膜ニ此疾番着スルハ其部ヲ拳動

此疾ハ骨動ノ後或ハ温暑煩熱ニ就テ率キ冷氣ヲ吹ケル且ツ衣
ヲ脱キ裸体ニテ冷処ニ坐卧シ驟雨ニ遇テ衣服ヲ更テテ能ハ
サル等ニテ多ク発ス此疾ハ骨節ノ間ニ於テ生ズル也
春秋ノ昼暖ニシテ夜冷ル以テ之ハ如キ病ハ因テ為ス
初發惡寒振慄シ次テ發熱煩渴困惱シテ安カラズ一兩日ノ中
肢体各部ニ劇痛ヲ發シ其疼一処ニ住セズ手臂或ハ肩胛或ハ
膝脚其他諸部ニ發ス其部疼痛止メハ赤色腫起ス
此病ヲ寒熱ノ二種ニ分ツ熱症ハ嫩衝発熱ヲ兼ス寒症ハ大抵
如此症ナシ
關節ノ筋ヲ被包スル腱質ノ膜ニ此疾番着スルハ其部ヲ拳動

スルニ就テ疼ミ堪忍フヘリラス
其勢一兩日ヲ経テ止ムコトアリ然レモ其疼ハ依然トノ退カス
其疼腰ニ雷着スレハ殊ニ困難ニシテ拳動運指スルコト能ハス
槁木ノ如クニシテ床上ニ墮臥ス
或ハ腰痛退テ股膕ニ轉移スルアリ此部ニ入ルハ殊ニ頑固ニ
シテ退キ難シ
此疼痛ハ轉移變動シ易キヲ以テ動モスレハ病毒内蔵ニ轉移
潛入シ腦或ハ肺ニ懸留シテ危篤トナルコトアリ如此ハ表部ノ
疼ミ消散シ胸中大ニ煩悶ヲ發シ精神錯乱スルナリ如此再攻
スルニ非レハ此病ニテ死スル者寧ナリ然レモ初發輕忽ニシ
テ峻効ノ劑ヲ速ニ用ヒサレハ病患烈クナリ或ハ頑固ニシテ
退キ難ク或ハ冬久治セサレハ關節強拘不遂ニテ動搖スルコト

能ハス或ハ生涯依然トシテ不治ノ廢疾トナルコトアリ
秋此病ヲ發スル者ハ大抵久キ瘧工嚴寒ノ候ニハ此病ヲ發ス
ルコトナシ其他ノ時候ニハ必ズ再發シ易シ
傷冷中濕流走痛治法
此疼身体ノ左方ニ在ハ左手ニ刺絡シ右方ニ在ハ右手ニ刺絡
スハ十髮許リノ血ヲ浮スヘシ
或云此病大勢ヲ兼テ關節劇痛腫起スルハ発汗スルコト
ナク但勉メテ刺絡スルコト絶ニナキ毎日ニテ勢去ル疼
盡ク消シ若クハ疼輕微トナルマテ絶スヘシ患者少壯
多血ニシテ大ナル刺絡ニ堪工ヘキ者或ハ少ク衰弱ス
ル者ニ數々刺絡スルニ堪工ヘキ者ハ此病ニ於テハ恐
ルコトナク毎ニ多ク刺絡スヘシ

第十二号製劑ヲ毛布ニ蘸シテ患部ヲ不断温莖濡潤スヘシ
食料ハ大麦或ハ米ヲ煮テ与ルル又煮菓モ良シ
飲料ハ第一号飲劑ヲ与ヘ或ハ可乳汁ニ大麦煎汁四分ノ一ヲ
加ヘ与ヘテ渴ニ充ツヘシ
右ノ治法ヲ施シテ尚治セサル者ハ第二十二号劑ヲ半時毎
ニ匙ワ、与ヘコレニ次テ毎服第二十三号飲劑一コリ
ヲ温服スヘシ
第二十二号劑方
淨焰硝 一匙
蝦石 二匙
白蜀葵舍利 別名
大麦煎汁 八匙
右合
第二十三号劑方

杜松木 六割十
白檀 六割
寸中 八割
右合沸湯泡出如茶
翌日ハ第十一号灌腸法ヲ施シ且ツ第九二号劑第二十三号劑
ヲ勉テ用ユヘシ
其疾自若トシテ減セズ熱モ解セサルハ第三日ニ於テ復々劑
絡ヲ施シ第十二号製劑第二十二号劑第二十三号劑ヲ勉メテ
用ユヘシ
第四日ハ清涼ナラシムル下劑ヲ与フヘシ又此日ハ第九二号
劑第二十三号劑ヲ用ルルナカレ但シ夜末以時以ニ第九四号
鎮痛劑ヲ与フヘシ
第二十四号劑方
止痛液 十名
和痛糕 四名
煮大麦汁 八

右合為一服

右ノ如ク方法ヲ施セハ此痲大抵治スヘシ其善徴ハ小便ニ夥ク微赤色ノ滓空アリ總身微汗ヲ發ス如此者ハ患有葦中ニ保護シテイニ第二十三号劑ヲ服シテ其餘殘ノ毒ヲ尽ク除クヘシ
右ノ方法ニテ其疼退カス患所ニ赤色ヲ發セハ其部ニ水蛭名ヲ貼シテ血ヲ吸ハシムヘシ十二号劑第一十二号劑ニテ其疼盡ク解シ速ニ全愈スル如クニシテ其疼尚在葦トシテ去ラス或ハ疼処轉移スルハ一子チアノ石鹼半匙ヲ丸トシ一服トシテ朝ト日中ト夜ト一服ヲ与ヘ每服第九三号劑二碗ヲ温服シ患者冷氣ニ冒觸セヌヤウニ嚴ニ戒メ卧床ニ保護スヘシ

又羅紗ノ片布ヲ温メテ徐々ニ患処ヲ摩捺ス
或ハ其疼一処ニ留着シテ全ク變移セス或ハ股脰痛頑固ニシテ患者其他ハ無病ナルハ芫菁膏ヲ大指二指橫徑ホトニシテ患処ニ貼シ六時ホト経テ日數發泡セハ其水泡ヲ刺破シテ水ヲ出シ其膏ヲ去テ別ニ官粉膏名ヲ貼シテ瘡ニ八日ヲ経テ全瘡セハ復タ前法ノ如ク発泡スヘシ
尔後其疼全ク退カサルハ芫菁膏ヲ患部ニ貼シテ發泡スヘシ
芫菁膏ヲ剥キ去ルニ就テ其泡ヲ成ヌ表被ヲ剥去ルナリ唯鍼ニテ刺破シテ其水ヲ出スヘシ若シテ剥脱スレハ赤爛ノ裸肉ニ大疼痛ヲ發シテ其治要ヲ失フカ故ナリ

又方傷冷毒ノ股脛痛肩痛ハ患部ヲ粗布或ハ毛櫛ニテ
 類リニ摩擦シテ赤色ヲ発スルニ至リコレニ石鹼ト竜
 腦ヲ鎔金水名ニテ溶シテ塗擦ス此ヲ以テ其疾退リサ
 ルハ芫菁膏ヲ大サ茶碗ホト或ハコレヨリモ大クシテ
 患部ニ貼シ六時ヲ経テ其泡水ヲ尽ク去リ尚半時ホド
 患部ニ貼シ其後之ヲ去リバザリコム名ヲ以テ蓋
 至ル之ヲ以テ其痛速ニ能治ス此ヲ數々経験セリ
 或ハ頑固ノ股脛痛風ノ患部ニ絆法名或ハ股ノ内側打膿法
 名ヲ施シ不断膿汁ヲ流泄シテ屢々大効ヲ得たり或ハ後方ヲ
 患部ニ貼シテ良効アリ其方
 又方香瀝膏十 竜骨木脂二 テレメニテイナ

通宜

右硬膏トナシ廣ク患部ニ貼ス
 或ハ後方ヲ患部ニ貼シテ良効アリ

白蜜 生石炭

右硬膏ト為シ患部ニ貼ス
 内目ニ依テ脛股骨ノ脱臼ヲ発スル者アリ故ニ脛股痛風モ亦
 脱臼ノ病因ヲナストシハク多シ此以テ脱臼モ脛痛風ノ治法
 ヲ用ルヲ考フヘシ
 此疼痛久クシテ一所ニ留着シテ去ラズ關節強硬ナルハ温湯
 ノ蒸氣ニテ日ニ二度ヲ患部ヲ蒸シ温メタル綿布ニテ拭乾
 シ且ツ徐々ニ摩擦シテコレニ蜀葵膏名ヲ塗ルヘシ

間歇熱

此病間歇熱ト名クルハ其熱発作スレハ漸ク全ク解散シ諸症亦退ク然レ時日ヲ経テ復々諸症ヲ発スルノ前ノ如クナレハナリ 二日毎に発熱あり一日に三回発熱あり一日に一回発熱あり其熱毎日発スルヲ日発熱ト名ク隔日ニ発スルヲ間日熱ト名ク二日ヲ隔テ一発スルヲ三日熱ト名ク其症初メ欠伸ヲ発シ肢体困重懈惰惡寒四肢黧澹色脈弱渴ヲ発ス如此症少頃暫留シテ後發熱脈強數大渴止ス頭痛ヲ苦シ支節疼シ終ニ通身多ク汗ヲ覆シ諸症漸ク退テ睡眠ニ寤レハ熱去リ脈平常ノ如シ但身体疲倦ヲ覺ルノ時ニ至テ是レ熱去リ或ハ發熱中ニ胆液ヲ多ク吐スル者アリ 汗中或ハ熱解シテ后小便赤色ニシテ瀝沫多ク冷レハ上面

浮膜アリテ尿管ノ縁圍ニ着キ其底ニ滓塗アリテ赤色ヲ帯ヒ
赤石脂或ハ瓦礫ノ碎粉ノ如キ土質ノ物アリ如此小便ハ秋ニ
発スル間歇熱ニアリ或ハ以前他ノ熱病ノ諸症ヲ患ヒタル者
始テ如此小便ヲ通利スルコトアリ然レテ春ニ発スル間歇熱ハ如
此トノ罕ナリ但小便甚ク赤色ナラズ黄色ヲ帯ヒ中間ニ雲ア
リテ懸留シ尔後白塗ヲ作スナリ如此ハ良候トス
此病ヲ春熱ト秋熱トニ別ク春ニ發スルハ秋ニ發スル者ニ以
スレハ毎ニ治シ易シ秋熱ハ稍重シ
二月ヨリ七月ニテニ發スルヲ春熱ト謂フ七月ノ末ハ
月ノ初ヨリ正月ノ末ニテニ發スルヲ秋熱ト云フ
九月十月ハ間歇熱ヲ乘ル病多シ然レニ凡ソ樹葉槁落シ
勁風騷鳴ノ頃ハ間歇熱作アル熱病ノ種々ハ速ニ消ス

ルナリ考定シテ本邦ノ數ニ改メシ
春秋ノ二熱元ニ其治法モ大ニ差別アルカ故ニ各々之
ヲ分テ論説スルコト左ノ如シ
春發間歇熱
此病ハ大抵間日熱ニシテ多クハ善性ナリ
或ハ重複ノ間日熱アリコレハ間日ニ於テ其熱又一発スルナ
リ然レニ間日ニ發スル熱本日は發スル熱ニ以テスレハ更ニ輕緩
ナリ此症ハ春熱ニハ罕ナリ
凡發作中ハ粘稠ヲ稀解スル適意可義ノ飲劑ヲ溫服スルヨリ
他ナシ冷飲ハ害アリ此ハ第九五号劑ヲ患有ノ意ニ從テ多ク
与フヘシ

第二十五号劑方

酸模根 三白

鹿角屑 五十

大麦 新有 三

茴香子

橙皮 各二十

右判合劑トナシ用ルニ臨テ此劑九四錢ヲ取り水道宜

密封罐ニテ查ルテ四分時澆過シテ其汁四百錢ヲ取ル

或ハ大麦煎汁ニ第三十一号蜜醋劑ヲ加ヘ或ハ橙汁砂

糖少許ヲ加ヘ可美トシ之ヲ用心モ亦良

発熱中ハ患者身体ヲ穏靜ニシ被衾ヲ寒温適宜ニスヘシ

凡ソ熱ノ発作ハ発汗ニ依テ解散ス故ニ飲劑ヲ温服シ

テ汗ヲ発スヘシ然レモ身体ヲ外ヨリ温煖ニシ或ハ重被

シテ強テ汗ヲ発スルハ害アリ

其熱漸ク解セントシ或ハ既ニ解スル者ハ良丹ノ美汁ニ橙汁

ヲ加ヘ酸味トシ數々与フヘシ

間日ノ熱ナキ時ハ醇厚滋養ノ食料魚肉ヲ許シ与フヘ

シ然レ粘膩多脂ノ物ハ禁ス

発作ノ前ニハ食ヲ与ルテ勿レコレ発作中ニ胃弱重シ

テ消化セサレハナリ

発作ノ二時前ニ稀キ美汁ヲ少シ与フヘシ

春熱ハ大抵発作ノ時刻違フヲナシ然レモ動モスレハ早

ク発スルヨリ故ニ飲食ヲ与ルニ意ヲ用ユヘシ

天气晴暖ナラハ間日ハ道途遊歩スヘシ然レモ疲勞スル

莫勿レ又平生ヨリハ多ク睡臥スヘシ

春ノ間歇熱ハ動モスレハ嗽衝ヲ兼ル病ニ変スルヲアリ患者

少壯ニシテ多血ノ者特ニ然リ故ニ此症ハ刺絡ヲ良トス顔色

赤ク頭痛或ハ胸刺痛スル者ハ珠ニ刺絡ヲ良トス

食ヲ悪ミシハク意気吐吐舌上苦アリ口中苦ク頭旋暈スルハ
急作ノ二時前ニ吐劑ヲ適當トス

凡ソ諸疾皆初発ニ吐劑ヲ与テ胃中ノ汚物ヲ吐シテ
良トス腸胃ニ痼毒多ク粘汚ノ敗液膠着スルハ二度或

ハ三度吐セシムレバ尚尽ク淨除スルヲ能ハサル者
リ如此ハ總テ後方ノ吐劑ヲ与テ

大麦煎汁百二 酒十六
末二十 白蜜四
イペカコア十根

右劑半時毎ニ一二匙ヲ与ヘ徐クニ断ヘス胃ヲ衝蕩シ
テ悪心吐吐ヲ起シ以テ夥ク實敗ノ膽液ヲ吐ス如此ナ

ズトハ裂キ吐劑ヲ用ルヨリハ却テ優レリ
吐ヲ得ル夜ハ催睡劑ヲ用テ鎮靜スヘシ

右ノ劑惡性痢疾ノ初発ニ用テ毎ニ大効アリ

通例治スルキ治節ニ治セズ自然排泄ノ須臾ヲ推キ病

毒滯留滞結シテ治シ難ク或ハ變シテ危險ノ警雷熱ト

吐劑ヲ与テ初メ吐スル後或ハ其後吐スルニモ速ニ微温湯ヲ

多ク与フヘシ此ニテ吐シ易ク諸々痼毒汚物ヲ胃ヨリ排泄ス

ルノ便宜ヲ得ルナリ
一二度吐スル後ハ其温湯ヨク受容テ吐止ムナリ

吐後半時許過テ第九四号劑ヲ与ヘ又尔后急作ノ熱中ニ第九
五号飲劑ヲ用テ静卧保護スルヲ前ニ云如クニテ熱解散スル

ヲ候ワヘシ

患者腰痛腸鳴痞氣鬱蓄腹脹ヲ苦ム者ハ発熱スル四時前ニ適
宜ノ下劑ヲ与ヘ発熱ノ三時前ニ第二十四号飲劑ヲ与フヘシ
痲毒尚遺留ノ徵アラハ吐劑下劑其痲毒ニ從テ撰ミ再ヒ用ユヘ
シ然レ春ハ間歇熱ハ吐下ノ劑大抵一度用レハ痲毒除クヘシ
數度用ル者罕ナリ
吐劑ハ吐スルノナラス下利スルヲアリ下劑モ亦吐
スルヲアリコレ言ナシ腸胃凡ニ滌除スレハナリ
右ノ法ニテ腸胃既ニ淨除シテ後ハ第九九号劑客ヲ適宜ニ用
ユヘシ然レ發作中ニハ用ルヲ勿シ又熱醒テ後睡ルヲ得ナ
ルハ只此劑ノ用ユヘシ
春ノ間歇熱ハ右ノ療法ニテ大抵全治スルナリ然レ或ハ罕ニ
七八熱スレバ治セズ且ツ諸症減セズ其發作却テ長ク劇盛ナ

ル者アリコレ卧褥ニ保護シテ十分多ク発汗セサルカ故ナリ
此症ハ消熱皮ヲ以テ治スヘシ故ニ發作ナキ時ニ第三十号散
劑ニ酒少許加テ一時半毎ニ一服ヲ与フヘシコレニテ速ニ治
シ且ツ再発スルノ恐レナシ春月ハ氣候漸ク清爽和暢スレハ
ナリ
第三十号散劑方
消熱皮名 八名 余名 三名 日名 廿名 八名 香名 ヲ
右極細末トナシ分テ十二服トス
或ハ三四発ノ後鼻唇口等ニ小ナル膿瘡ヲ発スルヲ善也トス
コレヨリ治スヘシ秋熱ニ如此ナルハコレヲ以テ善也トシ難
シ

秋發間歇熱

此病ハ春熱ニ以スレハ毎ニ頑固ニシテ退キ難シ夏暑熱甚
キ後此病持ニ多シ
此病初発或ハ其熱長ク暫留シ或ハ重複頻発シテ宛ニ暫留熱
ノ如ク或ハ其熱劇ク発スル後一二時過テ復々悪寒発熱スル
ヲアリ是以テ其熱順序正ク発作スルヲ始テ間歇熱タル
ヲ知ルヲアリ初発動ニスレハ如此ナルヲアルヲ預メ識得
スヘシ
或ハ初発右ノ如クニシテ終ニ三日熱トナル者アリ
或ハコノ熱病初発全ク退キ其後重複ニ発作シ或ハ漸次ニ暫
留シテ終ニ險重ナル暫留熱トナル者アリ
凡ソ此熱病ハ毎ニ必ス腐敗セル胆液管ノ病毒ヨリ生ル熱病

ナリ故ニ腐敗ノ胆液管ノ毒液腸胃ニ蘊蓄スルヲ早ク除クヘ
シ滯滯スレハ其害滋ク甚シ故ニ速ニ吐劑ヲ与ヘテ之ヲ驅除
スヘシ其法春熱ニ云如シ
顔色赭赤憤盛ニ大眼中ノ血絡盈脹シ總身大熱アルハ吐劑ヲ
与ル前ニ刺絡スヘシ
顔色黯澹萎衰シ脈多血ノ候ナキハ刺絡害アリ
吐劑ハ熱全ク退テ後用ユヘシ然レ其熱尽ク解セサル症ハ発
作ノ劇盛ナル時少ク退テ後用ユヘシ
秋ノ熱病ハ必ス屢々吐セシムヘキ者甲乙殊ニ一度吐劑ヲ用
テ吐スル後モ尚食ヲ悪シ口中苦ク舌上苔アル者ハマタ吐劑
ヲ用ユヘシ
吐劑ヲ与ヘサル日ハ第二十五号劑九十六号ニ第三十一号蜜

醋劑ハ克ヲ加ヘテ多ク与フヘシ

第三十一号劑方

白蜜去沫者 嚴醋白

一二度吐劑ヲ与テ後ハ第三十二号散劑ヲ二時毎ニ用ユヘシ

第三十二号劑方

淨煇硝四十 霸塩各二

右合研為末適宜ニ用ユ

右ノ療法ヲ施シテ勢減シ徒来全キ間歇ナキ者余漸ク正候間歇注未シテ発作ノ間断長キ者ハ第九号飲劑ヲ春勢ニ云フ如ク与フヘシ
食料飲料共ニ春勢ノ条ニ云如ク用ユ之且以飲料ニ香橙汁

橙汁等ヲ加ヘ与フヘシ又煮タル菓類梨子等用ユヘシ

患者精力衰ヘサル者ハ奥肉ヲ少ク与ヘ滋養スヘシ

秋ハ冷氣日ニ増ス日故ニ既ニ回復スル者ハ冷氣ニ再感スル

勿レ凡ソ病治シテ十四日許ノ中ハ毎日早晨ト日中半時前

ト夜食半時前ト三度ツ、第三十三号劑ヲ每服再豆蔲大ホト

与フヘシ

第三十三号劑

单方テリヤカ各 苜蓿糖各十二錢

右合研為末適宜ニ用ユ

既ニ一月許ニ至勢ノ北ナキ者ハ空心ニ第三十四号丸劑ヲ一服用ヒ又八日ヲ経テ又一度用ユヘシ

第三十四号劑方

芦薈十六

没菜八

サフラン四

右細搗凡研ヲ七丸トレ一服トス以酒馬丸局方

吐劑无ニ前菜ヲ用テ其解ニ或ハ漸ク減スレ凡患者精

力虚脱スル者ハ消熱皮ヲ用工ヘシコレヲ春熱ニ以ス

レハ最モ必要トス故ニ第三十号劑ヲ春熱ニ云如ク用

工ヘシ尔后十四日ヲ経テ又再ニ用工ヘシ

或云春熱秋熱凡ニ吐下劑ヲ用テ後或ハ七丸ノ後痲治

セサル者ハ大氏消熱皮ヲ用工然凡左方穩和ニシテ

危懼ナク良効アリ又消熱皮ヲ用テ才効ナキ者左ノ劑

ニテ口ク治ス三日熱モ亦速ニ効アリ

苦薤死ハ八燔硝ニ湯成テ后清水ニ合ス凡八右煮テ三分ノ一ヲ減ス凡藥味堅ク用工ヘシ

患者熱ナキ時毎日三四度毎服三十二丸或ハ四十丸ヲ

或ハ右ノ劑ヲ糖劑トシ毎日數塊ヲ服スルモ亦良糖劑ハ右

蔗糖ノ如ク製スルヲ云凡製スル者ハ右ノ劑ヲ糖劑トシ毎日數塊ヲ服スルモ亦良糖劑ハ右

眼中黄色ヲ見ハシ胃元ニ胸中苦惱ヲ覺ヘ小便黄色ヲ帶ル者

ハ大ニ虚脱衰弱スト虽凡消熱皮ヲ禁ス此症ハ尔後十四日ヲ

過ルト虽凡之ヲ用ルヲ勿レ但第三十五号劑ヲ一時半毎ニ二

匙ツノ与ヘテ眼黄苦惱其他ノ諸症モ治スルニテ連服スヘシ

第五号劑方

潭花蜜石十六丸 霸塩三丸 水六十丸

薄荷油四丸

右合

若シ障花蜜得カタキハ葱ヲ取り温醋一盃ヲ注テ搗
爛シ布ニ裹テ汁ヲ絞リコレニ等分ヲ蜜ヲ加ヘ用ユヘ
シコノ劑コク疼ヲ疏解スコレニ用ルニハ四分時毎ニ
一匙ヲ子フヘシ

右ノ症漸ク治スル後復タ以前ノ如ク発熱スル者アリ然レ此
以前暫ク其熱去リシ中ニ患者ノ精力既ニ復スルカ故ニ病
ニ堪ヘ易フシテ自ラ後速ニ治スヘキカ
此病必ス再発シ易シ此症ニ確砂精一匙ヨリニ匙マテ
ヲ適宜ノ劑ニ加ヘテ与ヘ或ハアリキシルプロフリ
タチス^名ニ加ヘ用ユヘシ
右ノ症或ハ如此類ノ症ハ消熱皮ヲ用ユヘカラス妄リニコレ
ヲ用レハ殆シト難治ノ病或ハ荏苒タル病トナルナリ

凡ソ消熱皮ニテ治スル症ハ第三十四号ノ下劑ハ害アリ之ヲ
用レハ復タ其熱ヲ発起スルナリ其故ハ其熱ニバク発作スル
ニ由リ或ハ馳泄スルノ諸劑ニ依テ此病毒漸ク挫折シテ体外
ニ泄去ス然ルニ其熱尚懸留シテ去ラサルハ患者ノ衰弱スル
カ或ハ此病ノ從來漸清因循ノ勢ニ依テ去ラサルカ故ニ消熱
皮ノ強壯健運スル効力ニテ其熱ヨク消解スルナリ然ルニ復
タ峻攻ノ下劑ヲ用レハ此病ノ漸復ノ順梳ヲ失テ其熱再発ス
ル所以ナリ此ノ如キ症ハ荏苒タル間日熱元ニ三日熱ニシハ
クアリ
此病初発其烈シクシテ脉度ソロハス顔色萎衰シテシハク昏
眩冷汗ヲ発シ或ハ胃疼ヲ堪忍ヒカタク或ハ其発熱中ニ昏睡
シテ省寤セサル者ハ皆大ニ危篤トス如此症ハ速ニ消熱皮ヲ

用工へし然ラサレハ次ノ発作ニ死スルナリ
若シ其熱退テ後顔色薰黄胃胸苦悩スル者ハ前ニ云如ク第三
十五号劑ヲ与フヘシ

此病ハ刺絡セズ刺絡スル者アレハ甚ク穿ナリ
其熱第二度ノ二時前ニ吐劑ヲ与ルノ前説ノ如クスヘシ
第三発ノ前ニ下劑ヲ与ヘ此ニ就テ食飲起居ヲ慎ムノ春熱ニ
云如クスヘシ
尔後間日ノ熱ナキ時ニ第三十六号糖劑冉豆蔻大ヲ二時毎ニ
用工ヘシ

三日熱

此病第八発ニシテ退カス且ツ患人衰弱スル者ハ第三十号消
熱皮劑ヲ用工ヘシコレニテ熱去ル者ハ大抵尔後八日ノ中ハ
熱発スルノナシ故ニ八日許ニシテ復タ一劑用工ヘシ尔後十
四日ヲ経テ又一劑ヲ用工此ニ依テ惣計二十四日ヲ服ス然ラ
サレハ動モスレハ再発スルナリ

三日熱ハ他ノ熱病人寡食スルニ比スレハ差多ク食シテ可シ

第三十六号制方

霸塩

三錢

單方テリアカ

四錢

五種鬮根舍利別

豆名適

右合

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

黃疸

此症ハ上腹ノ面側堅脹ニ或ハ疼痛ニ或ハ食後否瀉ニ或ハ吐

吐ニ眼中ノ白膜黄色小便赭黄ニシテ終ニ周身黄色トナル

此症熱病人後花ニ秋発ノ間歇熱ノ後立発スル者ノ少ク

或ハ飲食蕪悪ナルカ飢飽節ナク并ニ消化ニ難キ物ヲ食スル

ヨリ発スルヲ多シ

膽ニ结石アルヨリ頑強ニシテ數々再発スル黄疸ヲ発スルヲ

多シ

此病ハ第三十五号制方毎日一時半毎三四匙以テ毎次

第七号制方

茅新解者

蒲公英

全

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

右到水適宜煮之四分時凍過絞取其汁二百匙コレニ淨
蜜丸四匙ヲ加ヘ溶化ス

又石鹼ヲ丸トシ朝夕ニ毎服半匙ヲ用ユヘシ
毎朝空心ニ毛布ニテ右肋下ノ軟處ヲ摩擦スルヲ八分時亦良
教日右ノ如ク藥劑ヲ用レハ大抵微利ヲ発シコレヨリ病輕緩
ヲ得如此ハ一日ノ某劑ヲ勉テ尿色常ニ復シ眼中肢體黄色去
ルニテ用ユヘシ

右ノ劑ヲ用ルヲ六日ニシテ大便快通セサルハ第三十四号丸
劑ヲ一度用ユヘシ翌日ハ依旧第三十五号劑第三十七号劑并
ニ石鹼丸ヲ用ユヘシ小便赤黄ニシテ一服後ニハ
口舌汚苔及此ノ腸胃ニ汚穢ノ敗物アリナリ此症ハ大
黄劑ヲ用ユヘシ

食料ハ粉麵ノ類粘稠ノ物ヲ禁ス羹汁ニハ葛苳菘類酸模ヲ加
ヘ与フヘシ此病在モ良
此病ニハ身体運動スルヲ甚夕良ナリ故ニ天气晴爽ナラハ道
遙遊歩スヘシ

此病ハ血中ノ水液自ラ水脉ヨリ体中ノ大小ノ腔隙ニ溢出シ
テ滯留スルナリ
其水脂膜ニ皮内表ニ泛濫シテ總身腫脹スルヲ皮水ト名ク此
症大抵下部ニ始テ總身ニ及テ顔面眼目其他諸部黯澁色小便
少ク絶テ汗無シ或ハ腫ヲ按ハ痕没シ腫起ノ部冷ニ膝足跡特
ニ甚クシ
経久ノ間歇熱ヲ患ルノ後遂ニ水腫トナル者多シ或ハ失血過
多ナル後此病ヲ発ス刺絡過度ナルモノ亦コトヲ発スルコト
アリ
間歇熱ヲ患ル後発スルハ吐下ノ劑ヲ与フヘカラス唯弟三十
八号方ノ某酒ヲ毎朝空心ト午膳ノ半時前ト夜食ノ半時前ト

水腫ハ下
此病ハ血中ノ水液自ラ水脉ヨリ体中ノ大小ノ腔隙ニ溢出シ
テ滯留スルナリ
其水脂膜ニ皮内表ニ泛濫シテ總身腫脹スルヲ皮水ト名ク此
症大抵下部ニ始テ總身ニ及テ顔面眼目其他諸部黯澁色小便
少ク絶テ汗無シ或ハ腫ヲ按ハ痕没シ腫起ノ部冷ニ膝足跡特
ニ甚クシ
経久ノ間歇熱ヲ患ルノ後遂ニ水腫トナル者多シ或ハ失血過
多ナル後此病ヲ発ス刺絡過度ナルモノ亦コトヲ発スルコト
アリ
間歇熱ヲ患ル後発スルハ吐下ノ劑ヲ与フヘカラス唯弟三十
八号方ノ某酒ヲ毎朝空心ト午膳ノ半時前ト夜食ノ半時前ト

毎日三度每服十六匙ワ、用ニへシ

第三十八号制方

苜蓿穗十六

泥菖根

竜胆根

メリス各八

月桂子十二

杜松子十四

茴香子八

右剉搗テ攪合シ好酒或ハ蜜水各一貫二百八十ヲ注

シ封固ノ蓋ニ丹シ微火ニ置テ浸出スルヲ十二時ニシ

テ用ニ

或ハ右ノ菓劑ヲ極細末トシ淨蜜三百匙或ハ四百匙ヲ

和シ糖劑トニ用テ良

右ノ糖劑ト第三十三号制方ニ考ヘテ諸病ニ用ニ

シ良効アリ

右ノ糖劑十六匙ニ消熱皮四匙ノ加ヘ每服四匙毎日四

度用テ諸間歇熱ヲ治ス前ノ菓酒ヨリ効峻捷ナリ

或ハ右ノ糖劑十六匙若クハ二十四匙ニ銅粉四匙ヲ加

ハ版量前ノ如クニシテ又萎黄赤水腫无ニ頑固ノ黄

疸ニ用テ大効アリ

或ハ右ノ糖劑八匙ニ上好ノ芦薈一盞ヲ加ヘテ毎日二

三度一二匙ワ、用テヨク腸胃ヲ清除シ且ワ強健ナラ

シタルノ良劑トス

或ハ右ノ糖劑二匙ニ止痛液各十滴若クハ十五滴廉角

鹽或ハ竜腦十铢ヲ加ヘ毎夜之ヲ用テ催睡発汗ノ良劑

トスコレ世ニ称譽スル底野加ヨリハ其効在毛勝レリ

経久頑痼ノ間歇熱ニ經テ発スル水腫ノ萎或ハ尚其効ヲ夾テ

冬ク消解セサルハコレ大抵肝脾若クハ腸間膜ノ腺ノ壅塞或
ハ黄疸ノ萌葉ヲ乘ル者ナリ此症ハ左ノ劑ヲ用テ奇効アリ極
テ日ク粘稠凝結ノ汚液ヲ稀釈烱解シ且日ク小便ヲ利ス
其方 茵陳 藎 茵陳 藎 茵陳 藎 茵陳 藎 茵陳 藎 茵陳 藎
右水適宜浸出し濾過シテ八十度ヲ取り後菜ヲ加フ
茵陳 藎 各半或三十斤 杜松子精 廿六
右稠勻シ一日ニ三度ニ用テ尽ス數日如此連服スヘシ
右ノ症四五日毎ニ適宜ノ下劑ヲ用テ下スヘシ
尔后病患減セハ第三十八号ノ方後ニ出ス糖劑ニ銅粉ヲ加ル
劑ヲ与フヘシ毎ニ大効アリ
此病ハ温暖ニ保護スヘシ天气冷ル片ハ爐ヲ擁ヒ睡レハ日ク
厚被スヘシ

食料ハ乾テ水気少ナキ物ヲ佳トス矣肉魚ノ類良ナリ
飲液ハ与ルノ勿レ若与ヘハ勉テ寡クスヘシ且ツ純精ナル飲
液ヲ良トス
患者ノ力ニ應ジテホド日ク闲歩スヘシ此ニテ治シ易シ
毛布ヲ温メテ腫脹ノ部ヲ數々摩擦スヘシ或ハ腹皮甚々薄ク
ナラサル者ハ日ク摩擦シテ麻油ヲ塗ルヘシ日ク小便ヲ通シ
又大便モ通ス
小便ノ量漸ク益シ汗発スルハ病治スルノ徴ナリ此ニ就テ腫
稍減スヘシ
其腫全ク消シテ後ハ總身ノ皮弛緩虚軟ナル者ナリ故ニ復々
水腫ヲ発ヤニテテ恐ル此症ヲ預メ防ニハ腹无ニ両脚ニ縛帶
ヲ為シテ收固シ天气晴朗ノ日ニ遊歩闲行スルヲ良法トス

凡ソ間歇熱ノ後発スル水腫ハ右ノ諸方ヲ施シテ治スヘシ
間歇熱後ノ水腫ニ非ル症ハ凡テ其瀦留ノ水ヲ諸道ヨリ通泄
スルノ肝要ナリコレヲ考究スルニ第三十九号劑危懼スヘキ
トナクシテ奇効アリ早朝ニ一匙ヲ用ユコレヲ用ユレハ大抵
少し惡心懊悩ヲ発シコレニ就テ小便多ク通利シ大ニ輕快ヲ
覺ユ此劑ヲ用テ罕ニ下利スルトアリコレモ亦害ナシ
若シ一匙ニテ効寡キ者ハ漸次ニ其量ヲ益テ小便夥ク通スル
ニテ用ユヘシ又其水尽ク小便ヨリ利シテ其腫全ク治スル迄
毎日用ユヘシ

第三十九号劑方

澤花 海葱 新鮮者

右好酒二百克ヲ注キ搗テ濾過シ用ユ 大蒜ヲ代

若シ患者此劑ニ堪ル者ハ一盞ナリハ之ヲ与フヘシ
或ハ澤花ヲ乾シ細末トナシ丸劑ニ作り用ルモ亦捷効
アリ然レ新鮮ナル者其効勝レリトス
右ノ劑肺癆衝ニ用テヨク痰ヲ吐セシム
以前痰ヲ吐スル者俄ニ止ム者ハ危險トス速ニ輕キ吐
劑ヲ用ユヘシコレニ効アルハ澤花蜜名ナリコレヲ適
宜ノ飲劑第一号ニテ少許ツ、數々用ユヘシ
腫脹漸ク消スル者ハ飲食起居調攝等前ニ云水腫ト全シ
水液漸ク腹腔ニ瀦留シテ腹大ニ膨脹スル症アリ之ヲ腹水ト
名ク一方ノ腹ノ側面ヲ徐々ニ敲ツニ水響動スル者ハ水必腹
腔ニアルナリ
右ノ症未タ久ヲ経ナル者ハ大抵第三十九号劑ヲ用テ治ス

右ノ割ヲ用テ後數日小便快通セズ腫モ減セサルハ速ニ刺腹
ノ術名ヲ施テ水ヲ泄スヘシ初ニ早ク施セハ最モ切實ニシテ必
ズ捷効アリテ誤ルコトナク又簡便捷徑ニシテ患者ニ苦疼ナレ
又初ニ早ク施スノミナラス未タ下割ヲ用ヒサル症ニ施スヘ
シ故ニ此術適當スヘキ症ナラハ少年未熟ノ医ニテモ危フム
コトナク早速ニ施スヘシ
然レ病既ニ久ヲ経テ衰弱スル者ハ効ナク差^ヤ危懼ナキニ非ス
右ノ術ニテ一頓ニ尽ク其水ヲ除ケレ危懼スヘキコトナレ但シ
廣キ縛締ニテ其水ノ流泄スルニ從テ漸次ニ腹ヲ縛窄スヘシ
コレニ依テ夫氣昏暈先ニ他ノ惡症ヲ発スルコトナレ其水尽ク
除カハ尚縛締ニテ腹ヲ固縛シ保護スヘシ
再ニ腹脹セハ右ノ術ヲ復タ施シ或ハ其症ニ從テ數度施シテ

可ナリ

右ノ外ニ又第三十八号割ヲ勉メテ用ユヘシ
食料ハ全ク乾固ノ物ヲ良トスルコト前説ノ如シ

鼓脹

此病ハ腹腔ニ水ナク唯風氣ノミ充テ腹脹スコトハ刺腹術ナ
 害アリ左ニ拳ル看法ニテ弁知スヘシ且其動脈ノ主トシテ
 真ノ鼓脹ハ男子ヨリハ婦人ト小兒ニ多シ
 婦人ハ卵巢ノ水腫甚タ多シコレ尋常ノ水腫无ニ鼓脹ト混シ
 易シ意ヲ用テ弁別スヘシ
 看法第一鼓脹ハ其腫水腫ノ如クニ峰高隆起スルヲナシ
 第二鼓脹ハ腹ノ前部甚タ起脹ス然レモ腹ノ両側ハ陥没ス
 第三鼓脹ハ腹中ニテ水ノ鳴動スル候ナク唯腹ヲ敲ク時ハ鼓
 ヲ拊カ如シ
 第四鼓脹ハ左側或ハ右側ニ轉臥スレモ腹形変ヒズ腹皮白色
 ニナ紫脹スルノミ

第五鼓脹ハ其危スル以前ニ脘ノ辺圍數々疼之絞急シテ大便
閉ヲ乘ヌハ五内之病ニ至リ其病ノ重キ者ハ大ニ輕シ
第六鼓脹ノ患者ヲ秤量スルニ水腫ノ者ニ以スレハ大ニ輕シ
第七鼓脹ハ時々腹率ニ膨脹シ呼吸促迫ス尔後一二ノ通利ナ
リシテ漸ク消散スル者ハ其病ノ輕シクハ其病ノ重キ者ニ
第八腹ノ緊脹消スル時ニ按腹スルニ腸凹凸ノ状ニ腫起スル
ヲ覺ヘコレガ左方ヨリ右方ニ蟠屈シ或ハ右ヨリ左ヘ勾曲ス
殊ニ腹ノ両側ニアリハ其病ノ重キ者ニ至リ
第九腹ノ空氣數々大ニ響鳴スルヲアリ
第十直腸或ハ諸腸牽縮シ或ハコレニ息内腫瘍等ヲ生シテ閉
塞シ大便元ニ放屁モ通洩シ難キ症アリ此症モ亦鼓脹ノ一因
タリ

右ノ症候ニ依テ考レハ風氣腹腫ニアラスニハ腸ニ在リ又此
病ノ二屍ヲ剖觀スルニ皆腹腔ニ少シモ風氣ナク唯腸中ニ在
テ緊滿膨脹シ大ナル脚ノ如シ
予初メ其風氣腹腔ニアリトス故ニ疑テ思フニ腸腐壞ナクシ
テ其風氣何ヲ以テ腹腔ニアリヤト又奈何ヲ細鍼ヲ腹ニ刺ス
ニ寸効ナク風氣少モ疏散セサルヤト因テ開屍ノ緊滿膨滿也
ル腸ニ三稜鍼ヲ刺スニ風氣洩ルハナク唯泡沫様ノ粘液出
ルノミニテ其緊張少シモ減セズ又其腸ヲ全ク剖開スルニ粘
液ト風氣ト糞ト微細ニ混和シテ唯泡沫ヲ見スノミ故ニ此病
腹部ニ鍼法ヲ施シテ治セサルヲ和ルヘシ若鍼シテ其液腹腔
内ニ流泄セハ徒ニ死期ヲ促スノミ
鼓脹ヲ水腫ニ比スレハ危險ニシテ多クハ死ス

此病ハ毎日二度凡ソ八分時ノ間毛布ヲ温メ腹部ヲ摩擦シテ
第四十号軟膏ヲ塗ルヘシ

第四十号剖方

竜腦一

可巴旦杏油八

右印ニテ日夕研合ス若シ巴旦杏油ナキハ雞子黄ニ

代用スヘシ按胆入油杏仁油胡广油

雞子黄并ニ巴旦杏油ハ竜腦ヲ溶解シテ用ルハ良劑ト

ス凡ソ瘰癧ノ性アル疼痛ニ塗抹トシテ捷効アリ

右ノ四十号剖方逆ニ十滴或ハ其餘ニ用テ良効アリ

又肺元ニ服肋ノ假癩衝或ハ産后右ノ諸症アルニ竜腦

十二餅或ハ十五餅日リ六十餅ニテ夕四分時中ニ内服

第四十一号剖方

又數日ノ中第四十一号散劑ヲ毎夜用ユヘシ

茴香油滴四

乾淨白砂糖餅四十

大黄餅十五

右合為散劑

或云此病ハ廣キ繃帶ニテ腹部ヲ固縛スルハ甚夕必要

夕リ

又云此病腹部ニ芙蓉膏ヲ貼シテ良効アリ

又云此病ニ煙艸ノ灌腸法名ヲ良トス一婦人真ノ鼓脹

ヲ患ヒ煙艸ノ煙ヲ屢々腸中ニ薰入シテ少間ニ全愈セ

リト

又云冷水ヲ以テ腹部ヲ浸浴ス甚夕効アリ

腹中ノ風氣漸ク鳴動シ大便多少通利スルハ回復スヘシ

胸水

此病ハ胸腔ニ水溢泄シテ滯留スルナリ
 其症患者呼吸短促不利シ睡臥セントスレハ特ニ甚シ故ニ平
 臥スルヲ能ハス起居シ或ハ俯伏シテ坐ス或ハ乾咳ヲ発シ且
 ヲ初発ニ足跗腫起ス又其水胸左腔ニ蓄留スレハ患者必ス左
 胸ヲ下ニシ臥ス右腔ニアルハ右股ニ臥ス又増長ノ極ニ至レ
 ハ肋骨差擡張ス故ニ水アル方ノ偏肋ノ周圍殊ニ巨大ニナル
 ナリ
 胸膿病或ハ胸腔ニ血ノ溢泄シテ滯留スル症モ右ノ如キ證候
 アリ然レ屢々解剖シテ徴スルニ右ノ諸症アル者ハ大抵胸水
 病居多トス
 是脚ノ腫増長スレハ胸中輕快ナルヲ覺ユ又脚腫減スレハ胸

此症ハ吐浮一有ニ劇ク発シテ粉ク液汁ヲ吐浮スルナリコレ
胃中ニ滯積飲酒等ニテ四季共ニ不レ凡夏末秋初殊ニ多シ
夏月ノ果瓜ヲ過食シ湿汚腐敗ヲ飲ム等ヨリ発スルヲ多シ
此病烈キ者ハ吐実ノ人ト虫疝急ニ疲脱シ甚シキ者ハ一昼夜
ニ死ス

此症ハ吐浮一有ニ劇ク発シテ粉ク液汁ヲ吐浮スルナリコレ
胃中ニ滯積飲酒等ニテ四季共ニ不レ凡夏末秋初殊ニ多シ
夏月ノ果瓜ヲ過食シ湿汚腐敗ヲ飲ム等ヨリ発スルヲ多シ
此病烈キ者ハ吐実ノ人ト虫疝急ニ疲脱シ甚シキ者ハ一昼夜
ニ死ス

其症大渴煩燥脉数微小而シテ常度ヲ失ヒ搏度ソロハス顔色
萎衰シテ死人ノ如ク四肢厥冷總身冷汗ヲ発シ手足疼痛拘強
痘疔掣引ス此時ニ速ニ捷効ノ劑ニテ救治モサレハ忽チ搖擗
ヲ発シテ死ス

此病ニ吐下ノ劑ヲ禁ス輕劑トシテ損害アリ

此病ハ雞肉ノ稀キ羹汁ノ如キ羹ヲ連服スヘシ

鷓鴣汁可此

類速ニ得唯キ汗ハ美大麦煮汁ニ代テ用ユヘシ又石ノ類ニテ
灌腸法ヲ施スヘシ右ノ劑ニテ腸胃ノ酷毒ヲ灌洗滌除スル
カエヘナリ

右ノ美汁ノ類ニテ稠養スル一^一時半或ハ二時許シテ後第四
十三号劑ヲ八分時毎ニ一七ツト与ヘテ吐浮凡ニ休ス或ハ減
スルマテ用ユヘシ或ハ漸ク諸症減セハ一時半毎ニ一七ツト
与ヘ次第ニ連服セシメテ全劑ヲ尽スヘシ

第四十三号劑方

丹桂水八

大麦水四十

淨純阿片三

蝦石一

白罌粟舍利別四

右合

吐浮凡ニ全ク休メ凡尔后四日ノ中ハ朝夕ニ第四十三号劑ヲ

三七ツト与フヘシ

此病初発治療ヲ加ヘス時ヲ経ル中吐浮烈キニ依テ大ニ虚脱
シ既ニ手足拘急スルヲ覺ル者モ遲疑スルヲナク速ニ第四十
三号劑ヲ前法ノ如ク用ユヘシ又下劑アレバ衰弱セズ却テ吐

下利

此病ハ大便数々水泻シ烈キ腹痛ヲ兼ルナレコレニテ痢ト
 區別スヘシ
 大抵ハ害ナクシテ却テ益アリ又下利アレハ衰弱セ又却テ壯
 健ナルモ右ニ全シ
 然レハ疲弱スル者ハ損害アリ又下利過多ナル者初発ハ惡シカ
 ラサレハ四五日ヲ経テ止マサレハ体中ノ津液ヲ失脱スル工
 へニ害アリ
 腸中ノ裏面剥脱スレハ腹痛シテ裏急後重ス如此者ハ下利變
 シテ痢疾トナルナリ
 下利止スレテ某劑ヲ用ルニハ早朝ニ第四十四号散劑ヲ用ヒ
 夜ニ第九十四号劑ヲ用ヒ

二日ヲ経テ治セサルハ復タ右ノ二劑ヲ一度与フヘシ如此シ
テ尚全治セサルハ二日ヲ経テ又右ノ二劑ヲ一度用フヘシ
右ノ劑ヲ下痢止セテハ尔後四日ノ中毎夜第四十五号糕劑
ヲ与フヘシ

第四十四号劑方

大黃上好者 訶子半

右合為散劑

第四十五号劑方

帝野加

右為紙劑

古疾痢

此病ハ粘液ニ血ヲ帯ヒ或ハ血縷ヲ交ヘテ劇ク下利シ此ニ腹
痛絞急ヲ兼テ此症目ヲ経ル者殊ニ甚クシ
下利止スシテ終ニ痢トナル者アリ然レ夏秋ノ間ハ初発ヨリ
痢ヲ患ル者多シ
時候ハ炎暑勞役煩熱スル等ニテ喜テ涼ヲ取り胆液大ニ酷厉
腐敗スルニ因リ或ハ湿地ニ睡臥シ或ハ瀦水沍水
惡臭ノ水ヲ飲ミ或ハ差麻鱧セシ臭糞其他瓜菓ヲ貪食スル等
皆此病ヲ生ス
凡ソ此病ノ惡厉ナル者ハ傳染ノ氣甚ク鋭ボクシテ速ニ滋蔓
ス殊ニ汚穢惡臭ノ大便ヨリ痢毒ノ蒸氣薰升スル故ニ無病ノ
人モ其廁ニ行クハ傳染ス故ニ人衆多ク群居シテ廁同キ者

ハ患者ノ厨ヲ異ニシ或ハ便益ヲ設ケ或ハ別ニ深坑ヲ穿テ患
者コレニ大便セシメ毎次コレニ土ヲ覆フヘシ
患者多血ニシテ大熱アルハ速ニ尺沢ニ刺絡シテ六十四莖或
ハ八十莖許ニ浮血スヘシ然レ流行ノ痢ニシテ大熱ナキ有ハ
浮血シテ益ナシ
此痢ハ初発ニ吐劑ヲ与ヘ一度吐スル片ハ微温湯ニ蜜ヲ加ヘ
与フヘシ尔後吐ヲ催ス毎ニ數々飲劑ヲ与フヘシ
吐止テ一時ヲ过テ食ヲ与ヘ或ハ大麦水ニ砂糖ヲ適意ニ加ヘ
与フヘシ

第四十七号丸方

何片一
右為丸

其翌朝復々吐劑ヲ与テ前日ノ如クスヘシ
二日吐止テ痢減セカ九ハ第三日又一度吐劑ヲ与フヘシ
但シ二日ノ吐劑ニテ痢減セハ一兩日経テ吐劑ヲ夕一度用
テ吐スヘシ
吐法ニテ痲毒汚物清除セハ第四十九号糖劑ヲ一莖ツ、毎朝
毎午毎夜与フヘシ
第四十九号糖劑方

赤石脂六 桃膠一 底野加十二
白罌粟舍利別宜
右合
飲料ハ大麦煎汁百莖ニ乳汁五十莖ヲ加ヘ合テ日常与フヘシ
此痢甚ク悪性ナルニ依リ或ハ時日ヲ経ル久シキニ依テ患

者大虚脱スルハ駆泄除ノ劑ニ甚ニサレカ故ニコレヲ用
ユヘカラズ又竹瀝汁十錢合二日常子一合
腹痛烈シク重墜窘迫甚ク或ハ脉弱クシテ定準ナク或ハ顔色
黯澹一切食物ヲ惡ミ煩渴甚キ者ハ惡性トス
右ノ症ハ第五十号劑ヲ半時毎ニ八錢ツ、用ニ其夜第四十七
号劑ヲ一度用ユヘシ
第五十号劑方
好酒八錢 大麦查汁百五 丹桂水八
淨白砂糖六
右合二日 或云右ノ症ニ左ノ劑甚ニ稱譽セリ且補一合
真寶陳黃柏皮二 水百九 二十

右查テ六十四錢トシ時々一茶碗ヲ服ス大抵三碗ヲ服
シテ此症減除ス若シ治セサレハ亦碗一或ハ其餘五服ス
此劑苦味甚ク且ク衰弱ヲ強壯ニス故ニ既ニ吐下劑ヲ
用テ糞敗ノ痼毒ヲ驅除シテ後用シム特ニ重墜窘迫連
綿トメ休ス下利スル志ニ甚ニ稱譽セリ
患者精力漸ク増益シ惡症漸ク減セハ朝ニ第四十四号劑ヲ与
ヘ夜ハ第四十七号劑ヲ与フヘシ
其翌日モ亦前ノ如ク右ノ劑ヲ用ユヘシ然ルニ尚其症退カサ
ルハ復タ其劑ヲ前ノ如ク用ユヘシ
其後ハ第四十九号劑ヲ一日ニ三度一錢ツ、一兩日連服スヘ
或ハ通利スル汚物ヲ酷厉ナルニ依テ直腸爛痛刺傷シ此ニ由

テ重墜窘迫須臾モ休ス頻リニ圍テユケニ較著ニ通利ナキハ
左ノ方ヲ撰用スヘシ

亞麻油胡麻油ナ油ニテ可也ヲ灌腸法トシテ良効アリ

又方亞麻油ニ乳汁ト止痛液數滴ヲ加テ灌腸法トス

又方アラヒアゴム樹脂ノ各船舶未ニアリ通具ニ用ユ

右水ニ焯解シ乳汁ヲ適宜ニ加ヘ温メテ灌腸トス

此劑丹腹シテ亦良効アリ

アラヒアゴム或ハ如此緩和ノ効アル樹脂或ハ真鯨ヲ

水ト乳汁ニ焯化シ若クハ苦蕒沸湯浸ニ焯解シシバク

丹腹シテ腸大ニ疼痛致急スルニ大効アリ

凡ソ如此樹脂ハ日ク腸ノ汚物ヲ清除シ又又々滋養ノ

功アリ此疾ニ經驗甚々多シ

適宜驅除ノ劑ヲ用ヒ腸胃ノ汚物ヲ滌除シテ後尚劇ク腹痛シ

テ休サル者ハ雞卵ヲ軟ニ煮テ新鮮ノ牛乳汁ヲ加ヘ服スヘシ

コレニテ忽チ緩和シテ腹痛治ス

或云痢ノ腹痛頑固ニシテ退キ難キハ芫菁膏ヲ患处ニ

貼ス或ハ他ノ温煖ノ効アル膏菜ニ芫菁膏五分ノ一ヲ

加ヘ腹部ニ貼シテ大効アリ

或云右ノ症ニ苦蕒ノ沸湯浸ヲ丹腹セシメテ大効アリ

日ク疼痛ノ牽引拘急ヲ除キ強壯ニシ且ツ瘻壞ヲ防止

スルノ性効アリ

或云石灰水名ニ乳汁半分ヲ加テ丹腹ス久痢ニテ内藏

衰弱セルヲ扶助ス良効アリ

惡症トス其故ハ刺腹術ヲ施セ共膿ヲ腹腔ヨリ泄シ去ルヘ
シトイヘ凡既ニ之カ腹腔ニ溢世シ瀦留セル者ト未タ溢世セ
サル者トノ証候甚タ殊ニ難ケレハナリ又其膿一頓ニ敷ク腹
腔ニ他テ著ク腹脹スル者ハ尚其術ヲ行フヘシ然凡如此症ハ
罕ニメ唯多クハ漸ク日ヲ経テ瀦留スレハ早ク之ヲ診知シ難
ク又久ク日ヲ経テ終ニコレヲ知ニ至テハコレヲ泄シ除ケ凡
治セサルナリ
其膿自ラ腸中ニ泄テ大便ニ通利スルハ甚タ善徵トス故ニ既
ニ膿ヲ成スヲシラハ第五十二号灌腸法ヲシハク施スヘシ
此ニ由テ腸ヲ緩和シ膿ヲ引テ導泄スルナリ
右ノ如ク膿ノ通利シ或ハ大便ニ交テ通スルハ第十六号佛
湯浸ニ壺ヲ加ヘ可美ニシテ多服セシムヘシ又其間ニ第十八

号散劑ヲ毎日ニ度兼用スヘシ
姜汁ニ蒿苳菠稜菜菔胡蘿蔔嫩葉等ノ軟知ノ効アル蔬菜姜
ヲ加ヘ煮テ日常下飲ニ供スヘシコレニテ大便硬燥結滯スル
トナレ
右ノ如ク茶劑飲食凡ニ怠ラズ与ヘテ終ニ三日モ大便ニ膿ヲ
見ルトナクハ漸ク平常ノ飲食ニ復スヘシ

狂躁熱 即腦熱

即腦熱

據語狂躁スルヲ体スシテ皆齒熱ヲ発スル有之ヲ狂躁熱ト名

此病ハ譫妄ト異ナリ凡ソ開歇熱ノ発作大熱ニ就テ譫語スル
ヲ譫妄ト云フ其熱退ケハ譫妄モ休ムナリ

此病ノ前兆ハ大熱シテ頭痛甚クヘカラス面部眼目赤色ニ
ナリ患者ニ問フアレハ答ヘ差誤シ或ハ衣被ヲ摘テ轉動シ
脈強堅呼吸大ニシテ遲ナリ

或ハ綠色ノ汚物ヲ吐シ思慮シハク錯乱惑誤ニ暴戾忌憚ナク
痰唾ヲ吐キ或ハ顫振躁動シ或ハ小便清澄ニシテ水ノ如ク絶
ニト色ナシ或ハシハク抽掣牽引シ或ハ渴ヲ苦ムナク或ハ
矢氣昏暈スル如ク見ユ

此病甚々危篤ナリ或ハ多ク日ヲ経スシテ死スル者アリコレ
脳膜ノ真ノ嫩衝熱ナレハナリ或ハ腦モ其嫩衝ヲ被フル者アリ
リ特ニ危篤トス
此病曰ハ凡ソ炎暑ニ頭ヲ露ハシテ歩走シ炎熱ヲ冒シテ堅臥
シ或ハ久シク憂睡セサルヲアリ或ハ大ニ忿怒シ或ハ酒又ハ
其他精烈ノ飲液ヲ過用スル等ナリ
痔血通泄シ或ハ衄血逆出シ或ハ患者嫌惡忌避ノ思慮休ムハ
皆善徴トス
胸部或ハ下部支節ニ疼痛ヲ覺ルハ甚良ナリ或ハ劇ニ救ヲ
発スルモ良トス此ヨリ病患減スヘシ
此病ハ足ニ刺絡スルヲ最モ良トス然レ多ク浮血セサレハ効
ナシ如此シテ熱退カサルハ數度刺絡スヘシ

但シ刺絡ヲ初メ足ニ施シ後頸靜脈ニ施シ亦特ニ良驗アリ宜
ク其熱荒ニ謔語大ニ減スル迄數度刺絡スヘシ
或云此病自衄血ヲ発スレハ毎ニ請志緩解ス故ニ驚
管或ハ自余便利ヲ物ニ鼻中ヲ磨傷シ自然良能ノ勉
力ヲ扶ケテ衄血ヲ発スヘシ
或云此病ハ水蛭六七條ヲ頸顛ニ貼シ血ヲ吸ハシメテ
良効アリ
或云此病焔硝ニ竜腦ヲ加ヘ舂服セシメテ良効アリ蓋
シ竜腦ヲ夕熱ヲ清涼ニシ又此両品服量少許ツ、ニシ
テ數々用ユレハ胃中ニ受ケ易フシテ嫌ヒ惡マサル
或云此病ニ完菁膏ヲ頭上ト脚ニ貼シテ良効アリ
或云冷水ニ硝砂ト焔硝ヲ溶化シ綿布ニ浸シ頭髮ヲ利

り貼シテ良効アリ
不寐ヲ食セハ第五十四号劑ヲ半時毎ニ九八戈ヲ温版シコレ
ニ次テ第九五号劑ヲ多ク版ス
第五十四号劑方
梅膏七四
右沸湯ニ輝化シ漉過シテ三百戈ヲ取りコレニ洋燭硝
一戈蜜十六戈ヲ加フ
朝夕一度ツ、第十一号灌腸法ヲ施スヘシ

患者頭髮ヲ剃リ或ハ口中ヲ温湯ニテ數々嗽ク合シ
或云醋ヲ温湯ニ加ヘ手足ヲ浣洗ス
洗スレハ尚良トス凡ソ表氣ハ蒸氣ヲ發スルコトヨ
善キハナシ此病ハ体表ハ蒸氣ハ抑留スルヨリ生

又此ニ由テ此病ヲ增長セシムレハナリ

醋ト水ヲ等分ニ合シ綿布ヲ四襲ニシテ浸シ額ニ貼スヘシ
毎日兩度臥蓐ヲ出テ椅子ニ倚リ温湯ニテ脚ヲ浸スヘシ
良シ
毎夜右ノ脚湯ヲ施シテ后第五十五号引障糊劑ヲ貼止或ハ足
趾ニ貼シ翌朝去ルヘシ
居室ノ氣ハ清凉ナルヲ肝要トス故ニ屣障ヲ開テ鮮爽ノ瓜氣
ヲ納ルヘシ又患者ヲシハ起坐セシムヘシ
此病中ハ過食セシムルコト勿レ又淡薄ノ者大麦葦ノ粥以テ
良トス
痔腫起スルコトアラハ水蛭ヲ貼シテ血ヲ吸ハシムヘシ
右ノ諸方ヲ用テ熱大ニ減シ謔語休テ后尚熱睡スルコト得サ

ルハ第十七号乳劑ニ白嬰粟舍利別十二号ヲ加ヘ毎夜与フヘ
レ
痲症盛ニナル中ハ必ス催眠劑ヲ与フルヲ勿レ
凡ソ如此危険ナル痲ハ初発ニ怯懼スルヲナク多力優効ノ某
劑ヲ分量多ク用ヒ又勉強シテ堵法方ヲ施スヘシ
契寡ク謔培減スル者ハ刺絡元ニ灌腸法ニ緊要タラス但
二十五号飲劑ノ與フヘシ
痲未尚差モノハ謔語スルヲアレバ此兆少シモナク堵症退ク
者ハ差食ヲ益スヘシ又昼ハ床ヲ出テ起坐スヘシ

凡ソ契痲ニ衄血ヲ発スレハ毎ニ痲減シ或ハ全瘥スル者アリ
故ニコレヲ早ク止ムヘカラス
衄血過多ニシテ身体虚脱シ失気昏暈或ハ死セントスルホト
ナルハ速ニ救療スヘシ
脈甚タ弱ナラス常調ヲ失ハス四肢普ク温煖ニシテ平常ノ如
ク唇顔尚赤色アルハ失血過多ナリ凡危篤ヲ恐レナシ
脈細微顔唇黯澹色ニナルハ出血ヲ止ムヘシ其法臂脚及ヒ股
ニ縛帶ヲ施スヘシコレニテ静脈ヲ壓閉テ心藏内運輸具血ヲ
減スルナリ尔後其血止片ハ久シク紫紫スルヲナク大底八分
時ヲ経ル片ハ縛帶ヲ去ルヘシ
右ノ法ニテ血止サル者或ハ縛帶ヲ去テ後再発スルハ綿撒絲

ニテ栓ヲ造リコレニ第五十六号收瀝水ヲ浸シ鼻孔ニ刺スハ
シ或ハ綿撒糸ニテ羽翹ヲ密ニ巻纏シコレニ右ノ收瀝水ヲ浸
シ鼻孔ニ刺スコレヲ始メハ直ニ刺テ凡ソ喉ヲ去ルノ半拇指
横徑ホトクテ徐々ニ送り入レ終ニ羽翹ノ端ヲ稍拳テ鼻底ヲ
毀傷セサルヤウニ浸シ鼻底ニ届ラシメ然シテ手ヲ鼻竅ニ撐
定テ其羽翹ヲ抜去レハ其綿撒糸ノ鼻孔ニ残ルナリコレヲ
一兩日モ去ラスシテ自ラ脱落スル下テ置ヘシ此法ヲ最モ良
トス

第五十六号削方

白胆礬一 水八

標樹耳ノ馬蹄状ナル者止血ノ良効アリ故ニ第五十七号散削

ヲ羽管ニテ鼻中ニ吹クヘシ

第五十七号削方

標樹耳

右適宜細末トス

又方峻烈ナル火酒ヲ水鏡ニテ一度或ハ二度モ鼻孔ニ注入ス
劇盛ニシテ頑痼ナル衄血ニ最モ効アリ若コレニテ忽チ止サ
ルハ長クフトキ柔ナル絲栓ヲ造リコレヲ火酒ニ浸シ鼻孔ニ
深クサスヘシ即効アリ

右ノ削大ナル鼻痔ヲ技出シテ失血スルニ絶テ良効アリ

又方落葉松茸ヲ長ク四ク巨ク削リテ鼻中ニ刺テ良効アリ之
ヲ末トシ鼻中ニ吹モ亦良

又方精緻ノ水綿ヲ水ニ湿シ線ニテ卷纏シヨク乾シテ前法ノ
如ク用エ毎ニ良効アリ

動脈ヲ創傷シテ出血スルニ精緻ノ水綿ヲ患处ニ貼シ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ

其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ

其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ
其部ノ全肢ニ縛帯ヲ施シテ良効アリ

此熱病ノ初発ヨリ究竟ニテ須臾モ間断ナク発熱シ諸ノ間歇

熱ノ発止往來アルコト如クナラズ故ニ稽留熱ト名クテ

病日ノ身体労働疲倦或ハ炎暑熱候ニ勞役過甚ク或ハ大渴ヲ

忌ル或ハ峻烈ノ嗜飲ヲ過服スル等因テ血中ノ清稀ノ潤液

消耗シ其血イリコト稠厚ニシテ酷厉ニナリ此日ハ險重ノ諸症

ヲ発シ荒ニ燄衝熱ヲ兼発スコレ血ノ性以前ヨリ既ニ甚ク燄

衝ニ傾クカ故ナリ
右ノ熱病モシ身体各部ニ燄衝ヲ發スルハ其部ニ從テ各ヲ異
ニテ所謂ル肋膜肺腦咽喉腸等ノ燄衝熱是ナリコレ皆其燄衝
一處ニ懸留シテ變移セズ其熱モ稽留シテ始終間歇ナシ
前説ノ病日ヨリ右ノ如キ熱病ヲ発シテ各部ニ懸留セシ燄衝

ナキ者是ヲ特警旨契ト名ク大抵其病因ト患者其壯年強実契
性多血ナルトニ依テ此契病タルヲ知ルナリ同契ナリ
其症脈數ニシテ強其契劇盛ニシテ肌膚燥カ如ク小便赤色
シテ稠濁舌燥煩渴引飲甚忍フヘカラズ劇キ頭痛ヲ苦ニ呼吸
短促ス

此病必ス危險トス諸症劇盛ナルホト病モ漸ク完惡ナリ
此症ニ最モ緊要ニシテ瀕クヘカラザル者ハ刺絡ナリ初發速
ニ刺絡ヲ施シテ大契減シ舌漸ク滋潤ヲ生スルマテ數度浮血
スヘシ

大麦煮汁九十六匙ニ弟一ノ醋蜜劑八匙ヲ加ヘ日常ノ飲料
トシテ用フヘシ
第五十四号飲劑ヲ一時毎ニ一茶碗与ヘ又弟十一号灌腸法ヲ

毎日兩度施スヘシ

諸々欬衝ヲ兼ル病ハ妄リニ下劑刺絡ヲシハク施シテ
患者ヲ虚脱セシムルヲ勿シ唯其精力ヲ保護シテ病毒
ヲ離方排泄スル自然良能ヲ順机ヲ成シテ之ニシムヘシ
故ニ此症ハ灌腸法ヲ最良トスコレニテ存藏ヲ清涼爽
活スルヲ力ヲ及ラス病毒ヲ下部ニ誘導驅シテ患者ヲ虚
損スルヲナシ然レ如此病ニハコレヲ過用スルヲ勿シ
灌腸法ハ乳汁ヲ清ヲ單用シ或ハ水ニ蜜少許ト燻硝ヲ
加ヘテ施スヲ良トス
右ノ方法ヲ施シテ熱減シ脈差緩和シ渴減シ口舌潤ヲ生シ小
便赤色減シテ滓塗アルハ病治スルヲ善徵ナリ如此善徵アル
下劑強シテ用フヘシ

病漸ク減セハ唯第二十五号煎劑ノ用テ足レリトス
食料ノ病治スルニ從テ漸次ニ増シテハ
凡ソ食飲起居ノ法ハ肺膜嫩衝ト全ク
凡ソ督苗熱ニ嫩衝ヲ兼ル者ハ病ノ暫留スル
ハ九日或ハ十四日或ハ二十一日或ハ
リ故ニ右ノ日限ヲ断病日ト云フ此日ハ自然ニ
離断排泄ノ候ヲ見カヌナリ此故ニ其前日
其病劇盛ニシテ患苦更ニ甚シ故ニ此日ハ劇盛日ト云
フ又四日六日十一日十七日ヲ測驗日ト云フ此日ハ大
小便汗等著キ變動先ニ通泄アルニ依テ変化ヲ測ルナ
リ
且此危險ノ熱病ハ右ノ日數ノ候ニテ審ニ鑿察スルナ
リ

肝要ナリ

然レ腐敗熱ノ如キハ右ノ日數ノ候確定ニ在リ
督苗熱ノ一種腐敗熱ト云フ者アリ其血稠厚ナラズ嫩衝ニ傾
カス却テ腐敗ニ傾テ血液甚ク溶解散逸シテ稀薄ナリ
嫩衝熱ニ以スレハ危篤險惡ニシテ又日久傳染ス
病因ハ夏月暑熱ノ時湿地ニ坐臥シ其汚穢腐敗ノ氣ヲ受テ或
ハ兇多ノ人卑狹隘ノ居ニ群集シ室中ノ氣新陳更謝スルニ足
テス常ニ腐敗シテ其氣ニ感スル者ハ此病ヲ全ク故ニ人卑群
居セル所ニ此病多シ殊ニ病院或ハ牢獄ニ多シ故ニ此熱病
或ハ病院熱或ハ牢獄熱ト名ク
凡ソ腐壞ヲ生スルニ温熱濕氣腐敗ノ氣ヨリ甚キハナ
シ故ニ其氣ヲ受レハ當ニ血液ノ凝結ス凝結ノ諸毒

亡共ニ腐壞シ真ノ腐敗熱ヲ生スルナリ
狹隘ナル病院ニ許多ノ患者花ニ被創ノ患者群居雜告
シ空中ノ氣情鮮新更セズ爵敗スルハ最ニ害アリ其故
ハ患者表氣ノ蒸氣ニ便ノ臭氣花ニ此氣ヲ患者一同
ニ須臾モ休ス氣息日リ吸入スル故ニ速ニ傳染シテ皆
惡厲ナル真ノ腐敗熱ヲ生シ此熱病ニ可ク滋蔓スルナ
リ牢獄中モ之ニ準シテ知ル余シ
或云此病日ク傳染ス故ニ病院ニハ勉メテ救療スレモ
回復スル者日リハ傳染スル者却テ多シ
無病ノ人ハ如此患者ヲ日夜親ク看護スルヲ勿レモモ
亦之ニ意ヲ用工ヘシ動モスレハ如此惡厲腐壞ノ熱中
ニテ多ク見ルニモト壯實強勇ナル男子重創ヲ被ル者

或ハ支節脱落シテ半ハ治スル者或ハコレヲ全愈セル
者モ如此血ノ溶解換崩セル性ノ腐敗熱ニ傳染スル
ニ其創口或ハ脱落セル支節ノ端日リ其腐壞焯解セル
血力縛帶ヲ滲透シテ漏出シテ多ク死ス然レモ消熱及
ヲ丹版シテレメニテイニ精ヲ外用シテ非常ノ奇効ヲ
得ルヲ甚タ多シ是ヲ以テ此熱病ハ血液腐敗焯解シテ
稀薄換崩スル性タルヲ察知スヘシ
初発惡寒戰慄シ次テ發熱シ忽チ復タ惡寒シ終ニ發熱ニ歸ス
如此寒熱互ニ発シテ食ヲ欲セズ睡中易カラス
額鉗痛シ頭中困重ニシテ沈痛ニ堪ヘス
脈幾ニト平全ノ如シ
皮膚乾燥セズ多クハ平常ノ如ク潤アリ

患者数日如此ニシテ臥床ニ就カス然レ倦惰之弱ナルヲ覺ヘ
日常ノ作業ニ懶シ
舌柔和滋潤シテ黄緑ノ苔ヲ帶フ
患者朦然トシテ樂マズ眩リ難ク凶厄ヲ懷テ神意ヲ痛傷スル
状ノ如シ
病増劇スレハ手振惕シ可聴ヘ難ク声音之弱ニシテ連続セス
脈沈ニシテ絶スルカ如シ故ニ患者健運強壯ナラシムル劑ヲ
服シテ補益センコトヲ冀フ
夜ハ諸症増劇ス
或ハ終ニ惡性ナル斑ヲ発シ其形整列ナラス又其發スルコト時
日ノ定期ナク人毎ニ遲速アリ
此症ノ発斑ハ必ス皮上ニ隆起セス故ニ他病ノ発斑ト

區別スヘシ又其斑小ナレバ其状一様ナラス或ハ差分
界アレバ皮膚大抵赤色ニ見ヘテ泛然トシテ限界ナキ
者アリ然レ精ク鑿察スレハ其間隔必ス見ユヘシ或ハ
顯著ナラスシテ綿密ニ鑿察セサレバ見ヘサル者ナリ
此斑胸背ニ多クシテ手足ニ少シ又面部ニ発見セス其
斑多クハ黯褐色ナリ
右ノ如ク斑ヲ発スレバ是病毒表分ニ排出スル善徴ノ
斑ニ非ス
此斑発病ヨリ四五日ニシテ発スルアリ然レ大抵十四
日此ニ始テ発ス或ハ死後ニ発スルアリ如是ハ其屍惡
臭極テ甚シ
惡汚腐敗熱ニテ死スル屍ヲ解剖シテ病毒ノ所在ヲ檢

索スルニ或ハ大脳小脳凡ニ一二彰著ノ潰瘍アリコノ
患者死スル少し以前ニテ正ク知覚アリ
又一人剖観スルニ肝ト腸ニ嫩衝アリテ寒壞疽様ナリ
コレ皆腐敗熱病ノ證タルヲ其病候ヲ以テ領會スヘ
患者ノ精力速ニ脱去シ視力減乏シ喜テ仰臥シ膝ヲ高擧シ或
ハシハク起坐セント欲シ或ハ黒色ナル舌瘡ヲ発シ或ハ身体
彼此ニ疫疹様ノ黒斑凡ニ青黒ノ條紋ヲ発ス或ハ此時ニ於テ
鉛色若クハ黒色ノ大便ヲ浮下シイヨク虚脱スル者アリ如此
ハ不治ノ候トス
此病発クノ腐敗ノ汚物ヲ吐シ或ハ浮下シ其色赭黒ニ
シテ血色アル者西印度荒ニ屈刺加^カ何^カ地ニテ黃病或ハ

能得及緑病ト名ク或ハ格^カ格^カ刺^カ度^カ食物^カ病ト名ク政羅巴人此地
至^カ至^カ至^カ多クハ此病ニテ死スル者甚ク多ク
秋月雨湿多キ時ニ必ス此病流行ス然レ冬月諳又利亞
名^カニテ此病流行シ免多ク患者瘵院ニ群居皆臥シ起^カ
相壁テ肩胛腰臂股脛足腫皆死肌寒壞焦トナル者多ク
コレ極メテ惡厉ナル腐敗熱ニシテ元運生氣以衰脱セ
此病ニテ頭候タリ此国ニテハ此病ニ皆臂ト脚ニ芫菁膏ヲ大
ニシテ貼ク貼シテ発泡スコレヲ見ルニ其部甚ク膿潰
シテ久ク瘡カタキ者アリコレ其病ノ尤惡性ナルヲ知
唯此病ハ早ク消熱皮ヲ法ヲ如ク用ルヲ最良トスル
此病聾ヲナス者ハ必スシテ皆惡徵トセス病治シテ後尚聾ス

ルハ耳孔ニ潰瘍ヲ生スル者ナリ
大便ニ膽液質多クシテ小便稠ク舌潤モハ善徴トス大便通
シテ患者精力甚ク減ヒサルハ殊ニ良
赤斑或ハ白斑多ク發シテ隆起スルハ善徴トス此ニ就テ微行
ヲ発シ耳腺ニ小膿瘍ヲ生シ或ハ頸ニ白色ノ細泡ヲ生スルモ
皆佳兆トス
前説ノ病因並ニ諸病ニ批テ考徴スレハ患者全身ノ血腐敗シ
又精力虚脱スルヲ知ルヘキノ故ニ甚ク多血ニシテ必ズ刺
絡スヘキ症ニアラサレハ刺絡スルヲ勿レ此病ニ刺絡ヲ過シ
テ忽チ精力缺脱シ精神錯乱ヒシ者シハハ登觀セリ
居室ヲ淨掃シ牖戸ヲ洞シ敷々新氣ヲ納レ厨陳ヲ放除シテ
清鮮爽涼ヲ輸ステ此病ニ關クヘカヲナル一大緊要トス

患者シハハ吐氣アリ心窩鳩尾ニ當テ痞悶困重ヲ覺ヘ舌黃
綠ノ苔アルハ吐劑ヲ与ヘ從テ吐ヲ発セハ速ニ微溫湯ヲ多ク
与ヘコレニテシハハ吐ヒシメテ終ニ自テ吐ヲ発スルヲナキ
マテ与ヘ間歇熱ノ条ニ云如クスヘシ
此病初発皆腐敗ノ汚毒胃先ニ腸ニ滯蓄シソレヨリ血
中先ニ神經ニ運輸泛流シテ諸惡性ヲ発ス故ニ此病ヲ
一ニ腸胃熱毒ト名ク是ヲ以テ初発ハ眩懼スルヲナシ
速ニ吐劑ヲ与フヘシ但シ分量少クシテ數々用ヰルヲ
良トス
右ノ如ク吐劑ヲ用テ痲毒ヲ驅除シ痲性ヲ變化シテ此
ノ如キ最險危惡ノ病ヲ免ル然ルニ庸医動モスレハ初
発ニ発汗劑ヲ与テ此ノ如キ惡后ナル痲毒ヲ腸胃ヨリ

体表へ馳逐発越スルハ其毒速ニ血液中ニ汎流シテ
 脳膜嫩衝或ハ肺嫩衝ヲ生シテ遂ニ救ハレサルニ至ル
 吐劑ヲ与ヘテ適宜ニ吐スル夜ハ第五十八号糕劑ヲ与ヘコレ
 ニ次テ第五十九号乳劑四十八錢ヲ用ユヘシ若シ此乳劑得ヘ
 カラサルハ第八十九号煎劑九十六錢ニ酒九十六錢ト第三十
 一号蜜醋劑四錢ヲ加テテ代用スヘシ如此熱病野右人如キ清
 爽ナル飲劑ハ患者ノ意ニ適シテ口服ニ爽快ヲ覺ルテ此病ニ
 甚タ効アリハ味ヲ甘ク調ヘテ飲マシムルニ最モ宜シ
 第五十八号糕劑方
 底野加^一 鹿角塩^十
 右合^一 或云此劑ノ底野加一錢半ヲ良トス因ニ汗スルカ爲

ナリ或ハ左ノ二方亦発汗劑トス汗ソ嫩衝ヲ兼ル病口
 適當トス少至熱ヲ起スルナクシテ表熱ノ盛氣ヲ発ス
 レハナリ^一 水^{適宜}
 発汗精^一 右合^一 爲飲劑
 又方^一 鹿角塩^二 醋^{十二}
 右合^一 爲飲劑
 右二方^一 右二方^一 右二方^一 右二方^一 右二方^一
 与フヘシ^一 帝田
 第五十九号乳劑方

新鮮耳乳汁二百錢 白酒二百錢

右合シ煮ル一瞬時ナル中ハ稠固ニシテ酥ノ如キ有
ヲ生スコレヲ抄ヒ去リテ其稀薄ナル者ヲ用ユ

吐方ヲ以テ腸胃ヲ清除セハ第六十号消熱皮散ヲ三時毎ニ一
版ヲ与ヘ每次第五十九号劑四十八錢或ハ第七十五号劑ニ酒

少許加テ与フヘシ

第六十号劑方

消熱皮末半

右合為一版

解毒根末一分

竜腦四

此散劑味苦辛ニシテ用ルニ堪ヘス故ニ砂糖或ハ蜜ヲ
加ヘ或ハ適宜ノ舍利別ヲ加ヘテ糕劑トシ用ユヘシ或
ハ酒少許加ヘテ良ナリ惡性瘰癧敗瘻ニ良効アリ

或云此熱瘰癧疔ナルヲ以テ瘰癧ノ中或ハ瘰癧ノ前
後或ハ瘰癧ノ初起ニテモ速ニ消熱皮ヲ用ユ此ヲ法
ノ如ク用テ屢々奇驗ヲ得タリ

或云此熱瘰癧ニ消熱皮ヲ用テ効ヲ得ル一四十余人ナリ

或云往歲惡性熱ニ瘰癧ヲ兼ル者數人皆斃ル然ルニ消

熱皮ノ散劑ヲ毎日ニ三錢用ル者ハ患者瘰癧日漸減セ

テ速ニ治スル者六人ニ至ル

或云此瘰癧ニハ壞毒焦ノ性アルヲ以テ消熱皮ヲ用レハ

瘰癧止シ又瘰癧ノ内攻スルヲ防止スルノ奇効ノ良劑トス

或云此瘰癧瘰癧隱伏内攻スルハ速ニ消熱皮ヲ与テ適宜

ノ酒ヲ服セシムレハ速ニ発出ス。患者精力脱去シ悪性ノ斑疹ニ発疹漸ク隱伏得攻ス。煩悶搖擲ヲ発シテ死ス如此症ハ第六十一号劑ヲ半時毎に一匙ヲ与ヘ每次第五十九号劑ニ酒ヲ加テ与ヘ或ハ第九号劑ニ酒ヲ加ヘ代用スヘシコレヲ長ク用テ遂ニ隱伏ノ斑疹夕發シ疹自ラ拳起スルテ急ル日勿ク發疹後右ノ劑ヲ二時毎一匙ヲ与テ奇効アリ

第六十一号劑方

竜腦一 右峻烈ナル火酒二十滴ヲ加ヘ硝子白ニテ研磨シ之ニ乾淨砂糖十六匙ヲ加ヘテ混和シ又コレニ峻醋八十匙ヲ和シ攪合シ淨硝子ニ納メ固封シ貯フ

或云此劑発汗ニ奇効アリ凡ソ竜腦ハ香烈ナルエニ嫌惡ム者多シ然レ醋ニ調和シ用レハ大ニ服シ易シトスコノ両品併ニ用レハ發疹惡性ノ疹攻隱伏スルヲ日ク驅発ス。或云竜腦ニ硝子ヲ加ヘ用テ良ト然レ此劑日ク血液ヲ稀解スル故ニ他ノ發疹ニハ良効アリ凡ソ瘡敗熱ニハ却テ損害アリ。右ノ劑ヲ用テ通身微汗ヲ発スルハ甚タ善候トス。痲中大便秘スルハ第五十二号灌腸法ヲ施スヘシ。此痲回復セハ痲室ヲ他ニ移轉シ新鮮氣ヲ迎フヘシ否レハ前症復タ發シ易ケレハナリ。或云此發疹ハ水棉ヲ冷水ニ浸シ之ニテ數々全身ヲ浸

レ終ニ青色或ハ黒色ノ斑点ヲ発ス
病危篤ニ至レハ皆忘日夜ニ増劇ニ異常ノ熱ヲ発シ全身腐壞
シ或ハ吐血下血衄血等ノ死ニ頻チ失血ヲシハク発シ丹藏損
壞シ昏冒シテ卒ニ死ス
原因ハ冬月或寒国異地ニ客行シ卑湿汚泥ノ地ニ住シ不正ノ
悪氣ヲ被リ身体ヲ拳動セズ或ハ食物廉悪ニ食料ニ新鮮ノ
蔬菜ヲ用ヒス或ハ汚敗ノ水ヲ飲ミ或ハ炎炮塩藏ノ魚肉ヲ多
食スル等ナリ
大ニ憂愁鬱悶シ或ハ恐怖スル等多ク此病ヲ発ス既ニ此病ア
ル者ハ此ニ由テ増劇ス
此病ヲ研究スルニ其血必ス稠厚ニシテ酷厲ナリ此酷厲毒ニ
由テ血液腐敗スルナリ

此病ノ主因ハ初メ血稠厚粘凝シ後ニ稀渾溶解シテ腐
敗ス然レハコノ血ノ腐壞溶解ハ稠粘ヲ血ヨリ生スル
所ニシテ此病ニ先許階級區別ヲ為セ凡腎稠粘ノ血ヨ
リ生セサルナシ或ハ此原因ヲ灰汁塩毒ト酸敗トノ
ニツニ分ツノ説アレ凡コレヲ取ラズ前挽ノ如ク定ム
ヘシ故ニ訂シテ云ヘハ此原因ハ腐壞セシタルノ酷厲
毒ナリ
是故ニ治法ハ勉テ血液ノ稠厚ヲ稀解シ或ハ其血既ニ腐壞ス
ル者ハコレヲ專ラ挽回スヘシ
前ニ云諸々原因トナル諸件ヲ禁止スルヲ一療法トス假令尽
ク禁スヘケラス凡ナリタケ禁スヘシ
右ノ原因ヲ禁スルニ就テ飲料ノ水ヲ扱フ一極テ緊要ナリ必

汚水ヲ飲シムルノ勿レ若シ異地ニ在テ善水ナキハ其汚水
ヲ性良ニ為スヘシ其方水ニ升五合許ニ醋火酒各十六戈ヲ和
スヘシ
醋花ニ火酒ヲ好々サル者ハ水ニ泥菖根一塊ヲ浸シ与フヘシ
此草ハ得易ク又湿地ニ多シ又如此湿地ニハ瘰癧瘰癧ニ多ク流
行スルナリ
此病ニ烈キ吐劑下劑花ニ刺絡ハ効大ニ然レ此病兼悪ノ飲食
ニ因テ多ク発スル故ニ腸胃ニ積スル汚物ヲ驅除スルニ輕
キ下劑ヲシハク与ルヲ良トス此ハ茅朮四号丸劑ヲ朝ニ用ヒ
又一日ヲ経テ再ヒ用ユヘシ

食料ハ酸模菠薐菜蒿苳菘類赤菘蘿蔔等ヲ煮テ与フヘ
シ

性良ニシテ日ク熟セル菓類ヲ許シ与フヘシ然レ二頓
ニ過食スルノ勿レ
如此蔬菜得カタクハ大麦或ハ茶ノ煮汁ヲ与フヘシ
此病ヲ預メ防キ又既ニ患者ヲ治スルニ左ノ方屢々經
驗セリ
麦芽ハ莖此ニ温湯三百八十四戈ヲ注テ浸出スルノ二
時計ニシテ濾過シ用ユ初メニ少許用ヒ其後漸ク多板
ス此ニテ大便大ニ浮下スモシ下利烈キ者ハ健胃浸
數滴ヲ加ヘ与フ或ハ夜中止痛液十五滴或ハ二十滴ヲ
与フヘシ
右ノ麦芽ノ浸劑ニ乾蒲桃ヲ加テ尤良膏効アルノ
ナラス美味ニシテ鮮蔬ノ類ヲ与ルト全シ

此病瘡ルノ候ナリ此ニ於テ身体ヲ適宜ニ挙動シ良食ヲ用ル
中ハ果シテ回復スヘシ

此病漸ク快復スレバ病毒僅ニ遺ツテ全ク去リ唯キハ第六十
四号劑ヲ每服四十滴ツ、朝ト日中ト夜ニ酒水等分ノ飲液ニ
テ服シテ甚ク効アリ

第六十四号劑方

薺菜精十六錢

右合

樟功浸八錢

右合

此病治スト並ニ動カスレハ餘毒淹留シテ斷唇頰裏上顎裏ニ
小ナル膿瘍ヲ生シ速ニ滋漫シテ諸部ニ浸蝕シ少間ノ中ニ其
壞焦トナル者アリ如此小瘡ハシハ一經歴習熟スルニ非レハ
診察ヲ誤ルコトアリ凡ソ初発セテ見ルニ白色或ハ黄色ノ斑ヲ

費シ周圍焮赤シテ疼甚シク大ニ惡臭ヲ発シ又惡臭ノ唾涎數
ク流出シテ止ス此ノ如キハ速ニ治療セサレハ熱壞焦瘰ニ腐
壞シテ速ニ諸部ヲ侵蝕シ歯牙脱落シ顎骨損壞スルニ至ル
此症或ハ患處ヲ頻リニ摩擦スル法アレバ此ニ由テ痛ヲ増シ
險重ニナルナリ

右ノ症ハ綿撒絲ニ第六十五号液劑ヲ蘸シ毎日頻リニ患部ヲ
浸シ又訶ト頰トノ間ニ夾ミシハ一換更テ施スヘシ

既ニ甚ク腐壞シ潰爛速ニ滋蔓スル者ハ右劑中ノ海鹽精ヲ漸
次ニ増加シテ全治スルニテ用エヘシ

第六十五号劑方

海鹽精一錢

右合

薔薇蜜十二錢

右合

水四十

シニ蛇根竜胆橙皮或ハ赤月桂樹皮ヲ如ハ腸胃ヲ強健ニスヘ
シ

此病ハ梅毒アル人ト交接シ傳染スル者非既ニ傳染スルハ蛇
多ク患症ヲ免スルト膝ヲ敷スルハラズハ毒ハ内ニ積ルハ情
或ハ梅毒アル人ト口津毒吸シ同衾臥眠シ飲膳同器
用スルハシテ蛇啗相交ルヨリ傳染スト云ヘルハ皆妄説ナリ然
本症非ト如此更件推シ患者ニ告テ交接ヲ戒メ梅毒ヲ避ケシ
ルルヲアリ

癩毒

此病ハ梅毒アル人ト交接シ傳染スル者非既ニ傳染スルハ蛇
多ク患症ヲ免スルト膝ヲ敷スルハラズハ毒ハ内ニ積ルハ情
或ハ梅毒アル人ト口津毒吸シ同衾臥眠シ飲膳同器
用スルハシテ蛇啗相交ルヨリ傳染スト云ヘルハ皆妄説ナリ然
本症非ト如此更件推シ患者ニ告テ交接ヲ戒メ梅毒ヲ避ケシ
ルルヲアリ

此病其所在ニ就テ名ヲ異ニス龜頭龜頭皮ヲ潰瘍ヲ下疳ト名

リ用ニ
表危ノ莖気ヲヨク発セシムルハ此劑ニ竜腦六辨ヲ
加フ其味无ニ色ヲ変スルニハ白罌粟舍利別ハ芟ヲ加
第六十七号劑方
白蜀葵根十六
右水適宜煮ルノ半時ニシテ月中ハ芟ヲ加ヘ濾過シ四
百芟ヲ取り用ユ
右ノ劑ヲ用テ下利ヲ発スルノアリ然レコレハ等ニシテ多ク
ハ小便ト行ニ由テ功蹟ヲ成スナリ
此劑ヲ用テ患者ニ全ク損害ヲナスノナレ故ニ心ヲ安シ意ヲ
一ニシテ堵惡症尽ク消除スルニテ長服スヘシ

右ノ第六十六号劑ハ斯佛天人梅毒ヲ治スル經驗切実
ノ奇方ニシテ始メ歐羅巴ノ親キ外科ニ傳ヘ此日ノ堵
邦ニ傳播シテ各声ヲ得タリ且ハ一蓋ニ知ル
往年險惡ナル梅毒ヲ患ル者百ニ八ニ皆瘡院ニ入り悉
ク此劑ヲ用テ吐涎ナクシテ治セシ就中以前ニ吐涎法
ヲ二度用テ効ナキ者此劑ニテ全治スル者多シ
或云此劑少キ怯懼也又長服ニテ多ク梅毒ノ瘡症ヲ治
スルニ甚ク称賛ス人名
或云千七百五十七年瘡院或ハ都下ニアル數百ノ梅毒
ノ患者此劑ニテ皆良驗ヲ得險重ノ瘡症ヲ治スルノ勝
テ數ヘカタシ必ス信證スヘシト
或又云ク堵又利亞名目ニ於テ此劑ヲ最良トシ卑多ノ

大試驗ヲ以テ必効アルヲ論定セリ
又云千七百五十八年ニ絶多人患者ヲ左ノ劑ニテ尽ク
治スルノアリコレ右ノ劑ト全シ其方
剛永丹一錢 火酒一貫七
右調勻シ用テ此劑毎朝毎夜一匙或ハ二匙ヲ与ルノ
モナラズ或ハ其症ニ從テ其餘ニ終日時々与ヘ又四日
毎ニ下劑ヲ与フ此劑ヲ絶多人患人ニ用テ試ルニ輕キ
吐涎ハ免スル有二人アリ其翌年右ノ劑ニテ治スル患
者ヲ審テ診察スルニ皆健康ニシテ少モ余症ナク再発
セズ喜色アリト
或云右ノ劑多年經驗スルニ切實無疑ノ良効アリ以テ
医局ニ著セテ世ニ公行セリ

此劑ハ近世新製ノ方ナリト思フ徒多シ然レモ必ズ
新方ニ非ズ古昔ノ丹料如此劑ヲ用ル者多シ其方或ハ
剛永丹ヲ水ニ和シコレヲ適宜ノ煎劑一盞ニ和シ用テ
其法初日ハ一滴第二日ハ二滴トシテ毎日一滴ツレ益
テ右ノ劑ニ加ヘ終ニ三十滴ニ至ルソレヨリ毎日一滴
ツレ減シテ一滴ニ至ルニ至ルニ至ルニ至ルニ至ルニ至ル
或ハ適宜ノ煎劑ニ剛永丹一二碎ヲ加テ丹服セズ又梅
毒ハ腫瘍潰瘍花ニ其諸症ヲ治スルニ切實無疑ノ良効ナ
蒲蘭加兒都各千六百八十四年ニ著ス梅毒ニ昏ニ云ル
左ノ劑屢々奇効アリ少モ危懼ナク多ク用テ日久梅毒
ヲ治セリ其方
剛永丹一錢 水百六

右調勻ス隔日ニ一匙ヲ与フ大氏如此ニシテ七匙ヲ用
レハ痲治スル者多シト云尔後千七百二年ニ著ス外科
昏ニ云ク若シ右ノ劑峻烈ナリト思ハ、コレニ水ヲ多
ク加フヘシ此劑ヲ用ルニ就テ適宜ノ輕キ劑或ハ沸
湯浸シ寸乳汁ヲ加ヘ一盃ヲ兼服シテ尤良
或云向私地重結モス私羌コ莫私格未亞共國各ニテハ梅疾ヲ
治スルニ剛永丹ヲ糊ニ和シテ用ル或ハ大麦粗碎ノ煎
汁ニテ用ユ母見列見ハ三十四
或云剛永丹ハ極テ日久痲毒ヲ變化シ莖氣ヲ發スル劑
ナリ或ハ剛永丹一二碎ヲ接骨木糖十六匙或ハ二十四
匙ニ和シ分テ二十服トシ一服ヲト与ス凡ソ經久ノ痲
痲ニ効アリ羌ニ諸々酷烈ナル菓ヲ緩和シ莖氣ニ發散

悉者製セシム又云剛永丹一錠ヲ水ハ匙ニ焯和シ少許ノ莖菓
調製舎利別ニ右水液一匙ヲ加テ緩和シコレヲ一日ニ三度
服シ不消ニ属スル痲々痲疾ニ奇効アリ蒲見法歌
以上ノ諸説ニ因テ考徴スレハ剛永丹ハ凡ソ身体ノ流
動セル血液ノモナラス筋膜皮肉諸骨等ノ凝体ニ普達
ラサルニテ功蹟ヲ致シ固結ノ痲毒ヲ變化シ尤モヨク表氣ノ
莖氣ヲ透発ス又濕氣多ク卑低ノ地方ニハ表氣ノ莖氣
阻遏スルヲ以テ剛永丹ヲ用レハ汗小便涎唾ヲ進輸シ
行旅或ハ稍大便ニ通利スルニ効アリ
又試用スルニ體質脆弱ニシテ觸動シ易ク未夕吐涎奇
ヲ用ヒサル患者ニコノ第六十六号劑ヲ与テ遠ニ惡臭
ノ涎ヲ吐スル者アリ又以前久ク吐涎有テ用ヒ或ハ水

銀劑ノ塗某ヲシハク抱シテ吐涎スル者ニ此劑ヲ多ク
長服シテ少モ吐涎ナキ者アリ
或ハ火酒三百八十四錢ニ剛永丹四十八餅ヲ和シ或ハ
五レテ倍シテ九十六餅ヲ和シテ一患者ニ二劑連服セ
シタルニ少モ吐涎ナキ者アリ
或云頑癩ニシテ深ク根結セル梅毒ニ第六十六号劑ヲ
又ク用シ尼治セザルノアリト然レ通例梅毒ノ諸症ニ
此劑先ニ他ノ承劑ヲ用ルニ皆効驗アリテ損害アルノ
説絶テナシ此ニ剛永丹ヲ丹服シテ必効ヲ確説スルノ
實ニ後来医方ノ惠賜ト云フヘシ
時明温暖ノ日ハ患者徐疾進行シテ清爽快濶ノ氣ヲ受クヘシ
天气淫冷ナルハ方居ニテ保護スヘシ

患者強壯ニシテ痲毒既ニ沈痾頑滯ニ治セザルハ第六十六号
劑ヲ毎朝毎夜一七半ツ、用ユヘシ尚也ヲ用テ數日効ナク惡
症退カサルハ毎朝毎夜二七ツ、與ヘコレヲ又フシテ全治ス
ルニテ用ユヘシ
凡ソ此劑ハ時日ヲ期セズ絶久ニテ用ユヘシ然レ未タ險重大
テサレハ大抵三七日ニテ治スヘシ但シ痲毒深ク頑結スルハ
時月ノ久クヲ俟テ加テ奏スヘシ屢々經驗スルニ絶許ナク
此劑ヲ服スレバ毫モ患害ヲ速クナシ
汚壞醜壞ノ潰瘍羞色ニナリテ良膿ヲ成シ或ハ漸ク瘡合シ或
ハ腐蝕ノ碎骨拔出シ腫減シ是ニ夜中ノ疼モ去ル者ハ回復ノ
兆トス
飲食ハ大麦米等或ハ蔬菜ノ麥ヲ煮テ食シ或ハ輕キ肉類乳汁

類性良ノ熟セル菓類ヲ許レ用エヘシ厚脂ノ丹麥藍藏ノ真麥
皆害アリ

右ノ劑ヲ用テ吐涎スルヲアリ然レモ甚ク罕ナリ以前既ニ丹
飲外敷ノ吐涎劑ヲ用テ吐涎スル者ハ此劑ニテ吐涎スルヲナ
シ畢竟吐涎ハ痲ヲ治スルニ益ナシ故ニ此劑ニテ吐涎ノ兆ア
ラハ暫ク此劑ヲ休ムヘシ
斷腫起赤色ニシテ疼之氣息惡臭アルハ吐涎ノ兆ナキ如是ハ
此劑ヲ休メ八日或ハ十日ヲ経テ吐涎ノ兆全ク退キ然レテ此
痲全治セサルハ復タ前劑ヲ用エヘシ
第六十七号煎劑ハ平常ノ飲料ニ代テ毎日勉強シテ用エヘシ
或ハ尿道潰瘍ヲ生シ痲ヲ発セハ第六十七号煎劑ヲ多服スヘ
シコレニ由テ小便ノ酷后毒ヲ緩和ス又温湯ニ乳汁ヲ和シ少

温ニシテ毎日數度凡ソ八分時ノ中陰莖ヲ浸スヘシ良効アリ

梅毒痲ハ第六十六号劑ヲ四五十日或ハ其余ニ久ク用
ルニ其痲毒ハ日ク消解スル如クナレモ終ニ少許ニナ
リテ全愈セス久フシテ厭倦スルヲアリ故ニ此劑ヲ休
テ別ニ輕キ下劑ヲ用エ

或ハ痲疾治シ或ハ他ノ目ニテ一方ノ畢丸腫痛シ阴囊赤色ナ
ルヲアリ此症ハ速ニ刺終ヲ多ク施シ第十二号煎劑ヲ温メテ
断ス患部ニ傳貼シ又第一号飲劑百錢ニ硝磺一銖ヲ加ヘ毎日
多ク服スヘシ其後畢丸ノ焮腫疼痛発熱等去ルハハ夕第六
十六号劑ヲ用エヘシ

經久ノ疥癬ハ其小泡自ラ皮中ニ透蝕シ稀水ノ泡変シ
 于真ノ膿瘍トナル此ヨリ其膿漸ク静血脈ニ吸收セリ
 之ヲ避レ遂ニ全身ノ血液ニ傳染ス此ニ因テ更ニ種々險惡ナ
 クモ此ノ病症ヲ免ス既ニ如此ナル者其症ニ從テ各々治法
 味合ハテ施スヘシ此ニ於テ治法ヲ撰シハ此病モ亦必ス治シ
 易カラスト知ルヘシニ
 然レ凡此病挂淺ニシテ總身ニ羅カズ各所ニアルハ
 患ヲ内服ニ請劑ヲ要セズ外用劑ニテ治スヘキナリ
 患者勉メテ身体ヲ清潔ニスルニ觀衣綿絆ハ數々新ニ更ヘシ
 天晴气和シ患症穩ニシテ耐忍ヲヘキナリ
 湯ニ浴スヘシ某泉ハ硫黄氣アル者又浴湯ニ硫黄ヲ加ヌル者
 効アリ

觀衣綿絆等ハ硫黄ヲ薰烟スヘシ但シコトヲ爵閉セ竹筥中ニ
 テ薰スルヨリ又其氣ヲ吸入シテ害アリハ宜キナリ其氣味
 毎朝早晨ニ第六十八号下劑ヲ必日毎ニ用エヘシ外敷劑ヲ患

第六十八号劑方

牽牛膏十五餅
 淨砂糖十餅
 黑汞丹二十餅

煖硝一餅
 右合為散劑并黑汞丹新ニテ煎製スルヤ亦服ル可キ也

右ノ下劑ヲ用テ疥ル日ニ第六十九号散劑ヲ毎朝日中毎夜六
 版ツ、日三服用ニ然シテ毎夜第七十号軟膏ヲ患部ニ塗擦
 スヘシ

第六十九号劑方

硫黃花半餅
 黑汞丹十餅

スルノ劑ヲ一兩日用ニ其後峻効ヲ下劑ヲ用テ海下スルニ惡
臭ノ劑ハ阿魏一名五餅丸劑ヲ一服トシ一時半毎三用ニ此劑
ヲ兩日用テ後毎朝空心ニ峻効ノ下劑ヲ与フヘシ此ニ就テ稀
キ煮汁ヲ与テ下劑ノ効ヲ扶クヘシ
右ノ如クシテ根治セシル者ハ公且又經其復前方ヲ与スルニ
カタクシテ本意ハ眞ノ苦劑ニ禁ヘスルハ其意ヲ
細虫ハ惡性ナル下劑ニ兼食スル則多シク胆汁腐敗毒
ヲ兼ル秋食ノ間歇ニヨク細虫ヲ吐下スルヲ多シ
苦味ノ菜劑スヘテ細ヲ除クニ用ニ然レバ細虫ノ思
ハ小中ニ苦味ヲ嫌惡シテナルハ其故ハ苦烈ナル
膽液ハ日帯注入セル小腸ニ巢結スレハナリ

剛鉄粉或ハ鉄粉ヲ服量適宜ニシテコレニ阿魏ヲ加ヘ
數日用レハ腸稍疏解スルヲ覺ユ此ニ於テ適宜ノ下劑
ヲ与フレハ細虫自ラ下ル
細虫ニ死シ或ハ驅出セハ食膳ニ雞卵ヲ加ヘ与テ衰弱
ノ腸胃ヲ復スヘシ
或ハ腸胃ヲ健運スルニ左ノ方ヲ用ユヘシ其方
沒菜 三錢
白石臍 一錢
ハルサモベルヒアニ 名
二十
滴
右合シ六十丸トシ毎朝空心ニ毎夕薄暮ニ三四丸ツ
、用ユヘシ
或ハ茅朮三號苦味健胃ノ糖劑ニ剛鉄粉八錢ヲ加ヘ用
ルモ亦良効アリ

