



朋百氏藥論  
二

武	9
84	2
2	5



門 十 貳 9  
番 545  
卷 24



朋百氏藥論卷之二

佐渡 凌海司馬 虧盈之 譯並注證

第五篇 論迅發作用之發動

藥物ノ迅發作用ヲ發スルヤ其道ニ般アリ一ハ血液運滙ニ由リ一ハ神經感傳ニ繇ル○其血行ニ由ル者ハ或ハ其藥質變易シ或ハ否ラス總テ血中ニ入テ遠隔地位ニ達ス之ヲ為ス所以ノ者ハ

吸攝ノ機能ナリ其感傳ニ繇ル者ハ神經中樞ノ  
幹旋ヲ以テ成ル

第一 由血液運滙者

迅發作用ノ此道ニ成ル所ノ者ハ左款ノ數件以  
テ之ヲ保證スベシ

以既ニ融解セルノ藥物ヲ把テ體中ノ囊ヲ為ス部  
即腹膜若クハ胸膜中ニ置ケハ其容量漸次ニ減  
少シ隨テ遂ニ消耗ス

注證第十

鳴司萬耳ト梭ト人嘗テ鳩ヲ捉ヘ番水斃

熬膏ノ水ニ溶和セル者ハ弓許ヲ其氣管ニ注

射スルニ七八分時ヲ經テ其鳩抽掣ヲ發シ牙關  
緊閉メ遂ニ斃ル屍ヲ剖テ之ヲ檢スルニ氣管及  
其支梢ニ至ルマテ絶エテ水液ノ潴留セル者ナ  
シト云ヘリ吸攝ニ非ズハ何ヲ能ク斯ノ如ク  
ナラム

呂凡百ノ藥物總テ其品或ハ分析課ノ試藥ニ由  
リ或ハ自家ノ香臭味色ニ由テ其原質ヲ查亮ス  
ヘキ者ハ皆再ヒ血乳糜及分泌諸液加旃諸器ノ  
織質中ニ存在セル者ヲ檢出スベシ

注證第十二

是最多ク溺中ニ見ル者ニメ諸酸灰

鹽。大黃。泊夫。藍。荷。魏。河。狸。香。規。屈。嘆。啡。等皆能ク  
此般ノ事ヲ致ス

波人設使諸般ノ津液及織質ニ藥毒諸品ヲ致セ  
ハ其液其部復屢々用ユル所ノ者ニ同一ノ作用  
ヲ發ス是其吸攝ニ由テ此地ニ達スルヲ證スベシ

注證第一 革邏屈名ハ乳母ニ灰鹽ヲ用ヒテ嬰

児ノ酸液ヲ治シ咽喉名ハ產母ノ醇酒ヲ飲テ

生児ノ醜醉セルヲ見ル他ノ諸毒モ亦然リ故

ニ諸獸毒物ヲ食フ者ノ肉ハ能ク人ヲ殺スニ

足ル

仁藥毒常ニ迢發作用ヲ發スルノ性ヲ具フル者ア  
リ今設使使用ノ部ニ於テ術ヲ以テ其遠及ヲ障  
碍スレハ則其作用ヲ發スルヲ得マ然此故ニ之ヲ  
憇患スレハ其發スルヲモ亦速ナリ

注證第二 蝮蛇ノ咬傷之ヲ其部ニ緊紮スレハ列

ニ危殆ノ作用ヲ興サズ表皮剥露セルノ部ハ此

子ノ藥物ヲ傳フルモ能ク強劇ノ刺衝ヲ致ス

保 糞液膜及皮下織質ニ藥毒ヲ用ヒ或ハ之ヲ血

管ニ注射スレハ其發スル所ノ作用又他ノ腸管

吸攝ニ由ル者ト其歸ヲ一ニス

注證第十三

永膏ヲ皮膚ニ敷テ吐涎ヲ起シ規尼  
ヲ齒齦ニ擦メ瘡熱ヲ截ル等枚舉ニ違アラズ

邊意料ヲ以テ之ヲ察スルニ藥物ノ過誤作用ヲ誤  
スル其性其道共ニ吸攝ニ由ラスンハアラズ

注證第十四

吐酒石ノ焮衝ヲ消シ芫菁ノ淋瀝ヲ  
致ス是歷然トメ其吸攝ヲ指スベキ者ナリ

第二 由神經感傳者

輓近大家ノ論說ニ曰ク神經系ハ他ノ吸攝機能ノ  
介灼ヲ待タスメ既ニ藥物ノ作用ヲ過誤セシムト而  
メ之ヲ證スルノ事件數條ヲ舉ク

以中毒ノ証諸般ノ吸攝機能アラサルノ地ニ特發  
スルアリ

注證第十五

一獸ノ頸血脉ヲ剥露シ細線ヲ以テ  
其上下ヲ緊紮シ少ク之ヲ割テ灌クニ毒水ヲ

以ス此時ニ當テヤ其血行既ニ閉止ス血ノ之  
非ヲ輸致スルノ機力復アルベカラズ而メ一二分時ヲ

経ルノ後其獸抽掣ヲ發メ斃ル是莫侃究第味  
共ニ等ノ共ニ歷試セル所ニメ以テ神經感傳

ヲ證セリ然レ血管自家ノ織質ハ所謂沁出沁  
入ノ妙機ヲ具フ之ニ由テ其毒ヲ邊圍ニ佈達

シ他ノ髮細管之ヲ吸攝メ以テ他部ニ輸送ス  
ルノ機ナシト謂フベケンヤ

呂諸毒ノ作用ヲ發スルノ迅疾ナルヲ殆ト思議スベカ  
ラサル者アリ是一旦吸攝メ而ノ後ニ發スル者ニ  
非サルニ似タリ

注證第六

朋百氏曰ク青酸ヲ以テ蹠心ニ灌ク  
ヤ其人ヲ殺ス一瞬ヲ待タズ豈血中之ヲ吸  
攝スルノ暇アラムヤ是以テ感傳ヲ證スベシ然レ死  
後其血ヲ検査スルニ闇黒ニメ凝固セス是其既  
ニ吸攝セルノ證タリ然レハ青酸ノ作用ハ血ノ

之ヲ吸攝スル極テ迅疾ナルニ由ル者ナルヤ未タ  
知ルベカラズ

波毒物ヲ血中ニ注入スルニ繼令其部太クシク神經

中樞ニ遠隔スルモ其作用ニ至テハ近迹ノ部ニ於  
テスルト同ク迅速ニ發動ス

注證第七

毒物ヲ腸骨血脉ニ灌クニ其劇症ヲ  
發スルヤ之ヲ頸血脉ニ灌ク者ト時ヲ同ニ或ハ  
却テ之ヨリ早キトアリト云フ朋百氏曰ク予之  
ヲ試ルニ或ハ然リ或ハ否ラス

仁中毒ニ由テ死セルノ獸アリ今其血ヲ取テ之ヲ

他獸ニ與フルニ更ニ險症ヲ發スルナシ

**注證第十** 獸ニ與フルニ三匹ノ斯<sup>ス</sup>的<sup>テ</sup>哩<sup>リ</sup>幾<sup>キ</sup>喃<sup>ナ</sup>ヲ以

テスレハ瞬間ニメ斃ル今其血ヲ搯取メ之ヲ他  
獸ノ血脉ニ灌ケハ少シク抽掣ヲ發スルモ復太  
夕シキ患害ヲ為サスト云フ是實ニ然リ何ソ知ラム  
死獸ハ全ク之ニ毒セラルモ其體中ニ止マルノ間  
其毒分ヲ點化消耗シテ既ニ他獸ニ移ルニ及  
テハ復從前ノ劇毒ニ非ルヲ

**保** 中毒ニ由テ生スル所ノ証狀他ノ神経系及其  
中樞ヲ損傷セル者ニ發スル所ト其轍ヲ同ウスル

者アリ

**注證第九** 明百氏曰ク此驗說ノ如キ信ハ則信

ナリ然レ唯其証狀ヲ同ウスルヲ以テ其據トナス  
点陋ナラズヤ尖針ヲ取テ延髓ヲ刺セハ必ス抽  
掣拘攣ス番木鱉ノ毒ニ中ルモ亦然リ其毒血  
行ニ仍テ延髓ニ達スルヲ能ハザラムカ予未タ其  
說ヲ知ラス

此外ニ尚左ノ證說アリ曰ク諸毒其作用ヲ發ス  
ルニ敢テ其秤量ノ著シク減少スルヲ見ス殊ニ又  
曰ク神經ノ一支ヲ緊紮メ而メ其下部ニ諸毒ヲ

用ユレハ其効復<sup>イッホ</sup>平素ノ如クナラズ

**注證第三** 阿片十<sup>イッホ</sup>瓜ヲ與ヘテ猫児ヲ毒殺シ其

胃腸ヲ淨刷ノ殘餘ヲ集メ之ヲ秤メ九<sup>イッホ</sup>ヲ得  
タリ是其量僅ニ十分ノ一ヲ失フノ人之ヲ以  
テ感傳ヲ證セリ特ニ知ラス一<sup>イッホ</sup>ノ阿片ハ能  
ク猫児ヲ殺スニ足ル者ナルヲ今猫児ニ一<sup>イッホ</sup>  
ヲ與ヘテ死セサルハ蓋其胃腸悉ク其量ヲ吸攝  
シ盡サルニ由ル者ナリ ○神經中樞ニ傳達ス  
ルノ路ヲ隔絶メ其部ニ毒ヲ傳ヘテ得ル所ノ  
徵二般アリ曰ク作用ヲ發スル速カナリ曰ク或

磚  
不<sup>セ</sup>同<sup>セ</sup>瓦<sup>セ</sup>ナリ  
瓦<sup>セ</sup>ナリ

ハ遲シト是<sup>レ</sup>以テ證トスルニ足ラス

右欸ニ開陳セル所ノ事件或ハ全ク其保證ヲ缺  
キ或ハ時ニ其沮磚ヲ生スルカ故ニ作用ノ發動神  
經感傳ニ由ルノ説ハ實ニ確據アリト為スニ足ラ  
ズ唯血液運滙ノ間融化吸攝ニ其道ヲ假ルノ論  
ハ特リ定徵ヲ得タリトス然<sup>レ</sup>氏又神經系ノ介約  
ニ由テ局發若ハ迢<sup>レ</sup>發ノ作用ヲ發スル實ニ疑フ  
ヘカラサルノ事件アリ寒冷温熱電氣ノ作用及食ヲ  
見テ嘔<sup>レ</sup>シ香ヲ聞テ悶スル等即是ナリ

**注證第卅** 朋百氏曰ク硃砂精ヲ嗅クカ如キ嗅



器ノ神經之ニ感メ腦ニ傳ヘ腦之ニ應メ眩暈卒  
厥ス是實ニ神經感傳ニ由ル者ナラム  
是ニ由テ之ヲ觀レハ醫藥ノ作用ノ神經感傳ニ  
由テ生スル者或ハ疑フヘカラサルヲアリト雖氏其功  
理ヲ善ク領會セムト欲セハ正ニ左ノ建說ヲ以テ  
不刊ノ典例ト為スヘキナリ  
曰ク醫藥ノ作用ハ特リ吸攝ニ由テ血中ニ入り  
從テ遠隔ノ部位ニ達スルニ由テ成ル蓋此吸攝  
ノ機能ハ諸般ノ事件ニ於テ醫藥ノ過發作用ヲ  
講明スルニ足ル者タリ

第六篇

論定發作用及變發作用之差等

藥物ノ作用平素健康ノ器體ニ在テ發スル所ノ  
者ハ常ニ畫一不變ナリ名ケテ定發作用一ニ健康作用  
ト曰ト云ヒ其部本既ニ病的變常ノ事アリ而メ  
之ニ由テ發スル所ノ者ハ概子非常ノ景状ヲ發  
ス名テ變發作用一ニ醫治作用ト曰フト云フ蓋此作用ハ一  
去ハ其藥物原質ノ作用ニ本ツキ一來ハ器體及  
織質變常ノ景況ニ從テ發スル者ナリ  
定發作用ハ則是變發作用ノ本原ナリ而メ之ヲ

知ラザレハ藥ヲ施シ方ヲ處スルヲ確實ナルヲ能ハス  
然レモ吾人ノ學識ノ此作用ニ於ケル未タ十全ノ  
淹通ニ至ラサルナリ

蓋醫藥ハ一箇ノ定位トメ考察スルヲ要ス何トナ  
レハ其量其性總テ變易ヲ致スヘキノ事件未其運  
為ヲ發セザレハ醫藥モ亦依然トメ其作用ヲ興サ  
レハナリ故ニ作用ノ發動ニ至テモ器體ノ景況ニ  
從テ亦各異同アリ是即器體ノ常態ニメ亦其受  
クル所ノ變化ノ常態ナリ且此變化ハ其作用ニ  
他ノ繼發ノ機會ヲ授ケ又其部位ヲ變革ス

藥物ノ作用健康ノ體軀ニ發スルヤ地方氣候溫度  
男女長幼性稟習癖等諸般ノ關係ニ於テ各此子  
ノ差等ヲ生セザルヲ得ス然レモ其大態ハ實ニ  
畫一不變ノ定發作用ニメ每常同ニカラサルヲナシ  
刺戟劑收斂劑興奮劑ハ常ニ其物タルノ功ヲ奏シ  
砒石青酸ハ每ニ其毒タルノ性ヲ顯ス  
變發作用即醫治作用ハ然ラス藥物作用ノ狀ハ  
每ニ同一ナリト雖モ器體及織質ノ景況ハ必多少  
健全ニ乖戾スレハ則其發スル所ノ功用亦自異ラ  
サルヲ得ス是即其變發タル所以ニメ夫ノ反應ノ

蠲除痲疾

作為全ク其變状ニ相應ス夫レ然リ故ニ變發作  
用ノ各自一定ナラサルハ患部各般ノ差等アルニ由  
ル者ナリ○是故ニ疾疾ニ於ル醫藥ノ功用ハ總  
テ確然定發ノ者ニ非ス唯其景状ニ從テ之ヲ異  
ニスルノミ豈又驅熱ノ藥蠲癥ノ品或ハ腺病ヲ治  
ルノ物トノ各其一効ヲ備ルノ藥物アラムヤ今設  
使芫菁ヲ取テ之ヲ健全ノ皮膚ニ貼シ又之ヲ經  
久ノ瘡疹ニ搵シ又之ヲ太劇ノ炎症ニ敷カハ則  
其為ス所果メ如何ソヤ予將ニ其當ニ天淵ナラサ  
ルヲ見ム

健康ノ人鍊劑ヲ久服スレハ遂ニ疾患ヲ誘發シ血  
液匱乏症若クハ萎黃病ニ之ヲ用レハ又却テ之  
ヲ治スルノ益アリ腸炎及赤痢ニ之ヲ用レハ却テ  
死亡ヲ致スシ酒類モ亦然リ之ヲ用ル人ノ強弱  
ニ從テ其功大ニ同シカラス之ヲ重病ノ末期ニ用  
レハ其為ス所又變ニ異ナリ  
定發變發兩般ノ作用互ニ相異ナルカ如ク變發作  
用モ亦自家ノ差等ヲ生ス名ケテ變發ト云フハ  
之カ為ナリ然氏此作用敢テ異常ノ者ニ非ス亦  
夫自然力及分析力ノ範則ニ從テ起リ生活器體

衍感

精意

別種ノ變化ニ就テ其發迹ヲ定ル者ナリ故ニ吾人定發ノ力ヲ以テ變發ノ功ヲ概スヘカラス是前者ハ其操作ヲ預定スヘシト雖比後者ニ在テハ則能ハサレハナリ○即尔云ト雖比吾人設使明ニ病的織質變状ノ原性ヲ知レハ藥劑ヲ用ルルモ亦難カラス比如其病體中蛋白質ノ増衍ニ由テ發スル者タルヲ的知シ而メ又其藥能ク之ヲ減消スルノ定發作用アルヲ詳識スレハ則諸般ノ疾痰其因ヲ蛋白質ノ増衍ニ取レル者ニ觀テ毫モ猜疑スル所ナク藥ヲ投シ方ヲ處スヘキカ如シ精切斷ノ如キ

要訣 考之使實ヤ

ハ蓋善ク人身諸器ノ功用ヲ數知シ又其病理ヲ推原スルニアリ

注證 第三 頸核腫ハ頸下ノ腺ニ蛋白質ノ沁出

鬱蓄スル者ナリ蓋病學ニ由テ之ヲ知ル沃顛

ハ蛋白質ヲ融解稀釋スルノ功アル者ナリ藥物

學ニ由テ之ヲ知ル故ニ頸核腫ニ沃顛ヲ投ス

レハ人々預先其痊癒ヲ期スヘキナリ

變發作用ノ定發作用ニ違フ所以ハ左ノ二件ニ

アリ一ニ曰ク度ニニ曰ク性是ナリ甲ハ其強弱

ノ差異ヲ云ヒ乙ハ其性質ノ異同ヲ論ス阿片ノ

如キ之ヲ健全ノ人ニ用レハ屢其通泄ヲ閉澁ニ  
 之ヲ鉛毒病ニ投スレハ却テ上圍ヲ催進ニ健康ニ  
 在テハ興奮ノ績ヲ致シ疾痰ニ在テハ打睡ノ効  
 ヲ見ハス故ニ此作用ハ正ニ疾痰ノ存スル者ニ  
 用テ其營為ヲ觀ルノ後始テ之ヲ確證スベシトス規  
 尼ノ熱病ニ於ル麝香ノ腦病ニ於ケル等皆是ナリ  
 注證<sup>第三</sup>癩風ニ吐酒石ヲ投スレハ其分量平素  
 ニ蓓蓓メ更ニ少嘔ヲ發スルナク胃炎ニ之ヲ  
 用レハ其量輕些ニメ却テ劇吐ヲ起ス等以テ  
 變發作用ノ全ク其度ヲ異ニスルヲ見ルベシ

第七篇

論變發作用之性状

醫藥ノ効績ヲ奏スルハ常ニ其局發迢發ニ般ノ作  
 用ニ在リ而メ其藥物抵觸ノ部位ニ於テ特發ス  
 ル所ノ者ハ是局發ノ功ナリ焚灼。發泡。止血。收斂。  
 制酸。驅虫。催下等ノ諸劑ニ於テ屢見ル所ノ如シ  
 或ハ胃ノ筋膜及神經ニ其操作ヲ為ス者アリ健  
 胃劑是ナリ又硬軟ニ膏。合嗽劑。灌腸劑ノ如キモ  
 亦多クハ局發ノ功用ヲ為ス者ナリ  
 迢發作用ハ其功ヲ普ク全軀ノ器體ニ達メ或ハ

血液調和ヲ變ニ或ハ生養分泌ノ機能ヲ理ム補  
血變質利瀉諸劑ノ肺結核血液匱乏症萎黃病痛  
風癩毒等ニ於ルカ如シ或ハ血管神經ニ系ノ障  
碍ヲ剋治メ幾多ノ痛楚ヲ寛解ス興奮麻醉諸劑  
ノ痙攣疼痛癲癇子宮病等ニ於ケルカ如シ  
迅發作用或ハ直達ニ由テ其功ヲ呈シ或ハ介効  
ヲ待テ其力ヲ發ス感傳反對誘導ニ由ル者ハ是  
介効ヲ待ツ者ナリ  
爰ニ藥物一種特異ノ性能ヲ具ル者アリ之ヲ名  
テ殊効藥ト云フ蓋此藥ハ一定ノ品物特リ一定

ノ織質ニ其作用ヲ致ス者ニメ此如實芟谷利私  
ノ心ニ於ケル芫菁ノ膀胱ニ於ル莖莖ノ瞳孔ニ  
於ルノ類是ナリ然レ凡此品實ニ唯其一定ノ織質  
ニ功力ヲ逞メ決メ他ノ諸部ニ作用セサルニ非ズ  
唯他部ニ在ル者ハ屢輕微ニメ著明ナラサルノミ吐  
酒石ノ催吐ノ如キハ人認テ以テ其本能トナセリ  
然レ兼テ肌肉ノ歛縮ヲ弛メ且大ニ發汗ヲ獎ムル  
等復同時ニ發スルノ功ナリ是以テ證スルニ足ル

注證 第三 烏司篤耳稜曰ク殊効藥ノ能力ハ藥  
物ノ原性ニ由ルニ非スメ唯器體ノ本質ニ從フ

汞ハ癩毒ノ殊効藥ナリ然レ義膜炎ニ於ルト  
其力ヲ同ウシ沃顛ハ頸核腫ノ殊効藥ナリ然  
レ癩瘰ニ於ケルト其効ヲ岐ニセス

設使夫一二ノ醫藥一定ノ疾疾ヲ治シ得ルヲ十  
全確實ナル時ハ則其狀ニ從テ之ヲ殊効藥ト稱  
メ可ナリ縱令吾人未夕毎ニ此能力ノ然ル所以  
ヲ精審スルヲ能ハサルモ決メ隱秘ノ性力ヲ此間ニ  
存スルニ非ス又唯夫自然分析ニ力ノ範圍ニ從テ  
作用スル者ナルノミ故ニ真ノ殊効藥ナル者ハ必其  
應スル所ノ一定ノ疾疾ヲ療シ得ヘシ其他ハ則

能ハス

變發ノ功用其關係スル所重切ナレハ之ヲ正能ト  
云ヒ否ラサレハ之ヲ奇能ト名ツク即甲ハ確實必  
見ノ本力ニメ乙ハ隨時有無ノ偶功ナリ此如通  
便ヲ增多スルハ是下劑ノ正能ニメ同時ニ腸虫ヲ  
驅逐スルハ其偶發ノ奇能タリ

第八篇

論諸毒物及其作用

夫毒物ノ名ハ峻烈ノ藥品ヲ用ルノ標的ニ從テ  
之ヲ稱スルノミ別ニ醫藥ニ異ナル者アリテ然ルニ

非ス何ントナレハ毒物及醫藥ノ間ニ判然タル境  
界ヲ定ムルヲ能ハサレバナリ是故ニ實ニ一藥決然ト  
メ殘毒ノ作用ヲ見ハス者ナシ唯其之ヲ使用スルノ  
標的健全ヲ破リ性命ヲ殘フニ在レハ是時始テ毒  
物トナル然レト大概人毎ニ左歎ノ事跡ヲ以テ一物  
ヲ名テ毒物ト云フ  
曰ク輕微ノ秤量ヲ用ヒテ能ク劇烈ノ作用ヲ致  
ス實ニ効ヲ以テ量ニ比較スルヲ得サル者  
曰ク其作用病的變常ノ状態ニ由ルニ非スメ健  
全無病ノ器體ニ異様ノ患害ヲ生出シ來ル者

注證<sup>第三</sup>五 烏司篤身按曰ク毒物ハ尚夫瘍科ノ

利器ト同一般ナリ之ヲ用ヒテ腫瘍ヲ別開シ  
苦楚ヲ寬解セハ其功實ニ貴フベシト雖氏或ハ  
之ニ由テ血囊ヲ剪逆シ性命ヲ逆挽セハ其害  
舉テ論スヘケムヤ是其物ハ同一ナリ而メ功害  
忽其地ヲ易フ蓋之ヲ使用スルノ標的大ニ異レ  
ハナリ○食鹽及豆豉之ヲ大量ニ服食スレハ劇甚  
ノ泄瀉ヲ發メ精力衰痿ニ規尼若クハ麝香之  
ヲ無病ノ人ニ用ユレハ又患苦ヲ誘起ス蓋此數  
品ハ性命ヲ保全シ疾疢ヲ恢復スルノ効績ヲ具



ル者ナリト雖此措置宜ヲ得サレハ復他ノ毒物ト  
其作用ヲ岐ニセス是一去ハ其用量ノ大過ナルニ  
由リ一來ハ其投施ノ乖戾セルニ由レハナリ  
醫學上ノ看法ニ從ヘハ真毒物ト傳染毒トハ毫毛  
異ル者ニ非ス

第一 局發作用

毒物ハ甚輕微ノ分量ヲ用ユレハ常ニ能峻劇ノ醫  
藥トナリ其量大ニメ且抵觸ノ地ヲ變革スルニ足ル  
時ハ則毒物トナリテ局發ノ作用ヲ興ス而メ其狀  
三等ノ別アリ以<sup>レ</sup>其抵觸ノ部刺戟ヲ受ル<sup>レ</sup>極テ大

ニメ血液ノ充漲ヲ起シ遂ニ血液充漲及糞液沁  
泄ヲ致ス刺戟 **呂**一部ヲ侵掠メ分析作用ヲ興シ  
以テ其地ヲ荒蕪ス鑛鹽類及腐蝕劑 **波**其部ニ於テ較著  
ノ物質變革ヲ起サスト雖此其力大ニ肌肉及支末  
神經ノ機能ヲ抑壓消歇シ以テ麻痺ヲ發セシム醉  
毒 ○此作用ニ繼發スル所ノ症ハ頗ル多般ナリ或  
ハ其部全ク荒蕪殘廢シ或ハ痊テ後癩癩ヲ遺シ  
或ハ硬結腫大ヲ致シ或ハ機能ノ障礙ヲ殘ス  
第二 過發作用 **毒**物ト過發作用ハ其發動全ク醫藥ニ同シト雖

其性太夕危險ニメ殊ニ人ヲ墓門ニ挽クニ至ル而メ左歎ノ事件ニ注目セムトヲ要ス以腦ニ其作用ヲ致ス是殊ニ麻醉劑及興奮劑ニ由ル呂脊髓ニ其作用ヲ致ス是殊ニ發搐劑及青酸ニ由ル波神經系感傳ノ介約ニ由テ心ノ營為ヲ減殺ニ或ハ全ク之ヲ歇止ス烟草烏頭實莖荅里私及箭毒等はナリ仁呼吸器ノ神經及肌肉ヲ麻痺メ以テ窒息ヲ發セシム保肺經織質上ニ其作用ヲ致ス複鹽酸汞吐酒石砒石等皆此力アリ邊血液調和ヲ改變スルノ非常ニ迅疾ニメ其作用疑フヘキ者アリ

リ即有毒氣類ノ如シ而メ此作用各人ノ性稟ニ從テ亦必一樣ナラス中毒症狀ノ發動スルヤ各多少ノ遲速アリ且其生前發見ノ症ニ由テ中毒ノ何者タルカヲ決斷スルハ太夕能シ難シトス而メ良ク之ヲ辨晰シ善ク之ヲ精審スルハ醫事斷政ノ科ニ在テ最肝要ノ事件タリ

第九篇

論中毒之治法

夫中毒ハ其未夕害ヲ被ラサル以前ノ事迹ヨリシ又

現今發見セル所ノ證狀ヨリシ又排泄ノ物及殘遺セル諸件ヨリメ之ヲ診決スルヲ得ヘシ而メ治療ノ法モ亦之ニ從テ三様ノ定範アリ以テ此三種ノ診識ニ應シ且三箇ノ時限ヲ建ツ曰ク**第一毒**ヲ被ルノ時ヲ去ルヲ未タ太タ遠カラス且其中毒ノ證狀發スルヲ尚久シカラス或ハ未タ全ク發セサルノ時限 **第二毒**ヲ被ルヲ既ニ多時ヲ經過シ共發スル所ノ證狀モ亦既ニ著シク高度ニ登リ或ハ更ニ極度ニ至ルノ時限 **第三急性中毒**ノ諸症ハ既ニ經過シ了リ而メ今唯前症ノ存遺セル

者アリ以テ所謂慢性中毒ノ証ニ轉移スルノ時限○中毒ノ時限ヲ定ルヲ斯ノ如ク差等アルニ從テ治法モ亦之ニ從テ區別アリ

### 第一時限

此時ニ在テハ尚速ニ毒物ヲ除去シ以テ其猖獗ヲ抑制シ得ルノ企望アリ故ニ先早ク毒物ヲ體軀ヨリ排擯セムヲ要ス唯其毒ヲ被ルノ各異ナルニ從テ治術モ亦一定ナラス

**以毒**ヲ被ルノ不意ト有意トニ論ナク總テ其部外表ニ交通スルノ地如皮膚口内直腸陰戶等ノ

粘液膜ニ在レハ洗滌射注吹噓刷拭等ノ諸法ヲ以テ之ヲ除去スヘク或ハ又腐蝕藥等ヲ以テ其部ヲ荒蕪シ毒勢ヲ逞蕞セサラシム金刃創傷諸獸咬傷ニ於ルカ如シ○鑽物ノ毒ニ中ル者ハ速ニ消毒藥ヲ用ヒテ之ヲ無害ノ品ニ變セシム而メ設使毒血中ニ襲入スルノ危機アレハ濕角法ヲ行ヒ或ハ口吻ヲ以テ之ヲ吸收シ或ハ患部ト心トノ間ニ結紮法ヲ行ヒ以テ其機ヲ阻絶スルヲ要ス

呂毒物胃中ニ入り或ハ既ニ腸中ニ下ル者ハ左ノ三療法ヲ行フヘシ曰ク無害ノ水漿ヲ飲服メ毒

物ヲ稀釋ス曰ク催吐ノ方法ニ由テ其排泄ヲ促ス曰ク恰當ノ消毒藥ヲ用ヒテ其融解ヲ止メ以テ作用ノ蕞動ヲ遏ム○蓋此三法ハ毎ニ相繼テ用ユヘキ者ニメ毎常多蕞ノ中毒諸症ニ在テ人々之ニ由テ以テ十分ノ効績ヲ致スヘシ唯其施用ニ至リテハ互ニ相後先スルヲ免レス○強烈腐蝕ノ諸毒ハ先ツ其性ヲ中和性ニ變セシムヘシ是後來ノ局蕞作用ヲ預防スル所以ニメ稀釋及排泄ノ二法ハ毎ニ先早ク施行スヘキノ事タリ

注證第三十六 腐蝕毒ヲ飲服スル者設使始メ之ヲ緩

和セスメ吐出セシムレハ其厲物ノ逆行スル或ハ  
咽喉食道等ニ再ヒ危害ヲ致スヲアリ

毒物ヲ稀釋セムト欲セハ速ニ患者ノ近圍ニ在ル  
所ノ水醬類水乳。礮水。ヲ多ク飲シムルヲ要ス然レ  
之ニ由テ却テ毒物ノ融解ヲ獎進スル者ハ決メ  
用ユルヲ勿レ○胃水節ハ之ヲ反復シ用ユレハ毒物  
ヲ稀釋シ又之ヲ排泄セシムルニ太夕恰當ノ器ナ  
リ如何セム此器ハ人々毎ニ之ヲ左右ニ具フル  
者ニアラス其使用ニ於テ許多ノ時刻ヲ費スヲ  
斯ノ如ク水漿ヲ以テ胃ヲ飽滿セシムレハ自ラ能

ク嘔吐ヲ誘スルヲアリト雖凡然凡毒ニ有力ノ吐劑  
ヲ用ヒズムハアラス麻酔毒ノ如キハ殊ニ然リ而メ  
其品ハ毎ニ奏効迅速ニメ其力極テ強キ者ヲ採  
リ且其量ヲ大ニセムヲ要ス吐酒石。吐根。硫酸銅  
硫酸亜鉛。越。默。質。等。皆其選ナリ○胃腕ノ刺戟進  
テ炎症ニ遷ル者ハ復此諸劑ヲ用ヒ易カラス唯形  
器底方術胃部ヲ壓窄シ。咽喉ヲ探ヲ以テ吐泄ヲ  
促スヘシ是有力ノ吐劑ハ却テ其炎症ヲ煽揚スレハ  
ナリ故ニ此時ニ當テハ胃水節ヲ施用スルヲ以テ  
頗ル安穩ニメ又偉勲アリトス

注證<sup>第三十七</sup>

烏司篤耳按曰久中毒ノ植物ニ由ル者ハ鑛性ノ吐劑ヲ用ユヘク其鑛物ニ由ル者ハ復植性ノ品ヲ用ユヘシ是其性ノ相剋ニ資ル毒物ヲ調理メ其ヲメ殘害スルヲ無カラシムルハ是消毒藥ノ功分ナリ蓋其毒ヲ中和性ニ變シ或ハ其融解ヲ難クシ或ハ之ヲ解拆メ其毒性ヲ失ハシム故ニ其他ノ諸症ヲ恢復スルノ品ハ復既ニ之ヲ消毒藥ト云フヘカラス是此品ハ則醫藥ニ外ナラサレハナリ

蓋良善ノ消毒藥ナル者ハ之ヲ單用スルモ自ラ毒

物トナルノ性ナク而シテ他物ト相連テ水液若ク胃津中ニ融解セサルノ新物ヲ化成スルノ功アル者ナリ○今夫レ用ユヘキノ消毒藥品既ニ意料ニ定マレハ則チ之ヲ速カニ相繼テ用ヒ蓋其分量ヲ大ニシ且ツ其吐泄ヲ促サムカ為ニ兼テ多量ノ水飲ヲ與フヘシ

毒物并ニ消毒品ノ重切ナル者アリ之ヲ左款ニ開列ス

毒

消毒品及治効藥

砒石

新製抱水酸化鎂

炭酸鎂及石灰水モ六  
稍消毒ノ功アリ

鉍石 鞣質及鞣酸性煎劑

鉍諸鹽 太稀硫酸及硫酸灰鹽

銅諸鹽 蛋白沙糖乳 銹鏽 二銹鏽  
二合劑

汞諸鹽 鷄蛋蛋白 植物膠 澱粉 硫酸銹 鞣酸性  
煎劑

銀諸鹽 食鹽及他鹽 酸性藥

亞鉍諸鹽 炭酸苦土 蛋白及鞣酸性諸藥 重炭酸  
煎劑

錫諸鹽 同前

腐蝕灰鹽 稀植酸及脂性油

腐蝕土 同前

重土諸鹽 硫酸性諸鹽

肝色硫黃 咯味水 咯味鹽 咯味灰 皆之ヲ稀釋  
メ用ユベシ

鑛酸 新製抱水苦土 炭酸 礬 石灰水 坩土

及其他灰鹽類 墁壁石灰

蓆酸 苦土 坩土 石灰水 墁壁石灰

青酸 揮發鹽 咯味 硫酸銹 及礪砂精氣 咯

味水氣之嗅入

硫水素氣 咯味 咯味鹽 人工呼吸術 其他ノ咯  
味諸鹽

咯味氣 礪砂精及硫水素氣 之ヲ用ユレ最モ  
意ヲ加フヘシ

磷 爰ニ用ユヘキノ消毒藥ナシ

龍腦 醋下劑及吐劑 ○分析科ノ消毒藥

阿片

ハ未タ發明ナシ  
阿片劑

鞣質沃顛  
醋。拘櫟汁。揮發鹽。龍腦。鞣酸性煎劑。

莫非

同前

斯的哩幾喃

沃顛 莫非 哥囉 叻水 及 獸脂

右ニ列舉セルノ諸品或ハ形器底治術ニ属スル者  
アリト雖氏多クハ皆分析力ノ作用ヲ為ス者ナリ

**注證** 第三十八

烏司篤耳梭尚之ニ諸品ヲ加フ是亦

頗ル肝要ノ者タルヲ以テ煩縷ヲ憚ラスメ爰ニ附  
載ス看者以テ贅トナスコト勿レ

毒 品

消毒品及治効方

沃顛

澱粉

硝石

阿片 蛋白 乳 及 澱粉

芫菁

龍腦 及 阿片

有 毒 菌 首

嚼 昇 食 鹽 石 腦 油 及 遏 篤 耳

第 二 時 限

此時期ニ在テハ中毒ノ諸症既ニ高度ニ登リ飲  
服セルノ毒物既ニ吐出セラレ或ハ血中ニ吸攝セラル  
故ニ消毒藥ヲ用ユルモ毫モ効績アルノ理ナシ然レ  
毒物既ニ悉ク胃中ニ止マラサルヤ否ヤヲ確定ス



へカラサルカ故ニ先始メニ消毒ノ法方ヲ施行セスムハ  
アルベカラズ

腐蝕毒ヲ飲服セル者ハ局部ノ毀傷ニ注目スベシ  
是或ハ口吻或ハ咽喉  
或ハ胃腸諸部ニ在リ而メ他ノ過激作用ハ殊ニ腦心  
脊髄胃腸及分泌諸器ノ景況ニ注視メ之ヲ剋治  
ニ其他ハ悉ク原病學ノ定則ニ從テ治術ヲ施ス  
ヲ要ス

### 第三時限

此時限ニ至リテ始テ單ニ原病學治療ノ法方ヲ  
講ニ以テ夫既ニ存在セルノ諸症ヲ治メ又血液調

和ノ病的變易ヲ恢復スベシ  
汞鉛砒石ノ如キ諸鑛ノ慢性中毒ニ繼發スル所  
ノ血液變調ノ症ハ是屢貴重ノ者ニメ太夕醫家  
ノ心匠ヲ費シ治藥ノ使用モ亦長久ナラザレハ功  
ナシ而メ尚分泌系ニ浴テ殘餘ノ毒質ヲ排除セ  
ムコトヲ要ス

### 第十篇

論醫藥作用之差等由内外諸件而生者  
平素健全若ハ變常疾疾ノ景態ニ論ナク爰ニ諸  
般ノ事件アリ以テ醫藥ノ性力ニ許多ノ差等ヲ

生セシム用藥ノ部位秤量及其三質流體。凝體。氣體。或ハ水  
土歳時。温度等ノ諸件皆之ニ属ス

第一 機體及其原質之景態

動物機體ハ毎ニ諸般ノ成分ヲ襟合メ成リ且其  
運為一定ナラサルカ故ニ醫藥ノ作用モ亦其定規  
ヲ守ル一能ハス是即左ノ諸件ニ在リ

以年紀 諸般ノ疾疚ニ藥石ヲ用フルヤ正ニ年紀

ノ多少ニ從テ其秤量ヲ議セズムバアラス是即原病  
學ノ教ユル所タリ故ニ幼児ニ在テハ毎ニ峻藥ヲ  
避ケ麻醉藥ノ如キハ之ヲ用ユルモ必三思ヲ要シ

鑛酸。鑛鹽等ハ殆ト之ヲ禁スベシ老人ニ於テハ峻  
藥殊ニ吐劑。下劑等ニ最モ注意セズムバアラス

注證 第十九

九 幼児ノ成人ニ於ル成人ノ耄耋ニ於  
ル諸器ノ大小諸液ノ稀稠各許多ノ差異アリ  
以テ生々ノ妙機ヲ為ス故ニ同一ノ藥ト雖凡  
之ヲ幼腦小胃ニ致スヤ其為ス所之ヲ老腦大  
胃ニ用ユル者ト變ニ相差フ

呂男女 藥物ノ作用男女ノ間ニ於テスル者ハ別

ニ許多ノ差等ナシ唯婦女ハ其神經系及延嗣諸  
器ノ特異景態ニ注目スベシ故ニ月經ノ時期ハ殊

二峻藥吐劑下劑及諸酸等ヲ回避セムコトヲ要ス○  
 妊娠ハ是最注意スヘキノ事ニメ麻酔劑及他ノ諸  
 藥陰部ニ血液ヲ充漲セシムルノ功カアル者ハ力テ  
 之ヲ避クヘシ峻下劑及峻利瀉劑即是ナリ○諸種  
 ノ藥石皆能ク其功カヲ乳中ニ遷移セシムルノ性  
 アリ故ニ哺乳ノ時期モ亦頗ル重切ナリ就中變  
 質劑麻酔劑吐劑下劑及諸酸等ニ注意スヘシ又他  
 ノ苦味藥香竄藥等ハ能ク乳性ヲ改變メ之ヲ哺  
 乳ニ適セサラシム復爰ニ意ヲ致スベシ然レ此毎ニ  
 必然ト云フニ非ス

注證 第四

明百氏曰ク天癸妊娠哺乳ハ是婦女  
 生々ノ一大妙機ニメ之ニ由テ性命ヲ保全シ  
 種属ヲ蕃息スル者ナリ故ニ其整然齊調時ヲ  
 差ヘズメ来止シ便易安康事ヲ敗ラスメ産育スルハ  
 是自然ノ妙契ナリ醫家豈濟世ノ手ヲ以テ之  
 ヲ支障スヘケムヤ故ニ此諸期ニ當ルヤ小心翼  
 ヲタクラムコトヲ要ス然レ夫險劇ノ疾疢ニ於テハ  
 又此例ヲ看破セムハアルベカラストス

波慣習及攝生 人體ハ能ク諸藥ノ作用ニ慣習  
 スルカ故ニ阿片過篤耳下劑等毎ニ大量ヲ服メ其

常功ヲ發セサル者アリ之ヲ名々テ習癖ト云フ而  
メ此類殊ニ植性ノ藥品ニ多シ○飲食攝生モ亦  
藥功ニ多少ノ差等ヲ生セシム平素飲酒ニ耽ル者  
或ハ膏粱ニ飽ク者或ハ粗糲ヲ食フ者等皆是ナ  
リ故ニ先此般ノ景態ヲ回顧メ以テ方ヲ處セスム  
ハアラズ

**注證** 第十四 古語ニ曰ク人ハ習ニ由テ其性ヲ為  
スト信ナル哉故ニ醫家ノ方藥ヲ用ユルヤ先小  
量ヲ以テ始メ漸ク追テ大量ニ至ルノ理能ク  
其肯綮ヲ得タリトス

仁性稟四質及五種 藥功ノ差等此諸件ニ由テ  
生スル所ノ者ハ未夕之ヲ精密ニ得ス然レ五種  
ノ如キハ殊ニ藥功ヲ變易セシム故ニ醫家ノ病客  
ヲ診スルニ當テハ先其稟質ヲ推考シ藥石嫌忌ノ  
有無ヲ咨問シ貴重諸器ノ營為ヲ精覈シ而レ後  
方ヲ撰ミ量ヲ定メムヲ要ス

**注證** 第十四 勇怯旺羸之ヲ性稟ト云ヒ多血質胆  
液質黑胆質粘稠質之ヲ四質ト云ヒ蒙古種麻  
喇種喀烏喀種遏質屋必種米利加種之ヲ五種  
ト云フ○喇那兒名曰ク麻喇兒人阿片ヲ食ス

レハ心識昏朦精神狂燥之土耳古人及波斯人之ヲ服メ心思喜悦メ快眠ス

**保**疾痰 病的變常ノ景況ニ由テ藥石ノ効力差等ヲ受ル者ハ屢較著ニメ且貴重ナリ是汞劑下劑及吐酒石等諸藥ニ於テ見ル所ノ如シ

第二 藥物自家之品質

藥物ノ生産種属採收及貯藏等ノ諸件異同アルニ從テ其功力亦許多ノ差等ヲ生シ而メ其植物ニ出ツル者ハ皆此數者ヲ免ル、シテ能ハズ醫藥ノ秤量ハ先ツ其差法ヲ辨論スベシト雖凡決

メ其等限ニ株柱スヘキ者ニ非ス然凡其輕重ニ從テ効績ノ差等ヲ致セハ則之ヲ辨論スルハ蓋必須トナスヘキナリ而メ長幼ノ序疾痰ノ差稟質ノ別皆其差法ヲ議スベシ

今夫成人ノ期ヲ取テ藥石ノ秤量全五匁ヲ用ニシトナセハ其之ニ倣フテ生スル所ノ例蓋辨制スヘキナリ即左ノ如シ

未至一歲	四分匁至三分匁即全量十二分之一
一歲至五歲	三分匁至一匁半即全量四分之一
六歲至十四歲	二匁至三匁半即全量八分之五

十四歲至廿歲	四匁至五匁即全量
廿歲至六十歲	五匁即全量
六十歲以上ハ復稍其量ヲ減殺スヘシ	
峻力ノ藥物ヲ外用スルモ太夕三思ヲ須シ者ニ	
メ其部位ヲ撰ミ其施用ヲ詳ニセムヲ要ス設使	
五匁ヲ以テ成人ニ内用スルノ全量ト為セハ外施	
ノ秤量即左ノ統制ヲ生ス	
健全皮表	廿五匁至四十匁 <small>内用量之五倍至八倍</small>
潰瘍及有膿部	十匁至廿匁 <small>二倍至四倍</small>
皮下織質	十匁至十五匁 <small>二倍至三倍</small>

直腸	十匁至二十匁 <small>二倍至四倍</small>
眼目	二匁至五匁 <small>三分之一至全量</small>

蓋シ秤量ノ定限太約斯ノ如シト雖凡復爰ニ幾多ノ差法ヲ生セムハアルヘカラス

第三 方藥之形狀及其三質 流體。凝體。及氣體。

方藥ノ製造總テ固形ヲ為ス者 丸。散。丹。錠。熬膏ノ類。 ハ之ヲ溶液ニ比スルニ其作用ヲ起ス一太夕遲緩ナリ是其始メ先胃中ニ融解スルニ若干ノ時刻ヲ費セハナリ

注證 第十四 瘧熱ニ規尼ヲ用ユルヤ之ヲ溶液ト為

セハ其量之ニ倍セル丸劑ニ其効ヲ比スベシ是  
丸劑ハ胃ニ入テ融解スルノ間半ハ既ニ腸中ニ  
下行シ走テ渣滓ニ混シ以テ其量ヲ減スレハ十  
リ豈啻ニ之ノミナラムヤ其効ヲ奏スルニ至テモ  
亦太夕遲緩ナリ故ニ醫藥多クハ溶液ヲ撰ム  
ヘシ然レ又數般ノ利害ニ由テ他法ヲ采ルヘキ  
者アリ此如木炭ニ吸收乾枯ノ功ヲ望ム者ハ  
之ヲ散末トシ用ユヘキ力如シ

第四 方藥之配合

有力ノ藥物ヲ同時ニ併用スルハ最モ良善ノ用法

タリト雖モ是毎ニ成シ得ヘキノ事ニアラス且之ニ由  
テ屢龐雜ノ作用ヲ見ルコトアリ然レモ夫沸滾散ノ如  
キハ唯ニ味酒石酸及苦土ノ配合ニ由テ一箇ノ新物炭酸  
ヲ化成シ以テ須ク所ノ偉勲ヲ建ツ  
是故ニ奇偉ノ須効ヲ企望シ或ハ危險ノ餘害ヲ  
預防セムト欲セハ毎ニ先ツ分析變革ノ法理ヲ詳  
審セスムハアラス而モ其他ハ藥局合藥ノ科ノ主ト  
ル所ナリ

注證 第四 哩机多兒名曰ク藥方ヲ用ルヤ三種

ノ法アリ曰ク數藥ヲ一方ニ伍ス曰ク二方ヲ

同時ニ用ユ曰ク屢藥品ヲ更換ス是皆功力ヲ扶ケ消化ヲ冀メ香味ヲ適シ殘害ヲ制スル等ノ標準ニ由テ成ル者ナリ

第十一篇

論施用醫藥之部位

人身百體醫藥ヲ施用スヘカラサルノ地ナシト雖氏之ヲメ能ク追發作用ヲ起サシムト欲セハ良ク其部位ヲ撰マスムハアラス蓋之ニ由テ生スル所ノ作用ノ差等數般アリ就中左ノ三者ヲ重切トナス **以藥** 物ノ作用ニ由テ其部ノ織質變易ス **呂器體ノ原**

性藥物ヲ分析シ又其性功ヲ變易ス **波其部ノ織**

質中血脉及神經ノ多少ニ從テ醫藥ノ作用大ニ

差フ ○粘液膜殊ニ胃腸ノ膜ハ上ニ論セル所ノ

理 第二及第三ニ由テ速ニ藥物ヲ體中ニ吸攝ス故ニ

血管注射ノ法ヲ除クノ外ハ他ノ諸道能ク之ニ

勝ル者ナシ而シテ之ニ次ク者ハ皮膚ナリ然レ是

唯其外皮ヲ剝セル者ヲ云フノミ其舌ラサル者ハ

復諸道中最劣ノ地トス ○胃腸ノ吸攝尤モ速力

ナル者ハ植物動物ノ二品ニ在リ其無機體ニ屬

スル者ハ之ニ較スルニ稍遲緩ナリ



藥物ヲ施用スルノ道路數般ナリ之ヲ左歎ニ開列ス

第一 胃及小腸

此道ヤ毎ニ諸般ノ藥劑ヲ用フヘシ而メ其用ルヲ得ルノ間ハ必此道ニ從フヲ以テ穩ニメ且良ナリトス然レモ爰ニ障礙アリテ以テ用藥ヲ禁スヘキ者ハ他道ヲ撰マスムハアラス

注證第四十五

障礙トハ何ソヤ咬嚼ノ器病的感傷ヲ發スル者形器底沮磚ヲ致ス者食道狹窄ニ變スル者異物之ニ嵌入セル者或ハ胃腸ニ炎

症アリ藥ヲ與レハ之ヲ激スル者覺機允進メ食藥口ニ入レハ則吐スル者方藥不佳ノ香味アリ人ヲメ嘔セシムル者胃腸ニ非常ノ害物アリ食藥之ニ連テ却テ毒ニ變スル者等皆是ナリ

第二 直腸

此道ニ於ル粘液膜ノ廣袤ハ之ヲ胃ニ比スルニ太ク少ナク藥物ノ變革ニ罹ルトモ亦稀ナリ然レモ其吸攝ニ至テハ頗ル迅速ニメ或ハ直腸一部ノ疾患ヲ療シ或ハ其近鄰諸器ニ功力ヲ施シ或ハ他部ノ疾苦ヲ誘引シ或ハ榮養ノ品ヲ送輸スル等

ノ目的ヲ以テ人之ヲ撰用ス○爰ニ毎ニ用ル所ノ者ハ太約流動物ナリ以テ灌腸劑トナス然レ又或ハ坐藥阿片膏等ヲ用ルコトアリ

第三 口内及舌

藥物ノ使用此道ニ在ル者ハ太夕重切ナラス而メ其作用モ亦局發ヲ以テ標準トス然レ或ハ一二ノ鑛鹽金諸鹽 汞諸鹽及ヲ齒齦若ハ舌ニ塗擦シ以テ過發ノ作用ヲ致サシムルコトアリ

第四 鼻内粘液膜

嚏劑ハ此道ニ用ルノ方ナリ以テ其部ヲ蕩滌シ

或ハ腦病眼疾等ヲ誘泄ス

第五 呼吸器粘液膜

此道ハ藥物ヲ吸攝スル極テ速ナリ然レ之ニ由テ其部大ニ侵掠セラレ且劇甚ノ諸症ヲ繼發ス蓋爰ニ醫藥ヲ用ルノ標準ハ之ヲ氣状ニ為リ吸入セシメ以テ局部ノ疾患ヲ治スルニ在リ○人亦或ハ精微ノ藥末ヲ煙分スルノ法ヲ採ル者アリ然レ此法ハ唯喉頭ノ疾患他ニ良策ナキ者ニ於テノミ施スコトヲ得ヘシ

第六 皮膚

明百氏藥性論 卷之二 廿三無羅在丁舟樓

此ニ用ユル所ノ方法ハ或ハ局部ノ病患ヲ剋治  
シ或ハ他部ノ疾疢ヲ誘泄シ或ハ吸攝ヲ假テ過  
敷ノ作用ヲ致サシム塗液膏油散末糊劑擦劑等許  
多ノ製アリ以テ諸般ノ法ニ應ス

**以外皮法** 軟膏硬膏糊劑洗方汽浴等ノ如キ直  
下ニ外皮ニ抵觸スル者ハ之ヲ名テ外皮法ト云  
フ蓋此ニ由ル者ハ吸攝ナシト云フヘカラスト雖凡多  
クハ毎ニ局敷ノ作用ヲ致ス

**呂塗擦法** 此法ニ般アリ一ハ藥物ヲ胃津若ハ  
胆液ニ湿和シ一ハ之ヲ酒水及膏油ノ類ニ研調

シ手若クハ毛布ヲ以テ體上諸部ニ擦入ス然凡甲  
法ハ汚穢粘稠難惡スヘクメ且功益少ナキヲ以テ乙  
法ヲ用ルヲ以テ優レリトス○此法ヲ行フニ體中  
外皮最薄ノ部ヲ撰ムヘシ是其吸攝ヲメ迅速ナラシ  
ムレハナリ手足ノ指間臂股ノ内部及腋下等皆用  
ユベシ

**注證** 第六四 烏司篤兒按曰ク塗擦法ニ由テ藥力  
ヲ神經中樞ニ達セシメムト欲セハ正ニ神經夥  
多ニメ覺機穎敏ナルノ部ヲ撰ムヘシ足蹠胸側皆  
佳ナリ或ハ又藥ヲ乳房ニ施メ陰部ニ作用セ

シムル者アリ故ニ其地唯疾患ニ近攝セルノミニメ  
他ニ感傳ノ捷機ナキ時ハ之ヲ用ルニ適セス

**波内皮法** 此即羌膏ヲ以テ外皮ヲ剝削メ内

皮ニ藥ヲ傳フルノ法ニメ溶液熬膏散末膏油ノ類

皆用ユヘシ故ニ人屢此道ニ由テ植物鹽規尼斯的

等莫非ヲ施用ス然氏此法敢テ前法ニ勝ル者ニア

ラス間其吸攝ノ度ヲ推算スルヲ能ハサルカ故ニ却

テ宜シカラス又刺戟劑ハ其劇甚ノ炎症ヲ發スルカ

為ニ之ヲ用ユルニ適セス

**仁傳藥物于創傷及膿部法** 此法ハ唯局處ノ治

効ヲ要シ或其痊癒ヲ防ケムカ為ニ之ヲ用ユル者  
ナリ故ニ此道ニ由テ夫追發作用ヲ致サシムト  
欲スルヲ太夕稀ナリ而メ又之ヲ稱スルニ足ラス

**注證**第七 **吐却**却人 名曰ク藥物ヲ膿部ニ傳ルヤ

每ニ正ニ其症ノ新舊ニ注意セムヲ要ス蓋此

二症ハ藥効ヲノ太夕差ノシムル者ナリ

**第七 血管**

此即血管ヲ剔開メ之ニ藥液ヲ注射スルノ法ニメ  
藥物ノ血中ニ入ルヲ斯ノ如ク迅疾ニメ且確實  
ナル者ナキカ故ニ之ヲ以テ最良法トナスヘシト雖

凡如何セム術ヲ行フト太夕難ク又危険ノ繼症  
ヲ設スルヲ予ヲ以テ之ヲ觀レハ此法ハ特リ他  
ノ疾疾萬無一生ノ時ニ當テ之ヲ行フヘシ而メ  
又其藥物直下ニ血中ノ肉絲及蛋白質ニ抵觸メ之  
ヲ分析スル者諸酸及  
汞諸鹽及髮細管中ノ血液運行ニ  
形器底閉止ヲ致ス者ハ皆之ヲ用ユヘカラス

### 第八 糞液膜

此道ニ由ル者ハ吸攝極メテ迅疾ナリトス蓋刺戟  
ノ藥液ヲ糞液膜ニ注射メ其部ニ炎症及糞液滲  
泄ヲ起シ以テ新織質ヲ生下セシムルノ法ナリ○

此法ハ罩丸ノ膜水液瀦留スル者ニ施メ最モ良  
効アリ然レ此功理ヲ推擴メ腹水症ニ用ユヘカラス  
設使之ヲ用ユレハ險症蜂起メ遂ニ救ハレサルニ至ル

### 第十二篇

#### 論藥物分類之法

夫藥物ノ學ハ百般ノ品物ヲ網羅スル者ナレハ之  
ヲメ類ヲ分チ等ヲ伍セシメスムハアルヘカラス然レ其  
性質功能ニ於ル吾人ノ學識未夕豁然タル淹通  
ニ至ラサレハ則其取裁分類ノ法ニ於ル之ヲ良善  
ニ為サムト欲セハ復爰ニ許多ノ蹉跌ヲ生セサル

能ハス予今爰ニ古昔ヨリ成シ来ル所ノ者ヲ辨  
析セスト雖凡又一二ノ分類法輒近碩學ノ尚承順  
セル者ヲ揭示セムトス蓋此法四種アリ

第一 從於藥物之自然系屬

此法ハ其生成做成ニ論ナク皆系屬ニ從フ者ニ  
ノ天地ノ三有動物植物礦物ニ由ル

第二 由於其分析成分

此法ハ其分析會合ノ性質ニ由ル者ニメ酸類灰  
鹽類土類鑛類等ノ次序ヲ正ス

第三 資於其治病性効

此法ハ諸種ノ疾疚ニ從テ其畫指スヘキノ性能ヲ  
取ル者ニメ下劑麻酔劑興奮劑等ノ區別之ニ由  
テ生ス

第四 原於其健康作用

此法ハ藥物ノ每常定發ノ性効ニ原ク者ニメ而  
メ良善確實能ク諸法ニ卓越スト稱スヘシ然凡此  
定發作用ニ於ル吾人ノ學識尚僅少ナレハ其沮礫  
ニ逢フトモ多シ

烏司篤耳接人名ハ此般ノ分類ヲ為ス者ナリ予今  
之ニ倣ハムト欲ス是即藥物ノ作用ニ繼發スル活

體各機ノ變化ニ原テ其取裁ヲ定ル者ニメ學窓ノ研究病室ノ工夫等共ニ醫家ニ鴻益ヲ致ス者タリ  
此法ニ由テ藥物ヲ取裁スレハ先ニ般ノ大宗類ヲ生ス即一ハ其抵至セル地ノ造質及分析和合ヲ改變シ血液ノ調和身軀ノ營養ヨリ以テ分泌排泄ノ營為ニ至ル迄皆之ニ由テ其變革ヲ受シム此ニ屬スル者ハ變質劑解凝劑強壯劑ナリ一ハ其運為機能ヲ改變スルノ正能アル者ニメ神經系及血管系等ニ殊ニ多ク其力ヲ致ス此ニ屬スル

者ハ興奮劑麻酔劑等ナリ蓋此變易ニ側テ其造質モ亦改變スルアリト雖凡是多クハ較著ナラズ且若汗ノ關係ナシ  
尚爰ニ一種ノ宗類アリ諸般ノ外製物及秤量スヘカラサル物品之ニ屬ス光温電等而メ他ノ食餌總テ身軀ヲ營養スルノ性アル者モ亦一類ヲ建テスムハアルヘカラス  
此ニ由テ取裁スル所ノ藥物ノ宗類ハ左歎ニ開列スルカ如シ而メ其性能モ亦多少劇易ノ差等アルニ從テ再ヒ數箇ノ小區別ヲ生ス

宗類第一 變質解血之藥

宗類第二 強壯補血之藥

宗類第三 興奮強心之藥

宗類第四 峻厲刺戟之藥

宗類第五 腦及脊髓之藥

宗類第六 純毒物

宗類第七 榮養身軀之物

宗類第八 外襲物及不可秤量之物

毒物分類之法

諸般ノ毒物夫ノ毒物學ニ在テ其論說ヲ見ルノ品ハ則テ吾有力ノ峻藥タリ是ニ於テヤ別眼ヲ以テ之ヲ見ルノ能ハス唯其劇易ノ度ヲ定算メ始テ其命名ヲ異ニスルノミ抑醫タル者藥物ノ功害ヲ精覈スルハ是固ヨリ分内ノ事ナリ故ニ毒物ノ等伍モ亦分タスムハアル人カラス啞耳今拉名諸毒ノ分類ヲ定ムルノ左ノ如シ

第一類 刺戟毒

此物ハ其抵觸ノ部ニ刺戟及炎症ヲ發シ或ハ之ヲ荒蕪ス設使其量大ナルハ腦及脊髓ニ峻烈ノ作



用ヲ致ス之ニ属スル者ハ銅。各々繆。巽。沃。顛。莞。菁。巴豆油等ナリ

第二類 麻醉毒

此物ハ之ヲ用并テ其部ニ炎症ヲ發スルヲナク却テ麻醉昏睡。麻痺。搐搦。卒厥等ノ症ヲ起ス所ノ者皆之ニ属ス阿片。菲。沃。斯。亞。密。青。酸。等。即。是。ナリ

第三 峻厲麻醉毒

此物ハ炎症ヲ興シ又前物ト同ク麻醉ヲ致サシム海葱。歇。喇。篤。噠。斯。的。哩。幾。喃。箭。毒。醇。酒。燒。炭。氣。等。皆之ニ属ス

第四 解血毒

此物ハ血液調和ヲ變解シ精神知覺ヲ撲滅ス然レ其才智ヲ障クルヲナシ硫水素氣毒獸咬傷腐霉物等皆是ナリ

朋百氏藥論卷之二終

原百... 卷之二 四十一 每景... 舟...

凌海司馬先生譯證

從二帙至十帙嗣刻

明治二己巳歲三月刻成

日本橋北通十軒店



東京書肆 播磨屋喜右衛門發兌

