

醫傷科瑣言  
譚言

武  
546



門 賦 9  
號 546  
卷

自 新

同 心 同 德

欲 救 疫 病 當 用 精  
其 內 外 方 無 古  
今 唯 在 致 其 知

四 拾 五  
永 購  
十 三 日

丙戌仲秋朔望日為菽野生書

浪花中洲華園文獻



卷材瓊言目錄

痘症

脫疽

腸癰

下疳

懸癰

結毒

瘰癧

流注

陰瘡

腦疽

癰疽

臟毒

便毒

腎癰

咽喉痛 附口疾 欬 喘 咽 喉

肺癰

乳癰

傷寒發背

疔瘡

鬚疽

痔

囊癰

楊梅瘡

疔毒

多骨疽

附骨疽

癰疽

小腹瘡

石柏疽

翻花瘡

骨槽風

破傷風

湯火火傷

癩瘡上

合查毒

鴉掌爪

疥瘡

鶴口瘡

穿踝疽

腋瘡 腳瘡

疥爪

腦漏 名鼻淵

甲疽

天蛇毒

血血

腎囊爪

血爪瘡

龍泉疽

大麻爪

鼻痔 鎖鼻

齒痛

打撲

齒唇

頭痛

牙縫出血 血箭

膿瘡

頑瘡 則頑瘡

膿粟瘡

天泡

油爪

漆瘡

疥瘡

濕腫

面生紫黑斑

腳了

黑子

白亮瘡

凍爪

肺爪 疥刺 倒查 龜

白屑爪

竹木刺

癩疤

咬傷

銀印爪 七三十四三五六

手足破裂

眼胞菌毒

奶癬

火丹

雀斑

耳瘡

座席瘡

癩爪

爪文傷

枯筋箭

眼丹

棘氣

瘡掛頭

痘。

遺毒爛疔

赤遊丹

胎毒

痘疔

臭田螺

田螺泡

葡萄疫

誤吞針鐵骨破

天朱

雙胎串

走馬疔

鶴口瘡

黃水瘡

牙疔瘡

股痛

百虫入身

中砒毒

小兒痘疔瘡

重舌

痘瘡

火人口破

僵脚疔

陰虱

惡中叮咬

陰毒

配劑錄

李中丞通平一百十二症附醫譚添續醫譚則方

瘍科類言目錄終

醫譚目錄

尖朱

淋同膏

諸癩

金瘡

眼疾

整骨

放平

鎖陰

鎖肚

鎖吻

諸疔

婦人雜症

雜症

痿弱

及鼻毒

解顧結毒、車急痛、藏毒、及疔瘡、小兒生及張、腸痔、腐毒、取蟾酥法、遺溺、口眼喎斜、疔病、陰門破裂、弱死、危症、疔病、阿片取毒、廣義、歷節、田虫、刺腸脫、破傷風、出血、馬脾兒、氣腫、龜胸、白疔、陰莖、印疔、大頭瘡、指頭、大神、仙病。

合水堂配劑錄  
春林軒配劑錄

方函

版胎傳

產科回生術  
產科手術秘錄

匡範

某微解

春林軒膏藥方

メラノ海 蘭方

花皮茶サキサニニ支

紅花サキサニ四支

燒酎九支

右三味フラスコニ入口封メ仕用中世日ネリロロニテ茶氣ヲ出スル一日ニ一度ツ、右フラス

コヲ振リニセル則時置ツカハシ右封ヲシテ氣ヲモラサシム

膏方

ノ油 百六十支 黄柏三十支 石膏亦二十支 白物 廿支 黄麻 六十支

右ニツミラ 輝リサス

瘍科項言

杏岡萃園先生口授

瘡疽

瘡ハ壅也フサクト割シ相状ニメ六腑ニ属スルモノナリ血滯ルト血氣ヨリ廻ルエエ其形高ク腫上リ頂粟粒ノ如キモノツフクト出共根或赤ク或紫色ノ暈四辺ニ漫又痛甚ニケレテ節骨ニ微スル程ハナリ毒ノ在處後キ故膿ニ易ク又収リ易ク其状初起ル傷寒ノ如ク寒熱甚シク微腫シ腫モ浮致ニテ免角暴ニ発スルモノシ疽ハ疽也ハムト割シ相状ニメ五藏ニ属スルモノナリ毒氣隆クシテ血血ト比ニ病カ故ニ其故初起ニ高ク腫アカラズ粟粒ノ如キ者出テ痛ヲ知ラズ暈ハ廣クシテ龜甲ノ如キ色ニテ却テ瘡ノ暈ヨリハ薄ク毒アサキヤフニ見ルモノシ全瘡光沢ナシ此毒ハ傷状ナルカ故也只背重ク目ナリノ物ヲ負タルヤフニ覺エ初起寒熱アレシ拾別甚シカラズ免角諸症緩ナルモノ故初心ノ医ハ平生ノ腫物ノヤフニ思ヒ治ラ失ヒテ人ヲツコノウコトアリ日ヲ経ハ痛筋骨ニ微シ精神昏憤ニテ只氣ムツカシク面色青黄ニシテ脱状ヲ見ノ腐難ク収リ難ク膿モ清ク稀ニシテ臭穢ナルモノナリ且相陰ノ骨正宗ニモ詳ニメアレシ共診候ノ捷經ハ瘡瘡ノ陰陽ノ状ヲ以テ知ルヘシ亦知陰モ暑相染スルモノシ是ニ點ノ覺エラレシムルナリ膿管ヲヒライテモ痰水出テ粘膿出カルモノ陰状也是而疽也亦膿管ヨリ粘膿ハヤク能少ル者ハ相状ニメ疔瘡也凡此瘡疽ヲ生スル多ハ肥肝ノ人或膏粱厚味ノ物ヲ食スルニヨリテ血氣凝滯ノ甚ルニサテ五善七惡トテ五ノ善症セツテ惡症マリ正氣ニ詳ナリ些畧又七惡ノ内神氣昏妄スルハ極惡症ナリ膿管ハ二ノ惡症見ニテヨリ治ヲ施セハ救ハルレト膿潰スルヤセ又内ニ一症アラハレテモ御前ハナラズ也膿管ニ便任ニテナリハ常理ナリ痔瘻固ルモノ故舌ガ乾燥スルモノ也若シ乾燥ノ甚シキハ脱症且毒裏ナ



二階也亦不便敷大便不利八脱症也凡腫物皮肉變黑色ノハ是非二腐ルモノハ手術ヲ施サ入  
トモ自若ニ腐爛ノ取ラレ、也シカノミナラヌ四邊ノ生肉モガシツ、ハ共ニ腐ルモノ也然レ腫物ノ上  
辺ニ腐ハ毒氣滲ミト知レ、下辺ニ八脈流レ留ル故是非腐ル者ニ常也是モ血氣ノ虛弱故  
ナリ治法モ意ヲ用ヘシカ因腐取レテ赤肉ニナリ次チ二愈ヘキニ及テ四辺黑色ニナリ或ハ白膜ヲ  
生スルヲアリ正座ニ白表ト云テ漆麻紙ノ如キ者赤肉ニカ、リ赤紫黒點ヲ起スモノハ皆惡症  
ナリ今日カ、リソノ白表ヲ取テモ赤紫日元ノ如ク生シテ試取ルホドツ、内滅シテ長肉セ又  
數日如此モノノ遂ニ脱スルハ亦腐肉取レシ跡歟ノ皮ヲ剥タル如キモノ由シトス唯純紅ニシテ  
チヨホク、ト石槌莫ノ如ク長肉スルヲ吉兆トス亦腐肉ノミニテ膿ガシモ不出者アリ亦膿ハ  
大越出テモ腐取カキモノアリ何レ七八日迄ニ高腫セ十四五日ハ膿氣ヲアケ、者ヲ吉トス十四  
日迄モ膿氣チキ者ハ難症也九重キ症ハ八九日ノ迄モ珍貴リ慢腫スルモアリ此等ノ症ハ忌  
ルヘシサテ外術ハ先共中黃粟起シテガ膿氣ヲ含ム所ヲ瘡切ヲ以テ十字ニ割裂キ共肉ヲ  
缺ニテ丸ク切卷キ取ヘシ其瘡口ニ面ニ灸スルハ壯毅ハ正座ニイヘル如ク痛者ハ痛追灸シ不  
痛モノハ痛ヲ覺ユル迄灸スルハ勿論痛者余リ壯ク思ハ、多灸スヘカラス其時ハ左ノ瘡モ  
ナケレ此共灸大壯煩悶スルナリ亦何ホト灸シテモ覺サルモノ正座ノ雷火針ヲ用ヘシ亦燒慢ヲ  
能燒耐ニ度、浸シテ用ルヲアリ亦水綿ヲ燒耐ニ度ニテ瘡上ニ布キ其上ヨリ燒テモ  
アリ未膿直ノ前燒耐テ膿盡スルナリ其代ニ雷火針ヲ用ルヲアリ亦雷火針共レハ  
膿盡ニタルオモ毒氣早く引根ニ去レカ為ニ用ルヲアリ是モ隨テ火氣ヲ過サ、ルヤフニ  
二日ニ度シ日ニ度ホロ用ヘシ瘡口ヲ燒肉ニ腐肉和ラセニノ變テ陥ル處アリ是ハ瘡因枝  
テ生肉ノ處之若火氣過シハ變テ生スルハ生肉ノ長スルヲ知ラ又類ニ燒ハ生肉モ腐肉ノ

辨ニ關ル、ナリ腐肉生肉トノ差別ヲ知ラント致セハ二日クヲイ雷火針ヲ用テ腐肉相離キ者ハ一ニ  
日休ヘシ生肉トシハ亦肉次チ長シ腐肉ナレハヤリ望色ナリ何レ此雷火針ハ初心ノ者ハ根不可用ニ  
症ヨリ腫物甚々灸ニシテ病人温氣ヲ好ム者アリ兼、水ヲ乾シキキ油ヲフリ火ヲ付テ腫物ヲ  
照シテタ、ムヘシ但先ヲ助ケルノ術也正座對口疽ニ詳ナリ根頭項以上ノ腫物ハ灸雷火針此ニ忌ム  
ヘシ頭ハ諸疔會和經出ル故ニ火氣ヲ嫌フナリ亦腹下部ノ瘡疽ニ每湯ク腐リコムモノナトモ強ク灸  
スルヲ忌ムヘシ高ク腫上ルモノハ若シカラス正座ニ未タカテ下サ、ル、マイ灸スル、ア、レ、是ハ一切ノ  
腫物ノ軟痛スルモノハ宜シケレ此瘡ハ尋常腫ニ易シ且切肉ケハ毒氣外ニ免、始終ノ治瘡大ニ  
ハカドルナリ正座ニハ十日ノ針スルヲア、レ、甚選ニ此時、ハ專テ肉批スル程ニナケレハナラ、又也必ス期ヲ  
設ルヘカラス膏藥ハ初起ヨリ破軟ヲ貼スヘシ次チ生肉腐肉ニテ赤肉ニテハ左變ニ代フヘシ亦腐  
肉ヲ早く取ラント思フトキハ破軟ニ胆卷ノ末ヲ灸セテ貼スヘシ他家ニテハ終始左變ヲ用テ輕キ者ハ  
夫ニテヨクレ此重キ者ハ身又ルケシテ腐肉取難キ也フタ膏ハ先舞ヲ用テ是ハ腫物ノ瘡一ハ、ニ點スヘシ  
生肉長ク既ニ愈肉アカルトキハ瘡痕アルニハ些處、貼スレハ美ハ、ニ愈モノハ瘡反ノ色望色ナルヲ  
早速ニ膏ノ色ニスルニハ妙貼散ヲスルヘシ且諸瘡瘍ノ勢ハケレテ追々變スル症ニハ瘡葉ヲ外圍  
ニ布クヘシ方ハ色々アリ瘡科方書ニ出ヌ扱亦世上ニ瘍瘡腫ニ並ニ洗第ニアルアリ是ハ傷レサル前  
ニ宜シケレ此湯ヲ浴ハヤ、レ、スレハ破傷風見、痺腫トナリ或ハ流注久流注スル者ハ熱テ瘡收  
ノ者ニテ腫物也腐肉也唯膿出ルノミニシテ長肉ハルキニ至テ手足處之腫痛スルモノ  
ノ是流注也流注スル者ハ必ス死スルハ、次瘡ニ脱候見ハル、也時ニヨリテ洗第並ニ洗第スルヲ  
レ此其取ル瘡ヲ忌ム甚煩ムヘシ瘡蹄湯リ愛、故ニ手ハ根ニ用ルヲナシ或ハ並ニ洗第ニテ瘡  
洋ヲ用テ洗第ニハ燒耐ヲ用テ燒耐ハ、血ヲ去リ新血ヲ生スル功アリ故ニ瘡葉ニ代ル  
ナリ亦膿血盛ナルオハ瘡ノ四辺ニ膿汁流レテカフル、モノナリ其時ハ四圍葛根湯灸

敗毒散十敗、差ヲ荒汗ハシ古方者流ハ大青竜ナトモ用シレ免痛腫瘍ニハ石膏ヲ  
忌ム故ニ儘分石月ヲ減シテ用ヘシイカホト粘膠ニテモ石膏ヲ用ユシハ水腫ナルニ其時或  
附劑ヲ用ユシハ亦膠粘膠ナルニサテテクニクテ取テ后ハ陰陽虛弱ニ拘ラズ葛根加木附ニ  
伯州散ヲ兼用スヘシ毒ハクニキ症ハ奪命丹テリヤマカ膽酥凡十ト用ルニ若齒其ニテ便秘  
ル者ハ大柴胡内疎黃連解毒加荆防括用便通テラハ速ニ后服テ止ムヘシ痛強ニハ千金内托  
托裏消毒方中ニ乳波ヲ加テ用益テラハ甚故建中十補ノ差見合セ用ヘシ扱十四五日に至テ  
腫モ不高腫不出脈微細ノ身冷ル者ハ神起内托加鹿茸或故建中加附子或鹿茸附子  
酒亦ハ伯州散ノ角石ト鹿角ヲ鹿茸ニ代用ルモ佳也イツシ附子劑テ手強ク用ヘシ吐氣アルニ正  
宗ノ六君子力生姜陽心劑ソシテモ止マキハ吐所門ノ或理中ヲ用ヘシ若汗モ下ホトノ症  
少羊交ヲ用フシ亦陽アリトモ交リニ右膏ヲ用ヘカラス不得已ハ竹葉石月十トテ用  
ユヘシ何レ膿潰ノ后ニ古乾燥ニ渴甚ニキハ惡症ナリ吃逆ノ出ルハ尤凶也此ニモ色  
々商方アリ別書ニシルス傷肉取テ后変症ナキハ甚故建中人参養榮或ハ理中陽ヲ用  
ユヘシ丸ノ膠汁冬ヲ長用リ逆者ハ后ニ變症ヲ生スルニ附劑ヲ手強ク用ユヘシ十補欠カ千金  
大補ニ鹿茸ヲ加用ユヘシ何レ膿潰ニハ甚故劑ハ難カシ又ハサテ老人十ト大瘡ヲ患シ后健忘  
或妄語スルヲアリ然レ血氣ハ能調ユハ自ラ治也且瘡ヲ患テ后羊年モ一羊モ蕎麥油ヲ麥ヲ  
食ヘカラス或人三十斗ノ瘡ヲ患シ百日ヲ経テ蕎麥ヲ嗜喰セシカ翌年又此中斗ノ瘡ヲ患シ  
死スホ一人全愈セサル内ニ蕎麥ヲ食メ忽チ藺邑リタル者アリ入門ニ肥肝ノ人地黄丸ヲ多ク  
用ユシハ瘡ヲ愈ストルヘルカ試ムルニ庶幾ニナラサル也及々モ瘡危ニハ蕎麥油ノ麥ヲ多ク  
食スヘカラス可憐ノ  
合水堂先生 十敗 十補 托裏消毒

十味敗毒湯 每方治瘡疽及諸般瘡腫初起憎寒壯熱喉痛者  
柴胡 枳椇 羌活 川芎 櫻桃 荆芥 防风 茯苓 甘草 生姜 右十味  
十補湯 前千金大補湯也 每方治瘡瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或自汗盜汗或膿成而  
不潰々而不飲者 人参 木 茯苓 當飯 川芎 地黄 芍藥 甘草 黃連 薑 薑 支  
大產 生姜

十補欠 前千金大補湯中加附子 是即十補欠也  
内疎黃連湯 每方治瘡疽腫膿在熱作嘔大便燥結煩燥火冷噦呃心煩舌乾口苦六脈沉  
實者有力此非氣在臟也急服之 木香 黃連 山梔子 芍藥 當飯  
薄荷 枳椇 枳椇 連翹 大黃 甘草 右十二味

千金内托散 治諸般瘡腫膿未成者速散已成者潰敗膿出玉道之劑  
黃連 當飯 人参 芍藥 防风 枳椇 白芷 厚朴 甘草 鹿茸 金銀苓  
托裏消毒方 治瘡疽已成不得内潰者宜服此藥托之不成者可消已成者而潰腐  
因易公新因易生 參 川芎 芍藥 黃連 當飯 白朮 茯苓  
金銀花 白芷 甘草 皂刺 枳椇 右十二味  
神起内托散 當飯 木人参 黃連 芍藥 茯苓 夜苓 附子  
陳皮 木香 甘草 川芎 山甲 加鹿茸

治瘡疽項諸毒等瘡至十四日后當腐潰膿膿不作腐潰更兼瘡不高腫  
詳細考者  
六君子湯 人参 茯苓 白朮 國老 即四君子也 羊交 陳皮 加六君子也  
生厚 參 芍藥 大棗 生姜 苓 連 甘草 干姜

生厚 參 芍藥 大棗 生姜 苓 連 甘草 干姜

生厚 參 芍藥 大棗 生姜 苓 連 甘草 干姜

外科聖要  
方同











脱疽

正氣曰孫真人所謂在肉者刺在指則切而此病也一則脚背背下云亦脱疽也云暴卒之發也云然不  
者ナリ凡毒脚氣ノ様ニ足趾ナト痛ミ月日ヲ経テ発ルニ初起指先ヨリ赤小豆位ノ紫ノ色ノ泡ヲ生ス  
極メテ刺カ如クニ痛ミ爛爛ノ次キノ指ニウケル者也如此指一本ニ出タラハ先早ク生肉ト腐肉トヲ見テ  
ヨリヨリ谷ルニ此指上ニ出タル者ハキレ又故ニ腐肉ヲミテハサニ切リ取テ亦右ノ足ニ出左ノ足ニ移者アリ  
甚難治ノ者何レ腐肉深クハ治癒セ又テ亦癩疾ニ類似タル者也然レ此癩ハ不痛脱疽ハ痛公者也  
一人梅毒ヲ患エ化毒ニテ指ノ指ノ指ニ生ルニ如ク脚痛ニテ寒熱アリ三十七八日諸医ヲ  
チ尽メ治セ又因テ指ヲ斷フ診スニ脚股過羊腐リテ也皮ノ如クニ痛タル公ハ免角生肉ヨリ一尋  
ヒキナリ腫ノ辺ハ丸痛痒ヲ不知コトノ背死肉ナリ諸医是ヲ知ラズ只爪區ハキリ思ヒタルナリ予  
診ニテ是ヲ皆クルニ家肉共ニ指セサルヤフナレバ強テ是ヲサロヒテ云苦痛甚ヒカタリ思ナラハ止  
ムニ不苦ト思フク瘡治シテ遺スニハ病人モ餘リ難堪故強テ治ラ指ヲ斷フ即生肉ト腐肉ト  
同ニ針ニタルニ汚水ヲ出ス一升キリ予又紙條ヲ入テ先カヲ止ルウキニハマ脱疽ヲ可クハシ惡寒十  
ト出タリ針セザル内ニ補ヲ調合シテキタレハ右ノ手ヲ翌朝又是ヲ見ルニ股ノ内腐ル公ハ陽火傷  
状ノ如クニ水泡ヲ発ス又補劑ヲ手ニハレテ是ニ死ス又一人前腫劇痛六日又フノ不愈兜支ナトメ二十日斗  
モ引籠リ居ル内ニ痛忍テ是ノ大指下リ赤小豆ノ皮ヲ陽ニタミタル如クナリ頻ニ痛ニ指ニハ次指  
ニウケリタニクニ遺尿ニテ四指ニ及ビ小指ニ至テ外ハ趾ヲ欠テ腐落タリ大ニ腫ノ脈虛數  
盜汗出即ニ補劑ヲ子ニメ指ニハ腐落ナリ加テ一年モ服メ全治ニタリ其後至テ壯健ニナリ高野山ニ住メエ  
師ヲ以テ業トセリ免角脱スルモノ故治方ハ補劑身要ナリ若初起ニハ指ヲ切テ肝要ナレト人ニヨリテ種  
フモノナリ雷火針正氣ノ解毒火毒用ルニ初ニ腫カ毒ヲ抜テハ第一也瘡敗凡奪命丹ナト用ルニ  
治ニハ補劑亦金支加木補劑ニ消毒ナトヲ兼用スニ此瘡ヨリニ分逆ニ至ル其止ハ用エハカラス



瘰癧

瘰癧ハ瘰癧ノ初起ナキニ日久シクサシツ用エヘシ消毒ニテ初起者ハ化毒凡テ用フニ必凡テ用テ  
腫来ル者ハ不慮也骨ハ破破腐肉ナカレテ痛出タラハ左變ハ瘰癧ノ變也骨中黄ヲ取スルモヨシ  
化毒甚シクニ時々瘰癧ニテ瘰癧凡テ中ニ又リ四辺ニ中黄ニ辰砂亦ハ此瘰癧ヲ加テ貼スニ  
一婦人足ノ痛ム一廿六月次者ニ一ノ痛指上ニテあり解々腫ニ一ナル指ノ痛ハ却テ止ミ痛痒ナシ  
テ皮膚色紫色ニ変シ指ノ辺ニ及ビ指指上ニ針モ覺ヌシクエニ色黒クナリ脈虛數舌上乾裂裂口在指ニ脱  
候ノ見合モタリ然レ指神ハ正シカリニカ如此ナル一十日ナリニ死ス是モ脱疽ニ可也ハハ  
正解  
脱疽痛公者ハ未タラサレニ痛ヲミラサレハ腐リタレト ○脱疽ハ鷄骨ノ辺ヨリ来ル大患ハ  
不治也骨ヲ切リハ生肉カケテ切ルニ  
瘰癧  
瘰癧ノ甚シキ者早ク切ヘシ不然レハ則腐爛ナニカ又一婦人中指カマサル一十年疼痛不止  
指頭及先甚大発汗公瓜杖ニ腐去テ疼痛遠九テ瘰癧ニテ指ノ腐ルト早ク取又ト指五指  
ニ十腐リ及フニ  
瘰癧ハ瘰癧アリテ痛強ク瓜甲毀腐蝕スルニ破傷似テモ能ク似タル一マレレハ其終ニテ中黄ナ  
ト指ノ是ハ痛ニスナキニ亦奪ヲリフトナルハ胎指ト云大括瘰癧ニ似タルモノハ指同ニナリ  
瘰癧ハ指先腫テ痛ナラス  
甲疽ハ爪間ヨリ湯水入り腐肉ニナリ或ハ黒腐ニナルニ痛分シクナルモノナリ俗指又ヘキト云天蛇毒ヲ  
ツマハラミト云胎疽ヲ奪フト云又代指疽ト云  
脱疽赤ヲカケ久シクキレ又丁ナリ大ニ腫カタルニ若梯ナモノハ奪ヨリ限ニ切ヘカラス出血スルニ  
其肉淺クハ止メラレレ比指キモノハ謹テ切ルヘカラストメ難キ者ハ失張赤ヲカケ置ヘシ一瘰





中内膿スルヤフニテテ虚脱モテ死ニ至ルモノ何レナル者ハ非治ナリ  
瘰癧ノ頑肉ニ成テ内ノ高肉ニナル者アリヨク切開キタル寸高肉ヲトラ子ハ直ラサルモノハ腐ニ至  
テ至リ

瘰癧

瘰癧ハ瘰癧ニ生シ初起劇熱喉痛或ハ頭眩或煩ニ其色紫黒色也甚キハ頓近モ腐リ及フ是必死  
ナリ輕症ハ瘰癧モ格別セサルニ二條ハ瘰癧ニ似タレ又外ノ瘰癧ノヤフニ膿ヲナサハルナリ且此症ハ至テ  
稀ナル者ハ治法ハ初起ハ破刺ニテ紫銅加石或ハ苦硝大黃或ハ黃連解毒ヲ魚用スハ痛強ニキ  
ハ筋通ヲ魚用ス高ク腫レ腫ヲ減セントスルハ才敗カ或ハ瘰癧凡拵解ニスルイアリ膏ハ先鋒膿出  
ルハ左邊或ハ破刺ヲ用膿ハ流注ノ如クタラクト此レハ高肉多ハ瘰癧ナキヲアテルコトアリ腐肉尽タ  
ラハ才重膏ヲ貼スルヲマリ膿急アルハ湯毒灸ニスルヲマリ又桑本灸ヲ用ルヲモアリ何レ初起  
ニハ強ク解毒スハ若早ク膿口ヲアタキキ才ハ奇術アリ針灸ハ必ス忌ムハ太陽經ノ近処ナリ  
ハ針灸ト大ニ出血スル者ハ心膈ハキト

腸癰

腸癰ハ瘰癧血ノ留滯ニヨツテ生スヨツテ婦人ニ多ク男子モ貴人ニハケシ平生妾リニ肉食ヲ大過  
スルカ或ハ常ニ大ニ努カスル者ナト腸ニ瘰癧生スルカ故也婦人産後敗血汚滯メ此症ヲ患ル也初起ハ  
赤下ニ終ル者也腸癰ハ腫タル處ニ結シ且痛ニ上下エヒ、キ小使ニテテ淋疾ノヤフニ成ルナリ、出  
トモ初ハ八道ヒ心下エヒコムトヤフナリハナシハ鳥頭ノ子殺采ノ症ヲ終レ易ケレトモ腸  
癰ノ痛ハ常ノ腹痛トハ違ヒ是非アレカ上エヒツハリ才ニテヲサシハガシサハリテモ大ニ難ニ其塊  
變ニテ和ラカナル心ニテ腸癰ハ膿ヲナサレトスハ腫上リ便秘久膿トナラレトスルハ腸ニ腫アル故ニ  
腹ニ脹ヤリテ按スレハ底堅ク覺テ其症腹面ハイニ引リテ痛此時大黃牡丹ヲ用エシハ益痛強ク

ナレバ便膿血ヲ下セハ痛輕クナルハ初下ハ下血スルハナシ正第ノ大黃牡丹ト大抵同ニ場ノ第ニテハ  
便膿散ハ腹堅硬ニ内包コラテ又症ニ用ルハ腸癰ハ多ハ外エ腐潰スルモノハ内エ潰ルモノマリ慢症  
ノ丹王膿腫ハ極ニシレハ大黃牡丹トナト用エシハ必ス脱スルハ此ハ牡丹皮散ヲ用フハ角カ取ルカ或  
ハ僅下ノ後ノ腸癰ハ痛テ其痛處凝結ノ微塊ニ針ニテツク痛ニ存取ノ故ニメ上下エヒツハ  
リ且層括燥スルハ此症ニハ蓋以附子敗醬散ヲ用エハ凡テ意以ハ排膿ノ加アリ此症大黃牡  
丹ノノ症ニ比スレハ脈和ラカナリ産後惡露不尽ニテ三十四日モ経テ腸癰ト成ントスル者皆血散  
癰癰トト功アリ大黃牡丹ハ一月度不膿血塊ノ状ニメ數年ヲ経テ腸癰トナル者ニヨクハ腸癰ノ緩症ハ  
腹一面ニ五痛腫ノ在処ナリ痛按之ハ大ニ痛ムハ大黃牡丹ハ伯州ヲ重服スレハ一旦ニ二三月痛強ク  
メ血ヲ下ス者ハ消散ニテニエフハ又程急後宜痢疾ニ似テ膿ヲ下シハ膿エ水交リ下リ惡寒ナ  
カスルハ至テ種症ハ又内向外方エ膿ノ出ルヤフニナリテハ救レサルハ外エ潰ル者ハ其マニテ入マ又者  
ナリメイテヤニ危變ヲ用ヒ際ワカスヘカラス也一寸位サスハハ脱メ且痛ナスモノハ自  
然ト膿口ノ大ナル者ハ非ニ及ス又小産後ハ腹痛ニテ腸癰ニナルナリ此ハ胞ノハレハ大黃牡丹トニヨク  
産後ニ瘰癧カト疑似タル処ニハ其虛状ナルモノナシ大補ニ益母草ヲ加エ用エシハ止痛ムヲマリ膿ヲ  
桃核承氣ヲ用ルヲ加シ此症潰レハ陰門ヨリ膿ヲ出ス何レモセヨ初起ニハ大壯宜ニ虛状ノ者  
ハ身ニテ按セハ和ラカニテ病人大ニ思フ寒状ハ痛上下エヒ、キ拘ルキミマリ何レ膿潰後ニハ  
正第ノ排膿散ヲ用エハ十日モ世日モ連綿トメ膿及尽ハ大壯伯州ト用エヘカラス膿モ易キナリ  
脱状ハ必盜汗出時久惡寒ナトスルハ恍惚症ハ半年ニテ膿ニナルモノアリ内エ潰タリ便秘スルモノハ  
下サレハ變テ膏ニ及ス膿腐ルハ膿ヲニ三度下レテ止ム者ハ宜ニ腸癰ニモ痛瘰癧ヲ作アル者ハ食スレハ  
痛ヲ若者アリ又小産後ハ初第残リテ外瘰癧ノ状ニナリ腐出ルヲナリ多クハ腎ニ未テ腐ルモノナリ  
又内服ニ未リテ腐リタル者ヲ見タリ小産後ハ初第ノ有血ヲ吟采スハ何レ膿潰後ノ治法



瘰癧ノ前死セル由及ヘリ此腸瘻ノ瘰癧ハ予カ在明ニテ未嘗ノ一術也他ノ外治ニ決ミテ知ラ  
ルヘカア真ノ瘰癧ト云ハ婦人唯産ノ時キハリ出シ又ハ痲疾治或ハ小兒ニ多キ者ハ是肝門ニ三寸モ  
縮出カ者ハ是ハ病人ヲ助サニテ括卷ノ未ヲ肝ニ又リ能テ以テ押込收マテ調和益ヲ使入  
テ益ニテ無スハ並陽ノ補中益氣如赤石脂ヨロシ並肩ノ行ハ痛ム也或ハ之行ハ少ハ是腸瘻也  
内ノ瘻毒ヲ取ラテ子ハナラヌハ瘻毒ハ肝門ニ八重皮中ニアリテ其狀極目カ胡ノマフナル里色ノ  
カタリトモトモト是ヲ取テ其處出シタル肉ノ中ニアルイゴクヲ殘ラス取テハ外側ハ切ヘカ  
ラス誘テカヲフルハ大ニ腫痛ニ出血スル者ハ且動脈アル處ヲ切ヘカラス腫痛ノイゴクハ六七枚  
枚モアルオハ六六度ニ切ヘシ切様アヒ血メハ止血也并チ瘻切テ石胆ヲ行ハ出血甚クノ葷割スル者  
ハ此瘻瘰癧セルと思ク病人ノ腹中ヲ能トエノ大便モ其ノ元モ宜シキ時ヲ待テ治ヲ施スヘシ治  
メ后一日ハ便ヲ行テ葷割テ又其毒ヲ能クテ余リ瘻キハ腸管スルヲ能ク得テ且其切テモ其日又ハ  
七日モ経テテキリ病入ノ瘻瘰癧ヲ能クテハ葷割ハ調和益治法ハ治瘰癧スル三日以前ヨリ葷割瘰癧  
痛マクノ瘻瘰癧者ハ葷割解法ニナト用ユヘリ九テ腸瘻ハ括卷ノ肝門ニ敷シテ下血スル故治瘰癧者ハ  
氣漏シテ瘻漏ナリハナラサル然レ此百人ノ内ニハ三人ハ此瘻トナル者モアリ瘻漏止瘻瘰癧者ナリ  
是ハ免角漏ナリヲカケテ破飲或ハ枚毒十ト付テ瘻内ヲ取血スヘシ此ノ數有テモ肝門ニ通リテ  
瘻管ト云ハ左右一ツ宛ヨリ外ハナシ跡ハ瘻管ノ枝ノ能ク瘰癧ヲ掃リ瘰癧治スヘシ在肝門子ハ外  
ノ穴ノカボトヨク人血タリハ此毒毒毒毒毒此血流シ未テ瘻ノ及ルニ蘭説ニ瘻ヲ切ルニ肉ヲニカヘ孤胆田  
ナアリテキレハ痛ヲ知ラストテ是ハ一向莫受ニクテキ説ノ如何トナレハ肉ニ切ラテタテモ内マ  
テニハ有テラ又カニ切ラテタレハ切ニキモノハ必ス此瘻ナル説ハ迷惑スヘカラスサテ近年塗ラ  
テテハ瘻ヲ切ルハ是レ説ノ難ニ各其手裡ニ切レハ患モノハ苦レシニモ相テラス

治也凡瘻漏病人瘰癧ニナリ自汗盜汗寒熱瘰癧未能ニ教ニナリ其漏ノ四辺些黑色テ水腫多キ瘻ハ瘰癧  
スヘカラス是ハ瘻ノ瘻物ノ先ク瘻ノハダツタワルトモ瘻ノ門ニ入親炙スル一二年ノロヲツマサレハ其妙ヲ觀  
テ不能ハ其瘻ヲ述フ ○瘻ハ漏ヨリ出スルハ瘻瘰癧ヲ一寸ク切リシ如キ出スルハ此瘻肝門至テ臍  
キ者ハ瘻ヲ肝門瘻ノ下ニ出テ下ニ漏ナク此等ノ瘻モ治法ハ同ニテ一寸ハ大瘻七八日ニテ愈ルハ金匱ノ肝  
瘻中一ツ瘻ニ葷割ヲ用ルハ此瘻治モ口瘻アリ門ニ入テ口瘻ヲ瘻クヘシ  
瘻漏ナリ割テ出血不止者ハ快勝ニテモ無知如何トモスヘキヨフナキニ硫黃世ニテ鉄餅ヲマキ患處ニ貼  
内瘻四物皮消ヲ用ヘシ能レモハ血ヲ止ルヘリ何レモ手術ニアルヘシ  
瘻瘰癧ハ瘻漏或ハ瘻瘰癧ヲ患フル者甚多是ガノ漏ノアル者瘻瘰癧ニ依テ一瘻ニ瘻ル者ト見ユ予先年  
此瘻ヲ治テリ瘻瘰癧治六六日ニメ瘻ニタルハ故ニ葷割瘻割ヲ用テ瘻ヲ得タリ  
及花瘻 ○此内瘻キ者ハ善瘻也如瘻及花ヲナスト瘻瘰癧管ニメ且管アリテ膿汁出ル者ハ瘻瘰癧  
或切リテ血何種瘻ノ丸丸思ルハナカシ最善強弱ヲ察シテ治ヲ施スヘシ今瘻瘰癧ニテ大ナル瘻ハ後瘻  
内瘻瘰癧ノ口瘻一婦人北ナ余右ノ類ノ内瘻ニ患ス根ハ少シニテ如何瘻上尖ハ出血不止ニテ瘻ニテ丸リ瘻タ  
リ血金鎖ニ瘻連ナリ  
瘻瘰癧大ナル者且難取ニ三度ニモ取ヘシ瘻内ニヤハリセツロニナカスヘシ葷炭膏肺欠瘻瘰癧ノ及花ニ  
タル者此ヨリ外ニ出テ長クニナリタル者ウカワニ斷トキハ出血スルハ故ニ鉄鑽管ヲ紙ニ貼メ其根ヲ卷  
テ其上ヨリ葷割クヘクヘクハ切ルハ連ニテ切テ丸タハ出血スル者根ヲ取ヘシ瘻瘰癧初起ハ瘻ヲ鉄ニ切  
リモ引ニヒツカケ取ヘシ而後ニセシトニテ用テ瘻ヲ瘻クヘシ失テ割カヘシ出血不止者ハ快勝ヲ瘻割スヘシ大  
瘻七日位ニ取テ盡スヘシ瘻ハ自瘻可シ最善瘻散每度刺入可シ  
瘻漏肝門ノ邊ニ面ニ瘻ルハ瘻瘰癧一度ニ切ヘカラス幾度ニモ切ヘシ一度ニ切斷スレハ瘻瘰癧ヲ起依テ瘻  
瘻々ニスルハ瘻ルリナシ凡テ何ニテモ瘻ハ瘻瘰癧ハ瘻ノ瘻ヲ能ク瘻ルハ瘻ノ瘻ヲアルヤ瘻ヲ見ヘシ

あつかり初ハ痛ハ既通ナシ鐵月カニテハ痛モナシ速ナレハ血止律キ一ツ可考  
按律ヲナタトキヨク落血ヲ採リサレハ免角鼻皮ノ中ニ升ス直腸近ユクシ先ヲ付ヘシ  
疣痔ニ及花アリ散敷子ノ如ク赤ク肝門ノ口ニテリ腸痔ト相似タリ門生曰腸痔也ト先生日是疣痔  
ナリ今及花ニテリ切取テ血ヲ多ククテ置キ過ナシ  
痔漏気血ノ新内律生者鮮甲在變ヲ察ス  
腸痔ハ八參養菜一ヲ用或苦飯膠艾一或ハ三黃地黄一治瘡メ后ハ調和血ヲ以テ毒之脱  
血甚香縛血散四物一加身皮梢 痔漏根ノ大毒ヲ瘡ノ後終始凡寒ヲ堅ク嚙スハ凡温瘡  
ヨリ變入テ破傷凡ホノ大毒ヲ免ルシ予巳ニ三人瘡痛ヲ免セシトス者ニ會エリ  
痔漏チ切テ後疼痛ヲ免ル者ハ在變ニ乳皮ヲ加イ貼ス  
痔漏免ナレハ一日ニ二度ニモ及フ者ナレハ常ニ心ヲ和ルニ生肉ノ生ニタル先ヲ變崩サ又  
様ニ斷々ニ引カケンニ極毒スハ腫物ノ様モ同シ此ハ痔瘡一ツ  
肝門ノ中ニ痔ノ出来テ便スル寸腺ノ出ルヲ内痔ノ者也其内一痔ノ際ニ出来ル瘡毒  
ト云モノアリ是ハ至テ難治ナリ其内痔戎ハ左變ヲ入テ一鹿城此瘡毒ヲ瘡セラシニ裏人  
養藏一ト申テ貼ス  
一ノ痔ヲ切テ留ホトトハ血出テ不止犀角差ニテヤミシ節ノ如クニウキアリケシハ何シ先ノメリ  
リ要コリ附マシハト思ヒ糞武一チキハ此先應メ再ト出サリト先ヲ付ヘシ  
痔ノトクモ毒ノ付様ニテ大ニ治ハ治後急ナル免角鼻上愈ノセ又ヤフニスズシ又痔疣ニモ  
本穴ト板也カマリトテ直サ子ハ治セ又シ  
鼻痔ノ鼻ニアルハヒツカケニテ引出シ置コソリニテ切ヘシ此ニセントンテ附ルシ其鼻ニアリシニ  
ロヨリ指ニテ推シ出シ置鼻ヨリトテラシシコマリ

痔モ此ノ痔ノ肝門ニ微セ又モノハ八參養菜ヲ入テ切斷セメ此愈ルシホタトエ肝門通ラ又此通サ子ハ  
ナラヌナリ見合ヘシ  
鼻痔ハ一林ナラズメ数多クモ生ルシ皆其根ヲ切ヘシ其痔ヲ免引ニテハサミチキ缺ナレナレハ  
ヘシ但シ大根毛引ト缺長カヲハカリ置テ入テ否則缺ノ行處知シ又クカマハ久鼻ニテ切ルヘシ  
但シ鼻ニ通スハ是ヲ度ト止ム其内ヨリ先ヲ付ヘテ有無ヲ見ルヘシ  
腸痔ト便後先ナル處トヘシ其内肝門ト切テハ毒ヲ免ス。痔ハ鼻スルト先ノエカミテ出ル者  
アリ世上海毒痔ニ云ハレ甚思シ。痔ハ鼻ノ付ルヲ甚先ヲ付ヘシ先エキフタラト決メ直ル者ニ  
非ス其内何毒ニテ先ノエキツノ多キハ其内一ツニ先ト付ヘシソレカ一ツ愈ルト先減メ又好愈  
易キ一ツ一度クニ直サレト思ハ切テムツカニキナリタラエハ此三ツヲハ其内一ツヲ一ツ先ト  
先ノ先ノ付ヘシ外ノニツハサツク先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ  
三ツ一處ニ直サレト先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ  
蓋ニテモ其通リテトヨク先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ  
藏毒ハトテモ其降也次膏ニ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ  
ハ大毒散ト肝門ヨリ入ルヲナリ何レ外痔ニテハエカ又ナリ服藥ヲカレヘキ人米ナトエフヘシ  
腸痔疣痔ヲ免ル者ナリ又截リ割キ見之則小血黒血ナル者ナリ是毒根シ経日流浸メ大害ナラズ  
其色紫黒ナル者痛本出其肉也不愛者痛苦多ヘ難ク或ハ常ニ出血多キ者ナリ瘡底布紙鹽乳  
而此不許拳動不然血流出浪華ヨリ赤ル痛人如脱肝四五寸餘ニ出テ不收先枯膏血ヲ陽毒  
ニ浸シ和ラケテ呼吸ニ從ヒ收胎ノカラテ綿ニ包ミ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ先ノ先ト付ヘシ  
先出芽ニ八醫王加番脂也  
一人痔ノ十年余ノモノイタレリ肝門一面ニ腐リタリ切テ愈タリ血出不止八則燒コテヤクヨミトテ

一人痔ノ十年余ノモノイタレリ肝門一面ニ腐リタリ切テ愈タリ血出不止八則燒コテヤクヨミトテ

ルナリ。○痔ナト及花をヤフニルト難治也。取テモアリ。蓋スルモアリ。○肛門ヨリ膿ノ如キ子バキモノ  
出ルアリ。是ハヌマリニテ膿ニテアス。痔ナトニ出ルレバ。肛門ノカラス。○腸痔ヲ印テ大ニ脱血。脈冷。絶脈ニ  
至ル者。リ。故ニ大便ヲ禁ス。シテ内服ヲ禁ス。アツケリタルモノハ痛モ少ク。血モ大ニ出ヌ。又シ。○先生曰ク  
腸痔ノ名。出テ金破。傷濕ノ名。非。絶ニ少。○瘻。此。瘻ハアマリ用ル。ナク。レバ。カヲ。カニ。テ。マニ。ケ。ニ。甚  
シキ者。用ル。フ。モ。アリ。腸痔。極。用。ユル。モ。アリ。○腸痔。大ナル者。ハイ。ク。ツ。モ。糸。ヲ。カ。ク。ベ。シ。  
○腸痔。印。テ。治。痔。痛。ヲ。免。ル。者。ハ。左。變。ニ。乳。皮。ヲ。加。イ。貼。ス。ツ。腸痔ノ。變。見。ニ。無。患。子。一。果。爲。瘻。  
羊。羊。ニ。有。知。○痔。漏。已。ニ。初。テ。後。落。穴。ヲ。免。テ。有。ツ。見。出。シ。タ。ラ。ハ。糸。ヲ。カ。ク。ツ。身。切。タル。キ。ツ。ノ。則  
愈。シ。テ。中。漸。ス。ヘ。シ。此。穴。ハ。甚。多。ク。落。穴。ハ。必。ツ。ツ。且。ツ。其。穴。セ。ツ。モ。ア。ラ。バ。其。遠。キ。穴。ヨリ。先。切。リ。愈  
ス。ツ。シ。次。第。ニ。落。穴。ニ。及。フ。ツ。○先。此。處。ヲ。切。リ。四。五。日。経。テ。次。ノ。所。ヲ。切。リ。中。云。ヤ。フ。ニ。行。ニ。行。フ。ツ。  
然。レ。臨。時。ニ。色。々。ヲ。練。マ。リ。其。内。隔。キ。ハ。六。ケ。シ。キ。ナ。リ。○如此也。一ツノ。頑。肉。ニ。穴。ノ。ミ。ア。キ。タル。モノ  
アリ。頑。肉。ノ。高。キ。處。ハ。カ。ラ。ア。シ。ス。ニ。ラ。ト。リ。其。ヲ。切。リ。落。穴。ニ。及。フ。ツ。落。穴。ノ。十。キ。ハ。絶。テ。十。キ。ナ。リ。十  
キ。ハ。匠。ノ。程。リ。后。必。ス。花。ス。故。ニ。肛。門。ニ。及。ハ。ズ。シ。テ。愈。ル。ヲ。ナ。シ。又。至。テ。穴。ノ。ミ。シ。レ。難。キ。モノ。モ。技。ヲ。サ。シ  
置。通。ル。レ。始。メ。ノ。頃。ハ。肛。門。ニ。通。ヌ。モ。アリ。又。直。ニ。ア。キ。テ。肛。門。ヨリ。糸。ヲ。ア。ケ。テ。難。キ。アリ。是。ハ。く。ハ。ウ。シ  
ニ。ラ。切。ツ。○虫。痔。甚。者。方。 雄。黃。一。錢。 芥。菜。葉。五。分。 苦。楝。皮。三。分。  
右。箱。ノ。内。ニ。火。ヲ。入。シ。蒸。ヲ。入。ヤ。リ。其。箱。ノ。蓋。ノ。上。ニ。穴。ヲ。ア。ケ。テ。其。穴。ヨリ。蠶。入。ナ。リ。虫。必。ス。死。ス。  
痔。漏。ノ。膿。ヲ。フ。ク。ミ。ア。タ。リ。フ。キ。通。ル。才。ハ。及。テ。イ。シ。又。フ。キ。タ。ラ。イ。テ。ハ。ユ。コ。又。シ。其。内。サ。シ。ハ。フ。キ。タ。ラ  
ヌ。ト。必。修。テ。通。サ。ヌ。マ。フ。ニ。ス。ツ。血。出。ル。後。ニ。ス。ル。ハ。過。ル。ナ。リ。フ。キ。過。ル。ト。自。第。ヲ。貼。ス。直。ニ。痛。ナ。リ。ス  
ヘ。テ。心得。アリ。一。藥。ニ。論。ス。ヘ。カ。ラ。ス。下。手。ニ。ス。ル。才。ハ。卷。皮。ニ。ナル。モノ。ナ。リ。梅。丸。ノ。アル。モノ。ハ。愈。ル。フ。ツ。  
○痔。ニ。ニ。重。痔。ト。ム。ハ。○如此。ニ。下。ニ。隔。アル。ナ。リ。上。ヲ。キ。リ。テ。后。下。ヲ。キ。ル。ツ。然。レ。始。ヨリ。レ。レ。ル  
モノ。故。ニ。久。客。ニ。テ。下。ツ。ラ。フ。キ。ル。ヘ。シ。八。髒。骨。邊。迄。モ。隔。ル。モノ。シ。又。落。穴。ノ。至。タル。處。テ。瘻。シ。置

其。支。元。能。行。テ。行。テ。故。ニ。ノ。爲。テ。血。シ。置。ハ。遠。方。ノ。穴。モ。イ。エ。ル。難。ナ。リ。又。矢。ニ。テ。攻。テ。膿。ノ。サ。バ。ケ。ル。アリ  
カ。タ。ツ。フ。別。ニ。二。重。穴。ノ。如。ク。ニ。枝。元。ヲ。出。ル。レ。モ。アル。モノ。ナ。リ。故。ニ。必。ス。多。ス。ヘ。カ。ラ。ス。○腸。痔。ナ。ト。ノ。第。ハ。麻。ヨ  
シ。結。ハ。モ。ツ。シ。易。シ。痔。漏。ハ。キ。又。ナ。ラ。デ。ハ。内。中。ニ。入。ル。ヤ。フ。ニ。痛。者。ナ。リ。亦。痔。漏。テ。後。糸。ニ。ツ。ケ。ル。フ。ナ。リ。腸。痔。ハ  
高。第。ヲ。付。ス。頑。肉。ニ。テ。キ。レ。難。キ。者。ニ。糸。線。ヲ。用。○痔。ナ。ト。印。テ。血。ノ。度。々。出。ル。フ。アリ。五。若。也  
痔。ノ。名。自。ラ。サ。カ。ニ。傷。ノ。處。ニ。ア。タ。ラ。ヌ。ヤ。フ。ニ。ス。ツ。シ。肛。門。ノ。方。ヨリ。入。ル。ツ。レ。ヨ。リ。傷。ノ。方。ヲ。サ。ヘ。又。ト。痛  
ム。ナ。リ。肛。門。ハ。背。ノ。方。ニ。アル。モノ。シ。脱。肛。ハ。枯。骨。水。有。第。ニ。テ。浸。シ。ヤ。ハ。ラ。ケ。未。ヨリ。収。ム。ツ。必。呼。吸。後。ハ  
ガ。レ。ハ。難。キ。一。身。ニ。テ。入。タル。處。ヲ。イ。テ。又。ヤ。フ。ニ。サ。ヘ。ナル。ツ。枯。骨。ノ。膏。け。ヲ。ツ。ケ。ル。フ。其。妙。劑。也  
納。テ。后。大。便。通。シ。難。キ。ハ。蠶。並。身。導。爲。ハ。鏡。ニ。テ。ソ。グ。ツ。細。腸。ノ。州。ハ。本。ヨリ。入。ル。ナ。リ。然。レ。大。抵。同  
シ。様。ノ。心得。アリ。○瘻。痔。ヲ。治。メ。后。硝。砂。散。ヲ。セ。ワ。レ。シ。后。ニ。隔。ル。フ。ナ。リ。○痔。ノ。及。花。高。第。ヲ。用  
ル。フ。アリ。○瘻。痔。ノ。痔。キ。者。ハ。喉。ヨリ。指。ヲ。サ。シ。鼻。ヨリ。サ。グ。リ。指。頭。ト。相。合。シ。テ。切。ル。ツ。シ。イ。ツ。シ。鼻。ヨリ  
セ。子。バ。ナ。リ。又。シ。其。内。ニ。三。度。休。テ。ハ。サ。ミ。タル。ナ。リ。指。ニ。テ。咽。ノ。腫。ル。故。ナ。リ。○口。痔。一。婦。人。戴。セ。十。余。リ  
右。ノ。頬。ノ。内。裏。ニ。生。ス。根。ハ。細。ニ。メ。如。内。上。ハ。大。ナ。リ。切。ハ。出。血。五。止。メ。綿。ニ。テ。扎。リ。落。タル。ナ。リ。ア。ト。金。銀  
ヒ。黃。連。一。○色。紫。色。ニ。細。絡。モ。ト。フ。テ。アリ。○痔。上。通。メ。耳。鳴。目。カ。ス。ニ。髮。脫。タル。程。ノ。フ。アリ  
亦。痔。ヲ。印。テ。治。ハ。必。ス。小便。閉。ス。ル。フ。アリ。是。ハ。導。水。管。ニ。テ。取。ル。○瘻。痔。ハ。缺。ニ。テ。切。ル。ツ。シ。中  
ヨリ。出。ル。者。ナ。リ。亦。内。ニ。出。ル。者。モ。アリ。痔。疾。ニ。桂。枝。ヲ。用。キ。者。ナ。リ。此。ニ。羊。交。ノ。未。ヲ。生。姜。け。ニ。テ。切。シ。貼  
ス。シ。ハ。又。層。積。ニ。増。ナ。リ。其。處。ヲ。自。分。ニ。痒。ヤ。フ。ラ。セ。テ。巨。鮮。木。一。ニ。テ。洗。フ。ツ。○痔。漏。膿。管。ヲ  
見。ニ。口。搜。アリ。左。右。十。程。アレ。凡。膿。管。ハ。左。右。ニ。此。穴。ナ。ラ。テ。ハ。十。キ。者。ハ。直。腸。ヲ。見。分。テ。治。テ。施。ス。ツ。○  
然。セ。カ。ル。中。ハ。知。テ。害。ヲ。招。リ。ナ。リ。採。リ。ニ。テ。落。穴。ヲ。サ。グ。リ。傷。リ。直。腸。エ。可。刺。度。也。○克。穴。ヲ。見  
分。テ。治。肛。門。ニ。切。リ。過。ム。シ。余。ハ。口。後。○腸。痔。ヲ。瘻。ス。ル。ニ。血。出。ル。者。ハ。其。痛。ナ。リ。水。血。走。リ。出  
ル。ハ。難。候。也。

下疳

下疳陰差ノ癆ニシテ方變ニテ陽氣ニ係ラズルニ痒キ者、毒淺ク痛強ハ毒深シ必ス痒キヨリ  
 ノ痛ニ至ルノ旨ハ中筋左變或ハ破瘻ヲ付直リ、大解毒的ヲ兼用スルニ一通リノ下疳ハ口フサハ口  
 ハハテニキテルモノナルニイ松ノ洗藥ハ用ユヘカラス長寄處ノ醫院藥ヲ用エシハ是ハ治癒ノ功夫ナシト  
 ナリシ其藥ハイヤ知ラヌト思シテクノ喉嚨下疳ノ腐爛強キ極ニハ口ウサハロニテ此ト正宗ノ珍珠散  
 ナリ用ルニナリ或ハ連綿トシテ亦愈長引モノニナルニイヤナリ用エシテ神起ノ内ニ用ユレハ及テ害  
 便毒骨痛或ハ耳目板工互側ノ變証ヲ示ルニ慎ムヘシ此エケヒニヤコシ極モ用ルニ内兼ハ本附劑  
 毒肉或ハ七室ナル用ルニ甚妙ウシト疰ハ大葉劑ヲ強ク用ユルノ肝要也茲ニ其方ヲ示スルニ甚妙  
 リ大解毒的の最妙アリ亦年々長引テ愈スル症ハ八室丹化毒凡ナリ用ルニ陰差ニ  
 結毒ニ存用テヨシ故テ疰ナレ能シシハ愈易ニ亦淋ヲ示タル下疳ハ解毒毒一八正散ナリ用ユヘシ  
 妬積癆ヲ示アリ是ハ房室ニヨラヌ自然ニ生ルニカキキ症ノ神起藥粒ノ如キ者四ツ出テ  
 大ニハ口ウサ及骨痛ニモ至ラヌ其後治癒者ノ疰癆癆治モ手段多キナリト氏先ツソノ大  
 畧ヲ述ヘテ示ス

医譚

癩毒

下疳ヲ患テ陰差ニ凝結ル者アリ乱刺メ血ヲトリ中葉ヲ取スルニ或ハテ弟ヲ用コルモアリ凡テ  
 ナ弟ヲ用ルモノ先知カキ及陰心ヲ用何ニヨラス陰心ヲ用ヒ心ヲカスカニテ可用

毒毒ノ蠶毒ハ毒ノ極烈ヲ折者ニテ全功ヲ得ルニ疰ニ先生曰毒毒膿水尽テ治久ニリ肌肉  
 フ生セサル者ハ蒜ヲ摺爲泥患處ニ貼シ其上ニ燒金ニテ毒々ニ殺スヘシ若キ蒜ナキ寸ハ葱白  
 ニ代ルモ功アルシ附骨疰治ヲ施シテ疰愈ント欲スル寸愈サル者ハ陰虛ノ附子一枚爲末  
 瘡上ニ付テ其上ニ灸灸ス陽氣助ケヘシ

毒毒ニテ疰ノ核ニ凝結シ破瘻ノ瘻ヲ付テ疰ノ腐爛セテ膿ヲ取シカハ口ウサハ口ウサニコササ  
 置ハ破瘻第一如リニ取ル者シ若シカシク瘻者ハ蜜陀鉢極刺テ漸ク取ル者ナリ蜜陀鉢又  
 ノキ也 ○毒毒強ク頸上凝結者或厚膠粒ヲリテ頭痛不レ者多シ加木附細辛防凡一或消毒  
 葛根木冬附料モヨシ ○同症 山午陽ニ天石應鐘ニテ音功アリ

疰癆疰ノトノ疰ニアルノハヤシ、然シ痛ヨリハマシク痒ニモ苦凶アリハ高クハ疰ハ五愈其内  
 平テリテ疰ハ愈ルニ ○疰癆終リニ天カク使毒ニナル者又々マシク先使毒ニシテ毒丸ノ別ニ腫  
 出テモアルモノハ後毒ナド付テ之キ置ヘシ治ハカララシカ極テモサスベシ者捨置テギルト血毒々  
 出テ止メ死シ至ル者ナリ ○陰差ニ穴アキタルハ再リ易シ在上ツラ故シ下疰ニアキタルハ易リ疰  
 シカ水腫ル故シソレユエ上ツラニアキタルハ毒サエケレハ又イヨセテヨキシ ○師曰下疳腐爛  
 臭甚不可近擗ハ大患ニハ下疳初集七毒著ニテ無治癒者ハ毒毒ヲ用ルニ或人問曰下疳臭  
 甚下疳オレハ下部ニアリ毒毒トリスレハ上部ニイリ然ルハ必ス先ツ疰可見上部ニ毒毒ハ毒毒  
 不審、尤ノ下疳腐爛臭甚メ諸毒無功位ニシレハ必ス先ツ疰可見上部ニ毒毒ハ毒毒  
 陽毒癆力或ハ向目差明或ハ臭中乾燥カ咽喉カ命症必頭、疰ナリ故ニ上部ノ攻毒ハ毒毒ナ  
 カケ上部ニ取リ下疳腐爛臭ハ下部ニテ下疰毒一ニテ取ルニ上下ニ毒毒ヲ一ツニテ疰スルニ醫ハ  
 結毒ニ主木疰ヲ子ヲ内リ毒毒ヲ節シ外ニ毒毒ヲ解テ毒毒ニ毒毒カ毒毒及ニハ毒毒ニテ疰破リ破瘻ニ  
 テ毒毒ヲ吸取ラヌ先毒毒何ノ異ナルナリヤ夫毒毒毒毒葛根加大黃一ヲ下疰毒毒ニ  
 用テハ甚妙ニ方愈解ニ疰ニ束同子已ムテ疰得メ用タリ疰十ニ故ニ毒毒毒毒毒毒丸ヲ兼用ナ  
 リ無腫ニ下スルニ取ラヌ免疰解疰ニレリハナキナリ ○毒毒骨疰ト云モノ皆敗辰  
 脂膜中ニ溜リテ疰スルト見エタリ 中村先生曰以上數下疰トコラス協斷スヘシ生肉ハカ  
 ケヤテ疰毒癆ノ瘻ニ疰ヲ術ハ別書瘻材口瘻中ニ出

便毒

便毒ハ市俗ニ云ヨコ子シ左ラ便毒ト云右ヲ臭口ト云又臭口腐爛ノ后ノ取状ヲ以テ云説アリ又丹三疔  
瘡疾血血亦便毒石亦瘡比云馬瘡騎馬瘡ナトサマノト名ハカハレ共昔一疾ノ初起結腫ノ歩行  
シガタリ痛アルハ大解或ハ大壯如蟹或虎状ヲ加テ用テ瘡血スル處エハ虎状ヨリ瘡スル者ノ別ニ虎  
状画ト云マリ初起未膿ノ前ニ前方ヲ用テベントフザニテ血ヲコレハ消散スルモマリ初起下初ヲ以テ能下  
シテ消散スルモマリ然レ共毒ノ浅深ヲ考エ見テ下スベシ除毒ハ下初ヲニテハ消セヌ扱ソノ膿血  
スルモノハ針スベシ余ノ膿物ヨリハ口ヲ瘡クメヒラメイナヤニ破歎ヲスリテサス便毒ノ膿管ハ甚  
クシテ知難シ針ニテ后腐肉些異ノ者ハ膿ニナラヌ者共紫黒ノ色ノ内ニ針ニテカラフア  
スオサスノ瘡ノ治瘡ノ如ク初取リヘシ又膿管ヲモ腐肉去リ難キモノハ枝毒ヲ西三日サシ跡エ破歎  
ヲ取リテ置ハ腐肉取リヘシ前腐ハ大解瘡的ヲ用テヘシ亦便毒ノ所在エ結毒ヲ瘡スルマリヨク糸糸  
テ支支架附ニ消毒ヲ用ユヘシ

囊瘻

疔毒ヨリ生ノ小取強ク痛ニ蒙大ニ痛ク腫テ膿出カハル前ニ一面ニ里腐ニナリ臭穢近ツクヘカラ又自ラ血  
水流ルハ者ハ必死スノ症ハ只慢腫ノ痛ムハ復ク瘡ハ兎角大ニ腐ルモノノ早ク膿管ヲ見テ針ス  
ヘシ初起ハ島頭ニニ些内ノ膿用テヘシ小取ヨリサシコム瘡瘡スルハ退瘡ノ亦ハ便毒利頭瘡  
老瘡破痛スル者ハ陸射瘡腫一瘡(瘡)ニテ年久ニテ痛モナクモテ不痛痛ヲ瘡スルハ必膿ニナル  
イヨク膿ニナラント取スルハ内北スヘシ伯州散ナト取用スルモマリ膏初起ハ中黃潰后ハ左安  
ニテヨシ脱スル者ハ八景散ヲ用テ亦瘡ヲ瘡エ腐ル者膿一針ヤ合ツク毎日出ルハ云者ナル症ハ必死ス  
ヘシ又腐肉突出シタルニ腐ヲサシ瘡瘡スルマリ又瘡瘡ニテ瘡瘡ヲ如ク大ニナリタルニ管ニテ  
水ヲ取リマリ世間ニテト是ハ馬水取タル時ハ快ヨケレバカラ又奔ノ通リニ水タマリ大ニ成ル

懸瘻

ナリ是ハ別ニ瘡瘡ノ一偶アリ又腹右創口ヨリ肉突出ニ年ノ如クニナル者アリ是モ瘡瘡ノ者也入門ノ  
軍八毒リ此術ヲ理會シテ行フヘシ然ラサレハ大ニテ誘ルヘシカチ以テ治ルレバ然レ比治瘡中々  
患ニタマヌ表瘡瘡瘡ノ門ニ也

會陰瘻瘻ノ口腹リト云是ニ初起瘡或蓮子ノ如ク變腫メ痛強ク紫色ニナリ炊然トシテ及々大成  
遂ニ膿ニ成也甚ク穴鋪シテ后ハ常快ナリ不救ニ至ル者ニテ正氣ニ輕キ取ハ漏テ成トアルハ瘡ヲ見誤リタル  
者ナラシカ淋漏ノ如キ者初起ニハ大壯伯州散ニテ取用スヘシ膿ニナラズニハ針スルヘシ膿管ニテ針  
タルハ正中ヨリサシ治口腸ノ右エヨセテ刺スヘシ前エヨレハ尿道エ近キ故漏ニ成易シ破歎メイナヤ  
サシ先鋒ヲ貼スヘシ大瘡瘡ト治方同シ本ナカラ大瘡初ヲ強テ用ユヘシ一瘡淋毒ヨリ生スル者マリ是  
ハ必漏成ル者也是而淋漏ハ大壯八正散ノ瘡瘡アリ亦瘡瘡トハ是非比漏管肛門エツ、イテアリヨ  
ノノ氣ヲ白ク見ルヘシ亦瘡瘡ト疑似タルヘシ去レ共陰毒ハ初起痛ナク大便秘シ小便不利ニテ餘ホト  
菌ル直痛ニナル故病人白ク覺サレ者也后ハ陰毒ノ根腐リ浸淫ニテ痛強クナリ其痛ム寸陰差起  
リ痛ニエルハ陰毒毒毒ト云以テ異トス此瘡瘡後ハ甚臭氣強クメ四日ノ内ニ脱ニテ死スルヘシ一兩人モ  
誠ニタリ真ノ懸瘻ニ毒瘡クメ腐リ瘡ニ及ヌモノハ丸ヤキ水漏ル、モノノ大瘡瘡丹ニ白附散兼用スヘ  
シ腐肉取リハ稀的ヲ用ヘシ此瘡ニ在ル瘡物瘡瘡淋漏懸瘻但ハナリ場ト云エ故成リ云エ未熟車ハ  
先ナリ瘡ニ能ク診察スルヘシ各症分明ニ異トマリ

腎瘻

左右ニ不限初粟米粒ノ如ク黃泡ヲ瘡ニ段々高ク腫レテ暈ヲナスヘシ丸ヲ用血氣ノナリアヘキ也故  
ニ患ノ外ニ大ニ腐リ且膿ニナリ難キ者マリ附刺ヲ手強ク用ユヘシ初起便秘セハ下劑ヲ用エヨシ  
丹術ハ瘡背ノ陷ヲ輕クスルト心附テヨシ或ハ切ラヌニ灸メ膏ヲ貼スルモヨシ破歎ニテ腐肉



取し難キ者ハ膏藥ヲ煉リ交テ貼スルニ内第ニハ大壯伯列ヲ兼用シテ佳也亦ハ産后差第残リテ腎痛  
價ル者アリシカシ此ハ慢腫スルニ腸癰ノ部ニ詳也正第ニ腫重如石トナルハ腎癰ニ限ルニ非ス真ノ癰  
收ラナク者其六才ノ大サノ者ハ重キ一ニ貫目ナリノ物ヲ負タル様ニ思フ者ハ腎ハ血氣ノメリルニ思キ  
処故ニ眠癩ナト多ク此處ニ生スルニ眠癩ト云ハ俗ニ云トコトシク是久ニリ即ニ肉ヲハサイヤ其處ノ  
血氣縮ルニ能ハル故爾ルナリナレバ眠癩ハ毒アツテ爾ルニ非ス

楊梅瘡

綿花瘡砂ニ瘡其外名多クアレトモ皆瘡ノ故收ヲ以テ名ツケタルニ初起癩瘡ノ根ニナルニ至又  
如木附七葉葉ヲ用テシハ及テ色々ノ變起ルニ先初瘡ハ表スルコトニ骨痛ト云ハ真ノ骨痛カ又肉下ノ痛  
カヲ能ク分ツヘシ初子ハ九テ古ク陽キ毒ノ者用テルニ初起ニ用テハ及テ害ヲナス者ハ薑芋十  
トモ初起ノ内ニハ及テ患ニ又表セシト瘡ニテ瘡ニ氣ルニ奇方アリ 無患子 木通 甘草  
右三葉煎服スヘシ初毒ヲ解スル才最速解ニ每ニ石留子香附子甘草ヲ加用ス又口ウサハニテ口中ヲ  
洗フヘシ下疳便毒骨痛ト腹ヲ逆テ来ルハ楊梅瘡ヲ瘡スル前症ノ瘡タルカコト敷加遺種葛  
根加黃又ハ厚萍加黃或ハ十神ニ加遺種解木ヲ用テヘシ痛止マタキハ大解加遺種一土骨  
皮一十ト用テ意行ニテ面ニ度下スヘシ此ハ瘡的凡テ氣用ス木通一ヲ用ルニモアリ必ス貼第ナト  
スヘカラ又内攻スルニ又ニ等陰キハ葛根木附ヲ用テヘシ然レバ毒皮膚ニアル者ハ五宜毒陰ノ頭面瘡  
服ヲナス者ハ此實丹敷劑ヲ用テ可シ梅肉ノ行処ハ位淺ク些内リ行處ハ深シ瘡的ト七葉トハ動リ  
毒ト動カレトモトノ差別アリ下疳トハ七葉トナリ瘡的ノ初大ナリ頭痛瘡ニハ七葉ト方宜シ又梅  
毒ヨリ来ル瘡痛ニ當的芍藥散ニ七葉ト用テルニナリ數年瘡痛スルニ生々氣ヲサツテ用テ知アリ毒  
ノ筋ヲシキニ木附ニ化毒ナト用テハ惡クスルト吐血ナトスル者ハ化毒ヲ用ル陽劑ハ大解ヲ用テヘシ七葉  
丹ハ筋骨疼痛ニ起シシ外面腐爛ニタル者ニ用テヘシ石炭湖ハ三年ノ古貝ヲ用テヘシ又子安貝ヲ加

テ地味ニ赤也紅毛ノヘシニビタハ能腐肉ヲ去リ生肉ヲ上ル者ハ結毒ノ臭ニ至ニ南江茂好ノ毒瘡約言  
淋疾瘡漏疥瘡或膏瘡凡結核陰癰瘰癧癰腫癰腫癰腫一名鼻肉ノ毒ハ毒瘡ニ屬ストアレトモ  
中々石ノ諸症ハ毒瘡ノ差ニ非ヌタマク一近似スルハ皆結毒ノ各處ニ屬スル可シ毒瘡ノ様々トスル  
ハ甚毒説ニ能ク於スルハ他症ハ分明ニ知レル

結毒

結毒ハ處在テ限ラヌ古キ毒滯リテ瘡タルニ或ハ口眼喎斜或手足不遂或筋骨疼痛其受ナリ  
難シ至又如水鳥頸消毒兼用ニテ又ニク用テヘシ又其永化毒凡天水丸各起アリ初メハ毒リテ瘡ニナリタル  
先知難ニ破敵ヲ一面ニ貼シ置ハ其穴自然ト知テ来ルニコトクノ破敵メイケヤサスヘシ漏ニナリタル処ハ  
多クコケル又鐵ニテナリ膏ヲ貼スヘシ瘡内取シ難クニハ腐肉ヲ用ルニ又ヘテ高内ハ血氣漏テメリラ  
ス者ハ因テ膏第ノ氣ニ違ニ非ニ故ニ切サキヲ入テ腐肉取ルニ是皆術ノ捷徑ナリ又一等陰キモノハ  
此星化毒ヲ用テ又ニ等陰リ骨痛屈伸ナラサル者天水丸ヲ用テ咽喉結毒ハ大抵ノ者ハ喉癰一ニ屬ス  
凡テ兼用ニテ倍ス一等陰キ者ハ此星丹ヲ用テ金又モ應スルニ是ハ三四劑ヲ用テハ起立カタニ是ヲ用テ  
ト一旦思クナレバ一劑ヲ推テ用テヘシ起テリ聖金丹モ長ク用テハ起見エ又者ハ此星化毒咽喉ニハ起ウス  
ニ其外ノ結毒ニハ能應タル者ハ此星丹ノ中飛白霜トナルハ鉛白霜ナリ麴粉ニアラス  
薑芋毛起連口ナレバ調製及宜者ハ丹瘡スルニ一旦ノ起ハアルモノナレバ必ス再瘡スルニ是モ甚々用ル  
處ニ於テ機微ナリナリ親炙ニテ得ガレハマタハス

醫評

結毒結ニ至主木附ニ消毒ヲ与テ漸々瘡癰ヲ結毒治セ又モノアリ是ハ毒アリ此血氣共ニ虛ニナルナリ攻擊  
ニタハメ内ニ生故ニ内ヲ生スル奇良劑一薑蕪一ノ毒ヲ去フヘシ必ス抑アリ毒瘡約言本八身ヲ  
此意ヲ取テアレバ毒ガ散ラ変汁ニニテ主木附根ノ行ク処ヲ知ルニナシ其一ヲ知テ其ニヲ知テ

○膏傷ノ  
類イリ

結毒水ノ膿水尽テ白クシク肌肉ヲ生セサル者ハ蒜ヲスリ為泥患處貼シ其上ヲ脱金ニテ餘々ニ腐スヘ  
シ者ニ患ヤ寸ハ葱白ニ代ルモ可也 ○結毒ノ美久年不愈者及テ治癒イタシ者ハ毒動カ又故ナリ  
新梅ヲ得ル者ハ毒動アリテ及テ處在ヲウツスナリ度々ハ肉化通リテアラハツツニスヘシ否ハ愈  
ルナクハ切タルヲトモ危肩者ヲムスト上愈イタシ切ロフヤクヤフニナルモノハ其内瘡ノ變ハ上愈ノセマヤフ  
ニスヘシ切ロフヤカルヤフニナル者ハ枝毒ヲ自ヲクヘシ其内氣道ニ近處ハ用格スヘシ

結毒ノ足ニ出テ穿腫痛ノ如ク出テモ結毒ナラハ直ルヘシ穿腫痛ハ深キハ結毒ノ變ニ非ス  
毒毒ニテ萬銀ニ毒ノ及フ者ハ口瘡ニ終シ易シ結毒ハ萬銀蝕スル如ク口瘡ハ萬銀及因リ形ナリ  
咽喉結毒ハ喉癰一ツ用ヘシ初生室丹ヲ用テ早ク愈テ患キク日ヲ経テ室丹直ニ止ルナリ  
咽喉結毒ニテムク變出スルアリ此變後ナトナリテ破敵ニテ包ムヘシ次者ニサクナルモノハ沃テ  
切取ルヤフノハナラ又モノハ此メテ取テナラ又者ハセクナリタラハ愈スナリ

咽喉結毒ハ初メハ五室丹ヨロコカラ又信ニヤルヘシ耳ノ中ナドノイタク覺エルハ大カク因ニ瘡ノ出未  
テアルモノハ

○結毒癰痛ハ數年治セヌナリ甚メハ裂如シ多クハ不治トメ方ハ生文  
水附加細辛石鐘丸ヲ兼用スヘシ

○結毒ニテ乳岩ノ如ク凝リナリ然レ氏凝滞ニタル  
塊何トナラメナリニ凝結ノモノ多クコルヤフナ乳岩アリ乳岩ナリヤハ當リ兼軟ナル乳岩アリ  
乳岩トハ大ニ異ナリ結毒ナラハ及花ノ石未メ又肉ノセザル前ニ解毒劑ヲ用エ又因后ハ生本附  
消毒丸及花症ニヨリ毒アラハ解毒劑ヲ長ク用テ治テ斷スヘシ

咽喉

咽喉閉塞ハ食道ナリ喉親ハ氣道ノ何レモ飲食者吐納ノ道ニシテ甚大起ナル處故別ノ能  
氣ヲ自テ隨テ果ノ治テ絶スヘシ

乳管ハ咽ノ中ニナリホリト管鳥ノ乳ノ如ク赤色ヲ生ルヘシ一方ニ出ルヲ單管鳥ト云兩方ニ出ルヲ雙  
乳ト云又女子凡ハ皆管鳥ヲ以テ名ニ皆食道ニカハルヘシ回春ノ腫凡解毒ニ石膏ヲ加ヘ用エ外面腫多  
キ者ハ柴胡加石豆仁又椒散一果モ知アル者ハ纏喉凡ハ咽一面ニ腫レ長ク纏フ魚ナリ息スルナリ  
咽飲ノ食下ルナリ又ノ惡寒者熱極キニナリ甚急症ナリ先ニ後針ニテツキ破リ金鎖ビヲ吹キ腫凡  
解毒如石成ハ清咽利膈一云參解毒ノ變ヲ用エヘシ至テ萬刺ナル症ハ咽ノミ出血ニテハナセヌ  
者ナリ肩井ニ吸玉ヲカケ血ヲ取ヘシ或ハ大指ガシ小指ノ穴ヨリ血ヲ取ルヘシ

喉痺ハ懸壘エトナキ者出段々腫塞ルヘシ針又ハ錐ニテ切破リ金鎖ビ水研散ヲ吹ヘシ並ハ正  
軍人海脚散能應スルヘシ急咽痺ハ石砂散ノ末ヲ吹ヘシ亦者橋板山椒ニ尾ヲ末ニシテ服サシムヘ  
シ又丹蒼白姜蚕ノ末ヲ用柴胡加石ヲ末トシテ散攪ヲ加用入毒因ニ代テモヨシ山豆根射丁  
モ起アリ甚多ノ者方モ多クアリ別ニ記ス苦酒一ナントモ起アリ

喉癰ハ初起尋常ノ咽喉痛状ニシテ漸々ニ腐爛ノ后ハ及肉スルヤフニナル者ハ初起口ヲヒライテ  
見ルニ咽中ニ腫見エサレモノハ咽癰ニテアレハ喉癰ニ非ス正室ニ瘡生テ吐クストスルトアレハ此ハモノニテ  
ハナクハ氣裂ナルヲ以テ押ヘラレシ又ニ挫ケノ良ノ方ヨリ段々腐者多シ喉癰ノ一ノ後症ナリ結  
毒毒ニ終シ易シ結毒ノ者ハ外皮腫痛スルヲ以テ分ツヘシ

凡テ咽喉痛ハ毒毒ニカキラヌ五室丹ニスルル者ナシ喉癰ハ用ルナリ梅核氣ハ何カ咽中ニ  
物アルヤフニ覺ヒラモ不出者トモ下ラヌ心ワルリ思フヘシ獲子降死一正室ノ腐化凡テ兼用ニテ切  
アリ腐化凡テ用ルト吐スルモノアリ又辛辛モ一年元長引モノアリ又厚朴一可シ

医釋 口疾 喉癰 咽喉

舌症附舌癰ハ口科ニテ五治ノ者ハ然レ此方極ハ近年ニ夫レ數人ヲ救フナリ得タリ附舌癰萬應ニ  
至テハ未メ治治ヲ得又何レ腐者ノ一ニハ非又清解劑ヨロシ





シエラキツムハハ白砂糖ノ糖ニルシテア痛ヲ見レテ七日オキテガニ解ヨレハ取ル節ニ又自然ト糖ニテリテ破  
ルハ倍大ニ傷人痛ヲ忌ムニ於テハハシワカリトシタル者ハ内ニ白キ豆腐ノ糖ノ糖ヲ取リ針ヲサシテアヒ  
リ也中ニ袋アル者ハ其袋ヲ取ラサレハ又集ル也取難キ此ハ腐肉ヲサシテ取ル也其痛ハ痛極ヨリ大ニ  
ラハ取テ盡シ痛ハハカリトスル者ハ節ノ骨ノ骨ヲ取リテ取ル也其痛ノ中ナリ於痛ヨリハサシ硬ク覺エ  
用ヒラシメテアリ脂痛ハ因テ多ク是モヤハリ節痛ノ中ナリ於痛ヨリハサシ硬ク覺エ  
中ニ糖脂ノ糖アル者アリニ度ニモ取ルナリ於痛脂糖ヲ取シテラハシニフテ其ヲ貼入於糖取  
不込モノハナイチヤテ入ル也又カウチコフナリ用ルテアリ其痛ハ黃連解毒散ヲ貼入ノ其痛用ス  
内痛ハ根ヲ動セシ決シテ針スヘカラス肩工荷ヲフトスルナリ葛木附ニ十葉一七葉ヲ用テ節ス  
ル者アリ也膠ニル者ハ腐肉ヲ用カレバ知ウス

骨痛ハ大抵此骨ノ骨ノ骨ニ多ク生ズ唯骨ノ高クナル者ハ此骨痛ハ骨中痰液ノ集タル者ハ是ヲ治スル術也  
秘也一人甚奇ナル症アリ能多クハ骨痛ハ其收膿腫ハニ於ル也一旦寒熱シテ脚軟痛スルニ甚シク伸スル  
不能ト云凡手ヲ以テ即クレハハナリヨク見レハ膝腹ノ痛ハツタル也如何ト云レハ膝間ノ痛テキタル故膝  
頭又ケタル也其痛痛ナリ則チ其痛ニ七葉用ニテ過半消シタル也其痛ハ骨痛ノ中ヨリ也  
如キモノ出ルモノアリ骨ノ骨ノ骨ニ其痛モツレテ上テ腫タル状ナリ凡骨ノ骨ノ骨ニハ  
ラ又或ハ針ヲ入テカウチコフナリ用モツテ節ノ骨ヲ取レトモ是ハ中々初心ノハ陽ルト多ク眼至  
ハ清上防凡ノ用ニ若腐肉ニ膠腫スル者ハ三葉加石ヲ用テ之ヲ治スル也其痛ハ血痛多ク其痛ハ  
風痛ハ多ク長痛治ニ在ル者ハ痛口サシク其痛ハ一人風痛ハ尽クレト是ニ勞心ナリテ死ニテリ也  
此痛ハ一年モテ復テ死ク出ス是モ其痛ノ者也  
血痛ハ硬軟相雜ル也皮膚痛クモテサシク物サハリテモ血ノ出ル者ハ根ニ血絡纏テアリ何レ血痛  
ニハ如クテリテ血色ヲ替リテ凡卵オトテ其痛ハ痛止ル也此ノ痛ハ痛ナキハ九テ痛ハ痛

ト八邊ニテ兼ス者ハ血痛ハ兼シ下ル者アリ金針ニテ三處オトシメ共針口エカラマシコチ手早リス  
手ニルカレハ血出テ止ル也針口ヲクテ水ヲソケハ血止モノハ高者ヲサシタル上ハ破敵ヲ貼シ置ハ漸々  
腐リテトレル也腐肉ノ膠腫ニハ黃連解毒散ヲ貼入シ其痛ハ痛止ル也此術初ニ者ハ女リ  
ニ倍テ其痛ハハカラス内テ口後面命ヲ復ス

医譚

乳痛乳癰ハハタナフスヘカラス其痛ノ者ハ此痛ハ痛極ヲ以テ治スル者マ、アリ陰門痛ノ大サ傷最ヨリモ大  
ニナル者アリ中ヨリ針ニテ其痛ヲ通シ其痛ニ外、ルナリキシメイ後毒カラマシコフナリ也  
痛ヲ捨置テ及死ニテ死タリ血痛ハ甚大ナル者難取大抵ハ捨置テハハカママイニナラ又者ハ手ヲ下サ  
ス此可ナル也其痛ハ大抵手ヲ下リハ大ナル者見後又痛痛ハハカママイニナラ又者ハ手ヲ下サ  
咽中ニ大ナル痛出ラ大食ノニ難キ者アリ白色ナリ刺テ血出サレモノナラハ口中推出シキル也此ニヤラ  
シ又処ナリノ者ニ腫シ盛ル也ハ乳製ナラ又ヤフニナル也又ヒツカケテカキ錘ニテキリテ愈  
或大痛ヲ取テ百日ニ根ヲ治ラヌモノアリコレハ甚難ニテカフレル故ニ愈サルヲ知ラ子ハ如何ヤフ  
ニ夜ニ其痛ニシテ其痛ハ八仙人骨ヲワケテ上ニ其痛ヲ付ヘシ  
陰門ノ痛ヲ抑テ陰門ノ内高サニ手ヲ置テ手ハ此痛ナリアリニ鉄ニテ一鉄ニヤタレハ脂膜  
クハト出タリ急ニ其痛ノ治ニ是ヲ其痛ヲ貼ス  
骨痛モ頑ニ生ズルモノハ口中ヨリサシテ取リヤスレバ其痛ニ生セシハ此痛ヲ取リテ一人眉上ニ出シ二割ニテ  
ガニ減セシトモアリ也  
骨痛ハ八骨ノアタリニ薄キ膜アリ此水ノタマルナリ  
○一女子十歳余左頰肉痛ヲ生ズ先生コロンメニテサシキルニ難會ノ如ク薄膜ニテ  
包ケルチニテ破リシニ内ノ如キモノタナリテアリ其痛極痛ノ痛ニ後テ復骨ノ骨ノ骨ヲ取リテアリ





別名ヲ設ケル是マハリ附骨疽ニ骨腐ノ多ク出ルヲ云ハ破飲ナキハヤチ入シ骨出ハ名引テ取  
ハシ再理ヲ取レハ出無ルニヨリ得テ骨ニ及ニモ三度ニモ取レ騰ラズオトニテ取テモアリ又口ヲヤ  
ハトロテ洗フテモアリ然レバ若シカラテ子死テ膿キ症ハ既フヘカラス痛口タ、シタルハヤケ  
ヒシヤコニテ洗フハ高湯取物ノ前湯ハ因年但榮湯若木附ニ七症ノ取用又脱ミタル者ハメイヤ  
モ取用シテ洗フハ者故違中一ヲテ強ク用ヒケツ、粉死ヲ用テハ  
一人財官ニ附骨疽ヲ患ス久クメ折骨一折大指ノ大ヤ長キ一ノオオオ付リ者口ニ端テマシ死口セマリメ  
テ大因テ切セラキモ引テヒキ出シ全愈ナリ

流注

古来二種ノ腫物トシ正氣終ニモ虚脱シテ血氣凝滞リニ成モノナレハ或ハ痲痺ナルカハハ酸痛ナロモ有ヘ  
ケレ此疾ノ右ノ症ナキハ此説的當フ論ニ非ス畢竟是ハ皆外傷ノ一也久病ハ痲或破傷ヨリ凡風相兼  
テ此症生テ初起也不變變腫シテ痛ハ甘シ地テ腫物ノ如ク痛モナキモノハ其痛ヲ異ルズアリ  
花提應應物ニテ初起ヤサキ者ハ紫肉ヲ用テハ散タルハ或ハ亂刺ヲ取テ食後スル者ハ越本附  
費ナキ者ハ烏丸一湯子散高湯浸腫シ水充マルモノハ花散ニ用テ初ニテ用テテハ散ハ消  
散ナレ、然レ余リ強ク下セハ腹痛ノ寸三脱テナリ腫状ノ者ハ甘草附子一ヲ用テハ消ハ先  
鋒ヲ取テハ一且痛止ム人平ナリテ再ビ勢ヒツク者ハヨク一見ルハ一症ニテモ膿アル者ハ十  
テ又ハ三腫モ膿ルモノハ初ヲハツヨリニツメハ製ナリ膿ヲナサスニ見ユレ能ク見レハ越ニ必ス  
膿アルハツシニモ膿充テラハ石蓋制ハ早く止メ節節散テ兼用ステ膿充テラハ針ニ膿氣ニナラナル  
前ニ必ス針テハ口ヲス腫ニテハ破針ニテ破飲或ハ左變ナイキヤヲサシ先鋒ヲ貼スハ腫尽サル者ハ十  
全内此散附子ハ柳一様用テハ至テ強強キ者ハ少柴胡初ニ用ルイアリ又脱状ニテハ膿ヲ出シ  
蓋行ナリテ後此ニナルモノハ若故違中一補欠ナト用テハ腫ハ早く尽ルモノヨシ昨日本合今日四

合明日ニ合ト五腫ニ成シ四日ニ尽ル者ハ順シ且八九ヶ處ニ疔アリ三四ヶ處モ一度ニ針入ラシタルハ腫ナル  
症ハヨシ日敷取ルモノムツカシ、膏丹出此散由出ルハ傷症、本症腫テ患ヒ過テ愈テ流注スルモノ  
ハ大膿疔ニ大膿ヲナス者故多クハ膿ヲ死シモノハ腫物ヲ患テ其毒流注スル者ハ是腫物ナルモノナリ  
腫ハ非ス其症ハ初ヨリ大散飲又又ナル者ハ九テ廿日廿五日モノ針ヲ入ル様ナル症ハ患ヒ又数日膿出  
ル内ニ難肉ナド食スハ痛口ヨリ出血シ及花充テ難肉ヲ食テハ毒尽テアハ針金肉リ出スルテ  
一箇年モナクニ腫用ルハ能ク治スヘシハ産房散血脈注ニナルハ散ニ唯ニ正宗ノ通經導滯ニ至  
本附ニテ起テ得テアリ凡テ腫テノ后ハ蓋散制モヨシ必ス大黃牡丹一ヲハ用テハカラス然レ併使ニ  
ノ毒氣不盡痛口半平モ蓋モノ大散ヲ用ルテモ終マレ腫物ハ決メ用テハカラス古方流ハ此處ヲ知ア  
ヤクルト多シ〇打腫ノ流注ハフラントニテ蓋ニ流血ヲ散シ烏丸一ヲ用テ毒血キラスノ膿セント欲  
テモノハ常法ノ如クハ一又一種疔瘡又ハ金瘡ヨリ瘡口四辺高腫シテ此毒ニハコロ腐リユク者ナリ  
是破傷風ニ就テ不附テハ先鋒ヲ貼スハ一早速痛止ムハ又草解症ニ破傷風多クアルナリ九テ虛  
候、毒毒年ヲ用ルテアリ解毒ハ毒毒後后血充不煩口飲リカタキモノニ起アリ又虚頸ヲモ代用ユ

医釋

三星ニ灸ス十日ヲ至血氣流通シテハ膿骨ニ腫ヲナシテ赤キナル故花散ヲ用テリ師些用一ニ膏膏  
シテ是通ニ蓋タリト云ハハ痛散ニナル  
師曰リ市傷村某者光年十月腹ヨリ花痛漸ハ腫脹又夜半腹ヨリ腫脹隣ニ何ハ蓋行出四又痛  
瘡又故ニ鼻腫見之為毒旁流治切ナシ故ニ元陽胎之標數細麻瘦骨立テ云ヘキヤフナシ其  
レ花毒毒ノ散ナリヨリ見レハ骨内腫腫腫然テ内ニ肉腫子見ル故按腐爛甚ノ而敗液流  
注ニ故ニ刺之膿出ルテ打テ神起肉此ヲ消テ一週リニ得ル遂ノ病ヲ掃ルテ是レ入タル  
ノ一合痔瘡症ノ舌ハ赤セテリ薄ナル刀真ノ毒毒ノ舌候ハ夫ヲ不知テ腫ニ腫毒ト



云非ナリ

九牌物能治收ヲ見ニ者因テ補セズ越不附ヲテ正第ニ云ハ甚稀ノ何シ能治收ヲ見ニ者其身  
併ニ務アル故ニ氣ヲ付テ見ヘシ正第ノ説ハ異ナリ  
一人腹下慢能ニテ年ヲ以テ投スルニクニ痛アリテ苦楚竹林院ノ治ヲ乞フ見テ見テ生年修  
日足癖痛ナラシト大壯ヲ投ヌ右先生曰是流注ニト在テ見ルニ果ノ痼アリ因テ投ニ木附ニ此凡集  
用 唯水血凝滯シテ漫腫シ即擣ナラガハ成ノ得ノ可ク若膠方ニモ見ルモノハ甚故劑ヲ十  
リ凡痼痛ノ流注ニハ破陽温ヨリ流注ニ及者越木附ニ鹿杖差ヲ加テヨク消散スル  
流注越木附ニ此凡強クカケテヨシ七八箇處モ出テ腰痛ノモノ背エヨリ左ノキニ痼アリ右ノ  
是逆類アル者是流注ノ腫脹ノ症ハ考茲不附劑ニ直ニ

乳癌

乳癌ハ乳房ハリテ熱ヲ生シ結腫スルノマアリテ生スルヲ外吹ト云姓娘中ニ生スルヲ内吹ト云初起寒熱  
往来ニテ腫シ色紅痛ムシ癌相ナドハ遺シ連ニ腫レルノ日敷長引ソフナル者ハ毒ヲ用テ乳けヲ止ムハ  
ナニキヤニ則ハ物ノ神趣ヲ加テ用テハ又別ニ毒方アリ初起葛根加苦更加石玉或ハ柴胡加石  
枳萸橘葉散ノ薬用ヘシルテ乳癌ニ痛ムノ息スルモノハ先鋒ヲ用テ散スルハ大壯ニ伯品散ヲ兼用ス  
レハ是非ウカ者ノ膿ヲ才シハ透膿散ヲ用テハ凡テ姓娘中ハ散ニ易シ産后ハ散ニ難シ又乳乳塞リテ  
腫ル或ハ麦門通草ヲ加テ用テハ甚ニ乳癌ニ以テ兼用送下又葱白ニテ乳癌ヲ並ヘシ又乳けノ止リ  
タルニハ露蜂房ニ呆服スルモヨシ又乳癌ハメイケヤチ入スニテ腐肉取レソコエハ乳癌ニナルノヨク  
破散メイケヤチ入シ腐肉ヲ取レシ或ハロフサハロフサニキケルヲナシテ此之然ドモ毎度洗フヘ  
カチス或ハ月才ニ丹卷ヲ加テ用テ傷ハ大壯ニ伯品散用スルハ白膿方ニツク出テ並内ヲ見ヌ伯品散ヲ  
止メ葛木附ニ粉凡綿的凡ヲ用テハ補ノメイケヤチ入シ夫ニテ不慮ノ才ハ切テ取レ乳癌ニ三年モ

不愈膿水冬者治難別ニ手段アリ内ニテ親炙スルニテラズシハ其術ヲ得テ難シ大壯ハ毒アリテ膿サナキ  
ニ用テ治シ蓋付難熱ナドヲ用テハ用テバカラス初起ル梅核ノ如キ者出テシツカリト履リ年モシテ不痛  
モノハ治シ漸々大ニナルニ由漸々ベカラス乳癌ノ他ノ症ハは痛カ又年々モジツカシテ居ヌモノハ乳核ハ  
乳岩格ナキコイドコヤテ軟ナリ又レリニテ消セヌ折々核痛ムシ又膿ナラヌ者ハ交草煎ヨロシ又乳  
癌ニ核ニモサルヲ乳癌ト云モ是甚毒草並テ用テハ乳癌ノハ毒ニクハ別ニ乳岩毒併録ニ見ユ

逆散

婦人乳癌痛テラ治シニ甚毒東同加苦更ニテ以テ止ムハ其方也予常ニ葛根加苦更ニテ  
方ニニ甚毒更ナリ然レバ又本稿比同ニ甚及然テ以テ用テ止ムハ其方也予常ニ葛根加苦更ニテ  
ニ葛根加苦更ニテ以テ用テ止ムハ其方也予常ニ葛根加苦更ニテ

乳岩方也予常ニ葛根加苦更ニテ以テ用テ止ムハ其方也予常ニ葛根加苦更ニテ  
乳岩方也予常ニ葛根加苦更ニテ以テ用テ止ムハ其方也予常ニ葛根加苦更ニテ

乳岩方也予常ニ葛根加苦更ニテ以テ用テ止ムハ其方也予常ニ葛根加苦更ニテ  
乳岩方也予常ニ葛根加苦更ニテ以テ用テ止ムハ其方也予常ニ葛根加苦更ニテ

乳岩方也予常ニ葛根加苦更ニテ以テ用テ止ムハ其方也予常ニ葛根加苦更ニテ  
乳岩方也予常ニ葛根加苦更ニテ以テ用テ止ムハ其方也予常ニ葛根加苦更ニテ

乳岩方也予常ニ葛根加苦更ニテ以テ用テ止ムハ其方也予常ニ葛根加苦更ニテ  
乳岩方也予常ニ葛根加苦更ニテ以テ用テ止ムハ其方也予常ニ葛根加苦更ニテ



久年ノモノハ口カハ口テニキテラニテ洗フハ腰口新ニキモノハ洗フベカラズ新ニキモノハ洗フハ腰口  
 少テ多テナキハ又破傷風ノ如キハ洗ハ本消毒薬用ニテ洗ハモノイキヤヲ入シ久ミク養生スハ養  
 生スハ治ル者ハ腰テ骨腫ノ盛ナル内ニ難肉ヤト食ムハカラズ必ズ大ニ出血シテ死スルハ腰大抵テ脱収ニテ  
 久ミクニ三年モ長因セサル者ニテツク用ニテ必ズ過度スハカラズ洗ハ毛同ニテハ腰尻トテ脱収ニテ  
 洗テ上テ下テ引テ痛ムモアリ鳥類ノ用ヒ養多スハ毒尽脱収止中ニ毒リニキヒシク屈伸スハ  
 カラス印テ痛出腫瀉リセロク成ルテアリ此症伸エリテ甚見有アリ復益ノアルハ散散ノ年段アリツ  
 ハシムハ又ハ腰脱収ニテ腎腫ノ向ニ軟如ク腰脱収ニテ中ニ毒アリ腫アリテ破シハ且快ク凡四音又  
 此ハ大脱収モノハ是迄教人ヲ試ムルニ尽リ死セリ口ヲ開カ又内ニ毒甚ニ消利テ用ヒ然ニテ口ヲ破ラハ風ニ  
 カラズ此ハ他症ニテモ腎腫ノ向ニ限ル者ハ脱収ノ症ニテ腰脱収ニテ年モ年モ本腰腫者針ヲ以テ腰口ヲ  
 コラカズ別術ニテ自然ト開クヤフニ至スハ肝腎ノ甚ハ腰脱収アリ

鶴膝凡ハ脚ノ内分大ニ腫脹ノ交如ク痛ニ寒熱ニテ次第ニ股ノ内肉脱スルハ甚又木削ニ七室ノ寒  
 膨脹セ又マフニ長服スハ又膝蓋骨ノ下ニ骨出腫又ケシテアリ坐スルハハナレバ立テ不叶且痛ナシ是  
 腫物ニ非ルヲ知ルハ又肘部ニ出シ者アリ又膝蓋骨ノ下ニ蓋骨腫痛スルハ膝蓋骨ハ穴名ヲ以テ名ツクハ  
 委中蓋骨ハ石ノ諸症ノウウハテハ内收ニシテ寒熱ナリ足ノヒツカハニ腫紋ノアタリニ至ス而委中ノ穴  
 ナリ蓋骨アタリ内脱ニ思傷ニナリ生テ腐トノ内ヨリ膿出テ臭息臭アリ又蓋骨不瘦ハ寒熱スル症  
 ナリ是ハ他症ノ寒ニ委中蓋骨アタリ又積クハ積スハハ

医釋

足ノ甲ニ骨腫テ足テ時々自出ト血出ル者アリ是甲甲明ノ経ニテ多氣多血ノ処故ニ出血スルハ医タルモノ  
 可參  
 胸版及ヒ其藏ノ近キ附骨ニハ紐テサスハカラズ脱疽ヲ見ヌト云リ穿鼻疽ハ一年モ療治セズハ抑テ

キ者ナリ其内種不消ノ者モアルナリ年々木削ヲヤルハ骨ニ毒アル故テ非消ス  
 各家口中上唇ニ腐シ腫出テ鼻近ニ微マアリ先骨種ト名引テ引出シ逐ニ天ナル骨出タリ骨腐ニナリタ  
 ラハ早ク出スハ内ニナリテハ肉生ニ種ニ甚痛テナラズモノハ内肉種ト名生骨ニ離シヌトアルモノモアリ  
 ンシハ冬ノ難出故腐骨ヲヤトハ直ルナリキナドノ内腐ニ處ナラハ内肉種ト名取テ取テハ内腐ニキ  
 ハ六ケニキス

腐骨疽ニテ腰ノアタリニ花アケアリ骨カ少子ハトテモイナルナケレバ腰ノアタリハ肉ニ至テ腐キモノ  
 故ニキリ肉ニ種ニ木削種ヲ入テ腐骨ノ出ルマテ見合スハトテモ腐骨出子ハナラズナリ其内腐骨  
 ニナラズモノアリ大カク腐キハ腐骨ニナリテアリナラズニテ腐骨モアリ多クハナリテアルハ又骨種凡ナト云  
 テヤハリ腐骨疽ノ種ニ骨ノ出ルアリ黒色ニ変スルモノハ

附骨疽ニ治テ絶ニテ右毒尽テ血シト飲スハ此血ナル者ハ死血而腐ナリ附子ノ毒ヲ去テ未瘥上ニニ  
 キテ其上ニ文火傷氣ヲ助クハ

瘰癧

瘰癧ハ陰中ニ瘡ヲ生スルハ多クハ附道ヨリ下ニ出ルナリ初起瘰癧門ノ中大ニ腫痛スルハ清肝瘰癧ノ  
 ナシテハハ慢腫シ痛甚者何レ破針ニテ惡血ヲ放キ毒蛇ヲ貼スハ痛ハケニキ者ハ桃葉ヲ用ルハ  
 ナリ又煤餅善生ノ瘡アリ服茶ナリニテハ治ニ難ク若ナリ折々破血スハ尋常ノ瘰癧ハ年セズ  
 又一種瘡クニテ種難キ瘡アリ寒方刺芥ハ蛇床子ニテ洗フハ又豈肝阻ニ蒂的消毒兼用ニ  
 生葉ヲ用ルハ又藤胸結者ニ果紙ニ包シ陰中ニ入ルモノハ九テ瘰癧ニ毒瘡ノ者多シ又帶下ニテ瘰癧中

痒キ者アリ帯ヲ脱スルハ自ラ治スルニ或ハ正氣ノ掃瘴ニテ治フコト又薑蕪ヲ用ヘシ方ハ虫毒ノ重キ  
ト同シ又一種虫ヲ生スル者アリ洗滌ニテ治セザルハ雄黃薑蕪ヨロシ正氣ノ銀杏散ヲ用テ之ヲ入道ノ上ニ煎  
子難症ナトト如キモノ出ルアリ又別ニ孔ヲ穿テ其内ヨリ膿ニシ長キハ内至テ毒キ者出シタリ又一人  
斥直ヨリ右ノ如キ者出シアリ赤ニテクハ引上テサセツトシテ付テ不ニ治シタリ抑直ハ絶テ歩行モ  
ナラサリシカ切取テ治ハハ百ニ十モ歩セリ又箱道ノ辺ニ大ノ乳ノ如キモノイウモアルアリ是等ハ  
三十閉瘡ノ青蛇ヲ貼シ糸線ニテサレシ是モセツトシテ自瘡用湯洗フテ用テ又傷中莫出スルモ  
ノ正氣ノ難症熱毒散ヲ用テ一人知テ得タリ又一種ノ積膿是ルコトイフコトモ治アリ大ニ痛ニ志  
フカラ又支命ヲナル者アリ必ス帶下スルモノ是多クハ淋毒ノ積リ治法ニ後フコト又右ノ症坐薬ノ  
一新方アリ別書ニ録ス産ニテ陰門破裂シタルハ白濁ニ馬油ヲ用テ用ヘシ  
又閉瘡ハ云者赤毒ニテ多シ子宮ヨリ肉變出シテオアリテ消長スルハ一閉瘡赤毒内ノ澤蘭葉  
サシテ三人治シタリ又子宮口ニルコトナリ赤々出ルアリ是ハ生陰不治ノ者ハ淋ニテ閉中ニ大ニ腫痛  
スル者アリ大抵ヲ去ヘ痛止者ハ柴胡主之宜シ兼テ薑蕪スツシ方易ク出ス  
一老婦毒氣ナリ陰中痒リ次者ニ腐爛シ水ヲ流シ良乳堪カタリ淋ノ蝕スルカ如クナリタリ於  
利ヲ錐ニ用テ各瘡ニ貼シタリ  
一処女閉中大腫痛入大便塞使シテ勞狀ヲ入泉治此症大承氣ヲ去ヘ燥瘴ヲ下シテ痛ヲ減  
ス右批丸ヲ去ヘテ痛イヨク安腫一向消セ又道遠散ヲ用セシニ逐ニ腫ヲナシテ愈タリ  
一婦人閉中ニ此ケキテ其中ヨリ乳ノ如キ者ヲ出シテ三年存リ走行スルコト能入ノ毒ヲ用テ切  
一旦治メ又老久縮赤ニテキリセツトシテ付テ正ニ治ス  
一匹蟬

用工 傷寒發願

一名寒毒ト云陽瘰又ハ瘰癧ト云毒不盡留滯ニテ生スルハ限ニ及限耳ノ前所ニモサレハ骨槽爪服  
瘰癧ニ於ルハ毒ノ初起腫レ痛強ク色變セシ形ノ區疹瘰癧ノ如キニテ治シ難キ者ナリ三月ハ先  
鋒發強ニケレハ柴胡加石或ハ葛根加石更柴姜主至テ發痛ハケシキハ正氣ノ身腐甘草當更  
ナ用ルシシカニ此症多クハ汗出後津液七竭ノ者ニ柴胡加石ハ用捨ニテ批劑ヲ用ヘシ膿潰セハ破  
蝕ヲ貼シ或級劑ヲ用ヘシ又鏡毒ト云者アリ正氣ニ耳后一寸ニ分ニ生ストアリ瘰癧ト云ハ治瘰癧ス  
瘰癧者ハ瘰癧ノ治  
一婦人ノ瘰癧瘰癧ヲ去腐リシ者アリ各治ト思ヒシコト耳后一寸ノ処ニテロチアケ膿ヲトリ次牙  
ニ貼

瘰癧ノ小ナル瘰癧ノ者ハ色淡赤腫脹ノ瘰癧ナリ大ニ痛瘰癧ニテ瘰癧者ハ俗ニ云凡毒瘰癧ニ差セリソコマメ  
ト云ハ瘰癧ノ是ノ瘰癧ナリケレ瘰癧ノコマノ瘰癧ニ血氣凝滯ニテ生スルハ小ナル者ハ錢ノ如ク大ナル者モ  
才圓ニテ皮厚ク頭トキ者ハ神ノ葛根加石或ハ葛根加石或ハ葛根加石或ハ葛根加石或ハ葛根加石或ハ葛根加石  
散スル者アリ瘰癧ニテハ破針ノメイヤヤヲ入先鋒ヲ貼久婦人ノ見針ヲ貼ル者ハ膿管ヲ見定メ  
後毒ヲサシ上ニ先鋒ヲナリテケハ口自ラアリシ又毒ヲ刺破シ易キ者ハ破敵ニテヨシ  
小瘰癧  
正氣ノ論面カラス瘰癧未チアスツト山ヲアケル者ニテ葉粒ノ如ク些色ナル者ハ是瘰癧ニ屬ス又又  
ハ瘰癧ニ近キ故チアテナリセ又カヨシ膿ニテハ針ヲカカリニ分チテ刺スヘシ瘰癧ヲ治クル  
ヘカラ又攻毒劑ヨロシカラ又瘰癧一病人ニハントフチナカケ率割セシメタリ三月ハ破敵ヲ用



又花はモノモアヒし初起大豆ノ如ク反々大キクハヒ針ヲハ鮮血出ル者ニ毒ニ針ヲカラス物ニ觸テ破レトアリ  
脇内ハ先投毒ヲサキツクシ次第ニ毒ヲ引去ルハ破敵ニテ取ルニ技毒ヲウクト賜臨ニテ也ヒノ毒アル  
モノナリ甘連石菖蒲ノ二毒豆ヲ加テ用フシ凡テ此毒ハ腕在ニルモノナリ在ニ隨テ肉神スツシ又腫物  
ノ根細キ者ハ苧綿ニテ結ビ切リニストアリ有患ノ及花ハ手強ク解毒スツシ毒去テ凡テ可シ此毒  
治年段多シ親灸シテ治ス。鹿城先生曰及元ニメル者ハ如何程大ナルモ何所シ金瘡ニ危

腹危腸危

腹下三生ニ危ニテ收ハ五毒ニスル通り下リ一各夾危ト云先毒背ニ似テナシ又尖シ危ヨリハ膝高リ腹  
腹ハヒリ成リ易シ初起十敗テ用ヒ伯州散ヲ兼用ス腹腹セハ積敵ヲ貼シ或腐肉取シ毒キ者ハ灸スルヲ  
アリ又灸ニテサキ取フシ腸危ノ如ク痛甚キ者或ハ腐リ此ヨリ多ク鮮血出ル者アリ是ハ不治ノ者ト  
心得フシニ在共ニ始終温補スハシ蘭鏡ニ勞瘵ハ皮腐胃腸ノ間ニ膿ヲナスト按スルニ胸危ノモノ  
多ハ郡散ニ之逆ニ逆ニ逆トナルモノニナリ乳ヲ付スルヘシ何レ治シ安サテサルノ症ニ医難見腸門ノ

鼻痔

世俗ニ鼻痔カケノノトハ鼻中ニ菌菌ノ勢セルカ如キ者出彼大ニ成モノハ初起輕キ者ハ瓜蒂ノ末ニ  
ハ水ナリ盪ルアリト重キ者ハ鉄ニテサキ取リ根ヲサクリテ錐ニテ引カケ能ク取スハハ此ノ多ク出ル者  
ハ瓜蒂瓜有ツ三枝針ニテサキ取リハ患ニ止ナリ正第ノ確神散ヲ吹ユムハハ又齋肉取シ鼻痔者ハ  
家方ノセツロシ紙條ニヌリミハノサキ取フシ服毒ハ始終辛荑膏肺欠ニテヨシ然レハ此術毒リニ行フ  
ナカレ初起ノ者セツロシノ毒ヲ用テ鼻痔ハ治シテ膿現或ハ頰ノ也大ニ腫痛ニ危態ヲナシ膿ニナリ  
却救ニ至ルノアリ彼破傷風ノ如キ者ハ危角此術ハ神醫ノ人妻リニ行フハカラス抑テ及毒症ヲ生  
ルノアリ可慮

鍾鼻ハ三枝針ニテ初開キ其毒五紙ヲヒラメニ指針ニセツトシテ貼シ内鼻毒ノ方ニセツトシテ付ケ

サレヤトニシテ入ルヘシ毒ニハ鼻毒腐瘡ト云録々ハハ又接骨ニ者ノセツトシテ又リサシ毒通手食タラハ  
鉛ノ管ヲ水銀カニテフチ突セ又リサシカイク右ノ通り又ハハカニテフチサリ付テ半年毛一年毛  
ナルヘシ

初メニ水銀ノシリサシ危ニカニテフチサシ共危ハ管ノミサシ通シ水銀ヲ多ク付テハツキ毒ニ燒スルヲ用エ  
ル毒毒ニナリ

医難 銀鼻 銀吻 銀肛 銀陰

銀鼻ニ三日ニ死ナルモノハ或ハ會陰ニ此ノキ或ハ肝門ニ細キ尿道ノ如キ穴モアリ或ハ肝門ノ側ニ穴  
百モアリ細キ穴ニテサキ取ラハ不治ノ毒ニシテサキ取リ生セリ割カテ以テサキ取リ右後陰ニ引ケ三導リ  
ナクハ切シ右ノ口ヨリサシハキ毒ニ可抑毒ノ吻ノ如クハ血止又モノ本ノ口ヨリサシ此毒ニ引ケサキ取  
釣カケテケハ大ニ成テ毒ニ又口唇ノ上ヲサキ取セキ者アリ中ニハ此ヲリ剛本ニ程程入言留毒ニハ得ル  
ナシ此ヲ療タルニ毒縮ニテ向テ火傷ヲナシメテ付テ金食又毒ニ鍊ニテ右後陰ニ引ケ三ヲケリ日  
ニ毒ヲ貼メ三旬ヲメ金食メリ或者口ト云危ナリ正第銀陰銀肛銀吻毒ニ再出ス此ニ事

骨瘤凡

銀ノツギメノ外ニ骨ノ節ノ毒ニ出ル腫物ニテ格別腫モノノモコワラヌ先口中ヨリ腫シテ口明確ク矢ヨリ夕  
ニ痛生タルハ是多クハ毒ノ痛ニナリナリテ骨痛也結ラ右此症ヲナスト見エタリ紫暗如石膏相付  
火物ノ毒ヲ用フシ多ク腫ニナリハ毒ヲ腐者ハ膿ト膿ニ成甚見分確ニ膿アリト見ハ連ニ針スハハ  
破敵メイヤヤ入シ一毒腐腐者ハ毒ヲ毒ニタル孔ニ接毒毒ヲサスハハ正第ニ灸スルヲアリ是ハ骨々  
ノ灸ハ骨也又七ノ多クハ灸ニテ腐肉ヲ尽シテ毒ヲ除タル者ナリ余カ家ニテハ灸セズニテ治スハ右術共ニ  
起ヤリ故ニ術者存タルナリ隔ハ数尺ノ中ノ一毒木能ニ消毒毒ヲ用スハハ是テ治シテ毒ニモハ骨  
出ル者ハ接シテハ又誤治ニテ隔ニナルモノハ毒縮アカラテナリ

世俗ニ所謂氣腫ニ疑ハスル者ハ先ニ氣腫ハカハ内ニ六腑リコト又モノハ俗ニ氣腫トナテ者ハ瘰癧ノ  
ニ在リ又俗ニ氣腫ト云モノキルニ照レ込ニ漏孔ノアキタル者云是語リ

癰疽

俗ニ云イマツシ夢白ノニ種アリ是温熱ノ凝滞ニヨリテ出ル者ニテ甚痒キ者アリ正宗ノ四黃散瘰癧  
散ヲ貼テ瘰癧シキ者ハ出血スヘシ癰疽ハハ生肌散ヲスリテ田ニスリテモ治スルハ家傳ノ土大黃  
ヲ貼テモ知リハハ生肌散ヲ用テ又正宗ノ胡十丸モ知リ白癰ハ治シ難シ是則瘰癧ノ  
一症ナリ  
又俗間ニ胡桃ノ并阿育島里明戸一合 右ニ果末白湯ニテ送下  
医聲

齒痛

齒痛甚ニキ者ハ夢内ノ用ルナリ又巴豆一果ヲ痛齒ニテ暫カミシメルヨシ齒根虫ハ雄黃ノ末ヲ並  
葉ニモ之合火エリト共個ヲ痛齒ニ当ルニ銀齒一通リハ白朮ニテ知リルニ至テ割シキ者ハ片腦  
膏香ニテ末ノ貼スルニ申抑難矣ヲ食テテ治ス

齒痛甚ト云ハ初テハ痛シ難クハ血ヲシクニ内服ニテ膿出齒落ルニ至テ重者ハ死ニ至ルナリ  
ニ黃加ニ硝ヲ手強ク用ヘシ照臨甚ニキ者ハ甘密火貼葉ハ人中白散ニテヨシ  
銀齒ハ齒大ニ痛ムモノハ出血シテ末又古更加石末ヲ用ヘシ又銀大ニテテ出血シテ止者  
犀角地黃ニテ用テ止者ハ一奇方アリ四生ト名ツク方ハ正宗ニ齒痛ニ出

生荷葉

口瘡ハ上脘ニ生シ筋々下葉細長ニシテ飲食ノ障リニナル者ハ鉄ヲ以テ切斷根斷金銀ニテ貼ス  
又出血止者ハ血竭並名異ヲスルニ其妙ナリタル根ニセツトテ付テアリ其意親炙ニテニルヘシ

癰疽ハ舌根下生ス者ニテクニ根ヨリ切リ苦瓠散ヲスリ正宗ノ加果ニ陳トテ用ヘシ

齒從齒痛皆齒ノ根ヨリ膿出ル症大侷同ニ者ハ 懸疾凡ハ内ニ牙瘡凡ハ俗ニ云齒クサハ銀膠テ白ク

爛ルハハ寒毒凡ハ上ハハテ難留ノ如クナルハ銀膠ヨリ膠シ口中燒カ如クニ覺ルナリ何シモ  
出血シテ口ヲカハロテテ洗フヘシ人中白散ヲ貼シ又背肩ニ強クヨル者ハ三黃加芒硝ヲ用ヒ其分症ニヨ  
リ痛胃散ヲ用テ胃ノ作葉石末ニテ見合用ユヘシ

胎前

銀齒ハ仙人草葉ニテモ之痛齒ナリトシ他種ニ付ヘカ又ニハラリクナクハ治スル

一名鼻淵約言曰腸中膿々既痛鼻出膿汁者曰腦漏或陶滲下不止者曰鼻淵腦膿ニ凡熱アルト生  
スルハ鼻中ヨリ滲滲或黃水ノカタマリタル者也ルハ在鼻下ノ雜血者ハ此症ハ本前項毒ヲ愛知ナ  
シ補中益氣ニ薑香ヲ大ニ加テ甚知アリ又小柴胡加辛散石末モ宜シ又一方  
防風 黃芩 杏仁 甘草 川芎  
右五果水煎梅子毒毒ル者ハ  
大黃 甘草 芍藥 黃芩 杏仁 通輝 砂仁  
右七果水煎合テテ三合煎用食後ヲカタクス

破傷風

此症ハ打撲損傷及金瘡ヨリ凡氣鬱入テ瘰癧ヲ発シ甚ニキ者ハ口紫ニ角弓反張シ涎沫ヲ吐ル  
者ハ症ハ乾固ニシハ破傷風ノ微ハ初起必ス脈微澀ニシテ欲絶スルハ初ニ古強ク言皆出瘰  
クカシク推探ノ如クニ是ヨリ諸症蜂起スルハ又脈澀ニテ所在ヲ移シ瘰癧物トナルモノナリ  
胸膈エセマリ自行出ル者ハ必ス死ハ症ハ葛根木屑ニ薑丸事用或水續命一原附ニシテ用  
ルナリ脈脈敗スルハ症ニテハヨク危ナクテテリヤアカ或自夫ハ監テ重便ニテ用ユヘシ破傷

區ハ瘡口ヨリ湯水入テ大ニ腫痛スルナリカウ此症ハ口嚙及張ハキ着ス越婢加木附子用テ大效アリ破傷凡一方 飛杖差傷子 無患子妙

右ニ葉烏根一續索一ニ加用フシ又五真散ヲ量便ニテ服スルモ可シ何レモ葉ヲ穿シテ用ユヘシ候ニ用テハ起テシ聖散ノ粉和物ニテ起テシ候ニ用テハ如聖散水並ニ用テ起テ得ルナリ甚多ニ葛根一上倍子飛杖差傷子以テ升此合ニ無凡合分温服ニ船而け出而症再破

医辨

破傷凡初復背強或言諸瘡瘻或寒痺凡四ハ可治方續索一桂枝ハ葛根一或毛附子也無患子及張者ハ如聖散ヲ用テ起スルモノ也者方シ又クニ輕キハ無患子飛杖差傷子用テ起テ又妙ナリ症ニ痛強者又鋒中藥可シ

胸凡ハ者名ナレモ莫ハ破傷區ニ在再トメ一年モ不愈シ或ハ變少ニテ高ク桂アリ治方常ノ破傷區ニ同シ然レモ高腫ニテ水ヲケレノ如キ者ハ多ク此症ハ在變或變也

破傷區破傷凡流注自ラ別ク破傷區ハ區ノ或ハ金瘡或ハ擊傷等ヨリ温氣入テ腫物僅ニ少使不利者然木附子トクニ破傷凡ハ衝キ症或ハ竹木刺金瘡ハ勿論ノ右ノ処工凡ノシミコニ腹背強言諸瘡瘻四支拘急甚シキハ角弓及張兔角心下ニツキアケル氣急促迫者症ニ隨テ葛根一或無患子飛杖差傷子或如聖散或承氣一或些内ノ初ノ症アリ其中下初ヲ用テアレ比甚用處傷火更ナリ甚難ニ及ハ茶餅下百治無知セノ合谷ニ針スルナリ然レモハヨリ茶餅進ハク破傷凡ニ見極ニ道アリ毒氣腹節ニ攻入寸ハ甚大ケシ經絡内ニアルナリ隨分膿アリ故ニ合谷ヲサテ寸ハ卒切テ得ルナリ又流注ニハ何レモ氣血凝滯シテヨリ生ヌト思フナハ甚傷ナリ余家不然シ矣更ニ微ナル寸ハ每々多治驗傷疾功流注ノ内ハ誠ニ可笑ノ甚シキナリ余家ニテ流注トハ何レモ指或ハ疵カ出未レニ水氣ヲ含シ疵口ハ全ク愈テ二十日斗ニシテ

或或腫或肩或手拘急或腫無項最初伴寒熱此症痛不可忍ナリ其治症痛止止ニテ心ヨリナル候ニテリ膿ト膿管トヲ見テ針ニテ刺テ小膿汁甚多ク一二升ナリ七出虚脱シ易キ者ナリ故ニ此ヲ内托ノ初ヲ用テヨシサケル前ニ病人ノ看守者治變ノ致テ覺ニテ置テ不致取ハ医者誤治トシテテ受ケル者ハ右手ニ疵アレハ左氣流注シ右ノ手処々ニ流シ此ナリ是真ノ流注ナリ候候切ノ如クハ可受彼ノ内症ト取ルニテ余家ニテハ右ノ手治此ニ舟膏ナリ此内敗壞有又痰液附骨痛ハ者痛症ヲ宜施之勿傷紙上布尽ク治癒別附録ニ出破傷凡ハ至テ難治ノ角弓及張至テ不治如項背拘急戰慄者ハ挫症ハ葛根一無患子飛杖差傷子飛杖差傷子及張ニテ氣症ハ如聖散用テ起テヨリ起スルニ是奇中ノ奇針治術ニ此症親交シテ可見

破傷凡ニテ角弓及張者如聖散用テ起テリ此方余家ノ每際キ者ニ用ユ破傷區名證治率絶見多ク然レモ子カ用ル処ノ方ハ異ナリ今茲ニ逢毎ニ越木附子飛杖差傷子加ニ用ルヨリ神方ナリ劑初改ニ加飛杖差傷子用ル処間々アリ

打撲

高處ヨリ落テ氣絶スルナリ是葉水ヲ打散シ氣絶シテノ葉付モ不通者ハ治術ヲ入テ救生サスフシ口閉口禁スル者ハ口中ニキニテ口アケ盡便テ阻ヤテ用ユ亦家方ノ回生散ヲ治サシ服サシムルモヨシ傷レシテ飛血滯リテ腫痛者ハ和經一ヲ服シテラレトニテ度々ハスヘシ甚シキ者ハ葉仁飛血ヲ用テ若葉血滯リテ不散セノハ板針シテ飛血ヲ取ヘシ其跡ニハ楊梅散ヲ敷ヌヘシ或葉名異サカテ可ナリ骨連ハ整骨ノ術ニテ治ヌヘシ又杖創ハ多クハ葉血コリテ散ヌヘ高リ膠ノナヌモノ也散葉枯痛湯如



アリ破血ニ中氣ヲ散スヘシクシ陽キ蓋ハ無射於フ付ニ且ニ帳ニテハ左變破敵見合セ賜スツシ  
延壽

打撲ニテ腫ラテ名者キニテ能毒寸ハ腫脹ニルナリ

會陰打撲ニテ小便閉スル者ハ仲臣凡可ナリ男子會陰ヲ打損腫脹管ヲ塞テ小便通ズル一ト能呼吸息迫  
已飲此固子仲臣凡ヲ小便ヲヨリ通セシメナクハ息迫ケニク緩ニメリ此レ此通ニ水割ヲ授ケタル故其水イツシ  
ケレハ膀胱ハモメフ故ニ腫レ且又如前苦ム此才ニ由テ利水劑進テ固テ予ハ腹ヲヤシテ通セシム打撲ニテ  
骨ヲ折ル者アルオハ其後ニテ亦亦イテ之ニ蓋ス又之ヲ直ル者ナリ又折傷ニテ骨ヲ傷リ出テモ骨  
ヲ折ル處ニテアトヲ縫ヨクハ直ル者ナリトイテ離シ居ル故納メルハ又又腐ツキテアル  
一アル者ハ一トク一腐行キレハ格蓋テモ自ラアルヤフナル者ハ即テ納ラ術トスルナリ東南骨出  
ルトモ其後納メテハ其ナリニ因ツク一ナリ人ノアルヘキ因骨ナレハ存スルヲ以テ善トスルナリ委ニ又ヘカラス  
物ナラハ斷テノコリテ一モナリ骨内ノ多ク骨ノ細クナルハ至テカタキモノハ腕ハ腕ノ處ニナリ  
高キ處ヨリ墮或ハ打撲ニテ骨節ヲ折シ者ノ衝脈キレル故ニ折目ヨリ上ハ動搖其舟ノ一モ變りシ一  
モナケレ下ハ血氣不通故動搖不自固ニテ脚モヒカス大少便共ニ不通ノ者ナリ下劑ヲ授メシハ下部ニナリ  
ナリシラ其出ルヲ不知是謂所西洋人ノ神怪ヲ中テ瘦ラナルナリ又痿痺ヲ患ル人ニ脊骨ノ屈伸セシ者  
ハ治スレモ此病無カヌル者ナリ是又風濕ノ神經ノ瘦ラナルナリ  
筋ヲ引テ打撲ニテ或骨節ニ因テ胸中ヲ揉ナトシ者此ニ氣ヲ在ラ若此思行腹中酸痛如瘦或ハ筋節  
狂亂如有神靈ノ症ニ放シニ柴桑一ヲ用テ有神效  
小腹ヲ打タルハ會陰打撲ニテコライテ用ヒラシ又有用エル術ナリ花庄ニ人ヲ瘡セリ皮ヲヨリメシ一  
コレテ用ヘシ

### 陽痿火傷

火毒内攻シテ色々ノ毒ナクニ毒ナリ四腹疼痛火ノ腹ニ大赤ヲ點メツシ馬田ヲ又ルモヨシ此第ハ腫ルヘカラス  
凡テ乾テ毒ヲ忌ハテ毒ヲユルヨシ

火傷ニ因テ若キ者ノ指四指皆屬シテ愈有テリ則チ毒ヲ用テ四指ヲ伸シ白雲ヲ付テ托木ヲナリ甲ヨリ四指  
ナ指ヲ置テ置テリ白雲内赤クナリテ及内々毒ヲ點メ毒ヲ

火傷ニテ脛脛ナト引付タル者ナリヨシ見シハハシト此ニ上ニ浮ク引付タルヤフナレ決メサヨフニハ非スハ二  
トハ下ニ有ニ是ヲ押ハニ甚大ナキハ毒腫カニテ先皮ヲ切ナリハシトテ隨テ切ハカラス皮ノミヲ切リ知  
キヲ以テ引付ハハシトハ自ラ伸ル者ナリ

治火傷痕痕斑點毒ヲ治瘰癧高クナル者ナリ是ハ全ク最初ノ治瘰癧ニヨリ先報到ヲ以テ  
亂刺ヲ授テ若キ者ハ大毒ヲ蓋シ三四日置ハ自然ト一皮膚ヲ爛ルナリ此毒ハ月ヲ點ス

又瘰癧モ同ニ一皮膚ヲ切テ之ニ又一皮膚ヲ點メアルオハ後ニ毒ヲ切テ毒ヲ點メ下ノ毒ニトリ是テ右  
無ニ右ヲ點メテナリ此病ハ毒キ者ニ非ス然レ此治法ニ治マシムルナリ小病ニアルハ治シ易シ此並ニシテ

紫衣ナルト其色ナルトハ非治

### 甲疽

俗ニ云ツマハラミハ手足ノ瓜甲ニ生メ大ニ痛ムハ瓜ヲ切テ先鋒ヲ點ニ櫻如クテ服スツシ膿出ハ破敵ヲ點  
又疽ニヨリ高ニ用シテヤリ内ニ毒キ者也若キ者一年モ腐不止痛冬夜を絶者ナリ是ハ腐毒ヲ以テ治  
スル術ナリニカシト初シ人ハ行非ニ

### 癰疽

上唇ニ出テ大豆ノ或ハハメノ如ク至テ痛劇ニキ者ハ毒ヲ針スシハ血出テ止者ハ血痛トモロフ  
ニカレ此症ハ痛ナルナリト云フツし血出不息身骨痠痛之類聚ナル者ハ不治症ナリ黃連解毒一ヲ  
用シ中黄ヲ點スツシ腫唇ハ小兒痘疹又ハ長疔疔ナリ唇爛シテ變腫ヲ爛シテ毒出ナリ如キ者此

不者此症ハマ、マレハ齒磨ハ多テ稀ナルモノ

齒磨ハ上唇より齒磨ノ此ニ似タリ故ニ各ツク腫テ痛ナク又抑レハ出血シテ止ス是モ疔ノ一様ニ黃連解毒湯

痔瘻

痔瘻ハ所借積聚瘰癧ノ類ノ毒ニ多ク腹中工生メ外ニ出者ハ去ナカラタシクニ腫上ルハ先鋒ヲ點シ

大黃牡丹一ヲ用上腹ヲ惟ヌヤフニナルハ脱スル道ニ敗菌散ナト見合用ユ

天蛇毒

蛇頭疔ハ五指頭ニ少シ赤腫劇痛寒熱ノ變アル者ハ大抵癰疽ノ由シテ血シテ先鋒ヲ

點シ少物大黃一ヲ點ス腫ニ成難キ者ハ膿管ヲ探リテ灸ス

日蝕瘡ハ指頭大ニ腫痛シ及ニ水胞ヲナス者ハ令ニ月ヲ貼ス

内ニ入ラヌ者ハ水ヲテ痛頓ニ愈

疔毒ハ凡ソノ此ヲテ名ツクハ或ハ腫ヲ赤ク熱シ或ハ背ヲフ、ウモアリ

疔毒ハ指先腫テ痛テ又俗ニ指ス、キト云ニテ治法同シ

疔毒ハ天蛇毒ニ似シ疔瘡痛多ク甚シリ又ハ或ハ疔瘡痛ナクシ或ハ疔瘡痛ナクシ

頭痛

頭痛六分 辰砂四分 石三葉ヲ鼻中ニ吹入ルハ痛甚シキ者ハ白鹿一梅五ノ者ハ大蘇加

頭痛經年不止者瓜蒂末吹管吹鼻中又刺大阳穴出血真頭痛ハ芫芷香薷散加石屑荆芥細辛

瓜蒂末散テ用テ頭痛ニ三等アリ水ニ屬スル者ハ主又加長本一或瓜蒂ニ藜蘆散兼用ス

血ニ屬スル者ハ黃連ヲ兼用又一極氣ニ屬スル者アリ暗日ニ歩行スハ痛ト云是甚難治其治法ヲ

得又一日ハ林見豆ノ者アリ見ルニ目見火則痛者トアリ即九葉丸治一此理ニ因テ夫ノ暗日ニ

頭痛スル者ニハ九葉丸一ヲ用テ音連テリ毎々暖テリ又毒ヲ毒ニヨツテ頭痛スル者ハ先ツ

六物解毒一ヲ用テ毒一ヲ去ル一モノ一トシ一日ニツク用テ毒ニ同テ腫日ニ用テ大極此四者ノ外ニ

五出外疔疔同テ頭痛スルハ此列ニ非ス真頭痛ト云者アリ必此ヲ兼ル者ハ而長葉更一ノ疔ナリ

水ニ屬スル頭痛ハ唇中ノ痛也屬スル頭痛ハ唇夜ノ別ナリ珠ニ夜ハ甚シキ

疔ノ毒ハ又ハ蛇虎口疔百了蟹又毒蟹毒每ト極々ノ毒アリキノ大指ト次指トノ股ニ生シ初ハ水也

疔六出痛ハクニキ者ハ又紅糸ノ引アリ血ヲ取テハ黃連解毒湯ヲ用テ疔ハ用テハカラス

疔ヨリ疔カクシ又毒中尺以ヨリ血ヲ取テハ疔子ノ毒ヲ鼻中ニ吹モヨシ犀角地黃一ヲ服シ或ハ犀角

疔ヲ用テミイラシ毒ヲ服シテハ此ハ疔毒ヲハ三黃加硝モヨクシキハ又毒骨 蠶鼠霜未トテ吹又

毒疔疔七件

牙縫出血

諸胃腹水一三洋角連葉ヲ加工用製ハ三黃散<sup>三</sup>石<sup>石</sup>一<sup>一</sup>又血出不止者ハカルニイテ合之九<sup>九</sup>白<sup>白</sup>散<sup>散</sup>ヲ口<sup>口</sup>中<sup>中</sup>

血崩血瘕

血崩ハ毛孔ニカキラス疾<sup>疾</sup>瘕<sup>瘕</sup>ヨリ血逆<sup>逆</sup>出<sup>出</sup>止<sup>止</sup>リ難<sup>難</sup>リ遂<sup>遂</sup>ニ脱<sup>脱</sup>ニテ死<sup>死</sup>スル者<sup>者</sup>ハ入<sup>入</sup>門<sup>門</sup>曰<sup>曰</sup>血<sup>血</sup>崩<sup>崩</sup>腸<sup>腸</sup>癉<sup>癉</sup>俗<sup>俗</sup>呼<sup>呼</sup>血<sup>血</sup>前<sup>前</sup>

其便血<sup>便血</sup>既<sup>既</sup>出<sup>出</sup>有<sup>有</sup>力<sup>力</sup>給<sup>給</sup>如<sup>如</sup>箭<sup>箭</sup>逆<sup>逆</sup>射<sup>射</sup>因<sup>因</sup>名<sup>名</sup>之<sup>之</sup>是<sup>是</sup>與<sup>與</sup>正<sup>正</sup>宗<sup>宗</sup>名<sup>名</sup>同<sup>同</sup>而<sup>而</sup>証<sup>証</sup>異<sup>異</sup>之<sup>之</sup>

血瘕

血瘕ハ初<sup>初</sup>起<sup>起</sup>リイキ<sup>キ</sup>コ<sup>コ</sup>ノ如<sup>如</sup>ク皮<sup>皮</sup>ウ<sup>ウ</sup>ス<sup>ス</sup>リニテ折<sup>折</sup>ナ<sup>ナ</sup>ハサ<sup>サ</sup>リテ血<sup>血</sup>出<sup>出</sup>ル<sup>ル</sup>ト血<sup>血</sup>不<sup>不</sup>止<sup>止</sup>ハ血<sup>血</sup>瘕<sup>瘕</sup>ノ正<sup>正</sup>骨<sup>骨</sup>ノホ<sup>ホ</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>白<sup>白</sup>シ<sup>シ</sup>湯<sup>湯</sup>ハ<sup>ハ</sup>瘕<sup>瘕</sup>

腎瘕

是<sup>是</sup>モ天<sup>天</sup>刑<sup>刑</sup>ノ一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニテ子<sup>子</sup>臣<sup>臣</sup>ノウ<sup>ウ</sup>フ<sup>フ</sup>ア<sup>ア</sup>カ<sup>カ</sup>シ<sup>シ</sup>ノ様<sup>様</sup>ニ<sup>ニ</sup>裂<sup>裂</sup>ニテ<sup>ニ</sup>冬<sup>冬</sup>君<sup>君</sup>ニ<sup>ニ</sup>宿<sup>宿</sup>燄<sup>燄</sup>ス<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>桐<sup>桐</sup>固<sup>固</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>テ<sup>テ</sup>八<sup>八</sup>景<sup>景</sup>道<sup>道</sup>逆<sup>逆</sup>散<sup>散</sup>ニ<sup>ニ</sup>地<sup>地</sup>

瘕

倍<sup>倍</sup>ニ<sup>ニ</sup>イ<sup>イ</sup>ニ<sup>ニ</sup>キ<sup>キ</sup>ニ<sup>ニ</sup>タ<sup>タ</sup>ム<sup>ム</sup>ニ<sup>ニ</sup>蛇<sup>蛇</sup>床<sup>床</sup>子<sup>子</sup>散<sup>散</sup>刑<sup>刑</sup>弁<sup>弁</sup>一<sup>一</sup>ニ<sup>ニ</sup>洗<sup>洗</sup>テ<sup>テ</sup>土<sup>土</sup>大<sup>大</sup>魚<sup>魚</sup>ノ<sup>ノ</sup>白<sup>白</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>白<sup>白</sup>シ<sup>シ</sup>服<sup>服</sup>茶<sup>茶</sup>ハ<sup>ハ</sup>瘕<sup>瘕</sup>厚<sup>厚</sup>ニ<sup>ニ</sup>解<sup>解</sup>ノ<sup>ノ</sup>受<sup>受</sup>ニ<sup>ニ</sup>

瘕

腎<sup>腎</sup>瘕<sup>瘕</sup>ハ<sup>ハ</sup>經<sup>經</sup>行<sup>行</sup>ハ<sup>ハ</sup>收<sup>收</sup>斂<sup>斂</sup>胎<sup>胎</sup>ス<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>者<sup>者</sup>ニ<sup>ニ</sup>此<sup>此</sup>病<sup>病</sup>生<sup>生</sup>ル<sup>ル</sup>云<sup>云</sup>瘕<sup>瘕</sup>散<sup>散</sup>生<sup>生</sup>白<sup>白</sup>經<sup>經</sup>行<sup>行</sup>之<sup>之</sup>男<sup>男</sup>女<sup>女</sup>夫<sup>夫</sup>合<sup>合</sup>テ<sup>テ</sup>セ<sup>セ</sup>ハ<sup>ハ</sup>其<sup>其</sup>見<sup>見</sup>心<sup>心</sup>煩<sup>煩</sup>ト<sup>ト</sup>ル<sup>ル</sup>夫<sup>夫</sup>

瘕

瘕<sup>瘕</sup>ニ<sup>ニ</sup>シ<sup>シ</sup>セ<sup>セ</sup>ン<sup>ン</sup>遠<sup>遠</sup>凡<sup>凡</sup>瘕<sup>瘕</sup>腫<sup>腫</sup>脹<sup>脹</sup>也<sup>也</sup>瘕<sup>瘕</sup>カ<sup>カ</sup>モ<sup>モ</sup>初<sup>初</sup>起<sup>起</sup>瘕<sup>瘕</sup>五<sup>五</sup>ニ<sup>ニ</sup>ハ<sup>ハ</sup>瘕<sup>瘕</sup>因<sup>因</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>多<sup>多</sup>食<sup>食</sup>ス<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>ハ<sup>ハ</sup>能<sup>能</sup>瘕<sup>瘕</sup>ス<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>也<sup>也</sup>面<sup>面</sup>部<sup>部</sup>阴<sup>阴</sup>處<sup>處</sup>

瘕

瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>

瘕

瘕<sup>瘕</sup>ニ<sup>ニ</sup>シ<sup>シ</sup>セ<sup>セ</sup>ン<sup>ン</sup>遠<sup>遠</sup>凡<sup>凡</sup>瘕<sup>瘕</sup>腫<sup>腫</sup>脹<sup>脹</sup>也<sup>也</sup>瘕<sup>瘕</sup>カ<sup>カ</sup>モ<sup>モ</sup>初<sup>初</sup>起<sup>起</sup>瘕<sup>瘕</sup>五<sup>五</sup>ニ<sup>ニ</sup>ハ<sup>ハ</sup>瘕<sup>瘕</sup>因<sup>因</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>多<sup>多</sup>食<sup>食</sup>ス<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>ハ<sup>ハ</sup>能<sup>能</sup>瘕<sup>瘕</sup>ス<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>也<sup>也</sup>面<sup>面</sup>部<sup>部</sup>阴<sup>阴</sup>處<sup>處</sup>

瘕

瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>

瘕

瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>

瘕

瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>瘕<sup>瘕</sup>ノ<sup>ノ</sup>患<sup>患</sup>ハ<sup>ハ</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>一<sup>一</sup>種<sup>種</sup>ニ<sup>ニ</sup>テ<sup>テ</sup>血<sup>血</sup>ノ<sup>ノ</sup>不<sup>不</sup>行<sup>行</sup>也<sup>也</sup>

是ノ疾ハ産后感冒ニシテ破針シテ瘧疾ヲトリ中熱ヲ除ク瘧疾ハ左腕ヲ貼スルニ最モ効アリ

一婦人産后此疾ヲ患シ良久不愈也此疾ニテリタリヨリ見レハ真ノ瘧疾ニ似テ然レドモ瘧疾ハ左腕ヲ貼スルニ最モ効アリ

瘧疾

中ノ疾ハ破針シテ瘧疾ヲトリ中熱ヲ除ク瘧疾ハ左腕ヲ貼スルニ最モ効アリ

瘧疾

一在黃濁病又瘧疾ト云初起瘧疾ニ患シテ瘧疾ハ破針シテ瘧疾ヲ除ク瘧疾ハ左腕ヲ貼スルニ最モ効アリ

瘧疾

俗ニ云瘧疾ヤケシ冬ニ限リテ瘧疾ニ患シテ瘧疾ハ破針シテ瘧疾ヲ除ク瘧疾ハ左腕ヲ貼スルニ最モ効アリ

瘧疾

瘧疾ハ破針シテ瘧疾ヲ除ク瘧疾ハ左腕ヲ貼スルニ最モ効アリ



大丹

正氣白經腹丹又帶腰痛也云單施ニ火丹瘧ト云此如天張丹也瘧疾ハ破針シテ瘧疾ヲ除ク瘧疾ハ左腕ヲ貼スルニ最モ効アリ

天也

錢カガノ如ク又腹丹ノ良ニテ瘧疾ニ患シテ瘧疾ハ破針シテ瘧疾ヲ除ク瘧疾ハ左腕ヲ貼スルニ最モ効アリ

瘧疾

瘧疾ハ破針シテ瘧疾ヲ除ク瘧疾ハ左腕ヲ貼スルニ最モ効アリ

瘧疾

瘧疾ハ破針シテ瘧疾ヲ除ク瘧疾ハ左腕ヲ貼スルニ最モ効アリ

客カレ故ニ酒ヲ事ケル者トイヘリ酒直ニ其ハ先ツ私利シテ以テ兼ノ者ヲサシテロキシクハ能ク水出テシ  
リナリ也

甚難

俗云ハカスシカシテ客ハナク子見苦キ者ハ正氣ノ和客比ニテ既シ和肌散ヲスルハカラスリ  
ノ様ヲ和シ大率モヨシ又氣血ヲ和シテ洗フモヨシ皮膚痛痒燻スルモノハ六果凡テ服シテ可ナリ降  
汗加テ可シ

油丹

俗云云毒親大患シ此年ニテモ後落眉存モハケテ癩疾ニ類似在ルカレロ此症ハ跡先ルナリハルサニ  
テ脂シテヨシ又車輪油ワヌルハ又桐油霜ヲ油ニテ燻付ル本草ニ出タリ正氣霍膠門ノ神應  
養真丹ヲ服スルハ起アリ多病ノ者髪落ルハ多ク又加意此ヨリトスル有

白髮ヲ黒クスル方 櫻桐子ヲ生テスリツフハ甘クシクナリ髪ハ蘭産脂ニテ洗フハ又奇方  
奈其油橋本実田 右ニ果実有スルハ

正性 男子ノ油丹ハ難治ナリ婦人ハ易治ト云々方付所通聖如側拍葉隨忘或ハ正氣ノ神應養真丹起ア  
リ

油丹ニテハ児七八ノ歳ヨリ頭髪脱ルモノアリ其取直ニ療治スルハ治又日ヲ経シハ難治ナリ脱  
落甚者ハ一夜ノ内ニ肉大ニ脱スル者ハ海芥ノニテ洗ヒ養真丹ヲ用エシハ治スル也

白屑凡

フケノノ一ハ葛根皮煎シテ湯ハシ割シキ者ハ龍門丸ニテ下スハ亦好過モ起アリ甚豆下  
ホフビンツケニ子リ合セ自モヨシ

耳痛

傳耳ハ和起ノ聲唱ノ如ク或腫痛シテ膿付多ク出ル様ニナリ割シケレハ解ル者ハ柳子油ヲサシツクハ患  
割子散或ハ葛根皮煎シテ湯ハシ割シキ者ハ龍門丸ニテ下スハ亦好過モ起アリ甚豆下  
ホフビンツケニ子リ合セ自モヨシ

ノ耳痛ト云ハ治ノ方ニテハ  
耳痛ト云ハ則耳痛ノ耳内虫因大サ者ノ様ノ如ク痛不可忍蔓刺子散付通ヲ用ヒカモノイ  
ルヲ入樽耳ノ如ク其毒ヲサシテナルモノアリ水聲聲唱ヲサセ昆膿付余リ多クハ不出者ハ變痛膿時  
ニ取ルモノハ辛夷散附欠山牛ノナトニテ起テキモノ蓋又和皮木附ニ炙大蓋入ノ應聲散系  
用シ或ハ酒毎毎毎毎見合セ用エツシニテモ不治者ハソツセルヲ用ヘシ又必丹ニテ治スルニ  
何レ耳痛ヲトシト痛モヤリ付モ不也ヤテリテハ不治也或傳ニ云毒毒并解ノ者ハ前フト  
ノ島ノ痛ヲ治シテ散ニ如ク是門々煎ケニテ用ユル在

耳ノ中虫ノ入テノ向難出者イリ衆人彼是トスレ氏段々奥エ入テ甚六ツケシキモノナリヒツカケ  
テ以テ手術ニテ治ス

肺癆

肺癆ハ生理ニ愈シ第ヲ貼スベカラス内攻スルハ炭荳硝荳棟ニ桑ヲ煎ケニテ頻ニ洗フハ並湯  
ハ葛根皮煎シテ湯ハシ割シキ者ハ龍門丸ニテ下スハ亦好過モ起アリ甚豆下  
ホフビンツケニ子リ合セ自モヨシ

毒越婢木相ノ葉見合セ用エツシ收粟イセボノ水ノイマハマヲ煎シ洗フ又山蜂出ヲスリツフハ  
又能クヲスリツフハ見ルモヨシ毎々感スル人アリ是ニハ古キ條若ヲタキハ大ニ感セヒムレハ再  
感セキモノ也

竹木刺

竹木刺身ニ入リテ其ツケヲアルハ毛引ニテ取テ其ニアルモノハ半針ニテロアヤカセラキカケニテ取テ其  
口ナルモノハ洗酒ニテ洗ヒ過シ金癩田ヲ塗テ其ニハ野雞子左ノ足ノ末ヲ穿テ子ノ口ニテ解自針ノ末々  
ルニハ針ヲカミリクタクテ其ノ末ノ滑ノ咽ニ至ルニハ鯉鱗ノ鱗ヲ白湯ニテ服又又ツケノ末タルニケテラノ  
出テ其ニシテ自レ妙シ

医辭

南紀ニテ馬鹿ヨリ毒ヲ得テ其ニテナセ六指ノアタリヨリ小版ニ投シ其アリ背ヲ抜ケハ逆改ニテ股エヌキ  
出シケルニ故ナリ能ケルト云リ  
又牛角ヲ會傷テ毒散シシ者此毒ヲ除クアリシニ縫テ直リコトモアリ其モヤ任ノ通セヌヤフノモノ  
ハ要知ト知トシ

一人勿術ノ真似ニテ針ヲノミ咽ニカマリタルヲ先生外因ヨリ抑テ出セシトモアルヨシ然レド外ヨリ針  
ノアル處ニ知者也

針ヲトノ折シタルハ視タル處ヨリ出テツツテ有者故痛ク出テ以テ所在ト云ヘシツシカウカバイヤ一  
ナリ慢ニ傷ロヨリ抑テカラス

一人眼ヲ變テ眼ノ外ヨリ唇キ膜ノ眼珠ノ如クニ出タルアリ少サキ口ヨリ雜音ノ大サノ物出シ者故ニ  
中ニ難入者ナリ是ハ呼吸ニシタガイヤシツク入ルヘシ中ニ多ク入者ニ非又痰皮モ入ヘシ眼ニ作ノ  
タキテキヲ狂テモシラヌ者ナリ唯眼病ノヤフニ思フテアリシニ直ラヌ故ニ見レハ此ノ斗ノ  
作アリトシ

瘰癧

本ニ物ノ瘰癧ハ子フコノ如キ者瘰癧ハヤセオク毒門生丸通天論口片出而逆登瘰癧云々此証兼做

濕痰凝結連ニ成瘰癧云々正氣ニ就ルハアセオク想身粟芥ノ如ク先ノ尖リシ者出膿モナク  
痛痒スル者ニ浮腫如大黃或仿凡瘰癧ヲ服シ則チ瘰癧ハ正氣ノ毒散ヲシ又凡ノ付ニテ天花粉ヲ自  
ルモヨシ

疔眼

小兒ノ眼ニ生メ膿ヲナス者ニ正氣ニ天行病ノ瘰癧ニイヘ是多クハ食熱ノ毒ニシテ外感ノ一ニ非又甚強ク  
ナ狂心ヲナス者ニ才散ニ先鋒ヲ貼テ瘰癧如石モヨシ瘰癧ヲハ内地云々

瘰癧

舌ノ下ノ也ニ赤シ多ノ如キ者此也ニナル痛アリテ不能言者針ヲヒロク入テ白キ暗ヲ出ヌ瘰癧ヲ抑リシ  
金銀ニ或種砂ヲ吹テテ服者ハ毒速解毒ニ或正氣ノ如キ瘰癧ニテ用ヘシ又方 此瘰癧ニ向

瘰癧

牙及 舌更 瘰癧者多ク 甘草ナリ 石水魚之服是瘰癧ノ聖藥也他藥ノ及處ニ非ヌ

医辭

天刺ヲ治セント然レハ先見瘰癧ノ瘰癧ヲ知テ手ノ肌膚瘰癧ナク抑痛シテ先テ其ノ又眼中黃ニシテ稍  
神ナリ或ハ又血ヲ帶ルモノ又合各内腫在者コシ瘰癧ナリノ眼喙針スル者又灸治出血温泉ノ瘰癧  
知温泉治タルモノ瘰癧ニテ瘰癧ニ至ル出血ハ予之ヲ試シシニ暈刺ニ至ル迄出血セシ者アレバ又本ニ  
及リテ蓋ナシ及テ眼ニ及ラズ

瘰癧

瘰癧ニテ毒肩背ニ登者ハ毒隔キ故ク瘰癧ニ又肩内腫者ハ瘰癧ニ

至テ小サキ者ニ腫物ニシテ所在テ迄ナク延延ノ如ク延延タルモノハ先鋒ヲ貼シ烏頭一ニ白世散ヲ用スルニ  
膿ニテハ早ク扱フ

咬傷

人ニ咬シタルハ毒氣甚キ者ハ出血ハ血名異或ハ血獨ニテ齒ハツシ痛甚シキニハ中葉ヲ貼スル一毒刺シキ  
ハルサシ毒毒即チ又ルツシ痛止テ好シ又黒砂糖ヲ用ル一モアリ亦同シ一正第ノ醫散散モヨシ又  
症ヲリニ者一ニテ此ノモアリ此散ハ十數ノ葉ニ加芽根ニ分別ニ香サキヲ食カレモヨシ

葉毒 小葉ノ水水煎一方六物解毒一嬰絡脚一果水煎兼用

葉毒方 綿突ニ炙 蒲黃一匙 右藥ロカハス

又方犀角嬰絡脚 二果細末白芽根煎汁送下此方尤流毒癩口久不愈者水々謹陪石主  
之

凡文傷

凡文ニ咬シタルニハ刺シクナレハ毒氣衝ニ股股ノ皮破スル者ハ赤ハ豆五辛麻等觸ル一ヲ忌ム一瘡腫  
ノ生因テ解毒ニ是レ管ニ大此ノ上ニ人ノ糞ヲニキ夫ス一或雞冠雄黃ヲ中葉ニ夫セテ貼ス又破敵ヲ貼ス  
一アリ則傷敗毒毒毒越婢木作烏頭一ニ罌丹ヲ兼用又黃連解毒ニ犀角水龍子ヲ加ヘ用ユレハメ  
シケシ一ヲ移リ如ナルニ得一ニ南都一医ノ傳ニ雞冠雄黃葛根ニ果為末以刑傷敗毒散煎一ニテ  
送下又且三果ノ末ヲ用テテテテ一症貼ト云リ

面生紫黑斑

是ハ前ノ在斑ノ治法同シヤハリソバカス

医傳

交ナト斑ヲ急ニ斑ヨリ血ノ出ル症アリ温疫ノ症ニアリ血ノ出ル症アリ白虎一者斑ハ危篤ニナリ

マ々出斑ノ至ル症ハ毒氣毒根ヨリ出血スル一アル者

叔中凡

疥癬ノ毒ヲ甚痒キ痒クハタレテ次者ニハビレシ疥ハ指ノ股ニ出ス是ハ指ニハ出セヌヲ以テソツ一  
消凡散如降降大葉之葉ヲ服一土大葉方ヲ貼ス又疥癬ノ毒一ニテ指ニモヨシ

枯節筋

俗ニ云々目ノ多ク初初ノ間ニ生々ハ蓋ニ生ニテ多ク服ス一ロヲ経レハ破腹スル一破敵ヲ貼シ毒取者ハ  
葉毒ニテヤル一ハ疥癬ノ治法ニ從一

脚

婦人ニ限ラズ行旅スル人ニ多ク出ル一俗ニ云々イキレ一初起指ノ間ニ出テ痒クカケハ糊シテ付出毒キ  
カタキ者一正第ノ粘香散ヲ自一白世散散毒モヨシ甚シキハ指曲ヲヌル一

手足破裂

俗ニ云々カキレ一豆ニ灰カ自トヨク出ルモノハ醫毒ハ似タシカカケハセ又モノハ甚シキハ  
血出ル一茄子ノ根ヲ煎シテ此方一先鋒又ハ脚肌ト貼ス一服毒ハ加第道逆散ニ刑者地骨皮  
ヲ加工用ニ此症平生足定葉ヲ看テヨシ又豆葉ノ内ニ敷皮ヲ入レハ此患ナレト云リ

眼丹

初起眼丹ノ如ク自テ初日ヲコライ一其又先鋒ヲ貼ニ刑敗毒每極痛加天黃ヲ服ス一膿毒アラハ早ク  
サヌ一シ益ラサレハ痛ナリテ一葉ニ年々無サレモノハ葛根木屑ニ粉劑ヲ兼用一テ久服スレハ治スレ  
是ハ疥ヲ潰リサヌ一ハ鼻ノ一医曰此症初起ニ益ラサレハ腫痛ノ速ニ愈ルト云リ俗ニ物モライ一ル  
目ト云一

異子

三枚針ニテ三處ホトオセシセトリツリアリ其ノ上ヲ三イニイニテ其セマケハニ三日ノ内ニナルナリ婦人ナド針  
ヲ忌ル者ハ解毒ノ火ニテオモセキ其毒エセツトシテ毒ヲシ大ナルモノハ板毒ヲワカフ一モアリ又高キ者  
ハ毒味ノ和シクナリクハ強クセツトシ自レハチツル也  
又一方方 淋毒ヲ飲毒ニテホキ有レハ解毒ニ枚ルホ云リ者哉  
臣譯

異子大ニテノ尖起スル者多ク不可取之々及花スルヨリ異子ノ根豆ヲ取尽セハ不冉養一ノ病入也  
大半以前腐毒ニテ取ル所々及花シテ如梅毒毒ヲ得ルモノフカラアコラ付テ自衛ヲ取又取  
合治トモ及花セシロ又皮膚腐キ處故ニ軽キ腐毒ヲ取久甚大ニ持フ

眼胞菌毒

是則眼毒ノ下目ヲクニ生メ痛痒キ者ノ内ヨリ引カニテ抑ナリ外ヨリ取ベカラ又小ナル者ハ橋核ノ  
大ノ如ク大ナル者ハ小ナル者ニテ抑ナリ  
臣譯

菌毒モ振針ニテ抑ナリ是モ内ヨリ及シタルハ又菌ノ大豆ヨリソラニ位シ其毒ニ大ナルハ痛ナリ  
内ヨリ粉掃ノマフナルモノ出ルナリ

眼胞菌毒ハ多クハ上胞ノ内ニ生シテ漸々大ニナリ胞ヲシテ高ク痛ノ如クナル最ナル者ハ田澤ノ  
如ク目ヲ腫レメ高ク赤クナリ或ハ甚シキ者ハ眼目痛痛ナリ痔治ハ胞ヲ及シ見シハ毒ニナルヲ  
及鉄ニテ抑ナリ内ヨリ粉掃ノ如キ者出ルノヲ免リ絞リ出スヘシ又大ナル者ハ及ニカ、ラ、ス  
矢後上ヨリ抑ルハ白出ヲ取ス  
体元

眼鼻ノリ、銅箱ニテ毒ヲヨリ申シ酸下ヲヨリ洗ヒ去ル者利ルヘシ其毒エ自毒スヘシ

世傳 明者 輕粉 胆毒 白起石

右方亦分細末ニシテ水ニテ抑リ自レ正毒ノ自毒ヲ起ナリ

又方 海魚 右ノ果細クナリクハ血出シカスヲ去リ能毒ヲマメ勝ノ如クナル眼毒ニ及シ  
ハ其人鼻水ナリトシトス

白赤瘰癧

俗ニ云シラクモハ小兒ニ多シ排形ノ出ナリテヨク又白雲ヲ付テ毒根が大毒治通ノ毒服ナシニ甚シ  
キ者ハ毒因ガナリ下スヘシ  
又方維子白散ニ和シタル又雜頭毒痛腫知レテ瘡ヲ破リ付ル

如癖

小兒ノ腹上ニ一而ニ粉又カノ如ク出甚シクハ八周自レ及ヒ甚ク痒リ搔ケハ汁出難キモノナリ  
大運先氣ヲ稀納ヲカラク此々坐丹ヲ以テ下スヘシ又馬明一ヲ用テ以テカテ用テ治セシ者ア  
リ古キ毒毒ヲ以テ毒ニシテ其ノ其ニテワリヘシ古先生曰母姓娘中トキキノ毒ヲ多食スルハ  
其子此疾ヲ患ヒ且智ヲ薄トナリ城ルニ多クハ出リ

瘰癧

一名腦瘰瘰ニ云ハ子ノ小兒胎毒ニテ腹上ニ生シ多クハ腫ニナル者ノ瘰ヲ推セハ直ニ皮色ニ及スルヘシ  
根針ニテ先鋒ヲ取ルヘシ服毒ハ毒根ヲ去リ大運先文又ハ瘰子瘰毒一ヲ用テ以テ下ス  
ヘシ此毒毒ノ毒根ヲ去リ服スルハ毒ハ下ニ下ルノ毒ニ在定ニ蛇足皮ヲ交ヘ取スルハ毒根カタクナラ  
サル也

遺毒爛痂







檳榔 薄荷 川芎 羌活 續斷 黃柏



陰凡

右三藥煎汁以酒煎之蒸之... 陰毛二母ノ生スルノ甚クシキ者ハ腋下及ヒ眉毛エ移ルルモヲツリテ又ルハ丹凡難粉樽賜三第ヲ  
解ニテトキ甘又洗藥方 百部根 露蜂房  
右三藥水ニ合テ以テ一合ニ蒸シ頻リニ洗ヒ其跡工黃柏難粉ニハ在砂ニハ  
右三第未ヲ又リ甘トシ亦無憂能可シ 其湯蒸ノ蛇尾子サハ宜シ

葡萄疫

不時ニ流行スル者シ多小兒ニテ初起寒熱甚シク面部工大豆粒ノ如クフツク其リ出テケシ痛モアリ  
水泡ニテリ唇ハ爛ルル針ニテ水ヲロリ中葉ヲ貼シ平血欠葛根加桔梗十葉敗毒ノ更見合用エトシ

百虫入身

諸虫身ノ中ニ入テ不出者ハ其マ、置テモ少ヤキテハ當ニテ又是ニハヤシエテ入ルハ大ナル虫及出毒ヲ又  
者ハ雞冠雞黃ヲ芥ノ中ニ入シ而燒共煙ニテ毒又ト出ルル者不出者ハ中ニテ死スル

惡虫叮咬

蜂ニヤシタルニハ中葉ニ雄黃ヲ煉文貼又難多クシテ痛甚シキ者ハ出血スルモヨシ入箱燻テテ醉ニテ  
陳骨ルモヨシ

跌打傷之同シ

暖地ノ毒ハ一柳酒中ニ入テ中葉ニ雄黃ヲ煉文貼又難多クシテ痛甚シキ者ハ出血スルモヨシ入箱燻テテ醉ニテ  
其内葉用ストシ日ハ中葉ニ雄黃ヲ加工貼シテヨシ其毒葉根ノ果膿血ニテ用エトシ如何程ハケシ  
キ者モ治ルル又蒸棧ニテ咬處爛シ痛者ハ十葉ニ葉根ヲ加工用又蠶連解毒ニ葉ノ尾草ヲ加工用テ



嵌骨針 缺骨 破咽喉

更骨ノ咽ニ入タルニ醉ニ合テ出テ位ニ置シテ服カシム又鴉ノ腹内ニアル出テ取乾シテキ未ノ服カシム  
又柳実霜ニ葉ヲ用テ膏妙シ喉痺及竹木刺ニ妙シ又鳳仙白花 鬼燈 右霜ヲ醉ニテ  
トキ用能ノ咽ニツマリタルハ胡ノ固ノ果服カシムトシ又醉テ膿血ニテ用モヨシ鉄針ナト内中エテ  
不出ハ磁石ノ末ヲ瘡口ニ月シハ所取ニ抜ル



中 柳毒

砒毒ニテタリ惡寒 花飛ヲ毒ニ刺シキ者ハ攻心ノ線豆大黃甘草石水煎服又黃連解毒十貼ノ  
兼用ルモアリ

阿膠毒ハ藍ノ果ニ里砂糖ヲ煉末セ服ストシ甚シキ者ハ人屎犀角ノ更知ナシ一奇方

白砂糖ニ竹喰ツタヘサシムトシ其起如神是蜜人糞ノ方シケシ後ナル者ハ楊梅皮及蠟血メ用エトシ  
其方起他方ニ勝レリト云又其起子皮血ニ服スルハ此出タルモノハ甚多奇方アリ

陰毒

稀ナル症ナリ會傷也ヨリ小版近モ膏ル者ハ一層本毒アリ穿然トシテ陰ヨリ陰毒起入腸ヲ作テ  
コレヲ蒸スオハ暫止ムコシテ熱視スルニ會傷ニ膿管アリ刺テ惡臭ノ者ヲ出ス後テ既ニ四日ニ  
シテ死ス此傷ノ病証併毒ナシハ此ニテ性ヲヤリ痔ナシハ肛門ノ方エムケ管アリ陰毒ナシハ  
痛ノ如ク強ク上テ痛ニ寒熱アリヨク後ヲナリテ并カストシ是ハ陰毒ハ又一人陰中ニテ  
會傷痛ニテ歩スベカラ又毒ノ毒ニ歸リ疼痛甚シク陰毒ニ似タリ諸医名吹スルヲア  
タハス日ニシテ破レテ出血止水者ニ腐リ握ヲブシノ大サニ此アキ死シタリ是亦陰毒也



朱深

是至下疳治之辨ノ前治鼻頰眉上トニ登ス氣骨ヨリ生ト見エ初起堅リ骨ニ付テ痛ニ包モ付ス  
骨痛ニ似テ方ニハ動モアル者ニ軟硬難ルモアリ如石堅硬ナルモノアリテ痛ク石ノ癭瘤ト異ル水アリ  
テ消長スルニタニク包骨紫包ニナリ破ニ脂水ヲ出シ瘻瘻体來自行盛付トナシテ骨收ノ故ヲア  
ラハミテ包死シ生々乳ノツヒルノ愛用テ一旦治ス凡標ナレバ又奪婦クナリテ終ニ死スル一人ニ拾  
草魚ヲ用ヒナキテ千金流乳穴ヲ服シ度テ脂水出テ羊牙ニシテ千金治ス防通如海蔘菊苣根本  
階ニ消毒ト云見合セ用ユトシ

正解

朱深ハ肩ヨリ上ニ生シ多ク耳下及頰邊ニ生スルニ初起核ヲ結テ漸ク大キクナルナリ世群ノコ  
シテ難クニ向運轉ス入石ハ自然ハロアキ惡付出テ膿不出痛ヲナス者共及花スルニ及フハ殆ト  
乳名ノ及花ト同シ

朱中毒

初起瘰癧ニテ甚リ痛強リ腫脹ハ及テ次第ニ瘦セ瘰癧中ノ四邊堅硬ニシテ石ノ如クニ脹テ日ヲ無シ公馬  
瘰癧ニテ少血ニ包ハ血星紫ニ包ハ膿サマツ、出斷々脱ニテ臭氣迫リハカラス終ニ死スル者古今不治ノ  
症ト云ハ不傳已ハ大黃牡丹皮ノ愛用ニカラカ附初ノ一ニテハ十キ瘰癧ニ思ハル、ノ若年ヨリ医事ニ研  
究スルノ不常洗湯心ニ思術ヲ得ルノモ多ク先味ノ未乾ヲ乾スルノモ諸君ノ知ルノイレバ朱深瘰癧  
中毒ノ症ニ於テハ未々得ル處ナシ

正解

朱中毒ノ秋ハ瘰癧中浸腫シ疼痛惡ヘカラス治星ノ腐リ惡付出テ膿ニハナラズ又腫頭トト次第ニ脱肉  
レ骨失ル者アリ世ニ見エテ動モスレハ瘰癧中毒ト云者アリ此症ハ脱肉杯ハ決メナリ及テ腫頭杯ノ腫

ルモノニ思ニ着過スベカラスハ物ト云

瘰癧中毒ハ鮮血出ル瘰癧ニナル者ニテ至テ瘰癧ナリ其内毒ヨリ生ルハ難シ瘰癧中毒ノ初起是ノ甲アタリ腫  
シ痛テアル内ニ瘰癧中ニ因テ心アシク女ニ痛ハ瘰癧ニナル、動カタリ先ツ當建ヲマルトシ或ハ島頭トナマル  
トモアルトシ、白ハ大毒ナトヲ動ナク、トシ久服シテ自然ト行ツトシ不圖石血ナトメ愈ルトモアルトシ決シテ  
刺スベカラス尺澤ノ也ト腫初ニ因テレキツケキノ廻ラヌヤフノ者了レバコレハ出血スル処ユヘニ治テ施  
サヌカコキナリ切テ血サハ大カク治レバ先用瘰癧ストシ瘰癧中毒ハ瘰癧中腫腫シテ疼痛及可忍石  
星瘰癧ナリ惡付出テ膿ニナラズ、瘰癧脱肉次第ニ骨トナルモノ、米毒毒ニテ瘰癧中浸腫シ痛モア  
レ脱肉也又テ瘰癧腫ルモノニ思ニ着過スベカラス

瘰癧類言 大尾

医譚

香洲幸園先生日記

失榮

先生嘗歎此語曰失榮氣懸於中蓋如キハ至テ難治ニシテ予モ未死又治術ノ如何スヘキ  
 ナリ又ハ術ノ子輩共歎ト症候トヲヨリ知テ病ヲ傷ルナカシ予知ノ今ノ吾ヲ見ルニ其難  
 治ナルヲ不知ハ危ニ臨テ救シサルヲ見テ初テ傷ルヲ竟テ厚腹ニシテ其病ヲ極ヒサルト問々多  
 ク予ニシテ三年前知及北弟近少弟在ノ殿上ニ病状ノ如キモノ奉シ一人連未テ治ラズナリ  
 シテ右病ニ連者ニ云此人ノ病所留氣懸ニシテ古未ヨリ治スル者ナシ是ノハ危ニ此ニテ死ニ至ル  
 ヘク早リ連弟ヲ家ニ召テ病者ニ聞スナシト云ケシハ後若大ニ驚キ古未ヨリ不治ニシテ先生又治  
 術ナシト云ハ夫クニ治スル人ナシト云フ程ヲ出ルニテ死ス  
 予嘗テ失榮ノ大ナル者ニ極針水ヲ用テ次第ナシテ用タシハ眼睛若クハス然レモ失榮ハ十二八九  
 大城夕故ニ病人モ苦堪カクキヲ忌テ劑ヲ尽セテ其眼睛緩ニシタカイ失榮又本ノ如ク大ニ眩テ  
 逝ニ死タリト云

一婦人來リ治ラズ先生ノ曰是失榮ニシテ不治ノ者ナリ予未タ治ヲ得ス是者強テ治ラズナ  
 屏故ニ篤ト是ヲ治スルニ未タ及花ニモ不及然レモ口開キ難クメ飲食ニ苦アリ故ニニ室丹一劑ヲ此ハ  
 眩テシク減シ飲食不能又一劑ヲ作り黃連解毒十貼ヲ与ヘ飯ラシム年四ヲ経テ死ス  
 失榮ハ必ス死ナリ处在ハ極ニテス卒然ニ死スル者ナリ又漸々ニ衰スルトモアルハ大カク動ノアル者ナリ  
 亦即チキキヨリ失榮ハ凡テ上郡ニ此ニ眩ニシテ右ノ如ク連轉トセズニテ痛モアリ  
 ノ塊ハハ入ニ鼻ナリ治ハ乳若ノ膏腹ノ状ノ如ク黄汁出テ死ニ至ル者ナリ



ナリ妻ニ切あすハ縫合ニテ台使通ナクツテ道路直ニカラ夫故ニ大抵ニテハ抑ラズ前ヨリテツス者ハ  
陰差ノ下ノ方ヨリ横ニナリ少スシ其口ニ使ル者ハ毎ルナリニ故ニ師家ニ一奇方アリ其少使テ國カズハ  
全ク無ル  
鹿城先生一婦人ヲ療セシハ大甘如餅大ニ出群故ニ右ノ内ニ水ヲ導テ碎テあせし一妙ナリ  
一婦人梅山ノ産婦ナリ娘又胎ヲ悪ル一七年其石大サ如拳碗重サ七十セアリ  
血脈ハ弱ニ加年南音ニ妙シ

諸瘍

凡屬腫痛腫癰動氣アツテ年々在スル者陰テ不可針 華國第一言社  
小兒腹ニ閉塞腫大ニテルモノアリ先生解木一ナキニ火吹筒ヲ以テ閉塞ノ頭ヲ吹シメタシハ復  
ニ愈タリ此術 本草中ノ附方ニ出リ

夏月瘡瘍ニ虫ヲ生スルツアリ瘡腫ヲ以テ巨ノ丹若クシテテ覆脱フ  
凡諸腫物ヲシテ腫脹ヲヨリ推去スルニ然シハ又大ニ高ル者ナリ又腫物ニ引テ重テ痛  
ヲ去スルモノハ再ヒ膿ヲナス者ハ諸瘍腫面を白盜汗出ル者元氣大虛ナリ

金瘡

金瘡ヲ傷ニ燒融ナハ六ニロフサワト口ヲ四ニ加テ用ルトアリ又山中ニテ燒融ナキ凡ハ指白ニテ洗テ  
ナシ

金瘡家酢酒菌ノ變也幸ノ變第スハ一憤怒房吏モ唯々ハ一ハカシ根ノ變也并推并ノ變  
ヲ第ス

灸道ナリ有瘡者ハ可治羊有瘡者ハ死ス食道羊有瘡者ハ可治金瘡腫癰ノ後メイキヤテ用ヒ  
八九言斗瘡血態テ台ハ五用ヒ血ノ未出内ニ猪ヲ見テ早ク按セハ止リ易シ若シ出テハ十ヨトニナ  
五止

脚腫ハ針カズ多クセヌト甚ク多キナリ且ヨリツキ難シ皮ヲヨリ見キヒヨキホトニ抑ルハ  
或ハ眼開ラシヌヤフニナル者ナリカクベツニ糸ヲ吐クシメルナラヌク眼皮ナリナルホトニナル者ナリ  
糸ヲテケルハナヤムモノニ入レ

傷門産后根製シタルヲ縫ケルニ糸ヲニ糸カケタル寸ニロノ糸ノ一辺ニ紙ヲ厚ク折テ添テラシケ  
ル如何ナラシ或曰縫タル処ノ糸一方ハ降クカリ一方ハサリカハリ故ニ紙ヲ厚ク折テ添テラシケ  
ノカ、リシ方ハサレハ、内ノキレ又為トサレレラハ外ノ一糸モ紙ヲ厚ク折テ添テラシケ故ニ  
生ノ一方ハ降ク一方ハ降クノカ、リ故ニ其後引取ハハヨリテ切ヨリ相添又モノハ故ニ厚  
ク紙ヲハサシテラカトニテ切ヨリワカシムルナリ何レモ肉ヲ抑レル故ニ非ス糸ヲソシテラハ  
ニ糸長ク布クベシ其上ニ肉ヲ切シ又為ニ紙ヲヒリ糸ハ一糸ノ紙ヲ用テ厚ク折テ添テラシケハ  
薄キ処ハ一糸ヲモイタルヤフニ出如此高クナルニテ縫ハシモニ其後此ノ如クニ相合ノ状居ノ  
如クスハ銀タル右ハ地面ヨリ早クナリナリ且ニ縫ナリオハ糸ヲ右地面ヨリ高クナリヤフニナツ  
テ甚ヨロシキ、地ノ下トエ薄皮ノ処ヨリモ如此縫故ニ何タルナリ

一婦人臨ニテ傷門ニモレニモ通リ割口本締糸ヲ入カケ引出シテ右縫フノニ此ハ縫ハ  
糸ヲ引テ長ク引テカレシナシト月モ糸ヲ引ルニ糸ニサハリテ息ヲソシヨリヤハリ本締糸ヲ  
残ニキテ夫ヲ引出シ糸ヲ切ベシシカシ本締糸ヲ引テ割口ヨリサシキハ創傷クナル故  
息ヲ割ノ外ヨリ引シ後少シヲキンシヨリ又創外ヨリサスカヨロシキ  
一人曰テ閉門ヲカシ婦人アリ頑固ニテ性シタリ右血背骨ノ折レ難シタル者必死スルナリ必キ三  
ノ毒ニルモノナリ

變傷ナリ紐ヲ厚クサスト及テ大ニ高クシテ大ニナルトアリ度リサスハ一又病ニヨリテ保クサストナ  
アリ





名引ニテモ綿ニテモ取津し取ト血飛ハム此等ハ指ニテ押エトハムし他等ニテハ血苗ヲウケヌハ燒  
燒ヲアテテ或熱甜ニテ院フモノアレバ夫ニテハナキニ膿ニナル者ナリ故ニ初皮フヲハ心得テ院フ  
し但ニ取物ヲ除ク迄ナリ吉雄アタリニモ燒皮ヲ用板斧モ燒皮ヲ用トシ故ニ死ハ死トモヤ  
リト云義ナシ又血難止者ハ又フテ止ムし先出血ノ上ラヌフしモしソシニテモ難止者ハ其血ノ  
少ル上血ヨリ下流ニテ深クヤレハ血少ムル者ニ回ヤ難ク又ルカウテ非ナリ其内難白ハマタヒ  
回ハ甚悪シ只此ニ深長ヲヌルカヨシイテ余ノ膏ナレハ難キトカトサシ置テシ左邊モ付ルナシモ  
多マケルナシハ金創油ヲツクし肉ノ厚キ処ハ大カクモカクし余ノ浅キトカトナリ創大エ  
ナレハ内アカレルモ厚クハシ膏ロカ又ヤフニ縫つて口ヲ合セ又ハ口開リヤフニナリ糸ヲ細クカ  
クルモアミ、余リニ慮キモアミ、シナルニモ緩急ナリ一針ニルト直ニ金創油ヲ用シテモアミ、今ハ  
不用辨申酢木綿ノ上ニ先縫テテ前衝セヨシ木綿ノ上ニ蓋ニスゞし是ハ爪寒ヲサケ且ツコノ  
自ラハリ置テ見ルナリ絆モ在免モ用ス、若シ血止モリニテ翌日ハリ替ノ時申木綿ヲウコカ  
エヤフニナルし層ニ自テアル木綿ニ血ニテウルヲイアシハ其本綿ヲウコカス直ニ其上ニ新ニナルし  
モシカキテ血ヲケシハナリテハリ替テヨシシ日ハ大抵血止ル者ナリ四日ハ月第ニテケルナリ  
申酢ヲ用シ又前衝ヲウコカハ決断テ子リマセツクべしコレニテハ月第ニテケルナリ  
マケルナリハ大抵廿六日ニテハ糸ヲヌリベキニ蓋ニマケルト膿ナガシコミニテ創口カハカサレナリハ  
じメ縫タル者ハニコリヨケレハ廿六日ヲニナルト糸ヲヌルハ外ニ膿染ルハヤハリ膏口アミクナルナリ故ニ可  
ナリ廿六日位ニナルト糸ヲケルニナリ心ス内ツカ又故ニ始ニ月第ヲハリ置テ月位ノオミヨリ糸ニカフ  
ルカウテケルナリ甚ミクケルト多クカフレレ故ニテハ廿六日位ニ縫ニテ糸ヲ引テケルトケルナリ  
ゴロシハヨクツキタルハ糸ヲヌリハハマツカ又ナリ膿ヨクツクハ糸ヲヌリケルニ度ニトラヌ  
而シ度ニモケルべし絆創膏ノ内ニ水気カタナルユイッテテ故又ナリケルニナルナリ故ニ水気サハ

テハ早リ抜クべし糸ヲヌリニイタムハ下午ノ口ナリ、縫ハキニ糸キウヲ押しサスシハイタ  
マヌマタ急症ヲ免ルナリ直視上痛創口ノ乾クハ面色赤ク腫脹身足腫脹及張久スルハ先  
ノナリヲヌリ呼吸呼吸ナリナリ下利モ非ナリ  
糸ヲ入ハタへ極ニテニナリ  
右ニウケタルハ縫タル處見苦キハ内膿膿シテアル故ニケルナリ易クナリケルしヒタルコレハ丸チ珠  
ノ蓋モナリ厚ク入タル者モナリ膿毒ヲ内ノ針ノ破シタルモナリツシラ捨置ハ戦慄スルヤフニナリ  
竹ヲ食ニ刺リ又元結核ノカミキルノナラヌハ骨ノ膿ニテアルハモシ膿しセスハマ、膿スヘカラス  
戦慄ノ来ルハ別ニ症ヲ治スル方ナリ膿ノ出タルニ用ル者方ナリハ見ノ糸ヲ売食セヌ大段ニ草ヲ解  
糸ヲ入ハタへ極ニテニナリ  
變目モ有糸是モ内膿ニ針ニタル所ノ法ノ如ク七日モ内膿ヲフサカシテナリ  
糸是ノ膿血腫ニナリ出血スルモ世世ニナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリ  
中込ナリトヨリ血ヲルニナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリ  
金傷ノ痂川如此ニナル者ハ常ノ如ク一針ニニ針ツ、縫テハ皮タラヌヤフニナリナリ故ニニ針  
若シニ縫ニ縫レタリ糸例ノ如ク申英ヨリ初メニツギ先一処ニ縫ルハ如此ニ縫ハ皮ノタラヌナリ  
キナリ  
鼻下ノ痂ハ針ノハナ難キ者ナリ鼻下ノ中ヨリスルナリ安ケシハ糸ノ向端ニ針ヲツケ皆口中ヨリ  
刺し紙唇ヲキテ離シテ有物故ニ鼻下ノナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリ  
ニ度張ナリナリナリ縫梳ケシアタル位ニ皮ヲ引ヨセ子ハ何シユルモノユヘニ口ナリヤフニナリ  
モノナリ  
二目子乳下膿ニテナリ時ニ師療之逆血不止醫一日而先生ヲ迎フニ地ニ血ヲ止テコシテ縫シニ一  
夜瘡治ナリ

年早ク既と随つし若弱ナリニ候アリテ燒酎中ニ入ルハ必ス膿ニナルナリ心得つし若し膿中ナリハ  
異変ナリ尋起ニテ可救ナリ  
頭下血ハ盛キ処ニハニ甚難ニ此ハ余及テ擽リテ擽ノ方内針ヲサスナリ屈伸多キ処ニ至ク卷  
不綿ヲ入し

為眼血テ右其處紫色或黒色ニテワテ治スルニハ初ニ皮ヲ剝利シテ擽テ刺ハ愈テ右痕殘ル者  
ナリ先壁厚ヲ一日ニ度々、數日自乾スルハ自乾ト愈ルナリ如何ニヨラズ、竹カ吉早ケレハ色残ラサル  
血ノ氣通ニテ先能スル者ハ治術ヲ以テ治ス

全痛乳者及諸腫物愈テ右アトケツ、痛ク者アリ是神經ノ運ラシトスルハ血白テ運ラリ  
ル故ニ痛ハナリ  
全痛鼻上盛ニ刺ヨリ下皮或癩痺スル者ハ創神主ニカ、ルト知ルし

燒酎ハ血ヲナリ新肉血ヲ生ズナリ  
陽癰ノ疾ハ易治陰癰ノ創ハ難治且屈伸ニ害アリ若氣血不復トナリ癰痺シテ難屈伸者  
主木屑ヲ入し神主ヲナラスニ主木屑ヨリニクハナシ專ラ氣ヲ運ラシ氣ヨリ運セハ血此ニ流  
ラ滯ル氣血滯復シサル者ハ多クカラス、脱血ノ者ニ主木屑ヲ投スルハ、陽勝スル故アリ、  
後胞ノ玉出サルハ其置ヲク、若取モ不若又四五日過シハ破シ肉高テ膿ニナリ其ナクサシハ玉出  
ルテモアリ、紅ハ四五日ナリ大ニテ得し

眼胞ノ疾ニ前術ヲ用ルオハナリ血ノホフ加工用  
友人ノ信ニ眼丹モ眼肉ヨリサスべし凡テ内ヨリサ、ル者ハ必ス肉ヨリサスつしハヤクサスつし早ク愈ス  
し口中ノ差ニ是ナリ又大ナル者ハ切テ縫子ハ直ラヌトモアリ、尺大極自ラ手ヲ経テ右ニ成ル者ナリ

眼疾

白眼ノ疾ニ前術ヲ用ルオハナリ血ノホフ加工用  
友人ノ信ニ眼丹モ眼肉ヨリサスべし凡テ内ヨリサ、ル者ハ必ス肉ヨリサスつしハヤクサスつし早ク愈ス  
し口中ノ差ニ是ナリ又大ナル者ハ切テ縫子ハ直ラヌトモアリ、尺大極自ラ手ヲ経テ右ニ成ル者ナリ

白眼ノ疾ニ前術ヲ用ルオハナリ血ノホフ加工用  
友人ノ信ニ眼丹モ眼肉ヨリサスべし凡テ内ヨリサ、ル者ハ必ス肉ヨリサスつしハヤクサスつし早ク愈ス  
し口中ノ差ニ是ナリ又大ナル者ハ切テ縫子ハ直ラヌトモアリ、尺大極自ラ手ヲ経テ右ニ成ル者ナリ

白眼ノ疾ニ前術ヲ用ルオハナリ血ノホフ加工用  
友人ノ信ニ眼丹モ眼肉ヨリサスべし凡テ内ヨリサ、ル者ハ必ス肉ヨリサスつしハヤクサスつし早ク愈ス  
し口中ノ差ニ是ナリ又大ナル者ハ切テ縫子ハ直ラヌトモアリ、尺大極自ラ手ヲ経テ右ニ成ル者ナリ

白眼ノ疾ニ前術ヲ用ルオハナリ血ノホフ加工用  
友人ノ信ニ眼丹モ眼肉ヨリサスべし凡テ内ヨリサ、ル者ハ必ス肉ヨリサスつしハヤクサスつし早ク愈ス  
し口中ノ差ニ是ナリ又大ナル者ハ切テ縫子ハ直ラヌトモアリ、尺大極自ラ手ヲ経テ右ニ成ル者ナリ

白眼ノ疾ニ前術ヲ用ルオハナリ血ノホフ加工用  
友人ノ信ニ眼丹モ眼肉ヨリサスべし凡テ内ヨリサ、ル者ハ必ス肉ヨリサスつしハヤクサスつし早ク愈ス  
し口中ノ差ニ是ナリ又大ナル者ハ切テ縫子ハ直ラヌトモアリ、尺大極自ラ手ヲ経テ右ニ成ル者ナリ

白眼ノ疾ニ前術ヲ用ルオハナリ血ノホフ加工用  
友人ノ信ニ眼丹モ眼肉ヨリサスべし凡テ内ヨリサ、ル者ハ必ス肉ヨリサスつしハヤクサスつし早ク愈ス  
し口中ノ差ニ是ナリ又大ナル者ハ切テ縫子ハ直ラヌトモアリ、尺大極自ラ手ヲ経テ右ニ成ル者ナリ

白眼ノ疾ニ前術ヲ用ルオハナリ血ノホフ加工用  
友人ノ信ニ眼丹モ眼肉ヨリサスべし凡テ内ヨリサ、ル者ハ必ス肉ヨリサスつしハヤクサスつし早ク愈ス  
し口中ノ差ニ是ナリ又大ナル者ハ切テ縫子ハ直ラヌトモアリ、尺大極自ラ手ヲ経テ右ニ成ル者ナリ

白眼ノ疾ニ前術ヲ用ルオハナリ血ノホフ加工用  
友人ノ信ニ眼丹モ眼肉ヨリサスべし凡テ内ヨリサ、ル者ハ必ス肉ヨリサスつしハヤクサスつし早ク愈ス  
し口中ノ差ニ是ナリ又大ナル者ハ切テ縫子ハ直ラヌトモアリ、尺大極自ラ手ヲ経テ右ニ成ル者ナリ

筋ヲ貼入経一日修スルニ此指頭腫テ藍色ニ染之難ク水色前日ニ比スルハ是即ニ及ニテ浮腫又先生云  
曰予嘗テ大人如此者ヲ治ス是即痛痺ノ甚者ニ凡水胞ハ血氣不流ニテ所致ニ麻痺ノ水胞ニ亦異  
ナラズ皆氣ノ不流ヨリ如此敗毒劑ハ毒掃治其毒掃ヲ治スニ是木附ニ堂内ヲ兼用ス一日ノ間三度  
之ヲ攻テ可シ

● 整骨放平

手ヲタガエテアルモ世ノ人或ハ本病トシテ骨節ノタカイテアルヲ知ラス誠ニキテ動キ難ルノ百十  
シ然タカイテアルハガシモモトシテ又右ナリトシニ左右ノ肩ヲ飛ニ見ルハタカイテアルニ高抵ノ  
タカイアル者ナリノ術ヲ可行  
小兒四五歳ノ物外邪ノ右左肩腕不能運動先主整骨ノ術ヲ行テ服下ニテ本綿ニテクシリ  
本國醫ノ又ウチ年オナル僧橋友ヨリ来リテ弟ヲロケ療セシニ子愈ナリ  
痲痺ノ百ナリ放平ノ術ヲ用ル多クは腐骨痲痺トシテノヒストニ及リニ放平ヲ行テカラス  
放平膝蓋骨不動者風濕或腐骨ノ差ニテ在れば決シテ治シニクシ然レニカラズ紙クモナリ  
痛痺トアルモノハ隨テ治テ行ニ口シル者アリ先ツ膝蓋骨ヲ修スルヲ一凡テ一向ニ腕動カ  
カル者アリ強治ト心得シ先放平術ヲ行ニト後セハ木附ヲ用テ四五日前ヨリ吐期由テヌリ  
ナラス右ノ是ヲ律々ト両手ヲ以テ動搖シ其身ニシクシテ在アル者ハ治シ易シ若シ一度ニテ行ハ  
ソシテカモハス動ルナリ始メ術ヲ行フト出シ其身ハフアラシド放平蓋骨ニテ蓋ナリ両手ヲ以テ動  
スニハ丹ノ如クニ間ヲカケ持テスニト出テガレテ一度ニ強リ居スルト外骨ヲテシテイ治テ然ル  
ナリ此島治ニ治ハ自ラ我心ニ通スルニ及ニテ手ヲ下スニカラス  
放平切癆スルニ痛アルトシハ必ス蓋骨或ハ服テテドイタシ其痛ト云ハ余ニ及アルナリ其毒

ナ途ヲ術ヲ施スニ否則術ヲ能ニタル治必難来ルナリ療治目撃スル必アリ

放平一度ニテナキニ位スルヤフニ見ルハケニ一而三度モテ兼用ル位ナラ子ハ難治ニ

放平術ヲ以テナシニモ動カヌハ不化ナリ即チニメ置ニテ術ヲ用ナリ

放平ハソロソロニ度修ニ直スニ一放平ヲ用テ痛痺ノアル内ニスヘカラス腫痛止テテナテ術ノ

以テ直スニ一放平度ナリハ又別格ニ腫ル者ハ非ス放平ノ術モ腫物治ノハ百発百中ナリ其内腫

車ノ内カ又者ハ術ヲ用テナシニモ腫物治ニテモ然リ免ク免ク自ラ一放平トハ肺脈伸テ不屈テ

云正宗見立器ハ手腕屈曲ノ自業トハ臂肘強直ノ自

今ノ人手巨甚皆放平ト云ハ治リニ倍放平曲テ直者ニ又リ込寸ハバトヤ筋膜ヲ緩ムルヲ如シ

● 鏡陰並鏡肌鏡吻

鏡阴ハ人ニヨリテ皆異ルハ是ヲ兼テ用テ動カマテテ尿道ノ下ヨリカ或一皮アルアリ或奥ニ有キ  
皮アルモノアリ或尿道ノ如キ此カモアリ或直伸膜アルモノアリ昔ニ京都ノ娼ヲ療セシニ尿道ノ  
如キ小穴アリ其中ニ有ニ草ノハサキ袋ニ大豆ヲ入シ次ヲニツナニ將斗リナキ引出スニ内ヨリ皮出ヌ  
リソレヲヤテ治シナリ  
浪花ノ一婦ナク兼セシ是ハ一皮ナリ指ニテ探リ深奥ニ膜アリ初指一卒ニテ破リ夫ヨリニ卒ニ  
本ニ入ルニタリニ有テ付ルニハカメテ取テ秘ニ自傷ヲヌリサシテクハ尿道門トハ薄皮一草ニテ  
隔ル故ニ暴卒ニ術ヲ施セハ指ルリアルニヨリテ一死ナリ  
鏡阴モ鏡肌ノ如ク針ヲ以テ中開ニ何レ指ニ在ニ位ニナスニ剪開テ指ヲニ卒位  
入テヨリ明ルニ道ニ穴ナキナリモ一是モ子宮宮ニテツナリタルハ六ナリニキニ餘ホリ手練  
セサシハ療治亦多クモ一是ハ尿道ニ導水管ヲサシマキ肛門ノ方ニモワトキ絲貫テ



ノ其ヨリ由ク糊シ及花ニテ終ニ死ニ至ルレド何モ針ノアヤリニ非ヌステキキタルニ自然ニ膿漬  
シテ死スル者ナリ許ニテ治セサルテシカズ及テ各ヲ治ヌ  
癰疽ハ水血膏肉ノミアリ膏肉ハ痛アルモノ針ニハ水ノ如キモノ出テ死ニ至ルナリタトト針  
セド由ラ由ル者ナリ又支リ出ル皮膚膜ノ血カ囊中ノ血カ可分別針ヨリ鼻鼻ニナルハ必ヌ血  
癰ヲ存スルニ三合後章一在起ハ見ハ五各壯一ニテ治ス大人ハ大ニテ又マテニテ不  
血癰ハ口ハノ癰疽ノ毒ナリセケシ使毒ノ一名ヲ血癰ヲ云コトハナシシカシ他毒ニテ陰毒ニ入  
ラズ使毒ニテワラウタカイ名ツケタルノ不可不知一人甚ク大サ承露盤ノ如ク破針ニテ刺エタシ  
ハ血射出シ水ハギモ必夫ニ紐ササシキ五日ニテ板タシハ微シク膿氣ヲナス赤紐ササシケケケ  
拾別クナラズ斷久癰疽ニテ治癒ヲ免シ善ハ初ニ倍セリ何シ不迄ノ者ト云  
一癰疽ヲ療セント欲セハ先難易ヲ凡テ傷寒備大陰自若トノ斷々腫大ナルハ治シ易ク行  
ハ施ステ陰毒ヲナシテ消長シ痛ハ腹ニ引若治シ易ク按ニ痛ハ小腹ニアリテ腸ヲ推ニヨリテ  
大腸閉塞エ下毒スル者ト見ユ平先難此治ハ行ヲ施シ大便針ニ隨テ下リ臭氣甚カ子シ  
アリ必此症ニ行ヲ施スヲ勿シ腸中瘀ヲ投クル故治方ニ脫収ヲ見シテ逆ニ奪ヲ復スルニ至ル又  
一癰疽偏墜ノ症ニテ癰疽毒ヲ忌ヒ逆ニ頑肉ト成者アリ其頑肉ハ勇力ニテ割或ハ拔五ノ美  
ニテ割ラスハ治ルナリ其軟ナル処ハ行ヲ以テ治ラ施ステ然レハ膏肉ノ甚ハ克瞑眩スル  
処故妄リニ治ラ施セハ後リアリ傷ハ

### 婦人雜症

產後ノ症初起起能ヨリタルナリ皆陰虛故ニテ血ヲ傷リ及展スルニ破傷爪ト全ク同ク肩隨リテ治ス  
海久生方ハ小續命一或葛根一症ニ隨ヒ得用夫一又剛症ナリ葛根一豆シナ全大補加附子刺并ニ之治  
方多シ合者ニ針ニテ着起ヲ得ルナリ是ナリ  
產後症痛胞表在下内ニニ產後ハ治後ヲヨクスレハ治不レ前日戰慄ヲ免メ今日此免分ヨリ云テ起テ不  
此当リトスレハ又前日治不レ必免者ナリ方ハ荆芥 犀香ニテサフテ甚妙一產後戰慄ノ症ハ又輕易ニ  
不レ了勿レ此六免スル者トハ戰慄止後又猝起ニテ不能免ニ至ル治後戰慄ノ症ニ至テハ世送  
二十倍ハ先此症治後治後每夜身熱ナリ或ニ可免理ニ  
產後ノ症初キリリク一トメキナ握テ口張スル者ハ治ス又口ヲ関ク者ハ不治口張スル者忽レ下シテ驚  
ル奇行アリ先年德田村ノ症初キ者アリ先年一奇行ヲ施メ可握ノ手忽チ関ク可握左右之合者  
針ニテ治後發陰ニ奇行アリ  
產後ノ症初キ者神経ノ痙攣セサル故ナリ遺尿門ノ血赤ノ加附子一ヲ手フシ方中益知ラ信スハ  
產後戰慄ハ血氣不和邪乘虛ニ是調獲ヲ失ルニ先其不和ノ血ヲ治スルヲ至トス戰慄四起在症  
ノ非トス先四五症ノ内早リ刺并治者一ヲ可チ全大補加附子或ハ治ニ隨テ加香附子ノ不レ  
十用一此方金ニ產後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後  
ノテウ一產後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後治後  
產後治後  
或ハ益母草一可ナリ先年德田村ノ症初キ者アリ先年一奇行ヲ施メ可握ノ手忽チ関ク可握左右之合者  
更後ノ内出血スル者ハ匡王方内麻脂霜ヲ加テ治ル  
產血ハ版破胎ニタル者ニ極當丸ニギナリ大牡ヲヤリテ血レ後ハ死シタリ  
乾血ノ在ハ必ス破血劑ヲヤルヘカラス四物劑ノ要テ手張シ或ハ薑以附子煎散ヲヤルヘカ  
産ノ體甲劑ナリ  
產後血上行スルニハ甚痛一藥湯ニテ用エ  
產後戰慄ノ奇方當故四逆加參黃其毒一知附子

産後三ノ腹ヲカタリ扱タル者ハ子宮虚腫ヲ生シ産後血塊ノ下ニ見ユル

赤者間口一婦人産後不ノ塊以回生行テ故之日ヲ經テ舒快し而後腹中及肚門ヨリ下血シ又陰門

ヨリ一物突出テ斬々ニ長大ニナリ甚色黄ニシテ軟弱後ニハ甚色ニ変シ何ノ故ナルヲ不知然ルハ

其処ヲ開カシ先出日此ハ腐捷ナリ先年一婦人逆産門身者着床之引扱テ首ハ腹中ニ残り

先生性見テ出テ出タルニ胎衣不下努カスハ内ヨリ一物ノ出ルアリキヲ以テ推定テ胎衣ヲ取テ

カス如此日キニ逆ニ死タリ又一婦人患帯下六年其臭味他ニ異ニシテ不可中見ニ陰中ニ

腐肉アリ乾固ニテキチ以テ引ケキルニ則キレハ切ヲ以テ治スニ臭味テ傷キ治ニタリ又一婦人陰中

ヨリ如前モノ出ルヲ赤ヲカケテキリ治ニタリ障テ甚色ニ変スルハ切テ取テ

婦人久シク頭瘡ヲ患テ極甚者ニ赤厚ヲ子へ常用悉ク脱甚ヨリ息スルモノ又菴仁四ヲ患

處ニ又ルコシ産後癰腫ノ方ハ胎毒天テ可子

崩漏之症ニ胎胎毒ヲ用ルハ急症ヲ用ル也

金匱者産後血塊心腹ニ迫テ痛者ハ失血散可用此症ノ者ハ三黄膠ニ一或抑其痛也ナリ是ハ心胃ニ逆

ル者ニ効テ氣ヲ引ケテ甚難治ス

產後惡露不尽ヨリ二三日ヲ經ルハ止難キ者ナリ早クニ三行ノ内ニ留ルニテ用テハ速ニ効アリ

産キハ起テ前方ヲ用テ淫利ハ止テ心ニ下痞不食スルハ甘草膠ニ一可ナリ又胃凡一ニ加硫

所引子ヲ用ルナリ

胎衣不下者早ク是ヲ取テ子受及腹散ニ忌憚果ヲ若入産後單劑スル者ハ狐鼠散ヲ子ニ用テ四肢

厥冷肌浮浮ハ必治ナリ

婦人陰中腹痛ノ夫合ナリカタキ者アリ赤厚火一ヲ用テ陰散ニテ取テ治ス

一婦人咳テ時々在彼ニ特勝ニ塊アリ昏夜ニ三行後引入散甲劑ニ氣喘石大丹ニ一白帶ニニテ

血倍ニ氣血咳ト云腫滿シ

凡子ヲ引出テ身ニ壯門ノ方エハ不可引前引出スハ難産ニテ破裂ニタル者ハ早速ニ治テ之ニカラス大抵

百日後ニスキテ癒スハ一食膠ノ功ノ如シ

產後血暈早ク補腦ノ功有テ胎毒ヲ引テ治スルハ香油子ハ一枚童便ニ侵シ明日用テ常ニ可

又此症ニ童便ナリ者ニハ甚妙シ又胎毒益ニ分ニ追引リ血ヲ用テハ立止ム如シ

二番煎ハ立トセ用

產後血暈者赤リ爛テ痛ニハハ物一ニ加鹿胎霜ヲ用テ治スルヲ妙シ

產後下血不止ニハ鹿胎霜ヲ白湯ニテ送下止ムヲ妙シ產後ノ下血不止ニハ赤芍ヲ用テ

三本術

葛根如木附陽ハ血ノ閉ニテ迴ラサル故ニ血塊凝ル者血凝滯ヲ行ス方功アリ故ニ痛強ク其息亦

ニヨシ或本附ハ利付ヨシ其氣閉テ氣迴ラサルハ氣ノメクテ又痛ヲ消ス功アリ故ニ血塊凝滯ニ便結

五ヨシ細本附ハ水腫ノ滯滯ヲ解シ循功アリ故ニ血塊凝滯ヲ解シ血塊凝滯ニ消テヨシ其本附ハ氣

血トモニ凝滯ニテ血角血ト赤トノ固テ又迴ニテ痛者ニアリ或不痛シテ又赤トノ痛ヲ消ス功アリ

如此目的トシハ手結毒ナリノ頑肉トナルテ身中人身中ニ血塊凝滯ニ迴リヨクハ腹内カナルヲナシテ

腹内トナルハ血ニ凝滯ニテ迴ラサル故ニ先結毒ニ消ス者ニ本附ヲ用テエ其カノ不及処鉄ニ割

毫ニ破敵ヲ貼テ腹内ヲトリ血ト元トノ復スルハ至キナトナルヤフニナル者ナリ宜ク是ヲ用

フシ本附ハ赤烏頭ニ代用奏効多シ

痿弱

痿弱ニ未だ用テ脈中ニ痿弱ニテクル者ニ是即奏功ニ大抵十四日ニ些丸ヲ用テ其ニ痿弱ノ果ルモノヲ下スルニカスレハ未だ用テ廻リ大ニヨシ些丸ヲ用テ其用ニ

夢名

結毒

和ニ氣ヲ行スヤフニヌフシ未だ附ニ直ニキキ  
痺痛ハ血氣ノ不和ニテ氣ノ迴ラガルヨリ未だ痛ニシ故ニ痛痒ハ和ラケルヲ知サレテ又痛痒ヲ  
痺痛ハ血氣ノ不和ニテ氣ノ迴ラガルヨリ未だ痛ニシ故ニ痛痒ハ和ラケルヲ知サレテ又痛痒ヲ  
痺痛ハ血氣ノ不和ニテ氣ノ迴ラガルヨリ未だ痛ニシ故ニ痛痒ハ和ラケルヲ知サレテ又痛痒ヲ  
痺痛ハ血氣ノ不和ニテ氣ノ迴ラガルヨリ未だ痛ニシ故ニ痛痒ハ和ラケルヲ知サレテ又痛痒ヲ  
痺痛ハ血氣ノ不和ニテ氣ノ迴ラガルヨリ未だ痛ニシ故ニ痛痒ハ和ラケルヲ知サレテ又痛痒ヲ

甘草子毒

甘草子毒一ハ毒心下ニ迫リ自汗盜汗ヲ治ス又胸中痛ヲ治ス又左ニ助セハ右痛右ニ助セハ左痛右ニ助セハ右痛右ニ助セハ左痛  
甘草子毒一ハ毒心下ニ迫リ自汗盜汗ヲ治ス又胸中痛ヲ治ス又左ニ助セハ右痛右ニ助セハ左痛  
甘草子毒一ハ毒心下ニ迫リ自汗盜汗ヲ治ス又胸中痛ヲ治ス又左ニ助セハ右痛右ニ助セハ左痛  
甘草子毒一ハ毒心下ニ迫リ自汗盜汗ヲ治ス又胸中痛ヲ治ス又左ニ助セハ右痛右ニ助セハ左痛  
甘草子毒一ハ毒心下ニ迫リ自汗盜汗ヲ治ス又胸中痛ヲ治ス又左ニ助セハ右痛右ニ助セハ左痛

〇反七

及鼻毒

及鼻毒治スルニ内系鼻頭一ニ些丸兼用又咬処ハ柿ノ皮ヲ又痛甚者ハ外散加雄黃白  
及鼻毒治スルニ内系鼻頭一ニ些丸兼用又咬処ハ柿ノ皮ヲ又痛甚者ハ外散加雄黃白  
及鼻毒治スルニ内系鼻頭一ニ些丸兼用又咬処ハ柿ノ皮ヲ又痛甚者ハ外散加雄黃白  
及鼻毒治スルニ内系鼻頭一ニ些丸兼用又咬処ハ柿ノ皮ヲ又痛甚者ハ外散加雄黃白  
及鼻毒治スルニ内系鼻頭一ニ些丸兼用又咬処ハ柿ノ皮ヲ又痛甚者ハ外散加雄黃白

解頰

解頰ニ三歲ニテ多ク神機ノ病ニテ頭次ニ大ナル者ハ初起ニ些丸兼用之自ニ手ニ些丸十人ヲ治スルニ知  
解頰ニ三歲ニテ多ク神機ノ病ニテ頭次ニ大ナル者ハ初起ニ些丸兼用之自ニ手ニ些丸十人ヲ治スルニ知  
解頰ニ三歲ニテ多ク神機ノ病ニテ頭次ニ大ナル者ハ初起ニ些丸兼用之自ニ手ニ些丸十人ヲ治スルニ知  
解頰ニ三歲ニテ多ク神機ノ病ニテ頭次ニ大ナル者ハ初起ニ些丸兼用之自ニ手ニ些丸十人ヲ治スルニ知  
解頰ニ三歲ニテ多ク神機ノ病ニテ頭次ニ大ナル者ハ初起ニ些丸兼用之自ニ手ニ些丸十人ヲ治スルニ知

痛

諸ノ痛ト云ハ血氣凝滯ナルノ金瘡如シテ痛ハ血氣ノ迴ラ又故シ行キサカシハ痛止ムハ刺ヲシテ痛  
 同シマニウタシテ氣迴ラサレシ

自失盜

ヨク胸中ノチチ解ス血凝ニテ痛倍スル者チ然トノ奈シ金瘡産后或自失盗一云

臟毒

截毒ノ者凶ハ肝門ヲ閉シ見ルニ内臟ノ瘕クアリテ赤キホ豆ノ如キモノヲ下ス甚則身チリモノ  
 ハ毒ノ藏トモシ甚テ至テハ及死スルノ先ト云俗ノ者ト見ル此症ニ所アリ治スルコトナリ

又花癆

及花癆ハ腐田ニテ先ニ度ハ倍スレハ先難治ノ先身ノ留子膿骨也ニ血毒アリテ治シ得ルナキ年ニ及  
 花セリ予腐毒シテヤタレ眼腫ニ至ラハ眼ヲ赤シテ心ノ傍ニ衝ヲ施シ準シ其聖日路ト  
 常ノ眼ニ患テラス然レバ何年ノ患テ眼腫ヨリ入テ及及化ワリ次第ニ此受又固テ又右ノ衝ニテ  
 又倍シテ死スル年ヲ経テ亦毒ニ至ニ死ス及及化ワリ見ルニ管耳ニテ肉コソケシハ血入又チ破リ  
 テニ思テ血入不レノ症ヲレハ夫シテ血入又及及化ワリ見ルニ管耳ニテ肉コソケシハ血入又チ破リ  
 切斷スレバノ高馬ノ膿膿大ニ口中ワキ台上蓋里骨ヲ生ス及及水ヲ好シ飲食亦進シ思莫奈シク在テ  
 石ルシ甚シキハ頰肉爛爛トテ死シ毒心下ニ迫リテ逆ニ空ヲ積スル者ハ何所スベカラス早ク黃連解  
 テ每夜石連甘草加綿豆一搗テ手強ク用フシ且冷水ヲ用ヒ屢服テ可シ丸胃腹及ヒ藏毒ニ  
 直チ附骨瘻ノ毒ヲサスベカラス服ニ拘テアハス

小兒生及張

此症ノナカラテリ及リ地ヲフム一不能言ニテ治スルニ切斷ナレバハ漸ク能クテ不倍ナリ治シ小年ナリ

先トハ賊ニ及テ治ラセテハ治カハ多ク扱ヲ以テ且ノ症ノ形ヲ作リ且底ニマラ者大指ノ間ヨリ木綿ヲナリ  
 解シ腫チ引引ルルニ其毒ノ形ニテラ要トス一日ニ兩ニ度ヲラドニテ引モトシ強クトサスハ急ニ知  
 ヲ取テ治スルノナカシ腫ハ指ホラテ治ニ急ニスシハ脱離シ後ニスレハ意ノ如クナルト同ト此症世ニ  
 二三アリ所ヲ施テ了却シ一二夫ル

腸痔

腸痔ノ者ナリ一日ニ六行ニ下血ニテ血液枯損シ括瘻シテ大ニ疲タリ此病近邊ニ漸ク瘻ヲ病者  
 故ニ前通利疾ノ治務ヲナス者子ハ莫因テ堅ク在テ先ト莫肉ヲ免ス先生門人テ曰常ニ病症  
 ニ明者ナリトナリ是カ者ハ括瘻トナウナキ故ニ如此見悟ルル多シ且痛血ヲ下ス者ハ莫肉ヲ禁  
 テス又膿ヲ下ス者ハ莫肉ヲ禁テス

高年

高年ヲ用ルルニ其醫内カケテ知ラカレハ倍ナリテ多ク其ノノ能知テ治ラセテ此ヲ知法坐  
 肉針ヲ下セハ其血チホクト出テ形ハス鮮血ニ非ス能急ヲ用テ其根ヲ知フ

取膿殊法

膿瘻ノ虫若クカラ鶴ニ武丈ニ奈セ斷々出ルルノ虫出ツキタルハ尺ヲ下シ其骨ヲ去リ即チ取レ正室ノ  
 取法ハ不便

牙疔

口眼喎斜

右葉研丸久年下利足腫水寒ヲ生スル者此方ヲ用テ愈ユ尽瘻シテ居痛出ルルニ之治シテ  
 又口眼喎斜タル者ハ治瘻ニテ終身固着ナリに得テ括瘻物ヨリ膿ヲ出カス上エエテ



腫膜の内を痛滞リテ又腫カタル者ヨリ推出スル所大受シ腫物重テ痛ナク在ル者ハ膿カエル

瘻瘻

婦人陰中痛之瘻門ノ口肉腫破シテ指ヲサエシハ振工削ル不甚者ハ夫瘻ハナラズ此瘻ニ涼菜厚火一此瘻散ヲ以テ瘻院テ愈タリ

瘻門破裂

婦人亦直破裂シタルハ甚難シ先生ニ三度縫タシタ未タ全リ舊ノ如クニナラズト云リハ此瘻ニ一破シハ多ク縫フシ又産ニテ破シテ有リ此ハ先鋒針ヲカケ強ク引抽置テ縫テ導水管ヲ尿道ニ并シ置キ細カニ縫フ小水ノ漏スル故小水ノ毎々多ク異ヲ感スルコト云

胎死

心下腹中ノチリ腹ノチリ或ハ呼吸線ノ如ク通スル者ハ生クハ先小ヲヨリ吐シ活ヲナルハ面赤色ニ有ハ天ヲ物ケシ胎也胸上ニ査査ヲキキ者ヲ大キクナ産スルハ次子ニ變テ養フハ胎スルハ尋ハ疑テ醫學ヨリヨリ何レハナリ

瘻

瘻ハキリイルマテ先瘻ヲ后内ニ瘻ルハ毛孔瘻ヲツツト出テ按之尺ハ毛孔ヨリ膿ジクト出テ約ハ瘻癭ト云テ女子ハ刺キ多ク先子ノ膏結スル処ヲ早ク開キ膿血ヲ出シ是瘻ヲ瘻スルハ先鋒一術也

先腫

俗ニ先腫ト稱スル者多ク腮ニ生シ腫テ膿ヲ流シ又口開テ腫脹ヲナス如此スルハ六七度ニマハハ批仁杜仲ヲ加テ貼ニテ瘻ヲ閉スル

疥癩

青筋ハ疥癩ノ痒カシ肩癢テ痒絶テ云ニ抜針ニテ三四推テ刺テ出血セ又者アリ馬才破針ニテ痒クヤシハ出テ前ノ三後針ニテ是疥ノ病皆刺結スルコト刺結ノ方ヨリ書ニアリ腎囊爪ハ極細ノヤキ婦人ニ尖シハ此疥ヲ生ト云テ殺ノ曰至行ノ取夫合ナレハ其兒必ハ癩トナルアリ夫張此意ナリ或瘻癭ニテ附所ヨリ背近ニ生スルマテ或周身疥ニテ肌癢ハ内至括冬ニ接骨木一或若弱大瘻ノ有テ用フ

阿片取法

阿片是テ取法朱囊花刺刺製葉元ハ花葉ヲ拾殺シホカヲ以テ四五第破リ置ハ白膿出テ篩ニテ取日ニニニ度ニ日程ニ取シ 至後喘息或ハ遺尿一呼吸息ノ下ニ用テ妙日ニ五リハ葉粉ノ大リ在可大過照眩甚

疥癩

疥癩腫脹甚メ不醒者ハ檀香油ヲ多クテ大ニ施アリ 瘻水多出る瘻又飲血出ル者アリ日之ハ水方シツク出ルニマタ細ノタラヌナラモアリ 疥癩ノ腫脹甚者即骨ニテ高クナリマテ赤雲色ヲナシタルモ高クハ細メ難トサカヲ見先ヤフノ者ハ瘻元ハ其色赤クナリ瘻元ニナリナル者ハ取テ難ト黒色ニメ毛ト生スル者ハ大カク高ク起リテアル者ニテ真リ易シ火傷ナドニテ痕高クナル者アリ何シモ乱刺シテ抜去テ貼シ火傷ハ大赤散散トドクツクハ先鋒針ヲ用テコレヲスニテ割ラズ凡可ハ其高タルヲ見ハ昂ク愈シ月ヲツクハ疥癩瘻ハ流行スル者ハ水泡ヲナシ寒熱ヲナシ周身ニ疥ス瘻瘻トト元又強ヨリ大ナル者也

瘻癭

牙痛必犀角ノ功アリ有シ歷葉凡ノ變代用ス大ニ效驗アリ又ニテ炙リ削リ用ユ

田虫

田虫自毒杜方アリ本方為根柢ヲ復版ニナキテカセロニ敷葉ス限草ニ四十余ノ胃子久シク  
癩疥瘡ヲアリシニ眠癩ヲ股ニ生シテ或医搗在葉吉瘡ト一標ニ見ナシテ灸ヲ進ル故ニ追々  
癩ニナリテ難治骨ノ痛ヲ出シカイヨク一膏上ニ灸セシカトモヒテ止サリシカハ止テア  
符又表ヲ子トシニ本目ニテ死スルカハ此膏ヲ符死スル入セアリキト敷セリ橋本宗吉蘭家ニテ見  
テ符シ今ハニナリ也其年ノ人ニライテマヤ如何ナルヲイハタシト思ル

刺腸脂

凡刺腸脂者右所產下シ今一オマリハ脂皮間ニタリタル水ヲケルナリ四五歩ニテ水出テ才任皮ノ薄  
キカユヘシナリ

七果脂脾 滋潤降火 參莖

七果脂脾一ハ心下否ノ才ニ痛ヲ自來ト用ユゴシ小兒ノ小便秘敷或眼腫痛ヲ有或咳喘  
症後潤降火一ノ場合ノ如キモノヲ用テ可ナリ又時后症余疾尽テ體格或ハ咳ヲ重テ  
空シ弱身起有ニ此方ヲ用テ神アリ是之也症ヲ目的トシ東同先生此方ヲ秘テ常ニ用テナリ  
又小兒ノ小便秘ニテ強軟ト云程ニナリ知極スル者ハ參莖一ノ症ナリ

石膏 皮食子 荊芥

石膏ハ消散ノ効アリ喉癰腫痛症ヲ用テ消散スルニテ其効ヲ知ゴシ皮食子ハ勝瘕ヲ  
ホバク故ニ喘咳ヲ治スルナリイブリコハ汗液ヲサリ身ヲ殺ス効アリ荊芥ハ血分ノ邪ヲ去ル  
るナリ瘧疾等ヲ用テ其効ヲ知ゴシ

桃承 千姜黃連人參 荷葉

荷葉ハヨク火逆ヲ治スル者ナリ主才ニ加葉メ用ユゴシ此葉ノ三方葉承一ノ一名家方選疫ノ門ニ出ス

十葉一服

十葉一ヲ用テ不食スル者ハ甘遂ノ瞑眩ナリ甘草厚仁一ヲ用テテケハ治スルナリ

升陽散

升陽散一ノ症ハ舌黃赤ニシテ中寒ケシ病ナリ服葉ニメ痺厚ナリ指衣摸候スルニ

黃連解毒

黃連解毒一ハ舌厚胎ニシテ指衣摸候候内ニ安ヒ薄厚ナリ或失血ス是瘧心中ニ迫リテ在  
指子ニナリテ凡多者エテ下スナリ

瓜蒂散

瓜蒂散一赤豆ハ吐劑ニ非ス瓜蒂ノ性テ柔ケルナリ瓜蒂ノ瞑眩ハホヲ用ユ又煎香マヨシ  
瓜蒂ヲ用テ不吐者ハ指衣摸候候不吐寸ハ鳥ノ羽ニテ探リ吐スゴシ用法ハ三々或ハ用テモア  
リ

此後

吐后ハ一切魚肉ヲ食スルナリ其後ニシテ食スルハ腹痛ヲ免ヌ又吐血ナドシテ死スル者又瓜蒂  
葉ノ可換

乾粉

乾粉ヲ用テ降吐スル者ハ乾粉ニテカセロニ敷葉ス限草ニ四十余ノ胃子久シク

托裏消毒飲

托裏消毒飲一未膠則消散ス既ニ膿スル者ハ潰ト云ハ以前ノ初治ヲ用テ其毒ヲ大抵ニリジキ  
後ニ是ヲ用ユシハ未膿ハ則消散スルナリ既ニ膿スル者ハ潰ユルニ

○ 薏苡仁

薏苡仁ハ痲二一葉ヲ用テ免節を治ス肺痿痛ル此効ヲ以テ可考又祛膿ノ効モアリ

○ 芫丹  
芫丹ハ漸上ノ塊在テ準的トシテ可用シ

○ 多建中  
多建ノ神準ハ小腹痛リ脘ニカケテ痛ハ夜建ハ心下疼痛ノ中ニ悸ヲ帯フ小建中ハ腹中疼痛シ

○ 多建中  
夜建本甘ハ腰ノ冷ル目的ニ夜建本甘ハ眩暈ヲマラス温経益氣ハ表虚惡寒ノ発熱自汗或ハ盜汗タルヲ用ス

○ 多建中

腹中痛テ肩背工製トムカ目的ナリ

○ 玄真散

玄真散ハ身附劑ヲ用テ疼痛甚シキニ用テ疼痛甚シキハ烏頭ノ膠合ナリ良奇附ハ結毒血此法勝テテ用スニ用ス

肺腸痛

一先生指諸門生曰有一男子七十ナリ肺癆數古乳癆口渴少腹滿スルハ小便濁時々腰痛ノ症ヲ患テ甚者ハ塊ノ所為也葉主支加鳥ヲ用テ兼テ雲母並テ以テ葉之塊漸々減シテ似得如然シ此方ノ的多セサルヲ以テ全快セ入生等驚之何ヲ症ト為低方ヲ出セヨ各為肺癆或為肺癆方一ニ其上壁ニカコラズ因テ向之先生曰消渴ノ症ニ非スハ腹ノ塊ハ全リホシノ塊ニ非スハ免腸癆ニ充テ如此故ニキヲ以テ換之則小便通ス主支加鳥頭雲母並テ用テ塊減シテ快者方多ラサルニ非スト云凡蒸ラルニ依テ内ニユルニテ小便通利シ塊ニ

戒セリ之症治ナシ凡痛冬ニ黃連解毒ヲ兼用セハ効ヲ得ルニマラレカ

○ 葉主本甘

主支加鳥朴ノ喘ハ水気迫ルノ喘ニ非ス表在テ下スノ故ナリ邪内ニ溜ラトスルノ喘ハ

葉主本甘ノ症ハ氣脈ノ因テ頭眩スルハ故ニ九ヲ頭眩ノ症ハ脈沈滞ナル者ハ若昏冒スル者ハ脈浮ナシハ必死ス

○ 芍甘附

芍甘附ノ症ハ脚膝軟伸スシハヒワリテ不伸腰痛ナリ大惡寒マリ芍甘甘草ノ症ハ幸急スシ氏本痛亦無惡寒

○ 芍甘

芍甘一ノ方ハ芍薬アリラヌメクトノ白朮ニシテ芍ハ黃ヲ帶又擔荷ノ微和了テ腹中雷鳴スル者ニ用テ効アリ

○ 葉主加鳥附

葉主加鳥附ヲ用テ盜汗或下利スル者用テカラス四肢不伸スルハ若又下利スル者ハ主支加鳥又加芍何子ヲ用テト妙ニナリ

○ 桃仁承氣

桃仁承氣ハ赤ニテ葉主加鳥性タヤフハ又黃芩ニシテ芍ハ黒ク帶ル者ハ傷寒論曰脈浮虛ナレ者ハ發汗スシハ表虚ニテアル者故ニ發汗スシハ愈虚スル故ニ發汗ハ致サシ又ト克リ葉主ニテ治癒スルハ葉主加鳥性者益氣一ヲ用テアリ

○ 取陽虛

破傷風ノ脈脈脹ニテル者、克多クナリトシ、モト頭氣ナラハ故ニ眩ナリ、眩脈ナラハストコ  
ソニ痛処アル者、引分リテ痛、此脈ヲ見ス

● 黃連 魚荊

關契ヲ食シテ大便閉スル者ハ黃荊一ヲ用テ下利ヲ止メ、后ニ十葉胡一ヲ用ル

● 出血

小腹痛、若汗血ヲ動シテ、九葉荊一、此出ル者アリ、口ヨリ吐者、難治、是ニ三葉加、地黃ヲ用、若アリ、然レハ小腹痛  
存ヨリ下利アル者、故ニ大葉、其ハ遠慮ス、シ、細葉、極力、地黃、黃連一ヨロシ、此古ハ赤黒シ、下利、膿  
血、心中、煩、不得、即、黃連、阿膠一、血止マサシ、ハ地黃ヲ加フ、血虛ハ、若、加フ

● 后世阿膠一 黃連 阿膠 龜子黃荊

是ニ右ノ症、用テ、克多ク、ル、品、葉、荊一ノ、症、ハ、上、通、シ、テ、吐、シ、頭、痛、モ、アリ、然レハ、上、通、ノ、甚、ニ、キ、至  
ラ、自、ラ、シ、ラ、ス、キ、足、厥、逆、煩、燥、シ、テ、心、下、チ、リ、痞、アル、者、此、方、ヲ、用、ル、ノ、秘、要、ハ、后、ニ、多、日、使、不、通  
者、ハ、或、ハ、小、兒、ニ、坐、内、括、用、テ、五、葉、葉、カ、ノ、味、ヲ、吐、ル、ル、者、ハ、コ、シ、坐、内、ノ、膠、膠、也

● 喉莫癒

喉莫癒ニテ咽中塞リテ飲食共ニ吞下不了、霜或瓜蒂ノ霜ノヒルノ霜自湯ニテ下ス

一男子傷食テ脈堅脈弦、大便秘塞不可堪、救、按方和劇、亂不得、其昔、醫、投、大、承、氣、一  
大便不下、以水鏡灌、肚、門、漸、得、通、然、而、指、在、依、然、情、緒、危、生、於、之、按、之、案、亦、病、未、ノ、所、着、也  
以附子、使、在、一、用、ニ、此、兩、大、便、指、得、手、厥、當、先、生、曰、是、不、堪、劇、劑、而、取、皮、不、復、也

● 脫疽 瘰癧 疔

脫疽ハ膿付テ不生、瘰癧トノ差別ハ何レ、凡ニ楚痛スレ、瘰癧ハ膿付テ生シ、脫疽ハ膿付テ  
不生、所、水、キ、リ、ル、ル、ナリ

自夫藍ハ生後、緩均、急止、疼痛、心、氣、益、痛、心、使、眠、若、覺、通、利、經、因、氣、在、催、生、若、巧、此、物、專  
為、肺、癥、之、要、藥、 產、后、血、暈、 戰、慄、 崩、血、 腹、痛、 甚、者、知、リ

● 紫胡如石

紫胡如石ハ身服ノ一ニ非ス、頭目ノ病ニモヤル、紫胡血ノ養、先ノ養、リ、初、散、石、為、ハ、伏、メ、養、ヲ、キ、或、ハ、解  
熱、カ、モ、有、概、ノ、云、ハ、此、方、性、ヲ、ナ、ス、ヤ、フ、ノ、外、ヲ、概、ノ、者、ハ、紫、胡、ハ、連、葉、ノ、場、合、ニ、似、タ、シ、氏、連、葉、ハ、血、氣、ノ  
逆、ヲ、抑、痛、シ、也、二、腹、脹、セ、シ、ト、ル、外、ニ、ユ、ク、ハ、紫、胡、此、症、ノ、前、ニ、ヤ、ル、又、紫、胡、ハ、熱、氣、ヲ、至、ル、故、ニ、下、部、ノ  
病、ニ、行、カ、ス、多、ク、ハ、上、部、ニ、シ、ク、ハ、下、部、得、之、ニ、シ、月、以、上、心、中、煩、ノ、不、得、助、ト、云、ハ、黃、連、 阿、膠、ノ、主、症、ニ、非、ス  
心中煩ノ上ニ下利膿血ノ四葉、麻、ス、ル、此、方、下、利、膿、血、ヲ、主、病、ニ、セ、子、ハ、知、ナ、シ、仲、景、氏、再、生、也、有、此  
此、後、ニ、從、之、皆、日、高、血、アリ、シ、病、人、下、利、心、中、煩、シ、テ、不、得、眠、或、ハ、口、中、乾、燥、ス、ル、ニ、ヤ、リ、テ、亦、日、ニ、メ、愈  
タ、リ、性、々、此、症、アリ

● 獲子降氣

獲子降氣ノ一ハ、八、頭、ブ、ラ、ツ、キ、上、ニ、ニ、ウ、ク、ナ、リ、三、十、ト、迄、ハ、ホ、ノ、症、ニ、是、アリ

● 遺量

淨府ノ獲候ハ、暗、眩、ニ、拘、牽、ナ、リ、テ、前、症、ニ、比、ス、シ、ハ、刺、痛、甚、シ、テ、且、心、下、及、ヒ、背、エ、引、テ、痛、ヲ  
ナ、シ、其、候、ニ、當、る、ニ、比、ス、シ、ハ、堅、リ、メ、水、亦、尿、或、後、濁、ナ、ト、ノ、余、病、アリ

● 淨府一

白散ハ、肺、邊、ノ、疼、ヲ、吐、ス、坐、金、丹、ハ、肺、中、ノ、疼、ヲ、吐、ス、部、位、上、下、ノ、遠、ヒ、且、尿、保、ノ、別、アリ

出血

枕竟肝の出血ヲ此ル者シアルニヤ因ノエニ常用

姜主

姜主一ノ第下ニ下滿微結トアリ満ル者微結甚難視如何シテ診し得し曾テ琴山翁ニ質ス翁曰是甚難視難シ只胸ノ也ニ在テ予高キ者ハ甚心下微結スル者ナリ譬何ノ脈シノ如し其上ニ巨石ナル此ハ甚心下微結ト相似タリ其葉ヲ見ハス者万病皆此方ナリ処し起テ奏ス梅毒久年不愈者林此草方ヲ用テ予起テ予テ教ベカラス且世間ニテ凡ヒキナト云ル者尤奇起アリ

当級四逆一 当級建中一 当級芍药散

此三方ヲ三等ツツテハ当級四逆一ハ尤難成シノ四支麻痺スルナラズ在ニ應ス手足一厥寒ハ云處ヨリテ予ヲ推スレハ当級建中ハ少腹拘急ニヨリテ四支痺急等ヲ目的トス当級四逆ヨリ一等厚キハ当級芍药散ハ最モ厚ク面色痿黄腹中如有物按之非塊何ナリ物ヲ包タル如リフククハシタル処工用テ速奇起アリ早竟ハ血滞リ是カ者ニ水又滞リタル物ナリ

交合中出血

交合ノ中出血スル者ハ補中益氣一一方中加鹿胎霜ヲ用テ克治スル者也

膏方

予ハ京ノ膏薬ハ其名唐ノ李諒カ陳法ニ從故所名ノ意ヲ想ハ則チ自ノ起自ラ知ル也  
右衛ハ毒殘リテ飲愈ス愈者貼ス上ヨリ押ス功アリ  
其地ハニメル起アリ左衛ニ合スレハ克膿ヲ吸起アリ  
中黄ハ解熱解毒ノ起アリ  
先鋒ハ變ヲ解シ毒ヲ消散ス又托膿早ク膿ナサシト欲スル寸ハ中黄ニ左衛ヲ白ク早ク膿止

白雲ハ新血ニ用テ火傷林ハ此物ヲ加フ

大赤ハ毒ヲ火傷陽傷ニ用テ

前衛ハ金瘡ニヨリ何シ新血ニ貼ス肉ヲ長スル

決勝ハ今用ルハ血塊ノ系或血塊無名易ニ系芦蒼乳投テ畧ス

大去ハ左衛破敵輕キ処推充破敵膏肉ニヨリ甚美ハ凝血ヲ散ス

破敵ハ有塞肉者ニ貼ス此塞因チ肉ヲ生シシムル故ニ左衛ニ貼ス

烏脾丸

烏脾丸所収位息痰喘逆滿舌形驚爪ノ如シ十歳以下ノ者ニ多シ大人ニハ無者ナリ内系聖金丹麻若甘石一投食子臣ナリトアリ割シテ見ユルハ易ク散シ安ク見ユルハ及テ倍ニ難シ  
烏脾丸ハ痰壅壅塞如何スレキ様ナキニ白物辰砂等ヲ以魚肝汁或白湯煎送下取生知

乳腫

乳腫ハ多ク胸ニ生ス腫テ膿ヲ流シ又口閉テ膿歩ス如此スルニセハ度ニテ仁承主一ニ在仲ヲ加テ用テ十貼ニテ倍タリ瘡口ノ明タルハ口中ヨリ指ヲ入シ見シハ膿ヨリ第ヲ引張居ル夫ヲ力ニテ和辰砂ヲ蜜ニテ煉有ル外ニ右衛ヲ貼ス

治毒産神方

ナカリナバシシニ水銀ヲ又リウケテ堅ニテテ動カヌヤフニミテテクシク久シクシテ延は多ク出ル

龜胸

龜胸ニシテ胸胸一ト甘草ヲ用テ

製極砂法

二十身細タル由ノ灰ノ桶ヲ見ハ細タリアル夫ヲ取テ日ニテ直ニ水ケシメレ尿毒ニテ取テシ其右

華鏡ニミシヨリニ孟ヲシテ泥封シ目張ラシテ霜月陰地ニ埋ミ未ニ月ニ至シハ上ニ氷ル者アリ則是也

小児生テ死ス

小児生テ弱弱死生不分明者アリ其時死生ヲ不ト欲セハ先ツ腎ノ海ノ根ヲニツト摘ミ候ニ命  
死アリ是ハ生治スルニ至ニ胎ノ濕ニメ灸ノ帶ヲ可クス只腎ノ動脈ヲ目的ス

肺也

肺也ニ至アル者ハ肺脈ヲ見ス者也

大弟

大弟ヲ用シト欲セハ先ツ羊浮妻ヲ用テ心ヲ下ラスカシ台用ユシハ克應スル也

大弟ハ散ニシテ用ユシハ勢強ク早暝眩し吐出スル者ハ煎ニニテ用ユシハ眩暈緩クメ暝ニ此出スル  
モノ又人ニヨリノ遠速アリ大抵一通リハニ多用テ三時位ニ醒ス三時用ユシハ翌朝迄モ不覺ナリ  
眩カト肺必スコレヨリ血ノ色モ黒ク枯ル者ナリ

又曰大弟ハ散ヲ十ハニ多用テ克暝眩ス至服ハ散多リメケシ暝ニ救ニ少量ニ同也

大弟ハ散ガ至ニクタクレ用ルル人ナシテ殆テ用費シ世医ニ心掛ウラス也

大弟ヲ用シト欲セハ先ツ腎ヲヨクウシ血気不衰者中滯痰宿水心下痞硬ノ者ハ決メ不可用先取  
部ヲ療テ治チテ

大弟ハ血氣経終ヲ一時ニニメルナリ大抵十ノモノ六七トニメルト見ユ尽シハ心死ス

形削

痼疾ヲ治スルニ形削ヲ投ゼシトセバ緩々長服サズシ然ラカレハ上リ走リノ趣ナシ聲言ハ復日火天

ニ一壺ノ水ヲ度ニ地ニ灌カ如シ但上ノミ潤テ底ニ及非シ又壺ノ水ニシマリテサシツク地ニ  
シテハ自然ニ潤ヒ底ニ透ル理ト同シ

示送

匠タルモノハ廣ク方書ヲ不可不涉獵也凡書ヲ流シ伝アリ備有テ歴史ヲ讀カ如クスハ假令教

百卷ノ書ヲ流シ伝エト云ハ治術ニ益ナシ先方書ヲ流シテ欲セハ患者ヲ診スルヲ去テアルニ  
伊呂波之書ヲ規則トナシ千金ヨリ回春入門等ノ書ニ至ルマテヒロク涉獵スルハ此書ニハ  
是レ名傳ヲモハリ遺キ全書ノ水陸門ヲ引右セテ流ズシサスレハ此書ニハ如ク此書セリ此書ニハ

又此命アリシテ克祀應スルノ多シ如此シテ救善ノ書ヲ流シ教百人ノ患者ヲ治スルハ大ニ此術  
ニ益アリ且此ヲヲ忌却スルノ勿シクタハ歴史ヲ流如クスハ此治方アルテテ空者過メ其的否ヲ知ラ  
カルナリ然レ此開後ヲレハ博覧ヲ勤メ異症ニ違ハレ其方症ヲ抄寫スルニ是其大方ナリ

医則

凡外科ヲ能セシトスルハ先内科ヲ精スルニ不然シハ世術ニ益ナシ今此ニ痼疾ヲ患ル者アリ診スルニ  
内虚ノ者アリ血虚ノ者アリ氣血共ニ虚スル者アリ是ヲ診察シテ治術ヲ施シ且其方投スルハ其膏  
ニ後スルヲ連シ若ク知シテ治術ノミニテ痼疾ヲ治スルハ益言ヒ日ヲ経ルル者ハ愈難シ且非ニ在  
持カレテ之ヲ治スルニ至レバ若クアリ医タル者其氣血虚タルヲ診テ視シテ不可不知  
是ヲ知ハ内治ヲ精スルニ非シハ得難シ

狼毒

狼毒ハ我國ニ于シ大根草ヲ狼毒ニマツシ凡此悦不分明狼毒ト名ル程ノ猛烈ノ者ニ非ヌヤ  
春月申山海人等ヲ狼毒ニアツシ凡是又木植

胸中動気

胸中在動気ヲ痰ヲ蜀椒ヲ用テ治ス

乳室

乳室

南人乳名ヲ裂スルニ鉅尾ノ鉄ノ如キ者ヲ以テ後ヲ執リ取ルル云リ如此スルハ遠ニ死スルナリ  
蘭人ニモ大ニ産シテアリ

● 自汗

自汗常ニ出テテグクニル者ハ阴虚ノ証モノニ年ニ少ル

● 陰莖切斷

陰莖切斷テ身更ニ先身縮テ屈伸不自由ナル者ハ梅毒ノ由ラ塗主丈加木附テ用テ然レハ血氣ノ  
後セザル内ハヤシ

● 大頭瘡 眼瘻瘡

大頭瘡瘻瘡ハハ紫胡加者力ヲ用テ却アリ

● 瀝水

瀝水古ヨリ傳アリテ子知共術ヲ行フ瀝湯共傳ナシ南越巽村翁初テ其門人田中信藏共術ヲ習テ  
施セリ世ニ中寒時々下痢腹痛スル者ナトニ克却アリト云其傳法未試尚試者傳待之

● 井中浴

一男子井ノ中ニ入り井ヲサライシニ折テ上ヨリ石落カレ其人頓ル死タル人ニテ早速左右ノ手  
ニテ其石ヲ脱出無何反上ニアルニ忽テ積氣困積メ不知人更四又痿弱スルカ如シ治テ南越巽村翁ニ  
乞フ役スルニ其仁承承一ノ以テ又教却ニシテ神氣醒覺シテ百患一掃セリ其意ヲ授ルニ  
是ヲ撰ニテアラト多氏初テ右ヲ受タル才努力自ラ経終テ復スル也且其妻動ニ因テ急ニ血  
経絡ヲ迫リ是カ者ニ四五接弱スルモノナラシ九テ批承ノ証ハ血ノ経終ニ迫ル者ナリ故ニ其妻  
日從陪陪脱其人如狂血自下セテ石愈ナリ

● 難補頭火

一男子更ニ其ノ子ヲ指頭大ニ痛テ發他症ナシ甘草一葉ヲ服ニシテ其子一服ニテ氣タリ是急迫ニヨル者  
ト見エタリ

● 神仙病

古今傳者ナシ者川子ニ神仙病ハ病ニ非入草根木皮ノ如何治之ト云リ長及馬関上村勝脚ニ女アリ  
姉ハ書ニエニナリ妹ハ蓋ニエニナリ近國其名高シ其姉ナル者曾患之症但茶実ノミヲ食ハス全身  
全身瘦弱シ治テ四方ニ此村井氏ニ至リ治テ其年更功又此井ニ至リ治テ受テ又惠ニ至リ  
無起長及福井田殿介初聞テ過ル共家治方ヲ問フ診メ曰不治ナリ所下血一三才賜テ子テ  
親實ニ過ル七十賜テ服シテ全收セリ其所以ヲ問フニ其版ヲ按ニ膀胱ニ粟子ノ如キ塊アリ母スル  
才ハヤ痛進スルナリ見シヤモ動是金匱ニ塵虫丸ノ余下ニアリ有軋血者著睛下者ナリト  
瘀血ハヨリ食スル者ノ論中曰人血衰衰在發七八日多脚膝軟弱可下之假令已下惟致不鮮  
合便則積穀善饑多七八日大便有瘀血宜抵當一此章ヲ以テ徵スヘキ也是ヲ以テ其軋血ハ  
一才年ナリ) 村井西遊ノセリ其家世此更ニ及ヘリト大ニ感メ返國ノ中川修ニ告テリテ  
レハ西遊ノ土産此ニ更ニテ是レリト云テ早クテ賞譽ヲ尺牘ヲ送シテ村井氏ニ云此ヲハナシテ  
レハ前治ノ後リタルヲクヤマ其得テ感心セウシタリ塵虫モト船者ナカリシニ村井氏ノセ治ニテ  
近未根山ニ渡リ其用シ和メタル人ニ心付及テ此人治方此ニ及ヘリ頗ル長少氏ノ書ニ採セル  
人ト云フ

消渴

不食痢

消渴病七葉白木散方中瓜呂根知母麦門ヲ加イ黃連解毒散食禁ヲヨクスレハ克愈ルナリ  
又食用ニハ連根常ニ食スルコト飯ノ上席ヲ三椀程ツ用テキ重方テ人腹スレハ克愈ルナリ  
消渴ハ上焦渴中焦下焦渴ナリ是ヲヨクシテ  
不食痢ハ柳肝扶脾一葉胡十倍ニ三棧地菘木ヲ加工辰砂散或五金丸ノ更兼用シテ

却アリ

脹滿

世ニ脹滿リ移ル者一ノ筋統アリ動脈ノ大官ニ或ハ肉筋ノ如キ者生シテヨリノ四肢四件ノ筋  
環アミクナル故ニ余甫一建胃血ノ差ヲ用ユ雷ヲ投ハスルアリ脹滿ヲ患ル人死メ火葬ニシテ  
一塊残リシ者アリ是ヲ見ルニ堅硬如石ノ差ヲ以テ医者ノ慮ハスツシ

脹滿ハ其正ニメ剗劑ノ心スル処ヲ目的ニ用テ治其知度ルヲ又者ハ治スルノ非ニ乳汁ヲ止ル  
ニハ大至大補一加神麴麥芽炒ニ止者ナリ

脹滿ヲ患ル者ナリ仰臥セシメテニ間ナリ逆ヨリ是ヲ見シハ腹大滿ノ頭見エ難滿ニ大承氣一  
六百貼ニ治スルナリ

脹滿ハ水ノミニテ腫ヲナス物ニ非ス腸中ニ気執リテ腫ヲ成イリ水ヲ含テ腫ヲナスハ治易キ  
氣ヲ攪テ腫ヲナスハ治シ難シ

一男子腹脹ヲ患フ大承氣一敷十貼ヲ与ヘ益腹滿メ大便不通ニヨツテ塩湯ヲ以テ章門ノ  
辺ヲ以テ腹ヲ按シ盤中ニテ又承氣ヲ与フテ二貼於是前ニ用ル所ノ差ヲ斷々四リ未リ頃

刻大便快利スル未此方ヲ処メ敢知アリ是妊娠胎ノ不正斜ニメ小便不通スル者ニ整正  
胎ノ術ヲ施ラ共治身利ノ劑ヲ与レハ通スルナリ理同一一併大腸ノ止只輒ニメ縮脹ノ自

由ナル者上ニ上ノ二膠糜ノアル者ハ相突厚抄ニテ氣ノ運動ヲ即ルキハ腸自張結蓋  
斷下ニ及フ大腸下口ハ反厚メ縮脹不自由故承氣ノ差共知及ボイロニテ下ヨリ承

氣瀝クシ共起發導ニ勝レリ上口下口ハ治方アリト云氏中間ニ壅塞スル者ハ其力及ビ  
難ニ因以此懸方也ニメナリ

痲

目下亦見ユ身鳴リオドスル症ハ多ハ痲ノ流者ナリカハ在ニハハ紫胡加夜神克應スル

痲痲

痲症ニテ交ニテモ頭脊癢身ハ汗ノ出ルヤフナルハ其又如黃疹一ノ症ナリ  
痲或ハ中爪ニテ口眼喎斜スル者不逆也クハサカリ不逆セサル方ハ引上ルナリ

痲痲ノ人他ノ痲アルナリ兼用ユルニ其後痲痲不起トナリ中年ノ痲痲症也  
痲痲眼目紫結スル者腫子散大スル者不治也

痲痲ハ初起葛根一ヲ用テ発表スルカ宜シ下利ハ免南下ル者故ニ早ク発表イタサナハ漿  
肉ニ陷テ痲症ニ至ルモノナリヨク発表スルハ利救大ニ成ナリ

此姜厚心ハ下利水際ニテ乾吐共ニナリ  
痲痲治毒承液或黃連解毒ナトノ症ニ至テアツイミナト云煩熱ノ生ル者ニ梔子干姜  
一ヲ兼用メ大知ナリ

下利スル者ハ其又如葛根湯子ヲ用エト妙ニ止ナリ  
黃連一痲疾禁口痲症ナリテ升陽湯也ナリタルニ知アリ

蓄血下利ノ痲ニ逆發劑ヲ用エハカラスモノナリ發候及ビ否候ナクニテ可考不知ノ痲痲利ヲ  
投スルハ死ニ至ルモノナリ此症ニテ金ノ黃連一ニ黃連解毒兼用メ知アリ

黄連一ノ兼用スルナリ  
黄連ノ前兆者ハ心下否メ食不進ハ便赤ノ陽食ハイキツフニニテイカス又眼裏ヲ及之見ルニ黄包

ヲ衆スル者如是者早ク見有治ヲ施セハ兼用メ知ナリ  
脚氣ハ心セントスル者ハ初ヨリ小腹痛メアル者ナリ此症ハ必衝心スル者ハ氣ヲ付可知

脚氣ハ在丹ノ不差一層甚シク衝心ニシテ欲スル寸ハ指方敷アリト格別ノ名方也者  
右ノ症起ラント欲セハ前ニ金木葉一加用之可也

脚氣

右ノ症起ラント欲セハ前ニ金木葉一加用之可也





塊

ヲ手ヲ愈エ又唇邊中ニ遺精スル者ヲ治ス楢又村上玄經克揮反ヲ用ユ凡テ腹中痛ニ用ユ三  
和散腹氣和申一多千金ノ茅根散和ニ加蛇虫ニテ鶴胡菜ヲ受サレ者ニハ理中安蛇極ニ加用  
胃中ノ水ガヲ逆フ意アルカ是養和申一ニ楸反ヲ加フ癖臺ヲ治ス一名ムリケト云  
凡無散ノ者ハ各胎ヲ見ス一モ十ニ大承亮ハ胎氣ハ有散ノ病ニ故ニ必胎氣ヲ見ス者ナリ大  
承亮ハ水氣ノ變ニ至フルモノナリ故ニ腹滿ヲ見スナリ此等ニ因テ三承亮ヲ糸スヘキナリ水氣ニ  
大承亮ヲ用ル症アリ胸下心下ニ當テ水塊ヲ結テ疊々タリ而身微ナリ甚シキニ至テハ塊散ヲ  
ヲ結タル者ナリ應スルハニニ點ノ處  
一男子宛然トメ指頭大ニ痛テ他症ナシ甘草一朶ヲ臍前ニテ五フ一匙ニテ愈タリ是急迫ニ見  
者ト見エタリ

産后

産ノ少産ト既血トノ差別元ニ二日経水止テモ誠ノ妊娠ナレハ雖ノ目的アリ何トナレハ先ツ  
子宮中ニ胎存ヲ驗ト一番ニ出未ルナリ因テ脱血ノセツ克々彙撰ヲ尋見フシ中ニ葡萄  
実ヲツブシタル如キ血ノモノアリ是ヲ引上ケシハ秀明ナリ是ヨリ月ノ重ルニ從テ右ノ如キモノ  
ダシク大キクナルニ姓ニアラゲレハ唯血ノミニニフカフ実ノ如キ者ナリ血塊カ又塊ナキ血ナリ  
下ルナリ

勞瘵

勞瘵ハ雜治者神中益多一加楸柳也ト炮姜ニ片生一姜一片炭シ而路宿トシテ服セシム

大尾

7

心一

