



藝人齋必簡曰誦傷寒
論頗覺玉石混淆如細
加淘汰自知其非漢以
後文也吉益猷曰此書
必出乎周末至漢季張
仲景偶得而傳之耳元

吳澄曰漢季張仲景著
傷寒論此書淵奧典雅
煥然三代之文心一恠
之及觀仲景之序卑弱
殊甚然後知序乃仲景
自序而傷寒論即古湯

液論蓋上世遺書仲景
特編纂之嗚呼三家既
以為秦為周為三代之
文其成於先王考文一
律度量衡之日亦未可
知也然則方技之事當

今欲由先王之道舍此
書何所適從天之未喪
斯文此書幸存而吾儕
從事於方技者得與斯
文於三千載之下豈非
幸之最幸哉因校讐多

年去攬雜補遺漏訂謬
誤正錯亂遂祖全舊文
之意於是謀與衆俱之
且傳之不朽也乃上諸
石建于雲州神戶郡杵
築鄉

天日隅宮側恭仰
神德照護之於永世云
天保六年乙未春三月
平安中川故其德九拜
誓首敬白

疾醫之道未墜于地其人
斯亡其存者書讀者幸能
就其書以通其義則萬病
悉得應而古人不朽矣其
術唯在習熟積功活用得
宜焉世醫既不之知雖讀

七

此書終不盡其用是以尋
彼探此或馳高遠或陷卑
近彷徨迷惑損人及身故
敢為後進告之此上石之
所以起也
天保乙未春中川故再識

八

傷寒論之為古訓誰不之
識但殘缺不通加以謬竄
與實背馳及至害生我師
深憂之刊謬補缺欲以復
舊一以古義斷之以古言
綴之不敢妄加私意也顧

師此舉豈一旦夕所能哉
或徵之古籍或試之事物
積歲月竭心力而後粗得
全焉我輩親見之但恐世
之不知者或有生誹譏也
故及上諸石謀不朽聊錄

此言附其後云

天保癸巳春

山内休美謹識

山内休美嘗欲取論中所
用諸方同上石建于後不
幸早歿其事不成常之欲

十一

繼其志事事蹉跎不得遂
志以不堪遺憾敢錄期他

日云

天保乙未夏片尾常之識
田邊憲再書

十二

傷寒論

太陽病上

太陽之為病脉浮頭項強

痛而惡寒 太陽病發熱

汗出惡風脉緩者名為中

風 太陽病或已發熱或

未發熱必惡寒體痛嘔逆

脉陰陽俱緊者名曰傷寒

太陽中風脉陽浮而

陰弱嗇嗇惡寒淅淅惡風

翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂

枝湯主之 太陽病頭痛

發熱汗出惡風者桂枝湯
主之太陽病項背強反
汗出惡風者桂枝加葛根
湯主之太陽病三日
已發汗若吐若下若溫鍼
仍不解者此為壞病桂枝
湯不中與也觀其脈證知
犯何逆隨證治之桂枝
本為解肌若其人脈浮緊
發熱汗不出者不可與也
常須識此勿令誤也太陽
陽病三日發汗不解蒸蒸

發熱者屬胃也。調胃養氣
湯主之。太陽病下之
後其氣上衝者，可與桂枝
湯。方用前法。若不上衝者，
不可與之。太陽病發汗
遂漏不止，其人惡風，小便
難，四肢微急，難以屈伸者，
桂枝加附子湯主之。太陽
陽病下之後，脈促胸滿者，
桂枝去芍藥湯主之。若微
惡寒者，去芍藥。方中加附
子湯主之。太陽病初

眼桂枝湯反煩不解者先
刺風池風府卻與桂枝湯
則愈眼桂枝湯大汗出
脉洪大者與桂枝湯如前
法若形如瘧日再發者汗
出必解宜桂枝二麻黃一
湯眼桂枝湯大汗出後
大煩渴不解脉洪大者白
虎如人參湯主之眼桂
枝湯或下之仍頭項強痛
翕翕發熱無汗心下滿微
痛小便不利者桂枝去芍

藥如苓朮湯主之
陽病得之八九日如瘧狀
發熱惡寒熱多寒少其人
不嘔清便欲自可一日二
三度發脈微緩者為欲愈
也面色反有熱色者未欲
解也以其不能得小汗出
身必痒宜桂枝麻杏各半
湯傷寒脈浮自汗出小
便數心煩微惡寒腳攣急
反與桂枝湯欲攻其表此
誤也得之便厥咽中乾煩

燥吐逆者作甘草乾薑湯
與之以復其陽若厥愈足
溫者更作芍藥甘草湯與
之其脚即伸若胃氣不和
譏語者少與調胃養氣湯
若重發汗復加燒鍼者四
逆湯主之
太陽病項
背強無汗惡風者葛根湯
主之
太陽與陽明合病
者必自下利葛根湯主之
不下利但嘔者葛根加半
夏湯主之
太陽病桂枝

證醫反下之利遂不止脈
促者表未解也喘而汗出
者葛根黃連黃芩湯主之
太陽病頭痛發熱身
疼腰痛骨節疼痛惡風無
汗而喘者麻黃湯主之
太陽與陽明合病喘而胸
滿者不可下宜麻黃湯
太陽病十日以去脈浮細
而嗜臥者外已解也設胸
滿脇痛者與小柴胡湯脈
但浮者與麻黃湯

陽中風脉浮緊發熱惡寒
身寒痛不汗出而煩躁者
大青龍湯主之若脉微弱
汗出惡風者不可服服之
則厥逆筋惕肉瞤此為逆
也傷寒脉浮緩身不疼
但重乍有輕時無少陰證
者大青龍湯發之傷寒
表不解心下有水氣乾嘔
發熱而咳或渴或利或噎
或小便不利少腹滿或喘
者小青龙湯主之傷寒

心下有水氣咳而微喘發
熱不渴服湯已渴者此寒
去欲解也小青龍湯主之
太陽病脈浮緊無汗
發熱身疼痛八九日不解
表證仍在當發其汗服
湯已微除其人發煩目瞑
劇者必衄麻黃湯主之
傷寒脈浮緊不發汗因致
衄者麻黃湯主之傷寒
不大便六七日頭痛有熱
者未必不可與承氣湯其人

小便清者知不在裏仍在
表也當須發汗若頭痛者
必衄宜桂枝湯太陽
病外證未解脈浮弱者當
以汗解宜桂枝湯太陽
病下之微喘者表未解故
也桂枝加厚朴杏仁湯主
之太陽病外證未解者
不可下也下之為逆欲解
外者宜桂枝湯病人
藏無他病時發熱自汗出
而不解者此衛氣不和也

先其時發汗則愈宜桂枝湯
湯傷寒發汗解半日許
復煩脈浮數者可更發汗
宜桂枝湯病人煩熱汗
出則解又如瘧狀日晡所
發熱者屬陽明也脈沈實
者宜下之脈浮虛者宜發
汗下之與大承氣湯發汗
宜桂枝湯太陽病先
發汗不解而復下之脈浮
者不愈當須解外則愈宜
桂枝湯太陽病先下之

而不愈因復發汗其人因
致冒冒家汗出自愈宜桂
枝去芍藥加苓朮湯
本
發汗而復下之此為逆也
若先發汗治不為逆本先
下之而反汗之為逆若先
下之治不為逆凡病
若發汗者吐若下者亡津
液陰陽自和者必自愈
大下之後復發汗小便不
利者亡津液故也勿治之
必自愈下之後復發汗

必振寒脉微細所以然者
以內外俱虛故也 下之
後復發汗晝日煩躁不得
眠夜而安靜不嘔不渴無
表證脉沈微身無太熱者
乾薑附子湯主之 發
汗後身疼痛脉沈遲者桂
枝加芍藥生薑各一兩人
參三兩新加湯主之 發
汗後不可更行桂枝湯汗
出而喘無大熱者可與麻
黃杏仁甘草石膏湯 發

汗過多其人叉手自冒心
心下悸欲得按者桂枝甘
艸湯主之發汗後其人
臍下悸欲作奔豚者茯苓
桂枝甘草大棗湯主之
發汗後腹脹滿者厚朴生
薑甘草半夏人參湯主之
者虛故也芍藥甘草附子
湯主之發汗若下之病
仍不解煩躁者茯苓四逆
湯主之發汗後惡寒者

虛故也。不惡寒但熱者實也。當和胃氣與調胃養氣湯。太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈。若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散主之。發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之。傷寒汗出而渴者五苓散主之。不渴者茯苓甘草湯主之。病在陽應以汗解。

之反以冷水濕之若灌之
其熱被劫不得去彌更益
煩肉上粟起意欲得水反
不渴者服文蛤散若不差
者與五苓散 脉浮數者
法當汗出而愈若下之身
重心悸者不可發汗當自
汗出乃愈 宜真武湯 太
陽病發汗汗出不解其人
仍發熱心下悸頭眩身潤
動振振欲擗地者真武湯
主之 傷寒若吐若下後

心下逆滿氣上衝胸起則
頭眩脈沈緊發汗則動經則
身為振振搖者茯苓桂枝
朮甘艸湯主之太陽
病發熱汗出者此為營弱
衛強若身疼痛宜桂枝湯
四肢疼又下利厥逆而惡
寒者四逆湯主之太陽
病發熱頭痛脈反沈若不
愈身體疼痛當救其裏宜
四逆湯傷寒醫下之續

得下利清穀不止身疼痛者
急當救裏後身疼痛者
急當救表救裏者
宜桂枝湯
發汗微煩小便數大便因
鞭者與小養氣湯和之愈
太陽病未解脈陰陽俱
停必先振慄汗出而解但
陽脈停者先汗出而解但
陰脈停者下之而解若欲
下之宜調胃養氣湯

大陽病下
傷寒五六日中風往來寒
熱胸脇苦滿默默不欲飲
食心煩喜嘔或胸中煩而
不嘔或渴或腹中痛或脇
下痞鞭或心下悸小便不
利或不渴身有微熱或欬
者小柴胡湯主之傷寒
四五日身熱惡風頸項強
脇下滿手足溫而渴者小
柴胡湯主之傷寒中風
有柴胡證但見一證便是

不必悉具凡柴胡湯病證
而下之若柴胡證不罷者
復與柴胡湯必蒸蒸而振
卻發熱汗出而解陽
寒五六日頭汗出微惡寒
手足冷心下滿口不欲食
大便鞅脈細者此為陽微
結必有表復有裏也可與
小柴胡湯設不了了者得
屎而解傷寒六七日發
熱微惡寒肢節煩疼微嘔
心下支結外證未去者柴

胡桂枝湯主之傷寒五
六日已發汗而後下之胸
膈滿微結小便不利渴而
不嘔但頭汗出往來寒熱
心煩者此為未解也柴胡
桂枝乾薑湯主之
陽病過經十餘日反二三
下之後四五日柴胡證仍
在者先與小柴胡湯嘔不
止心下急鬱鬱微煩者為
未解也與大柴胡湯下之
則愈傷寒十三日不解

胸脇滿而嘔。自晡所發。朝
熱已而微利。此本柴胡證。朝
下之而不得利。今反利者。
知醫以丸藥下之。非其治
也。潮熱者。實也。先宜小柴
胡湯以解外。後以柴胡加
芒硝湯主之。太陽病。過
經十餘日。心下溫溫欲吐。
而胸中痛。大便反澹。腹微
滿。鬱鬱微煩。先此時。有極
吐下者。與調胃承氣湯。若
不爾者。不可與。但欲嘔。胸

中痛微瘕者此為柴胡證也傷寒十三日不解汗出譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為內實也調胃養氣湯主之傷寒陽脈澀陰脈弦腹中急痛者法當先與小建中湯不差者小柴胡湯主之傷

疾二三日心中悸而煩者
小建中湯主之傷寒脈
結代心動悸炙甘草
之傷寒八九日下之
胸滿煩驚小便不利識語
一身盡重不可轉側者柴
胡龍骨牡蠣湯主之傷
寒脈浮醫以火迫劫之必
亡陽驚狂起臥不安者桂
枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍
骨救逆湯主之火逆下
之因煩躁者桂枝甘草龍

胃壯蠟湯主之 燒鍼令
 其汗鍼處被寒 挾起而赤
 者必發奔豚氣 從少腹上
 衝心者也 灸其臑上各一
 壯與桂枝加桂湯 太
 陽病不解 熱結膀胱 其人
 如狂 血自下 之愈 其外
 不解者 尚未可攻 當先解
 外 外解已 但少腹急結者
 乃可攻之 宜桃仁養氣湯
 太陽病 六七日 表證仍
 在 脈微而沈 反不結胸 其

人發狂者以熱在下焦少
腹當鞅滿小便自利者下
血乃愈抵當湯主之
陽病身黃脉沈結少腹鞅
小便不利者為無血也
便自利其人如狂者血證
諦也抵當湯主之
有熱少腹滿應小便不利
今反利者為有血也當下
之不可餘藥且抵當丸
婦人中風發熱惡寒經
水適來得之七八日熱除

而脈遲身涼胸脇下滿如
結胸狀識語者此為熱入
血室也當刺期門隨其實
而瀉之婦人中風七八
日續得寒熱發作有時經
水適斷者此為熱入血室
小柴胡湯主之婦人傷
寒發熱經水適來晝日明
了暮則識語如見鬼狀者
此為熱入血室桃仁養氣
湯主之太陽病脈浮
而動數頭痛發熱微盜汗

出而惡寒者表未解也醫
反下之動數變遲膈內拒
痛短氣躁煩心中懊懷陽
氣內陷心下因鞅則為結
胸大陷胸湯主之若不結
胸但頭汗出小便不利身
必發黃也太陽病重發
汗而復下之不大便五六
日舌上燥而渴日晡所少
有潮熱從心下至少腹鞅
滿而痛不可近者大陷胸
湯主之傷寒六七日結

胸熱實脉沈而緊心下痛
按之石鞞者大陷胸湯主
之傷寒五六日嘔而
發熱者小柴胡湯證具而
以他藥下之柴胡證仍在
者復與柴胡湯此雖已下
之不為逆若心下滿而鞞
痛者此為結胸也大陷胸
湯主之但滿而不痛者此
為痞柴胡不中與之宜半
夏瀉心湯傷寒發熱無
汗嘔不能食而反汗出或

戩然者是屬胃也且調胃
兼氣湯傷寒十餘日熱
結在裏復往來寒熱者此
為水結在胸脇也但頭微
汗出者與大柴胡湯但結
胸無大熱者大陷胸湯主
之小結胸病正在心
胸按之則痛脈浮滑者小
陷胸湯主之寒實結胸
無熱證者與三物小陷胸
湯白散亦可服結胸者
項亦強如柔痙狀下之則

和宜大陷胸丸
 桂枝證頭不痛項不強
 脈微浮胸中痞塞氣上衝
 咽喉不得息者此為胸有
 寒也當吐之宜瓜蒂散
 太陽與少陽併病項強
 痛或眩冒時如結胸心下
 落鞭者當刺大椎第一間
 肺俞肝俞
 夫陽少陽併
 病而反下之成結胸心下
 鞭下利不止水漿不下其
 人心煩宜甘
 艸瀉心湯

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之
太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人黎黎汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之傷寒發熱汗出不解心下痞嘔吐而下利者太柴胡湯主之
下利脈遲而滑

者內實也利未欲止當下
之亘大兼氣湯下利脉平
按之心下堅者急下之亘
大兼氣湯下利後更煩按
之心下濡者為虛煩也宜
梔子豉湯太陽病外
證未除而數下之遂協熱
而利利下不止心下痞鞅
表裏不解者桂枝人參湯
主之傷寒中風醫反下
之其人下利日數十行穀
不化腹中雷鳴心下痞鞅

而滿乾嘔心煩不得安醫
見心下痞謂病不盡復下
之其痞益甚此非結熱甘
艸瀉心湯主之傷寒服
湯藥下利不止心下痞鞭
服瀉心湯已復以他藥下
之利不止醫以理中與之
利益甚此利在下焦赤石
脂禹餘糧湯主之傷
寒汗出解之後胃中不和
心下痞鞭乾噎食臭脇下
有水氣腹中雷鳴下利者

湯	寒	湯	其	因	陽	竹	後	代	痞	發	生
主	汗	主	脉	復	病	葉	虛	赭	鞭	汗	薑
之	出	之	浮	下	醫	石	羸	石	噫	若	瀉
	<small>頭</small>		者	之	發	膏	少	湯	氣	吐	心
	<small>眩</small>		大	心	汗	湯	氣	主	不	若	湯
傷	者	心	黃	下	遂	主	氣	之	除	下	王
寒	附	下	黃	痞	發	之	逆		者	解	之
大	子	痞	連	按	熱		欲	傷	旋	後	
下	瀉	而	瀉	之	惡		吐	寒	覆	心	
後	心	復	心	濡	寒	太	者	解	花	下	
復		惡								傷	
										寒	

發汗心下痞惡寒者表未
解也不可攻痞當先解表
表解乃可攻痞解表宜桂
枝湯攻痞宜大黃黃連瀉
心湯大陽病發熱汗
出復惡寒不嘔但心下痞
者此以醫下之也如其不
下其人不可惡寒而渴者此
轉屬陽明也不更衣十日
無所苦則未可與表氣湯
也渴欲飲水少少與之但
以法救之渴者宜五苓散

木以下之故心下痞與
瀉心湯痞不解其人渴而
口燥煩小便不利者五苓
散主之
中風發熱六七日
目不解而煩有表裏證渴
欲飲水水入則吐者此為
水逆五苓散主之
陽病發汗吐下後虛煩不
得眠若劇者必反覆顛倒
心中懊懣
濃梔子豉湯主之
若少氣者梔子甘草豉湯
主之
若嘔者梔子生薑豉

湯主之發汗若下之而
煩熱胸中窒者梔子鼓湯
主之傷寒五六日大下
之後身熱不去心中結痛
者此為未解也梔子鼓湯
主之傷寒下之後心煩
腹滿臥起不安者梔子厚
朴湯主之傷寒醫以丸
藥大下之身熱不去微煩
者梔子乾薑湯主之
太陽病若吐若下後七八
日不解熱結在裏表裏俱

熱時時惡風大渴舌上乾
 燥而煩欲飲水數升者白
 虎加人參湯主之傷寒
 無大熱口燥渴心煩背微
 惡寒者白虎加人參湯主
 之傷寒脈浮發熱無汗
 其表不解者不可與白虎
 湯渴欲飲水無表證者白
 虎加人參湯主之傷寒
 脈浮骨發熱而嘔者此表
 有熱裏有寒微惡寒而渴
 者裏有熱也白虎湯主之

陽明病

陽明之為病胃家實也

陽明病不吐不下心煩者

可與調胃承氣湯傷寒

吐後腹脹滿者與調胃承

氣湯陽明病脈遲雖

汗出不惡寒者其身必重

短氣腹滿而喘有潮熱者

此外欲解可攻裏也手足

濇然汗出者此大便已鞅

也大承氣湯主之若汗多

微發熱惡寒者外未解也

其熱不潮未可與承氣湯
若腹大滿不通者可與小
承氣湯微和胃氣勿令大
泄下陽明病潮熱大便
微鞭者可與大承氣湯不
鞭者不可與之若不大便
六七日恐有燥屎欲知之
法少與小承氣湯入腹
中轉失氣者此有燥屎乃
可攻之若不轉失氣者此
但初頭鞭後必澹不可攻
之攻之必脹滿不能食也

欲飲水者與水則噦其後
發潮熱者必大便復鞭而
少也直以小養氣湯和之
傷寒者吐若下後不解
不大便五六日上至十餘
日日晡所發潮熱不惡寒
獨語如見鬼狀若劇者發
則不識人循衣摸床惕而
不安微喘直視微者但發
熱識語大養氣湯主之
陽明病識語發潮熱脉
滑而疾者小養氣湯主之

因與養氣湯一升湯入腹
中轉失氣者更服一升若
不轉失氣勿更與之得
病二三日脈弱無太陽柴
胡證煩燥心下鞭至四五
日則雖能食以少養氣湯
微和之若不大便六七日
小便少者雖不能食但初
頭鞭後必溲未定成鞭攻
之必溲須小便利屎定鞭
乃可攻之直大養氣湯
陽明病識語有潮熱反不

能食者胃中必有燥屎也
若能食者但鞭爾大養氣
湯主之陽明病其人
多汗以津液外出胃中燥
大便必鞭鞭則讖語小養
氣湯主之下利讖語者
有燥屎也宜下養氣湯汗
出讖語者過經方可下之
下之則愈宜大養氣湯
傷寒四五日脈沈而喘滿
及發其汗津液越出大便
為難久則讖語宜大養氣

湯

陽明病下之心中

懊懣而煩胃中有燥屎者

可攻腹微滿無燥屎者初

頭鞭後必澹不可攻之若

有燥屎者宜大承氣湯

病人不大便五六日繞臍

痛煩躁發作有時者此有

燥屎也大下後六七日

不大便煩不解腹滿痛者

此有燥屎也病人小便

不利大便乍難乍易時有

微熱喘冒不能臥者有燥

屎也 二陽併病太陽
證罷但發潮熱手足絳絳
汗出大便難而譫語者下
之則愈 五 大承氣湯 陽
明少陽合病必下利脈滑
而數者有宿食也當下之
宜大承氣湯 傷寒胸中
有熱胃中有邪氣腹中痛
欲嘔吐者黃連湯主之
三陽合病腹滿身重難
以轉側口不仁面垢譫語
遺尿發汗則譫語甚下之

則額上生汗手足逆冷者
自汗出者白虎湯主之
陽明病脈浮而緊咽燥口
苦腹滿而喘發熱汗出不
惡寒及惡熱身重若發汗
則煩燥心憤憤而譫語若
加燒鍼必怵惕煩躁不得
眠若下之則胃中空虛各
氣動膈心中懊懣舌上胎
者梔子豉湯主之若渴欲
飲水口乾舌燥者白虎加
人參湯主之若脈浮發熱

渴欲飲水小便不利者猪
苓湯主之陽明病汗出
多而渴者不可與猪苓湯
若脉浮發熱口乾鼻燥能
食而煩者猪苓湯主之
陽明病下之其外有熱手
足溫不結胸心中懊憹饑
不能食但頭汗出者梔子
豉湯主之陽明病脇
下鞅滿不大便高嘔舌上
白苔者可與小柴胡湯
陽明病發潮熱大便溼小

便自可胸脇滿不去者小
柴胡湯主之陽明病脉
遲汗出多微惡寒者表未
解也可發汗宜桂枝湯
陽明病脉浮無汗而喘者
發汗則愈宜麻黃湯
陽明病發熱汗出此為熱
越不能發黃也但頭汗出
小便不利渴引水漿者此
為瘧熱在裏身必發黃茵
陳蒿湯主之傷寒七八
日身黃如橘子色小便不

利腹微滿者茵陳蒿湯主
之傷寒身黃發熱者梔
子藥皮湯主之傷寒不
發汗發熱在裏身必發黃
麻黃連軹赤小豆湯主之
陽明病下血譫語者
此為熱入血室但頭汗出
者刺期門隨其實而瀉之
濺然汗出則愈病人無
表裏證發熱七八日雖脉
浮數者可下之假令已下
脉數不解合熱則消穀善

錢至六七日不大便者有
瘀血宜抵當湯若脉數不
解而下不止必協熱而便
濃血也 陽明證其人喜
忘者必有畜血屎雖鞭大
便反易其色必黑宜抵當
湯下之 陽明病本自
汗出醫更重發汗病已差
尚微煩不了了者此大便
必鞭故也 宜小承氣湯
陽明病自汗出若發汗小
便自利者此為津液內竭

屎雖硬不可攻之當須自
欲大便宜蜜煎導而通之
若土瓜根及大猪膽汁皆
可為導 跌陽脉浮而濡
胃氣強而小便數大便則
難麻仁丸主之 陽明
病潮熱汗多者急下之宜
大承氣湯 發汗不解腹
滿痛者急下之宜大承氣
湯 腹滿不減減不足言
急下之宜大承氣湯 傷
寒六七日目中不了了睛

不和無衣裏證大便難身
微熱者此為實也急下之
宜大承氣湯
少陽病
少陽之為病口苦咽乾目
眩也木太陽病不解轉
入少陽者脇下鞅滿嘔不
能食往來寒熱尚未吐下
脈沈緊者與小柴胡湯若
已吐下發汗溫鍼識語柴
胡湯證罷此為壞病知犯
何逆以法治之

太陰病

太陰之為病腹滿而吐食

不下大便自利時腹自痛

若下之必胸下結鞭下利

益甚本太陽病醫反下

之因爾腹滿時痛者屬太

陰也桂枝加芍藥湯主之

大實痛者桂枝加大芍藥

黃湯主之

少陰病

少陰之為病脈微細但欲

寐也少陰病始得之反

發熱脈沈者麻黃附子細
 辛湯主之
 少陰病得之
 二三日發熱
 少氣者麻黃
 附子甘草湯微發汗
 少陰病得之一二日口中
 和其背惡寒者當灸之附
 子湯主之
 少陰病身體
 痛手足寒骨節痛脈沈者
 附子湯主之
 少陰病惡
 寒身踈而利手足逆冷者
 氣急者宜麻黃附子細
 辛湯
 少陰病得之二三

日以上心中煩不得臥黃
連阿膠湯主之少陰病
下利六七日欬而嘔渴心
煩不得眠者猪苓湯主之
少陰病下利咽痛胸滿
心煩者猪膏湯主之
少陰病二三日咽痛者可
與甘草湯不差者與桔梗
湯少陰病咽中痛半夏
散及湯主之少陰病咽
中傷生瘖不能語言聲不
出者苦酒湯主之少

通	止	利	湯	者	躁	寒	湯	陰	痛	陰
加	厥	脈	有	者	而	主	病	小	病	病
猪	逆	微	蓄	且	身	之	下	便	二	二
膽	無	者	血	且	踏	少	利	不	三	三
汁	脈	與	也	且	脈	陰	便	利	日	日
湯	乾	白	桃	桃	不	病	濃	下	至	至
主	嘔	通	仁	仁	至	四	血	利	四	四
之	煩	湯	兼	兼	不	逆	者	不	五	五
少	者	利	氣	氣	煩	惡	桃	止	日	日
	白	不			而		花	便	腹	腹

陰病下利清穀裏寒外熱
手足厥逆脈微欲絕身及
不惡寒其人面赤色或腹
痛或乾嘔或咽痛或利止
脈不出者通脈四逆湯主
之少陰病吐利手足厥
冷煩躁欲死者吳茱萸湯
主之少陰病二三日
不已至四五日腹痛小便
不利四肢沈重疼自下
利者此為有水氣其人或
欬或下便利或不下利或

嘔者真武湯主之
少陰病下利脈微澁嘔而汗出
必穀更衣及少者與吳茱萸
更湯不差者宜大柴胡湯
少陰病四逆其人或欬
或悸或小便不利或腹中
痛或泄利下重者四逆散
主之
少陰病得之二
三日口燥咽乾者急下之
宜大承氣湯
少陰病自
利清水色純青心下必痛
口乾燥者急下之宜大承

氣湯 少陰病六七日腹
脹不大便者急下之宜大
承氣湯 少陰病飲食
不入口則吐心中溫溫欲吐
復不能吐始得之一二日
手足寒脉弦遲者此胸中
實不可下也當吐之者膈
下有寒飲乾嘔者不可吐
也急溫之宜四逆湯 少
陰病下利若瀉逆脉沈者
急溫之宜四逆湯脉浮而
遲表熱裏寒下利清穀者

四逆湯主之

少陰病下

利清穀裏寒外熱汗出而

厥者通脈四逆湯主之

厥陰病

厥陰之為病消渴氣上撞

心中疼熱饑而不能食

食則吐下之利不止傷

寒厥而脈滑者裏有熱也

白虎湯主之手足厥寒

脈細欲絕者當歸四逆湯

主之若其人內有久寒

嘔下利者當歸四逆加吳

菜羹生薑湯主之
傷寒厥而脈微至七八日
冷其人煩躁無暫安時者
此為藏厥非虵厥也虵厥
者其人當自吐虵令病者
靜而復時煩藏厥者宜吳
茱萸湯虵厥者烏梅丸主
之病人手足厥冷脈乍
緊者邪結在胸中滿
而煩饑不能食者當須吐
之宜瓜蒂散傷寒厥
而心下悸者宜先治水部

治其厥當服茯苓甘草湯
嘔而脈弱小便復利身
有微熱見厥者四逆湯主
之傷寒本自寒下醫
復吐下之寒格更逆吐下
若食入口即吐乾薑黃連
黃芩人參湯主之熱利
下重者白頭翁湯主之
利欲飲水者以有熱故也
宜白頭翁湯傷寒下
利日十餘行手足厥冷脈
及實者大承氣湯主之

大汗若大下利而厥冷
微欲絕者四逆湯主之
傷寒論畢

凡章尾必空一字節尾
必空二字以為其別換
改補入之文皆小書以
別于原文

天保四年歲次癸巳正月
平安中川故謹建
平安田邊憲敬書

