




五雲子腹診法

楳 9
551
25



門 十 9
第
卷



臍中

診腎

腎間之動氣者密排右之三指
左之三指以

安臍間和緩有力一息二至遠臍充實者腎氣之足

也一息五六至屬熱
手下虛冷其動沈微者命門

之大虛也
手下熱燥不潤其動細數上支中腕者陰

虛之動也
數有積聚之人或寸口不細按之分散者一

止者原氣虛敗之候
吐血欬血動甚而溢中腕者不

治雖愈而復發
一切卒病諸脉雖絕而臍溫其動未

絕者有甦
無名氏

臍中深動氣大底二在寸氣口
脉下同位十儿八

實之臍淺亦浮クヤウナル根ノ絶チハナル、虚ナ
リ白竹

凡諸病氏ニ神闕ノ脈ヲ見ヘシ實証ハ指ヲ強ク按
メ見レハ脈ノハツカス底ニシツクリト小サクメ
應スルモノノ攻下ノ劑ヲ與フルト此脈ニテ可考
此脈宜キハ大抵ノ下劑ヲ與ヘテモ格別ノトナシ
虚人ハ浮テフハミトスルノ實人ト相反ス神闕
ノ脈水分ノ動氣口ノ脈皆診ヒ様同シトノ指ノ腹
ニテ診スルノ水分ノ動モ診子ハナラヌ又東郭
診腹先臍ヲ診スヘシ臍中按メシツカリト有カハ

無病人ノ人之按メ無カハ難治ノ症ノ按之無カ如
人指乾泥者難治壽安

稟虚ノ人房ニ入キハ二三日臍中ニ動アリ腎氣有
餘ノ人ハ翌日マテモ動氣アルモノ間アリ同上
腹ノ肝心ノメツケトエロハ臍ノ又ケルト又ケヌ
トテ吉凶ガアルノ又リルト云ハ臍ノワキノ氣カ
ヌケテ臍カ離レテツマ、ルヤウニナル臍ノマハ
リカ手ノハイルヤウニアルヤウナレハ間モナク
死スルモノナリ臍ノマハリコリテカタキモ脾胃
ノ虚ナリヌケタハ勿論ヌケバカタカラズ大抵氣

ノアルカヨイゾ鳥巢

臍ヲ按メ中へク、リ入テ上皮ハカリ動テ下ノ不
動ハヨキ臍ノ底マテ按メ動ハアシ、常ニ臍
ニク、リアル人ハアレトモ中ノシマリナククロ
トスルモノ多シシマリアルヲ菓ノ蒂ノ如ナ
ル一シ中虚

臍ノキル、ハ不治シカシワキへ引テ見ヨ落レハ
カタヨルモノソ両方氏落ルモノテハナイソ片々
落ルモノ之白竹

臍ヲ上ヨリ軟下へ按見下ヨリ上へ按見自左右へ

自右左へ按見ルニ常ハ臍ハトチラへモ不動然氏
気分弱キトアレハ片一方ヨワキトテキル之自左
右へ按セハ右ノ方へ行易キハ左ノ臍切タリ又自
右左へ按テ左ノ方へ行易キハ右ノ臍ノ切タリ是
ヲ臍切ト云之上下モ此例ナリ南溟

元氣ノ虚実ヲ候ハ臍ニアリ臍ニ手ヲアテ推見ルニエタへ
ハ十キ臍アリ是元氣ノ虚ナリ表ヲ推テモ裡テモ
カアルハ元氣ノ実ナリ如臍ヲ推テカアル内ニ凝
テ堅キ物アルハカノアルニハ非ス是ハ氣合ノフ
サカル故之其症ハ大病後ニアルト之或ハ痲病十

トニ別テ臍ノ凝アルモノ之夫ハ実ト云病ナリカ
リソメナ病氣ニテモ積聚ノ類アレハ臍力凝タカ
ルモノ之氣塞リ結レルユヘク時ニヨリテ聚リ其
邪去ル中ハ臍ノコルトモナクナル之併大病後ニ
凝ハ惡之表ヲ伺テ裡マテ推テモ力ナキハ元氣ノ
不足之目上

臍者通五藏而真神往來之門之故名之以神闕則對
當于腎如南北極是也凡臍者深大而堅固左右上下
桃之不動輪廓約束者是為真神安全倘有大病猶可
治但暴疾非此例台州

平人ノ臍ハシツカリトノ上下左右ヨリ推氏動力
不足氣血充溢スル故之高年ニナルト自然ト動ヤ
ウナル之是精氣ノ衰ル故之久臍ノ廻リニ烟管ノ
カンクヒ程ノ牢キ輪郭アリ此輪郭ノ剛柔盈蝕ニ
因テ虛實ヲ辨スル之サテ腎氣盛ナルモノハ輪郭
剛盈之壯實トス無病ノ人トスタトヘ大病タリ氏
無難ニ治スル之又輪郭蝕メアルカ或ハ無アリ是
臍ノキル、之氣血耗虛ノ所致之病人ハ死不遠ト
覺悟スヘシ又無病ノ人タリ氏是有ルモノハ命不
長ト思ヘシ故ニ神闕ノ強弱輪郭ノ盈蝕ハ腎氣ノ虛

實ニヨル之又古ヨリ臍ハ十四椎ニ對ストイヘリ
彌神關ノ本腎ノ藏ニカ、ルヲ知ヘシ是以大病ノ
死生ヲ決スルハ神關ヲ的トスル之別ノ水腫脹滿
等ノ証ハ腹皮引ハリテ居ル故ソレニツレテ神關
モヒキツル之是以臍力動ヤラ動カ又ヤラ知レ又
之然ハ何ヲ以テ断スルソト云ニカノ輪郭ノ有無
ニテ決スルナリ然ルモハ萬不失一ナリ且臍ハ李
ヲ容ル、ヲ好トスト云リ壽相トス又小而淺者
ハ夭相トス是人相家ノ一看法之心得ヘシ人臍中
ハ動ナキモノ之然ルニ動アル者ハ五藏敗之輪郭

并ニ腎間ノ動ト見合テ死生ヲ決スヘシ同上此
動ナシトイヘルハ總ナラ
ス前歎諸説可從ニ似タリ
脹滿初起ヲ預察スル法アリ腹部中ノ最的トスル
ハ臍之面部ノ肉ノ端ハ口吻之此臍ノマワリヘ取
マワシテイラリニミトアタリフクレタル様ニ堅
クアラハ一身ノ中へ腫氣催タルト知ヘシ是腫氣
身一ノ診之

去其病可愈之
力勝下
...

小腹

腹心ヲ候フ時ニ手ヲ柔ニメ鳩尾ヨリ以下臍下丹田氣海ノ分ニ至マテ摩ヲロシニ指ヲ以テシナヤカニ丹田ヲ按厄ハ呼吸ニ隨テ其後ヲタヤカニメ内ニ何ノ障モナク指ヲ引ハ強キヤウニ皮肉起リ按スレハ張ル如クシナヤカナルヲ是ヲ元氣ノ根本ト云如此ナルハ假令大病ニテ何程羸タル人ト云厄其病可愈之トカク腹ヲ按ヘシルニ手ニ隨テ無力臍下ダワキトスル様ニ呼吸ニ隨テ起ルヲモナク手ヲ引時ニ手ニ隨テ皮膚ノ起テ又ハ是元

氣勞レタル腹之如此ナル人ハ其病輕シトイハレ
必不可治若又如此ノ腹ト云凡痛アル時ハ邪氣未
退之ト可知又如此ニテ丹田ヲ按ユル時腹中ニ何
物モ無ク手ノ背マデ冷板力如ナルハ死五三日ノ
間ニ免角元氣アルヲ腹ニテ候ハ臍下滑ニテ呼吸
ニ隨テ抑揚スルモ強ノ不强柔ニシテ不柔抑ヘ揚ル
ニ舉ルヲ有元氣ト可知之南溟

臍下ヲ按メ臍下筋ハルカ或ハ堅メ氣ヲ盛ルヲア
ルカ又撫テ見テ臍下至テ築山ヲツキタル様ニコ
ブミト肉ノ立夕處アル此類カ三焦不和ノ候ナ

リ同上

壯年ノ人臍下弱ク無力ハ腎虛ノ人之按之氣ノ保
アリテ上へホドツツ、ヤワラカナルハ吉之老人
ハ下虚上實スルモノ之臍下ノ氣弱ク和カニ臍
上ヨリ鳩尾ノ邊マテ脹モノ之此老人ノ常之又老
人臍下ノ氣能ハナルホト無病ノ人ナリ壽安

臍下ノマワリカタキハ腎虚トシル是腎氣ノカワ
キニメ八味丸ヲ用ル場之中虚
臍ノトヲリヨリ女シ下ニテヨコ腹ヲ候アニ分ハ
ニミトヨハクハリナフシテ手ノハイルヤウニア

ルハ腎虚ニ属スルナリ 烏巢

小腹ハリアツテタテニ筋タケイテトキトキニサ

ハルハ腎虚ナリ腎中ノ陽氣不足ナリ 同上

氣衝腹ノツケ子ノ邊へ内皮ヨリコワリテアル病

人必惡之 白竹

天樞ヨリ下ハ瘀血ノ如ク又大筋ノ如ク臍ノ左右

ノ下四五條手ニ應メヒキハルモノアルハ必死ノ

候ニ同上

診腎

臍至小腹輕手陷下重手如按龜板者腎氣之虚

脱 臍下至曲骨按之陷者痛者真水之足也 積在

小腹其動遲緩時一止者腎積也 無名氏

臍下甲錯メ按ノグワトスル者ハ頓死ス病人ナ

レハ不治之陰虚火動者ハ動臍下ヨリ臍ヲ夾ミ上

リテ膈膜ニ迫ル故ニ短氣シ白沫ヲ吐スル之火動

セ入但陰虚者按之其手帶青黑者陰氣絶シ極ル之

壯家者臍下丹田ヲ瓜ニテ搔テミルニ硫黄ノ氣ア

ルモノ之大酒肉食ノ血熱強者ハ臍下ヨリ火出ル

之陰虚ノ火不動モノハ臍下ニ如箸筋力立之火動

者ハ臍下任脉肉脱ノ溝ノ如シ兩旁堅ク中五分程

カクサニトスル之虚勞勞瘵ノ末ニアリ必死ス

総テ動氣ハ多ハ水飲之又熱毒之久病不食ノ中腕
ノ左右ニ動スル者ハ胃氣絶之趺上ハ腫不至トイ
ヘ氏必死ス奔豚氣ハ必任脉少陽ノ間ニアリ台州
小便閉ニテモナク膀胱脹大リ皮外へ形見ル、
アリ甚キハ臍上一寸位マデ見ヘル之又甚ハ臍
上一面ニ脹之サレ氏少シ左へヨル之ナセ右へヨ
ラマナレハ肝ヨリ陰囊ドへノ道筋故ヨラ又ト
ミヘタリ同上

腎氣實シタル者ハ小腹膨満ノ堅キ氏イワレスシ
ツカリトメ不軟之坐禪ナトラシタル者ハ小腹堅

リアル之又腰痛者必シモ疝ナラヌ臍ヲ廻テ凝結
ナク小腹クサミトメ腰痛ハ腎勞ニ得タル之腰
肉脱シ髌骨アラワル者ハ必死ス同上

右ノ少腹ニ凝結ノアルハ皆畜血之少腹ノ痛ニ食
積虫積ハナシ皆畜血カ疝之左ノ小腹ニ凝結ノ痛
モアリ其譯ハ任脉衝脉帶脉ノ三脉ヲ以テ血室ヲ
養フ此三脉陽明ノ氣衝ヨリタル陽明ノ分レク子
ニ凝結スルモノアルユへ之同上

少腹ニ燥屎ヲ畜ルハ必左横骨ニ迫テ累々トノ塊
ヲナス左十分ニツマツ上ハ右へモ連ル之按之

イタマヌ之クレツキ長キ之同上腹兩傍ノ

食ハ先ツ右へ納テ克化ノ後水分ニテ糟粕尿トナ

ツテ出ルハ右ヨリ臍下左へマハリテ下ル故ニ燥

尿アル症ハ其部ヲ以臍三燥屎日數ヲ歴テ多ア

ルハ最シカリテ候トス腸癰モ此部位ニアリ

按スルニ病人ノ心意痲ヲ押ヤウニイタク覺ル之

此部ノ外ニアルモノハ腫物ニテモ腸癰ノ類外ノ

モノト知ヘシ凍郭燥屎ノ診候台別以テ是ハ凍郭其説同

男子疝ハ臍ヨリスコシ下右へヨリテツク女子ノ

帯下毒モマニ附着ス内經曰男子七疝女子帯下

癥聚トアレハ疝ト帯下ト同處ニ候アルト宜ニ病

強ク按ハ陰囊へ引ハル氣味アリ輕キ時ハ臍下ハ

カリモ引ハリアリ老病ニナレハ心下へサ、ヘル

之垂積ハ左右共ニ拘急シ臍ノ右ノ下ヒラキニ軟

疑アリ同上

一通りノ疝塊ハ大畧臍ヨリハ斜ニ下リテアリ脾

胃不足ノヨリハ臍ヨリ少シ横へ下ル心持マテ之

左右何レニアリテモ同シト之同上

老人ナト臍下左へヨリ動元ハ必死咽喉腐爛ノ症

ナド此處ニ動元ル者必死凡諸病此處高キモノ危

シ同上

脚氣ト勞瘵ト濕毒トハ臍下ニ五六分任脈ヲ開ク
一各一寸許ノ間左右ノ内必動アルモノ之勞瘵ノ
動ハ虚ニシテ數之大抵脈ト應ス脚氣ノ動ハ弦ノキ
ミアリ濕毒ノ動ハ定法ナシ脈症ヲ能ク考テ可察
濕毒ヲ病タル人必右ノ處左右ノ内ニ動悸アルモ
ノ之能ク心得ヘシ此三症臍ノ動的候トハシカタ
シ同上

臍下無力モノ之ヲ按メ沈テ塊アリテツヨク按セ
ハ臍ノ四方ハ勿論五體へ響音テ堪カタキ痛ハ虚之

臍下ハクハイカナキホトカナクトモ少モ按セハ

痛アルモ虚ニ屬ス南陽

臍下ニ堅塊ノ處々へマハルテアリ是ハへツ軟シ

テカマイニナラヌヲモアルベシ急クスルト小便

不利スルテアリ轉胞ノ因ニナルアリ 同上

腹中行
 脾胃ノ虚ハ中脘ヨリ以下臍ノアタリマデ任脈
 通り箸ヲフセタル如ニ筋夕ツモノナリ宜ク中
 焦ヲ補ベシ壽安
 腎水ノ虚ハ臍ヨリ以下関元石門任脈通り箸ヲ
 フセタル様ニ真中ニ筋夕ツモノナリ宜ク滋陰
 ノ藥ヲ與フヘシ腎虚ノ症モ先中焦ヨリ衰ル故
 ニ中脘以下石門ノ上下任脈通り筋張之同工南溟同
 又曰泄瀉ナトニ此ヲ
 見スハ死症ナリ
 古傳曰腹ノ正中任脈通り中脘盛ニノ幅廣キ是

ヲ胃熱トスル之又任脈ノ膻穴ノ處弱ク動氣ナ
キ者ヲ胃寒トス 南溟

任脈アラワレテ手ニサワルハ惡証ナリコレハ
内カ甚カハクエヘナリ平人モ腹カソコ子レハ
任脈アラハル、モノゾコレモ内ノカハキト知
ヘシ不足ト知テ補ヘシ膻上任脈アラハル、ハ
脾胃虚ナリ膻下任脈アラハル、ハ腎虚ナリ大
病ニテ任脈アラハレソウナル人ノアラハレサ
ルハ腹ニ腫氣アリ猶アシ、烏巢
任脈ノフトクスサマシク張見ユルハ惡キニモ

ツキ又不苦ニモツクナリ但シ脾胃ノ診ニテ膻
上鳩尾マテハルハ脾胃食滞ノ候之膻下ノ任脈
ハルハ腎ノ虚ト知ルヘシ中腕軟ノ鬱ノ人ニ一
生煙管ノ如キフトキ筋ハリテ息災ナルアリ精
察スヘキナリ 白竹

任脈引ハリテ煙管ノヤウニナリテ神瀾ヨリ心
下連者ハ死ス是靈柩ニ出ツ百發百中ノ 台州
任脈ヨリ少陰ニ連テ大吹筒ノ如ク筋立テ力ナ
キハ多ハ腸ヲ病テ死ス 同上此說南溟ニ本ケ
久病腹皮貼背當膻上下有堅結排之不動者是脊

骨也同上
遠臍有凝結按之則痛者寒疝也宜薑桂烏附輩上

腹兩傍

診肝

藏氣法時論曰肝病者兩脇下痛引小腹云々
經脈篇曰其經布脇肋云々故肝病其診在兩脇云

輕按摩脇下皮肉滿實而有力者肝之平也
兩

脇下空虛無力者肝虛及中風一切筋病之候
因其在

以知偏枯雖病未
男子積在左脇者多屬病氣女子

塊在左脇者多屬瘀血
動氣在左脇者肝火亢也

無名氏中風診候
脇下ノ條ニ詳ナリ

胃經トホリハ兩乳ノトホリナリコレカ川ノ瀨

ノ中ノニシユツタレハ脾胃ノ不足ナリ鳥巢

腹衰大横ノ邊力甚弱キ人アリ必死ニナルヘシ
白竹

左腹ノツカエ第一腎虛疝氣ト知ヘシ右腹ハ氣
鬱タルヲ疑ナシ同上

左腹ハ十二八九ハ疝ナリ腎水耗ニ從テ左ノツ
カヘ胸ヘサシユムナリ同上

肝ハ血ヲ藏メ其部位腹ノ左ニアリ故ニ丸ノ天
樞ニテ血ノ盛虚ヲ候ナリ血虚ノ症其腹ヲ候ニ

天樞ノ邊表ハ軟ニシテ手ヲ沈テ裡ヲ候ニ板ヲ推
ス力如クニ堅ハ此血分ノ燥ナリ左ノ天樞ヲ血

分ト名ク何トナレハ肝ハ血ヲ藏メ其部位腹ノ
左ニアリ故ニ丸ノ天樞ニテ血ノ盛衰ヲ候ナリ
南溟

滯食宿酒共ニ右脇下ニツクク胎毒モ同シ其ウ
キニ胎毒ハ堅ク貯食ハ柔ナリ東郭

允腹部左引ハルモノハ逍遙抑肝ノ類血劑ニテ
肝血ヲ和ス右ハ建中ノ類肝主ナリ同上

外邪久ク不鮮者左ノ腹筋右ト比スレハ力ナキ
ナリ中風ノ肚肉脱トハ別ナリ横腹ニアラズ肚
ヨリ内腹筋ナリ又左ノ上ニバウミトイフツ

毛動アルモ外邪未解ト知ヘシ同上
下焦ノ左右セハマク動アルハ耳鳴カ耳聾之同上
藥毒ハ脾部腹筋ヲサガルモノ之附毒ニ多シ同上
左ノ臍傍ニ拘急ノ凝タル証面色青白唇紅目下
臉赤ク惡心或吐清水ハ蛔虫ノ候ト又同上
陽明胃經按第二肋之端而下者是也以左為主自
左冲逆及拘牽者為水飲左右拘牽按之不痛者雖
痛反快者是為胃氣不和或血虛宜建中輩和之
少陽膽經按第三肋之端而下者是也以右為主自
自右冲逆者為惡血拘牽者屬肝鬱台州

大便閉自左臍傍橫至右旁或左橫骨邊累累々如納
尾石者是為燥屎同上小腹同上條
内經ニ云テアルハ臍右ニ當テコリアル者ヲ胃
氣衰トナレモ多ク左ニアリサテ左ヨリ右ヘ取
廻シテアルナリ又左ニハカリ有モアリ是ヲ指
テ痲瘋ト是本胃氣衰テ運化惡キヨリ起ルナ
リ又肝藏ノ氣ハ臍ノ右ニアラワル臍ヲ去リ一
寸許下ヘ至テアリリユニ凝結ス同上
尤ノ陽明拘牽スル者ハ皆動氣アリ食毒ノ動氣
ハ大ニ打テ陽明臍傍ヘ連テ拘牽スル是ヲ候フ

ニ上衝アリヤト問フ食毒アル者ハ必上衝スル
ナリ食毒強キ者ハ上衝ニツレテ瘡ヲ發スルソ
水飲ノ動ハ大ニナリ小ニナリ常ノ動氣ナリ水
飲ノ動ハ心下ヨリ左ヘカ、ル章門ノ通り厥陰
少陽アタリ引ハル者アリ是モ水飲ノ所為ナリ
温藥ニテ下スヘシ同上

虻虫亦任脉ヨリ左ヘ係ル胃中ニ居ルユヘリ左
硬滿メ動氣又水飲ノ動ト混シ易シ重ク之ヲ按
メ築ニ然ト細ナリ又大ニ動スルモアリ其動臍
傍ヘ連ナラヌナリ脉ハ數或ハ大ナリ腹中ノ動

氣ナクヨト其脉ニ應スルユヘアテニナラヌ又之同上
右ノ陽明厥陰ニ係リ硬滿スル者ハ肝鬱ナリ肝
鬱ハ即血不和故ニ柴胡或ハ四物ノ類通例共ル
ナリ左ニテ腹痛スル者ハ虫積カ食毒或水飲右
ニヨリテ痛者ハ皆血ナリ右ニカ、ルモノハ血
劑ヲ帶タモノテユカ子ハ不治ナリ同上
スベテ瘡ノ類左ニアルハ大事ナシ右ニアルハ
大事ナシ治シカタクモノト心得テ療治スヘ
シ陽分ノ左ハ治シ易ク陰分ノ右ハ治シ難キ道
理ナリ長裕

大事ノ痞下云ハ脾胃ノ元氣衰ル故飲食ヲ尅化
スル運行ノ力弱ク邪氣イツトナク滞リ集リテ
肋ノ下ヨリ口ヒサシテ下シタル如ク板ノ様
ニ支ヘルモノナリ其痞ヲ手ニテ按ハ痛ヲナシ
トカタ肋下ニクツ口ギナキモノナリ此レ中氣
ノ虚スルニ因テ自然ト集タル数年ノ痞ニシテ大
事ノ痞ナリ此痞アル人大方後ニハ腫氣脹滿ノ
證ニナルモノナリ然ル故ニ腫氣脹滿ノサシ出
ル病人ハ先腹ニテ知ルモノナリ良務

凡人肥瘦ノ別ナク章門ノ穴ヲ指テ以按シ其指
先ノ筋ヲ越テ深季肋ノ中へ按ルハ必定三年ノ
内ニ中風ノ病ト知ベキナリ是先師歷功ノ秘訣
ニノ百ニ一ヲ失フナシ南溟

中風ヲ患ル人ハ二三年前ヨリ章門ノ通ヨリ腰
骨マデノ豎筋ノ切タル様ニナリテ按之無力モ
ノナリ此人三年ノ内ニ中風ヲ發スルヲ必定ナ
リ左脇下如此ナレバ左半身不遂ス右脇下如此
ナルハ易治氣ノ行ル故ナリ治法ハ二三年前ヨ
リ認得テ補氣ノ藥順氣ノ劑ヲ久服セシムルヲ

善トス

壽安口白
竹玄悦同

肋下無力四十以前ノ者ニモアリ是ハ強壯以上
ノ者トハ殊ナリ其處ノ陽氣薄故ナリ枯セズト
イヘヒ痿スルナリ又季肋ヨリ腰體骨マデ季急
スル者其方ノ手足拘挛スルナリ病成テハ不可
救又季肋季セスカナキニ非メ偏枯スルモノハ
飲ナリ治スヘシ廢者ハ治スベカラズ台州

心腹痛

大抵醫ノ即効ヲ得ル處ハ腹痛ト嘔之其心得六ヶ
條アリ積痛食痛疣痛飲痛瘀血痛腸癰痛是之此六
ノモノトレヲトウト言レ又中ニ別テ見誤ルト死
ニ至ル者食痛腸癰ナリ予自然ト多年ノ功ヲ以テ
病人ヲ見ルト黑白菽麥ヲ辨スル如キ之今其大抵
ヲ述ル之○食痛ハ心下ヲ按ニ凹ミテ午ノ入ホト
心下カ背ノ方ニツク此極テ食積痛之此證ハ備急
圓ヲ用レハ吐下氏ニアリ然氏香平ナトヲ用カヨ
キ之○積痛ハ前ノ宿食ノ如ク心下不凹メシツト

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

脹テ心下ニ手ノ不入モ人此積氣之此モマタ劇症
ナレハ背ノ動付モノソレユヘ心下柔ニナルニア
ル之〇蛇痛ハ其處ヲ按フトクト氣ヲ鎮メ診ニ
クヌミト手ニ當ルヲ心ニ覺ルモノ之〇瘀血痛
ハ多ク臍傍少腹ニアリ其痛處ヲ按メ塊手ニアタ
ル之〇飲痛ハ其痛彼是散乱ノ痛之此痛ハ積氣ニ
チモアレハ其處ニ飲聚リ来ル之〇腸癰痛ハ此病
十人ニ九人マデハ右ニアリ按腹スルニ左右何ト
ナク異ナルモノアリ其腸癰ノ上ヘ手力行ニ外処
ヨリモ又ツメリト肌甚好キ之ソレニ必右足卒急

小便淋瀝スル之疝或ハ蛇ニ似タリ醫誤テ疝蛇ト
思ヒ療治メモ愈サル多此病之大黃牡丹湯或桃核
承氣ニテ下寸ハ妙ニ痛モ止モノ之小兒ニモ多シ
心付ベキ之東郭〇台州曰腸癰左臍傍壅腫
右亦有之又曰又有少腹癰者
左右不容承滿部位患滿痛按之彌痛或引手胸腹中
奔響漉々有聲時吐水汁吐則痛減是為澀囊宜温藥
宜減飲食台州
古傳曰腹ヲ候フ時塊積責上テ不吐不瀉呼吸モ既
ニ絶ントトメ三部ノ脈モ既ニ結代シ或ハ絶テ手足
厥冷スルノ證ニ三人病因アリ一八年未ノ塊積之

一ハ食物ノ留滯之一ハ疝氣之此三ニ於テ甚辨ヘ
難シ故ニ醫ヲ學フ者明ニ辨セスンハアレルヘカラ
入其積ヲ按ヘミルニ丹田氣海ノ分ヨリ根ヲシテ
上リ上腕鳩尾ノ地ヘ時ヲ取テ升降スルハ多年未
ノ積塊之若食滯ナレハ多ハ升降スルヲナクメ唯
塞テ動氣甚キモノ之食滯ノ積ニモ升降スルアリ
其ハ必ス時ヲ取テ腹痛スルヲアレル之殊ニ動氣甚
ノ痛ハ必ス天枢ノ地ニ在ト知ルヘシ食積ノ腹ハ按
テ快痛止ムヤウ之塊積ノ腹ハ邪氣ニ于ノ當ル毎
ニ痛絶カタシ然レ痛ヲ實證トシ不痛ヲ虛證トス

又章門京門ノ地ニ於テ或ハ左或ハ右ニテ痛ハ積
之股ノ邊氣衝ノ穴ノ分ヨリ指上ルハ多ハ疝氣ノ
積ト可知午ヲ強ノ按シ下ス時ニ漸クニ引テ臍下
小腹ノ邊ニテ散スルハ是皆疝氣ノ證ト可知ナリ
南溪

古傳曰腹痛不治ノ證ハ中腕ノ所ヤ中腕ノ左右テ
痛ハ難治ノ疝腹一枚ニ痛ト云ハ本道ナレレ中腕
ノ左右テ痛ハ不治ノ症ヲ衝痛ノ腹ハ是モ中腕ノ
間テ痛ハ其腹ノ形カ表ハ柔ニメ按テ見レハ戸板
ヲ推ス如ク堅ク成テ痛ハ陽虛陰實ノ腹テ死スル

同上

玉痛ノ腹ト云ハ是モ上中腕ノ間カ痛之臍水分ノ
處ヲ推テ見ルニ無カ上ハ鳩尾上腕ニ無カ上腕ノ
左右ニモ無カ其中ニ凝テ痛是カ玉痛之同上玉
腸癰ハ腹候ニテ決スルモノ之臍下小腹ノ邊ニ塊
マリテ指モツケルヲナラヌホト痛ミ皮膚甲錯ト
テ潤ナクサラニトナリテ腹痛ハケシク腹内雷
鳴ノ德利ヨリ水ニテモコホス如ク音アリ又杓ニ
テ水汲カヘス如ノ音スルハ是膿ヲナシタルニ甘
テ指ヲツケテモ痛ト云モノ常ノ積ニモアレ疝腫

物ノ膿ヲモツト云処ヘサワルモノナレハ痛ム様
子モ按シタ処モワカル者之半産ニ多シ産後ト食
傷ノ後腹痛スルハ油断スヘカラス度、アレ病之
膿血ヲ下ノヨリ腸癰ト知ルハ良工ニアラス南陽

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

張満 虚張實張ノ別アリ 虚張ハ腹ヲ候ニ張力弱

鼓張ニ虚張實張ノ別アリ 虚張ハ腹ヲ候ニ張力弱

キリ惣ノ臍カ切ル、之實張ハ臍カ上リテドナラ

へ推テモ動カ又若ソ腹ノ張力強シ手ヲ以テ推ニ

承ホナラズ是實張之 南溟

張満ノ邪ノアル所ヲ知ニハ上ヨリ按付テハ不見

之其跡ガギラトト光出ル者此邪ノ滯ル所之水腫

ノ腹下同クヲサユレハ手ノ下カラ冷ルモノ之是

モ邪ノ滯ルカラ之又虚張ナレハ臍カ切タリ張テ

モ柔之惣ノ張満ハ腹ハサスリミレハ張リニ人形

ヲサスルヤウニカナトノ鳴ル者又ハジケハ
ホシコトト鳴リ是ハ内空虚ナル故之鳴ルナキ
ハ内気ノ脱虚之サレ先ハ難治之又不治ノ症ハ
決メ見様アリ先臍ノヌケテマイ揚ルナリ是ハ
元氣ノ脱スルエヘソ肺先脾募ノ所力又ケルハ早
ク死スル之欵上下ノ氣離テ氣滯ル所カアル故之
是不治ノ症之肺先脾募ハ抜ケズトイヘ氏鼓脹ハ
難治ナモノ先死證ヲ見ルニ臍凸ニ抜テ肺先脾募
ニ脹氏欵ハ決メ死證也同上宜ク衆疾中ノ
總ノ腹脹ヲ患ル人ハ皆底ニ塊アルモノ之塊ナク

ノ腹脹ルモノニアラズ予ヨツトシタル脹ハ此例
ニアラス一旦急ニ脹スルナト塊ナキアリ是ハ腹
診ヲ詳ニスルハ分ルモノナリ 東郭
腹満ニ附子ヲ用ルノハ皮薄メ潤ナク脹ヲへ行ナ
リ同上

婦人妊娠

男ハ陽ニ屬メ一身皆陽ヲ體トス故腹亦自然ニ強ク氣質雖柔弱女ノ壯實ナルヨリハ強シ女ハ陰ニ屬ノ一身皆陰ヲ體トス故ニ男トハ格別ニ及メ柔弱和緩ヲ現セリ多産ノ婦人ハ腹診ノ例ヲ以テハ云難シ然レ其間ニ虛實ヲ可見之〇婦人ノ腹ニモ有陰陽二象之陽腹ハ是氣有餘血不足ニメ婦人ノ常象之故ニ多孕或ハ中年以後多病ナルモ有孕之陰腹ハ是血有餘氣不足ニメ婦人ノ變象之故壯歲ニ無病ナルモ孕トナシ對時

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

婦人天癸初至ハ時淫心甚ノ慾事不遂モノ心ヲ勞
シ腎ヲ傷リ水火不交ノ否トナリ漸ク積テ痞塊ノ
證ヲナス氏ハ其後夫婦ノ交ヲ成トモ終ニ子ヲ生
スルトナシ何ヲ以テコレヲ候フニハ其婦人ノ腹
ノ上下ヲ診スルニ鳩尾ノ下上腕中腕ヲ按スヲ
甚キライ右ノ章門ノ下ニ積氣アリテ動搖シ腰常
ニ冷ル者是必子ナキノ證之自先師至吾此ヲ以テ
候ニ百ニ一失ナキ之南溟
女子十四許虚里ノ動乳上ニ及者アリ是經水來レ
ハ低クナル之台州

血塊在中行者為在胞内經水或未或漸故經日月則

墨積在傍者為在胞外挑之則動或痛宜破之不動不

痛者慎不可攻之在胞外者經水不斷内

帶下之病小腹如囊盛蛇者不治無名氏

婦人ノ腹上ヨリタシニニ撫オロシテ臍ニ至リ

クツト一段ヲ千ルモノアリ是ハ産後血ヲ多下ス

カヤナクハ崩漏帶下カイヅレ脱血人之ト知ヘシ

且動氣元ルモノ之此ハ血虚ノ候之饗庭

腹ノ内ニ底ニツラミトシテ電十トマイタル如

クニ皮シハヨリ引ハ一慶ヘヨルハ小産ノ後カ子

ヲオロシタルアトカ産後ヨリノ病カ此三等ニ定
ル心得玉へ白竹
古傳曰凡經水滯留スル婦人ヲハ皆以妊娠ト疑フ
者多シ醫タル者明ニ辨セズンハアルヘカラス先
脈ヲ候フニ尺澤ノ動脈甚ク且太衝ノ動脈甚ハ妊
娠ノ腹ヲ候テ知ラント欲セハ丹田氣海ノ地ニ動
氣アリテ時トノ上腕ノ地へ上フトスルハ是妊
娠ニ非ス血塊之唯沈テ手ノ下ニ沈ム如クナルハ
血塊ニアラス必妊娠之又動氣曾テナキモアリ是
手ヲ以テ暫接ヘルキハ手ノ下潤汗少出ルハ妊娠

之乾テ汗ナキハ血塊之此可秘ノ專一ノ先師以未
效ヲ得ルヲ百ニ一失ナシ猶而後試ムベシ南漢
又曰惣ノ懐胎ノ形ヲヤトス所ハ臍下氣海丹田ノ
邊ニヤトスモノ之然積聚或ハ瘀血ナドガ滯ル
有テ難決ノ其時ハ臍下ヲ手ノ平テ上へ按テミレ
ハ瘀血力積聚ナレハ手ヲ引ト否ヤ本ノ處へ歸ス
推上テ見ヨリハ又候ヒ様カアリ惣體夜明テ食ヲ
へテ時ハ見ル空腹ナラサレハ難見ソ空腹ノ時臍
下ノ形雞卵ノ形ニムツクリト高キモノ之夫ニ手
ヲ掩テミルニ手ノハハカル様ニ真綿ヲ握テ様ニ

ムツクリト當ルモノハ必懐胎之瘀血積聚ハ病故
ニ手ヲ以テ按ノミルニ内カラムツクリトセザル
モノハ是ハヤワラカナ候ソ又一ノ候法ハ高キ處
ヲ推ニ懐胎ナレハ痛マ又モノ之瘀血積聚ナレハ
痛者ナリ 同上

又曰死胎ノ者ノ腹ハ臍下寒ル之子息災ナレハ其
子ノ陽氣アルニ因テ温之其子力死ルト陽氣脱ス
ルニ因テ寒ル之同上
凡診妊娠受胎百日以徃為可前百日以亦宜於平且空
心診平且少腹張而胎見是胎之所居在中極胸下部

位間有偏右者胎大如雞卵軟而滿有光澤按之則手
下滋潤不痛不移正是灼然妊娠也按之皮膚乾燥如
有稜角或有者又按之則痛或轉移如此則為瘀塊痛為
痛為妊最是其所位必在右邊其在任脉或左者殊十
捷經辨法中之一耳不可不知 台別

驗胎ノ說ハ賀川氏ノ產論及翼ニ詳ニ茲ニ錄引
セス

小兒小兒... 凡小兒自四五歲至十三四... 薄虛里胸脈多動此所可預知也... 小兒ハ三葉十變ニモ其時ヲ逐テ腹象異ナル有ヘシ四五歳ヨリ少シ中腕脹ヘシ藏府未實ノ食用ノ多少ニ因テ腹象變ルヲ多シ只腹形小ニメ能シマリタルヲ宜トスベシ十歳比ヨリ漸上腕中腕俱ニ細長シ三焦同位ニ板ヲ立タル如クナル之俗ニ大長スル故ニ瘦ルトハ此時藏府ノ大體定テ實トシマリテ自ラ瘦ル如クナル之思フニ初生ハ

小兒小兒

凡小兒自四五歲至十三四
薄虛里胸脈多動此所可預知也 秀菴

小兒ハ三葉十變ニモ其時ヲ逐テ腹象異ナル有ヘシ四五歳ヨリ少シ中腕脹ヘシ藏府未實ノ食用ノ多少ニ因テ腹象變ルヲ多シ只腹形小ニメ能シマリタルヲ宜トスベシ十歳比ヨリ漸上腕中腕俱ニ細長シ三焦同位ニ板ヲ立タル如クナル之俗ニ大長スル故ニ瘦ルトハ此時藏府ノ大體定テ實トシマリテ自ラ瘦ル如クナル之思フニ初生ハ

陽盛ニノ氣常ニ上ル故ニ上ニ脹リ陰漸ク長スル
ニ隨テ下焦モ實ノ如板ナル之天年篇曰人生五歲
五藏始定ノ義ニ據ル片ハ腹部モ是ヨリ定ルト可
知十歲已下ハ只其時々ノ病變ヲ診スルノミ之十
五歲ヨリ腎氣旺ノ下焦モ實スル之然虛弱ノ者ハ
一例ニ論スヘカラサル之對時
小兒ハ十四五歲マデハ上ノ脹テ下ノスクタ平ト
ス是胃府ノ壯實ナル故之台洲
小兒發熱盛ニノ心下ノ動スツト臍中ヘサカノホ
ルモノハ必直視ノ患アリ預病家ヘコトワリオク

ベシ何ホド熱ツヨク其動上ニス、マス惟水分
臍下ニアルハ直視ナシ此診察痘驚風ナドニ入用
心得テオクベシ養庭〇痘疹腹候ハ
後ノ衆疾中ニ詳之

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

衆疾腹候 前診條中既ニ其説此ハ然彼ハ腹ニ就テ病ヲ知ノ法之此ハ病ニ就テ腹

ヲ察スル訣之

中風

中風ノ候腰ノツカイ骨ト肋骨トノ間へ手ヲ

ヤレハクサト入ル是ヲ大肉ノ離タルト云フ中風ノ

漸ニノ必手足麻痺スル之中風ニテ卒倒シ人事ヲ

分タヌモノナレハ何レデモ大肉ノ離ル方不遂シ

不治ノ症ハ左右共ニ大肉ノ切タルモノ之譬ハ言

語正メ人事ヲ見分トイヘトモ兩方ノ大肉離タル

ハ必死之條南溟〇前肋下ノ

中風

中氣ノ証ノ腹ハ中風ノ如ク大肉が不離之故

大肉ノ離不離トヲ以テ中風中氣ノ別トスル之中
氣ノ腹ハ臍グタツキ弱キモノ之同上

發熱 何ホト脈數ニテ熱強ク見エルハ腹候ニ熱ノ
ナキハ推付サメル表熱之サテ腹候ノトキ掌中へチ
リヒトト熱勢ノ見エルハ伏シタル熱ニテ容易ニ
サメズワケテ小兒ノ暴熱スルハ甚見分カ子ル引
付モアルへキヤドレホドノトニナラニヤト覺束
ナク脈ニテハ知レカ子ルモノ之コトニシテ腹候
ニテ決知スへシ心下ノ真中ニ動氣モアリテ手掌
へチリヒトト應スルハ油断スへカテス南陽

瘧 瘧症ハ其本濕熱ヨリ致スモノ之腹ハ大抵右へ
ツカユルモノ之是中焦不足スル故之先陽明胃經
ニ邪ヲ受ルモノ之壽安
瘧ノ候多ハ右ニツカへ惡寒強ノ發熱ス左ツカユ
ルヲモアリ其病人ハ必綿延トメ断シカタキモノ
之玄悅

痢病泄瀉 痢病泄瀉ノ證中脘ヨリ以下水分ノアタ
リ瘧アルハ假令數日ニ及ヒタリ氏換榔枳殼ノ類
ヲ以テ疎泄スへシ又下脘ノ水分ノ邊ツカへナク
テ按ノ無カハタトへ近日ノ痢病泄瀉ナリ元宜ク

補氣ノ劑ヲ典ノヘシ壽安〇玄悦同

古傳曰痢病ハ腹中上下ヲ按ス時ニ必章門ノ地ニ
動氣アリコノ動氣手ニ隨テ升降スル者ハ必外邪
ヲ兼タル之若動氣處ヲ定テ不上下ハ凡内傷ト知
ベキ之外邪トテモ先食積ニ傷ラレテ風寒暑濕ヲ
兼タル之南漢

又曰泄瀉ノ腹ヲ見ルニ臍ノ左ニ凝滯スル物アレ
ハ必痢ニナルモノ之又痢病ノ腹臍ノ左右ニ凝リ
鳩尾ニ動氣アル者ハ必禁口痢之又臍ノ右ニ凝リ
塊アレハ死證之同上

痢疾不容承滿部位或臍兩旁或少腹有凝結大如胡
桃有動者為毒至重結在心腹者唯在左不容者必為

禁口按之熱痛者宜下之台州

痢毒臍ノ右ヘマハリ動アル者ハ多死ス小兒外臑
ツヨクアルモ若左ノ動氣手ニ應スルハ必痢ニ
ナル之東郭

脚氣水腫脹滿當時ノ脚氣ハ本痼疾アリテ更ニ濕
邪ニ感スル故之腹診モ臍ノ左ノ痼毒任脉ヘセマ
ル甚シ氏ハ任ヲ升テ心ヲツク下焦ノ濕足ヨリ上
テ初テ腹ヘ入レハ臍下ニ動アリソレヨリ一寸ツ

上へ上リて遂ニ心ヲ衝ク之東郭
水腫ノ症水ヨク利シ腫悉去テモ心下ニ水結アル
モノハ必再発シ死ス右痞穀スルモノハ危篤之上
脚氣水腫有動者危冲氣雖低動不止者必死人迎動
高者亦水逆也為難治台州
水氣病中腕或臍上如約束状者為中焦虛難治同上
水腫脚氣心ニ心下ニ水氣ノミ入又ハ大事ナシ心
下カラ水氣ヲ催シタラハ油断ハナラヌ脚氣ノ衝
心ハ心下ト動氣ト呼吸ト脉ニテ決スベシ南陽
水腫脹満ノ症腹内甚脹タル者臍ヲエリ動ノ見ヨ

臍ノ後十四ノ処ヲ離レアチハ動キコチハ動ハア
クマテ腹ハ脹テモ臍ノ後ノ控キレタル之此必死
ノ症之腹緊脹ストイハ氏臍ニ動ノ十四ノ処ヘヨ
クツキテ左右ヘ動ザル者ハ吉之治スベキノ證ト
ス腫脹ノ診候カクノ如シ壽安〇玄悦同又白竹
脹満症ニ鳩尾マテ動氣アルハ必死ナリ中虛
心虚心虚壽疾并勞心ノ診ハ左筋ハリ堅シ左右氏
ニアレ氏左甚キ之其引ハリ先キ心ニ乘ル之勞心
甚者ハ水分ノ動亢リ或ハ動ニ結代アリ異風之郭
〇前水分條
ハ相參セ

癆疾 癆疾ニ右ノ腹ヨリツカヘクルモノハ不治中虚
血症 諸血症胸腹ニ動ツヨク物事少ノヒ、キニモ
驚ヤスキハ其形状ヨクミヘテモ不治ニ属スルモ
ノ多シ 饗庭

傷食 傷食ノ腹ニ凝アルハ知レタユトニテ手サワ
リヤワラカニテモ傷食ノ症ハハリフツテ内ガ一
マイニ凝テアルモノ之別テ水分下腕ノアタリカ
サウアルモノ之上ツリテ凝タハ吐スルモノ下ツ
リテ凝タハ瀉スル之中ノ凝タハ吐氏瀉氏カタツ
カ又ナリ 鳥巢

滯囊 滯囊ノ腹候ハ先活物ヲ囊ニ入タル如ク不時
ニムクミト彼ニ此ハ高クナリ實ニ鼠ナトヲ囊
ニ入タル如ク頭尾アルモノ、様ニエナラヨリ推
ハアチラヘヒコツト又ケ高クナリ上ヨリ推ハ下
ヘ又ケナトメ定所ナキモノナレ氏先多ハ臍欵傍
ヨリメ右ノ腹下ナトヘ差込モノナリ 東郭

嘔吐 嘔吐ノ症ニ動氣鳩尾ノ下マデサシ升ルコアリ
此症ニ粗忽ニ藥ヲ典ル氏ハ其嘔吐必ツノル之先
其動ヲ静メヨ其後ニ藥ヲ典ルヤウニスヘシワレ
ニハ鍼力丸藥ノ類自之鳩尾靜テ後煎湯ヲ評議ス

へシ 養食庭の良務同又曰 鳩尾ノ下ニ少シナリモ動
モソク久シキ吐逆ノヤミカヌル
ハ皆動氣ノサシ上ル故之

膈噎翻胃

膈症ノ腹ハ中脘ノ底枝ノ如ク堅キモノ

伏スルニ 壽安〇壽院同又曰 今不病トイヘ氏後未

硬キ物アルモ 膈ヲ病ヘシ物ト上皮膚ササトク

膈症ノ腹ハ臍ノ右ヨリ臍ノ下ヘカケ盃ヲ伏セタ

ルヤウニカタキモノ之是臍ノ右ヨリ臍下マテ大

腸ノ位スル所ニ今大腸ニ食物ヲツ、ミカ子不

行エハ如此ト之是死症トシルベシ中虚

或曰膈症ノ腹ハ表裏共ニ堅ノコブ、ミタツモノ

之又曰翻胃症ハ中脘脱ノ弱キモノ之胃陽虚脱ス
ルエハ之南溟

膈噎ヲ患ル人ノ腹ハ水穀ノ潤ナキ氏ハ燒土ヲイ

口ヲ加如ク燥モノ之 饗庭

痺古傳曰痺證ノ腹ハ臍ノ上下ニ動有テ盛ナルモ

ノ之風寒濕ノ三氣表ヲ閉テ皮膚發達スヘキノ氣

力塞ルニ因テノ故之是痛風ノ証之 南溟

痿古傳曰痿證ハ帶脉ニ見ル、モノ之皮膚ニ現ル

、ルノデナキ之天枢ノ左右ヲ指ヲ以テ按スルト

指ニ當ル者紙燃力貫セシヨリノ様ニ當ル之是痿

證之同上

腰痛 或曰腰痛ヲ候フ腹ハ京門ノ處ノ肉弱ノ指ヲ入ルニツクミニスルモノハ或腰痛ヲナス果メ不違之同上

消渴 古傳曰消渴ノ腹ハ表柔ニノ裏堅キ者ニ腹ヲ見ルニ表ニ手ヲ當ルハ柔ニ推テ沈テ見レハ豈ヲ按カ如之此消渴ノ腹之又臍ノ右ニ動氣アル者ハ死証之精氣不足ノ虛火ノ盛ナルニ同上

小便閉 小便閉臍下腫起大如雞卵漸大漸脹按之則痛時々欲小便者是為實按之不痛者是為虛脚氣溲閉者稱

下及瘦
〇台訓

小便閉ハ任脉曲骨ニ迫テ塊ヲナシ按スレハ溺氣催入之同上

轉胞小便不利ノ症臍下ニ塊アルモノ之圓キハ治ス枵核ノ如キハ不治東郭

卒死 頓死ノ腹ハ皮膚實ノ腹底勢カナキモノ之安壽

或曰人俄頃ノ間ニ昏倒スル者先神闕ノ動ヲ候フヘシ微トトメ脉尚アラハ鳩尾同兩旁ニ深ク鍼スヘシ此ニテ効ナクハ神闕ヲ深ク刺ヘシ若夫ニテモ驗ナキハ不可治之凡此症ハ邪氣心包絡ニ入

テ心気ヲ奪カ故ニ如此ナリ南漢
[中惡] 古傳曰中惡ノ証ハ不圖ヲリロシキ事アリテ
病テ氣下陷スル故ニ腹ハ必水分ノ處ニ氣結テ塞
ル之是ハ大肉切ルヲモ臍ノクタクヲモ無キモ
ノ之同上

[結毒] 總テ結毒アル腹候ハ皆心下へ聚ル者ニテ先
大柴胡ヲ用ル腹形ニ似タリサレモ輕々ニ數遍ナ
テ、ミレハ何トナク予サワリニ違アリ此予サワ
リノ中ルアシハ今ハ數年病人ヲ試テ意解神識ス
ヘシ格別手強ク按ノハ反テ分ラヌモノ之胎毒ハ

固ヨリニテ小瘡梅毒瘡痘瘡ノ内攻脚氣等ノ諸毒悉
心下ニ於テ其候ヲアラハスモノ之只一キハ違ヒ
タルモノハ天刑病ヲ患タル人ノ腹候之此症已ニ
面形色ヲ失ヒ合谷ノ所或ハ肩ナトモ肉脱シタル
モノハ果ノ其腹ホカクニトメ虚脱シタル腹ノ如
ク妙ニ違フモノ之サレモ若真ノ天刑病ニアラス
メ血風ナトニテ假ニ天刑ノ形ヲ見ハシタルモノ
矢張結毒ノ候アリ然結毒ヲ診候スルヲ唯診候ノ
ミニハ限サルヲユヘ天庭ノ血色皮膚ノ候腹脈ナ
トヲ以テ參伍錯綜ノ候ニ得ヘキト之東郭

結毒ノ證圖ノ如ク拘急スルヲ

以テ標的トナス之同上



凡外出瘡毒内攻ハ毒左ノ上ニツク午掌ヲ以テ胸

ヨリ撫ヲ口シ圖用如クキレテ毒ノ付処堅シ左ヲ

上トシ表トス故ニ先左ニツク是皆瘡毒之若問テ

外瘡ノ覺ナケレハ必瘀血ノ上リツク之

右此ニ如此ハ熱アル症ハ吐血スルアリ



虚腹ニテ拘急強之別診之同上

湿毒ノ内攻ハ臍下一寸許ノ地ニ凝テ動氣アリ此

凝去テガレハ手足ノ痛等愈ルヲナシサテ其毒上

へ上ル時ハ臍下ヨリ左へマハリテ上ル之決テ右

ヨリ直ニ上ルヲナシ其故ハ左ヲ東トシ表トスル

故ニ左へマハリテ上ル之同上

湿毒ヲ煩フ人ニハ臍上五六分許任脉ヲ排クテ各

一寸許左右ノ内ニ必動氣アリ大抵寸口ニ應ス是

ヲ以テ瘡毒疑似ヲ決スルアリ 饗庭

痘疹

古傳曰痘疹ハ腹ヲ以テ候テハ鳩尾サキノ

動氣高キモノ之大抵風寒ノ邪ニハ鳩尾サキノ

動氣高カラズ熱甚ク鳩尾サキノ動氣高ハ必痘瘡

ヲ發スル之熱甚ク掌中ノ動氣盛ナルモ必痘疹之

又痘疹発スルニ隨テ鳩尾ノ動ハ止モノ之然ルニ
出齊ニモ動ノ止又トハハ痘毒熾ナル故ニ死ス
ル之南溟

痘瘡順證ニ似タル疔疔下動甚キハ必死ス壽安〇

又曰疔下動微ク澤アル
ハ不死澤ナキハ死ス

痘報重ヲ知法ハ少腹ニ動甚者皮膚枯テ潤ナシ動
輕者ハ痘モ輕シ動甚ハ熱モ痘モ甚シ不可治痘ノ筋
合ヨリテタトヒ不死疔危シ其動虛里ニアルモノ
鐘ヲツク如ナルアリ但動甚ノ腹痛スル者ハ大黃
ニテ下スヘシ其動氣ハ毒故ニ下スヘキニ台州

痘瘡在不容邊動高者必難治同上

痘八九日ヨリ末心下ニ動アリ後ニ胸上へ上ルモ
ノハ必煩躁ノ死ス去ナカラ貫膿ノ節ハ少クノ動
出ルモノ之動胸ニ上リテモ腹ニ根アルモノハ又
木へ戻ル之胸ニ動アリテ下ニ動ノ根ナキモノハ
必死ス諸症モ亦然リ是秘中ノ秘之東郭

死生前ノ諸條中既ニ其説

古傳曰内經難經ニ載ル所ノ死生ヲ知ル法大畧皆
脈診ヲ以テ云然氏腹診ノ傳法ニ又一法秘訣アリ
リノ醫ノ手ヲ以テ病人ノ腹ヲ按モム時丹田氣溢
ノ地ニサシ張タル如クニ中ノ藏物ヲシカリト持
テユタヘアルハ是ヲ元氣ト云是當ニ腹ヲ候フ若
按メ絶ルホトナルハ必元氣虚衰ノ証ニ必病重ル
ヘキ之若又大病ノ後ニ丹田氣海ノ地如此ナル者
ハ必三十日ノ内ニ可死之又大病ノ後鳩尾ノ下ノ
間ニ細ク筋張り皮肉離レタル如クナルモノハ必

十四五日ノ内ニ可死又腹中ノ動氣不退ノ鳩尾ノ
下兩ノ骨マテサシコト責上ルモノハ必七日ニシ
死ヘキ之已上ノ診法ハ皆病中病後ノ診之假令ハ
人迎寸口ノ脈平和ニトイヘ此症アル者ハ治セ
ザルヘキ之南漢
邪氣離テ後腹ノ上下左右平和ニシテ強ク堅固ナル
ハ生之邪氣離テ後脈靜ニ足下温ルハ生之邪氣離
テ後腹中ノハラミトシテ布袋ニ石ヲ入タル如ハ死
證之邪氣離テ後腹中ニ物ナク唯ゲサミトシタ
ルハ死証之同上

又病人ニ兎角ニ不可治ト思フニ不圖腹部ヨクナ
リ一日一夜ノ中ニ驚ホトヨクミエルヲアリ此症
ハ二三日モ過ザル内ニ死スルモノ之ヒタトダマ
サルモノ之中虛
岩戸腹ト云アリ老人ナト本腹ノ張ルニ俄ニ腹皮
背ニヒツク症アリ不出三年ノ死ス藏真竭ル故
之又任脈通りニ中テ火箸ノ如ク三道幸急ノ下ニ
達シ臍ニ至テ左右ニ分ル者アリ不出三年癸大病
ノ多ハ死ス台州
惣テ大病ニ及ヒシモノ臍下ノ動必上ヘ上リ胃下

ニツキ上リ死ス廿十キ氏ハ肉分以上ニアリツレ
テ甚キモノハ皮下マテモ動クヤウニナル之此必
死ノ候ニ 柳食庭

病人ノ臍工我中指ニアテ、動氣アラハ死スルト
知ルヘシ左ニアル歸一湯ヲ與テ動氣静ラハ生ル
ト心得テ療治スヘシトカク動氣出ル人ハ死スル
之此歸一湯ヲアタヘ神闕ノ動氣静ナラスハ療治
スヘカラス 萬法歸一湯ハ益氣湯加桂附之〇右大極
源流腹診得ニ出ツ室永中ノ人山田昌庵

診病奇候大尾

五雲子腹診法

林養春院法印傳家秘本
男雲統筆記

五雲子曰病ヲ候ニ望問聞切ノ四者ヲ以テス然氏
病者ニ對シタルハカリ之ヲ候氏ハ病人ニ臨テ標的
トスヘキトナシ如常人ニ對シ其人ノ病邪アル處
或ハ性知マテモ候察シ其形ヲ見テ氣血ノ虛實ヲ
モ察シ平生ユレノミ心ヲ放タス時トノ彙慢スル
トナケレハ自然ニ背腹ノ様子ハ云フニタラズ藏
府心知ノトマテ掌ヲ見ルガ如クナルニ平生藏象

ニ工夫ヲ用テ佳ク

右

左

食滯 氣滯

氣滯 食滯

先人背ノ模様ヲ見ルヘシ肩ノ廻リハ骨ノ會スル
トエロナルニ因テ氣血滯リヤスシ故ニ肉モ亦厚
クナル之魄戶膏肓神堂ノ邊滯ルトエロ之此邊宜
ク灸スヘシ

右ノ方心俞督俞今按督俞詳ナラス一本腎俞ニ作
然其位低シ從ヒ難キヲ覺ユ

膈俞ノ邊ヲ推氏ハ食滯ノ症ヲ知ヘシ脾胃ノ食氣
升聚テ必癰毒ヲ発スルモ亦コノユヘ之右ノ方如

此ナレハ必左京門ノ邊隆脹スル之其時ハ右ノ督
俞膈俞左ノ京門ニ灸スヘシ左ノ方心督膈ヲ推
氏ハ右ノ京門隆脹スルハ是思慮多ノ心肝滯スル
故ニ左ノ方督膈俞右ノ京門ニ灸スヘシ背ノ大
抵ヲ見テ虛實ヲ知ヘシ氣稟怯弱ノ人ハ必十四十
六推ノ左ノ京門ノ邊ヨリ背ノ大骨弓ノ如クニ曲
ル之或龜背ノ如ク出ルモアリ能ク心ヲ付テ見ベ
シ




右ノ如ク圓カナル腹ハ上ニ無病上壽ノ腹之然也
 倘強キヲ頼テ飽酒飽食スルハ却テ病者トナル
 之我ハ病者ナリト云ニ二種アリ右ノ如ク氣稟至
 強エハ飽クマデ不養生ニテ病者トナルアリ又氣
 稟怯弱ニ至テ病身ナル生レツキニテ病者ト
 云人アリ又我ハ幼少ヨリ病者ト云人生レツキ
 ハ強ケレハ幼少ノ時食傷ノ養生不宜病者ノ如ク
 ナルアリ是ハ生質病者ニハアラス能ク考ベシ堅
 枕高枕飲酒ノ人煙草ヲ好ム人皆三焦ノ氣強キ人
 之元氣ノ強ト心得ベシ實症之柔枕低枕ヲ好ム人

酒ヲ飲サル人煙草ヲ好ザル人皆三焦ノ氣弱人ト
 知ベシ大槩右ノ如シ然モ酒ヲ飲サルニ強人アリ
 此ハ飲慣ルレハ上戸トナルモノ之上戸モ氣力弱
 クナレハ酒ヲ飲テナラヌ之平生ノ形恰好ヲ見虚
 實ヲ考知ベシ古人肩ヲ撫テ生死ヲ決ストイフ之
 二六時中心ヲ放タヌ工夫スベシ



此ノ如ク右方ノ筋骨下リ或高フナルハ常ニ食養


生ノ悪キ人ト知ベシ飲食濁氣升テ痰トナリ筋骨
ニ粘着ヲ骨高ナリ清氣升ラザルエニ筋骨ナ
カル之此ノ如ナレハ背ノ右ノ心督膈命ノ邊モ高
クナルナリ飲食ヲ節ニスベシ



如此左肋骨下リ或高クナルハ氣ヲ勞スル人ト知
ヘシ或ハ軍法等書籍ニ心カラ弾スカ或ハ平生謀
慮ノ心カラ勞スルカ下ニテ心肝鬱滯スル人如

此トシルベシ


如此右へ痞スレハ難治之崩ハカリニテ堅マラザ
ルウチハ健脾丸可治此ハ膏粱ノ變ナリ故ニ無病
息災ナル大丈夫ニ多キ証之硬ノ鳩尾下へヒロカ
レハ不食トナル黄疸ニモナル之不治ノ証之酒食
厚味夜分ニ蕎麥麩ヲ食ニ鯉ノサシミ等ヲ好ム人
ニアル之今俄ニ出来タルモノニアラス歲月ヲ積



于生スルモノ之シタシヨリノ催ナリ




兩ノ肋脊廣キホト無病ナリ鳩尾ノ下ニ入ノ深キハ病者ノ腹ナリ




如此ニ段々アルモノアリ二重腹ト号ス病者ノ腹

之細キ帯ノ如ク之ヲ撰レハグレリニトスルハ脾胃虚大包ノユルマル之





如此ニ大綱ヲ張タルヤウナル物アルハ四十以後五十以上ノ人大食ノ如此ニナル之傷食ノクレリトナリ半身不遂トナル之一旦治スル凡又傷食スレハ中風トナル之或膈症トナル不治之

如此右ツ、ハリ動氣モ右ニヨリテウフハ脾胃ノ
 傷シ液燥タルト知ヘシ病人ハ左方ツカヘタルト
 自云モノ之下痞ノ藥ハ用ベカラズハ珍湯ニ増減
 ノ滋潤ヲ專ニスヘシ



如此左へ痞アルハ厚朴青皮莢朮香附酒製黃連三稜
 一本莢朮ナクノ類ヲ用ヘシ然物懸見合スヘシ

如此中道ニアル痞ハ香附縮砂山查神曲酒製麥芽酒製芍藥當
 歸酒製青皮一本瓦砂仁芍藥有酒等ノ藥虛實ヲ考テ療治スヘシ



如此小腹痞タルハ病力或ハ大便結スルカ考ベキ
之病ナラバ大茴小茴木瓜香山查青皮換柳一本
香換ナト宜シ以上十二則原本並ニ家君曰ノ
字ヲ冠セリ家君トハ五雲子ニ
或曰患人ヲシテ仰臥ノ兩足ヲ伸ヘ兩手ヲ股外ヘ
ツケシノ男ハ左女ハ右乳下ヲ平手ニテ按シ五六
息ノ後其手ヲ下シ上腕ヨリ次第ニ之ヲ按メ病人
ノ心弱者按此義明虛之按メ痛モノ實之輕按メ痞
スルハ邪在表之重按メ痛ハ邪在裏之心下スキ臍
下フクレテ按コタヘアルハ腎積ノ實之心下フク
レ臍下スキタルハ腎虛之臍ノ上下ナレアウテ何

ノ碍ナク按ユタヘアルハ平常無病ノ人之或ハ堅
或ハ柔ニシ木枝ナドヲ袋ニ入タルヲ探ルガ如キ
者ハ縱ヒ無病トイヘ必病ヲ察スルモノ之左右
ニ堅筋張タルハ性氣ノ虛之生死ヲ診スルニハ臍
下三寸関元ノ穴ヲ候フヘシ此穴ハ天ノ一元ノ氣
ヲ受ルトコロニシテ三焦ノ根本之故ニ之ヲ按メ有
力無カク察シ以テ生死ヲ知之

五雲子腹診法 終

診腹之法唐山及無其說五雲子之於此術豈宿有獨得
抑歸化之後觀我醫之伎就有發明乎茲編余獲之于
養春後人雲悅又獲之于兒醫人見元德二本稍有異
同仍互參繕訂以附于奇後之後庶足相轉而行乙巳
歲修禊日三松齋記 堅

論後世法... 行歸化... 奏... 同... 尚...

