

薛氏二十四種

婦人良方三

和
584
R3



門武9
孫
卷
23

婦人良方卷之四

薛氏醫按

臨川陳自明編 吳郡薛 已註

新都 吳中珩校

婦人血風肢體骨節疼痛方論第一

婦人血風由氣血不足。腠理不密。風冷乘之。以致邪正相搏。故骨節疼痛。肢體發熱。口舌咽乾。

愚按東垣先生云。飲食失節。脾胃虛弱。乃血所生病。故口中津液不行。若熱來乘土位。故肢體發熱作渴。若肝經血熱。用四物羌活黃芩黃柏。肝經血虛。用逍遙散。山梔川芎。風濕兼痰。用四物南星半夏羌活蒼朮。風濕傷脾。用羌活勝濕湯。暑濕傷氣。用清燥湯。氣鬱肝脾。用四君。香枳殼。檳榔。胃氣受傷。用補中益氣湯。瘀血流注。用四物桃仁紅花。骨痛肋攣。

即
道
通
書
重
印

新
都

婦人良方 薛氏醫按 卷之四

用當歸沒藥丸。倦怠無力。用補中益氣羌活川芎。

附治驗

一婦人自汗盜汗發熱。晡熱體倦。少食。月經不調。吐痰甚多。二年後遍身作痛。陰雨益甚。此氣虛而風寒所乘。用小續命湯。疼痛頓止。補中益氣。加味歸脾。三十餘劑。諸症悉愈。一婦人月經不調。且素有痛風。遇勞必作。用衆手重按。痛稍止。此氣血俱虛。用十全大補。加獨活而痛痊。用六味丸。逍遙散而經調。

一婦人肢體作痛。面色痿黃。時或赤白。發熱惡寒。吐瀉食少。腹痛脇脹。月經不時。或如崩漏。或痰盛喘嗽。頭目眩痛。或五心煩熱。口渴飲湯。或健忘驚悸。盜汗無寐等症。歷年許。悉屬肝脾虧損。氣血不足所致。用十全大補。加味歸脾。兼服月

餘諸症悉痊

百窮散

川芎一錢

赤茯苓

赤芍藥

酸棗仁炒

桂心

當歸酒洗

木香

牛膝酒洗

羌活

枳殼炒

甘草各三分

右水煎服

羚羊角散

治血風身體疼痛手足無力

羚羊角鈔

酸棗仁炒

生地黄

檳榔各一兩

五加皮

防風

赤芍藥

當歸酒洗

骨碎補炒

海桐皮

川芎各五錢

甘草三錢

右為末。每服二錢。溫酒調下。

通靈丸 治血風手足疼痛不可忍者

白附子

僵蠶各一兩 全蝎半兩

麝香一字

婦人良方

李氏醫案卷之四

二

七

右為末煉蜜丸桐子大每服十九丸温酒下日三服

當歸沒藥丸 治血風肢體刺痛肋攣骨痺或手足麻木

當歸 五靈脂各一兩炒 沒藥半兩

右為末醋糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

虎骨散 治血風走痛或打撲作痛

虎骨酥炙 敗龜板酥炙 當歸酒洗 桂心

牛膝酒洗 漏蘆 地龍去土 歲靈仙

玄胡索炒 自然銅製等分 右為末每服二錢熱酒調下

附方

羌活勝濕湯 治頭痛脊痛腰似折項似拔

羌活 獨活各一錢 藁本 防風

甘草炙各半錢 蔓荊子 川芎各二分

右水煎服如身重腰沉沉然是濕熱也加黃柏一錢附子半

錢蒼朮二錢

東垣清燥湯方見後

四物湯

補中益氣湯

四君子湯三方見二十四卷第六論

小續命湯方見十九卷第八論

逍遙散

加味歸脾湯

十全大補湯三方見二十四卷第四論

六味丸方見二十四卷第十一論

婦人血風白虎歷節走疰方論第二

婦人血風。白虎歷節。由體虛風邪乘之。隨血而行。或淫溢皮膚。或卒然掣痛。走疰如虎嚙者。加減小續命湯主之。

愚按東垣云。若人身體沉重。走疰疼痛。此濕熱相搏。或風熱鬱而不得伸附著於有形也。是症多因飲食起居失節。或因七情勞役失宜。脾胃虧損。脾胃不密。外邪所侵。以致內熱。熱自汗盜汗。或經候不調。飲食不甘。治法。濕熱腫痛者。清燥湯。兼痰佐以二陳湯。肝火作痛者。加味逍遙散。肝鬱作痛者。加味歸脾湯。血虛作痛者。四物湯。氣虛作痛者。四君子湯。氣血俱虛者。八珍湯。俱加羌活川芎。月經先期而痛者。加味逍遙散。頭眩倦怠而痛者。補中益氣湯。大抵按之痛甚者。病氣實。按之痛緩者。元氣虛。勞役而痛者。亦元氣虛也。飲食失宜而痛者。脾氣虛也。惱怒而痛者。肝火盛也。若晝輕而夜重者。

血分病也。與前兼用

附治驗

一婦人歷節發熱。作渴。飲食少思。月經過期。其脈舉之洪大。按之微細。用附子八物。四劑而痛止。用加味逍遙而元氣。

用六味丸而月經調。
一婦人體肥胖。素有熱。月經先期。患痛風。下體微腫。痛甚。則小便頻數。身重。脈緩。此風濕血虛而有熱。用羌活勝濕湯。二劑。腫痛漸愈。用清燥湯。數劑。小便漸清。用加味逍遙散。內熱漸愈。又為飲食停滯。發熱仍痛。面目浮腫。用六君加柴胡升麻而愈。又因怒氣。小腹痞悶。寒熱嘔吐。用前藥加山梔木香而安。惟小腹下墜似欲云後。此脾氣下陷。用補中益氣而愈。後因勞役。怒氣作嘔。吐痰遍身。腫痛。經行寒熱。此肝木侮脾。

婦人良方 薛氏醫案按卷之四 四

土用六君加柴胡山梔腫痛嘔吐悉退後用補中益氣而安
一婦人飲食少思畏風寒患痛風嘔吐寒熱脉弦緊用附子
八物而四肢痛愈用獨活寄生而腰痛漸痊惟兩膝腫痛用
大防風湯而痛漸愈用歸脾逍遙而元氣復
漏蘆散 治走疰疼痛

漏蘆 當歸 酒洗 牛膝 各三錢 桂心

地龍 去土 防風 羌活 白芷

沒藥 甜瓜子 各半 虎脛骨 敗龜板 各酥炙

右為末每服二錢熱酒調下

四生丸 治骨節作痛或渾身麻痺

白殭蠶 炒去絲 地龍 去土 白附子 五靈脂 草烏 去皮尖

右為末米糊丸桐子大每服二十九丸茶清送下酒調服亦可

麝香丸 治歷節諸風走痛或如蟲行

大川烏 三個去皮 尖生用 全蝎 二十個 黑豆 二十粒 地龍 去土

麝香 一字

右為末米糊丸菉豆大每服十九丸温酒下。○許學士云予得

此方凡歷節及不測疼痛一二服便癒治一貴婦遍身走痛

夜如蟲螫三服而愈

附子八物湯 治歷節痛如錐鍛

附子 乾薑 炮 芍藥 炒 茯苓

人參 甘草 桂心 各五分 白朮 一分

右水煎服一方去桂用熟地黃二錢

獨活寄生湯 方見後

小續命湯 方見後 一婦人兩踝作痛上行膝髀肩肘痛如錐鍛

婦人良方 薛氏醫案卷之四 五

至夜尤劇六脉皆緊一劑而愈又鄧安人夏月患此人迎脉虛此因暑而得用酒蒸黃連丸一服亦安

附方

東垣清燥湯 治元氣虛濕熱乘之遍身酸軟或肺金受邪絕寒水生化之源腎無所養小便赤少大便不調腿腰痠軟或口乾作渴體重麻木頭目眩暈飲食少思或自汗盜汗肢體倦怠胸滿氣促。

黃芪一錢五分

五味子九粒

黃連炒

神曲炒

猪苓

柴胡

甘草炙各二分

蒼朮

白朮炒

麥門冬去心

陳皮炒

生地黄

澤瀉各五分

白茯苓

人參

當歸酒洗

升麻各三分

黃柏酒拌一分

右水煎服

二陳湯方見二十四卷第五論

八珍湯

加味逍遙散

加味歸脾湯

三方見二十四卷第四論

四物湯

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

四方見二十四卷第六論

六味丸

方見二十四卷第十一論

羌活勝濕湯

方見前

大防風湯

方見二十四卷第九論

婦人血虛癭瘰瘡痒方論第三

婦人血虛方

薛氏醫案卷之四

婦人瘡痒癩癧五心煩熱乃血風攻症用人參荆芥散消風散
逍遙散大抵因體虛風寒相搏赤屬血分而白屬氣分也經云
汗出見濕乃生痲凡人汗出不可露卧沐浴使人身振寒熱
致生風癩也。

愚按前症有身發疙瘩或如丹毒痒痛不常或膿水淋漓發
熱煩渴或頭目昏眩日晡益甚或寒熱發熱月經不調皆肝
經風熱血燥用加味逍遙散為主佐以四君芎歸若忿怒身
發疙瘩痛痒寒熱乃肝火血燥用加味小柴胡湯氣血俱虛
入珍加柴胡丹皮若夜間發熱作渴謔語乃熱入血室用小
柴胡加生地血虛四物合小柴胡後用加味逍遙散調理若
鬱結食少體倦內熱晡熱乃脾經血燥用加味歸脾湯寒熱
加山梔熟地若遊走瘙痒乃血風走注用何首烏散血虛道

逍散風熱消風散若專用風藥復傷陰血必致助癩等症

附治驗

一婦人身發疙瘩或如丹毒痒痛不常搔碎成瘡膿水淋漓
發熱煩渴頭目眩暈日晡益甚此血虛內熱之症以當歸飲
加柴胡山梔治之而愈
一婦人患前症肢體疼痛頭目不清自汗盜汗月水不調肚
腹作痛食少倦怠先用人參荆芥散後用逍遙散治之而痊
一婦人因忿怒身發疙瘩憎寒發熱余謂肝火用小柴胡湯
加山梔黃連治之而愈後口苦脇痛小便淋漓復用前藥全
一婦人患前症發熱夜間謔語此血分有熱以小柴胡湯加
生地治之而安後用四物湯加柴胡山梔丹皮而熱退又用
逍遙散全愈。

一室女年十四天癸未至身發赤斑痒痛左關脈弦數此因肝火血熱以小柴胡湯加山梔生地丹皮治之而愈若因怒而致者亦宜治以前藥治驗餘見二十四卷血風門

何首烏散 治皮膚瘙痒遊走無定

何首烏 防風 白蒺藜炒 枳殼麩炒

天麻 殭蚕 胡麻炒 羌蔚子

蔓荆子各一錢 茵陳五分 右水煎服

附方

四物湯

四君子湯 二方見二十四卷第六論

加味小柴胡湯

小柴胡湯 二方見二十四卷第六論

八珍湯

加味歸脾湯

加味逍遙散

逍遙散 四方見二十四卷第四論

消風散 方見二十四卷第七論

當歸飲 方見二十四卷第六論

人參荆芥散 方見五卷第三論

婦人虛風頭目眩暈方論第四

婦人頭眩由氣虛風入於腦循脈引於目系目系急而然也邪甚則必癩素問云頭痛癩疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎狗蒙招搖目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則暈

婦人虛風 婦人虛風 婦人虛風

狗蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀故肝厥頭痛不同也。

愚按丹溪先生云眩者言其黑運旋轉其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟船之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也若風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也若鬱結生痰而眩暈者此七情虛火上逆也若淫慾過度而眩暈者此腎虛氣不歸源也若吐衄漏崩而眩暈者此肝虛不能攝血也有早起眩暈須臾自定者元氣虛也正元飲下黑錫丹傷濕頭暈用腎著湯加川芎有痰用青州白丸子頭風風熱也久則目昏偏頭風相火也久則目緊便澀皆宜出血以開表之竊謂前症肝虛頭暈用釣藤散腎虛頭暈六味丸頭暈吐衄養正丹不應入味丸血虛

四物參苓白朮不應當歸補血湯氣虛四君歸芪不應益氣湯肝木實瀉青丸虛用地黃丸不應川芎散脾氣虛二陳參朮柴胡升麻不應益氣湯加茯苓半夏脾胃有痰半夏白朮天麻湯風痰上壅四神散發熱惡寒八物湯七情氣逆四七湯傷濕而暈除濕湯。

附治驗

一婦人素頭暈不時而作月經遲而少此中氣虛弱不能上升而頭暈不能下化而經少用補中益氣湯而愈後因勞仆地月經如湧此勞傷火動用前湯加五味子一劑而愈前症雖云氣無所附實因脾氣虧損耳。

一婦人內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下詳見六卷第十六論養正丹治虛風頭眩吐涎不已蓋此藥升降陰陽補接真氣

非止頭眩而已。

黑鉛 水銀 硫黃研 硃砂各一兩研

右用砂器鎔鉛下水氣攪勻離火少時入硫砂再攪候冷為末飯丸菘豆大每服三十丸空心服煎棗湯下。

釣藤散 治肝厥頭暈。

釣藤鈎 陳皮炒 半夏薑製 麥門冬去心

茯苓 茯神去木 人參去蘆 甘菊花

防風各一錢 甘草各三錢 石膏煨二錢 右薑水煎

川芎散 治肝腎虛風頭目眩暈或頭痛耳鳴目系緊急。

小川芎 山藥 白茯神 甘菊花野菊不用 人參各半兩

山茱萸肉一兩 右為末每服二錢酒調日三服

三五七散 治八風五痺肢體不仁或風寒入腦頭痛目旋耳

內蟬鳴

附子炮 細辛各二錢 乾薑炮 山茱萸各五兩 防風

山藥炒各七兩 右為末每服二錢温酒調

四神散 治血風眩暈頭痛寒熱唾痰。

菊花 當歸酒洗 旋復花去梗 荆芥穗各一錢

右葱白三寸茶末一錢水煎

門方 治血風頭旋或不知人事用喝起草嫩心陰乾為末

酒服二錢其功甚効即前蒼耳散

治頭旋如天動地轉名曰心眩膽礬一兩細研用麩餅劑一箇

拌勻勒如骰子大瓦上焙乾每服一散為末燈心竹茹煎湯

調下此去痰之法當審而用之。

附方

正元飲 治下元虛敗痰氣上湧頭目眩暈臟腑滑泄時或自
活手足逆冷霍亂轉筋等症。

紅豆炒二錢 人參去蘆二兩 附子炮去皮一兩 茯苓

甘草炙各二兩 肉桂五錢 川芎 山藥薑汁炒

烏藥 乾葛各一兩 白朮二兩 乾薑炮三錢

黃芪炙一兩半 右每服三錢薑棗水入鹽少許煎送黑錫丹

黑錫丹 治真陽虛敗痰氣壅塞心火炎熾或赤白帶下等症

肉桂 沉香 附子炮去皮臍 葫蘆巴酒浸炒

破故紙炒 茴香炒 肉苳蔻麩裏炒 陽起石研水飛

金鈴子蒸去核 木香各一兩 硫黃 黑錫去灰各二兩

右將黑錫硫黃入銚內煉結砂子傾出地上去火毒研細餘藥為末和勻再研至黑光色酒糊丸桐子大陰乾入布袋擦

令光潤每服四十丸

腎者湯 方見十五卷第八論

青州白丸子 方見三卷第四論

六味丸

八味丸 二方見二十四卷第十一論

當歸補血湯 方見十九卷第六論

四物湯

四君子湯

補中益氣湯 三方見二十四卷第六論

二陳湯 方見二十四卷第五論

瀉青丸 方見二十四卷第三論

八物湯 方見二十四卷第四論

婦人頭方 四七湯方見十二卷第七論

除濕湯 即腎著湯加川芎

半夏白朮天麻湯 方見四卷第五論

婦人血風頭痛方論第五

許學士云婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車船之上蓋因肝經血虛而風邪襲之爾用川芎當歸散若頭痛連齒時發時止連年不已此風中腦謂之厥逆頭痛宜白附子散及灸曲鬢穴在耳掩前正尖上灸七壯左痛灸左右痛灸右

愚按東垣云足太陽頭痛脉浮緊惡風寒川芎羌活獨活麻黃為主手少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主足陽明頭痛身熱目赤鼻乾惡寒發熱脉浮緩而長升麻湯或石膏白芷為主手太陽頭痛有痰體重或腹痛為痰癖脉沈緩蒼

朮半夏南星為主足少陰經頭痛足寒氣逆為寒厥脉沉細麻黃附子細辛湯為主足厥陰頭項痛或吐涎沫厥冷脉浮後吳茱萸湯主之諸血虛頭痛當歸川芎為主諸氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣少加川芎蔓荊細辛痰厥頭痛半夏白朮天麻湯厥逆頭痛羌活附子湯如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治若脉雜亂而病見不一且補胃為主

附治驗

一婦人因勞耳鳴頭痛體倦用補中益氣加麥門五味而痊三年後得子因飲食勞倦前症益甚月經不調晡熱內熱自汗盜汗用六味地黃丸補中益氣湯頓愈經云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也故脾胃一虛耳目九竅皆為之病

婦人頭方 四七湯方見十二卷第七論 除濕湯 即腎著湯加川芎 半夏白朮天麻湯 方見四卷第五論 婦人血風頭痛方論第五 許學士云婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車船之上蓋因肝經血虛而風邪襲之爾用川芎當歸散若頭痛連齒時發時止連年不已此風中腦謂之厥逆頭痛宜白附子散及灸曲鬢穴在耳掩前正尖上灸七壯左痛灸左右痛灸右 愚按東垣云足太陽頭痛脉浮緊惡風寒川芎羌活獨活麻黃為主手少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主足陽明頭痛身熱目赤鼻乾惡寒發熱脉浮緩而長升麻湯或石膏白芷為主手太陽頭痛有痰體重或腹痛為痰癖脉沈緩蒼

婦人良方 高氏醫案卷之四

一婦人兩眉稜痛後及太陽面青善怒此肝經風熱之症用
選奇湯合逍遙散加山梔天麻黃芪半夏黃芩而愈此症大
治多致傷目或兩耳出膿則危矣頭痛手掉身麻見一卷第
川芎當歸散

川芎 一錢

當歸 酒拌

羌活

旋覆花

細辛

蔓荊子

防風

石膏 煨

藜蘆

荊芥穗

半夏麩

生地黄

甘草 炙各五分

右薑水煎

白附子散

治風邪風痰頭痛連齒不時舉發或遠年不愈

麻黃 根不去

烏頭 炮去皮

南星 炮各半兩

白附子 炮一兩

全蝎 炒五枚

辰砂

麝香

白薑 炮各一錢

右為末酒調服三分卧少時

川芎茶調散

治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛

薄荷 八兩

川芎

荊芥 各四兩

羌活

白芷

防風

甘草 炙各二兩

細辛 一兩

右為末每服二錢食後茶清調

如聖餅子加細辛其効甚速若頭痛筋攣骨重少氣噦噫腹滿
咳嗽煩冤其脈舉之則弦按之石堅由腎氣不足而逆上謂
之腎厥頭痛宜玉真丸硫黃丸

硫黃丸

治頭風不問新久服此除根屢用屢効

硫黃 二兩

硝石 一兩

右為末滴水丸指頂大每服一丸空心細嚼茶清下

一方用生菜煎汁仰卧注兩鼻數年之患一注即愈

一方治風邪犯腦患頭痛不可忍不問年歲

婦人良方

薛氏醫案卷之四

七

荒百八

硝石 人中白 腦子等分

右為未用一字吹入鼻中

都梁丸 治產前產後風邪所傷頭痛頭暈。方見後

附方

調中益氣湯 治氣血俱虛而頭痛

芍藥 三分 升麻 二分 黃芪 一錢 甘草 五分

五味子 七粒 當歸 白朮 人參 各三分

柴胡 橘皮 各二分 右水煎

半夏白朮天麻湯

半夏 一錢 白朮 神麴 炒各一錢 天麻

黃芪 人參 蒼朮 陳皮

澤瀉 茯苓 各五分 大麥蘖 一錢 乾薑 三分

黃柏 酒製 二分 右每服半兩水煎

羌活附子湯

麻黃 黑附子 炮 白芷 白殭蠶

黃柏 各三分 羌活 蒼朮 各五分 防風

甘草 升麻 各五分 黃芪 五分 右水煎服

選奇湯 治風熱上壅眉稜骨痛或頭目眩暈

羌活 防風 各三分 甘草 二錢 夏黃芩 酒製冬生冬炒 去之

右每服三錢水煎時服

吳茱萸湯

升麻湯

麻黃附子細辛湯 二方見六卷第十二論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

婦人復方 碎氏醫安卷之四

婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口苦月經不調此肝膽
經火兼傷脾胃用四君加柴胡升麻黃芪芍藥而愈後因勞
役怒氣嘔吐脇脹用六君子湯加山梔柴胡而安
一婦人因怒寒熱作渴左目緊小頭頸動掉四肢抽搐遍身
疼痛此血虛肝熱則生風也用加味逍遙加釣藤鈎數劑諸
症漸愈又用八珍湯而痊

六味丸 方見二十四卷第十四論
逍遙散 方見二十四卷第四論

頸項強痛方論第六

夫頸項屬足太陽膀胱足少陰腎二經相為表裏若感風寒濕
氣則發熱惡寒頸項強急腰背反張瘳癢口噤脉沉遲弦細新
產血虛出汗多患此症若因斲睡失枕而致用三五七散追風
散若風散所傷用都梁丸木瓜煎

愚按東垣云肩背痛不可回顧此手太陽氣鬱而不行以風
藥散之竊謂前症若因肝木自旺用瀉青丸精血不足六味
丸風熱淫肝加味道遙散怒動肝火加味小柴胡湯肝經血
虛加味四物湯腎不能生肝六味丸膀胱氣滯羌活勝濕湯
大抵肝火旺則肝血虛而筋燥頸項強急或腰背反張或火

用拳擊或頸項等處結核

附治驗

婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口苦月經不調此肝膽
經火兼傷脾胃用四君加柴胡升麻黃芪芍藥而愈後因勞
役怒氣嘔吐脇脹用六君子湯加山梔柴胡而安
一婦人因怒寒熱作渴左目緊小頭頸動掉四肢抽搐遍身
疼痛此血虛肝熱則生風也用加味逍遙加釣藤鈎數劑諸
症漸愈又用八珍湯而痊

追風散 治風邪所乘頭目眩痛口眼歪斜牙關緊急或百節
疼痛鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙癢面若蟲行

- 川烏 炮去皮 防風
- 石膏 煨 川芎
- 甘草 炙 荆芥穗
- 白僵蠶 炒去絲 天南星

婦人良方

醫方類聚卷之四

羌活

地龍 去土

白附子 炮

全蝎 去尾

白芷

草烏 炮去皮

沒藥 研

乳香 研

雄黃

研各一錢

右為末每服五分用清茶少許食後臨卧調下

都梁丸

治諸風項背不利頭目眩暈腦門作痛或產前產後

傷風頭目暈重血風頭痛用白芷末蜜丸彈子大每服一丸

細嚼荆芥煎湯下

木瓜煎

木瓜

不犯鉄器二個

沒藥 二兩

乳香 一兩

右以木瓜去核入二藥仍蓋合之飯上蒸爛研成膏每服三

匙生地黃汁半盞無灰酒和服有人患此自午發至夜方止

余曰此足少陰經症發必先從足起蓋足少陰之筋自足大

指起至頭筋者肝之合也日中至夜天之陽陽中之陰又曰

陽中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶昇法云

至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受病氣故發於是時子受

此方三服而愈

附方

瀉青丸

方見二十四卷第三論

六味丸

方見二十四卷第十一論

八珍湯

加味道遙散

二方見二十四卷第四論

加味小柴胡湯

方見二十四卷第二論

加味四物湯

四君子湯

二方見二十四卷第六論

羌活勝濕湯

方見前

婦人良方

薛氏醫案卷之四

六

荒百十一

婦人腰痛方論第七

夫腎主於腰。若婦人腰痛，由腎氣虛弱，外感六氣，內傷七情，皆能致之。如因風邪所乘，用小續命湯加桃仁、杜仲。如因寒濕所傷，五積散、腎經虛弱、青娥丸。如因氣血凝滯，用牽牛、茴香之類。愚按陳無擇先生云：若形體虛羸，面色黧黑，腿足痿軟，不能行立，此失志所為也。腹急脇脹，目視眈眈，宗筋弛縱，白淫下注，此鬱結所為也。肌肉不仁，飲食不化，腸胃脹滿，閉墜腰脇，此憂思所為也。皆屬內因。若腰冷作痛，身重不渴，小便白利，飲食如故，因勞汗出，腰痠脇痛，或墜墮血滯，或房勞精竭，皆屬內外因也。竊謂前症失志、腎虛熱者，六味丸、腎虛寒者，八味丸、鬱怒傷肝，實用龍膽瀉肝湯。虛用六味丸、補肝散。憂慮傷脾者，歸脾湯。逍遙散。腎着者，寒則朮附湯。虛則腎着湯。腰

膝痛者，寄生湯。養腎散。瘀血滯者，如神湯。舒筋湯。房勞者，如神湯。青娥丸十補丸。

附治驗

一婦人腰痛三年矣，每痛必面青頭暈目緊，余以為肝脾氣虛，用補肝散而愈。三年後因勞役患頭痛，兼惡心，用補中益氣湯加茯苓、半夏、蔓荊子而愈。
一婦人苦腰痛數年不愈，余用白朮一味大劑服，不三月而痊，乃胃氣虛閉之症，故用白朮也。

如神湯 治男婦腰痛

延胡索

當歸

桂心 等分

右為末，每服二錢，溫酒調，甚者不過數服。

獨活寄生湯 治足三陰虛風濕所侵，脚膝歷節作痛。

婦人良方

李氏醫案卷之四

七

七百七

婦人經水不調 婦人經水不調 婦人經水不調

獨活 桑寄生 續斷 酒炒 杜仲 薑汁炒

細辛 牛膝 秦艽 茯苓

白芍藥 炒 桂心 川芎 防風 粉草 炙各五分

人參 熟地黃 自製 當歸 酒拌

舒助散 治風寒傷腎脊作痛或閃挫氣滯血瘀亦良

玄胡索 炒 杜仲 薑汁炒 官桂 去皮 羌活

芍藥 等分 右為末每服二錢酒調

又方橘核炒木香研酒下 附方

濟生戒附湯 治寒濕傷腎腰重冷痛小便自利或手足逆冷

附子 炮 白朮 各一兩 杜仲 薑汁炒 右每服四錢薑水煎

三因腎着湯 治腎虛為病身重腰冷如水洗狀不渴而小便

自利飲食如故腰以下冷痛如帶數千錢

茯苓 白朮 各四兩 乾薑 炮 甘草 炙各二兩

青蛾丸 治腎虛腰痛或外邪所侵腰腿或筋骨作痛

胡桃仁 二十枚 蒜 研膏 破故紙 酒浸炒 杜仲 去皮薑汁炒 一斤

右為末蒜膏丸桐子大每服五十九空心醋湯下 蒜不用亦可

六味丸

十補丸 三方見二十四卷第十一論

八味丸 三方見二十四卷第八論

龍膽瀉肝湯 方見七卷第十七論

補肝散 方見七卷第十七論

婦人腰脚疼痛方論第八
歸脾湯
如月良方
醫林秘傳卷之四
九

歸脾湯

逍遥散 二方見二十四卷第四論

養腎散 方見後

婦人腰脚疼痛方論第八

腎主於腰脚，女人胞絡係焉。若勞傷腎氣，風冷客於脈絡，故腰脚作痛也。治當補元氣為主，佐以祛邪之劑。

愚按前症若真陽衰敗，寒邪乘襲，手足俱冷，頭痛惡寒，或嘔吐腹痛等症，宜用本方。若氣血虛弱，寒邪所感，惡寒發熱，頭痛作渴，或嘔吐腹痛等症，宜用五積散。若元氣虛弱，濕熱所傷，兩脛腫痛，寒熱身疼，或嘔吐不食等症，宜用檳蘇敗毒散。若脾胃虛弱，元氣下陷，寒熱嘔吐，發熱頭痛，喘渴體倦等症，宜用補中益氣湯。若足三陰精血虧損，陰火內動，內熱晡熱。

作渴痰甚，小便頻數等症，宜用六味地黃丸。右足三陰陽氣虛敗，惡寒發熱，手足俱冷，吐痰不食，二便滑數等症，宜用八味地黃丸。

附治驗

一婦人先腰膝作痛，後兩腿亦痛，余以為足三陰虛寒，外邪所傷，用小續命湯及獨活寄生湯，或作或止。所用飲食極熱，腹中爽快。余曰：邪氣去而元氣虛寒也。診其脈果沉細，用養腎散漸愈。又用十補丸而痊。

一婦人亦患同前，但發熱作渴，喜冷飲食，脈洪數，按之遲澀。余以為一虛有熱，用羚羊散去檳榔，加白朮茯苓數劑，更用加味逍遥散而痊。

一婦人患前症時，或腿膝作痛，脈浮數，按之遲緩，此元氣虛。

婦人良方
薛氏醫案卷之四
九
卷百十四

婦人風方
而風濕所乘用獨活寄生湯頓愈又用瓜珍湯而安
一婦人因怒患前症寒熱往來口苦不食脯熱內熱余以為
肝火血虛先用小柴胡山梔頓愈又用加味道遙散而愈
一婦人患前症寒熱頭痛殊類傷寒此寒邪之症用栝蘇敗
毒散而安又用補中益氣調補而愈

骨碎補散 治陽氣虛弱外隲所侵腰脚疼痛腹脇拘急

寒傷腎膀胱虛寒之良藥用之得宜殊有神效

附方

五積散 方見後

栝蘇敗毒散 方見二十四卷第十論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

十補丸

六味丸

八味丸 三方見二十四卷第十一論

小續命湯 方見前

獨活寄生湯 方見前

羚羊角散 方見前

加味道遙散

婦人風方

婦人風邪脚氣方論第九
八珍湯二方見二十四卷第四論

小柴胡湯方見二十四卷第二論

婦人風邪脚氣方論第九

婦人脚氣乃肝脾三經或胞絡氣虛為風毒所搏腎而患蓋胞絡屬於腎主於腰脚三經絡脉起於足中指若風邪客於足從下而上動於氣故名脚氣皆由六淫七情或產後或經行風毒相搏其症或頭痛身熱肢節作痛或大便秘結小便不利或脚膝緩弱足脛腫滿或腰膝枯細忪悸嘔逆或小腹不仁舉體轉筋或胸滿氣急遍體酸痛用香蘇散加檳榔生薑若寒中三陽必冷用小續命湯若暑中三陰必熱用小續命湯去附子大躁者紫雪最良無紫雪以自合薄荷煎冷水調服大便秘用脾約丸麻仁丸三和散補藥淋洗皆大禁也。

愚按嚴用和先生云前症初患不覺因他病乃發先從脚起或緩弱痺痛不能行履或兩脛腫滿或足膝細小或心中怔忡或小腹不仁或舉體轉筋或見食作嘔或胸滿氣急遍體酸痛其脉浮而弦者因於風濡而弱者因於濕洪而數者因於熱遲而澁者因於寒男子由於腎氣虧損女子血海虛弱七情所致竊謂前症若足三陰虛弱用還少丹若脾氣虛寒用八味丸若飲食停滯腎腿痠脹浮腫作痛此脾氣下陷用六君子少加柴胡升麻不應須用八味丸若發熱口渴月經不調兩腿無力此足三陰血虛火燥用六味八味二丸兼服前症西方之人多患之因素食乳酪脾胃壅滯脛足腫滿至於南方亦有因膏粱厚味濕熱下注而患者故古人謂之壅疾所用之方多疎通發散之劑然感於房勞過度虧損三陰

治法又當以固本為主故六物附子為元氣虛弱寒邪內侵之聖藥所屬各經等方附後。

附治驗

一婦人兩膝赤痛寒熱口苦嘔吐懶食面色青黃或赤此肝木乘脾土用小柴胡湯加山梔升麻茯苓二劑頓愈又用六君子湯加柴胡山梔全愈。

一婦人飲食勞役兩膝兼腿疼痛或時寒熱余以為脾虛濕熱下陷用補中益氣湯加山梔茯苓半夏治之而痊後復作用六君子湯加柴胡山梔全愈。

一婦人經行後寒熱晡熱兩腿作痛此肝經血虛也用加味逍遙散加山梔治之而愈後因勞日晡內熱或用四物黃柏知母之類前症益甚更加食少作瀉余以為元氣下陷前藥

復傷先用六君子湯加補骨脂二劑調補脾胃而消止食後又用補中益氣湯升舉元氣而痊。

大腹皮散 治腳氣版節煩疼心神壅悶或頭暈喘嗽不食

大腹皮

紫蘇

木通

桑白皮炒

羌活

荊芥

赤芍藥

青皮

木瓜不犯鐵器

獨活各五

枳殼炒

右薑蔥水煎

半夏散 治腳氣上攻心腹脹滿飲食不下嘔吐不止

半夏薑製

陳皮

人參

大腹皮

桂心各三

檳榔一錢

赤茯苓

紫蘇各五

右薑水煎

桑白皮飲 治兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿或喘嗽痰湧嘔

吐不食

婦人良方

薛氏醫案卷之四

三

荒百七

桑白皮

防已 酒拌

檳榔

防方

杏仁 去皮

大腹皮

青皮 各五分

赤茯苓 各一錢

紫蘇子 炒

右薑水煎

木香

木通 去節

大黃左經湯

治四氣乘注足陽明經以致膝腿作痛或足脛赤腫嘔吐不食大小便秘結或惡食喘急自汗等症。

細辛

甘草 炙

茯苓

前胡

羌活

枳殼 麩炒

大黃 煨

厚朴 薑製

黃芩 炒

杏仁 去皮尖

右每服五錢薑棗水煎

麻黃左經湯

治風寒濕乘注足太陽經以致腰足攣痺肢節重痛或增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭疼。

麻黃

乾薑

細辛

白朮

茯苓

甘草 炙

防已

防風

桂枝

羌活

右每服半兩薑棗水煎服

半夏左經湯

治足少陽經為風寒暑濕乘注以致惡寒發熱腰腿疼痛或頭目眩暈嘔吐不食或熱悶心煩腿痺不隨。

半夏 薑製

乾葛

細辛

白朮

麥門冬 去心

茯苓

桂枝

防風

乾薑 炮

黃芩 炒

小草

甘草 炙

柴胡

右每服半兩薑棗水煎熱開加竹瀝喘急加杏仁桑白皮六物附子湯 治四氣乘於足太陰經以致骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利或手足浮腫。

清人

薛氏醫案卷之四

三

卷百十八

婦人良方
附子炮
桂
防已各四錢
甘草炙二錢

白朮
茯苓各三錢
右每服半兩薑水煎

換腿丸 治足三陰經為風寒暑濕之氣所乘發為攣痺緩縱
或上攻胸背下注脚膝疼痛發熱行步艱辛

薏苡仁 南星 石楠葉 石斛

檳榔 草薢 酒拌 川牛膝 酒浸 羌活

防風 木瓜 各四兩 黃芪 炒 當歸 酒拌

天麻 續斷 酒炒各二兩

右為末酒糊丸如桐子大每服五十九粒鹽湯下

五積散 治風寒所傷以致脚氣疼痛或寒熱拘急嘔吐不食等症

當歸 酒拌 芍藥 炒 川芎 炮薑

人參 茯苓 陳皮 桔梗 炒

厚朴 薑炒 白芷 蒼朮 半夏 薑製

肉桂 麻黃 甘草 炒 右薑棗水煎

當歸拈痛湯 治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸膈不利或兼遍身作疼足脛腫痛不可忍者或濕熱流注下部瘡瘍腫

羌活 人參 苦參 酒製 升麻

乾葛 蒼朮 各一錢 甘草 炒 黃芩 酒炒

當歸 茵陳 酒製各五分 防風 知母 酒炒

澤瀉 豬苓 白朮 各四錢 右水煎服

紫蘇子湯 治脚氣上攻陰陽交錯清濁不分上重下虛中滿喘急嘔吐自汗無復紀律

紫蘇子 炒 半夏 薑製各二兩 前胡 厚朴 薑製

婦人良方
卷之四
二五

婦人良方

薛氏醫按卷之四

三

九

甘草

當歸

酒洗各

桂心

陳皮

右每服四錢入薑棗煎服

還少丹

方見二十三卷第四論

六味丸

八味丸

方見二十四卷第十一論

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

六君子湯

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

加味道遙散

方見二十四卷第四論

婦人良方卷之五

薛氏醫按

臨川陳自明編

吳郡薛

已註

新

都

吳中珩校

婦人勞瘵各症方論第一

夫骨蒸殭殍復連尸症勞瘵蟲瘵毒瘵熱瘵冷瘵食瘵鬼瘵瘵者注也自上注下與前人相似故曰瘵其變有二十二種或三十六種或九十九種令人沉沉默默寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁或腹中有塊或腦後兩邊有結核咳嗽膿血下利羸瘦死而傳瘵甚至滅門更有蜚尸遁尸寒尸喪尸尸注謂之五尸人為其瘵者不自知所苦雖有狸骨獺肝天靈蓋等方未嘗見効唯崔氏灸法早用有濟若寒熱自汗面白目乾口苦神昏善恐不能獨卧傳在肝也若寒熱面黑鼻燥善忘大便秘瀉口舌生

婦人良方 卷之五
瘡傳在心也。若寒熱面青唇黃舌本硬強言語不出飲食無味
羸瘦吐涎傳在脾也。若寒熱面赤鼻白乾燥毛析咯嗽喘急吐
涎膿血傳在肺也。若寒熱面黃耳焦脚脰痠痛小便白濁遺瀝
腹痛傳在腎也。

愚按前症誠然有之。故葛仙翁用獺肝一具陰乾杵末水下
方寸七日三服未愈再作朱宣和間一法師善考訊鬼怪時
一婦以疾投狀既而如有鬼祟所附曰非我為患乃病人命
自衰爾渠今已成蟲食肺故令吐血聲嘶又屢掠問彼所畏
何物云以獺爪為末酒服之則去矣。患家如其言得愈。獺爪
即獺肝之類歟。玄珠云蟲瘵多有兄弟互相傳染甚至絕戶
此乃冤牽相纏及風水所致。雖有符文法水下蟲之方然蟲
去而人亦凶。若能平素保養亦可免矣。竊究濟生微旨云益

氣補肺益精補腎皆資其化源也。蓋人之精血常不足加之
數奪其真資化失常則胃氣不固精氣滑脫不能上接陽氣
故頭重或痛氣弱而食少元氣下陷脈即微弱外散欲絕而
虛洪或見損脈此實元氣不足之所致非有外感賊邪之病也。

附治驗

一婦人素勤苦因喪子飲食少思忽吐血甚多而自止。此後
每勞則吐數口瘵症已具形體甚倦。午前以補中益氣午後
以歸脾湯送地黃丸而愈。

一女子患前症反其唇視有白點。此蟲蝕肺也。余曰急尋獺
肝治之不信。果咳膿而歿。後聞其兄弟三人皆夭於此症。大
凡久嗽當視其兩唇若上唇有點蟲蝕上部下唇有點蟲蝕

下部

二十四種蒸病論新附

所謂勞蒸者。毛折髮焦。肌膚甲錯。其蒸在皮。外熱內寒。身振肉
爛。其蒸在肉。髮焦鼻衄。或復尿血。其蒸在血。身熱煩躁。痛如針
刺。其蒸在脉。爪甲焦枯。眼昏脇痛。其蒸在髓。頭眩熱悶。延濁眩
淚。其蒸在腦。男子失精。女子白淫。其蒸在玉房。乍寒乍熱。中脘
煩悶。其蒸在三焦。小便赤黃。凝濁如膏。其蒸在膀胱。大便秘泄。
腹中雷鳴。其蒸在小腸。大腹隱痛。口舌乾疼。其蒸在大腸。口鼻
乾燥。腹脹自汗。睡卧不安。其蒸在胃。口苦耳聾。兩脇下痛。其蒸
在膽。裏急後重。肛門秘澁。其蒸在廣腸。小腹疝痛。蒸脉縱緩。陰
氣自強。其蒸在宗筋。眩暈下淚。躁怒不常。其蒸在肝。舌黑氣短。
煩悶灑然。其蒸在心。唇乾口瘡。胸腹脹悶。畏寒不食。其蒸在脾。
咳嗽喘滿。咯痰吐血。聲嘶音啞。其蒸在肺。耳輪焦枯。脚氣酸痛。

其蒸在腎。情想不寧。精物時下。其蒸在右腎。心膈噎塞。攻刺
痛。俯仰煩寃。其蒸在隔。此症蟲多。嚙心肺。治當絕其根也。

愚按醫林集要云。前症若蒸肺。用天麥門冬。桔梗紫苑。烏梅
肉。若蒸皮。石膏桑白皮。若蒸氣喘促。鼻乾身熱不安。人參黃
芩。梔子。若蒸大腸。大黃芒硝。若蒸心。黃連生地黃當歸。若蒸
脉。蒸血皆用生地黃當歸。童子小便。若蒸小腸。赤茯苓木通
生地黃。若蒸脾。芍藥木瓜苦參。若蒸肉。芍藥若蒸胃。石膏粳
米。大黃芒硝。乾葛。若蒸膽。柴胡瓜萸。若蒸三焦。石膏竹葉。若
蒸肝。川芎當歸前胡。若蒸筋。川芎當歸。若蒸腎。生地黃石膏
知母寒水石。藁本。若蒸腦。生地黃防風。若蒸髓。天門冬當歸
生地黃。若蒸骨。鱉甲地骨皮。當歸牡丹皮。生地黃。若蒸玉房。
知母黃柏。當歸芍藥。若蒸脬。澤瀉茯苓。生地黃沉香。滑石。若

蒸膀胱澤瀉滑石凡此諸蒸虛勞熱病食肉與油膩房勞飲酒而成者久蒸不除變為疝症即死亦有瘧疾久而不愈以致咳嗽失治漸成骨蒸勞瘵之症當推標本而治之

崔氏灸骨蒸勞瘵用細繩一條男左女右從足大姆指頭齊重起從脚板底當脚跟中心向後引繩循脚肚貼肉直上至曲脊中橫紋截斷又令患人解髮分兩邊見頭縫自顙門平分至腦後乃平身正坐取前所截繩一頭從鼻端齊引繩向上直循頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引繩向下至情盡處當脊骨以黑點記此黑點不別取一繩令患人合口將繩按於口上兩頭至吻却鈞起繩中心至鼻端根下如人字樣齊兩吻截斷將此繩展直於前在脊骨上黑點處取中橫量勿令高下於繩兩頭以白圈記之
此是灸穴初灸七壯累灸至百壯此名患門穴初灸此訖次令其人

平身正坐稍縮臂膊取一繩透項向前雙垂與鳩尾齊鳩尾是無是岐骨骨前兩歧骨骨間量取一寸即是鳩尾也即截斷却背翻繩頭向項後以繩中停取心正令當喉嚨結骨上第二次墨點處摺中橫量繩兩頭以白圈記之此是灸穴初灸七壯至百壯又將第二次量口繩摺中當脊直上下豎停中心在第二次墨記上下繩頭盡處以白圈記之此是灸穴初灸七壯至百壯此縱橫四方凡四穴是名曰四花穴初灸各七壯凡灸時可用若瘡愈其疾未効依法復灸故云累灸至百壯凡灸時可用若婦人纏足短小難為量只取膏肓膈灸之在第四推次灸四花穴道軒用此法灸之無有不効者
神仙秘法 取勞瘵須先擇良日焚香禱祝令病人面向福德

方服神効

青桑枝

楊柳枝

梅枝

槐枝

俱各東者

葱白七莖 青蒿一握如無子代 阿魏一錢 真安息香一錢

右用童便一升半煎至一升入阿魏再煮數沸入硃砂半兩小檳榔半兩麝香五錢五更并天明各進一服下白蟲尚可治以淡粥補之用藥調理三五月再服以除病根如蟲黑已入腎不可救矣

治心胸痛引兩脇昏悶聲濁熱壅鼻衄或癆喘發熱

桑白皮炒 枳殼炒 木通 甘草各五分 右水煎服

溫金散 治肺嗽惡寒發熱唾痰皮毛焦燥

甘草炒 黃芩炒 桑白皮炒 防風各一兩 杏仁三十七粒製 人參 茯苓各半 麥門冬三錢

右前五味用米泔浸一宿曬乾入人參等三味每服三錢入

蠟一二豆大水煎

桔梗飲子 治心氣不足解倦溢血或喘嗽痰甚

桔梗炒 甘草炒 黃芪炒 人參 麥門冬各一錢 青皮三分 右水煎服

治咽喉痛

百藥煎去黑皮 硼砂 甘草 生白礬等分

右為末每服一二錢食後用米飲調細呷嚥之

含化丸 治肺間邪氣胸中積血作痛失音痰喘

蛤蚧一雙去足炙 訶子去核 阿膠粉炒 麥門冬去心 細辛 甘草炒 生地黃各半兩

右為末蜜丸次實大食後含化一丸

河車丸 治一切勞瘵虛損骨蒸等疾

紫河車

一具初生男胎者尤良洗淨汙爛本草云人肉治瘰癧病胞衣主勞損面黧皮黑諸疾瘦悴

白茯苓

半兩 人參 一兩

乾山藥

二兩

右為末麩糊和入河車加三末九梧子大每服三五十九空

心米飲下

補肺湯

治勞嗽五臟虧損肺熱發熱盜汗自汗吐痰喘嗽

桑白皮

炒

熟地黃

錢各一

人參

紫苑

黃芪

炒

五味子

炒各

右水煎入蜜少許食後服

養正膏

治傳尸出汗取虫辟邪

鱉甲

醋炒一兩

青蒿

一握

淡豆豉

三七

葱白

兩莖

安息香

一分

桃柳桑枝

各七

天靈蓋

用七蓋大一片酥炙

桃仁

四十九箇去皮尖雙仁

右隔夜以水一升浸至五更煎至半升入童便半升煎取四

合調檳榔麝香末各一錢日高時頓服以衣覆十指汗出

藕絲瀉下如蟲狀甚者旬日再服

阿膠丸

治勞嗽出血咯血發熱肺熱口渴盜汗

阿膠

炒

生地黄

卷柏葉

山藥

炒

大薊根

五味子

炒

雞蘇

各一兩

柏子仁

炒

人參

防風

麥門冬

去心各半兩

右為末煉蜜為丸彈子大每服一九細嚼麥門冬煎湯下

四君子湯加秦芫黃蠟水煎服尤妙治勞嗽咯血

神授散

治傳尸蟲用川椒二斤去核并合口者炒為末每服

一錢酒糊丸空心米飲下服盡見效

蘇合香丸

治傳尸骨蒸勞瘵疰疢鬼氣心痛

方見二卷第四論

附方

婦人更方

薛氏醫案卷之五

六

卷五

四君子湯

方見二十四卷第五論

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

歸脾湯

方見二十四卷第四論

六味地黃丸

方見二十四卷第十一論

婦人骨蒸勞方論第二

夫骨蒸勞者由積熱附於骨而名也亦曰傳尸。殭殭複連無辜其名不一。此病皆由脾胃虧損所致其形羸瘦腹脹泄瀉肢體無力傳於腎則盜汗不止脾膝冷痛夢鬼交侵小便赤黃傳於心則心神忪悸喜怒不時頰唇赤色乍熱乍寒傳於肺則胸滿短氣咳嗽吐痰皮膚甲錯傳於肝則兩目昏暗腸下妨痛閉戶忿怒五臟既病則難治療

愚按前症多因經行胎產或飲食起居七情而傷肝脾之所

致又或失於調攝或過於攻伐而成東垣先生云發熱之症肺熱者輕手乃得微按全無日西猶甚乃皮毛之熱其症喘嗽寒熱輕者用瀉白散重者涼膈散白虎湯地骨皮散心熱者微按之皮膚之下肌肉之上輕手乃得微按至皮毛則熱少加方按之則全不熱是熱在血脉也日中太甚其証煩心心痛掌中熱而噦用黃連瀉心湯導赤散硃砂安神丸脾熱者輕手捫之不熱重手按至筋骨又不熱不輕不重在輕重之間此熱在肌肉遇夜猶甚其証怠惰嗜臥四肢不收無氣以動用瀉黃散肝熱者按之肌肉之下至骨之上寅卯時猶甚四肢滿悶便難轉筋多怒多驚筋痿不能起於床用瀉青丸柴胡飲腎熱者輕手重按俱不熱加重手按至骨分其熱蒸手如火其症骨蒸如蟲蝕因熱不能起於床用滋腎丸此

治實熱之法也。竊謂肺經虛熱者，用人參補肺湯；脾氣虛而不能生肺者，用六君子湯；脾熱遺於肺者，用三黃丸；心經虛熱者，用補心湯；命門火衰不能生土者，用八味丸；肝虛不能生心者，用補肝散；腎剋心者，用附子理中湯；脾經虛熱者，用人參黃芪散；土剋水者，用承氣湯；脾不能培肝者，用六君子湯；元氣下陷及金不能生水者，俱用補中益氣湯；肺剋肝及腎經虛熱與腎不能肝者，俱用六味丸。

附治驗

一婦人發熱晡熱，盜汗自汗，殊畏風寒，飲食少思，或腹脹吞酸，或大便不實，此脾胃不足，諸經虧損。朝用補中益氣，夕用八珍湯，倍用參苓白朮各二十餘劑，諸症漸愈。因喪母哀傷，患盜汗，便血，用加味歸脾湯數劑而止，仍用前二藥，又五十

餘劑，尋愈。月經兩月而至，適因怒去血過多，發熱作渴，酸倦，頭目暈痛，用逍遙散加味歸脾湯二藥調補而痊。

一婦人盜汗自汗，遍身酸疼，五心發熱，夜間益甚，或咳嗽咽乾，或盜汗自汗。月經兩三月一至，用加味逍遙散六味地黃丸兼服，臨臥又服陳朮丸三月餘，諸症悉愈。其經乃兩月一至，又服兩月而痊。陳朮丸，即陳皮白朮為丸。

一婦人患前症，食少倦怠，肌肉消瘦，日晡發熱，至夜益甚。月水過期，漸至不通，時發渴躁，誤用通經之劑，熱倦愈重，飲食愈少。余用八珍湯加升麻丹皮山梔柴胡治之，熱漸退，又用八珍丹皮軟柴胡調理而愈。

一婦人飲食少思，胸膈不利，或胸中作痛，或大便作瀉，或小便不利，用逍遙散加山梔伏神遠志木香而愈。後因怒寒熱

往來倦怠煩熱以前藥加炒黑黃連三分頓愈用八珍湯調理而愈後因怒吐血躁渴用人參五錢茯苓當歸各三錢陳皮甘草各一錢治之而愈

一婦人胸脇作痛內熱晡熱月經不調余謂鬱怒傷損肝脾朝用歸脾湯以解鬱結生脾氣夕用加味逍遙散以生肝血清肝火半載而愈後因飲食失調兼有怒氣月經如注脈浮洪而數用六君子加芎歸炮薑一劑而血止用補中益氣加炮薑茯苓半夏治之而元氣復又用歸脾湯逍遙散調理而康。

一婦人內熱口乾頭暈吐痰帶下體倦飲食少思余謂脾氣虛弱而不能生肺金用補中益氣湯加茯苓半夏脾氣漸復飲食漸進諸症漸退再用加味逍遙散治之尋愈。

一婦人腹脹脇痛內熱晡熱月經不調不時吐痰或用化痰行氣之劑胸膈不利余謂脾氣鬱結肝經血虛朝用歸脾湯夕用加味逍遙散百餘劑而諸症漸愈又因飲食停滯或用峻厲之劑口乾體倦余用七味白朮散補中益氣加茯苓半夏中氣漸愈又以補中益氣及八珍湯兼服而痊

一婦人患前症將愈因怒胸膈不利飲食少思服消導利氣之藥大便下血余曰此脾氣復損不能攝血歸源用補中益氣加茯苓半夏炮薑血止用八珍加柴胡炒桅熱退用八珍湯逍遙散而痊

一婦人肌體倦瘦口乾內熱盜汗如洗日晡熱甚用參芪歸朮茯神遠志棗仁麥門五味丹皮龍眼肉炙草柴胡升麻治之獲痊後因喪子懷抱不舒腹脹少寐飲食少思痰涎上湧

月經頻數余為鬱悶傷脾不能攝血制涎歸源耳用補中益氣濟生歸脾漸愈又用八珍湯調理而痊。

一婦人發熱口乾月經不調肢體無力腿痛體倦二膝浮腫余作足三陰經血虛用六味丸逍遙散兼服兩月形體漸健飲食漸進膝腫漸消而痊。

一婦人日晡熱甚月水不調飲食少思大便不實胸膈痞滿頭目不清肢體倦怠發熱煩躁余為七情肝脾虧損之症用濟生歸脾湯加味道遙散補中益氣湯調治元氣漸復而愈。一婦人月經不調晡熱內熱飲食少思肌體消瘦小便頻數或用清熱生血之劑月經不行四肢浮腫小便淋瀝余朝用金匱加減腎氣丸夕用歸脾湯漸愈又用八珍湯兩月而愈。一婦人胸膈膨滿小腹悶墜內熱晡熱飲食不甘體倦面黃

日晡則赤灑浙惡寒此脾肺氣虛先用六君子加川芎當歸諸症漸愈又用補中益氣加茯苓半夏諸症全愈後飲食失節勞怒惡寒發熱不食用加味小柴胡一劑而熱退用逍遙散歸脾湯調理而康。

天靈蓋散 治骨蒸四肢無力晡熱頰赤食少心煩

天靈蓋 酥炙 安息香 地骨皮 當歸

山梔仁 人參 貝母 去心 黃芪

桃仁 去皮尖雙仁炒黃 檳榔 各一兩 鱉甲 醋炙

柴胡 生地黃 赤茯苓 麥門冬

阿魏

右每服五錢桃柳枝各七寸薑五片蔥白五寸童便煎
愚按醫學綱目云柴胡本經並無一字治勞熱今治勞方鮮

婦人良方 有不用者誤世多矣。凡此症乃真臟虧損而虛熱。王海藏先生云：苟無實熱而用柴胡不死，何待？蓋柴胡乃肝膽之藥，雖能升胃氣下陷，每劑不過分許，而可多用哉。產後氣血虛熱，尤宜禁忌。

癩肝丸 治骨蒸勞熱或潮熱發熱，體瘦煩疼，不欲飲食。

癩肝 一具 蟹甲 醋炙 柴胡 各一兩半 硃砂 另研

升麻 天靈蓋 酥炙 犀角 鎊 桃仁 去皮尖雙

梔子仁 炒 地骨皮 知母 各一兩 黃芪 炒

甘草 炒各五錢 麝香 研一錢

右為末，煉蜜丸。桐子大，每服三十九丸，空心食。

治肝臟中風，心神煩熱，言語蹇澁，不得安臥。

竹瀝 荆瀝 葛根 生薑汁

白蜜 各一合 右和勻，頻服之。

麻黃散 治心臟中風，多汗，惡風，善怒，心神顛倒，言語蹇澁，舌

強口乾，面赤，頭痛，身發熱，胸背拘急，手心熱甚，偃臥不側。

松悸恍惚，或寒，鷓心驚悸，口喎，昏昧，好笑。

麻黃 去節 白朮 防風 川芎

甘草 炙 漢防己 當歸 人參 各一錢

羌活 遠志 去心 茯神 去木 各一錢 升麻 八分

桂心 半錢 右水薑煎入竹瀝半盞，再煎一二沸。

茯神散 治同前，或四肢沉重，精神不安，或痰氣不利。

茯神 去木 羌活 麻黃 去節 龍齒 另研

赤芍藥 甘草 炙各一錢 蔓荊子 薏苡仁

麥門冬 去心 人參 去蘆 防風 去蘆 犀角屑 各七分

婦人良方 薛氏醫安卷之五 十一 卷百三

右薑水煎服

十全大補湯 治氣血虛熱加柴胡地骨皮秦芫

秦芫散 治五心煩熱頰赤

逍遙散 治血虛五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口

燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧

痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸方見二十四卷第四論

枳殼散 治婦人手足煩熱盜汗肌痺經候不調煩倦心胸滿

悶狀如勞氣

枳殼去穢麩炒二兩半夏麩炒赤芍藥各一兩柴胡

黃芩炒各一兩右為末每服三錢薑棗水煎服

華陀解勞生肌進食活血養心石膏每服水和錢許甚驗

青蒿散 治體倦虛疼勞熱九月採青蒿去梗用童子小便浸

三日曬為末每服二錢烏梅一箇煎湯調服

清心蓮子飲參蘇飲加黃芩麥門冬並治五心煩熱手足熱甚

附方

加味小柴胡湯 方見二十四卷第二論

柴胡飲 治肌熱積熱或汗後餘熱脈洪實弦數

柴胡 人參 黃芩 芍藥

甘草 當歸 大黃各二錢半 右薑水煎服

瀉白散 治肺臟氣實心胸壅悶咳嗽煩喘大便不利

桔梗炒 地骨皮 甘草炙 瓜蒌仁

升麻 半夏薑製 桑白皮炒 杏仁去皮尖

右每服四錢薑水煎

導赤散 治心虛蘊熱小便赤澀或成淋瀝口舌生瘡等症

如人良方 薛氏醫抄卷之三

生地黄

木通

甘草等分

右每服三錢竹葉煎水

瀉黃散 治脾熱口臭咽乾或口舌生瘡發熱作渴

石膏

防風

藿香等分

甘草

山梔子炒

右每服三錢水煎

涼膈散 治上焦積熱煩躁作渴頭目昏噴咽喉腫痛便溺赤

澁語言謔妄等症

大黃 煨

朴硝

甘草各二兩

連翹四兩

梔子仁炒

黃芩炒

薄荷葉各一兩

右為末每服二三錢竹葉七片水煎溫服

白虎湯 治胃熱作渴暑熱尤効又治熱厥腹滿身難轉側面

垢譫語遺溺手足厥冷目汗脈沉滑大便泄清水無度

知母

石膏各三兩

粳米半合

右水煎服

附子理中湯

治脾胃虛寒手足厥冷飲食不入或腹鳴切痛

嘔逆吐瀉

方見二十一卷第八論

硃砂安神丸

方見二十一卷第十論

地骨皮散

方見六卷第三論

黃連瀉心湯用一味黃連為末每服一錢以白湯調下

瀉青丸

方見二十一卷第三論

承氣湯

方見七卷第十論

滋腎丸

方見八卷第一論

人參補肺湯

方見二十四卷第十二論

補中益氣湯

六君子湯

方見二十一卷第六論

三黃丸

方見八卷第八論

婦人良方 薛氏醫案卷之五

補心湯 方見三卷第十二論

六味丸

八味丸 二方見二十四卷第十一論

補肝散 方見七卷第十七論

人參黃芪散 方見十三卷第十論

加味歸脾湯

八珍湯

加味逍遙散

逍遙散

歸脾湯 五方見二十四卷第四論

七味白朮散 方見二十二卷第二論

金匱加減腎氣丸 方見二十一卷第十論

婦人血風勞氣方論第三

婦人血風勞症因氣血素虛或產後勞傷外邪所乘或內有宿冷以致腹中疼痛四肢酸倦發熱自汗月水不調面黃肌瘦當調補肝脾氣血為主。

愚按東垣云喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故困熱懶言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐存養其氣以甘寒瀉其熱氣以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之要畧云平人脈大為勞以黃芪建中湯治之

附治驗

一婦人勞則足跟熱痛余以為足三陰血虛用聖愈湯而痊後遍身搔痒誤服風藥發熱抽搐脈洪數此肝家血虛火

婦人良方

盛而生風以天竺膽星為丸用四物麥門五味苓連炙草山

梔柴胡煎送而愈。

一婦人素清苦勤於女工因感風邪自用表散之劑反朝寒暮熱自汗盜汗形氣虛甚其脈或浮洪或微細其面或青白或痿黃此邪去而氣血愈虛也用十全大補湯三十餘劑漸愈又用加味逍遙散兼治半載而痊。

人參荆芥散 治遍身疼痛頭昏目澁心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿月水不調腹痛癍塊

荆芥

人參

生地黃

柴胡

鱉甲

醋炙

酸棗仁

炒

枳殼

麩炒

羚羊角

鈎

白朮

各七分

川芎

當歸

酒拌

桂心

防風

甘草

各五分

右薑水煎日二服

地黃煎 治血虛心忪發熱

生地黃

熟地黃

自製等分

右用薑汁和水拌杵丸桐子大每服五十九空心白湯下日三服若臟腑虛寒早間先服八味丸一服

愚按前方肝脾血虛發熱內熱晡熱盜汗作渴體倦筋骨疼痛筋脈拘攣血虛發躁虛熱生痰咳嗽之良劑若因肝脾腎精血燥熱生痰胸膈痞滿喘咳作渴及一切虛火症必用六味丸為主。

乞力伽散 治血虛肌熱或脾虛蒸熱或內熱寒熱

白朮

白茯苓

白芍藥

炒各一錢

甘草

炒五分

右薑棗水煎

附方

婦人良方

薛氏醫案卷之五

五

五

黃芪建中湯

方見二十四卷第四論

聖愈湯

方見二十四卷第九論

四物湯

方見二十四卷第六論

六味丸

加味逍遙散

二方見二十四卷第四論

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

歸脾湯

十全大補湯

二方見二十四卷第四論

人參養榮湯

方見二十四卷第三論

八味丸

方見二十四卷第十一論

婦人冷勞方論第五

婦人冷勞屬血氣不足。臟腑虛寒。以致臍下冷痛。手足時寒。月經失常。飲食不消。或時嘔吐。惡寒發熱。骨節痠疼。肌膚羸瘦。面色痿黃也。

愚按前症有內外真寒。然有內外真熱。亦有內外真熱而外假寒者。又有內外真寒而外假熱者。若飲食難化。大便不實。腸鳴腹痛。飲食畏寒。手足逆冷。面黃嘔吐。畏見風寒。此內外真寒之症也。宜用附子理中湯以回陽。八味地黃丸以壯火。若飲食如常。大便堅實。胸腹痞脹。飲食喜冷。手足煩熱。面赤嘔吐。不畏風寒。此內外真熱之症也。宜用黃連解毒湯以消陰。六味丸以壯水。若飲食如常。大便堅實。胸腹痞脹。飲食喜寒。手足逆冷。面黃嘔吐。畏見風寒。此內外真熱而外假寒也。亦用解毒湯。六味丸。若飲食少思。大便不實。吞酸噯氣。胸腹痞滿。手

婦人良方

薛氏醫案卷之五

五

五

足逆冷。面赤嘔吐。畏見風寒。此內真寒而外假熱也。亦用附子理中湯。與八味丸。當求其屬而治之。經曰。益火之源。以消陰翳。壯水之主。以制陽光。使不知真水火之不足。泛以寒熱藥治之。則舊疾不去。新病復生矣。夫所謂屬者。猶主也。謂心腎也。求其屬也者。言水火不足而求之於心腎也。火之源者。陽氣之根。即心是也。水之主者。陰氣之根。即腎是也。非謂火為心原。為肝。水為腎主。為肺也。大抵寒亦抑心。熱亦強腎。在治者審之。

附治驗方藥

一婦人食少作嘔。口吐痰涎。面黃腹痛。月經不調。手足逆冷。余謂此內外俱寒之症。遂以六君加附子木香治之而愈。先太宜人忽嘔吐酸水。內熱作渴。飲食不進。惟喜冷水。面色

青赤。投之以藥。入口即吐。此內外真熱之症。積十餘日。以黃連一味煎湯飲之。徐加白木茯苓。仍加陳皮。當歸。炙草。至月餘始進米飲。稀粥調理而愈。

一婦人內熱作渴。大便秘結。畏惡風寒。手足逆冷。余以為內真熱而外假寒。先用黃連解毒湯。後用六味丸而愈。

大方室趙氏。初患痰喘熱渴。醫以降火散氣治之。肌日削而氣日索。延至甲辰木旺。痰盛身熱。口腐腹脹。神昏絕食。幾死。先生診之云。此乃虛熱無火。投以壯水生上之劑。隨服隨效。得以不死。竊喜久安。忽值戊申夏初。坐則頭墜。不能起視。臥則背冷。覺風透體。煩熱暈眩。咳嘔痰湧。手足麻冷。病勢危殆。自分必死。得先生在診之日。此內真寒外假熱之症也。遂以大補姜附之劑飲之。不三四服。而大勢已平。仍以前藥加減。

而愈則其他以有餘之火治之無怪乎其展轉增劇也微先生則山妻不死於甲辰之春難免於戊申之夏矣大方感慨不已援筆備述求附卷末庶幾醫者之不昧病者之得全先生之惠垂諸無窮豈一世一人之幸哉長洲沈大方頓首拜書

八味丸

六味丸

一方見二十四卷第十一論

附子理中湯

方見二十卷第八論

黃連解毒湯

方見六卷第十一論

六君子湯

方見二十四卷第六論

