



薛氏二十


外科發揮

共四十二

一三



外科





立於外科發揮叙

醫家內外科實相表裏惟小兒爲難治故謂之啞科雖瘡瘍爲有形之症然亦必先審乎脉脉也者氣血之運也天以陰陽之運成四時人以氣血之運成一身以氣血之運定於所賦移於所感是故人有老少強弱之等而脉亦有盛衰虛實之異故瘡病治瘡瘍者皆當先辨其有餘不足而爲主客緩急之施則善矣其見于東垣丹溪河間仲景之論可攷而知也吾切嘆夫世之庸醫未嘗讀書明理以瘡瘍試方藥而遂誤人者不少也嘗見南京判院薛君外科心法精當切要可傳而許其有扶困起廢之仁一日持是編以告余先君子欲以隨治驗方萃以成編庶克濟人且以自驗其力余承先意乃今分症異欲而錄其既驗者尤致詳于有餘不足之辨而爲虛實主客之宜欲錢諸梓

以傳庶有便于窮鄉下邑之無名醫者不獨自驗而已也少宰
蒲汀李公嘗見之標曰立齋外科發揮予蓋叙之余惟君子不
忘乎親不私其有夫不忘其親之謂孝不私其有之謂仁孝則
仁仁則公公則溥君之是編其真君子之用心哉吾儒以推已
及物求仁而欲措天下於仁壽之域是編之行於人必大有濟
故爲之叙以推廣而傳之

嘉靖戊子秋孟月朔南京刑部員外郎前進士郡人張淮叙

立齋外科發揮目錄

卷一

腫瘍謂瘡瘍未出膿者

潰瘍謂瘡瘍已出膿者 潰瘍作痛

卷二

潰瘍發熱 作渴 作嘔 發背 腦疽

卷三

瘡疽 時毒謂毒發於面鼻耳項

疥瘡 臀癰附脫癰并腿痛脚氣

卷四

脫疽謂丁生于足指或潰而自脫故名脫疽亦有發于

肺癰肺痿 腸癰

卷五

瘰癧

流注

卷六

咽喉

癰疹 附丹毒

天泡瘡

楊梅瘡 近時稱

卷七

便癰

懸癰

下疳

囊癰

痔漏 附脫肛便

卷八

便秘

乳癰

婦人血風瘡 附陰瘡陰挺陰腫

瘡疥

杖瘡

立齋外科發揮目錄

立齋外科發揮卷之一

薛氏醫按

吳郡薛 已著

新都吳玄有校

腫瘍

謂瘡瘍未出膿者

腫高焮痛脉浮者邪在表也宜托之

腫硬痛深脉沉者邪在內也宜下之

外無焮腫內則便利調和者邪在經絡也當調榮衛

煩痛煩躁或咽乾作渴者宜降火

焮痛發熱或拘急或頭痛者邪在表也宜散之

大痛或不痛者邪氣實也隔蒜灸之更用解毒

煩躁飲冷焮痛脉數者邪在上也宜清之

惡寒而不潰者氣實兼寒邪也宜宣而補之

一 痲痛發熱汗多大渴便秘譫語者結陽證也宜下之
不作膿或熟而不潰者虛也宜補之

一 男子胸患癰腫高熾痛脉浮而緊以內托復煎散二劑表證悉滅以托裏消毒散四劑而消

一 男子腹患癰腫硬木悶煩熱便秘脉數而實以黃連內疎湯一劑少愈以黃連解毒湯二劑頓退更以金銀花散四劑瘡頭出水而消

一 男子患腿痛而不熾腫內亦便利調和用托裏榮衛湯數劑而消

一 婦人項患毒熾痛發寒熱以荆防敗毒散二劑少愈以小柴胡湯加連翹牛蒡子桔梗四劑而消

一 男子肩患毒熾痛飲冷煩躁便秘脉數而實以清涼飲二劑

少愈以金銀花散四劑悉退又以十宣散去桂加天花粉金銀花數劑瘡頭潰而痊

一 婦人臂患腫惡寒不作膿以十宣散六劑而潰以托裏散數劑而瘳

一 男子患癰腫硬疼痛發熱煩躁飲冷脉沉實大便秘乃邪在臟也用內疎禁連湯疎通之以絕其源先投一劑候行一次勢退一二再進一劑諸證悉退乃用黃連消毒散四劑而消

一 男子內股患毒腫硬痛甚不作膿隔蒜灸五十餘壯勢退七八以仙方活命飲四劑而膿成用十宣散六劑膿潰而愈凡瘡大痛或不痛麻木灸最良

一 婦人臂腫不成膿飲食少思遇勞作痛發熱以補中益氣湯二劑痛少止以補氣血健脾胃藥而消

一男子素弱胸患癰飲食少而倦以六君子湯加芎歸黃芪膿成針之更以托裏藥而愈

一婦人脇患癰未成膿惡寒脈緊以十宣散加柴胡二劑表證悉退更以托裏散數劑膿潰而愈

一婦人臂患毒腫硬咽喉壅塞四肢逆冷發寒熱以五香連翹湯二劑頓愈以瘡科流氣飲四劑而消

一男子臂患癰脈弦緊有力以白芷升麻湯二劑頓退又二劑而消

一婦人肩下患毒脈弦緊以白芷升麻湯二劑表證已退更以托裏藥潰之而愈

一男子臂患癰不作膿灸以豆豉餅及飲托裏藥三十餘劑而潰又月餘而愈

一男子膿熟不潰予欲針之補以托裏彼不信乃服攻毒藥致惡心少食始悟而用鍼更以六君子湯加藿香當歸四劑可再以加味十全大補湯數劑而飲凡瘡膿熟不行鍼刺膿毒侵蝕輕者難療重者不治老弱之人或偏僻之處及緊要之病若一有膿宜急針之更以托裏庶無變證

一男子患毒作痛服寒涼藥痛雖止而食愈少瘡亦不潰以六君子湯而食進再以托裏藥潰之而愈大抵瘡疽之證寒熱虛實皆能爲痛熱毒之痛者以寒涼之劑折之寒邪之痛者以溫熱之劑散之因風而痛者除其風因濕而痛者導其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之膿鬱而閉者開之惡肉侵蝕者去之陰陽不和者調之經絡秘澁者利之漫勿槩用寒涼之藥況血脉喜溫而惡寒若冷氣入裏血卽

凝滯反為難瘥之證矣

一男子素弱肘患腫飲內消服涼藥反致作瀉少食以二神丸及香砂六君子湯加肉豆蔻而瀉止食進又以托裏藥而腫亦消丹溪云癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣便根本堅固次以行經活血藥佐之參以經絡時令使毒氣外發施治之早可以內消此內托之意也又云腫瘍內外皆虛宜以托裏表散為主如欲用大黃寧無孟浪之非潰瘍內外皆虛宜以補接為主如欲用香散未免虛虛之失大抵癰腫之證不可專泥於火為患經云營氣不從逆於肉理乃生癰腫又云形傷痛氣傷腫六淫七情皆能致之况稟有虛實及老弱不同豈可槩用寒涼之藥設若毒始聚膿未作勢不盛庶可消尤當推其病因別其虛實若槩用寒涼藥必致誤事如膿將成邪盛氣實用消毒之劑證悉退矣

附方

內托復煎散 治瘡瘍腫焮在外其脉多浮邪氣勝必侵內宜用此藥托之

皮骨皮

黃芩 炒

茯苓

白芍藥 炒

人參

黃芪 鹽水拌炒

白朮 炒

桂皮

甘草 炙

防己 酒拌

當歸 酒拌各一錢

防風 二錢

吹阻先以蒼朮一升水五升煎去朮入藥再煎至二升終日飲之蒼朮粗外再煎服

托裏消毒散 治瘡疽已攻發不消者宜服此藥未成即消已

托裏消毒散

治瘡疽已攻發不消者宜服此藥未成即消已

四

月

成即潰腐肉易去新肉易生如有瘡口宜貼膏藥欵即不用
切不可用生肌之藥

人參

黃芪

鹽水拌炒

當歸

酒拌

川芎

芍藥

白朮

炒

茯苓

各一錢

白芷

金銀花

各七分

甘草

五分

作一劑用水二鍾煎至八分瘡在上下食前後服之

內疎黃連湯

一名黃連內疎湯

治瘡瘍腫硬發熱作嘔大便秘

澁煩躁飲冷嘔呃心煩脉沉實此邪在臟也急服以內除之
使邪不得犯經絡

黃連

山梔

當歸

酒拌

芍藥

木香

檳榔

黃芩

薄荷

桔梗

甘草

各一錢

連翹

大黃

炒各二錢

作一劑水二鍾煎八分食前服

黃連解毒湯

方見瘡瘍作嘔門

荆防敗毒散

方見疔瘡門

隔蒜灸法

仙方活命飲

清涼飲

十宣散

方見發背門

香砂六君子湯

方見作嘔門

破棺丹

方見發背門

托裏散 治瘡瘍飲食少思或不腐不收斂

人參

黃芪

鹽水拌炒

當歸

酒拌

川芎

白朮

炒

茯苓

芍藥

各一錢

厚朴

薑製

白芷

甘草

各五分

作一劑水二鍾煎八分服

代針膏 治瘡瘍膿熟不潰

乳香 二分

白丁香 細直者是

巴豆 去殼炒焦

碱 各五分

為末熱水調點瘡頭上常以碱水潤之勿令乾也

托裏榮衛湯 治瘡瘍外無焮腫內亦便利調和乃邪在經絡

宜用此藥調理

黃芪 炒

紅花 各一錢

桂枝 七分

蒼朮 米泔浸炒

柴胡

連翹

羌活

防風

當歸身 酒拌

甘草 炙

黃芩

人參 各一錢

作一劑酒水各一鍾煎八分食遠服

金銀花散

方見作嘔門

小柴胡湯

方見瘰癧門

黃連消毒散

方見腦疽門

補中益氣湯

方見潰瘍發熱門

六君子湯

方見作嘔門

十全大補湯

方見潰瘍發熱門

五香連翹湯

治諸瘡初覺一二日便厥逆咽喉塞寒熱

沉香

木香

麝香

連翹

射干

升麻

丁香

獨活

桑寄生

甘草 炙各一錢

大黃

木通

乳香 各一錢五分

每服五錢水一鍾煎八分溫服取利

瘡科流氣飲

方見流注門

白芷升麻湯

治手臂患癰左右手脉皆短中按之俱弦按下

洪緩有力此得之八風之變也

詳氏醫案

外科發源卷之一

六

白芷一錢五分

升麻

桔梗各一錢

生黃芩二錢

紅花

甘草各五分

酒黃芩

黃芪各一錢

作一劑水一鍾半煎八分食遠服

豆豉餅

方見腎癰門

二神丸

方見作嘔門

潰瘍

謂瘡瘍已出膿者

膿熟不潰者陽氣虛也宜補之

瘀肉不腐者宜大補陽氣更以桑木灸之

膿清或不斂者氣血俱虛宜大補

膿後食少無睡或發熱者虛也宜補之

倦怠懶言食少不睡者虛也宜補之

寒氣襲于瘡口不斂或陷下不斂者溫補之

脉大無力或瀦微者氣血俱虛也峻補之

出血或膿多煩躁不眠者乃亡陽也急補之

一男子患癰膿成不潰投以補劑而潰更以健脾藥而愈丹溪

云氣血壯實膿自湧出信夫

一男子潰而瘀肉不腐以參芪歸朮峻補氣血更以桑木灸之

腐而愈

一童子腋下患癰不斂膿清脉大倦怠懶食少寐自汗口乾以

內補黃芪湯及豆豉餅灸之兩月而愈凡瘡膿潰而清或瘡口

不合或聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者皆氣血俱虛也非補不可

一男子腰患毒膿熟不潰針之膿太泄反加煩躁以聖愈湯因

劑而寧更以人參養榮湯加麥門冬五味子兩月而愈此人後

患濕氣遂為癰疾凡瘡膿血去多瘡口雖合尤當補益務使氣

血平復否則更患他證必難治療慎之

一婦人患臂癰瘡口紫陷膿清不斂彼以為毒未盡欲服攻毒之劑予謂瘡瘍之證腫起堅硬膿稠者實也腫下軟慢膿稀者虛也遂用附子餅灸之及飲十全大補湯百劑始愈

一婦人患附骨癰久而不斂致腿細短軟脈來遲緩以十全大補湯加牛膝杜仲及附子餅灸之兩月餘而愈凡膿潰之後脈澀遲緩者易愈以其有胃氣故也脈來細而沉時直者裏虛而欲變證也若煩痛尚未痊也洪滑龐散者難療以其正氣虛而邪氣實也

一男子風襲瘡口牙關緊急腰背反張以玉真散一服而愈仍以托裏藥而飲

一男子患癰將斂遍身作痒脈浮以消風散二服而止更以托

裏藥而愈

一男子肩下患疽已數日漫腫微痛頭甚多皆如粟許色不變不起發此氣血虛也診其脈果然先以仙方活命飲二劑殺其大勢更以托裏藥而起發瘡頭雖潰但流血水氣血尚虛不能為膿也彼欲服太乙錠子予謂此藥止能攻毒不能托裏彼不深信仍服之至四次飲食不進瘡色黑陷吃逆不絕胃氣虛極也不治強投溫中健脾之劑不應而死○一男子近脇患此腫而不潰投大補之劑潰而已愈後患弱證而歿○一男子腰中患此腫而不潰其氣血止能發起不能培養為膿也投大補藥數劑而潰又數劑膿出尚清乃服參芪歸朮膏斤餘膿少稠數斤膿漸稠肌肉頓生凡大癰疽藉氣血為主若患而不起或潰而不腐或不收斂及膿少或清皆氣血之虛也宜大補之最忌

攻伐之劑亦有膿反多者乃氣血虛而不能禁止也若潰後發熱作渴脉大而膿愈多屬真氣虛而邪氣實也俱不治常見氣血充實之人患瘡皆腫高色赤易腐潰而膿且稠又易於收斂怯弱之人多不起發不腐潰及難於收斂若不審察而妄投攻劑虛虛之禍不免矣及患後當調養若癰癰流注之證尤當補益也否則更患他證必難措治慎之

一男子肩患毒腫硬作痛惡證迭見用白礬末三錢糊丸以葱頭七莖煎湯調下腫痛悉退再服諸證亦退更以仙方活命飲二劑出水而消此秘方名千金化毒湯本礬末葱湯調服因未難服故易為丸一方士治瘡疽不問腫潰先用此藥三二服後用消毒藥其効常治癰毒之人用此即退不用托裏藥亦愈蓋止熱毒為患血氣不虧故也若金石毒藥發疽者尤効蓋礬又

能解金石之毒也一方用礬末五錢硃砂五分熱酒下亦効此藥托裏固內止瀉解毒排膿不動臟腑不傷氣血有益無損其藥易得其功甚大偏僻之處不可不知此方或虫犬所傷溶化熱塗患處更以熱酒調末服皆効

一男子胸患癰嗽煩躁發熱作渴脉數而實時季冬予謂此熱毒內畜也須於時從證欲治以內疎黃連湯彼以時當隆寒乃雜用敗毒藥愈熾仍求治投前湯二劑後去二次諸證悉退以金銀花散加連翹山梔四劑出水而消大抵證有主末治有權宜治其主則末病自退用其權則不拘於時況於守常必致病勢危甚况雜用攻劑動損各經故丹溪云凡瘡發於一經只當求責本經不可干擾餘經羅謙甫云守常者眾人之見知變者智者之事知常而不知變細事因而取敗者多矣

一上舍年踰四十因怒脇內作痛不止數日後外結一塊三寸許漫腫色不赤按之微痛予謂怒氣傷肝致血傷氣鬱爲患以小柴胡湯對四物倍用芍歸黃芪貝母肉桂治之彼謂丹溪云腫瘍內外皆壅宜托裏表散爲主又云凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用况此證爲氣血凝滯乃服流氣飲愈虛始信而復求治視之虛證併臻診之胃氣更虛彼欲服予前藥予謂急者先治遂以四君子湯加酒炒芍藥炮乾薑四劑少得更加當歸又四劑胃氣漸醒乃去乾薑又加黃芪芍歸肉桂數劑瘡色少赤并微作痛又二十餘劑而膿成針之却與十全大補湯喜其謹疾又兩月餘而瘳夫氣血凝滯多因營衛之氣弱不能運散豈可復用流氣飲以益其虛况各經血氣多寡不同心包絡膀胱小腸肝經多血少氣三焦膽腎心脾肺少血多氣然前

附方

證正屬膽經少血之臟人年四十以上陰血日衰且脉證俱屬不足腫瘍內外皆壅宜托裏表散爲主乃補氣血藥而加之以行散之劑非專攻之謂也若腫焮痛甚煩躁脉大辛熱之劑不但腫瘍不可用雖潰瘍亦不可用也凡患者須分經絡氣血地部遠近年歲老幼稟氣虛實及七情所感時令所宜而治之常見以流氣十宣二藥槩治結腫之證以致取敗者多矣

桑木灸法 治發背不起發或瘀肉不腐潰陰瘡癰癰流注賺瘡頑瘡惡瘡久不愈者須急用此法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣誠良方也用桑木燃着吹熄焰用火灸患處每次多用時以瘀肉腐動爲度丹溪云火以暢達拔引鬱毒此從治之意也

十全大補湯

方見潰瘍發熱門

治瘡潰膿清或不潰不斂皆由

元氣虛弱不能營運服此生血氣壯脾胃兼補諸虛

黃耆人參湯

方見全前

內補黃耆湯

方見潰瘍作痛門

豆豉餅

附子餅

二方見腎癰門

聖愈湯

方見杖瘡門

人參養榮湯

方見潰瘍發熱門

玉真散

方見杖瘡門

消風散

方見瘡疥門

潰瘍作痛

膿出而反痛者虛也宜補之

脉數虛而痛者屬虛火宜滋陰

脉數實而痛者邪氣實也宜泄之

脉實便秘而痛者邪在內也宜下之

脉澀而痛者氣血虛寒也溫補之

一男子患毒潰後作痛肢體倦怠瘡口不合飲食不甘以六君

子湯加羌活川芎當歸四劑而愈更以托裏散月餘而斂

一男子潰後作痛脉數而無力以托裏散加生地黃黃柏二劑

而止更以托裏散數劑而安

一男子潰後發熱左手脉數而有力以人參敗毒散一劑而止

更以托裏散而痊

一男子潰後發熱熾痛不止煩躁便秘右手脉沉實以清涼飲

一劑而止更以托裏散毒散四劑而瘳

一男子潰後作痛而膿潰以定痛托裏散飲之敷乳香定痛散而止更以托裏散敷而愈

一男子潰而作痛脈浮緊以內補黃耆湯四劑而止又二十餘劑而愈

一男子項患毒潰而作痛以參耆地黃芎歸補之而止更以八珍湯加黃耆桔梗三十餘劑而愈

一男子患癰潰而作痛脈軟而濡予謂氣血虛欲補之彼不信乃服攻伐之劑反發寒熱始信之仍投大補藥而痊大抵瘡之始作也先發為腫氣血鬱積蒸肉為膿故多痛膿潰之後腫退肌寬痛必漸減若反痛乃虛也丹溪云膿出而反痛此為虛也宜以補之亦有穢氣所觸者和解之風寒所逼者溫散之齊氏云名德之元瘡疽之證有臟腑氣血上下真邪虛實不同也不

可不辨如腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下軟慢膿稀者瘡疽之虛也瀉痢湯鳴飲食不入嘔吐無時手足並冷脈弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便秘硬小便澀飲食如故腸滿膨脹胸膈痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩躁多渴身熱脈大精神昏塞者悉臟腑之實也凡諸瘡疽膿水清稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷白汗色脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者氣血之實也頭痛鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也精滑不禁大便自利脚腰沉重睡臥不寧者下虛也肩項不便四肢沉重目視不正睛不瞭瞭食不知味言嚤色敗四肢浮腫者真氣虛也腫脹尤甚痛不可近多日不潰寒熱往來大便秘澀小便如淋心神煩悶恍惚

不寧者邪氣之實也又曰真氣奪則虛邪氣勝則實又曰諸痛為疼為虛也又曰診其脉洪大而數者實也細微而軟者虛也虛則補之和其氣托裏也實則瀉之疎利而導其氣內經謂血實則決之氣虛則掣引之

附方

人參敗毒散

方見潰瘍發熱門

清涼飲

方見發背門

定痛托裏散

治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也

粟殼

去蒂炒

當歸

酒拌

白芍藥

炒

川芎

各錢半

乳香

沒藥

桂

各錢一

作一劑水二鍾煎八分服

乳香定痛散

治瘡瘍疼痛不可忍

乳香

沒藥

各錢二

寒水石

煨

滑石

各錢四

冰片

一分

為細末搽患處痛即止妙甚此方乳沒性溫佐以寒劑制之故寒熱之痛皆有效也

六君子湯

方見作嘔門

托裏散

托裏消毒散

方見腫瘍門

內補黃耆湯

治潰瘍作痛倦怠少食無睡自汗口乾或發熱

久不愈

黃耆

鹽水拌炒

麥門冬

去心

熟地黃

酒拌

人參

茯苓

各錢二

甘草

炙炒

白芍藥

炒

遠志

去心炒

川芎

官桂

當歸

酒拌各五分

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

八珍湯

方見潰瘍發熱門

立齋外科發揮卷之二

薛氏醫按

吳郡薛已著

新都吳玄有校

潰瘍發熱

附惡寒

脈浮或弱而熱或惡寒者陽氣虛也宜補氣

脈瀼而熱者血虛也宜補血

午前熱者補氣為主

午後熱者補血為主

脈浮數發熱而痛者邪在表也宜散之

脈沉數發熱而痛者邪在內也宜下之

一男子潰後發熱作痛脈浮數按之無力勞而尤甚以補中益

氣湯治之而止更以十全大補湯而愈常治左手脈小於右手

而熱者用血藥多於氣藥右手脉小於左手而熱者用氣藥多於血藥

一男子潰後發熱頭痛脉浮緊虛而兼表邪也以補中益氣湯加川芎白芷二劑而止更以托裏藥而愈

一婦人潰後發熱少寐四肢倦怠以黃芪人參湯治之而安更以十全大補湯加貝母遠志麥門冬酸棗仁香附月餘而愈

一婦人潰後發熱服清熱敗毒藥愈甚診之脉瀉以四物湯加粟殼乳香沒藥二劑少止又二劑而安

一男子潰後發熱頭微痛日晡尤甚脉浮按之則瀉以人參養榮湯加柴胡地骨皮而愈又月餘而愈

一男子潰而惡寒用四君子湯加桂倍用黃芪大料四劑而止膿水尚多投入珍湯加桂數劑漸少惟瘡口不合以附子餅及

十全大補湯每劑加炮附子五分數劑乃去附子又服月餘而愈

一男子潰後將愈因勞四肢發熱煩躁不寐以聖愈湯四劑而愈更以托裏藥而愈丹溪云有四肢熱逢風寒如灸於火者是人陰氣虛而陽氣盛也

一男子潰後畏寒脉虛以四君子加炮薑四劑而愈以十全大補湯月餘而愈仲景云脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡

腫脉虛宜托裏和養血信夫

一癰婦發熱日晡愈甚乃血氣虛也治以四物湯加柴胡地骨皮而愈

一婦人潰後發熱服涼藥反畏寒以十全大補湯二劑而止又以托裏藥而痊

一男子潰後發熱服涼藥益甚診之脉浮乃氣虛也以補中益

氣湯加五味子麥門冬治之而止更以托裏藥而飲

一婦人潰後發熱脉浮而數虛而兼表證也以補中益氣湯倍用柴胡升麻一劑而止以托裏月餘而飲

一男子患癰潰而飲酒燋痛發熱服黃連解毒湯二劑而止更以托裏消毒散而愈常治痛而大便秘脉實者用清涼飲治之一男子膿熱不潰微痛少食倦怠發熱予爲針之膿湧出熱益甚乃虛也急以人參黃耆湯二劑熱愈甚此藥力尚未及也又二劑果應再以當歸補血湯數劑而痊東垣云發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣脉洪大按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁當以當歸補血湯主之又有火鬱而熱者如不能食而熱自汗氣短者虛也以甘寒之劑瀉熱補氣如能食而熱口舌乾燥大便難者以辛苦大寒之劑下之以瀉

火補水

一男子患癰時值陰寒忽惡寒右手脉有而似無此胃氣虛而不任風寒也以四君子湯加炮薑肉桂二劑少止又四劑而安丹溪云惡寒者衛氣虛衰不能溫分肉實表而惡寒者又有上焦之邪隔絕榮衛不能升降出表而惡寒者東垣云夜則惡寒晝則安靜是陰血自旺於陰分也夜則惡寒晝亦惡寒是重陰無陽也當亟瀉其陰峻補其陽夜則安靜晝則惡寒是陰氣上溢於陽中也

一婦人多怒手背患瘡出血至夜發熱妄語服清心涼血藥不應乃熱入血室而然也遂以加味小柴胡湯二劑血止而熱亦清矣大抵七情皆能動火各經之熱亦異當分治之東垣曰晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也晝則安靜夜則發熱

煩躁是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室晝則發熱煩躁夜則發熱煩躁是陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰王註云病熱而脈數按之不鼓動乃寒盛格陽而致之非熱也形證是寒按之而脈氣鼓擊於手下盛者此為熱盛拒陰而生病非寒也又曰推而內之外而不內身有熱也傷寒論曰寸口脈微為陽不足陰氣上入陽中則酒淅惡寒尺脈弱為陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也以手捫摸有三法以輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血脉也重按之至筋骨之分則熱蒸手極甚輕手則不熱是邪在筋骨之間也輕手捫之則熱重力以按之不熱不輕不重按之而熱是在筋骨之上皮毛血脉之下乃熱在肌肉也○肺熱者輕手乃得微按全無曰肺熱甚乃皮毛之熱其證必見喘咳寒熱輕者瀉白散重者涼膈散地骨皮散○

心熱者微按至皮膚之下肌肉之上輕手乃得微按至皮毛之下則熱少加力按之則不熱是熱在血脉也其證煩心心痛掌中熱而噦以黃連瀉心湯導赤散硃砂安神丸○脾熱者輕手摸之不熱重按至筋骨又不熱不輕不重在輕手重手之間熱在肌肉遇夜尤甚其證必怠惰嗜臥四肢不收無氣以動瀉黃散○肝熱者重按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱寅卯間尤甚其脈弦四肢滿悶便難轉筋多怒多驚四肢困熱筋痿不能起於床瀉青丸柴胡飲子○腎熱者輕手重手俱不熱重手按至骨分其熱蒸手如火其人骨蒸如虫蝕其骨困熱不任亦不能起於床滋腎丸主之按徐用誠云手太陰少陰足太陰厥陰少陰本病為皮毛肌肉骨分熱也然面熱者足陽明○口中熱如膠足少陰○口熱舌乾足少陰○耳前熱苦寒手太陽○

掌中熱手厥陰少陰太陰○足下熱而痛足少陰○足外熱足少陽○身熱膚痛手少陰○身煎熱足陽明○洒淅寒熱手太陰○肩熱肩似拔手太陽中熱而喘足少陰○肩背熱及足小指外膝脛踝後皆屬足太陽○一身盡熱狂而妄聞妄見妄言足陽明○熱而筋縱緩不收陰痿足陽明厥陰手少陰與前熱在氣血之分皆諸經現證臟腑陰陽是動所生之本病也

附方

十全大補湯 治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或清或自汗盜汗及流注瘰癧便毒久不作膿或膿成不潰潰而不斂若血氣不足之人結腫未成膿者宜加枳殼香附連翹服之

人參

肉桂

地黃

川芎

白芍藥

茯苓

白朮

黃芪

當歸

甘草

作一劑用水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

四君子湯

方見痔漏門

四物湯

方見瘰癧門

人參敗毒散

治一切瘡瘍癰疽發寒熱或拘急頭痛脈數有力者

人參

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

枳殼

茯苓

川芎

甘草

作一劑用水二鍾煎八分食遠服

清涼飲

方見發背門

當歸補血湯

治瘡瘍潰後氣血俱虛肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脈洪大而虛重按全無此脈虛血虛也若

誤服白虎湯必死宜此主之

黃耆炙

當歸酒拌

作一劑水一鍾半煎六分服

補中益氣湯 治瘡瘍之人元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲

食無味或飲食失節或勞倦身熱脉洪大而無力或頭痛或

惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃耆炙一分

甘草炙

人參

當歸酒拌

白朮炒各一錢

升麻

柴胡

陳皮各三分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾空心服

黃耆人參湯 治潰瘍虛熱無睡少食或穢氣所觸作痛

黃耆鹽水拌炒二錢

人參

白朮炒

麥門冬去心

當歸身酒拌

蒼朮米泔浸各一錢

甘草炒

陳皮

升麻

神麴炒各五分

黃柏酒製炒三分

五味子九粒搗炒

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

人參養榮湯 治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦而

色痿黃汲汲短氣飲食無味不能收斂或氣血原不足不能

收斂若大瘡愈後多服之不變他病

白芍藥一錢半

人參

陳皮

黃芪蜜炙

桂心

當歸酒拌

白朮

甘草炙各一錢

熟地黃酒拌

五味子炒

茯苓各七分半

遠志去心炒五分

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

附子餅方見腎癰門

八珍湯 調和榮衛順理陰陽滋養血氣進美飲食退虛熱此

氣血虛之大藥也

川芎

芍藥炙

熟地黃酒拌

當歸酒拌

神麴炒各五分

黃柏酒製炒三分

五味子九粒搗炒

人參

白朮

茯苓

各一錢

甘草

炒五分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

聖愈湯

方見杖瘡門

黃連解毒湯

方見作嘔門

托裏消毒散

方見腫瘍門

加味小柴胡湯

治婦女熱入血室致寒熱如瘧晝則安靜夜

則發熱妄語

柴胡

二錢五分

黃芩

人參

生地黃

甘草

各一錢

半夏

六分

作一劑水一鍾半薑三片煎八分食遠服

發背

焮痛或不痛及麻木者邪氣盛也隔蒜灸之不痛者灸至痛痛

者灸至不痛毒隨火而散再灸不痛者須明灸之腫硬痛深脉實者邪在內也下之

腫高焮痛脉浮者邪在表也托之

焮痛煩躁或咽乾火在上也宜瀉之

腫痛或不作膿者邪氣凝結也宜解之

腫痛飲冷發熱睡語者火也宜清之

不作膿或不潰及不斂者陽氣虛也宜補之

瘀肉不腐或積毒不解者陽氣虛也宜助陽氣

膿多或清者氣血俱虛也宜峻補之

脉浮大或濇而肌肉遲生者氣血俱虛也宜補之

右關脉弱而肌肉遲生者宜健脾胃

一男子患此痛甚服消毒藥愈熾予為隔蒜灸之而止與仙方

活命飲三劑頓退更與托裏藥潰之而愈

一男子已四日瘡頭如黍焮痛背重脉沉實與黃連內疎湯二劑少退更與仙方活命飲二劑而消

一男子焮腫作痛脉浮數與內托復煎散二劑少退與仙方活命飲四劑痛止而潰再與托裏藥而愈

一婦人發熱煩躁飲冷與黃連解毒湯四劑少愈更與托裏消毒散始潰與托裏藥而飲

一男子毒勢熾甚痛不可忍諸藥不應以仙方活命飲二劑諸證悉退又二劑而潰以金銀花散六劑而愈

一婦人腫痛發熱睡語脉大用清心湯一劑而安以金銀花甘草天花粉當歸瓜蒌黃芪數劑漸潰更以托裏藥而愈

一男子腐肉漸脫而膿微清飲食無味以十宣散去白芷防風

加茯苓白朮陳皮月餘而飲

一男子已愈惟一口不飲診之脉浮而瀼以十全大補湯治之而愈

一男子將愈但肌肉生遲診之脾胃俱虛以六君子湯加芎歸五味子黃芪治之而愈

一男子已愈惟一眼瞤出衄肉如菌三月不愈乃傷風寒也以生豬脂調藜蘆末塗之即愈亦有衄出三寸許者尤宜用此藥也烏梅塗之亦効但緩硫黃亦可

一男子背患毒焮痛飲冷發熱多汗便秘譫語以破棺丹二丸而寧以金銀花散四劑膿成開之更用托裏藥而愈○一婦膿成脹痛不安針之投托裏消毒藥而即愈大抵發背之證雖發熱疼痛形勢高大煩渴不寧脉若有力飲食頗進可保無虞其

膿一潰諸證悉退多有因膿不得外泄以致疼痛若用敗毒寒藥攻之反致誤事若有膿急針之膿一出苦楚即止膿未成而熱毒作痛者用解毒之藥亦有腐潰尺餘者若無惡證投以大補之劑肉最易生亦無所妨惟忌腫不高色不赤不炊痛脉無力不飲食腫不潰腐不爛膿水清或多而不止肌肉不生屬元氣虛也皆難治宜峻補之其或膿血既泄腫痛尤甚膿水敗臭煩躁時嗽腹痛渴甚瀉利無度小便如淋乃惡證也皆不治

一弱婦外皮雖腐內膿不潰脹痛煩熱不安予謂宜急開之膿一出毒即解痛即止諸證自退待其自潰不惟疼痛潰爛愈深彼不從待將旬日膿尚未出人已殞矣雖針之終不能收斂竟至不起○一男子潰而瘻肉不腐予欲取之更以峻補一婦素弱未成膿大痛發熱予謂須隔蒜灸以拔其毒令自消皆不

從俱致不救常治不問日期陰陽腫痛或不痛或痛甚但不潰者即與灸之隨手取効勢未定者先用縮藥圍之若用烏金膏或漢生膏點患處數點尤好若頭痛拘急乃表證先服人參敗毒散一二劑如炊痛發熱脉數者用金銀花散或槐花酒神効托裏散如疼痛腫硬脉實者以清涼飲仙方活命飲苦參丸腫硬木悶疼痛發熱煩躁飲冷便秘脉沉實者內疎黃連湯或清涼飲大便已利欲其作膿用仙方活命飲托裏散蠟礬丸外用神異膏如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿香連進三五劑更用雄黃解毒散洗患處每日用烏金膏塗瘡口處俟有瘡口即用紙作撚蘸烏金膏紐入瘡內若有膿為脂膜間隔不出或作脹痛者宜用針引之腐肉堵塞者去之若瘻肉腐動用豬蹄湯洗如膿稠或痛飲食如常瘻肉自腐用消毒與托裏藥相

兼服之仍用前二膏塗貼若腐肉已離好肉宜速去之如膿不稠不稀微有疼痛飲食不甘瘀肉腐遲更用桑柴灸之亦用托裏藥若瘀肉不腐或膿清稀不炊痛者急服大補之劑亦用桑木灸之以補接陽氣解散鬱毒常觀患疽稍重未成膿者不用蒜灸之法及膿熟不開或待腐肉自去多致不救大抵氣血壯實或毒少輕者可假藥力或自腐潰怯弱之人熱毒中隔內外不通不行針灸藥無全功矣然此證若膿已成宜急開之否則重者潰通臟腑腐爛筋骨輕者延潰良肉難於收功因而不飲一男子年踰五十患已五日炊腫大痛赤暈尺餘重如負石勢熾甚當峻攻察其脉又不宜遂先砭赤處出黑血碗許腫痛頓退背重頓去更敷神功散及服仙方活命飲二劑瘡口及砭處出血水而消大抵瘡毒勢甚善用攻劑怯弱之人必損元氣因

而變證者衆矣

一婦人半月餘尚不發起不作膿痛甚脉弱隔蒜灸二十餘壯而止更服托裏藥漸潰膿清而瘀肉不腐以大補藥及桑柴灸之漸腐取之而尋愈常治一日至四五日未成膿而痛者灸至不痛不痛者灸至痛若灸而不痛或麻木者明灸之毒氣自然隨火而散腫硬不作膿炊痛或不痛或微痛或瘡頭如黍者灸之尤効亦有數日色尚微赤腫尚不起痛不甚膿不作者尤宜多灸勿拘日期更服甘溫托裏藥切忌寒涼之劑或瘀血不腐亦用桑木灸之若漏數發熱而痛者發於陽也可治脉不數不發痛者發於陰也難治不痛最惡不可視為常疾此證不可不痛不可大痛煩悶者不治大抵發背腦疽大疔懸癰脫疽腳發之類皆由膏粱厚味盡力房勞七情六淫或丹石補藥精虛氣

節所致非獨因榮衛凝滯而生也必灸之以拔其毒更辨其因及察邪在臟腑之異虛實之殊而治之庶無悞也

一男子初生如粟悶痛煩渴便秘脉數實此毒在臟也予謂宜急疎去之以絕其源使毒不致外侵彼以爲小恙乃服尋常之藥後大潰而歿○一老婦患之初生三頭皆如粟腫硬木悶煩躁至六日其頭甚多脉大按之沉細爲隔蒜灸及托裏漸起發尚不潰又數劑內外雖腐惟筋所隔膿不得出致脹痛不安予謂須開之彼不從後雖自穿毒已攻深矣亦及大抵發背之患其名雖多惟陰陽二證爲要若發一頭或二頭其形焮赤腫高頭起疼痛發熱爲癰屬陽易治若初起一頭如黍不腫不赤悶痛煩躁大渴便秘睡語咬牙四五日間其頭不計數其瘡口各含如一粟形似蓮蓬故名蓮蓬發積日不潰按之流血至八九

日或數日其頭成片所含之物俱出通結一衣揭去又結其四共爛爲一瘡其膿內攻色紫黯爲疽屬陰難治脉洪滑者尚可沉細尤難如此惡證惟隔蒜灸及塗烏金膏有效凡人背近脊并髀皮裏有筋一層患此處者外皮雖破其筋難潰以致內膿不出令人脹痛苦氣血轉虛變證百出若待自潰多致不救必須開之兼以托裏常治此證以利刀剪之尚不能去似此堅物待其自潰不亦反傷非血氣壯實者未見其能自潰也

一男子年踰五十患此色紫腫痛外皮將潰寢食不安神思甚疲用桑柴灸患處出黑血卽醒睡覺而諸證如失服仙方活命飲二劑又灸一次膿血皆出更進二劑腫痛大退又服托裏消毒散數劑而歿夫瘡勢熾甚宜用峻劑攻之但年老氣血衰弱况又發在肌表若專於攻毒則胃氣先損反致悞事

一婦人發熱致痛專服降火敗毒藥潰後尤甚煩躁時嗽小便如淋皆惡證候辭不治果死大抵瘡瘍之證五善之中見一二善證者可治七惡之內見一二惡證者難治若虛中見惡證者不救實中無惡者自愈此證雖云屬火未有不因陰虛而致者故經云督脉經虛從腦而出膀胱經虛從背而出豈可專泥於火○又趙太守患此腫堅不澤瘡頭如粟脉洪大按之則瀉經云骨髓不枯臟腑不敗者可治然腫硬色夭堅如牛領之皮脉更瀉此精氣已絕矣不治亦死

附方

隔蒜灸法 治一切瘡毒大痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散蓋火以暢達拔引釐毒此從治之法也有回生之功用大蒜去皮切三文錢厚安瘡頭

上用艾壯於蒜上灸之三莊換蒜復灸未成者即消已成者亦殺其大勢不能為害如瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換如不痛或不作膿及不發起或陰瘡尤宜多灸灸而仍不痛不作膿不起發者不治此氣血虛極也

內疎黃連湯

內托復煎散

二方見腫瘍門

黃連解毒湯

方見作嘔門

仙方活命飲 治一切瘡瘍未作膿者內消已成膿者即潰又排膿止痛消毒之聖藥也

川山甲

用蛤粉炒黃色

甘草節

防風

沒藥

赤芍藥

白芷

當歸尾

乳香

天花粉

貝母各八分

金銀花

陳皮

各錢三

皂角刺

炒黃一錢

作一劑用酒一碗同入瓶內紙糊瓶口弗令泄氣漫火煎數

沸去粗分病在上下食前後服之能飲酒者再飲三三杯尤好

傷

真人妙訣世間稀

一切癰疽總可醫

曰

消毒如同湯沃雪

化膿立見肉生肌

托裏消毒散

方見腫瘍門

清心湯

治瘡瘍腫痛發熱飲冷脉沉實睡語不寧即防風通

聖散每料加黃連五錢每劑一兩水二鍾煎八分服方見天

破棺丹

治瘡瘍熱極汗多大渴便秘譫語或發狂結陽之證

大黃

二兩五錢半生半熟

芒硝

甘草

各二兩

為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食後童便酒化下白湯

化服亦可

十宣散

治瘡瘍脉緩瀉身倦怠惡寒或脉弦或緊細者皆宜

用之散風寒助陽氣也

人參

當歸

酒拌

黃芪

鹽水拌炒各一錢

甘草

炙

白芷

川芎

桔梗

炒各一錢

厚朴

姜製五分

防風

肉桂

各三錢

作一劑水二鍾煎八分服

繩藥

治發背毒甚亂走不住此藥圍之而解

芙蓉葉

白芷

大黃

白芨

山茨菇

寒水石

煨

蒼耳草

黃柏

炒各等分

各另為末用水調搽四圍中如乾以水潤之

烏金膏

解一切瘡毒及腐化瘀肉最能推陳致新用巴豆一

味去殼炒焦研如膏點腫處則解毒塗瘀肉上則自化如乳

薛氏醫案

效驗如神

香少許亦可如縱瘡內能搜膿化毒加香油少許調稀可用

若餘毒深伏不能收斂者宜用此紐之不致成痛

援生膏 治一切惡瘡及瘰癧初起點破雖未全消亦得以殺其毒

輕粉 三錢

乳香

沒藥

血竭 各一錢

蟬酥 三錢

麝香 五分

雄黃 五錢

用蕎麥稽灰或真炭灰一斗三升淋灰湯八九碗將栗柴或桑柴文武火煎作三碗存一碗以備日久藥乾添用取二碗盛於磁器內將煎藥碾為極細末入灰湯內用鐵幹或柳枝順攪再入好細石灰一升再攪勻一宿却分於小磁收貯凡遇諸惡瘡點當頭一二點一日黃黃一錢甘草一錢血水為妙如藥乾却加所存灰與人參敗毒散方見潰瘍發熱門

神功散 治瘡癰不問陰陽腫潰並効

黃柏 妙

川烏 炮

另為末各等分用鹽津調敷患處并塗瘡口一道人不問陰陽腫潰虛實痛否此藥用嗽口水調搽不留瘡頭日易之內服仙方活命飲甚効

金銀花散 方見作腫門

槐花酒 治發背及一切瘡毒不問已成未成但焮痛者並治之用槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去粗熱服未成者二三服已成者一二服又治濕熱瘡疥腸風痔漏諸瘡作痛尤効

神功托裏散 治癰疽發背腸癰乳癰及一切腫毒或焮痛增寒壯熱

寒壯熱

小斗發背

古

月九

神農本草經

外科發背卷之二

五

月乙百

黃耆

鹽水拌炒

忍冬葉

即金銀花

當歸

粉草

一錢

作一劑用酒水各一鍾煎至一鍾分病上下食前後服少頃

再進一劑相敷患處不問陰陽腫潰老少虛實皆可服為末

酒調服尤効

清涼飲

治積熱瘡瘍煩躁飲冷熯痛脉實大便閉結小便赤

大黃

炒

赤芍藥

當歸

甘草

各二錢

作一劑用水二鍾煎八分食前服

苦參丸

治一切癰疽瘡毒熯痛作渴或煩躁

用苦參不拘多少為末

右用水糊為丸如梧桐子大每服二三錢溫酒下

托裏散

方見腫瘍門

蠟礬丸

治一切癰疽托裏止疼痛護臟腑神妙不問老幼皆

可服之

黃蠟

一兩黃色好者溶開離火入礬末一方用七錢

白礬

一二兩明亮好者研末

右二味和勻衆手急丸梧桐子大每服十丸漸加至二十丸

熟水或鹽酒送下日進二服

神農膏

方見楊梅瘡門

六君子湯

方見作嘔門

雄黃解毒散

治一切癰腫潰爛毒勢甚者先用此藥二三次

以後用豬蹄湯

雄黃

一兩

白礬

四兩

寒水石

煨一兩半

用滾水二三碗乘勢入煎藥末一兩洗患處以太乙膏或神

異膏貼之

豬蹄湯

治一切癰疽瘡腫毒去惡肉潤瘡口止痛

五

月乙百

白芷

黃芩

當歸

羌活

赤芍藥

露蜂房

蜂兒多者佳

生甘草

各五錢

用猪蹄一隻水四五碗煮熟去油粗取清湯入前藥煎數沸去粗溫洗隨用前膏藥貼之

桑木灸法

方見潰瘍門

腦疽

腫痛未作膿者宜除濕消毒

大痛或不痛或麻木者毒甚也隔蒜灸之更用解毒藥

腫痛便秘者邪在內也泄之

不甚痛或不作膿者虛也托裏為主

膿成脹痛者針之更以托裏

上部脉數實而痛者宜降火

上部脉數虛而痛者宜滋陰降火為主

尺部脉數而作渴者滋陰降火

不作膿或不潰者托裏藥主之

膿清或不斂或多者大補氣血

煩躁飲冷脉實而痛者宜瀉火

一男子患之腫痛脉數以黃連消毒散二劑少退與仙方活命

飲二劑而止再以當歸川芎芍藥金銀花黃柏知母而潰又

以托裏藥而愈

一男子頭項俱腫雖大潰腫痛益甚兼作瀉煩躁不睡飲食小

思其勢可畏診其脉毒尚在與仙方活命飲二劑腫痛退半

與二神丸及六君子湯加五味子麥門冬酸棗仁四劑諸證

少退飲食少進睡亦少得及與參苓白朮散數服飲食頓進

又與十全大補湯加金銀花白芷桔梗月餘而瘡

一老人色赤腫痛脉數而有力與黃連消毒散二劑少退更與清心蓮子飲四劑而消

一婦人膿熟不潰脹痛欲嘔飲食少思急針之與托裏藥而愈
一婦人患之不甚痛不作膿以托裏消毒散膿成針之補以托裏藥亦愈

一老人膿清兼作渴脉軟而濇予以爲氣血俱虛用八珍湯加黃耆五味子彼不信乃服降火之劑果反作嘔少食始信服香砂六君子湯四劑嘔止食進仍投前湯月餘而愈

一男子未潰兼作渴尺脉大而無力以四物湯加黃柏知母麥門冬黃耆四劑而渴減又與加減八味丸渴止瘡潰更用托裏藥兼前丸而愈

一男子腫痛脉數以荆防敗毒散二劑而痛止更以托裏消毒藥而消

一男子癰腫疼痛發熱飲冷脉洪數與涼膈散二劑而止以金銀花散四劑而潰更以托裏藥而愈

一老婦稟實潰而痛不止脉實便秘以清涼飲二劑而止更以托裏消毒藥而愈

一男子腫硬不作膿瘡頭出水痛甚以仙方活命飲二劑痛止而膿成針之更以托裏藥而愈常治膿清補而不應及不痛或木悶堅硬者俱不治

一男子膿將成微痛兼渴尺脉大而無力此陰虛火動之證彼謂心經熱毒自服清涼降火藥愈熾復求治乃以四物湯加黃柏知母五味子麥門冬黃芪及加減八味丸渴止瘡潰更

以托裏藥兼前丸而愈中藏經云癰疽瘡腫之作皆五臟六腑蓄毒不流非獨榮衛壅塞而發其行也有處其主也有歸假令發於喉舌者心之毒皮毛者肺之毒肌肉者脾之毒骨髓者腎之毒發於下者陰中之毒發於上者陽中之毒外者六腑之毒內者五臟之毒故內曰壞外曰潰上曰從下曰逆發於土者得之速發於下者得之緩感於六腑者易治感於五臟者則難治也觀此則疽發于腦者乃膀胱督脉陰氣不足陽火熾甚而出也豈可專泥於心火而不滋益陰氣耶一男子耳後漫腫作痛肉色不變脉微數以小柴胡湯加芎歸桔梗四劑腫少起更以托裏消毒散數劑脉滑數此膿已成矣宜針之彼畏而不肯用因痛極始針之出膿碗許以托裏藥兩月餘而始愈凡瘡不起者托而起之不成膿者補而成

之使不內攻膿成而及時針之不數日即愈矣常見患者皆畏針痛而不肯用又有恐傷良肉而不肯用殊不知瘡雖發於肉薄之所若膿成其腫亦高寸餘瘡皮又厚分許用針深不過二分若發於背腫高必有三四寸入針止於寸許況患處肉已壞矣何痛之有何傷之慮怯弱之人及患附骨疽待膿自通以致大潰不能收斂氣血瀝盡而亡者爲多矣

一男子素不慎起居飲食炊赤腫痛尺脉洪數以黃連消毒散二劑濕熱頓退惟腫硬作痛以仙方活命飲二劑腫痛悉退但瘡頭不消投十宣去桂加金銀花藁本白木茯苓陳皮以托裏排膿彼欲全消自製黃連消毒散二服反腫硬不作膿始悟仍用十宣散加白木茯苓陳皮反半夏腫少退乃去桂又四劑而膿成腫勢亦退繼以八珍湯加黃芪五味麥門冬月

餘膿潰而愈夫苦寒之藥雖治陽證尤當分表裏虛實次第時宜豈可始末悉用之然厥腫赤痛尺脉數按之則濡乃膀胱濕熱壅盛也故用黃連消毒散以解毒除濕顧腫硬作痛乃氣血凝滯不行而作也遂用仙方活命飲以散結消毒破血其瘡頭不消蓋因熱毒薰蒸氣血凝滯而然也宜用甘溫之劑補益陽氣托裏以腐潰之況此證元屬督脉經陰虛火盛而出若不審其因專用寒苦之劑使胃寒氣弱何以腐化收斂幾何不至于敗耶凡瘡之易消散易腐潰易收斂皆氣血壯盛故也

附方

黃連消毒散 治腦疽或背疽腫勢外散疼痛發焮或不痛麻木服此更宜隔蒜灸之

黃連

酒拌

羌活

黃芩

酒拌

黃柏

酒拌

生地黃

知母

酒拌

獨活

防風

當歸尾

酒拌

連翹

各一錢

黃芪

鹽水拌

蘇木

各一錢

藁本

防已

酒拌

桔梗

陳皮

澤瀉

人參

二錢

甘草

五分

作一劑水二鍾姜三片煎八分食後服

仙方活命飲

方見發背門

隔蒜灸法

方見發背門

槐花酒

方見發背門

清涼飲

方見發背門

四物湯

方見瘰癧門

加減八味丸

方見作渴門

十全大補湯

方見潰瘍發熱門

清心蓮子飲

方見下疳門

清心蓮子飲

方見下疳門

薛氏醫按

涼膈散 方見作渴門

二神丸 方見作嘔門

六君子湯 方見作嘔門

參苓白朮散 方見痔漏門

金銀花散 方見作嘔門

托裏散 方見腫瘍門

小柴胡湯 方見瘰癧門

托裏消毒散 方見腫瘍門

荆防敗毒散 方見潰瘍發熱門

十宣散 方見發背門

八珍湯 方見潰瘍發熱門

香砂六君子湯 方見作嘔門

卷二終

外科發揮卷之三

薛氏醫按

吳郡薛 已著

新都吳玄有校

贅疽

焮痛或發熱者祛風清熱

焮痛發寒熱或拘急者發散表邪

作膿焮痛者托裏消毒

膿已成作痛者針之

不作膿或膿成而不潰者並以托裏

不斂或膿清者宜峻補

一男子患此焮腫作痛發熱以小柴胡湯加連翹金銀花桔梗

四劑而消

薛氏醫按

一男子因怒後髮際腫痛發熱以小柴胡湯加連翹金銀花天花粉桔梗四劑根畔俱消惟瘡頭作痛以仙方活命飲二劑痛止膿成針之更以托裏消毒藥而愈

一男子頭面焮腫作痛時仲冬脉弦緊以托裏溫經湯汗之而愈
一男子腫痛寒熱拘急脉浮數以荆防敗毒散二劑表證悉退更以托裏消毒散潰之而安

一男子膿熱不潰脹痛針之而止更以托裏消毒散而愈凡瘡膿熱不潰屬氣血虛也若不托裏必致難痊

一男子作膿痼痛發嘔少食以仙方活命飲一劑而止以六君子湯加當歸桔梗皂角刺潰而愈

一男子膿清不飲以托裏散加五味子麥門冬而飲
一老人腫痛發熱膿清作渴脉軟而濇此血氣俱虛也欲補之

彼見作渴發熱乃服降火之劑果作嘔少食復求治投六君子

湯四劑嘔止食進仍用補藥月餘而愈夫患者臟腑氣血上下

各有虛實詳見清瘍作痛第十三條况陰證似陽陽證似陰治驗見外豈可

以發熱作渴而槩用寒涼之劑常治患者正氣虛邪氣實以托

裏為主消毒佐之正氣實邪氣虛以攻毒為主托裏佐之正氣

虛邪氣實而專用攻毒則先損胃氣宜先用仙方活命飲托裏

消毒散或用灸法俟邪氣退正氣復更酌量治之大抵正氣奪

則虛邪氣勝則實蓋邪正不並立一勝則一負其虛不待損而

自虛矣若發背腦疽疔毒及患在四肢必用灸法按引鬱毒以

行麻痺尤不可專於攻毒診其脉而辨之庶不有悞○如福泉

黃吏部肩患毒發熱惡寒大渴煩躁似有餘之證其脉雖大而

無力却屬不足用當歸補血湯治之○吾鄉周都憲兩腿作痛

形體清癯肝脉弦數却屬有餘之證用龍膽瀉肝湯治之並愈
齊氏云瘡腫之證若不診候何以知陰陽勇怯血氣聚散邪又
云脉洪大而數者實也細微而數者虛也河間云脉沉實者其
邪在臟浮大者其邪在表觀此誠發前人之未發診候之道其
可缺邪

一男子腫焮痛甚發寒熱服十宣散愈熾診之脉數而實此表
裏俱有邪也以荆防敗毒散加芩連大黃二劑少愈更以荆防
敗毒散四劑而消大抵瘡瘍之證腫焮痛甚寒熱往來或大便
秘結小便淋心神憤悶恍惚不寧皆邪熱之實也豈可補哉東
垣云瘡疽之發其受之有內外之別治之有寒溫之異受之外
者法當托裏以溫劑反用寒藥則是皮毛始受之邪引入骨髓
受之內者法當疎利以寒劑反用溫劑托裏則是骨髓之病上
徹皮毛表裏通潰共為一瘡助邪為毒苦楚百倍輕則危重
則死矣

附方

小柴胡湯 方見

荆防敗毒散 方見瘡瘍發熱門

托裏消毒散 方見腫瘍門

仙方活命飲 方見發背門

托裏散 方見腫瘍門

六君子湯 方見作嘔門

托裏溫經湯 治寒覆皮毛憊遏經絡不得伸越熱伏榮中聚
結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭面腫痛焮甚更三

麻黃

升麻

防風

乾葛

白芷

當歸

蒼朮

人參

芍藥

甘草

各一錢

作一劑水二鍾煎一鍾服臥於暖處得汗乃散

八珍湯

方見潰瘍發熱門

龍膽瀉肝湯

方見下疳門

十宣散

方見腫瘍門

當歸補血湯

方見潰瘍門

時毒

謂毒發於面鼻耳頂

裏實而不利者下之

表實而不解者散之

表裏俱實而不解者解表攻裏

表裏俱解而不消者和之

種甚熾痛者砭去惡血更用消毒之劑

不作膿或不潰者托之

飢年普患者不宜用峻利當審而治之

一男子患此腫痛發熱作渴脉實便秘以五利大黃湯下之諸證悉退以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一男子表裏俱解腫痛尚不退以葛根升麻湯二劑而消

一男子腫痛寒熱脉浮數以荆防敗毒散二劑少愈以人參

敗毒散二劑勢減半又二劑而痊

一男子耳面赤腫作痛咽乾發熱脉浮數先以荆防敗毒散二

劑勢退大半又以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一婦人表邪已解腫尚不消診之脉滑而數乃瘀血欲作膿也

以托裏消毒散潰之而愈

一男子熾腫脹痛作渴煩熱便秘脉數按之尤實用防風通聖

散一劑諸證頓退以荆防敗毒散加玄參牛蒡子黃芩二劑而
一老人冬月頭面耳項俱腫痛甚便秘脉實此表裏俱實病也
飲防風通聖散不應遂砭患處出黑血仍投前藥即應又以荆
防敗毒散而瘰癧前藥不應者毒血凝聚上部經絡藥力難達
故也惡血既去其藥自効拘用寒遠寒及年高畏用硝黃而
用托裏與夫尋常消毒之劑或不砭泄其毒專假藥力鮮不
一男子表裏俱解惟腫不消以托裏消毒散四劑膿成針之愈而
一婦人腫痛用硝黃之劑攻之稍緩翌日復痛診之外邪已退
此瘀血欲作膿也用托裏消毒散潰之而愈

一男子頭面腫痛服硝黃敗毒之劑愈甚診之脉浮數邪在表
尚未解用荆防敗毒散二劑勢退大半更以葛根牛蒡子湯四
劑而痊內經云身半已上腫天之氣也身半已下腫地之氣也

乃邪客心肺之間上攻頭目而為腫此感四時不正之氣為
與夫膏粱積熱之證不同硝黃之劑非大便秘實不可用若不
審其因不辨其虛實表裏槩用攻之必致有悞常見饑饉之際
芻蕘之人多患之乃是胃氣有損邪氣從之為患不可不察予
常治邪在表者用葛根牛蒡子湯人參敗毒散或普濟消毒飲
子邪在裏者五利大黃湯梔子仁湯表裏俱不解者防風通氣
散表裏俱解而腫不退者犀角升麻湯如腫甚者砭患處出惡
血以泄其毒或用通氣散取嚏以泄其毒十日後自愈若嚏出
膿血即愈欲其作膿者用托裏消毒散欲其收斂者用托裏散
此法最為穩當五七日咽喉腫閉言語不出頭面不腫食不知
味者不治

一男子服表散藥愈熾發熱便秘診其脉沉實此邪在裏也以

大黃湯下之裏證悉退以葛根半勞子湯浮腫亦消惟赤腫尚存更以托裏藥潰之而愈齊氏云時毒者為四時邪毒之氣而感之於人也其候發於鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人增寒發熱頭痛或肢體痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞人不識者將為傷寒便服解藥一二日腫氣增益方悟始求瘡醫原夫此疾古無方論世俗通為丹瘤病家惡言時毒切恐傳染者之於經曰人身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所為與夫時毒特不同耳蓋時毒初狀如傷寒五七日間乃能殺人治者宜精辨之先診其脉滑數浮洪沉緊弦濇皆其候也蓋浮數者邪氣在表也沉濇者邪氣深也氣實之人急服化毒丹以攻之熱實不利大黃湯下之其有表證者解毒升麻湯以發之或年高氣軟者五香連翹湯主之又於鼻內噤通氣散取十餘噓作効若噤藥不噓者不可治如噓出膿血者治之必愈左右看病之人每日用噤藥噓之必不傳染其病人每日亦用噤藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下猶宜和解之服犀角連翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃耆散宜針鏤砭割出血泄其毒氣十日外不治自愈也此病若五日已前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者必死治之無功矣然而此疾有陰有陽有可汗有可下常見麓工但云熱毒就用寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審矣

附方

五利大黃湯

治時毒愀腫赤痛煩渴便秘脉實數

大黃煨

黃芩

升麻各二錢

芒硝

梔子

各一錢二分

作一劑水一鍾半煎六分空心熱服

梔子仁湯 治時毒腫痛大便秘結脉沉數

鬱金

枳殼

升麻

山梔仁

牛蒡子

炒

大黃

等分

右為細末每服三錢蜜水調下

荆防敗毒散 治時毒腫痛發熱左手脉浮數

即人參敗毒散加防風荆芥 方見潰瘍發熱門

葛根牛蒡子湯 治時毒腫痛脉數而少力者

葛根

管仲

甘草

江西豆豉

牛蒡子

半生梓炒各二錢

作一劑水一鍾半煎八分食後服

防風通聖散 治時毒腫痛煩躁表裏脉證俱實

方見一瘡門

人參敗毒散 方見潰瘍發熱門

托裏消毒散

治時毒表裏俱解腫尚不退欲其作膿

普濟消毒飲

治時毒疫癘初覺增寒體重次傳頭面腫痛或

咽喉不利舌乾口燥

黃芩

黃連

人參

橘紅

玄參

甘草

柴胡

桔梗

連翹

鼠粘子

板藍根

馬勃

白殭蠶

升麻

作一劑水二鍾煎一鍾去粗稍熱食後徐徐服之如大便硬

加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫勢甚者宜砭刺之去血

通氣散 治時毒喉腫咽喉不利取嚏以泄其毒

玄胡索

猪牙皂角

川芎

藜蘆

五分

羊躑躅花

二分

右為細末用紙撚蘸少許絛於鼻內取嚏為効

托裏散 方見腫瘍門

疔瘡

脉浮數者散之

脉沉實者下之

表裏俱實者解表攻裏

麻痺或大痛及不痛者並灸之更兼攻毒

一男子足患作痒惡心嘔吐時發昏亂脉浮數明灸二十餘壯始痛以奪命丹一服腫起更以荆防敗毒散而愈

一男子患之發熱煩躁脉實以清涼飲下之而愈

一男子胃患之遍身麻木脉數而實急針出惡血更明灸數壯始痛服防風通聖散得利而愈

一男子左手背患之是日一臂麻木次日半體皆然神思昏憤

遂明灸至二十餘壯尚不知痛又三十餘壯始不麻至百壯始痛以奪命丹一服腫始起更用神異膏及荆防敗毒散而愈

一老婦足大指患之甚痛令灸之彼不從專服敗毒藥致真氣虛而邪氣愈實竟至不救蓋敗毒散雖能表散瘡毒然而感有表裏所發有輕重體段有上下所稟有虛實豈可一槩而用之耶且至陰之下藥力在所難到專假藥力則緩不及事不若灸之爲良故下部患瘡皆宜隔蒜灸之痛則灸至不痛不痛則灸至痛若灸之而不痛者宜明灸之及針疔四畔去惡血以奪命丹一粒入瘡頭孔內仍以膏藥貼之若針之不痛或無血者以針燒赤頻烙患處以痛爲度或不痛眼黑如見火光者此毒氣入臟腑也不治若患在手足紅絲攻心腹者就於絲盡處刺去惡血宜服荆防敗毒散若絲近心腹者宜挑破瘡頭去惡水亦

以膏藥貼之如麻木者服奪命丹如牙關緊急或喉內患者並宜噙一二丸凡人暴死多是疔毒用燈照看遍身若有小瘡卽是宜急灸之俟醒更服敗毒藥或奪命丹人汗入肉食之則生疔瘡不可不慎

附方

荆防敗毒散 卽人參敗毒散加荆芥防風 方見潰瘍發熱門
奪命丹 治疔瘡發背及惡證不痛或麻木或嘔吐重者昏憤

此藥服之不起發者卽發不痛者卽痛痛甚者卽止昏憤者卽甦嘔吐者卽解未成者卽消 者卽潰有回生之功乃惡證之中至寶也

蟾酥 乾者輕粉各半 白礬 枯 寒 石脂 銅綠
乳香 沒藥 麝香 各一錢 硃砂 蝸牛 二十箇另研無灰

右爲細末將蝸牛別碾爛入藥末搗勻爲丸如棗豆大如丸不就入酒糊些小每服一二丸用生葱白三五寸病者自嚼爛吐於手心男左女右包藥在內用熱酒和葱送下如人行五七里汗出爲効重者再服一二丸

清涼飲

隔蒜灸法 二方見發背門

神效膏 方見楊梅瘡門

腎癰 附腿癰并腿痛脚氣

瘰癧 瘰癧尺脉緊而無力者托之

腫硬痛甚者隔蒜灸之更以解毒

不作膿而痛者解毒爲主

不作膿者托裏爲主

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

不潰或潰而不斂者托裏為主

一男子臀癰腫硬作痛尺脉浮緊按之無力以內托羌活湯一劑痛止以金銀花散四劑膿潰而愈

一男子臀癰腫硬痛甚隔蒜灸之更服仙方活命飲二劑痛止腫消以托裏消毒散加黃柏蒼朮羌活瘡頭潰之而愈

一男子臀癰作膿而痛以仙方活命飲二劑痛止更以托裏消毒散膿潰而瘡

一男子臀癰不作膿飲食少思先用六君子湯加芎歸黃耆飲食漸進更以托裏消毒散膿潰而愈

一男子潰而膿清不斂以豆豉餅灸之更飲十全大補湯兩月餘而痊凡瘡不作膿或不潰或潰而不斂皆氣血之虛也若膿清稀尤其虛甚也虛實詳見潰瘍作痛門

一男子臀癰膿水不止肌肉漸瘦飲食少思胃脉微弦以六君子湯加藿香當歸數劑飲食遂進飲以十全大補湯及豆豉餅灸之兩月餘而斂

一弱人臀癰膿成不潰以十全大補湯數劑始托起乃針之又二十餘劑而愈夫臀居僻位氣血罕到老弱人患之尤宜補其氣血庶可保痊

一男子腿內側患癰未作膿而腫痛以內托黃芪柴胡湯二劑少愈又二劑而消

一男子臀漫腫色不變脉滑數而無力此臀癰也膿將成尚在內予欲治以托裏藥待發出而用針彼欲內消服攻伐藥愈虛復求治仍投前藥托出針之以大補藥而愈凡瘡毒氣已結不起者但可補其氣血使膿速成而針去不可論內消之法膿成

又當辨其生熟淺深而針之若大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也按之即復起者有膿也按之不復起者無膿也若腫高而軟者發於血脉腫下而堅者發於筋骨肉色不相變者發於骨髓也

一男子腿外側患癰漫腫大痛以內托黃芪酒煎湯二劑少可更以托裏散數劑潰之而愈

一婦人腿癰久而不愈瘡口紫陷膿水清稀予以爲虛彼不信乃服攻毒之劑虛證蜂起復求治令灸以附子餅服十全大補湯百餘貼而愈凡瘡膿清及不斂者或陷下皆氣血虛極也最宜大補否則成敗證若更患他證尤難治療

一男子腿癰內潰針之膿出四五碗許惡寒畏食脉診如絲此陽氣微也以四君子湯加炮附子一錢服之寒少止又四劑而

止以六君子湯加桂數劑飲食頓進乃以十全大補湯及附子餅兩月而愈

一老人腿患癰膿自潰忽發昏冒脉細而微此氣血虛極也以大補之劑而蘇○一弱人流注內潰出敗膿五六碗是時眼口歪斜脉亦虛極乃虛甚也非真中風以獨參湯加附子一錢二劑少愈更以大補藥月餘而痊大抵膿血大泄當大補氣血爲先雖有他證以末治之凡癰大潰發熱惡寒皆屬氣血虛甚若左手脉不足者補血藥當多於補氣藥右手脉不足者補氣藥當多於補血藥切不可發表

一婦人患腰痛脚弱弛長不能動履以人參敗毒散加蒼朮黃柏澤瀉而愈

一婦人環跳穴作痛肉色不變脉緊數此附骨疽也膿未成用

龍胆散

內托黃芪酒煎湯加青皮龍膽草山梔數劑而消

一男子患腿癰兼筋變痛脉弦緊用五積散加黃柏柴胡蒼朮治之而痊

一婦人患附骨疽久不愈膿水不絕皮膚瘙癢四肢痿軟予以爲虛欲補之彼惑爲風疾遂服祛風藥竟致不起陳無擇云人身有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓以成其形內則有心肝脾肺腎以主之若隨情妄用喜怒勞佚致內藏精血虛耗使皮血筋骨肉痿弱無力以運動故致痿痺狀與柔風脚氣相類柔風脚氣皆外所因痿則內藏不足之所致也

一男子患附骨疽腫硬發熱骨痛筋攣脉數而沉用當歸拈痛湯而愈

一男子腿根近環跳穴患痛徹骨外皮如故脉數而帶滑此附

骨疽膿將成用托裏藥六劑腫起作痛脉滑數膿已成針之出血

碗許更加補劑月餘而瘳

一男子腿內患癰漫腫作痛四肢厥咽喉塞發寒熱諸治不應乃邪鬱經絡而然也用五香連翹湯一劑諸證少退又服六便行二次諸證悉退而愈

一婦人兩腿作痛不能伸展脉弦緊按之則瀉先以五積散二劑痛少止又一劑而止更以神應養真而能伸屈

一男子患腿痛膝微腫輕診則浮按之弦緊此鶴膝風也與大防風湯二劑已退二三夜謂附子有毒乃服敗毒藥日漸消瘦復求治予謂今飲食不爲肌膚水穀不能運化精微灌漑臟腑週身百脉神將何依然以氣短而促真氣損也怠惰嗜臥脾氣衰也小便不禁膀胱不藏也時有躁熱心下虛痞胃氣不能上

榮也恍惚健忘神明亂也不治後果然此證多患於不足之人故以加減小續命大防風二湯有效若用攻毒藥必誤

一婦人患脚氣或時腿腫筋攣腹作痛諸藥不應漸危篤諸書云八味丸治足少陰脚氣入腹疼痛上氣喘促欲死遂投一服頓退又服而愈腎經虛寒之人多有此患乃腎乘心水尅火死不旋踵宜急服

一男子腿痛兼筋攣骨痛脉弦緊以大防風湯二劑變少愈又二劑而腫消但內一處尚作痛脉不弦緊此寒邪已去乃所滯瘀濁之物欲作膿故痛不止也用托裏藥數劑腫發起脉滑數乃膿已成矣針之用十全大補湯月餘而安

一婦人膝腫痛遇寒痛益甚月餘不愈諸藥不應脉弦緊此寒邪深伏於內也用大防風湯及火龍膏治之而消大抵此證雖

云腫有淺深感有輕重其所受皆因真氣虛弱邪氣得以深蘊若真氣壯實邪氣焉能為患邪故附骨癰疽及鶴膝風證腎虛者多患之前人用附子者以溫補腎氣而又能行藥勢散寒邪也亦有體虛之人秋夏露臥為冷氣所襲寒熱伏結多成此證不能轉動乍寒乍熱而無汗按之痛應骨者是也若經久不消極陰生陽寒化為熱而潰也若被賊風所傷患處不甚熱而酒漸惡寒不時汗出熨之痛少止須大防風湯及火龍膏治之若失治為彎曲偏枯有堅硬如石謂之石疽若熱緩積日不潰肉色赤紫皮肉俱爛名緩疽其始末皆宜服前湯欲其驅散寒邪以補虛托裏也

一男子右腿赤腫焮痛脉沉數用當歸拈痛湯四肢反痛乃濕毒壅遏又況下部藥難達非藥不對症遂投患處去毒血仍用

前藥一劑頓減又四劑而消

一男子先腿痛後四肢皆痛遊走不定至夜益甚服除濕敗毒之劑不應診其脉滑而濇此濕痰濁血爲患以二陳湯加蒼朮羌活桃仁紅花牛膝草烏治之而愈凡濕痰濕熱或死血流注關節非辛溫之劑開發腠理流通隧道使氣行血和焉能得愈一男子腿痛每痛則痰盛或作嘈雜脉滑而數以二陳湯加升麻二朮澤瀉羌活南星治之而安

一男子素有脚氣脇下作痛發熱頭暈嘔吐腿痺不仁服消毒護心等藥不應左關脉緊右關脉弦此亦脚氣也以半夏左經湯治之而愈

一男子脚軟腫痛發熱飲冷大小便秘右關脉數乃足陽明經濕熱流注也以大黃左經湯治之而愈

一男子膝脛兼踝脚皆厥冷治以加味敗毒而愈

一男子兩腿痛脉滑而遲此濕痰所致以二陳湯加二朮黃柏羌活澤瀉治之而消

一男子兩腿腫痛脉滑而緩此濕痰所致也先以五苓散加蒼朮黃柏二劑少愈更以二陳二朮檳榔紫蘇羌活獨活牛膝黃柏而瘥夫濕痰之證必先以行氣利濕健中爲主若中氣和則痰自消而濕亦無所容矣

一婦人兩腿痛脉濇而數此血虛兼濕熱先以蒼朮黃柏知母龍膽草茯苓防風防已羌活數劑腫痛漸愈又以四物湯加二朮黃柏牛膝木瓜月餘而愈

一男子肢節腫痛脉遲而數此濕熱之證以荆防敗毒散加麻黃二劑痛減半以枳榔敗毒散四劑腫亦消更以四物湯加二

木牛膝木瓜數劑而愈

一婦人脚脛腫痛發寒熱脉浮數此三陽經濕熱下注爲患尚在表用加味敗毒散治之不應乃瘀血凝結藥不能及也於患處砭去瘀血乃用前藥二劑頓退以當歸拈痛湯四劑而愈楊大受云脚氣是爲癰疾治法宜宣通之使氣不能成壅也壅既成而甚者砭去惡血而去其重勢經云膏則腫熱砭射之後以藥治之

一婦人兩腿痛遇寒則筋攣脉弦而緊此寒邪之證以五積散對四物湯數劑痛止更以四物湯加木瓜牛膝枳殼月餘而愈

一男子腿腫筋攣不能動履以交加散二劑而愈

一婦人患腿痛不能伸屈遇風寒痛益甚諸藥不應甚苦先以活絡丹一丸頓退又服而廖次年復痛仍服一丸亦退大半更

以獨活寄生湯四劑而愈

一男子素有脚氣又患附骨癰作痛服活絡丹一丸二證並瘳○上舍俞魯用素有疝不能愈因患腿痛亦用一丸不惟腿患有效而疝亦得愈矣○西蜀彭黃門大安人臂痛數年二丸而瘳○留都金二守女患驚風甚危諸醫皆勿救自用一丸卽愈且不再作夫病深伏在內非此藥莫能通達但近代始云此藥引風入骨如油麵之說故後人多不肯服大抵有是病宜用是藥豈可泥於此言以致難瘳

一婦人兩腿作痛時或走痛氣短自汗諸藥不應診之尺脉弦緩此寒濕流注於腎經也以附子六物湯治之而愈但人謂附子有毒多不肯服若用童便炮製何毒之有况不常服何足爲慮予中氣不足以補中益氣湯加附子服之三年何見其毒也

經云有是病用是藥

一婦人肢節腫痛脛足尤甚時或目汗或頭痛此太陽經濕熱所致用麻黃左經湯二劑而愈

一婦人患血痔兼腿酸痛似痺此陰血虛不能養於筋而然也宜先養血為主遂以加味四斤丸治之而愈

一老人筋攣骨痛兩腿無力不能步履以局方換腿丸治之○

一婦人筋攣痺縱兩腿無力不能步履以三因勝駿丸治之並愈河間云脚氣由腎虛而生然婦人亦有病脚氣者乃因血海虛而七情所感遂成斯疾今婦人病此亦眾則知婦人以血海虛而得之與男子腎虛類也男女用藥固無異更當兼治七情無不効也

一婦人患腿痛兼足脛攣痛服發散藥愈甚脉弦緊此腎肝虛

弱風濕內侵也以獨活寄生湯治之痛止更以神應養真丹而弗攣矣

一男子素有腿痛飲食過傷痛益甚倦怠脉弱以六君子湯加山查神麴蒼朮芎歸升麻柴胡而愈

一老人素善飲腿常腫痛脉洪而緩先以當歸拈痛湯候濕熱少退後用六君子湯加蒼朮黃柏澤瀉治之而痊

一男子每飲食少過胸膈痞悶或吞酸兩腿作痛用導引丸二服頓愈更以六君子湯加神曲麥芽蒼朮二十餘劑遂不復作河間云若飲食自信脾胃乃傷則胃氣不能施行脾氣不能四布故下流乘其肝腎之虛以致足腫加之房事不節陽虛陰盛遂成脚氣亦有內傷飲食脾胃之氣有虧不能上升則下注為脚氣者宜用東垣開結導引丸開導引水運化脾氣如脾氣虛

濕氣壅遏不通致面目發腫或痛者宜用導滯通經湯以疎導之已上十九條乃脚氣證雖非瘡毒因治有驗故錄之

附方

內托羌活湯 治凡腎患癰堅硬腫痛兩尺許緊按之無力

羌活

黃柏各二錢

防風

當歸尾

藁本各一錢

肉桂一錢

連翹

甘草炙

蒼朮米泔浸炒

陳皮各半錢

黃芪鹽水拌炒一錢半

作一劑水酒各一鍾煎至八分食前服

隔蒜灸法

槐花酒

仙方活命飲三方見發背

金銀花散方見作嘔門

托裏消毒散方見腫瘍門

六君子湯方見作嘔門

豆豉餅 治瘡瘍腫硬不潰及潰而不斂并一切頑瘡惡瘡用

江西豆豉為末埋津和作餅子如錢大厚如三文置患處以

艾壯於餅上灸之餅若乾再用唾津和作如背瘡大用漱口

水調作餅覆患處以艾鋪餅上燒之如未成者用之即消已

成者雖不全消其毒頓減前人俱稱有奇功不可忽之

十全大補湯方見潰瘍發熱門

獨參湯方見杖瘡門

內托黃芪柴胡湯 治濕熱腿內近膝股患癰或附骨癰初起

腫痛此太陰厥陰之分位也脉細而弦按之洪緩有力

黃芪蓋水拌炒二錢

柴胡

上瓜根各一錢 羌活五分

薛氏醫案

外科發背癰疽

乾

用酒

自以醫錄 卷之三

連翹 一錢五分 肉桂 各三 生地黄 各三 當歸尾 八分

黃柏 五分

作一劑水酒各一鍾煎八分空心熱服

內托黃芪酒煎湯 治寒濕腿外側少陽經分患癰或附骨癰

堅硬漫腫作痛或侵足陽明經亦治之

黃芪 鹽水拌炒二錢 柴胡 一錢 連翹 肉桂 各一錢

黃柏 五分 大力子 錢少 當歸尾 二錢 升麻 七分

甘草 炒五分

作一劑水酒各一鍾煎八分食前服

附子餅 治潰瘍氣血虛不能收斂或風邪襲之以致氣血不

能運於瘡所不能收斂用炮附子去皮臍研末以唾津和為餅置瘡口處將艾壯於餅上灸之每日灸數壯但令微熱勿

令痛如餅乾用唾津和做以瘡口活潤為度

四君子湯 治脾胃不健飲食少思肌肉不生肢體倦怠

人參 茯苓 白朮 炒各二錢 甘草 炙五分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

人參敗毒散 方見潰瘍發熱門

五積散 治風寒濕毒客於經絡致筋變骨痛或腰脚酸疼或

拘急或身重痛並治之

蒼朮 二錢半 桔槓 炒一錢二分 陳皮 去白六分 白芷 三分

甘草 炙 當歸 酒拌 川芎 芍藥 炒

半夏 薑製 茯苓 去皮各三分 麻黃 去節六分 乾薑 炮四分

枳殼 麩炒六分 桂心 一錢 厚朴 薑製四分

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎一鍾服

薛氏醫案 卷之三 附錄

當歸拈痛湯 治濕熱下注腿脚生瘡或膿水不絕或赤腫或
痒痛或四肢遍身重痛

羌活 五錢

人參

苦參 酒製

升麻

葛根

蒼朮 各二錢

甘草 炙

黃芩 酒拌

茵陳 酒炒 各五錢

防風

當歸身

知母 酒炒

澤瀉

猪苓 各三錢

白朮 一錢

作四劑水二鍾煎一鍾空心并臨睡服之

大防風湯 治三陰之氣不足風邪乘之兩膝作痛久則膝大
腿愈細因名曰鶴膝風乃敗證也非此方不能治又治痢後
脚痛緩弱不能行步或腿膝腫痛

附子 一錢

白朮 炒

羌活

人參 各二錢

川芎 一錢

防風 二錢

甘草 炙 一錢

牛膝 酒浸 一錢

當歸 二錢

黃芪 炙 二錢

白芍藥 炒 二錢

杜仲 薑製 三錢

熟地黃 用生者酒拌蒸半日忌鐵器 二錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分空心服愈後尤宜謹調攝更
服還少丹或加桂以行地黃之滯若脾胃虛寒之人宜服九

補中益氣湯 方見潰瘍發熱門

火龍膏 治風寒濕毒所襲筋攣骨痛或肢節疼痛及濕痰流

注經絡作痛或不能行步治鶴膝風歷節風疼痛其效尤速

生薑 八兩

乳香 為末

沒藥 為末 各五錢

麝香 為末 一錢

真牛皮膠 二兩切碎用廣東者

先將薑汁并膠溶化方下乳香沒藥調勻待少溫下麝香即
成膏矣攤貼患處更服五積散如鶴膝風須服大防風湯

二陳湯 和中理氣健脾胃消痰進飲食

薛氏醫案

外科發源卷之三

九

用前法

半夏薑製

陳皮炒

茯苓各一錢五分

甘草炙五分

作一劑水一鍾薑三片煎六分食遠服

半夏左經湯

治足少陽經為四氣所乘以致發熱腰脇疼痛

頭目眩暈嘔吐不食熱悶煩心腿痺縱緩

半夏薑製

乾葛

細辛

白朮

麥門冬去心

茯苓

桂心去皮

防風

乾薑炮

黃芩

柴胡

甘草炙各一錢

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

大黃左經湯

治四氣流注足陽明經致腰脚去腫痛不可行

大小便秘或食氣喘滿自汗

細辛

茯苓

羌活

大黃煨

甘草炙

前胡

枳殼

厚朴薑製

黃芩

杏仁去皮尖炒

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

加味敗毒散

治足三陽經受熱毒流於脚踝焮赤腫痛寒熱

如瘡自汗短氣小便不利手足或無汗惡寒

羌活

獨活

前胡

柴胡

枳殼

甘草

人參

茯苓

川芎

大黃

蒼朮各一錢

作二劑水二鍾薑三片煎八分服

附子六物湯

治四氣流注於足太陰經骨節煩痛四肢拘急

自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子

防已各四錢

甘草炙二錢

白朮

茯苓各三錢

桂枝四錢

作二劑水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

八味丸

治命門火衰不能上生脾土致脾胃虛弱飲食少思

或食不化日漸消瘦及虛勞渴欲飲水腰重疼痛小腹急痛

小便不利及腎氣虛寒臍腹作痛夜多旋溺脚膝無力肢體

即腎氣丸每料加肉桂一兩附子一兩其附子每日用新

童便數碗浸五六日切作四塊再如前浸數日以草紙包

裏將水濕紙炮半日去皮臍尖切作大片如有白星再用

火灸以無白星為度一兩凡用俱要照此法炮過方宜用

四物湯方見瘰癧門每服五十九空心鹽湯下

交加散 治風寒濕毒所傷腿脚疼痛或筋攣骨痛及腰背攣

痛或頭痛惡寒拘急遍身疼痛一切寒毒之證並効

即五積散方見瘰癧門對人參敗毒散方見潰瘍發熱門

檳榔 木瓜各一錢 香附子 紫蘇各三分

陳皮 甘草各一錢

作一劑水一鍾半薑三片葱白三莖煎一鍾空心服

麻黃左經湯 治風寒暑濕流注足太陽經腰足攣痺關節重

痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛

麻黃去節 乾葛 茯苓 蒼朮米泔洗 防已酒拌

桂心 羌活 防風 細辛 甘草炙各一錢二分

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

加味四斤丸 治肝腎二經氣血不足足膝酸痛步履不隨如

受風寒濕毒以致脚氣者最宜服之

重 用前法

虎脰骨

酥炙一兩

乳香

另研各五錢

肉蓯蓉

川牛膝

一兩五錢

木瓜

一斤去穢蒸

餘為末將木瓜蓯蓉搗膏加酒糊和頓熟杵九梧桐子大每

服七八十丸空心溫酒或鹽湯任下

局方換腿丸

治足三陰經為四氣所乘痺痺緩縱或上攻胸

脇肩背或下注脚膝作痛足心發熱行步艱辛

薏苡仁

南星

石楠葉

石斛

檳榔

草薢

川牛膝

羌活

防風

木瓜

黃芪

當歸

天麻

續斷各一兩

為末酒糊丸梧桐子大每服五十丸鹽湯送下

五香連翹散

方見腫瘍門

三因勝驗丸

治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足攣拳或脚

面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯筋骨

附子

炮法見八味丸

天麻

牛膝

木香

酸棗仁

炒

熟地黃

用生者酒拌蒸半日忌鐵器杵膏

防風

木瓜

羌活

乳香

各五錢

麝香

全蝎

沒藥

甘草

炙各一兩

為末用生地黃三斤用無灰酒四升煮乾再晒二日杵爛如膏入前末和勻杵千餘下每兩作十丸每服一丸細嚼臨臥

酒下作小丸服亦可

大神効活絡丹

方見奇効良方風門

獨活寄生湯

治肝腎虛弱風濕內攻兩脛緩縱攣痛痺弱足

膝攣重

獨活

白茯苓

杜仲

薑製

當歸

酒洗

防風

芍藥炒

人參

細辛

桂心

芎藭

秦朮

牛膝酒拌

桑寄生真者各錢五分

地黃用生者酒拌蒸半日忌鐵器一錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食前服

神應養真丹 治厥陰經為四氣所襲脚膝無力或左癱右瘓

半身不遂手足頑麻語言蹇澀氣血凝滯遍身疼痛

當歸酒浸片時搗膏 川芎

熟地黃製如芍藥

羌活

天麻

羌活酒製為末 木瓜各等分

右為末入地黃當歸二膏加蜜九梧子大每服百丸空心酒

下鹽湯亦可

開結導引丸 治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛

白朮炒

陳皮炒

澤瀉

茯苓

神麴炒

麥蘖炒

牛夏薑製各一兩

枳實炒

巴豆霜各錢五分 青皮

乾薑各錢五分

為末湯浸蒸餅丸如梧子大每服四五丸凡十九溫水下此

內傷飲食脾胃營運之氣有虧不能上升則注為脚氣故用

此導引行水化脾氣也

導滯通經湯 治脾經濕熱壅遏不通面目手足作痛即五苓

散內減諸苓各桂加木香陳皮每服三錢滾湯下

五苓散 治下部濕熱瘡毒或浮腫小便赤少

澤瀉

肉桂去粗

白朮

猪苓

赤茯苓去皮各等分

為細末每服一錢熱湯調服不拘時

托裏散 方見腫瘍門

龍氏醫書

卷之八

三

五

