共四十二

外科抱要

三四止

七

帝武9
384
37

武ヤ門 584 37

吳郡薛　已著
新都吳玄石校

腎癰　男婦仝用

腎膀胱經部分也居小腹之後此陰中之陰其道遠其位僻雖太陽多血氣運難及血亦罕到中年後尤慮此患治者毋傷脾胃毋損氣血但當固根本爲主若瘤硬作痛者形氣虛而邪氣實也用托裏消毒散主之微瘤微痛者形氣病氣俱虛也用托裏散補之欲作膿用托裏消毒散若脾虛不能消散或不潰不斂者六君子加芎歸黃芪若陰虛不能消散或作渴便溏者六味九加五味子若陽虛不能潰或膿清不能斂者用補中益氣湯氣血俱

虛者十全大補湯若瘡硬未成膿者用隔蒜灸活命飲潰後豆豉餅補中益氣十全大補二湯若灸後大勢已退飲毒未消頻用葱熨以補其氣以消餘毒爲善

治驗

巡撫陳和峯脾胃不健常服消導之劑左腿股及臀患瘡余曰此脾氣虛而下注非瘡毒也當用補中益氣倍加白朮彼惑於衆論云白朮能潰膿乃專以散瘡消毒爲主而瘡益甚體益倦余用白朮一味煎飲而消

儒者楊啓元大臀患此疽貼涼藥腫徹內股服連翹消毒散左體皆痛余以爲足三陰虧損用補中益氣湯以補脾肺用六味丸加五味以補肝腎股內消而臀間潰又用十全大補湯而瘡口斂

一儒者腫瘍痛甚此邪毒壅滯用活命飲隔蒜灸而消後因飲食勞倦瘡痛仍作寒熱頭疼此元氣虛而未能復也與補中益氣湯頻用葱熨法兩月而愈

一男子漫腫而色不變脈滑數而無力膿將成矣余用托裏而欲針彼畏針而欲內消誤用攻伐之藥頓加惡寒發熱自汗等症余用十全大補湯數劑瘡起色赤仍外針內補而愈

一婦產吳輔之父患此內潰瘡脹發熱口乾飲食少思此脾胃虛弱也先用六君加芎歸芪數劑而潰又用十全大補湯倍加參芪五十餘劑而愈

南濠沈克章子年三十脈如屋漏崔氏啄腫硬色夭膿水清稀誤服敗毒之藥余曰此足三陰虧損而藥復傷也余用六君加歸芪附子一錢二劑腫潰色赤又減附子五分數劑元氣復而瘡愈

一男子硬痛發熱此膀胱氣虛而濕熱壅滯用內托羌活湯二劑熱痛悉退後用托裏消毒散而潰又用托裏散四十餘劑而平湖袁上舍患痔外敷寒涼內服消毒攻潰於臀膿水清稀脈洪大而數寒熱作渴余辭不治後果殁此足三陰虧損之症失滋化源以致真氣益虛邪氣愈甚矣不死何俟

囊癰二　謂陰囊患癰

囊癰屬肝腎二經陰虛濕熱下注若小便澀滯者先分利以泄其毒繼補陰以令其自消若濕熱退而仍瘫痛宜補陰托裏以速其膿膿熯而便秘者熱毒壅閉也先用托裏消毒散後用針以泄之膿去即解若膿去而瘫痛不減者熱毒未解也用清肝養榮湯口乾而小便數者腎經虛熱也六味丸內熱晡熱者肝經血虛也四物加參朮體倦食少者脾氣虛熱也補中益氣湯

膿水清稀者氣血俱虛也十全大補湯此症雖大潰而睪丸懸露治得其法旬日肉漸生而愈若專攻其瘡陰道益虛則瘫者不能潰潰者不能斂少壯者多成痼疾老弱者多致不起亦有患痔漏久而串及於囊者當兼治其痔切忌寒藥剋伐虧損胃氣

治驗

給事陸貞山瘫赤脹痛小便澀滯寒熱作渴此肝腎陰虛濕熱下注也當清肝火除濕毒遂用柴胡炒龍膽吳茱萸炒黃連當歸銀花卓角刺赤芍藥防風木通甘草節一劑瘫痛漸退少加防風木通川萵茯苓作飲下滋腎丸以補陰其熱瘫俱退但內有一條筋不消此肝經血氣虛損也當滋腎水用六味丸料去茯苓加五味二劑再用補中益氣加茯苓作飲送滋腎丸筋頓消而愈

京兆朱三峰陰囊脹痛彼以爲疝余診其脉數而滑此囊癰也因肝腎二經陰虛濕熱所致膿已成矣服活命飲一劑而潰更用補陰托裏而斂

知州王汝道先晡熱發熱肢體倦怠入房則腿足酸軟足心熱至腿膝六脉洪數兩尺爲甚余以足三陰虛欲滋補化源彼反服苦寒降火之劑後陰囊瘡用治疝之藥瘡脹益甚形氣愈虛服溫補之劑瘡痛土攻小便不利兩尺脉洪滑按之虛甚余曰此囊癰也因氣血虛而不能潰先用補中益氣湯加山藥山茱萸車前子柴胡山梔一劑腫脹頓消隨用六味丸料加車前牛膝柴胡山梔一劑小便漸通乃用活命飲與前二藥消息兼用至二十餘劑囊裂出穢膿甚多乃用托裏消毒散六劑膿穢清又用托裏散數劑膿水漸少更用補陰托裏散及十全大補

五十餘劑而痊

儒者陳時用考試不利一夕飲燒酒入房妻不納翌日陰囊瘡脹煩痛遣人求治余以除濕熱清肝火之劑城門夜閉不及歸服至早報云夜來陰囊恐腐玉莖下面貼囊者亦腐此肝火挾酒毒而濕熱藏盛也仍以前藥加參芪歸朮四劑腐肉盡脫睾丸懸掛用大補氣血并塗當歸膏囊莖全復而愈

一膏粱之客陰囊瘡脹小便不利此中焦積熱乘虛下注先用龍膽瀉肝湯加黃柏知母黃連牛膝四劑漸愈後用補陰八珍湯加柴胡山梔而愈後不守禁忌前症復作仍用補陰八珍湯補中益氣湯六味丸而痊又因勞發熱自用四物黃柏知母之類虛症悉具瘡口開大余謂五臟氣血俱虛也朝用補中益氣夕用六君子加當歸各五十餘劑瘡口漸斂又用六味丸調補

全愈

府庠李達卿素腎虛發熱久服黃柏知母之類形體漸瘦遺精白濁脯熱唾痰余曰此脾水虧損虛火內熾用補中益氣之類加五味麥門前症將愈又別用清熱涼血之劑飲食少思唾痰不止余以爲脾肺復虛不能攝涎歸源仍用前湯加茯苓半夏而愈後入房頭暈吐痰腰骨作痛大小便道牽痛余曰此精已耗而復竭所致危殆之症也遂朝用前湯加麥門五味夕用六味丸料加五味子車辭五十餘貼諸症頓退後又入房陰囊陰莖作痛別用淡滲之劑陰囊內潰余用補陰托裏之劑出膿甚多喜痛消痛止竟不善調養以致大便不通小便如淋痰涎上湧余曰腎虛之症復作矣誠爲可慮有保其可生者用礞石滾痰丸牛黃清心丸之類吐痰愈加余曰非惟無以保其生而反促其危矣固辭不治後果效

一男子醉而入房陰囊腫脹大如斗小腹脹悶小水淋赤發熱口乾痰涎壅甚此膀胱陰虛酒毒所乘也用六味丸料加車前牛膝作飲下滋腎丸諸症頓退再加五味麥門二劑而愈却以補中益氣加麥門五味調理而康若用淡滲復損眞陰決致不起

懸癰三

懸癰謂瘡生於玉莖之後穀道之前屬足三陰虧損之症輕則爲漏瀝盡氣血而亡重則內潰而卽殞若初起濕熱壅滯未成膿而作痛或小便澁滯用龍膽瀉肝湯腫燬痛甚仙方活命飲並以製甘草佐之如此雖患亦輕雖積亦淺若不能成膿或膿成不潰者八珍湯補之若膿已成者急針之欲其生肌收歛腎虛者六味地黃丸血虛者四物加參朮氣虛者四君加芎歸脾

虛者補中益氣湯氣血俱虛者八珍湯并十全大補湯若用寒涼消毒則誤矣

治驗

尚寶鮑希傳足發熱服四物黃柏知母之類年餘患囊癰唾痰作渴飲湯其熱至膝更加芩連二陳熱痰益甚謂余曰何也余曰此足三陰虧損水泛爲痰寒涼之劑傷胃而甚耳遂先用補中益氣夕用六味丸間佐以當歸補血湯半載乃愈

趙州守患此症瘦多作痛五月餘矣晡熱口乾盜汗食少體倦氣短脉浮數而無力此足三陰氣血虧損用補中益氣加製首草五味麥門三十餘劑食進勢緩又用六味丸料五十餘劑膿潰瘡斂後因膿作痛少食脇痛發熱仍用前藥賴其稟實漸疾而愈

通府張敬之患前症久不愈日晡熱甚作渴煩喘或用四物湯黃柏知母之類前症益甚肢體倦怠少食大便不實小便頻數謂余曰何也余曰此脾虛之症前藥復傷而然余遂用補中益氣加茯苓半夏飲食漸進前症漸愈更加麥門五味調理乃痊經云脾屬太陰爲陰土而主生血故東垣先生云脾虛元氣下陷發熱煩渴肢體倦怠等症用補中益氣湯以升補陽氣而生陰血若誤認爲腎虛輒用四物黃柏知母之類反傷脾胃生氣是虛其虛矣況黃柏知母乃瀉陽損陰之劑若非膀胱陽火盛而不能生陰水以致發熱者不可用也

一儒者患此服坎離丸及四物黃柏知母之類不應脉浮洪按之細微余以爲足三陰虛用托裏散及補陰托裏散漸愈又用六味丸補中益氣湯調補化源半載而痊大凡瘡瘍等症若腎

經陽氣亢盛致陰水不能化生而患陰虛發熱者宜用坎離丸
取其苦寒能瀉水中之火令陽氣衰而水自生若陽氣衰弱致
陰水不能化生而患陰虛發熱者宜用六味丸取其酸溫能生
火中之水使陽氣旺則陰自生況此症屬腎經精氣虧損而患
者十有八九屬腎經陽氣亢盛而患者十無一二然江南之人
患之多屬脾經陰血虧損元氣下陷須用補中益氣湯升補陽
氣使陽生而陰長若嗜慾過多虧損眞水者宜用六味丸補腎
經元氣以生精血仍用補中益氣湯以培脾肺之生氣而滋腎
水經云陰虛者脾虛也但多誤以爲腎經火症用黃柏知母之
類復傷脾肺絕其化源反致不起惜哉

上舍劉克新潰後作痛發熱口乾小便赤澁自用清熱消毒之
藥不應左尺洪數余以爲陽氣盛而陰氣虛也先用四物湯六

黃柏知母等諸劑瀉其陽氣使陰自生服數劑諸症漸愈後用
補中益氣湯六味地黃丸補脾肺滋腎水而瘡口愈

一儒者小便赤澁勞則足軟瘧痛發熱口乾舌燥食少體倦日
晡益甚此氣血虛而未能潰也遂用八珍加麥門山藥倍用製
甘草數劑諸症悉退但患處瘧痛此膿內斂也又五劑膿自湧
出又五十餘劑而瘡口將完又因勞役且停藥寒熱作渴瘧痛
膿多用補中益氣湯加炒山梔二劑少愈又以八珍湯加麥門
五味百餘劑瘧痛悉去喜其愼起居節飲食常服補劑而安但
勞則出膿一二滴後惑於他言內用降火外用追蝕必其收斂
致患處大潰幾至不起仍補而愈

便癰 四 一名便毒 一名疫疫

便癰屬厥陰肝經內熱亦寒或勞倦過度或房慾不節或慾心

薛氏醫按 卷之三

薛氏醫按

不遂或强固其精或肝經濕熱而致治法內熱外寒者雙解散勞倦過度者補中益氣湯房慾不節者六味丸料慾心不遂者先用五苓散加大黃疎其精滯後用地黃丸以補其肝腎强固其精或濕熱壅滯者宜用龍膽瀉肝湯疎肝導滯夫便癰血疝也屬厥陰肝經之絡脉衝任督脉之隧道故婦人患此多在兩拘攣痛或腹中結塊小便澀滯苟治者得法患者又能調攝何難斂之有若槩用大黃等劑以求其內消或令膿隨便下損其氣血及不愼起居飲食者皆爲不治

治驗

府庠沈尼文年二十左拘患之余以肝腎陰虛先用托裏藥潰而將愈固入房發熱作渴右邊亦作痛膿水清稀虛症悉至脉洪大而無力勢甚可畏用十全大補加附子一錢脉症頓退再劑全退後用大補湯三十劑而愈

一儒者瘭痛便澀用八正散二劑清肝火導濕熱而瘭痛愈再以小柴胡加芎歸澤瀉山梔二劑清肝火補脾血而小便利

一男子潰而瘭痛不止此餘毒未解用活命飲一劑而痛止再劑而瘭消

一男子痛甚發熱用前飲一劑痛止再以神効瓜蔞散加山梔柴胡二劑而消

一男子瘭而不潰余謂此因陽氣虛弱用參芪歸朮以補托元氣用白芷皂角刺柴胡甘草節以排膿清肝數劑而潰以八珍加柴胡補其氣血數劑而愈

一男子已潰而痛不止小便秘澀此肝火未解也與小柴胡湯加黃柏知母芎歸痛止便利更以托裏當歸湯而瘡斂若毒未

解而痛不止者須用活命飲
一婦人素清苦因鬱怒患前症或用敗毒寒涼之藥反腊熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥余謂此鬱氣傷脾因藥復損先以當歸湯數劑後兼逍遙散各五十餘劑而諸症皆愈
一婦人小腹內如有所梗兩拘并入門俱痛小便淋瀝經候不調內熱作渴飲食少思腹內初如鷄卵而漸大脉洪數而虛左關尤甚屬肝脾鬱結之症也用加味歸脾湯肝火退而脾土健問以逍遙散下蘆薈丸而愈
一婦人兩拘痛痛腹內一塊不時上攻月經不調小便不利余以爲肝脾氣滯以四君加芎歸柴胡山梔而愈後因鬱怒前症復作却兼胸脇脹滿盜汗此肝木甚而傷脾土用加味歸脾湯下蘆薈丸而愈

一婦人小腹內或作痛或痞悶兩拘攣痛內熱寒熱胸膈不利飲食不甘形體日瘦此肝氣滯而傷脾氣朝用補中益氣湯夕用六味丸漸愈更用蘆薈丸而全愈
一婦人兩拘攣痛小腹痞脹小便時數白帶時下寒熱往來小水淋瀝余謂脾氣滯而血病用龍膽瀉肝湯漸愈又用加味逍遙散六味丸而全愈
一婦人患前症胸脇脹悶或小便不利或時作痛小便濇滯服疎氣豁痰等藥益甚余謂肝火氣分之病用龍膽瀉肝湯以清肝熱又用加味逍遙散以生肝血六味丸以滋腎水而愈
一婦人患前症余謂此肝脾鬱怒之症不信別服化痰利氣之劑胸腹脹悶又服峻利疎導之劑變脾虛發癉之症而歿
一婦人兩拘癉痛內熱作渴飲食不甘股體倦怠陰中作梗小

便赤澀爲肝脾陰虛濕熱用加味歸脾湯而愈後因怒復作小腹癰脹小便不利用小柴胡加山梔芎歸以清理肝火脹痛頓止又以加味逍遙散調補肝火而痊

一婦人兩拘作痛寒熱內熱小便赤澀胸脇不利此肝火動而脾氣傷用補中益氣湯加茯苓數劑少愈又與加味歸脾湯諸症悉退再用加味逍遙散而全愈

一婦人小腹痞悶小便不利內熱體倦懶食此氣血虛而兼肝火用八珍湯加柴梔膽草治之而安

一婦人陰中如梗兩拘痙痛寒熱不食小便頻數小腹重墜余以爲肝脾鬱結所致先以補中益氣湯加山梔茯苓車前子青皮以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯二十餘劑調理脾鬱而愈

下疳瘡 五

婦人陰瘡等症見女科撮要婦人良方

下疳屬肝經濕熱下注或陰虛火燥治法瘡痛發熱者血虛而有熱也四物湯加柴胡山梔瘡痛寒熱者肝經濕熱也小柴胡湯加龍膽草黃連瘡痛便澀者濕熱壅滯也龍膽瀉肝湯瘡痛腐潰者氣血虛而有火也八物湯加山梔柴胡日晡熱甚者陰血虛而有熱也小柴胡湯加參朮芎歸日晡倦怠者陽氣虛而下陷也補中益氣湯其經久不愈而發寒熱者腎水不能生肝木也用六味丸若筋縮縱或爲痒痛或出白津此筋疝也用龍膽瀉肝湯氣虛者補中益氣加炒山梔炒龍膽陰虛火燥者用六味丸莖中痒出白津用補中益氣湯與清心蓮子飲間服蓋此症肝經陰虛爲本腫痛寒熱等症爲標須用六味丸以生肝血凡脾土虛不能生金水而見一切肝症者當佐以補中益氣湯加麥門冬以滋化源

治驗

庶給士劉華甫或莖中作痛或竅出白津或小便秘澀先用小柴胡湯加山梔澤瀉黃連木通膽草茯苓二劑以清肝火導濕熱諸症漸愈後因勞倦忽然寒熱此元氣復傷也用補中益氣而安又用六味丸以生肝血滋腎水而全愈

州守姜節甫患前症膿水淋漓作渴吐痰午前惡寒午後發熱余曰午前惡寒屬陽氣虛弱午後發熱屬陰血不足不信反服二陳黃柏知母之類飲食益少大便不實又日晡熱渴小腹重墜患處瘍痛恪用四物黃柏知母之類飲食亦不思余以脾氣虛而下陷先用補中益氣湯調養脾胃以升陽氣諸症漸愈又用六味丸滋補腎水以生肝血而痊

一小兒十五歲患前症雜用消毒之藥虛症悉具二年餘矣詢之乃稟所致用革薤湯月餘諸症漸愈又用補陰八珍補中氣二湯而痊

一儒者莖中作痒發熱倦怠外皮浮腫二年矣用八珍加柴胡山梔及六味地黃丸而愈有兼陰毛間生蟲作痒者用桃仁研爛塗之

一儒者因勞而患瘍痛寒熱體倦頭疼小便赤澀用補中益氣湯加車前牛膝山梔而愈

一儒者陰莖腐爛瘡痛不止日晡熱甚口乾體倦食少欲嘔此肝脾血虛也先用六君子加柴胡升麻脾胃醒而諸症退更以補中益氣加炒山梔肝火退而瘡痛痊

痔瘡　六　男婦仝治

痔屬肝脾腎三經故陰精虧損者難治多成漏症若肺與大腸

二經風熱濕熱者熱退自愈不守禁忌者亦成漏症或因醉飽入房筋脉橫解精氣脫泄熱毒乘虛流注或淫極强固其精以致木乘火勢而侮金或炙煿厚味或勞傷元氣陰虛火熾所致初起燃痛便秘或小便不利者宜清熱涼血潤燥疎風若氣血虛而寒涼傷損者調養脾胃滋補陰精若破而久不愈多成痔漏有穿臀穿陰穿腸者其腸頭癆塊者濕熱也作痛者風熱也便結者火燥也潰膿者熱勝血也大便作痛者潤燥除濕肛門墜痛者瀉火除濕小便澀滯者清肝導濕其成漏者養元氣補陰精爲主經云因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔其屬肝脾腎也明矣若有患痔而兼痂患痂而兼下痔皆屬肝腎不足之變症但用地黃丸益氣湯以滋化源爲善若專服寒涼治火者無不致禍

治驗

進士周希輔素有痂痔勞則小腹作痛菑出白津痔亦癆痛若飲食勞倦起居失宜則發寒內熱肢體疲倦服十全大補湯諸症並退後欲去病根乃用攻病生肌之藥肌體骨立余用益氣湯地黃丸元氣漸復但白弛調攝不能全愈

一儒者膿血淋漓口乾作渴嗜熱便血自汗盜汗余謂此腎肝陰虛也不信仍服四物柏知連之類食少瀉嘔余先用補中益氣湯加茯苓半夏炮薑脾胃漸醒後用六味丸朝夕服兩月餘諸症悉愈

一儒者楊舉元素陰虛勞則肢體倦怠兩足發熱服清熱等劑熱至腰膝大便澀滯飲食過多則瀉至年餘作渴吐痰患痔出膿仍不節勞則忽惡寒發熱復患癰膿水不止氣血虛甚余用六

味丸補中益氣湯滋養化源喜其慎疾年餘而痊

一男子患此服寒涼之劑侵晨去後不實食少體倦口乾作渴小腹重墜余用補中益氣湯而下墜頓止用四神丸而食進便實用地黃丸而瘡尋愈

一膏粱酒色之人患之作痛服苦寒之藥致臂瘫硬又加大黃腹脹頭痛此足三陰虧損而藥復傷余用補中益氣湯升補陽氣加參苓半夏木香以助脾氣數劑而愈

上舍陸子潛時仲冬患痔作痛右手浮大左尺洪數余曰冬見夏脉當壯水之主以鎮陽光彼以爲迂別服芩連之劑越明年六月九日復邀視之痰涎上湧日夜不寐脈洪大而數按之無力左尺全無足手肩膊逆冷余曰事急矣彼云但求少延數日以待嗣子一見耳勉用參芪歸朮炮薑之類及六味丸料加肉桂至本月丁酉日果歿五行之理信然

侍御王兩湖長子患痔作渴發熱尺脈洪數按之無力余曰此肝腎陰精虧損而虛火妄動當滋化源彼不信後吐痰聲嘶面赤體瘦而歿

便血 七 婦人症見女科撮要

經云邪在五臟則陰脈不和則血留之陰氣內結陽絡外傷滲入腸間故便血也針經云陽絡傷則血外溢而衄血陰絡傷則血內溢而便血皆因飲食失節起居不時七情六淫失宜內傷外感所致若外感則血鮮名腸風內傷則血濁名臟毒外感而元氣實者人參敗毒散加槐花荊芥以祛邪氣內傷而元氣虛者亦用六君子湯以補胃氣元氣下陷者補中益氣湯以升舉之憂思傷脾者濟生歸脾湯以解之糞前見血者益

氣湯加吳茱萸黃蘗後見血者加黃連陰血不足者宜用四物湯病因多端不能盡述當臨症制宜庶無誤矣丹溪先生云精氣血氣出於穀氣惟大便下血當以胃氣收功治者審之

治驗

一儒者素善飲不時便血或在糞前或在糞後食少體倦面色痿黃此脾氣虛而不能統血以補中益氣湯加吳茱萸黃連三十餘劑而再不發

一男子每怒必便血或吐血卽服犀角地黃湯之類余曰此脾虛不能攝血恐不宜用此寒涼之藥彼不信仍服之日加倦怠面色痿黃更用四物芩連丹皮之劑飲食少思心煩渴熱吐血如湧竟至不起若用四君芎歸補中益氣湯多有得生者

脫肛屬大腸氣血虛而兼濕熱有久痢氣血俱虛而脫者有因腎虛而脫者有中氣虛而脫者有因腎虛而脫者有濕熱者升陽除濕湯血熱者四物加條芩槐花血虛者四物加白朮茯苓兼痔而痛者四物加槐花黃連升麻久痢者補中益氣湯加酒炒芍藥中氣虛陷者前湯加半夏炮薑茯苓五味腎虛者六味丸虛寒者八味丸肺與大腸爲表裏肛者大腸之門肺實熱則秘結肺虛寒則脫出腎主大便故腎虛者多患此症

治驗

舉人于時正素有痔每勞役便脫肛腫痛出水中氣下陷也用補中益氣湯加茯苓芍藥十餘劑中氣復而愈後復脫作痛誤服大黃丸腹鳴惡食幾危余用前湯加炮薑芍藥諸症漸愈後去薑加熟地五味三十餘劑而愈

一男子脾胃素弱或因勞倦或因入房肛門即下瘡悶痛甚用補中益氣湯加麥門五味兼六味丸而愈後因過飲下墜瘡痛誤用降火消毒虛症蜂起余用前湯加炮薑木香一劑再用前湯并加減八味丸兩月而安

一儒者面白神勞素畏風寒飲食喜熱稍多必吞酸作瀉吸氣覺冷便血盜汗余以為脾腎虛寒用補中益氣加炮薑肉桂五十餘劑八味丸觔許諸症悉愈

腎臟風瘡　九　男婦仝治

腎臟風屬腎虛風邪乘於臁脛以致皮膚如癬或漸延上腿久則延及遍身外症則搔痒成瘡膿水淋漓眼目昏花內症則口燥舌乾腰腿倦怠吐痰發熱盜汗體疲治法用六味丸為主佐以四生散若脾胃虛弱者用補中益氣為主佐以六味丸四生

散為善

治驗

飲天薛循齋六十有一兩臁患之膿水淋漓發熱吐痰四年矣此腎臟風症也與六味丸四生散而瘥年餘復作延及遍身日晡益甚痰渴盜汗唇舌生瘡兩目昏赤皆腎經虛火而水泛為痰用加減八味丸而愈三年後小便淋漓莖中滴痛此思色精不出而內敗也用前丸及補中益氣湯加麥門五味而愈

臁瘡　婦人症見女科撮要婦人良方

臁瘡生於下臁初起赤腫久而腐潰或津淫搔痒破而膿水淋漓蓋因飲食起居虧損肝腎或因陰火下流外邪相搏而致外臁屬足三陰虛熱難治若初起惡寒壯熱瘟煞作痛者屬濕熱用槐蘇敗毒散若漫腫作痛或不瘡

月諸症悉退三月元氣平復

一男子左腿癰肉色如故寒熱惡心飲食少思此脾氣不足而為外邪所感也用六君加藿香桔梗川芎而寒熱止又用補中益氣湯而癰痛消

陳湖陸懋誠素因陰虛過飲入房發熱腿痛似臁瘡用發表之劑兩腿癰黯熱氣如霧欲發痙脈皆洪數兩尺尤大余曰屬足三陰虛酒濕所乘元氣損而邪益甚耳用十全大補加山藥山茱萸附子一劑脈症頓退却去附子又二劑全愈

一男子先於兩臁後及遍身生瘡似疥非疥時或膿水淋漓兩腿為甚肢體倦怠作痒煩熱年餘不愈余作腎經虛火用加減八味丸而痊

一男子腿患癰服剋伐之藥虧損元氣不能成膿余為托裏而

不痛者屬陰虛用補陰八珍湯若膿水淋漓體倦食少內熱口乾者屬脾虛用補中益氣加茯苓酒炒白芍藥若午後熱或作痛頭目不清者屬陰火前湯加酒炒黑黃柏及六味地黃丸若午後發熱至子時分方止是血虛前湯加芎歸熟地若鬱結傷脾而甚用歸脾湯加柴胡山梔若怒動肝火而甚用補中益氣湯加川芎山梔黃芩內熱口乾肢體倦怠或痰涎上升或口舌生瘡屬脾腎虛熱用六味地黃丸補中益氣湯若患處黑黯肢體畏寒飲食少思屬脾腎虛敗用八味地黃丸若誤用攻伐復損胃氣絕其化源治亦難矣

治驗

馮臚翟少溪兩臁生瘡漸至遍身發熱吐痰口燥咽乾盜汗心煩潮赤足熱日晡益甚形體日瘦此腎經虛火也用六味丸不

潰大補而飲但大便結燥用十全大補湯加麥門五味而潤月餘仍結自服潤腸丸而瀉不止余用補中益氣湯送四神丸數服而愈

足跟瘡十一 婦人症諸見方

足跟乃腎脉發源之所腎經所過之地若飲食失節起居失宜虧損足三陽經則成瘡矣若漫瘡寒熱或體倦少食屬脾虛下陷也用補中益氣湯若晡熱作痛頭目不清屬脾虛陰火也前湯并六味丸若痰涎上升或口舌生瘡屬腎水乾涸也前湯并加減八味丸凡此皆當滋其化源若治其外則誤矣俗云兎嚙瘡者蓋獵人被兎咬足跟久而不斂氣血瀝盡而死

治驗

大尹陳汝鄰兩腿酸軟或赤或白足跟患瘡或痛或痒後痛而或如無皮或如皺裂日晡至夜脹痛煩熱用補中益氣湯加八味丸料補其肝腎而愈

一男子足跟作痛熱渴體倦小便如淋誤用敗毒散致頭痛惡寒欲嘔不食吐痰咳嗽此足三陰虧損而藥復傷余用十全大補湯加減八味丸各五十餘劑而愈

一男子素不慎起居內熱引飲作渴體倦兩足發熱後足跟作痛或用清熱除濕之劑更加發瘡又服敗毒之藥煩赤痛甚恪用祛毒清熱潰裂蚕張狀如赤榴熱痛如錐內熱晡熱此因足三陰虧損朝用十全大補湯夕用加減八味丸外敷當歸膏兩月餘而愈其服消毒等藥而致者不能枚舉

一男子亦患此服消毒散搽追蝕藥虛症疊出其形體骨立自分必死余用十全大補兼山藥山藥兩月餘而愈

一膏粱之人兩脚發熱作渴左尺脉數而無力余謂此足三陰虧損防患疽不信反服清熱化痰之藥更加晡熱頭暈又服四物黃柏知母日晡熱甚飲食漸少覺少面發疽余用補中益氣六味地黃丸百餘服而其不信患疽以致不起者多矣

一婦人勞則足跟熱痛余以爲足三陰虛用八珍湯而痊後遍身搔痒誤服風藥發熱抽搐肝脉洪數此肝家血虛火盛而生風以天竺膽星爲丸用四物麥門五味芩連炙草山梔柴胡煎送下而愈

一婦人兩足發熱兩跟作痛日晡熱甚余以爲肝腎血虛用加味逍遥散六味地黃丸五十餘劑諸症悉愈

一婦人素血虛因大勞兩足發熱晡熱月經過期或用四物黃連飲食少思胸痞吐痰用二陳枳實黃連大便不實吐痰無度足跟作痛余曰足熱晡熱月經過期乃肝脾血虛也胸痞吐痰飲食少思脾胃虛也蓋胃爲五臟之根本胃氣一虛諸症悉至先用補中益氣湯加白茯苓半夏脾胃漸健乃佐以六味地黃丸以補脾胃不兩月而痊

一婦人經候不調發熱晡熱胸膈不利飲食少思服清熱寬中消導之劑前症益甚更兼肢體酸痛服除濕化痰等藥經候兩月一至服通經降火等劑兩足跟指作痛其熱如炙余以爲足三陰虧損用補中益氣六味地黃丸兩月諸症漸退又用前湯并八珍散兩月而康

一婦人足跟患瘡兩腿酸軟或赤或白或痒或痛後或如無皮或如皺裂日晡至夜脹痛煩熱此足三陰虧損用加減八味丸及逍遥散加熟地川芎百餘劑而愈

脚發之症屬足三陰經精血虧損或足三陽經濕熱下注若色赤瘇痛而潰膿者屬濕熱下注為可治若色微赤微瘇而膿清者屬精血虧損為難治若黑黯不瘇痛不潰膿煩熱作渴小便淋漓者陰敗未傳惡症也為不治其法濕熱下注者先用隔蒜灸活命飲以解壅毒次服益氣湯六味丸以補精氣若色黯不痛者着肉灸桑枝灸以行壅滯助陽氣更用十全大補湯八味丸壯脾胃滋化源多有復生者若專治其瘡復傷生氣吾未見其生者

脚發十二　男婦仝治

治驗

閻老靳介菴脚指縫作痒出水瘇漸脚面敷止痒之藥不應服除濕之劑益甚余以為陰虛濕熱下注用六味地黃丸補中益氣湯而愈

大參李北溪左足赤瘇作痛此足三陽經濕熱下注先用隔蒜灸活命飲一劑其痛頓止灸患處出水赤瘇頓消次用托裏消毒散四劑灸患處出膿而愈

儒者楊舉元患此微瘇痛微赤煽此足三陰經陰虛濕熱下注用隔蒜灸托裏散而起發用十全大補湯而膿成又與加減八味丸料百劑而歛

一儒者患此瘇硬色白兩月餘矣此足三陰經虧損為外寒所侵用大防風湯及十全大補兼服而消後瘍屋不利飲食勞倦前症復作盜汗內熱飲食不化便滑肌瘦此脾土虛寒而命門火不能相生用八味丸益氣湯百餘劑喜其年壯得愈

一男子脚心發熱作渴引飲或用四物芩連柏知母之類腹痛

脫疽謂疔患於足或足趾重者潰脫故名之亦有患於手患於指者因醇酒炙煿膏粱傷脾或房勞損腎故有先渴而後患者有先患而後渴者若色赤作痛者元氣虛而濕毒壅盛也先用隔蒜灸活命飲托裏色赤作痛自潰者可治色黑不潰者不治故再用十全大補湯加減八味丸色黯不痛者腎氣敗而虛火盛也隔蒜灸桑枝灸亦用十全大補湯加減八味丸則毒氣不致上侵元氣不致虧損庶可保生亦有因修手足口咬等傷而致者若元氣虛弱或犯房事外塗寒涼內服剋伐損傷脾胃患處不潰若黑黯上延亦多致死重者須當以腳刀轉解周髓輕捩去之則筋隨骨出而毒得泄亦不痛否則毒筋內斷雖去而仍潰且偏僻之處氣血罕到藥難導達況攻毒之劑先傷脾胃

作嘔煩熱大渴此足三陰虧損前藥復傷脾胃也先用六君加炮薑數劑而脾胃醒再用補中益氣加茯苓半夏而脾胃健乃以加減八味丸兼服半載而愈

一儒者脚心發熱作痒以滾湯浸漬潰而出水肌體骨立作渴吐痰此脾腎虛而水泛為痰也服益氣湯六味丸年餘元氣復而諸症愈

少宗伯顧東江面黧作渴余曰此腎經虧損當滋化源以杜後患彼雖然之而終不服次年九月內左足面患疽色黯不痛脚腿沉重用隔蒜灸三十餘壯足腿即輕瘡出血水數日而消瘡色仍黯時公將北行賀　萬壽余診之曰脾脈衰憊陽氣虛極不宜遠行公曰余得夢屢驗向夢羣仙待我此壽徵也至河間驛聚仙堂病篤嘆曰立齋豈能留我果卒於此亦異數也

不若灸法爲良重者須解去爲善故孫眞人云在肉則割在指則截蓋親之遺體雖不忍傷而遂至夭歿則尤傷矣況解法無痛患者知之

治驗

一男子足指患之瘭煩痛赤此三陽經虛而外邪所乘也用隔蒜灸人參敗毒散加銀花白芷大黃二劑而痛甚又二劑痛止又與十宣散加天花粉金銀花去桂數劑而愈又有足指患之者色紫不痛此三陽經熱毒壅滯隔蒜灸五十餘壯又明灸百壯始痛投活命飲四劑更以托裏藥潰脫而愈

一男子患前症赤痛作渴此是三陰虛而火內動用隔蒜灸活命飲二劑而潰更服托裏藥及加減八味丸潰脫而愈若早用前法不至於此

一男子瘭痛色赤發熱作渴大小便秘結其脉浮數按之沉實此足三陽經積熱內外俱受患也先用隔蒜灸及人參敗毒散加銀花白芷大黃而潰更以活命飲而痊

一書梁之人先作渴足熱後足大指赤痛六脉洪數而無力左尺爲甚余爲此足三陰虛當滋化源爲主固服除濕敗毒等劑元氣益虛色黯延足余乃朝用補中益氣湯夕用補陰八珍湯各三十餘劑及桑枝炙潰而膿清作渴不止遂朝以前湯送加減八味丸夕用十全大補湯三十餘劑而痊是時同患此症服敗毒之藥者俱不救

瘤贅 十四　附結核凡結核當與瘰癧參看

內經云肝統筋而藏血心裹血而主脈脾主肉而統血肺主氣而司腠理腎統骨而主水若怒動肝火血涸而筋攣者其自筋

瘤起按之如筋久而或有赤縷名曰筋瘤用六味地黃丸四物
山梔木瓜之類若勞役火動陰血沸騰外邪所搏而爲瘤者其
自肌肉瘤起按之實軟名曰肉瘤用歸脾益氣二湯若勞傷肺氣腠理
不密外邪所搏而壅瘤者其自皮膚瘤起按之浮軟名曰氣瘤
用補中益氣之類若勞傷腎水不能榮骨而爲腫者其自骨瘤
起按之堅硬名曰骨瘤用地黃丸及補中益氣湯主之夫瘤者
留也隨氣凝滯皆因臟腑受傷氣血乖違當求其屬而治其本
大凡屬肝膽一經結核八珍加山梔膽草以養氣血清肝火六
味丸以養肺金生腎水若屬肝火血燥須生血涼血用四物二
地丹皮酒炒黑膽草山梔中氣虛者補中益氣兼服若治失其
法脾胃虧損營氣虛弱不能濡於患處或寒氣凝於瘡口營氣
不能滋養於患處以致久不生肌而成漏者悉調補脾胃則氣
血壯而肌肉自生矣若不慎飲食起居及七情六淫亦用寒涼
蝕藥蛛絲纏元花線等法以治其外則誤矣

治驗

長州庠王天爵辛丑春左腿近環跳患之狀如大桃按之濡軟
恪服除濕流氣化痰之劑惡寒發熱食少體倦形氣俱虛脉洪
大而虛氣瘤也肺主之蓋膽屬木肺屬金然發於膽經部分乃
肺金侮肝木元氣虧損而其膿已內潰矣遂用十全大補湯數
劑出青白稀膿甚多頓加寒熱頭痛殊類傷寒狀余謂此
因膿泄而血氣益虛耳仍用前湯其勢益甚脉洪數大按之如
無乃加附子一錢其勢愈甚而脉復如前此虛甚而藥未能及

薛氏醫按

也更加附子二錢三劑諸症頓退乃朝用補中益氣湯夕用十全大補湯各三十餘劑由腐骨五塊瘡口將完後因不慎起居患處復潰諸症更發咽間如焚口舌無皮用十全大補加附子一錢服之諸症即愈二日不服內病悉至患處復潰二年後又患服前藥不應診其尺脉微細如絲此屬命門火衰用八味丸爲主佐以十全大補湯稍愈至乙巳仍患虛寒之症而歿

一男子左腿外側近臀癰一塊上有赤縷三年矣飲食起居如常膈破湧出血膿發熱惡寒此膽經受症故發於腿外側診其左尺洪數左關弦洪此腎水不能生肝木用補中益氣湯六味地黃丸而痊

一男子小腹患之膿水淋漓此足三陰之症用補中益氣加麥門五味以培脾土用六味地黃丸以生腎水更用蘆薈丸以清

肝火而飲

一老儒冒間患之二年其狀如紫桃下墜蓋目按之即水囊此肝脾之症膿瘀內潰而然耳遂刺出血膿目即開以炒黑膽草山梔苦歸芍藥柴胡白朮茯苓等類而愈

一人江節夫兩耳下兩臂兩肋結核恪服祛痰降火軟堅之劑益甚余曰此膽經血虛火燥也蓋膽經行人身之側前藥必致虧損至明年七月復請視各核皆潰脉浮大而濇時金旺於秋木受金剋必不治果卒

一嘉善周上舍兩耳下項間筋攣癰堅硬咳嗽氣喘內熱盜汗所服皆化痰散堅行氣之劑勢益甚予診之左關弦澀左尺洪數此怒氣傷肝房勞損腎須滋腎水生肝血慎調攝至水旺之際庶可愈矣彼欲速效乃外敷商陸石灰等藥內服海藻蓬朮

之類至秋金旺之際元氣愈虛其瘡愈甚而殁
鎮江孫上舍盆缺間瘡如覆盌堅硬色赤內熱晡熱自汗盜汗
就治於余曰賤疾皆以散堅行氣降火破血之劑飲其內消而
反甚其脉左尺洪數按之而濇此怒氣傷
肝血涸而筋攣也因其急於仕進余辭不能治彼亦不信後果
殁此症若補脾肺滋肝腎則本得水而敷華筋得血而滋潤多
有得生者

疣十五

疣屬肝膽少陽經風熱血燥或怒動肝火或肝客淫氣所致蓋
肝熱水涸腎氣不榮故精亡而筋攣也宜以地黃丸滋腎水以
生肝血爲善若用蛛絲纏螳螂蝕著艾灸必多致誤大抵此症
與血燥結核相同故外用腐蝕等法內服燥血消毒則精血愈
虛肝筋受傷瘡口翻突開張卒成敗症

治驗

府庠朱宏仁年二十右手背近中指患五疣中一大者如黃豆
餘皆如聚黍拔之如絲長三四寸許此血燥筋縮用清肝益榮
湯五十餘劑而愈

府庠沈姬文幼嚙指甲及長不能自禁余曰此肝火血燥也又
頸側常生小疣子屢散屢發又臂生一塊如棗豆大若觸碎如
斷束縷扯之則長縱之則縮後兩鬢發白點求治余曰子素肝
病此病亦屬肝膽經也夫爪爲筋之餘膽行人身之側正與囓
爪生瘡等症相應須滋補腎水以生肝膽則諸病自愈矣乃與
六味地黃丸服之二年白點自退疣亦不生

一男子臉患疣初如赤棗雜用敷貼之藥翻張如菌又用腐蝕

煩大如瘤此足三陰經虛症悉具治以補脾肺生肝腎等劑而
尋愈
一男子小腹中一塊不時攻痛或用行氣化痰等藥不應尤以
爲血鬱服行氣逐血之劑後手背結一痧子漸長寸許形如鬱
狀肢節間如萁大者甚多彼泥鬱生子發於外亦用行血虛症
悉至左尺洪數關脉洪數弦余以爲腎水不能生肝木以致肝
火血燥而筋攣用六味地黃丸生腎水滋肝血三月餘諸症悉愈
一男子因勞役過度面色青黑發熱咳嗽面生疣子腹內一塊
攻土攻下作痛口乾小便秘澀服消剋之藥愈甚察其脉左右
關俱弦洪元氣弱甚此肝脾受病而筋攣也投以加味逍遙散
合地黃丸料元氣遂復若誤以爲血鬱之類消之必致不起
一男子素膏粱醇酒先便血便結驚悸少寐後肛門周生小顆
如疣子如鼠乳夫小不一用清熱消毒等藥牛載之間腿內腋
亦然又用化痰之藥寒熱吐痰頸間俱作肝腎脉浮數按之而
弱余以爲足三陰經血虛火熾法當滋化源彼不信別服四物
黃柏知母之類諸症蜂起此胃氣復傷各經俱病也先用補中
益氣湯三十餘劑諸症漸愈乃朝用前湯夕用八珍湯又各五
十餘劑諸症尋愈於是夕改用六味丸加五味子又半載諸症
悉愈
一婦人左手背并次指患五六枚如熟椹內熱脯熱月經素不
及期余曰此因肝脾血虛而有熱也當調補二經使陰血生而
諸症自愈不信乃用艾灸手腫脹發熱手指皆攣兩脇項及胸
乳間皆患疣經行無期余用加味逍遙散少加炒黑黃連數劑
漸愈乃去黃連更佐以歸脾湯各患漸愈又百餘劑經行如期

再用地黃丸三料而痊

一婦人小腹內一塊或時上攻或時下墜寒熱胸痞小便淋瀝或用行氣化痰等劑前症愈甚月經兩月餘而一行或以爲內有肉醫啖餘其血而經不行服驅逐之劑下血甚多兩手背結一疣如大豆許兩月漸長寸許又兩月餘又患瘡又疑爲瘡毒余曰此屬肝火行於外仍行驅逐兩耳下各患瘡又疑爲瘡毒余曰此屬肝火血燥也用加味逍遙加陳歸脾二藥兼服佐以六味丸三月餘而愈

一婦人患之用蚺絲纏苦花線螳螂啖毒藥餌着艾灸大潰瘍痛發熱出血余曰此陰血虛也不信仍服降火之藥而殁

瘡瘍發痙因氣血虧損外邪所搏或內虛鬱火所致其形牙關緊急四肢勁強或腰背反張肢體抽搐其有汗而不惡寒者曰柔痙風能散氣故有汗也其無汗而惡寒者曰剛痙寒能斂血故無汗也皆由亡血過多筋無所養故傷寒汗下遲多與潰瘍產後多患之乃敗症也若大補氣血多有復生者若作風治速其危矣

治驗

秋官張同野舊有流注因暑寒聶炕口目抽搐手足戰掉余以爲氣血虛熱而然用參芪歸朮川芎山梔柴胡半夏天麻炙草治之而愈

吳給事膽之墜馬傷首出血過多發熱煩躁肉瞤筋惕或作破傷風欲發汗祛風余曰此亡血火動也無風可祛無汗可發當峻補其血用聖愈湯二劑頓愈又用健脾胃養氣血而全愈

一儒者背瘡將愈發熱煩躁自用降火之劑項强口噤自汗惡寒此汗多內亡津血筋無所榮也用補氣血之劑及地黃丸而愈

一男子素勤苦早行遍身發疹落口噤目直脉弦緊此勞傷氣血內熱外邪所搏也用補中益氣加山梔羌活川芎而瘥半載後遍身作痒搔破成瘡發熱作渴脉洪大而虛復以前湯加苍朮麥門熟地天麻而愈

一儒者善怒惡瘧癒復因大怒跳躍忽仆地兩臂抽搐唇口喎斜左目緊小此肝火血虛內熱生風用八珍湯加牡丹皮釣藤山梔而愈次年春前病復作兼小便自遺左關弦洪而數余以爲肝火血燥用六味丸加釣藤五味麥門芎歸治之漸愈又用補中益氣加山梔釣藤牡丹皮而安

一癒婦因怒仆地瘡口出血語言蹇澁口眼喎斜四肢拘急汗出遺尿或用驅風之劑六脈洪大肝脈尤甚此肝火熾甚也用加味逍遙散加釣藤及六味丸等愈

一婦人患內痔因勞出血甚多不時發痙飲食少思形體倦怠其面色白余謂此氣傷而不能統血也用補中益氣湯反寒熱出血此陽氣虛寒也仍以前湯加炮薑四劑寒熱漸止飲食漸進又四劑而血頓止後因勞役或怒氣即便血或發痙投以補中益氣湯加釣藤而愈

一婦人素性急忽遍身搔痒或項間結核常服搜風順氣之劑後大怒吐血唇口牽緊小便頻數或時自遺此怒動肝火而血妄行也用小柴胡湯加山梔牡丹皮而愈

一癒婦因勞兼怒四肢攣屈煩痛自汗小便短少畏見風寒脉浮弦緩此氣血虛而風寒濕熱相搏也先用東垣清燥湯漸愈

再用加味逍遙散及八珍湯加牡丹皮而痊

一婦人素有肝火兩拘間或腫痛或寒熱忽然昏潰瘍瘡抽搐善伸數欠四肢筋攣痰涎上升此肺金燥甚而血液衰少也用清燥救六味救兼服尊愈

一婦人因大勞患腫瘡發疼瘡搔碎成瘡日晡熱甚或口噤發搐或頭目眩暈此肝脾氣血虛而內熱以八珍散加柴胡山梔治之諸症少愈復因怒前症復作經行不止此肝脾血熱用加味逍遙散漸愈又用八珍散加柴胡山梔而痊

一婦人發疙瘩日晡熱甚月經先期或頭目昏眩或寒熱發熱或四肢抽搐此肝經風熱血燥用加味逍遙散治之尊愈後因怒前症復作口噤遺尿此肝火血燥也用加味小柴胡湯治之漸愈又夜間發熱譫語此血分有熱也用小柴胡湯加生地而愈更用加味逍遙散調理而安

一婦人患蠶唇月經先期余以為肝火血熱不信乃泛用降火之劑反致月經過期復因勞怒口噤呻吟肢體不隨六脉洪大面目赤色用八珍麥門五味山梔丹皮數劑漸愈兼用逍遙散六味丸料各三十餘劑全愈

一婦人經行遇怒其經即止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰涎搐搦子上視此肝火熾甚以小柴胡湯加熟地黃山梔釣藤鈎而愈

一婦人素陰虛患遍身搔痒誤服祛風之藥口噤抽搐肝脉洪數余曰肝血為陰為水肝氣為陽為火此乃肝經血虛火盛耳宜助陰血抑肝火遂用四物麥門五味柴胡山梔生草熱搐頓止又以八珍加黃芪麥門五味釣藤炙草調理而愈

一婦人久患流注脾胃虛弱忽痰壅氣喘頭搖目劄手揚足躁難以候脈視其面黃中見青此肝木乘脾土也用六君加柴胡升麻治之而甦更以補中益氣加半夏茯苓而安

類破傷風症十七

大凡癰疽潰後筋微肉爛膿血大泄陽隨陰散或筋脉拘急惡寒惕搦甚者舌強口噤項背反張痰涎壅甚便閉汗出不時發熱此氣血俱虛而傳變雖與破傷風相類而主治之法當大補氣血若果係風症亦須以大補氣血為本而兼以治風之藥設若不審是非而妄藥之則誤矣風症治見後方

治驗

司徒漫華泉肩患癰潰而發熱日直或間殊類中風日晡熱甚脉益數此足三陰氣血虧損虛火妄動用參芪歸朮炙草加酒炒黑黃柏五味麥門肉桂四劑而愈又數劑而斂

陸大行背瘡內潰出膿二碗許用托裏之劑痛止瘡消停藥忽寒熱作渴頭痛自汗此元氣虛而未能復也用十全大補加麥門五味肉桂二劑益甚診其脉如故此藥力未及仍用前藥加附子一錢三劑諸症悉愈乃去附子加肉桂數劑而斂

一儒者患腿癰深耆於內肉色不變久不穿潰針出膿挨五碗許惡症駢臻全類中風此脾胃虛而變症也用六君子加當歸炮薑及聖愈湯各四劑而安又勞心不寐用歸脾湯而愈

一儒者傷寒後患流注瘡痛潮熱用十宣敗毒等劑出稀膿五六碗許發熱惡寒煩躁作渴殊類破傷風症而歿

一男子背瘡未痊飲以膏藥前孔貼之患破傷風症而歿此先失於內補外邪襲其虛耳余見此症貼膏藥剪孔飲其通氣而

反患破傷風搽飲藥生肌欲其收口而反助其餘毒以致殁者多矣可不慎哉

論瘡瘍隨症加減用藥十八

內經云形傷痛氣傷腫先腫而後痛者形傷氣也先痛而後腫者氣傷形也東垣先生謂胃爲五臟之本源人身之根蒂丹溪先生云癰疽因積毒在臟腑宜先助胃壯氣以固其本夫然則氣血凝結者自散膿瘀已成者自潰肌肉欲死者自生肌肉已死者自腐死肉已潰者自斂若獨攻其瘡脾胃一虛七惡蜂起其不死者幸矣大凡前症須用托裡消毒散爲主若高腫煩痛熱毒也加黃連漫腫微痛氣虛也去金銀花連翹二味加參朮頭痛發熱邪在表也本方加川芎羌活若外邪在表而元氣實者暫用人參敗毒散頭痛惡寒表虛也去二味加參芪發熱飲冷使秘內熱也去參芪歸朮加大黃發熱飲熱便秘內虛也去二味加參芪歸朮寒熱飲冷小便澁滯肝熱也去參芪加柴胡山梔不作膿膿不潰氣虛也去二味及白芷加參朮肉桂如不應暫用十全大補湯腫赤作痛血凝滯也本方加乳香沒藥如不應暫用仙方活命飲膿出反痛氣血虛也去三味加熟地牡蠣加參芪歸朮肉赤而不飲血虛而有熱也去三味加熟地丹皮肉黯而不飲陽氣虛寒也去三味加參芪白飲官桂漫腫不痛或肉死不潰脾氣虛也去三味加人參白朮如不應加薑桂更不應急加附子肉白而不飲陽氣虛也去三味加參芪歸朮膿多而不飲氣血虛也去三味加參芪歸朮熟地如不應暫用十全大補湯飲食少思而不飲胃氣虛也去三味加參芪如不應暫用補中益氣湯飲食難化而不飲脾氣虛也去三味加

參朮不應暫用六君子湯又不應佐以八味丸臌多而帶赤血虛也去三味加歸地參朮如不應暫用八珍湯加牡丹皮忿怒瞋熱而出血肝火血虛也去三味加牡丹皮熟地炒黑山梔加不應暫用八珍湯送六味丸面青脇脹而出血肝氣虛而不能藏血也去三味加山茱山藥五味子如不應兼六味丸食少體倦而出血脾氣虛而不能攝血也去三味加參朮歸地兼鬱結少寐更加遠志酸棗仁茯神龍眼肉如不應暫用歸脾湯欲嘔作噦或外搽內服寒凉或痛甚或感寒邪穢氣而嘔胃氣虛也去三味加藿香參朮飲食少思腸鳴腹痛腹冷泄瀉脾氣虛寒也去三味加炮薑木香手足逆冷脾血虛寒也更加附子煎送四神丸飲冷作渴熱毒也加赤小豆知母如不應暫用竹葉黃芪湯善食作渴胃火也加石膏山梔如不應暫用竹葉石膏

湯臌多而作渴氣血虛也去三味加熟地黃五味子如不應暫用十全大補湯加五味子麥門冬口乾舌燥腎氣虛也去三味加熟地山茱山藥如不應兼六味丸又不應佐以補中益氣湯自汗內熱口乾胃氣虛也去三味加參朮歸朮如不應暫用六君子湯盜汗內熱口乾陰血虛也去三味加熟地麥門五味如不應暫用當歸六黃湯莖中痛而小便不利精內敗也去三味加山茱山藥澤瀉如不應佐以六味丸愈便則愈痛愈痛則愈便精復竭也去三味煎送六味丸食少體倦口乾飲熱小便黃短脾肺虛熱也去三味加五味子山茱萸如不應暫用六味丸勞役而小便黃元氣下陷也去三味加升麻柴胡如不應煎送六味丸口燥作渴小便頻數腎水虧也去三味加五味山茱山藥熟地如不

薛氏醫按 ◇久利相要卷之三

應兼用六味丸四肢逆冷腎氣虛寒也去三味加桂附如不應佐以八味丸食少體倦作渴胃氣虛也去三味加參芪白朮如不應暫用補中益氣湯體倦頭痛或眩暈中氣虛也去三味加柴胡升麻如不應暫用補中益氣湯加蔓荊子日晡頭痛或眩暈陰血虛也去三味加熟地黃如不應佐以六味丸萎泄遺精頭暈頭痛或痰喘氣促腎虛不能納氣也去三味并川芎佐以六味丸如不應是虛寒也用八味丸面目赤色煩熱作渴脉大而虛血脫發躁也去三味加黃芪當歸如不應暫用當歸補血湯身熱惡衣欲投於水脉沉微細氣脫發躁也去三味加肉桂吩子如不應暫用附子理中湯善思體痛無寐益汗脾血虛也去三味加茯苓遠志酸棗仁圓眼肉如不應暫用歸脾湯寢寐而汗出腎氣虛也去三味加五味子煎送六味丸飲食而出汗胃氣虛也去三味加參芪歸朮五味子如不應暫用六君子湯睡覺飽而出盜汗宿食也去三味加參朮半夏如不應暫用六君子湯胸滿多痰脾氣虛也去三味加桔梗半夏如不應暫用六君子湯加桔梗枳殼補熟多痰脾血虛也去三味加歸地參朮如不應暫用六君子湯加芎歸熟地咳嗽唾痰腎虧津液泛上也去三味加山茱山藥熟地如不應佐以六味丸忿怒胸痞肝氣滯也去三味加桔梗山梔如不應暫用補中益氣湯加桔梗枳殼倦怠胸痞中氣虛也去三味加參朮茯苓如不應暫用八珍湯加柴胡口苦寒熱往來肝火血虛也去三味加柴胡熟地因怒寒熱往來肝火血虛也加柴胡黃芩如不應暫用八珍湯加炒山梔炒酸棗仁酒炒黑膽草體倦寒熱往來肝脾氣滯也去三味加參芪歸朮如不應暫用補中益氣湯內熱晡熱或

寒熱往來陰血虛也去三味加芍歸牡丹皮畏寒或寒熱往來胃氣虛也去三味加參朮八珍湯加牡丹皮畏寒或寒熱往來肝氣滯也去三味加青皮木香如不應屬氣血虛也更加芍歸參朮若婦人勞役恚怒或適經行發熱譫語或夜間熱甚在血分也去三味加生地丹皮柴胡如不應暫用加味四物湯若誤尅伐或膿血大泄或因吐瀉或誤而入房或勞損元氣或夢泄遺精或外邪乘入以致發熱頭痛小便淋瀝或滑數便血目赤煩喘氣短頭暈體倦熱渴意欲投水身熱惡衣揚手擲足腰脊反張鄭聲自汗此陽氣脫陷之假熱症也若畏寒頭痛咳逆嘔吐耳臊目瞶小便自遺瀉利腸鳴裡急腹痛玉莖短縮齒浮痛肢體痲痺或厥冷身痛或咬舌嚙唇此陽氣脫陷之眞寒症也凡此危候勿論其脉勿問其症但見有其一二亦去三味急加桂附補之庶有復生之理大抵用藥之法當分元氣虛實標本緩急若病急而元氣實者先治其標病緩而元氣虛者先治其本若病急而元氣又虛者當治其本爲主而兼以治標東垣先生云形氣有餘病氣有餘當瀉不當補形氣不足病氣不足當補不當瀉丹溪先生云但見腫痛紊之脉症虛弱便與滋補氣血無慮可保終吉治者審焉

吳郡薛　已著
新都吳玄有校

治瘡瘍各症附方

托裏消毒散　治胃氣虛弱或因尅伐不能潰散服之未成即消已成即潰腐肉自去新肉自生若腐肉既潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯爲主屬氣虛者四物湯爲主並兼寒涼消毒之劑

人參　黃芪（鹽水拌炒）　當歸（酒拌炒）　川芎
芍藥（炒）　白朮（炒）　茯苓（各一錢）　金銀花
白芷（各七分）　甘草（炙五分）　連翹（五分）

右水煎服

托裏散　治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及惡寒發熱者宜用此補托其屬六淫七情或諸經錯雜之邪而爲患者當各審其因而參以主治之劑其屬胃氣虛弱者當以六君子湯爲主

人參氣虛者多用之　黃芪炒各二錢　白朮炒　陳皮

當歸　熟地黃自製　茯苓　芍藥酒炒各一錢半

右水煎服

清熱消毒散　治一切癤疽陽症腫痛發熱作渴

黃連炒　山梔炒　當歸各一錢　連翹

川芎　芍藥炒　生地黃各一錢半　金銀花二錢

甘草一錢

右水煎服

黃連消毒散　治腦疽背疽腫瘍疼痛或麻木

黃連製　羌活各一分　黃芩　黃柏各五分

生地黃　知母製　獨活　防風

當歸尾　連翹各四分　藁本　防已

桔梗各五分　黃芪　蘇木　陳皮

澤瀉各二分　人參　甘草各三分

右水煎服

清涼飲　治瘡瘍煩躁飲冷煩痛脉實大便秘結小便赤澀

大黃炒　赤芍藥　當歸各二錢　甘草各二錢

右水煎服

破棺丹　治瘡瘍熱極汗多大渴便秘譫語發狂

大黃二兩五錢半生半熟　芒硝　甘草各二兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸童便酒化下白湯亦可

黃連解毒湯　治瘡瘍癰癤煩躁飲冷脉洪數或發狂言

黃芩　黃柏炒　黃連炒　山梔各一錢五分

右水煎熱服

內疎黃連湯　治瘡瘍發熱而嘔大便秘結脉洪而實

黃連　芍藥　當歸　檳榔

木香　黃芩　梔子　薄荷

桔梗　甘草各一錢　連翹　大黃各一錢五分

每劑水煎仍量虛實治之

托裏榮衛湯　治瘡瘍外無癰腫內便調和乃邪在經絡宜用此藥

黃芪　紅花各一錢　桂枝七分　蒼术米泔浸炒

柴胡　連翹　羌活　防風

當歸身酒拌　甘草炙　黃芩　人參各一錢

右酒水煎服

內托復煎散　治瘡瘍腫癰在外其脉多浮邪氣勝必侵於內宜用此托之

地骨皮　黃芩炒　茯苓　白芍藥炒

人參　黃芪鹽水拌炒　白术炒　桂

甘草炙　防己酒炒　當歸酒拌各一錢　防風二錢

右先以蒼术一升水五升煎去术入藥再煎至二升終日飲之

人參敗毒散　治瘡瘍癰癤痛寒熱或拘急頭痛脉細有力

人參　羌活　獨活　前胡

柴胡　桔梗　枳殼　茯苓

川芎　甘草各一錢

右水煎服

仙方活命飲　治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者卽潰又止痛消毒之聖藥也

川山甲（蛤粉炒黃）　白芷　防風　沒藥
甘草　赤芍藥　當歸尾　乳香
天花粉　貝母（各一錢）　金銀花　陳皮（各二錢）
皂角刺（一錢）

右酒一碗煎數沸服

滌心湯　治瘡瘍腫痛發熱飲冷脉沉實睡語不寧卽防風通聖散每料加黃連五錢每劑一兩水煎服

奪命丹　治疔瘡發背等症或麻木或嘔吐重者昏憒若疔毒牙關緊急用三五丸爲末水調灌下有奪命之功

蟾酥（乾者酒化）　輕粉（各五分）　枯白礬　寒水石（煅）
銅綠　乳香　沒藥　麝香（各一錢）

右爲末用蝎牛或酒糊丸菜豆大每服二三丸溫酒葱湯下

東垣聖愈湯　治胆胃虧損膿水不止或金瘡出血心煩不安眠睡不寧五心煩熱飲食少思

地黃（酒拌蒸生地黃酒拌蒸熟地黃半日）　川芎　人參（各五分）
當歸（酒拌）　黃芪（鹽水浸炒各一錢）

右水煎服

濟陰湯　治瘡屬純陽腫痛發熱

連翹　山梔（炒）　黃芩（炒）　黃連（炒各一錢）
芍藥（一錢五分）　金銀花（三錢）　甘草（一錢）　牡丹皮（一錢二分）

右水煎服大便秘量加大黃

抑揚散　治瘡屬純陽腫痛發熱

天花粉三兩　薑黃　白芷　赤芍藥各一兩

右爲末茶湯調搽患處

沖和湯　治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣虛弱失於補托所致

人參二錢　黃芪　白朮　當歸　白芷各一錢半　茯苓　川芎　皁角刺炒　乳香　沒藥各一錢　金銀花一錢　甘草節一錢　陳皮二錢

右水酒各半煎服

陰陽散　治瘡屬半陰半陽

紫荊皮炒五錢　獨活去節一兩　赤芍藥炒二兩　白芷二兩　石菖蒲二兩

右爲末葱酒調搽

回陽湯　治脾腎虛寒瘡屬純陰或藥損元氣不腫痛不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆或陽氣脫陷等症

乾薑炮　附子炮各二錢　黃芪各三錢　當歸　人參　柴胡　升麻各五分　陳皮　白朮　甘草炙各二錢

右酒水煎服不應薑附倍之

抑陰散　治瘡瘍元氣虛寒熯腫不消或不潰斂或筋攣骨痛一切冷症

草烏二兩　赤芍藥一兩炒　肉桂五錢　南星一兩

白芷 一兩

右爲末葱湯調塗熱酒亦可

托裏溫中湯　治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因尅伐胃氣脫陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏憒此寒變內陷緩則不治

羌活　附子 炮去皮臍 四錢
丁香　沉香　乾薑 炒 三錢
陳皮 各一錢　甘草 炙 二錢　益智　木香　茴香

右薑水煎服

附子理中湯　治瘡瘍脾胃虛寒或誤行攻伐手足厥冷飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子　人參　白茯苓　白芍藥 各三錢
白朮 四錢

右水煎服

薑附湯　治瘡瘍眞陽虧損或誤行汗下氣短頭暈

人參　附子 炮去皮臍 一兩　乾薑 炮 白朮 各五錢

右作二劑水煎服

參附湯　治失血過多或膿瘡大泄或寒涼汗下眞陽脫陷上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等症急服以救元氣緩則不治

人參　附子 炮去皮臍 各五錢

右薑五片水煎服不應倍之

獨參湯　治一切失血或膿水出多血氣俱虛惡寒發熱作渴煩躁蓋血生於氣故血脫補氣陽生陰長之理也用人參二兩棗十枚薑十片水煎徐徐服

人參理中湯　治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹作脹或胸膈虛痞飲食不入

白朮　人參　乾薑　甘草炙各等分

右薑棗水煎服

竹葉黃芪湯　治癰疽氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉二十一錢　黃芪　麥門　當歸

川芎　甘草　黃芩炒　芍藥

人參　半夏　石膏煅各一錢　生地黃二錢

右每服三五錢水煎服

竹葉石膏湯　治癰疽胃火盛腫痛作渴

淡竹葉　石膏煅　桔梗　木通

薄荷　甘草各一錢

右薑水煎服

當歸川芎散　治手足少陽經血虛瘡症或風熱耳內痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或婦女經水不調胸膈不利脇腹痞痛

當歸　川芎　柴胡　白朮

芍藥各一錢　山梔炒一錢二分　牡丹皮　茯苓各八分

蔓荊子　甘草各五分

右水煎服

若肝氣不平寒熱加地骨皮肝氣實加柴胡黃芩氣血虛加參芪歸地脾虛飲食少思加苓朮脾虛胸膈不利加炙甘麥痰滯胸膈不利加朮半肝氣不順胸膈不利或小腹痞滿或時攻痛加青皮肝血不足胸膈不利或小腹痞滿或時作痛加

熟地 肝血虛寒小腹時痛加肉桂日晡發熱加歸地
梔子清肝散 一名柴胡梔子散 治三焦及足少陽經風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱往來

柴胡 梔子炒 牡丹皮 各一錢 茯苓
川芎 一錢 當歸 牛蒡子炒 各七分
甘草 五分 芍藥

右水煎服若六陽頭痛加羌活

柴胡清肝散 治鬓疽及肝膽三焦風熱怒火之症或項胸作痛或瘡毒發熱

柴胡 一錢五分 黃芩炒 一錢 人參 一錢 山梔炒 一錢五分
川芎 一錢 連翹 桔梗 八分 甘草 五分

右水煎服

小柴胡湯 治肝膽經症風熱瘧癘結核或腫痛色赤或寒熱往來或日晡發熱或潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽或吐酸食苦水皆用此藥

柴胡二錢 黃芩一錢 人參 半夏 各七分
甘草炙五分

右薑水煎服

補陰八珍湯 治瘰癧等瘡屬足三陰虛者

當歸 熟地 川芎 芍藥
人參 白朮 茯苓 甘草

黃柏 酒炒黑 知母 酒炒 各七分

瀉青丸 治肝經實熱瘰癧腫痛寒熱或脇乳作痛大便秘結

當歸　龍膽草酒炒　川芎　山梔
大黃炒　羌活　防風各等分

右爲末蜜丸雞頭子大每服一二丸白湯化下

若血虛者四物加山梔柴胡或逍遙散若腎水虧損不能生肝木而自病筋攣結核或腰節拳攣或似中風宜用六味丸加五味子

散腫潰堅湯　治瘰癧堅硬氣血無虧宜用之

柴胡四分　升麻三分　龍膽草酒炒五分　連翹三分
黃芩酒炒四分　甘草炙二分　桔梗五分　昆布五分
當歸尾酒拌　白芍藥炒各三分　黃柏酒炒三分　知母酒炒五分
葛根　三棱酒拌微炒　廣木各三分　瓜蔞根五分

右水煎服

蓋氣養榮湯　治懷抱抑鬱或氣血損傷四肢頸項等處患腫不問軟硬赤白腫痛或潰而不斂

人參　茯苓　陳皮　貝母
香附　當歸酒拌　川芎　黃芪鹽水拌炒
熟地黃酒拌　芍藥炒各一錢　甘草炙　桔梗各五分
白朮炒二錢　柴胡六分

右薑水煎服

必效散　治瘰癧氣血雖無虧損內有癧核未去而不能愈

南硼砂二錢輕粉一錢　麝香五分　巴豆五箇去皮心膜
白梹榔一箇　班猫四十箇去頭翅同糯米炒

右同研極細末取雞子二箇去黃用清調藥仍入殼內以濕紙數重糊口入飯甑候熟取出曝乾研末虛者每服半錢實

者一錢用炒生薑酒五更初調服如覺小腹痛用益元散一服其毒俱從小便出胎婦勿餌毒去後多服益氣養榮湯瘡口自合

劍頭散　治一切頑瘡內有瘀肉癰核不化瘡口不合宜用此藥腐之

赤石脂一錢　乳香　黃丹一錢　輕粉

右為末搽瘀肉上其肉自脫若瘡口小或痔瘡用糊和作餅子陰乾紙之凡瘡久不合者內有膿管須用此腐之內服托裏之劑

神仙隔蒜灸法　治一切癰疽腫毒前論言之詳矣凡大痛或不痛或麻木痛者灸至不痛不痛灸至痛其毒隨火而散此拔引鬱毒從治之法也信有回生之功其法先大蒜頭切三分厚安瘡頭上用艾炷於蒜上灸之五炷換蒜再灸未成即消已成殺其大勢瘡患大以蒜杵爛攤患處將艾鋪蒜上灸之蒜敗再換瘡色紫或白而不起發不作膿不大痛不問日期最宜多灸

神效葱熨法　治流注結核骨癰鶴膝等症腫硬或先以隔蒜灸而餘腫未消最宜用熨以助氣血而行壅滯其功甚大又為跌撲傷損止痛散血消腫之良法用葱白頭搗爛炒熱頻熨患處冷再換

神效桑枝灸　治發背不起或瘀肉不潰此陽氣虛弱用桑枝燃火着吹熄焰用火灸患處片時日三五次以助腫潰若腐肉已去新肉生遲宜灸四畔其陰瘡癰瘍流注腫瘡惡瘡久

不愈者亦宜用之大抵此法未潰則解熱毒止疼痛消瘀腫已潰則補陽氣散餘毒生肌肉其陽症腫痛甚或重如負石初起用此法出毒水即內消其日久者用之雖潰亦淺且無苦楚惜患者不知有此治者亦不肯用此也

烏金膏　治發背中央肉死塗之即生若初起腫痛用點數處其毒頓消若肉腐塗之即潰若惡瘡頑瘡元氣無虧久不收斂者內有毒根以紙燃蘸紙其內有等發背因元氣虛弱或因起伐元氣胃氣虧損毒氣散漫中黯外赤不腐不潰服大補之劑中央漸潰漸脫須用純陽之藥以界其有裂紋如刀劃之狀中接其元氣庶能收斂若妄用刀針去肉出血陽隨陰散元氣愈傷或塗涼藥則毒氣不解氣血愈虛非徒無益而又害之

其方用巴豆一味去殼炒黑研如膏點于患處臨用合之已上三法雖不出於方書余推其意而製用之良有奇驗

砭法　治丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血壅盛用細磁器擊碎取有鋒芒者一塊以筋一根劈開頭尖夾之用線縛定兩手指輕振筋梢令磁芒正對患處懸寸許再用筋一根頻擊筋頭令毒血遇刺皆出毒入腹膨脹者難治

豆豉餅　治瘡瘍腫痛硬而不潰及潰而不斂并一切頑瘡惡瘡江西豆豉餅為末唾津和作餅子如錢大厚如三文置患處以艾壯於餅上灸之乾則易之如青瘡用漱口水調作覆患處以艾鋪餅上灸之如未成者即消已成者亦殺其毒如有不効氣血虛敗也

香定痛散　治一切瘡瘍潰爛疼痛

枳殼麩炒　薏苡仁炒微　桑白皮炒　甘草節
防己去皮各一錢　黃芪蜜水拌炒　五味子搗炒　百合蒸各一錢五分
茯苓麩炒　地骨皮　知母炒　杏仁各五分

右薑水煎服

人參補肺湯　治肺症咳喘短氣或腎水不足虛火上炎痰涎湧盛或吐膿血發熱作渴小便短澀

人參　白朮　茯苓
黃芪　陳皮　當歸各一錢　山茱萸肉　山藥各二錢
五味子五分　麥門七分　甘草炙五分　熟地自製一錢半
牡丹皮八分

右薑棗水煎服

人參平肺散　治心火剋肺傳爲疳疾咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸

乳香　沒藥各五錢　滑石二兩　寒水石二兩　水片一錢

右爲細末搽患處痛即止甚効

青龍湯　治肺受風寒咳嗽喘急

半夏湯泡七次二兩五錢　乾薑炮　細辛　麻黃去節
肉桂　芍藥　甘草炙各二兩　五味二兩拌炒

右每服五錢薑水煎服

葶藶大棗瀉肺湯　治肺症胸膈脹滿上氣喘急或身面浮腫鼻塞聲重用甜葶藶炒黃色研末每服三錢棗十枚水二鍾煎一鍾去棗入藥再煎七分食後服

桔梗湯　治肺症咳嗽膈咽乾口燥煩悶作渴時出臭濁

桔梗炒　貝母去心　當歸酒浸　瓜蔞仁

腸痞滿咽嗌不利若因肝木太過而致當補肺若因腎水不足而患當補脾肺若因心火旺而自病當利小便

人參　陳皮　茯苓各二錢　知母炒七分　天門冬去心各一錢　桑白皮炒一錢　甘草　五味子杵炒四分　青皮　地骨皮

右水煎服

參芪補脾湯　治肺疽脾氣虧損久咳吐膿涎或中滿不食必服此藥補脾土以生肺金自則不治

人參　白朮各二錢　黃芪二錢五分　茯苓　陳皮　當歸各一錢　升麻三分　麥門冬七分　五味子四分　桔梗六分　甘草炙五分

右薑棗水煎服

射干湯　治胃癰吐膿血

射干去毛　山梔仁　赤茯苓　升麻各一錢　赤芍藥一錢五分　白朮五分

右水煎服

薏苡仁湯　治風熱唇口瞤動或結核或浮腫

薏苡仁炒　防已　赤小豆　甘草炙各等分

右水煎服

瓜子仁湯　治產後惡露或經行瘀血作痛或作癰患

薏苡仁四錢　桃仁去皮　牡丹皮　瓜蔞仁各一錢

右水煎服

梅仁湯　治腸癰壅痛大便秘澀

梅仁九箇去皮尖　大黃炒　牡丹皮　芒硝各一錢

冬瓜仁　研三錢　犀角　鎖末一錢

右水煎入犀末服

大黃湯　治腸癰小腹堅腫按之則痛肉色如故或瘀赤微腫小便頻數汗出憎寒脈遲緊膿未成急服之

大黃炒　朴硝各一錢　牡丹皮　瓜蔞仁炒

桃仁去皮尖各二錢

右水煎服

牡丹皮散　治腸癰腹濡而痛時下膿

牡丹皮　人參　天麻　白茯苓

黃芪炒　薏苡仁　桃仁去皮尖　白芷

當歸酒拌　川芎各一錢　宮桂　甘草炙五分

木香三分

右水煎服

失笑散　治跌撲產後心腹絞痛或不知人事或經行瘀血作痛成癰

靈脂　蒲黃俱炒等分

右每服二三錢酒水煎熱服

防風湯　治破傷風表症未傳入裡急服此

防風　羌活　獨活　川芎各等分

右每服五錢水煎調蜈蚣散服

蜈蚣散

蜈蚣一對炙　鱉三錢煅

羌活湯　治破傷風在半表半裡間宜和解急服此湯稍緩則邪入於裡不可用矣

羌活　菊花　麻黃　川芎
石膏　防風　前胡　黃芩
細辛　甘草　枳殼　白茯苓
蔓荊子（各一兩）　薄荷　白芷（各五錢）

右每服五錢薑水煎日二三服

大芎黃湯　治破傷風邪傳於裡舌强口噤項背反張筋惕搐搦痙攣盛宜急服之

川芎　羌活　黃芩　大黃（各一兩）

右每服五七錢水煎服

白朮防風湯　治破傷風服表藥過多而自汗者

白朮　黃芪（各一兩）　防風（二兩）

右每服五七錢水煎服臟腑和而自汗者可服此藥若若有臟

秘小便赤而自汗者急以大芎黃湯下之

六味丸（一名六味地黃丸）　此壯水之劑夫人之生以腎爲主凡病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可用者世所罕知若腎虛發熱作渴小便淋秘痰氣壅盛咳嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痠軟五臟齊損肝經不足之症尤當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失瘡水泛爲痰之聖藥血虛發熱之神劑也

熟地黃（用生者自製八兩）　山茱萸（去核酒浸蒸）　山藥（各四兩）
牡丹皮　茯苓（去皮）　澤瀉（各三兩蒸）

右地黃杵膏餘爲末蜜丸桐子大每服七八十丸滾湯下

八味丸　治命門火衰不能生土以致脾土虛寒而患流注鶴

膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺即前方加肉桂附子各一兩經云益火之源以消陰翳即此方也

加減八味丸　治症同上即六味地黃丸加肉桂五味子各一兩

八珍湯　治脾胃傷損惡寒發熱煩躁作渴或瘡瘍潰後氣血虛敗膿水清稀久不能愈即四君四物合方

十全大補湯　治瘡瘍氣血虛弱腫痛不愈或潰瘍膿清寒熱自汗盜汗食少體倦發熱作渴頭痛眩暈似中風狀即八珍湯加黃芪肉桂

補中益氣湯　治元氣虛損或因剋伐惡寒發熱肢體倦怠飲食少思或不能起發消散生肌收斂或兼飲食勞倦頭痛身熱發躁作渴脈洪大弦虛或微細軟弱

黃芪　人參　白朮　甘草炙各一錢五分　當歸一錢　陳皮五分　升麻　柴胡各三分

右薑棗水煎空心午前服

生脈散　治胃氣虛損陰火上衝口乾喘促或肢體倦怠肌肉消瘦面色痿黃汲汲短氣汗出不止食少作渴或膿水出多氣血俱虛煩躁不安睡臥不寧或濕熱大行火土合病脾胃虛弱身重氣短或金爲火制絕寒水生化之源肢體痿軟脚歇服黑等症

人參十錢　麥門冬二錢　五味子一錢

右水煎服如不應倍之

人參養榮湯　治脾胃虛損氣血俱虛發熱惡寒四肢倦怠肌肉消瘦面色痿黃汲汲短氣食少作渴凡大病後最宜用此

白芍藥一錢半炒 人參 陳皮 黃芪蜜炙
桂心 當歸 白朮
熟地黃 五味子炒 茯苓各七分半 遠志五分
右薑棗水煎服

四君子湯 治脾胃虛弱或因剋伐腫痛不散潰斂不能宜用此以補脾胃諸症自愈若誤用攻毒七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作瘧或大便不實若脾胃氣虛瘡口出血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之症宜于前湯但加當歸脾胃饒旺飲食自進陰血自生若用四物湯沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂起若命門火衰而脾土虛寒必用八味丸以補土母

人參 白朮 茯苓各二錢 甘草炙一錢
右薑棗水煎服

六君子湯 治脾胃虛弱或寒涼剋伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以壯營氣諸症自愈即前方加陳皮半夏

異功散 治脾胃虛弱飲食少思即四君子湯加陳皮

四物湯 治血虛發熱或因失血或因剋伐或因潰後致補熱內熱頻躁不安皆宜服之經云血生於脾若脾虛不能生血者宜用四君子加當歸酒炒白朮以補脾

當歸 熟地黃各三錢 芍藥二錢 川芎一錢五分
右水煎服

歸脾湯 治憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不能攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不准晡熱內熱或唇瘡

流注等症不能消散潰斂

白朮　白茯苓　黃芪炒　當歸
龍眼肉　遠志　甘草炙三分　人參一錢　酸棗仁炒各一錢　木香五分

右薑棗水煎服

當歸補血湯　治脾胃損傷或服峻劑致血氣俱虛肌熱大渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無此病多得於飢飽勞役者若誤服白虎湯必死

當歸三錢　黃芪炙一兩

右水煎服

六一湯

黃芪炙六錢　甘草炙一錢

右水煎服

加味逍遙散　治肝脾血虛內熱發熱或遍身搔痒寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡煩赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胸乳腹脹小便欠利

甘草炙　當歸　芍藥酒炒　茯苓
白朮炒　柴胡各一錢　牡丹皮　山梔炒名七分

右水煎服

黃芩清肺湯　治肺經陰虛火燥而小便不通若因脾經有熱當清其脾若因心火刨肺當制其心

黃芩一錢　梔子三箇打碎

右水煎服

滋腎丸　治腎經陰虛發熱作渴便赤足熱服軟等症凡不渴

而小便秘熱在下焦血分也最宜此藥經云無陰則陽無以化若脾肺燥熱所遺當滋其化源

知母　黃柏各酒炒　肉桂二錢

右爲末水丸桐子大每服百丸空心白滾湯下

五苓散　治下部濕熱瘡毒小便赤少

澤瀉　豬苓　肉桂　白朮

赤茯苓各等分

右爲細末每服一二錢熱湯調下

犀角地黃湯　治胃火血熱妄行吐衄或大便下血者

犀角鎊末　生地黃　赤芍藥　牡丹皮各一錢半

升麻

右水煎熟入犀末服

若因怒而致加山梔柴胡若脾氣虛而不能攝用歸脾湯若肝脾火動而妄行用加味逍遙散若脾氣虛而不能統用補中益氣湯加炮黑乾薑若血虛有火而妄行用四物加炮薑若腎經虛火而血妄行用六味丸料不應急加肉桂以引虛火歸源

清胃散　治膏粱積熱唇口腫痛　齒齦潰爛煩痛連頭面或惡寒發熱

升麻二錢　生地黃　牡丹皮　黃連

當歸酒洗各一錢

右水煎服痛未止石膏之類可量加

潤腸丸　治脾胃伏火大腸乾燥或風熱血結宜用此丸通之若結在直腸宜豬膽汁導之蓋腎主五液開竅於二陰若津

液滋潤大便通調若津液不足脾氣虧損必當培補猶忌前藥

麻子仁　桃仁去皮尖各一兩　羌活　歸尾

大黃漂　皁角刺　秦艽名五錢

右各另研為末煉蜜或猪膽汁丸桐子大每服三四十丸白湯下若用猪膽汁導之而不結燥急補元氣

四神丸　治脾腎虛弱大便不實飲食少思或小腹作痛或產後泄瀉肚腹作痛不思飲食

肉豆蔻　五味子各一兩　補骨脂四兩　吳茱萸浸炒一兩

右為末水一碗生薑八兩紅棗一百枚煮熟取棗肉和末丸桐子大每服五七十丸空心食前白湯下

三神丸　治脾腎虛寒不思飲食或侵晨五更泄瀉或飲食少思大便不實其功甚劾如不應乃命門火衰急用八味丸補

火而生土

破故紙四兩炒　肉豆蔻二兩生用

右為末用大紅棗四十枚生薑四兩水煮熟去薑取棗肉和藥丸桐子大每服五十丸空心鹽湯送下

越鞠丸　治六鬱牙齒作痛口舌生瘡或胸膈痞滿嘔吐吞酸或腹脹腿酸等症

蒼术炒　神麯炒　香附　山查

山梔炒　撫芎　麥芽炒各等分

右為末水調麵糵麪糊丸桐子每服七十丸白湯下

二陳湯　治脾虛中脘停痰嘔吐惡心或頭目不清飲食少思等症

陳皮　半夏　茯苓各一錢　甘草炙五分

右薑水煎

錢氏白术散　治胃氣虛或因吐瀉口乾作渴飲食少思

藿香　白术炒　木香　白茯苓
甘草炒　人參各一錢　乾葛二錢

右水煎服

生地黃丸　治師尼寡婦室女乍寒乍熱而患瘡瘍等症肝脉弦長而出魚際

生地黃一兩酒拌炒　秦艽
硬柴胡各五錢　赤芍藥一兩
黃芩

右爲末入地黃膏加煉蜜少許丸桐子大每服三十丸烏梅煎湯下日進二服

加味地黃丸　治肝腎陰虛瘡症或耳內痒痛出水或眼暈氣喘嗽或作渴發熱小便赤澀等症

乾山藥　山茱萸　牡丹皮　澤瀉
白茯苓　熟地黃　柴胡　五味各另爲末等分

右將二地黃搗碎酒拌濕杵膏入前末和勻加煉蜜爲丸桐子大每服百丸空心白湯送下不應用加減八味丸

琥珀膏　治頸項瘰癧及脇下初如梅子腫結硬强漸如連珠不消不潰或潰而膿水不絕經久不瘥漸成漏症

琥珀一兩　木通　桂心　當歸
白芷　防風　松脂　硃砂研
木鱉子內各五錢　麻油二斤　木香各二錢　丁香

右先用琥珀丁香桂心硃砂木香爲末其餘藥入油內煎黑

濾去粗徐徐入黃丹再煎軟硬得中即成膏矣

人參黃芪湯　治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參　麥門冬　陳皮　白朮　蒼朮各五分　黃芪一錢　黃柏炒四分　升麻　歸身各五分

右水煎服

托裏當歸湯　治潰瘍氣血俱虛瘡口不斂或晡熱內熱寒熱往來或婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等症

當歸　黃芪　人參　熟地黃　川芎　芍藥各一錢　柴胡　甘草各五分

右水煎服

人參內托散　治瘡瘍潰膿而作痛者

人參　黃芪　當歸　川芎
厚朴　防風　白芷　桔梗
官桂　紫草　木香　甘草

右入糯米一撮水煎服

藿香正氣散　治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂泄瀉或作瘧疾等症

桔梗　大腹皮　紫蘇　茯苓
白芷　半夏　陳皮　白朮
厚朴各一錢　炙甘草五分　藿香一錢五分

右薑棗水煎服

升陽除濕湯　治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便赤黃四肢困倦

甘草　麥芽
澤瀉　益智仁
神麯　升麻
蒼朮一錢　白朮二錢
茯苓七分

右薑棗水煎服

十宣散　治瘡瘍脉緩濇體倦惡寒或脉浮緊細用之以散風助陽氣也

人參　當歸　陳皮　猪苓各三分
炙草　白芷　防風　半夏
防風　肉桂各五分　川芎各一錢　柴胡　羌活各五分
厚朴　桔梗　茯苓

右水煎服

參朮膏　治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

人參　白朮各等分

右水煎稠湯化服之

清燥湯　治元氣虛弱濕熱乘之肢體痠軟或頭目眩暈飲食少思口乾作渴或自汗盜汗胸滿氣促小便赤少大便不調等症

黃芪一錢五分　五味子九粒　蒼朮
白朮　麥門冬　生地黃　陳皮
澤瀉各五分　茯苓　人參去蘆　當歸酒洗
升麻各三分　神麯炒　猪苓　柴胡
炙草各二分　黃柏酒炒三分

右水煎服

補眞丸　治眞陰虧損諸症

肉蓯蓉（酒浸焙乾）　萌蘆芭（炒）　附子　陽起石（煨）
五味子　兎絲子（洗淨酒浸）　川烏
沉香　鹿茸（酒炒）　巴戟天（去心）　鍾乳粉（各一兩半）

右爲末用羊腰子兩對治如食法酒煮搗爛入酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心米飲鹽湯任下

托裏健中湯　治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少思或作嘔瀉等症

人參　白朮　茯苓（各二錢）　半夏
炮薑（各一錢）　炙草　五分　黃芪　一錢五分　肉桂　二分

右薑棗水煎服

裏益中湯　治中氣虛弱飲食少思或瘡不消散或瘡而不

人參　白朮　陳皮　半夏
茯苓　炮薑（各一錢）　木香　炙草（各五分）

右薑棗水煎服

托裏抑青湯　治脾土虛弱肝木所侮以致飲食少思或胸膈不利等症

人參　白朮　茯苓　半夏（各一錢）
芍藥　柴胡（各五分）　陳皮　一錢　甘草　五分

右薑棗水煎服

托裏清中湯　治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等症

人參　白朮　陳皮　半夏（八分）　桔梗（七分）　茯苓（各一錢）　甘草　五分

右薑棗水煎服

乳香五分　沒藥五分　丁香三分

右作二劑水煎服

濟生犀角地黃湯　治鬱熱不解劒血便血等症

犀角　生地　牡丹皮各等分

右每五七錢水煎服加減全上亦治便血

瘍瘡方

雄黃細研五分　五靈脂去石過飛淨者二錢半　白礬半生半燒過研二錢半　五倍子泡過各一錢

右爲細末研極細用紙花子貼瘡口上

猪蹄湯

香白芷　黃芩　生甘草

當歸　羌活　露蜂房取有蜂兒者

托裏益黃湯　治脾土虛寒水反侮土以致飲食少思或嘔吐泄瀉等症

人參　白朮　陳皮　茯苓

半夏各一兩　炮薑　丁香　炙草各五分

右薑棗水煎服

托裏越鞠湯　治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思等症

人參　白朮各一錢　陳皮　半夏各一錢

山梔　川芎　香附　蒼朮各七分

炙草五分

右薑棗水煎服

乳香止痛散　治瘡瘭不止

粟殼三錢　白芷一錢五分　炙草　陳皮各一錢

右先將猪蹄彎一隻用水數碗煮熟取清汁分作十數次每次用前藥一兩煎十數沸去滓無風處淋洗死肉惡隨洗而下極効

神効瓜蔞散　治乳癰初起者自消膿成者自潰及一切癰疽或潰後餘毒亦宜用之

黃瓜蔞一枚　當歸五錢　生甘草五錢　乳香　沒藥各五

石用水酒煎服

清肝解鬱湯　治肝經血虛風熱或肝經鬱火傷血乳內結核或爲腫潰不愈凡肝膽經血氣不和之症皆宜用此藥

人參一錢　柴胡八分　白朮一錢五分　牡丹皮八錢

茯苓一錢　陳皮八分　甘草五分　當歸一錢五分

貝母一錢　川芎八分　山梔炒　芍藥炒

熟地黃各一錢

右水煎服

清肝益榮湯　治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項腮乳脇助作痈或作疾子并一切肝火之症

山梔　當歸　木瓜不犯鐵器　茯苓各一錢

柴胡　川芎　芍藥炒各七分　龍膽草八分

白朮二錢　熟地一錢五分

右薑水煎服

益元散

滑石六兩　甘草一兩

右爲末每服一錢酒調下

神効開結散　治瘰疾不問年歲極驗

沉香　木香　橘紅四兩　猪厭肉子生熬豚猪項下
珍珠四十九粒砂鍋內泥封口煅過絲一枚如棗大取四十九
右爲末每服一錢臨臥冷酒調搽徐徐嚥下輕者三五服重者一料全愈修合用除日效忌鹹酸油膩濕氣等物

海藻玉壺丸　治肝經癭癗

海藻　昆布各二兩　小麥四兩醋煮炒乾龍膽草二兩
右爲末煉蜜丸桐子大每服二三十丸臨臥白湯下并吟化嚥之

普濟消毒飲　治天行時毒頭面腫痛或咽喉不利若饑饉之後患之最宜用仍當固胃氣

黃芩　連翹各五錢　人參三錢　陳皮
玄參　甘草　柴胡　桔梗各一錢

牛蒡子　馬勃七分　板藍根七分　白殭蠶
升麻各五分

右水煎服大便秘量加六黃

通氣散　治時毒壅盛取嚏以泄其毒

玄參一錢五分　猪牙皁角　川芎各一錢　藜蘆五分
羊躑躅花二錢

右爲末用紙撚蘸少許入鼻內取嚏爲度

防風通聖散　治時毒熱毒便秘熱燥若時毒饑饉之後胃虛虧損者須當審察非大滿大實不用

防風　當歸　川芎　芍藥
大黃　芒硝　連翹　薄荷
麻黃　桔梗　石膏　黃芩各一兩

白米　山梔
滑石　一兩　荊芥各一錢　甘草二兩
右水煎服或爲末白湯調下仍量人虛實

葛根牛蒡湯　治時毒腫痛而便利調和者
葛根　官仲　甘草（又名國老）　豆豉　牛蒡（半生半炒）各一錢
右水煎服

犀角升麻湯　治時毒或風熱頭面應痛或咽喉不利或風熱髮瘡疙瘩等症
犀角　升麻　防風　羌活各一錢
白芷　黃芩　白附子（名一錢五分）　國老（六分）
右水煎服

白芷胃風湯　治手足陽明經氣虛風熱面目麻木或牙齒疼

急眼目瞤動
白芷（二錢五分）　升麻（二錢五分）　葛根　蒼朮（米泔炒各八分）
炙草　當歸各一錢五分　柴胡
黃柏炒　蒼朮　羌活各四分　薑荊子五分
白殭蠶三分　麻黃去節七分

右水煎服

升麻黃連湯　治胃經熱毒腮痛作痛或發寒熱
升麻　川芎　當歸各半錢　連翹
黃連　牛蒡子　白芷各一錢
右水煎服燃連大陽加羌活連耳後加山梔柴胡

梔子仁湯　治時毒痛大便秘結
薤金　枳殼　升麻　山梔炒各一錢

右水煎服

雙解散　治便癰內蘊熱毒外挾風邪或交感失宜精血交錯以致癰痛大小便秘結先用此藥通解更用調補之劑

辣桂　大黃　帝牛蒡炒　桃仁　白芍藥　澤瀉　乾薑各五分

右水煎服

製甘草法　治懸癰不拘腫潰

右每用大甘草一兩切五寸許用潤水一碗浸透以慢火炙乾仍投前水浸透再炙至水乾為度却挫細用水二鍾煎八分空心服

大蘆薈丸　一名九味蘆薈丸　治肝火下疳潰爛或作痛煩腫或治小兒疳膨食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等瘡并蟲蝕二陰痒痛

胡黃連　蘆薈　黃連　木香　白蕪荑　青皮　白雷丸　鶴虱草各一兩　麝香一錢

右為末蒸餅糊丸桐子大每服一錢空心米湯下

八正散　治下疳便毒小便淋滴脉症俱實者

大黃　車前子　瞿麥　扁蓄　山梔　木通各二錢　滑石二兩　甘草一錢

右水煎服

內托羌活湯　治臀癰腫痛兩尺脉緊按之無力者

羌活　黃柏各一錢　肉桂　連翹　陳皮　黃芪各五錢　防風　蓽本　炙草　蒼朮

右水酒煎服

大防風湯　治足三陰經虧損外邪乘虛患鶴膝風或附骨疽腫或腫而不痛不問已潰未潰用三五劑後更用調補之劑

附子　牛膝各一錢　白朮　羌活

人參　防風各三錢　川芎一錢五分　辣桂

黃芪　白芍藥　杜仲　熟地

甘草炙各五分

右水煎服

加味龍膽瀉肝湯　治肝經濕熱或囊癕便毒下疳懸癕腫痛作痛小便濇滯或婦人陰瘡痒痛或男子陰挺腫脹或出膿水

龍膽草　澤瀉各一錢　車前子　生地黃

木通　當歸尾　山梔　枯黃芩

炙甘草各五分

右水煎服

清心蓮心丸　治膀胱氣虛濕熱玉莖腫痛或莖竅澁滯口苦咽乾小便色赤或白濁夜安靜而晝發熱

黃芩　麥門冬　地骨皮　車前子

炙甘草各一錢　石蓮肉半　白茯苓　黃芪

柴胡　人參各一錢

右水煎服

五淋散　治膀胱有熱水道不通或尿如豆汁或如砂石或如膏汁或熱沸便血

赤茯苓半錢　赤芍藥　山梔各二錢　當歸

甘草各一錢五分

右用燈心二十根水煎服
清肺飲　治渴而小便不利乃肺經有熱是絶寒水生化之源
宜用此藥以清化源其水自生而便自利矣
茯苓二錢　猪苓三錢　澤瀉五分　琥珀五分
燈心一分　木通七分　通草六分　車前子一錢
麥門冬五分　扁蓄七分
右爲細末每服二錢水煎服
腎氣丸　治腎經陽虛陰無所化以致膀胱淋漓或脾肺氣虛
不能通調水無所化而膀胱胱癃閉或腎氣虛熱干於厥陰之
絡陰挺痿痺而溺頻數或腎水虛弱陰虧難降使津液敗濁
而爲痰水又治腎虛便血及諸見血發熱自汗盜汗等症之
聖藥也卽六味丸方見前

遺少丹　治足三陰經虛損患膝風等症又補脾腎進飲食之
良劑也
肉蓯蓉去甲酒浸　遠志去心甘草湯泡去骨　茴香炒　巴戟去心
枸杞子　山藥　牛膝　熟地黃爲膏
石菖蒲　杜仲　五味子　白茯苓
楮實子　山茱萸各等分
右爲末用紅棗肉同搗爲丸桐子大每服七十丸溫酒送下
每日三服白湯送下
不換金正氣散　治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈寒熱少食
厚朴　藿香　半夏
陳皮　甘草各等分　蒼朮
右薑棗水煎服

槐花散　治腸風濕毒下血

槐花　青皮各六分　當歸一錢　荆芥
熟地黃　白朮各六分　川芎四分　升麻二錢

右水煎服

四生散　治臁腿瘡淫不愈或目昏花名腎臟風并治風癬疥

癩血風瘡症

白附子負者生用　蒼耳　獨活　蒺藜各等分

右爲末每服二錢用猪腰子一枚批開入藥濕紙包裹煨熟空心連腰子細嚼鹽湯送下

消風散　一名人參消風散　治風熱瘡疥搔痒發熱或頭皮腫痒頭目昏眩鼻流清水噦噴聲重耳作蟬鳴

荆芥穗　人參　白殭蠶　炙草

白茯苓　防風　芎窮　藿香
蟬蛻各二兩　陳皮　厚朴姜製　羌活各五分

右爲末每服三錢茶清調下瘡癬疥癩結大便不通

升麻和氣飲　治風癬瘡疥癩温酒下

當歸　陳皮各一錢半　芍藥酒炒　枳殼麩炒各八分
半夏姜製　蒼术米泔浸炒　桔梗炒黃色　白芷浸軟切片
白茯苓　炙草各五錢　升麻三分　乾薑炮黑　大黃各五分

右水煎服

換肌消毒散　治時瘡不拘初起潰爛

土茯苓五錢　當歸酒洗　白芷　皁角刺
薏苡仁各一錢　白蘚皮　木瓜不犯鐵器　木通

金銀花 各七分　炙草 五分

右水煎服

九味羌活湯　治風熱濕邪壅遏太陽經脈頭痛發熱惡寒身體疼痛或憎風惡寒或肢節煩痛或遍身作痛或拘急不利又治頭痛惡寒脈浮緊又治非冬時天有暴寒人中之頭痛寒熱宜用此以代麻黃湯此神藥也

羌活　防風　蒼朮 各一錢　川芎　白芷　生地　苗參 半錢　煮取切片　細辛

甘草 各一錢

右水煎服衣覆之取微汗濈濈司天加蒼朮天涯雨亦加如湯加石膏三錢知母一錢不渴不加加味羌活散　即前湯加金銀花連翹

當歸飲子　治風濕所傷以致瘡疥等症

當歸　黃芪　芍藥　荊芥穗
防風　蔾蒸　何首烏　生地黃
川芎　甘草 等分

右水煎服

黑丸子 一名和血定痛散　治跌撲墜墮筋骨疼痛或瘀血壅腫或外感風寒肢體作痛若流注膝風初結服之自消若潰後氣虛而發熱與補劑兼服自飲

百草霜　白芍藥 各一兩　赤小豆 一兩五錢　川烏炮 三錢
白斂 一兩六錢　白芷　當歸 各八錢　南星炮 三錢
牛膝焙 六錢　補骨脂焙 八錢

右各別為末酒糊丸桐子大每服三十丸鹽湯溫酒任下子婦不可服

太乙膏　治一切瘡瘍並宜貼之若元氣無虧用隔蒜灸更服活命飲以收全功

玄參　白芷　當歸　肉桂
大黃　赤芍藥　生地黃各一兩

右用麻油二斤入銅鍋內煎至黑濾去相入黃丹十二兩再煎水中捻軟硬得中即成膏矣

黎蘆膏　治一切癰疽發背對口惡瘡腫毒初起未潰者用之能令內消已潰者用之能去腐肉生新肌收口最速

黎蘆一味為末以生豬脂和研如膏塗患處周日易之治便血指云四兩連一同鍋炒不同研糞前紅用菜調酒葵後紅用酒調連元氣虧損者當以補藥加之方効二味用熱湯拌濕頓滾湯中半日藥氣相和炒將焦各揀出聽用甚妙即製菜葵黃連法也

黃蠟丸　治金石發疽及一切癰疽解毒止痛

明白蠟一兩　黃蠟五錢

右鎔蠟和蠟未急和勻衆手丸桐子大每服十九漸漸加二十九滾湯下如服金石發疽別用白蠟末一兩作三五服溫酒調下有人遍身生瘡狀如蛇頭服之即効此藥能解毒氣內攻須多服有効治蛇毒咬鎔滴傷處痛止毒出仍服兩許

當歸膏　治發背癰疽湯火等症去腐肉生新肉其肉未壞者用之自愈肉已死而用之自潰新肉易生搽至肉色漸白其毒始盡止肌最速其外肉燃乾爬連好肉作痛用之即愈亦不結痂又免皺揭之痛殊有神効蓋黃蠟主生肌止痛補血續筋性味甘溫非偏勝毒藥故與新肉相宜此方余已刊行近之治者亦多用之

川當歸一兩　麻油真正者四兩　淮慶生地一兩　黃蠟一兩如白蠟止用五錢

右先用當歸地黃入油煎黑去柤入蠟銘化候温攪勻即成膏矣用塗患處將紙蓋之發背癰疽湯火等症潰爛用之尤妙凡死肉潰爛已盡好肉有些須尚連宜用利刀剪之蓋死肉有毒去遲則傷新矣如洗拭換膏必須預備即貼之若死肉去盡尤宜速貼然新肉畏風尤甚不可忽也

蠲痺消毒散　治時瘡腫節筋攣

薑黃　土茯苓　獨活各五錢　白朮　當歸各一錢五分　赤芍藥一錢　白芷五分

水煎服