



薛氏二十四種

癰疽驗方
外科經驗方

武
584
39



武門
卷 584
39

癰疽神秘驗方

薛氏醫按

癰疽

餘杭陶華編 吳郡薛

癰疽

新 都 吳玄有閱

癰疽十段關

癰疽遍身拘急疼痛寒熱宜宜通經絡宜用人參敗毒散

人參敗毒散

人參

獨活

柴胡

桔梗

羌活

枳殼

茯苓

川芎

前胡

甘草 各一錢

作一劑水二鍾薑三片煎一鍾服後服內托復煎散

內托復煎散

地骨皮

防已

官桂

白芍藥

甘草

當歸

茯苓

白朮

人參

黃芩

黃芪鹽水拌炒 各一錢 防風二錢

咬咀先以蒼朮一片水五升煎去木入藥再煎至二升終日飲之祖再煎服

愚按機要云治瘡之法當分三因用煎二劑者蓋為外因之治也邪在表者用人參敗毒散散之後復內托復煎散托之使邪不得內侵因為善也亦有內因邪在臟致大逆不通宜用內疎黃連湯又有不內外因者便和調勻飲食如故都在經絡宜用托裏榮衛湯不可一槩用煎二劑也

內疎黃連湯
黃連炒 芍藥炒 當歸酒拌 檳榔 木香
黃芩炒 山梔炒 薄荷 桔梗炒 甘草各七
連翹錢半 大黃炒二錢

作一劑水二鍾煎八分食前服

托裏榮衛湯

黃芪炒 紅花 桂枝 蒼朮米泔炒 柴胡
連翹各一錢 羌活 防風 當歸身酒拌 甘草炙
黃芩各七分 人參五錢

作一劑水二鍾煎八分食遠服

癰疽大渴發熱或瀉或小便如淋宜用竹葉黃芪湯

竹葉黃芪湯
生地黃 黃芪各二錢 當歸酒拌 淡竹葉 川芎
甘草炙 黃芩炒 白芍藥炒 人參 半夏
石膏煨各錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食遠服

愚按前證七惡中之一惡也此方治之其功甚捷亦有左手脉浮大而熱或渴者宜發散表邪右手脉沉實而熱或渴者宜疎去內邪若潰後作渴或小便如淋或脉大而無力者屬氣血虛也宜大補氣血亦有潰後熱不止或作渴遂以為敗證不治若素有胃火或胃經熱毒未盡胃脉尚數者仍宜服前湯服而脉反大熱愈甚渴愈作斯為敗證蓋因真氣虛而邪氣實也今之潰瘍畏石膏黃芩二藥性冷多不肯服若胃脉未靜非此藥莫能治也苟因循日久煎熬氣血膿血愈多氣血愈虛反成敗證矣治者當舍證從脉可也大抵瘡瘍之證七惡內見一二惡甚可畏虛中見惡證者不治實證無惡候者自愈

又方托裏黃芪湯

黃芪

炒六錢

甘草

炙

瓜蒌根

各一錢

作一劑水二鍾煎八分頻服之加人參一錢亦可愚用此方治氣虛作渴甚効若氣血俱虛或膿血大泄作渴或兼發熱者宜用托裏養榮湯

托裏養榮湯

人參

黃芪

炙

當歸

酒拌

芍藥

炒

川芎

白朮

各一錢

五味子

研

麥門冬

去心

甘草

炙

熟地黃

酒拌

生者

半日

作一劑用水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

癰疽膿血大泄敗臭痛甚宜用黃芪人參湯黃耆人參湯

人參

蒼朮

米泔浸炒

白朮

炒

陳皮

麥門冬

去心

當歸酒拌 神麴炒 甘草炙 五味子杵炒各一錢

黃耆錢二 黃柏炒 升麻各四分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

愚按前證七惡中之二惡也宜用此方治之亦有潰後虛而發熱或作痛少寐尤效若痛少止大便不實黃柏麥門冬可不用蓋恐寒中也凡瘡膿潰之後若脉洪大則難治自不利者癰疽喘急恍惚嗜臥此心火刑肺金宜用人參平肺散

桑白皮炒 知母七分炒 杏仁去尖炒 地骨皮 紫蘇

橘紅 半夏薑製 茯苓 青皮 人參各一錢

甘草炙五分 五味子杵炒

作一劑水二鍾薑三片煎八分食遠服

愚按此方理氣清肺化痰之劑若肺脉洪數無力者宜用若兼發熱作渴脉洪數有力者宜用如金解毒散此證火克金為惡候面赤者亦不治

如金解毒散方見後

癰疽目斜視上黑睛緊小白睛青赤肝挾火邪宜用瀉青丸

瀉青丸 當歸酒拌 川芎 山梔仁炒 羌活 葶藶酒拌

防風 大黃酒拌炒各等分

為細末煉蜜丸雞頭實大每服一九煎淡竹葉湯化下日進二三服如瀉去大黃加荆芥或用黃連瀉心湯一二劑亦可愚按前證七惡中之三惡也若肝脉弦緊洪數者最當亦有目視不正睛不瞭脉微或浮者乃真氣虛也宜用大補之

劑夫瀉青者瀉肝經之火邪也肝屬木其色青故耳
癰疽四肢沉重宜用胃苓湯

胃苓湯

蒼木二錢米泔浸炒厚朴薑製陳皮 甘草炙白朮炒茯苓各一錢澤瀉 木香 白芍藥炒官桂五分淡竹葉二十片

作一劑水二盅薑三片棗二枚煎八分食前服

愚按前症七惡中之五惡也服而若脾氣醒濕氣除宜用參
苓白朮散之類多服恐導損津液

參苓白朮散

人參 茯苓 白朮炒蓮肉去心砂仁炒薏苡仁炒山藥各二兩桔梗炒甘草炙白扁豆姜汁浸炒去皮

為細末每服二錢用石苜蒲煎湯調下

癰疽嘔吐不下食不知味宜用橘半胃苓湯

橘半胃苓湯

橘紅 半夏薑製各一錢蒼朮米泔浸炒白朮炒厚朴姜製甘草炙茯苓 人參 澤瀉 茅根各二錢薑汁數匙

作一劑水二鍾煎一鍾入薑汁煎一二沸作十餘次飲之

愚按前證七惡中之六惡也用此方後胃氣將醒宜用六君子湯兼服之亦有煩燥飲冷不食脈沉實而嘔者恐不可用

此宜用內疎黃連湯

內疎黃連湯

癰疽聲嘶色敗唇鼻青赤面目浮腫宜用調胃白朮散

調胃白朮散

白朮炒 茯苓各二錢 陳皮 白芍藥炒 煨榔

澤瀉各一錢

木香五分

作一劑水二鍾薑三片煎八分食後服如腫不退加

白木炒

枳實麩炒各一錢

愚按前證乃七惡也用此方若濕除氣少退用六君子湯參苓白朮散之類大便不實尤效再用檳榔木香恐傷真氣也亦有真氣虛而致前證者尤不宜用二藥

六君子湯

人參

白朮

茯苓

半夏薑製

陳皮各一錢

甘草五分

作一劑水二鍾薑三片棗三枚煎六分食遠服

參苓白朮散

方見前

癰疽胸滿腹痛泄瀉咳逆悒憤宜用托裏溫中湯

托裏溫中湯

羌活

乾薑炮各一錢

附子炮四錢

益智仁搗碎

丁香

沉香

木香

茴香各一錢

甘草一錢

陳皮一錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食前服

愚按此寒氣內陷之方也羅謙甫捨時從證曰內經云寒淫於內治以辛熱佐以苦溫故以乾薑附子大辛熱溫中外發陽氣自裏之表故為君羌活味苦辛溫透關節炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐吃逆不下食益智仁丁香沉香大辛熱以散寒為佐瘡氣內攻氣聚而為癰本香茴香陳皮苦辛溫治痞散滿為使也用治前證誠為良方非精於醫治者不能立也若寒氣散中氣溫宜用托裏健脾之劑癰疽大痛不止宜用加味解毒湯

加味解毒湯

黃耆炒鹽 黃連炒 黃芩炒 黃柏炒 連翹

當歸酒拌各七分 甘草炙 白芍藥 梔子仁炒各一錢

作一劑水二鍾煎八分服之藥下痛即止

愚按此方若脉洪大按之有力者用此解之其功甚大亦有便秘脉實而痛者宜用內疎黃連湯下之若潰而反痛者宜用內補黃芪湯補之穢氣所觸而痛者和解之風冷所逼而痛者溢着之丹溪云凡瘡不可不痛不可大痛煩悶者不治

內疎黃連湯 方見前

內補黃芪湯

黃芪炒水拌 熟地黃酒拌 人參 茯苓 甘草炙各五分 芍藥炒

川芎 官桂 遠志去心炒 當歸酒拌各八分 麥門冬去心五分

作一劑水一鍾半薑三片棗二枚煎六分食遠服

癰疽勢惡平陷一應無名疔毒活人無數宜用真人活命散
真人活命散 一名仙方活命飲

滴乳研 防風 白芷 貝母 赤芍藥

常歸尾 明沒藥研 皂角刺炒 天花粉 甘草節

川山甲炮各一錢 陳皮 金銀花各三錢

在背俞皂角刺為君 在腹募白芷為君

在胸次加瓜蒌仁二錢 在四肢金銀花為君

如疔瘡加紫河車草根三錢如無亦可

右為粗末瘡大四兩瘡小二兩作一劑無灰酒十茶鍾瘡小五茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令泄氣煎至三大鍾去粗作三次服接連不段隨瘡上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯此藥並無酒氣不動臟腑不傷氣血忌酸薄酒鍍器

服後側睡覺痛定回生神功浩大不可臆度

真 真人活法世間稀 大惡癰疽總可醫

人 消毒只如湯潑雪 化膿漸使肉生肌

偈 陰功何止萬人活 神效何須刻日期

云 留下仙方誠信授 存仁脩製上天知

愚當用此方不問陰陽虛實善惡腫潰大痛或不痛先用此劑大勢已退然後隨餘證調治其功甚捷誠仙方也

二黃膏 治一切腫毒

黃柏 大黃 各等分

為末用醋調搽如乾用水潤之

又方搗毒散

大黃 兩半 白芨 一兩 朴硝 二兩

為末井水調搽如乾再搽

愚按此二方乃寒涼之藥若瘡瘍焮腫作痛屬陽之證宜用之或微腫痛而不焮赤者恐不宜用蓋氣血喜溫而惡寒若冷氣入裏反為難治之證矣

又方 治一切癰疽腫毒

草烏 貝母 天花粉 南星 芙蓉葉各等分

為細末用醋調搽四圍中留頭出毒如乾仍用醋潤之愚按此方藥性溫和常用不問陰陽腫潰並效

宣毒散 治一切毒瘡其功不可盡述

大黃 煨五錢 白芷 五錢

作一劑水二鍾煎一鍾食前服

愚按此方乃宣通攻毒之劑若脉沉實便秘者乃毒在臟也

宜服之以絕病源其功甚大或臟腑調和而脉不實恐不可用醫林集要方大黃一斤白芷六兩為末每服三錢熱酒調下更用茶清調搽患處命名萬金散蓋因其功而珍之也當以水送為丸令可服吳江申僉憲兄昔患疽木悶堅硬脉沉實乃毒在內用一服大小便二污物再服而消恐患者忽此二藥故以所嘗治驗者告之

集香散 洗癰疽潰爛

白芷

藿香

茅香

香附

附風各二錢

木香

甘草各一錢

作一劑用水三碗煎數沸去粗淋洗患處

愚按此方乃馨香之劑也經云血氣聞香則行得臭則逆即此意也若瘡毒將盡宜用之若毒未盡或有瘀肉宜先用雞

黃解毒散解之後宜用此方須用膏藥護貼使風邪弗入肌肉易生大凡一有瘡口即用膏藥貼之至收口為度最忌生肌之劑

雄黃解毒散 治一切癰疽潰爛解毒凡下部濕毒作痒未膿者連用數次自消

雄黃 一兩

白礬 四兩

寒水石 一兩

為末用滾水二三碗乘熱入前藥一兩薰洗患處

神僊太乙膏 治癰疽及一切瘡毒不問年月深淺已未成膿者並治之如發背先以溫水洗淨軟帛拭乾月緋帛攤貼之更用冷水送下血氣不通溫酒下赤白帶下當歸酒下咳嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹置口中噙化下一切風赤眼捏作小餅貼大陽穴更以山梔子湯下打撲傷損外貼內服橘

皮湯下腰膝痛者患處貼之鹽湯下唾血者桑白皮湯下以
蛤粉為衣其膏可收十餘年不壞愈久愈烈又治瘰癧瘻瘡
並用鹽湯洗貼酒下一丸婦人經脉不通甘草湯下一切疥
別煉油少許和膏塗之虎犬蛇蝎湯火刀斧傷者皆可內服外貼
玄參 白芷 當歸 肉桂 大黃 赤芍 生地黃各
為阻用蘇油二斤入銅鍋內煎至黑濾云相入黃丹十二兩
再煎滴水中捻軟硬得中即成膏矣予常用但治瘡毒并內
癰有奇效忽一婦月經不行腹結塊作痛貼之經行痛止後
隨前云治證用之無有不效愈知此方之妙也

生肌散 治瘡口不合

木香 二錢 黃丹 枯礬 各五錢 輕粉 二錢

右件各另為細末用猪膽汁拌勻酒乾再研細糝患處

愚按此方乃解毒去腐搜膿之劑非竟自生肌藥也蓋毒盡
則肉自生常見患者往往用龍骨血竭之類以求生肌殊不
知餘毒未盡肌肉何以得生反增潰爛耳若此方誠有見也
亦有氣血俱虛不能生者當用托裏之劑又有風寒襲於瘡
所不能生者宜用豆豉餅炙之若流注頑瘡內有膿管或瘻
肉或癰核須用針頭散腐之錠子尤妙如背瘡杖瘡湯火瘡
大潰當用神效當歸膏則能去腐生新痛大有神效

豆豉餅 治瘡瘍腫硬不潰及潰而不斂并一切頑瘡惡瘡用
江西豆豉為末唾津和作餅子如錢大厚如三文置患處以
艾壯於餅上炙之餅乾再用唾津和作如有瘡腫大用漱口
水調作餅覆患處以艾鋪於餅上燒之如未成者用之即消
已成者縱不能全消其毒頓減前人俱稱有奇功不可忽之

神效當歸膏 治癰疽瘡毒及湯火杖瘡潰爛最能止痛推陳致新

當歸 二兩 蘇油 四兩 白蠟 五錢如用黃一兩尤效

先用當歸入油煎至焦黑色去粗入蠟溶化即成膏矣此方用蠟為君前人每云蠟為外科之要藥生肌定痛續筋補虛其功不可盡述常見善訟者杖後隨食蠟兩許飲酒一二碗一睡之後血散痛止輕者即消重者雖腐潰亦易愈可見蠟之功為大用者不可忽之

癰疽勢退調治提防作渴宜用加減八味丸

加減八味丸 補腎止口渴虛煩

五味子 乾山藥 各四兩 官桂 一兩 白茯苓

牡丹皮 白者佳 澤瀉 蒸各三兩 山茱萸肉 四兩酒拌搗膏

熟地黄 用生者二兩酒拌搗熟半日即為熟地砂器亦可搗膏

為細末入二膏加煉蜜或酒糊丸梧子大每服七八十九空心溫酒下鹽湯亦可

愚按此方乃陰虛火動之劑也瘡疽痊後及將痊口渴甚者古黃堅硬及未患先渴或心煩躁渴小便頻數或白濁陰痿飲食少思肌膚消瘦及腿腫脚先瘦及口齒生瘡不絕此乃腎水枯涸不能上潤心火炎上不能既濟服此藥以生腎水降心火諸證恐退誠良方也○一男子作渴日飲水數碗冬月亦然彼用前方去肉桂服之不應○一男子患此欲治以前丸彼謂肉桂性熱乃服知母黃柏等藥渴不止背發疽而歿○一男子亦患此證漸消瘦與前丸數服渴減半一劑而痊再劑形體楹壯夫肉桂腎經藥也前證乃腎經虛火炎上無制為患用肉桂導引諸藥以補之及引虛火歸原故效○

一男子口舌糜爛津液短少眼目赤小便數痰涎壅盛脚膝無力或冷或午後脚熱勞而愈盛數年不愈服之即愈此皆地黃大補丸 治癰疽愈後作渴

龜板 酒炙 兩半
黃柏 酒炒 五錢
知母 去皮五錢 酒拌搗膏
人參 一兩
熟地黃 用庄者兩半 酒拌 銅器蒸半日 搗膏

為細末入二膏如前方丸服
大補腎氣丸 治證同前

五味子 炒
黃桂 酒炒各一兩 去皮一兩
龜板 童便炙 兩
熟地黃 用庄者二兩 酒拌 銅鍋內蒸半日

為細末入二膏加酒糊和丸梧子大每服四五十九五更酒送下鹽湯亦可
愚按二方常治陰虛相火之證有奇效亦有中氣虛而作渴

須用六一湯補中益氣湯之類

補中益氣湯

黃耆 炙錢 半
甘草 炙
人參
當歸 酒拌
白朮 炙各一錢
升麻
柴胡 各三分
陳皮 五分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾空心服

六一湯 方見前
黃耆 定痛生肌 黃耆 真者 二兩 明礬 二兩

先將黃耆溶開離火待少溫入礬末和勻衆手急丸如梧子大每服二三十丸食前溫酒下每日二服
愚按此方不惟定痛生肌而已護膜止瀉消毒化膿及內癰排膿托裏之功甚大或金石補藥發疽非此莫能治更用白礬一兩每服一錢溫酒調下尤效有遍身生瘡狀如戴頭名

白蛇頭瘡尤宜服之每日百丸方有功效若蛇蝎并切毒
蟲所傷熔化熱塗患處內更服之其毒即解為外科之要藥
也服至三四兩之上愈見其功矣

秘方托裏散 治一應瘡毒始終當服不致內陷

瓜蒌大者一箇 當歸酒拌 黃芪鹽水拌炒 甘草 白芍藥各兩

皂角刺炒 金銀花兩 天花粉兩 熟地黃用生者一兩酒拌 銅器蒸半日

用無灰酒五茶鍾和藥五兩入磁器內厚紙封口再用油紙
重封置湯鍋內煮用蓋覆之煮至藥香取出分服直至瘡愈
愚按此方藥品平易消毒之功甚大且不動臟腑不傷氣血
不問陰陽腫潰屢用屢效誠仙方也常治發背腦疽勢盛者
更隔蒜灸若脉沉實大小便秘者先用疎通而後用此其功
甚捷若大毒已退不作膿或不潰者用托裏潰而不飲及膿清用峻補

三合湯 治癰疽不肯作膿

新江子肉 砒

班猫各等分

為細末繼瘡內惡肉自化

愚按此方藥性太毒果惡毒之證宜用腐之更取以毒攻毒
亦有陽氣虛不能腐化成膿者宜用大補之劑及桑木炙之
以補接陽氣丹溪云氣血壯實膿自湧出大抵瘡之潰斂遲
速乃血氣盛衰使然也

梧桐淚方

癰疽勢腫惡不潰堅硬以快利刀將患處劃成十字路用麵水
調稠厚周圍瘡口外高起五分許如塘池樣將淚與半滿用
好米醋滴淚上須與自沸勿令滾出麵外次日用金銀花煎
湯洗淨再如前用一次只用醋洗不痛爛肉自去

愚按此方果惡瘡惡肉不腐宜用之亦有陽氣虛不能腐化者宜用大補之

李願顏先生口授治疔瘡

回生丹 非泛常之藥萬寶之秘專治一切疔毒並有神效

金脚信 明礬砂 明乳 半夏

上緋丹各五分 江子肉油不去 明雄黃 大南星

南礬砂各一錢 大斑猫頭十五箇去翅

為細末旋取蟾酥和丸麻子大硃砂為衣每服十五丸好酒下看瘡生上下食前後服能飲者至醉如腫毒失治毒氣入腹用此藥能起死廻生長久吐瀉俱作乃甦

飛龍奪命丹 治一切疔瘡毒瘡神效

乾蟾酥二錢 礬砂一錢 蟾酥成餅者真 沒藥

寒水石煨 礬砂 雄黃各三錢 乳香

硃砂 明礬枯名一錢 輕粉 水片各五分

蝸牛四十九箇研為膏如無亦效 蜈蚣一條去頭酒浸焙乾

右各味俱另為細末取蝸牛蟾酥研勻入前末熟杵在菜豆大硃砂為衣每服四五丸嚼葱白一口吐在手將藥包葱內用溫酒吞下須臾汗出或少吐瀉毒即解

愚按前方乃慄悍攻毒之劑也蓋無經不至無氣不動者後方尚緩若食一切禽畜毒物所致及瘡脉沉緊細數毒畜在內并惡毒證欲汗吐者宜用前丹有神效老弱之人或瘡毒稍輕者宜用後丹還更以隔蒜灸之為良常治此疾先以隔蒜灸之痛者灸至不痛不痛者灸至痛若灸之而不痛者明灸之及針疔及四畔去惡血以後丹一粒人瘡頭針孔內以

膏藥貼之若針之不痛或無血者以針燒赤頻烙患處以痛為度更宜服之眼黑見火光者此毒氣入臟腑也不治若患在手足紅絲攻心腹者就於紅絲盡處刺去惡血更服敗毒藥若紅絲近心腹者更挑破瘡頭去惡水以膏藥貼之如麻木者服後丹更以隔蒜炙明炙亦善凡人暴死多是疔毒用燈照看遍身若有小瘡卽是宜急炙之候醒更服敗毒散或前丹養生方云人汗入肉食之則生疔瘡不可不慎予常用後方無礪砂血竭蜈蚣冰片名奪命丹甚效方見外科心法土緋丹卽黃丹也

治冷癰青硬無頭陰毒

生鏤鏹

二錢

白松香

兩半

輕粉

二錢

麝香

少許

先將鏤鏹松香爲細末入銚內加麻油一兩慢火煎數沸離火待熱少退人輕粉麝香末攪勻卽爲膏矣收貯量瘡大小

攤貼患處

愚按此方常治瘡疥毒瘡皆效冷癰之證未試

御史散 治疔瘡

生鏤鏹

三錢

爲末木香磨酒調下分病上下食前食後服之得微汗而愈愚按此方乃秘法也未嘗試用常治疔瘡有赤絲攻心腹者用鏤鏹三錢牡礪二錢青鹽一錢爲末挑破瘡頭以燈內油調搽其絲自回名喚回丹但未用服考之本草云鏤鏹生鏤上衣也治惡瘡疥癬蜘蛛等咬蒜磨敷之亦未云服家藏方用貓兒眼草一擔細切以水擔餘浸二日煮百餘沸去粗取汁煎至三四碗用生鏤鏹細研末三兩徐徐入汁內以鏤杖不住手攪再煎至二碗許成膏了治一切癰疽瘡毒甚效療

癰疽後塗瘡內尤效

四聖散 治熱毒及疔瘡

槐花炒

龜甲童便炙 各四兩 鍊銹三錢

大黃如瀉 不用

川山甲炮一兩 五靈脂炒各一兩

為末酒下三錢如疔瘡加紫河車根三錢

愚按此方清涼降火攻毒之劑非積熱陽證膿未成者恐不 宜用

黑末子 治癰毒

用羊角連內骨燒存性為末酒調三錢分上下服之瘡可散
愚按此方未嘗用服蓋秘方也常治面上或身卒得赤斑或
痒或癩毒不治殺人以殺羊角燒存性研令極細末以雞子
清調塗之甚效本草亦云然

蟻蛭膏 治疔毒

蟻蛭三箇肚 白者佳 黃蘇蟲十箇

右二味搗勻撥破患處貼之如患在手足間有紅絲上臂絲

盡處將針挑斷出血仍用前藥

愚按此方常用有效如無蘇蟲亦效毒盛者更服敗毒藥蟻

蛭即屎蚬蛭也

拔毒散 治一切癰疽腫毒其功不可盡述

乳香 沒藥 川山甲炮 當歸

木鱉子各一錢 瓜蒌仁各八分 甘草炙五分 忍冬藤二錢

牙皂角炒七分 大黃生熟各半錢 連翹一錢 貝母七分

作一劑用酒水各一鍾煎一鍾食前服

愚按此方攻毒止痛化膿之良劑也屢用屢驗若有膿或已
潰者大黃可不用恐泄其真氣則膿者難潰潰者難斂也亦

毒疔瘡方 雜症驗方卷之六

有膿雖潰脉仍洪數或沉實喜冷者火邪尚在又所宜用
牡礪散 治血疝卽便毒

當歸 酒拌 錢半

甘草節 錢半

滑石 煨 錢半

牡礪 煨 錢半

大黃 三錢

木鱉子 五箇 杵

作一劑用水二鍾煎一鍾露一宿五更頓服冬月火溫服已未潰膿血從大便出

愚按此方乃鹹寒導滯之劑若久曠房室大小便秘發熱焮痛或交感虛損精氣致精血交錯結疼痛便秘者宜用若勞倦之人不甚焮痛大小便如常或小便赤色發熱不泮膿及潰而不斂宜用十全大補湯蓋證多起於勞役不足或房勞過度精氣俱虛之人俗云一石米瘡此言百日後可愈也若大補氣血不旬日而愈何用百日蓋瘡之收斂在乎血

氣之盛也嘗治舉人凌待之虛而服剋伐藥幾致危殆子用托裏健脾藥而消秀才王文遠勞苦患之服小柴胡湯而表證散後用托裏藥膿成針之而旬日愈胡判官膿清脉弱以大補之藥而已愈因新婚復發自用連翹消毒散致瀉痢不止竟致不救可見此證屬不足多矣非補不可大抵便毒屬肝經初起堅硬肝主筋故也五七日後當赤軟膿成故也若尚堅硬乃元氣不能腐化往往人見堅硬只欲內消反服攻散藥多致虛虛之禍前所治者卽其驗也

十全大補湯

人參 二錢

肉桂 五分

地黃 酒拌 錢半

川芎

茯苓

白芍藥 炒

白朮 炒

黃芪 鹽水 炒

當歸 酒拌 各一錢

甘草 炙 五分

蘇合香丸

蘇合香丸

七

長三四

作一劑用水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服若潰而毒未盡者加金銀花連翹白芷各五分

歲靈仙散 治便毒

歲靈仙 貝母 知母 各一兩

為末每服三錢空心酒調下如不散再服

愚按此方通經去膿消毒補虛益氣蓋此證多患於陰虛之人此方乃是一見也亦有焮痛小便數者宜先用加減龍膽瀉肝湯大小便秘焮腫作痛宜入正散增寒發熱荆防敗毒散然後用此方若不作膿或膿不潰宜用大補之劑潰而不斂者更用豆豉餅炙

加減龍膽瀉肝湯

龍膽草 酒拌 澤瀉 車前子 炒 木通

生地黄 當歸尾 酒拌 山梔 炒 黃芩 各一錢

甘草 生五分

作一劑水二鍾煎八分食前服如濕盛加黃連大便秘加大入正散

大黃 酒拌 車前子 炒 瞿麥 篇蓄

山梔仁 炒 木通 甘草 各一錢 滑石 煨 二錢

作一劑水二鍾煎八分食前服

荆防敗毒散 方見前

豆豉餅 方見前

防風通聖散 治瘡瘍便毒若瀉去芒硝大黃能解暑月熱毒或遍身頭面患瘡

芍藥 煨 芒硝 滑石 煨 川芎 大黃 煨

薛氏醫方 瘡疽疔毒方卷之 長三五

前氏醫書 瘡毒 治一切瘡毒

桔梗 石膏煨 荆芥 麻黃各四分 山柘

白朮 連翹 當歸 薄荷 甘草

防風 黃芩焙各八分 作一劑水二鍾煎八分服

愚按此方非表裏俱實大小便秘者恐不可用宜審之

郭氏神效烏金散 治一切瘡毒

蒼耳頭 小草頭 火麻頭 木賊去節 蝦蟆頭

樺皮節 麻黃去根

愚按此方乃攻毒表散之劑外因用之為宜前云再服解毒疎利之藥則又為內因也呆內外因者宜乎如此否則大犯禁庭矣常治外因者汗而不下內因者下而不汗玉機微義云此方治疔腫癰疽時毒附骨疽諸惡瘡等證若瘡黑陷如石堅硬四肢逆冷脉細或時昏冒譫語循衣煩渴危篤者服

此汗之瘡即起此可見治外因之專藥也常用有效蝦蟆頭即車前草

郭氏青金錠子 治發背癰疽開瘡口去腐肉好肉自生

峻利生砒開瘡 緩劑煨去死肉用 慢劑去砒枯肉用

愚按此以毒攻毒之意也嘗一縣尹背瘡竟背腐潰色黯重若負石甚危喜飲食頗進用桃紅散色漸赤負漸輕再用而肌生更服托裏藥而愈蓋此亦大毒證非此峻藥莫能治此亦用砒故用攻毒有效然有氣血虛不能腐潰宜補養血氣常治發背初起未成膿先用烏金膏或援生膏點患處數點以殺其大勢更服仙方活命飲如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿香連進三五劑如外皮腐動用雄黃解毒散洗之每日用烏金膏塗腐處候有瘡口即用紙作燃蘸烏金膏

神效醫方 瘡毒 治一切瘡毒

維入瘡內若有膿爲筋膜間隔不出致作脹痛用針引之腐肉堵塞者去之若瘀肉腐動用豬蹄湯洗如膿稠煖痛飲食如常瘀肉自腐用消毒藥與托裏相兼服之仍用烏金膏全搽若瘀肉已離好肉卽去之如膿不稠不稀微作痛飲食不甘瘀肉腐遲用桑柴灸患處更用托裏藥主治之瘀肉不腐或膿清稀不煖痛者服大補之劑仍用桑木灸之以補接陽氣解散鬱毒其肉自腐

援生膏

治一切惡瘡及瘰癧初起點破雖未全消亦得

以殺其毒

血竭

錢一

蟾酥

錢三

麝香

分五

雄黃

錢五

輕粉

錢三

乳香

錢一

沒藥

錢一

用蕎麥稽灰或真炭灰一斗三升淋灰湯八九碗將栗柴或桑柴文武火煎作三碗存一碗以備日久藥乾添用取二碗

盛於磁器內將前藥研爲極細末入灰湯內用鏡幹或柵枝順攪再入好細石灰一升再攪勻過一宿却分於小磁碗收行凡遇諸惡瘡點當頭一二點一日換二次次日又一次以出血水爲度如藥乾却加所有灰湯少許調之

烏金膏

解一切瘡毒及腐化瘀肉此藥最能推陳致新

用巴豆一味去殼炒焦研如膏點腫處則解毒塗瘀肉則自腐化加乳香沒藥少許亦可如維瘡內人香油少許稠稀可用但人謂巴豆有毒炒焦用之其毒已去不過能去舊生新耳何毒之有

桑木灸法

治發背癰疽瘰癧肉不腐潰或不起發陰瘡癩癰流

注膿瘡頑瘡惡瘡久不愈者須多灸爲佳此法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣誠良方也用桑木燃着吹熄焰用火

炙患處每次炙片時以瘀肉腐動為度丹溪云火以暢達拔引鬱毒此從治之意也

猪蹄湯 治一切癰疽消腫毒去惡肉潤瘡口止疼痛

白芷

黃芩

赤芍藥

當歸

羌活

甘草

露蜂房

蜂兒多者佳各五錢

先以猪蹄一隻用水四五碗煮熟取清湯人前藥煎二十餘

滾去藥濕洗患處隨用膏藥貼貼

內疎黃連湯

方見前

治炊腫發熱

愚按此方乃疎通攻毒之劑也毒在臟致便秘溢脉沉實嘔

破棺丹 治熱毒癰疽

大黃

二兩半主半熟

芒硝

甘草

各二兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九用童便加酒半盞滾白湯和酒化服

愚按此方乃鹹寒解毒之劑若脉沉實發熱多汗大渴煩躁便秘或謔語結腸之證用之即效如無前證恐不宜用

如金解毒散 治肺癰

桔梗

錢一

甘草

錢半

黃連

炒

黃芩

炒

黃柏

炒

山梔

炒各七分

作一劑水二鍾煎八分作十餘次呷之

不可急服

愚按此方乃降火解毒之劑也發熱煩渴脉洪大者用之俱效若脉數咳痰腥臭或唾膿痰宜用桔梗湯大抵肺癰之證肺脉洪大或吐膿不止者難治自止脉短濇者自愈面赤

火剋金也不治

桔梗湯

治欬而胸膈隱痛兩脇腫滿咽乾口燥煩悶多渴時

出濁睡腥臭小便赤色大便多澁

桔梗炒

貝母去心

當歸酒浸

瓜蒌仁杵

枳殼麩炒

薏以仁炒

桑皮炒

甘草節

防已去皮各一錢

百合

五味子

地骨皮

甜葶藶炒

杏仁去皮尖

知母炒五分

黃芪鹽水拌炒錢

作一劑水一盞半薑三片煎至七分不拘

時溫服咳加百藥煎熱加黃芩大便不利加煨大黃少許小

便澁甚加木通車前子煩躁加白茅根咳而痛甚加人參白

瀉白散 治肺癰

桑白皮炒二錢

地骨皮

甘草炙

貝母去心

紫苑

桔梗炒

當歸酒拌各一錢

瓜蒌仁杵

作一劑水一鍾薑三片煎八分食遠服

愚按此方乃瀉肺邪消毒之劑也若喘欬唾痰沫肺脉浮數

者用之有效如脉大發熱作渴宜用解毒散解之而後用此

劑其或唾膿之際宜排膿如唾膿後及脉將安宜補肺初起

胸膈脹滿喘急咳嗽宜發散表邪

排膿散 治肺癰吐膿後宜服此排膿補肺

黃芪鹽水拌炒

白芷

五味子炒杵

人參各等分

為細末每服三錢食後蜜湯調下

寧肺湯 治咳嗽唾膿自汗上氣喘急用此補肺及治榮衛俱

虛發熱自汗

人參

當歸酒拌

白木

熟地黃

川芎

白芍藥

甘草炙

五味子炒搗

麥門冬去心

桑白皮

阿膠蛤粉炒各一錢

白茯苓一錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食後服

青龍湯 治肺經受寒咳嗽喘急服此發散表邪

半夏 湯泡七次 乾薑 炮

肉桂 芍藥 甘草 炙各三錢 五味子 二兩 麻黃 去節

每服五錢水一鍾薑三片煎七分食後服

附子散 治腸癰

薏苡仁 二兩 附子 炮五錢 敗醬草 一兩

每服四錢水煎空心溫服

愚按此方乃辛熱之劑也若積久陰冷所致宜用丹溪云身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此腸內有癰積久陰冷所致故金匱有用附子溫之即此方也

茯苓湯 專治腸癰

赤茯苓 桃仁 去皮尖 甜瓜子 炒

芒硝 大黃 炒各二錢 牡丹皮 二錢

作一劑水二鍾煎一鍾食前服

牡丹皮湯 專治腸癰

牡丹皮 錢一 大黃 炒 桃仁 去皮尖 芒硝 各二錢

瓜蒌仁 研一錢 作一劑水二鍾煎一鍾食前服

愚按此二方乃行血破血之劑也如發熱自汗惡寒小腹作痛小便如淋脈遲者有效丹溪云小腹腫痞按之痛小便如淋或自調發熱身無汗復惡寒其脈遲緊者膿未成宜下之當有血此內結熱所成也故金匱有用大黃利之即此方也若無前證恐不宜用亦有腹內脹痛脈滑數或膿已下或後重時時而下宜用排膿散太乙膏蠟礬丸及托裏藥

排膿散 治腸癰小腹脹痛脈滑數或裏急後重或時時下血

黃芪 鹽水炒 當歸 酒拌 金銀花 白芷

川山甲

蛤粉炒

防風

連翹

瓜蒌

杵

白芷

各一錢

作一劑水二鍾煎八分食前服若膿將盡去川山甲連翹加當歸川芎或為末每服三錢食後蜜湯調下亦可

太乙膏

方見前

蠟礬丸

方見前

薏苡仁湯

治腸癰煩毒不安

薏苡仁

五錢

瓜蒌仁

四錢

桃仁

去皮尖 失錢

牡丹皮

二錢

作一劑水二鍾煎一鍾食前服

愚按此方藥品和平其功且速常治腹痛或發熱或脹滿不食水道澀滯產後多有此證或月經欲行或行後作痛尤效

外科經驗方

薛氏醫按

吳郡薛

世著

新安吳玄右校

腫瘍

人參敗毒散加荆芥防風名荆防敗毒散

治癰疽疔腫發背乳癰等證增寒壯熱甚至頭痛拘急狀似傷寒者宜服一二劑以衰其毒輕則內自消若至六七日不消可服托裏消毒散

人參

前胡

柴胡

羌活

獨活

川芎

桔梗

枳殼

炒 茯苓

甘草

各一錢

作一劑水二鍾煎八分食

遠

如熱甚或痛甚者加黃芩黃連

大便不通量加大黃

煨 枳 一錢

托裏消毒散

治一切癰疽服前藥不消者宜服此藥未成即

消已成即潰腐肉易去新肉易生如有瘡口宜貼膏藥斂即不用切忌早傅生肌之藥

人參 鹽水拌炒 當歸 酒拌 川芎 芍藥 炒

白朮 炒 茯苓 各一錢 白芷 金銀花 各七分 甘草 五分

作一劑用水二鍾煎至八分瘡在上食後服瘡在下食前服

仙方活命散 治一切癰疽疔腫不問腫潰

川山甲 同蛤粉炒黃色 甘草節 防風 沒藥

赤芍藥 白芷 各六分 當歸尾 乳香 各一錢

天花粉 貝母 皂角刺 各八分 金銀花

陳皮 各三錢 作一劑用酒一大碗同入瓶內紙糊瓶口

慢火煎數沸去粗病在上食後服病在下食前服能飲酒者服藥後再飲三兩杯尤好

金銀花湯 治一切癰疽發背疔瘡及喉閉乳蛾等證用金銀

花藤葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾溫服甚者不過三五服

可保無虞

忍冬藤酒 一名金銀花酒 治食膏粱炙博過多及服金石補

藥日久發疔預服免患

忍冬藤 無者五兩乾者一兩 大甘草節 一兩

作一劑用水三鍾煎至二鍾入無灰好酒一鍾再煎十餘沸

去粗分三次服能飲酒者一次服另取藤搗爛酒調敷患處

中留頭出毒乾再搽

槐花酒 治發背及一切瘡毒不問已成未成但焮痛者並治

用槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去粗熱服

未成者二三服已成者一二服

治癰疽發背疔腫惡瘡一二日至五六日不問痛否取大蒜切片如三錢厚置瘡頭上用艾壯於蒜上炙之三壯換蒜痛者炙至不痛不痛者炙至痛毒氣自然隨火而散丹溪云火以暢達拔引鬱毒此從治之意若瘡頭多即用大蒜搗爛敷患處攤艾於蒜上燒之更服槐花酒一二劑若至數日不甚腫痛及不腐潰者此屬血氣不足尤當多炙及服溫補藥切忌寒涼之劑

神功散

治發背癰疽及諸瘡不問腫潰並治之

黃柏炒為末

草烏炒為末

用漱口水調人香油少許搽患處如乾仍用水潤之

潰瘍

黃耆人參湯 治諸瘡潰後食少倦怠口舌乾燥或寒熱往來

驚悸少睡並治之

黃耆益水拌炒三錢

人參

白朮炒

蒼朮米泔水浸炒一錢

陳皮一錢

當歸酒拌

炙甘草一錢

麥門冬五分去心

神麩五分炒

升麻一分

黃柏三分酒炒腹不實者去之

五味子搗碎炒五分

作一劑用水二鍾薑三片煎至一鍾食

遠服如少睡加酸棗仁炒一錢肌肉遲生加白斂去皮一錢

乳香止痛散 治諸瘡潰爛疼痛不忍

乳香

沒藥各二錢

寒水石煨

滑石各四錢

冰片半分

為細末搽患處

雄黃解毒散 治一切癰腫潰爛毒熱甚者先用此藥二三次

以後用猪蹄湯

雄黃一兩

白礬四兩

寒水石煨一兩

用滾水二三碗乘熱人前藥一兩洗患處以太乙膏或神異膏貼之
豬蹄湯 治一切癰疽消腫毒去惡肉潤瘡口止痛

白芷 黃芩 當歸 羌活

赤芍藥 生甘草 露蜂房蜂兒多者佳各五錢

用豬蹄一隻水四五碗煮熟去油粗入前藥煎數沸去粗溫洗隨用前膏藥貼之

神仙蠟礬丸 治癰疽及腸癰托裏消毒固臟腑止疼痛

黃蠟七錢 白礬一兩細研

熔蠟候溫入礬末和勻丸梧子大每服三五丸食遠滾湯送下

治諸瘡久不合口用炮附子去皮尖為細末唾津和隨瘡大小作餅置患處用艾壯於餅上灸之更服六補氣血藥用江西豆豉為餅多灸之亦效

加減八味丸 治疽瘡後及將痊口乾渴舌或堅黃及未病先渴益腎水制心火

肉桂一兩 山茱萸用肉酒拌搗膏 山藥各四兩 澤瀉蒸三兩

五味子微炒四兩 牡丹皮白者佳 白茯苓各二兩 熟地黃八兩酒浸搗膏

為末入二膏加密丸梧子大每服七八十九空心跳湯送下太乙靈應膏 治一切瘡疽及跌打損傷寒濕疾痛

玄參 大黃 肉桂 白芷 生地黄 芍藥 當歸各一兩

為阻用香油二斤浸五七日煎至黑色去粗徐徐下黃丹一斤再煎二十餘滾滴水成珠即為膏矣加沒藥乳香一兩亦可

疔瘡

奪命丹 治諸般腫毒疔瘡

蟾酥 輕粉各五分 硃砂三錢 白礬枯 寒水石煨

銅綠各一錢 蝸牛二十箇別研如泥一方無亦可 乳香 沒藥

麝香各一錢 為末將蝸牛泥為丸如丸不就加酒糊少許

丸如菘豆大每服一二丸用生蒜頭三莖嚼爛同藥以熱酒送下出汗為度無汗再進一服

疔瘡之證初生其狀甚微多在四肢頭面骨節之處痒痛難忍

增寒壯熱可服荆防敗毒散一二劑或奪命丹一服若有紅

絲自瘡向腹走者宜撥破瘡頭去惡血以膏藥封貼如針之

不痛可用奪命丹一粒入瘡內毒即消如生唇面口內有紫

筋者宜挑斷吐去毒血噲奪命丹一二粒毒入喉入腹俱治

槐花酒 治一切疔瘡腫毒方見前

忍冬藤酒 治一切疔毒及發背癰疽並治之方見前

乳癰

神效瓜蒌散 治乳癰乳勞

瓜蒌大者一箇搗 甘草半兩 當歸半兩 沒藥另研

乳香各一錢 作一劑用酒三碗煎至二碗分三次食後飲

相熱處陳良甫云如有乳勞便服此散可杜絕病根如毒

已成能化膿為水毒未成者則從大小便散之

消毒散 治吹乳乳癰并便毒如增寒壯熱或頭痛者宜先服

人參敗毒散一二服方可服此藥如無前證即服此藥二三

劑或腫不消宜服托裏藥

青皮去白 金銀花 天花粉 柴胡

僵蚕炒 貝母 當歸酒拌 白芷各二錢

用水二鍾煎至一鍾食遠服如便毒加大黃煨一錢 空心服

又方治吹乳乳癰不問已成未成用蒲公英一握春時開黃花 搗爛

人酒半鍾取酒温服相貼患處甚者不過三五服即愈

瘰癧

瘰癧者結核是也或在耳前連及頤頷下至缺盆在鎖子骨皆謂
瘰癧手少陽三焦經主之或在胸及胸之側皆謂馬刀瘡手
少陽膽經主之大抵二經多氣少血初生如豆粒漸如梅李
核或一粒或三五粒按之則動而微痛不甚熱惟午後微熱
或夜間口乾飲食少思四肢倦怠或堅而不潰潰而不合皆
由血氣不足故往往變為勞瘵况其症原不係膏梁丹毒之
變因虛勞氣鬱所致宜以益氣養榮之藥治之其瘡自消若
不詳脉證經絡受證之異及虛實之殊槩用追蝕毒藥及牽
牛斑猫流氣飲十宣散敗毒散治之則先犯病禁經禁以致
血氣愈損反為敗證矣可不慎哉丹溪亦云或有風毒熱毒

氣毒之異更宜斟酌而治之

益氣養榮湯 治抑鬱及勞傷氣血頸項或四肢腫硬或軟而

不赤不痛日晡微熱或潰而不斂並治之

人參一錢 白朮炒二錢 茯苓 陳皮 貝母

香附子 當歸酒拌 川芎 黃耆益水

熟地黃酒拌 芍藥炒 桔梗 甘草炒各一錢

作一劑羌三片用水二鍾煎至八分食遠服

胸痞人參熟地黃各減三分 口乾加五味子麥門冬往來寒熱加

軟柴胡地骨皮膿清加人參黃芪膈多加川芎當歸膈不止

加入人參黃芪當歸肌肉遲生加白斂官桂

夏枯草湯 治瘰癧馬刀不問已潰未潰或日久成漏用夏枯

草六兩水二鍾煎至七分去粗食遠服此生血治瘰癧之聖

藥虛甚當煎膿膏服并塗患處多服益善兼十全大補湯加香附子貝母遠志尤善

治癰癧已成未成已潰未潰以手仰置肩上微舉起則肘骨失自見是灸處如患在左灸左肘患在右灸右肘若左右俱患兩肘皆灸灸以三四十壯為度更服補劑灸三次瘡自除如患三四年不愈者辰時灸至申時三灸即愈更服益氣養榮湯又方灸癰癧未成膿者用大蒜切片如三錢厚安患處用艾壯於蒜灸之至三壯換蒜每日灸十數蒜片以拔毒如破久不合內有核或瘀肉此因血氣不足不能腐爛以銅錢挺輕輕連衣膜取去縱取重亦不痛不必畏懼更用江西豆豉為末唾津和為餅如前灸之以助陽氣內服補藥外貼琥珀膏或太乙膏瘡口自合

又方治癰癧已破核不腐致瘡口不斂或貼琥珀膏不應時效針頭散傳之以去腐肉以如神散傳之更服益氣養榮湯若血氣虛者先服益氣養榮湯待氣血稍充方用針頭散仍服前湯如神散 治癰癧已破瘡口未合

松香末 一兩

白礬 三錢

為細末油調搽乾糝亦可

散腫潰堅丸 治癰癧馬刀瘡服益氣養榮湯不能消散者宜服此丸五日又服益氣湯五日如此相兼服之不應以針頭散傳之

知母 酒拌炒

黃柏 酒拌炒

瓜蒌根 酒拌

昆布 酒拌炒

桔梗

黃芪 酒拌炒

連翹

黃連 炒

京三稜 酒拌炒

葛根

白芍藥 各二錢

升麻

當歸稍 酒拌

柴胡

甘草 各一兩

草龍膽 酒炒

南日醫書

黃芩 一錢五分 一半生用

為細末煉蜜丸如菜豆大每服一百丸或一百五十九

加味敗毒散 即荆防敗毒散 加牛蒡子玄參 治風熱上壅頭痛或因怒氣增寒

壯熱如四五劑不退宜服益氣養榮湯 方見前

神秘散 治癩癰服散堅丸及養血氣藥不應者宜進此藥更

以養血氣藥服之

斑猫 二十一箇 去頭足翅同 糯米炒去米不用為末 荆芥穗末 二錢

黑牽牛末 炒一錢 直殭蚕末 炒二錢

和勻每服一錢五更溫酒調下日午惡物從小便中下如小

便澁或痛宜以葱茶湯或木通湯即下更吃米粥補人不下

次日五更再服必以下為度若脈牢瀆或洪大無力者不

時效針頭散 追極惡瘡疥肉

赤石 半兩

乳香

白丁香 各二錢

砒 生用

黃丹 各一錢

輕粉

麝香

蠟 一錢

為細末糝於瘡肉上或瘡口小就搽瘡口上肉自去更以膏

藥貼之肉亦去嘗用砒末二錢以白礬末二錢和勻同飛過

用礬一錢合藥亦效但不及生砒之功力速耳

琥珀膏 治癰癰腫硬或穿破膿水不絕經久不瘥或成癭疾

及癰疽並貼之更服益氣養榮湯

琥珀

丁香

木香 各三錢

桂心 半兩

硃砂 細研

白芷

當歸

防風 去蘆

木鱉子 去殼

木通 各半兩

黃丹 七兩

柳枝 三兩

松脂 二兩

麻油 一斤

內除琥珀丁香桂心硃砂木香為細末餘藥剉咀以油浸五

日入鐺中以慢火熬候白芷焦色濾去下松脂末及黃丹以

幸天醫書

八

民八

柳枝不住手攪滴水試軟硬如軟再煎得中方人琥珀等末攪勻磁器盛貯用旋攤

咽喉口齒

清胃散 治胃經有熱牙齒或牙齦腫痛或牽引頭腦或面上

發熱並治之

當歸身酒洗

黃連

生地黃俱酒製各一錢牡丹皮一錢五分

升麻二錢

作一劑用水二鍾煎至七分食遠服

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡或木舌重舌或連頰兩

邊痛腫並治之

玄參

赤芍藥

升麻

犀角鈎末

桔梗

管仲

黃芩各一錢

甘草錢半

作一劑水二鍾煎八分人犀角食後服

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索一兩

黃柏半兩

蜜陀僧

青黛各二錢

為末每用少許付之有涎吐出再搽

碧雲 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉及牙齒齦齩作痛

芒硝

青黛

寒水石煨

石膏煨各研末飛

朴硝

馬牙硝

甘草

滑石各二兩

將甘草煎湯二升入諸藥再煎用柳枝不住手攪令消溶入

青黛和勻傾砂盆內候冷結凝成霜取霜研為末每用少許

含化嚥津如喉閉不能嚥不用竹管吹藥入喉中

金鑰匙 治一切喉風及痰涎壅塞水漿不下不識人事者宜

刺患處去血即消或刺少商穴

在左手人指內側去爪甲韭葉許

急者二處

並刺後繪圖

焰硝一兩五錢 白蠟一錢 硼砂五錢 片腦二分

雄黃二錢 研末和勻以竹管吹入喉中有涎吐出內服

荆防敗毒散如大便秘加大黃朴硝

破關丹 治乳蛾喉閉喉風等證

蓬砂末五錢 霜梅肉一兩 和勻

九芙蓉大每服一丸噙化嚥下內服荆防敗毒散

又方治虛火炎上用炮附子去皮尖切片噙之或研為末用唾

津調塗腳心亦可

又方用肉桂為末哈之

治諸骨鯁

用象牙末吹患處

又方用五倍子茶葉為末吹患處

毒癰

加味瀉肝湯 治肝經濕熱不利陰囊腫痛或潰爛皮脫罌丸

懸掛或便毒及下疳腫痛或貴爛並治之

龍膽草酒拌 當歸稍 車前子炒 澤瀉

生地黄 芍藥炒 黃連炒 黃柏酒拌

知母酒拌 防風各一錢 甘草稍五分

作一劑水二鍾煎八分食前服外敷烏金散

烏金散

麩炭 紫蘇葉 為末各等分香油調搽

加味小柴胡湯 治囊癰腐爛或飲食少思日晡發熱

柴胡 人參 黃芩炒 川芎 白朮炒

黃耆鹽水浸炒 當歸酒洗 甘草 黃柏酒拌 知母酒拌

各一錢

半夏 五分 作一劑水二鍾煎八分食前服

痛甚加黃連 小便不利加木通

下疳

勝金散 治下疳潰爛或疼痛

黃連 黃栢 輕粉 硃 孩兒茶 各五分

水片 一分 為細末香油調搽內服加味瀉肝湯

加味瀉肝湯 治下疳腫痛或潰爛不愈 方見前

加味小柴胡湯 治下疳潰爛發熱少食 方見前

痔瘡 附便血

槐角 治痔漏腫痛或使血

槐角 一兩 防風 地榆 枳殼 麩炒 當歸 酒 各一兩

為末煉蜜丸梧桐子大每服五十九丸空心滾湯下腫痛或便

秘飲槐花酒膿多或倦宜服黃耆人參湯潰而作痛宜服乳

香止痛散

雙解散 治男子交感強固精氣以致精血交錯肛門連切腫

痛大小便澀滯

棘桂 大黃 炒 白芍藥 澤瀉 牽牛 炒搗

桃仁 去皮尖各二錢半 甘草 五分 乾薑 一錢

作三劑水二鍾煎七分空心并食前服

秦艽白朮湯 治痔瘡作痛大便乾燥或下血

秦艽 桃仁 去皮尖 皂角仁 煨存 枳殼 麩炒

當歸尾 酒拌 澤瀉 白朮 各一錢 地榆 一錢 血不

作一劑用水二鍾煎八分食前服

祛風潤燥湯 治痔瘡焮腫作痛大便秘澀

防風 荆芥 羌活 黃連 黃芩 秦艽 枳殼各一錢半

當歸酒拌 皂角仁去皮燒存性 桃仁去皮尖研 澤瀉 紅花各一錢

大黃煨二錢 作一劑用水二鍾煎八分食前服

治痔瘡下疳瘡

臘月取羊膽一枚入片腦末一分置風處用時以涼水化開

頻敷患處內服槐子酒或加味瀉肝湯能膽更佳如眼痛者

點之尤效

又方治痔瘡痛不可忍

槐樹根七兩不犯 片腦末一分 指甲草七顆蜀人呼為

民亦食之 作一劑用水二鍾煎一小盞入水片末候溫頓

敷患處內服槐子酒無指甲草亦可

江

用黃連吳茱萸等分熱湯拌濕罨一二日同炒各另為末各

糊為丸如梧子大每服一二錢糞前紅服茱萸丸糞後紅服

黃連丸俱酒下如四五服不應者乃氣虛不能攝血以六君

子湯加黃耆地松治之再不應以補中益氣湯倍加柴胡升

麻升舉之切忌寒涼之劑

便癰

雙解散 治男子交感強固精氣致患便癰腫痛或發熱宜用

此藥一二服如不消更服補中益氣湯

荆防敗毒散 治便癰發寒熱或拘急頭痛方見前

加味瀉肝湯 治便癰腫硬不消或小便澀滯方見前

仙方活命飲 治便癰不潰痛甚方見前

托裏消毒散 治便癰不作膿或不潰方見前

毒天

外科

十一

卷二

加味十全大補湯 治便癰膿清或不斂 方見後

神效瓜蒌散 治婦女患便癰不潰或痛甚及乳癰一切癰疽

等毒並治之 方見前

補中益氣湯 治勞役患便癰不消

人參 黃耆 鹽水炒 白朮 炒各一分 當歸 酒拌 陳皮 各一分

柴胡 升麻 各五分 作一劑 姜三片 棗二枚 水 二鍾煎八分 食前服

補骨脂散 治不慎房勞患便癰或勞役患此腫痛並治之

補骨脂 研炒 牛蒡子 研炒 牽牛 研炒 大黃 酒拌炒 各五分

為末每服五錢痛甚者一兩空心熱酒調下

製甘草 治便癰腫痛或炊連莖根 方見後

懸癰

治懸癰以大甘草 水一鍾浸透

以慢火炙 水乾為度如未成膿者四五劑已成膿者一二

劑酒煎空心服如小便赤更服清心連子飲三四劑及托裏

滋陰藥若潰而不斂宜服大補氣血藥不謹守者必成漏證

加味小柴胡湯 治懸癰炊痛發熱小便赤澀或增寒熱 方見前

清心連子飲 治懸癰勢退惟小便赤澀

黃芩 錢五 黃耆 錢五 石蓮肉 去心 人參 赤茯苓 各七錢半

車前子 炒 麥門冬 去心 甘草 炙 地骨皮 製甘草 法見前

每服一兩用水二鍾煎八分食前服 如發熱加柴胡薄荷

加味托裏散 治懸癰不消不潰

人參 黃耆 鹽水炒 當歸 酒拌 川芎 麥門冬 去心

知母 酒拌炒 黃柏 酒拌炒 芍藥 炒 金銀花 柴胡

製甘草 法見前 各一錢 作一劑用水二鍾煎八分食前服

加味十全大補湯 治懸癰潰而不斂或發熱飲食少思

人參 黃耆鹽水炒 白朮炒 茯苓 熟地黃酒拌中滿 減五分

當歸酒拌 川芎 芍藥炒各一錢 肉桂 麥門冬去心

五味子搗炒 甘草炒各五分 作一劑用水二鍾煎一鍾食前服

莖腫加青皮 熱加黃芩柴胡 日晡熱加柴胡地骨皮

小便赤加酒製知母黃柏 小便澀加車前子山梔子俱炒

治臙瘡濕毒瘡傷手瘡或遍身熱瘡並治之

黃柏末酒炒一兩 輕粉三錢為末

用猪膽汁調搽乾搽亦可內服人參敗毒散去桔梗加蒼朮黃柏

隔紙膏 治臙瘡濕毒瘡 各等分桐油調成膏作隔紙膏

貼之更服荆防敗毒散如數劑不應宜服人參黃芪湯方見前

湯火瘡

治湯澆火燒瘡止痛生肌

大黃末一兩微炒 當歸末一兩 用燭油調搽或芝麻油調搽乾亦可

栝葉散 治湯火傷或痛甚

栝葉炒 梔子仁各一兩 鉛粉半兩

為細末以羊骨髓五兩熔化和藥以木椎研良久日塗三五

次用燭油調亦可

治凍破成瘡或手足皸裂 瀝青末一兩 黃蠟一兩 香油二兩 一味熔化搽處

破傷風

玉真散 治跌打損傷或風入瘡口項強牙關緊急或腰背反

張並治之

防風

天南星

炮各等分

為末每服三錢小兒

一錢用童便一鍾煎七分熱服

又方

治打撲傷損或蟲獸傷破皮膚風邪入內牙關緊急腰

背反張或遍麻木甚者不知人事用蒜搗爛塗傷處將艾壯

於蒜上灸之多多為善仍用膏藥護貼內服玉真散如毒蛇

風大咬傷先刺患處去毒血亦如前法治之

小兒丹毒

治小兒丹毒多生頭面四肢色赤遊走不定用細磁器擊碎取

有鋒芒者一塊以筋一根劈開頭尖夾之用線縛定兩指輕

撮筋稍令磁芒正對患處懸寸許再用筋一根類擊筋頭令

毒血遇刺皆出更以神功散敷之內服荆防敗毒散或五福

化毒丹入腹者不治

五福化毒丹

治小兒蘊積毒熱驚惕煩躁頰赤咽乾口舌生

瘡夜卧不寧謔語咬牙或頭面遍身多生瘡癩

玄參

桔梗

茯苓

人參

青黛

牙硝

甘草

麝香

金銀箔

為末煉蜜丸

艾實大一歲者每服一丸薄荷湯化下及治痘

疹後餘

涎血臭氣以生池黃汁化下

更用雞翎掃藥口內

治小兒白屑滿口因名曰鵝口瘡不能吮乳用髮纏指上蘸并

水拭舌如屑不脫膿者栗木汁以綿纏筋頭拭洗却用飛過

黃丹搽上

神仙解毒萬病丹

一名太乙丹紫金丹一名神仙太乙丹一名玉樞丹

治一切毒及菽子

鼠莽菌草金石或喫疫死牛馬河豚等毒或時行瘟疫山嵐

瘴瘧急喉閉纏喉風脾病黃腫赤眼及衝冒寒暑熱毒上攻

神氏醫書

外科聖藥方之一

左

卷十五

或自縊或溺水或打撲傷損癰疽發背瘡腫湯火或蛇蟲犬鼠所傷或中邪狂走鬼胎鬼氣並宜服之居家出入不可無此藥真濟世衛身之寶毒藥如嶺南兩廣最多若從宦於此纔覺意思不快服之即安彼澗有草曰胡蔓草又名斷腸草陰置水中飲之即死又有取毒蛇殺之以草覆上以水洒之數日菌生其上取為末酒調以毒人始亦無患再飲酒即發立死其或淫婦多與北人配合北人回蜜以藥置食中乃戒之曰子某年來若從其言婦乃以藥解之過期則必死矣名曰定年藥凡北人至彼方亦宜知之若覺中毒四大不調即便服此况彼下藥時必於雞豚等肉投之後再食前物必發其毒急服此一錠或吐或利隨手便瘥昔有一女子久患勞瘵為屍蟲所噬磨一錠服之一時吐下小蟲千餘條後只服蘓

合香丸半月遂如常如牛馬六畜中毒亦以此藥救之

無不效者

文蛤

三兩淡紅黃色者搗碎洗淨又名五倍子

續隨子

去殼研細以紙包壓去油再研一兩

山茨菇

二兩

麝香

三錢

紅芽大戟

洗淨一兩五錢

右各另為細末和勻以糯米粥和勻於木臼中杵千餘下每料分作四十錠於端午重陽七夕合如欲急用辰日亦得勿令婦人孝服不具足人及雞犬之類見之合宜珍重否則無効○如癰疽發背未破用冷水磨塗痛處并服良久覺痒立消○陰陽二毒傷寒心悶語狂胸膈壅滯邪毒未發及瘟疫山嵐障氣纏喉風冷水入薄荷一葉同研下○急中顛邪喝叫亂走鬼胎鬼氣並用煖無灰酒下○自縊或落水死心頭煖者及驚死鬼迷死未隔宿者並冷水磨灌下○蛇犬蜈蚣傷並用冷水磨塗傷處如腹脹或迷悶者更宜服之諸般瘡

疾不問新久臨發時煎楊柳枝湯下○小兒急慢驚風五疳入痢蜜水薄荷一葉同磨下○牙關緊急磨一錠外塗內服量大小用之牙痛酒磨塗及含少許吞下○湯火傷東流水磨塗傷處○打撲傷損炒松節酒下○年深日久頭痛太陽疼用酒入薄荷磨紙花貼太陽穴上并服之○諸般癩疾口眼歪邪眼目掣眩夜多睡涎言語蹇澁卒中風口禁牙關緊急筋脉攣縮骨節風腫手脚疼痛行步艱難一應風氣疼痛並用酒磨下有孕婦人不可服○余治一婦人腹內結塊久而不消○一婦人月經過期不至腹內作痛服破血行氣之劑不效服之並痊○一婦人苦頭風作暈數年亦服之吐痰碗許遂不再發○一男子喉閉水漿難下○一男子纏喉風痰涎壅盛○一婦人中風牙關緊急痰涎溢出隨服並愈○

一男子便毒堅硬○一男子患痔未成膿苦痛大便俱難各進一錠後去二次痛即止不日而消○一男子患發背瘡頭如粟重如負石內服外塗後去三四次每去肛門如炙即日而瘳○三男子剥自死牛即日遍身患紫泡不計其數已而俱潰各灌一錠吐瀉而甦一藥不下者而死○一小兒昏憤六日不省一小兒驚風發掇諸藥不效口灌之並蘇○一男子中風牙關緊急口出涎水亦灌之尋愈○一女子爲邪所交腹作痞服之墮下惡物其邪仍至又服半錠每夜更炙二三錠使烟氣盈屋遂不再至○一家患傳屍勞兄弟五人已死者三人有方士令服此藥遂各進一錠一下惡物如膿狀一下死蟲如蛾形俱獲生其人遂以此藥廣濟屍證無不驗者余常用治一切雜病及瘡疽等毒未成膿者甚效其已

成膿者亦能殺大勢考其藥品雖不言補今羸瘦之人服之
並效誠神劑也然以價計之用銀三錢藥有七十錠可救七
十人有力之家當合之以濟人近人製此往往加以硃砂雄
黃考之諸方並無此味余故不用恐亂其真也識者當自知
之

