

方輿輓

十

噦

八十五

嘔吐反胃噎膈

三十四

吐酸噯氣
噯雜噯氣

喘哮

五

眩運

二十六

中武
589
9



方輿輓卷之十目次

喘咳

桂枝加厚朴杏子湯

小青龍加石羔湯

大青龍湯

麻黃杏仁甘草石羔湯

越婢加羊復湯

厚朴麻黃湯

射干麻黃湯

木防己湯

方輿輓

子給湯

參連加吳茱萸湯

葛氏湯

瓜蒂散

滾痰丸

控涎丹

續方

紫蘂子湯

眩運

茯苓桂枝白朮甘草湯

真武湯

澤瀉湯

五苓散

小半夏加茯苓湯

羌活湯

朱鳳散

嘔吐反胃噎膈

嘈雜噫氣 吐酸 惡心

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

大半夏湯

生薑半夏湯

半夏浮心湯

生薑浮心湯

旋覆代赭石湯

小柴胡湯

大柴胡湯

吳茱萸湯

千金吳茱萸湯

甘草乾姜湯

猪苓散

五苓散

茯苓澤瀉湯

大黃甘草湯

甘遂半夏湯

附子粳米湯

真武湯

四逆湯

安中散

療胃反大驗方

安癰湯

獨參湯

斷食法

瓜蒂散

橘皮湯

破棺湯

治嘔吐方

消黃丸

終始丸

滾痰丸

反胃灸法

續方

治食飲輒吐方

噦

橘皮竹茹湯

橘皮湯

半夏厚朴湯

吳茱萸湯

柿蒂湯

甘草乾姜湯

四逆湯

小承氣湯

一方

又方

滾痰丸

灸法

方輿輓卷之十
有持二名先生口授

○哮喘

○喘ハヒロクカ、ハ字ニテモトハスタクヲニテ氣
急ノ、フヘソレヨリ后世ニナリテ痰喘ノ類ヲ喘ノ一
字ニテ説キテアリ哮ハ今云喘息ニアタルハ哮又齁
孔ナト、カキテアリ音相通スルト見ユ哮喘ノ二字
ツ、ケレハ常ノ痰喘ト今ノ喘息ト相合ノ此ニ云
故ニ字ヲ挙タリ叔一通リノ痰喘伝モノハ諸病ニツ
イテアル者ナルカ喘息ハ毒ニヨル者ニ其毒伝モノ

一男子一日龍ハロニ
當道ニ出タリ戦ミ氣
多シテサニ死セトス
傍人驚キ医局ノ當
番ニ見セタリ匠作林
杏村石其之而家還
其望深ク師性テ見
ルニ其息迫ハ状イカニ
モ危篤ニ見ヘタリ
師問曰咽喉ハ心地
如何病人曰梅核ハ如
キチアリテ粘着スル
心持アリテ則作生更
厚朴湯其之兼用
滾痰丸屋カニニ三
貼ニテ平復セリ
又主人喘急ス師問
胸中状如何患者曰
如痒師謂肘后方
為之查仁甘々湯除
曰習々如痒幅々如滿
云云乃與之治焉矣
右二条侍於深見師
聞之

ハ多ク父母ノ遺毒ノ故ニ治法ニ取テモ喘息ヲ根治
セント欲セハ毒ヲ解スル方ヲ用子ハナラヌ而シ
凡此病難治ニテ養生モ仕遂ケル人モ少ナキ者故此
門ニハ但起リシ片ノ手當斗リノ仕方ヲ挙シ其喘
息ノ起ル多ク外邪ヨリ来ルモノニ故ニ以下挙テア
ル六方ハミナ外邪ヲ制スル藥ニ又小兒ノ馬脾モ大
人ノ喘息モ治法ニ於テハ一ニ別ニカワリシモノニ
アラス此喘哮門ニ挙テアル方ニテヨキ其内大人
ノ喘息ハ毒内ニ痼スルヲ久キモノ故其病毒ヲ其時
ニ臨テ駢リ取ルヲ出来ヌ故ニ素問ノ急則治其標

ノ例ニ從テ其毒ヲ駢ルヲシ棄テ先痰喘ヲ制スル
小兒ノ馬脾風モ大人ノ喘息ト同ク胎毒ヨリ来ル
ハ凡其毒内ニ痼スルヲ久カラスノ根柢内ニ結スル
ト大人ノ如ク甚シカラス故ニ馬脾風ハ其隨症ノ方
ニ紫丸龍麝ナトノ如キ解毒ノ劑ヲ兼用メユクニ乃
大人ノ喘息ト小兒ノ馬脾風トハコレタケノ違ヒア
ル
○喘哮ノモトハ毒ヨリ来ル痰ハ標ニケレ凡其發
リモ凡ニテハ内經ニ所謂急則治其標ニテ痰涎ヲ制
スルハ汗吐下凡ニスルニシカレ凡喘ハツレニテ治

スル者ニアラヌ治セヌハツク汗吐下疝痰シカル藥
ニメ毒シサハク藥ニアラサレハク若其毒ヲ去ント
欲セハ砒石礞石類治勦石丸ナトシ用ルニコレ毒
シ駢ル仕方ノ故ニ安靜ノ片用ルニ起リコレハ不用
ニコレニテモ不治者ハ外ニ手段ナシ治勦赤丸ハ発
リコレ片用テモ治セヌニテハナケレハコレニテ下リ
コレト根ヲ断ツ者ニアラヌ故ニ安靜ノ片コレツホリ
ト用ク一月モ二月モ三月モノマ子ハナラヌ者ノ其
内大人ノ喘息ハ治勦赤丸ニテモ不治者多シコレ藥
ニテハ尚更不治者ノ赤丸ハ小兒ニハ不用ノ若強実

ノ者ナラハ用ルヲモアルヘキナレハ多ハ不用ノ十
五以内ノ喘息ナラハ五効丸金芎丸双紫圓ナトシ用
テ五物紅花ナトシ用ヘシ何レ毒サユ逐ヘハナシ以
内ノ者ハ治スル者ノコレ其安靜ノ片ノ治法ノ十五
以内ノ喘ナレハナシメ八九ハ治スルモノ

○此門ニ載タルハ産后マ傷寒陰証ノ喘ヲ論スルニ
アラヌ此條ニアルハ俗ニ云喘息ノヲ云ニ喘ハ小
兒モ大人モ治法別ナシ

○大人暴喘仰テ居ルハヨキノ俯メ居ルハアコノ時
ニコレハ死スルヲモアリ病家ニ其変ヲ告テ咎ヲ受

ルヲナカレ

桂枝加厚朴杏子湯 於桂枝湯方中加厚朴四分杏仁

○此方ハ外邪ノ輕キモノノコレヨリ一等重キハ小青竜加石又其一等重クメ煩躁ナトアル者ハ大青竜此マテハミナ惡寒アリテ初發ニヨルモノノコレカニ初發ニアラスメモ惡寒ノアルモノハ何ツテモ用レ片先多ハ初發ニアルモノノ

○是ハ甚輕キアコレイニ最初風ニテモ引キ喘哮アル片ノアコレイニ○コレハ喘息家ノ邪氣ニ感ノ宿疾ノ動キニ片初發用ル但シ甚輕証ニツヨキ片ハ

効ナレツヨキ片ハ小青竜加石或大青竜湯主之

小青竜加石羔湯 方具痰飲條 肺脹欬而上氣煩躁而喘脈浮者

心下有水

○既ニ前ニ辨ス

○此方肺脹云テ用テアレ片肺脹云迄ニ不至片常ノ喘ニ用テヨレ肺脹ハ小兒ノ馬脾カタチニテ越婢加羊復ノ場ナトシ云モノニテ重キ者ハ小兒ノ馬脾ハ即大人ノ肺脹ハ大人ニテ云ヘル越婢加羊復ノ場ハ即肺脹ニシカレ肺脹ノ名義ハ不穩ニ越婢加羊復ノ處ニテハ小青竜ニテ不及モノハ肺脹ナレハ初發ニ

テモ麻杏甘石ニツレヨリ越婢加半夏ニ至ルモノ
小青竜加石ハ病勢ノ片ヲ以テ云ヘハ昼ヨリ前ノ藥
ニ○此方ハ桂枝加厚朴杏仁ノ隣ニアルモノニ又大
青竜ハ煩躁ナクモ表証ツヨクアリテ表發シ重ク
シタキ片ニハ小青竜ノ場ニテモ大青竜ヲ用ヘ此片
ニハ必シモ煩躁ニ不拘ニ○痰喘ヤ喘息ナトノ小青
竜ハイツテモ加石焦ヨキモノニソノ方カハヤキモ
ノ○喘息初發大小青竜ニテスム者ハ大小青竜
シヤリテアトヘ麻杏甘石ヲ用ヘ麻杏甘石ノ場ハ表
テモナク惡熱ノ気味ナル処ヘヤリテ佳ハ大柴一通

リノ喘息ハ大小青竜麻杏甘石ニテスム持病ノ喘
息初發ニモ麻杏甘石ヨカリソフナルモノナレト
シヨリハ此処ヘハ小青竜加石焦効アル○喘息ノ
初發ハ大小青竜ニテ足ル其アトハ麻杏甘石
ノ類ヲ用ヘ○持病ノ喘息ハ兎角下利ヨリ發汗劑
カヨキモノハ表發ノ表熱ナレト思テ控涎ノ類ヲマ
リテモ必上ヘ来ルモノハ表發モ桂枝加厚朴杏子ハ
キカヌモノハ少シニテモ表症アラハ小青竜加石焦
ヲ用ユルカヨキモノハ表症ナキハ麻杏甘石ヲ用ユ
小青竜加石焦ハ少シノ表症ニテモ用ユ○喘哮ノ輕

者ニハ桂枝加厚朴杏子湯ヲマリ重ウナルハ小青
竜加石羔シヤル此ニ方ハ表未解モノ表既ニ解
ノ陽明ヘユクモノハ麻杏甘石シ用ユ其一等進シ者
ハ越婢加半夏ヲ用ユ又表未解ノ熱甚キ者ハ大青竜
シヤル熱甚キ者ハ喘哮モ甚クナルモノ又喘哮
大ハ解メ欬ニナリシ者ハ射干麻黄シヤル凡テ喘
哮ノ解シタル后ハ必欬ニナルモノ射干麻黄ハ邪
去リシアトノ方也○持病ノ喘息ノ方ハ何ヨリモ小
青竜加石羔ヨキモノ也

大青竜湯 方具痰 飲條

○既ニ上ニ辨ス

○小青竜ノ証ニメ煩躁シジユツナル者ハ此方主
之右脈緊ナル者ニアラサレハ此方ハ不用也喘ニ虚
煩アリ実煩アリ虚煩ノ処ヘハ大青竜ハヤラレヌ
シカシ持病ニアル喘ハナニハ九ニテ実煩ノ它病ノ
喘ニハマ、虚煩アリ不可不審ク

麻黄杏仁甘草石羔湯 汗出而喘無大熱者

麻黄 一分 杏仁 一分 甘草 一分 石羔 二分

右四味以水ニ合煮取六勺

○此方モ越婢加半夏モ惡寒既ニ退キタル処ニ其内

麻杏甘石ハ陽明ニメ未タ太陽ヲ帶テ居ルモノハ故
ニ此ニハ惡寒モマタアルハ越婢ノ処ニテハ惡寒ナ
キモノハ越婢ハ少々惡寒アリテモ用ル藥ナレハ喘
息ニ用ルニハ惡寒トクト退キタル処ヘ用テ越婢ノ
処ニテモ惡寒アレハ喘息ニテハ麻杏甘石ヲ用ルカ
ヨキモノハ○前ノ大小青竜ニ比スレハ外証ナク次
ノ越婢ニ比スレハ其病少シ前方ノハ青竜越婢ノ間
ニ此病多シ○是ハ表証退キ惡寒ヤミタルハ用ル
ハ汗ノ有無ニハ不拘ハ大小青竜ノ表証ナキ者ナ知
レハヨキハ

越婢加半夏湯 欬而上気此為肺脹其人喘目如脫狀脉浮

大者

麻黄 九分 石膏 二錢 生姜 四分 大枣 六分 甘草 三分 半夏 七分

右六味以水一合二勺煮取六勺○明李仲梓医宗必讀云
一令愛久嗽而喘凡順氣化痰清金降火之劑幾千遍嘗絕
不取効一日喘甚煩躁余視其目則脹出鼻則鼓扇脉則浮
而且大肺脹無疑矣遂以此投之一劑而減再劑而愈

○既ニ上ニ辨ス

○是ハ目如脫脉浮大伝シ目的ニメ用テユケハトシ
ト間畫ノナキ者ハ欬嗽ニモ此証多シ其片ハ欬喘ノ

此ニテ眼目ノ候ヲ不待ク此欬喘久キヲ歷テ在萬ト
 ノ不愈ハ水氣トナル者多ク厚朴麻黃湯滾痰丸十寒
 控涎丹ナトノ証ニナルモノハ越婢加半夏ノ治驗李
 仲梓精ニ故ニ此ニ挙テ參考ニ備フ按ニ右ノ必読ノ
文卷九喘門出一
 令愛ノ一勾仕反孫芳其令愛ニ作ル又遂以此投之ノ
 夕遂以越婢加半夏湯投之ニ作ル
 ○此場ハ麻杏甘石ノツルケタル処ハ麻杏甘石ヲ越
 テ脱ニタル処ハ脱ニタルトテ虚脱トサシツケテ云
 ニハアラ子氏麻杏甘石ノ場ナトヨリハ虚脱ニタル
 様ニミユルモノハ

厚朴麻黃湯

凡喘息ノ發ルニ
 而道アリハ過
 食ニヨリハ時元
 ニヨリテ發タルモ
 ノハ過食ニヨリテ
 發ルハ後世ニテ
 平陳湯ヲ用テ方
 ハトモアレ理ハキコ
 ヘテアルハ此処ハ
 厚朴麻黃湯ヲ
 用テヨキク厚朴
 麻黃湯又水腫
 ニモ用ユ

○此方ハ金匱ニ挙テアレ氏晋唐ノ間ノ方トミユ仲
 景ノ方トハミユ又ハ故ニ其位ハ得ト分ラ子氏大青
 竜麻杏甘石越婢加半夏ナトノ間ノ方ハ此方ハ厚朴
 小麦ナト入テアリテ青竜越婢ナトノ方トハマタ少
 シカハリシ者ニテ具合ヨキ処アルモノハ厚朴小麦
 ナト入テアリテ胃中ヘアツカハアコライアリ故ニ
 藥味推シナシ氏此方ハ中脘ノ痞塞ナトシ酌合メ用
 ニ此方モ青竜越婢ナトニ近クメ射干麻黃湯ノ方ニ
 ハ遠キ藥ハ

射干麻黃湯

○是ハ喘欬ヲ主トル方ニ凡ソ喘息ハ初発ハ欬ナキ
 モノハ喘息ニ欬ノ出ルハ治マリロト思テヨキモノ
 其処ヘ用ユ喘ノツヨキ処ニハ勢不及ノ后セニ白
 果定喘湯伝アリツレト同意ノ方ニ射干麻黄湯金匱
 ニハ欬而上気喉中水雞声トアレ凡今此シ喘息ニカ
 リ用ルハ此方ハ青竜ヤ越婢ナトノ如ク麻黄石羔ト
 伍シタル者ト違ヒテ輕キ方ニ故ニ喘息ノ末ニナリ
 テ欬嗽ヲナス処ニ用ルハ喘息ノ欬嗽ナルハ熱クダ
 ケテ后ニナル者ハ此方ハ欬ヲ主トスル方ニ凡ソ喘息
 ノ証初発大ニ青竜ヤ越婢ナトヲ用ルハ此ハ欬嗽ナ

キモノハ假令アリテモ微咳ニテ格別ニ制スルニ不
 及モノハ故ニ青竜ヤ越婢ナトニモ欬ノ証ハアレ凡
 喘息ノ欬アルハ右ノ方ハユカヌモノハ何ト
 ナレハ喘息ノ欬ハ初發表熱ナトノ劇ニキ処ニハナ
 キモノハ其大勢挫ケタル処ニアルモノニテ射干麻
 黄ノ場ノ欬ヲナスモノハ

水防己湯 以上三方並
具痰飲條

○是ハ但喘メ心下痞スル者ニ用ユ
 ○是ハ持病ノ喘ニテモナク所謂支飲ノ証ニ多シ
 カル其狀喘哮ト相類スルヲ以テ此ニ列举スオコリ

喘哮ニ心下硬氣
 急スル者ハ水防己
 湯ヲ用ユ此方ハ
 本支飲ニ用ユル
 藥ハ咳ニ不
 拘

外邪ナクノ喘哮
スル者ハ喘四君子
ヲ用ル又分邪
ナクノ喘哮スル者
ハ子婦湯ヲ用ル
アリニ方主治
同ニテ先劇
易ノ違ヒル者

此片ハ頻ト持病ノ喘息ノ様ナルモノハ此方參連ナ
ト、同ク心下ノ痞堅シ目的トメ用ルハ喘急ノモ心
下痞堅ヲケレハ此方ハ不用ル此ニメ痞堅ノナキモ
小サノハ可発者ハ小青竜ノ類可下者ハ厚朴大黃湯ナト
モアルヘシイロクアルハ又汗吐下ニアラスメ千金
紫蘇子湯或葛氏湯ナトノユクヲモアルヘシ千金ノ
紫蘇子湯ハ后世ニテ蘇子降気湯ト是レ
○喘四君子湯 四春 此方常加沉香木香コレ華書ノ
加藥ハ此方后世ノ藥ニテ長々コレキ藥ナレハ効ニア
ル方ハ熱ナクメ短気カオモミナハ証ハ此ニテモ熱

喘四君子ハ沉香
降気ノ緩ナク者
ニカシ沉香降気
アリハ喘四君子ハ
イラメハ沉香降
気ニテサハハハ
沉香降気ノ場
重モノハ參連加
呉茱萸ヲ用ニ

アレハ麻黃石羔ノ類ヲ用子ハナラヌハ此方ニハ効
ナシアリテモ大夏ナシヤハリ用ヘシカシ此方ハ
ナクメモ大夏ハスハ藥故旧本ニハ木防己湯ノ次ニ
此方ヲ載スレハ今本ニハ削リ去レリカシ全ク用
ルヲナキ藥ニアラス此方參連加呉茱萸葛氏湯ナト
ハ近キ藥
子婦湯 治哮喘不得臥或風痰壅盛
半夏 七枚 皂角 甘草 各一寸 生姜 三分
用生絹帛盛水煎頓服
○是ハ主治ノ通り哮喘不得臥ニ用ユ即今ノ喘急ハ

又常ノ痰喘ニモ用ユ故ニ風痰壅盛トアルハ此方ハ
何レ喘ノ寒熱ナクノ不得臥ニ用ユ寒熱アレハ何レ
麻黃石羔類ヲ用子ハナラヌ又凡ソ此方ヲ用ルニ
ハ此ニアル如ク平生ノ藥ニ羊隻ヲ入ル、如クニ用
テハトントキカヌモノハ此方ヲ用ルニハ羊隻ヲ平
生ノ藥一貼ノタツフリトアルホトノカサ入レテ余
ノ藥ヲハ法ノ如ク入ルヘシ羊隻多ク入ル故煎スレ
ハ子ハくメ藥袋ノ目モトヲサカルホトナルモノ
ハ如此ナラサレハ効ナキモノハ

○此方喘哮不得臥カ主ク是モ表症アリテハ用ヒラ
レヌハ熱ハアリテモ大芩ナシ喘四君子ハスヘテ何
ノ熱ニテモ用ヒラレヌハ喘息ニ冷哮ハアリ即ツコ
ヲノ場ノ前ノ喘四君子湯ニ沉香木香ヲ末トシアト
ヨリ入ル此類ノ方後世ノ方ニマ、アリナルホト如
此スレハ殊効アリハ換柳ナトモ右ノ如クスレハ大
ニ良ハ外臺ナトニモ換柳ヲ磨シアトヨリ入ルモノ
多クアリ唐待中ノ方ナトニモ磨メ調服メアリ脚氣
ノ重キモノハ必右ノ如クスルハ其藥ヲ末メオキテ
其藥劑ヲ煎シアカリタル片右ノ末ヲ入レカキタテ
、用ルハ換柳ナトハ殊ニ氣ノ出ニクキ者ナレハ煎

マハ其気半分モ出カヌルノ叔子給湯ノ皂角ハ皂角
子カヨシ刺シ用ルハモアル非ス此方東坡ノ方ニ
テ東坡尺牘ニ人ニ贈ル文中ニ此方載テアリ又蘇沉
内翰良方ニモ此方出テアリ右ノ書ハ東坡ハ沈存中
ノ二人ノ方ヲ集メシ書ニ又此方回春ニモアリ其右
ノ方書ニモテラク見テアリ

良方十卷晁氏曰皇朝沈括存中撰存中博學通醫術類
其經驗方成此書用者多驗或以換子瞻論醫藥難說附
之文獻通考又曰陳氏曰不知何人所錄其間辨難古香
一段言靈苑所辨猶有朱書者館閣書目別有沉氏良方
十卷換沉良方十五卷而無靈苑方俞辨子容所著續
醫說卷一云蘇沉良方十卷前有永喜道士林靈素序余
家有宋刻本竊意靈素在二公之集々或難記或筆談等
書抄出彙或一編附託二公之盛名以行其方耳李東垣

謂蘇沉良方猶唐家類待何也蓋言不能詩者之集詩猶
不知方者之集方也一詩之不善止不過費紙而已不致
誤人一方之不善則其禍有不可勝言者矣噫后集方書
者尚煩之哉

○コレモ喘哮汗吐下シハナレテ一種此方ヲ用ル症
アリ此方ニ格別ノ定証アルニアラサレ凡麻黃石羔
ノ類ニテ治マラヌモノアリ其処ハ此方ヨキニカ
シ此通ノ半復ノ分量ニテ効ナシ半復ハ七投倍テハ
キカヌ一錢ヨリ二三錢迄用ヘシ余カ家ニテツ子
ニ調合スルニハ多クニ幾目ホトモ入ル

參連加吳茱萸湯

短気喘鳴心下痞硬者

參連湯方
具前條

○是ハ喘息ニテモ常ノ痰喘ニテモ心下へ痞塞ハケ
シキ者ニ用ユ此輕キハ二味浮心ヤ三黃ナトシ用ハ
フモアル

○何ノ喘ニテモ其入心下痞堅メアルハ此方ヲ用
テ喘從テイユ喘四君子ナトモ參連ト同意ニ心下サ
工開クハト短氣ヤ喘ハ自治ハ手段ノ參連ハ本防己
湯ノ急ナル者ニテヤハリ心下痞堅スルモノ

葛氏湯 方具痰
飲條

○痰飲門ニテ云ニ通りノ別ニ辨ナシ
○喘鳴促迫伝ハル急症ニ用ユ

瓜蒂散 方具傷
食條

喘家當其安靜當吐之宜瓜蒂散或與桔梗

白散吐如烱膠若血則瘳夫哮喘者痼疾也非數用之何
能破其堅

○凡喘息ハ發リテアルハ吐劑ヲ用ルハアキ者ニ
平生治マリテ居ルハ用ニカシ余ハ吐劑ハアマ
リ親シク試ミシフハナケレハ喘息ハ瓜蒂ニテモ治
セヌモノニテ瓜蒂ニテ治スルハ百人ニ一人ノ故ニ
田中子ナトモ具ヘテハオカシシナレハアマリ喘息
ニハ瓜蒂シ不用メ化毒丸ノ類方ヲ用ラレタリ即治
勲赤丸ニ化毒ヲ喘息ニ用ルハ平生更ノナキモノ

喘息ニ化毒ヲ用レハ始終少々ツ、痰沫ヲ吐スル
モノ又桔梗白散ハ喘息ノ発ル前後ニ用ルコ
モ此方ヲ用レハ痰沫ヲ吐モノシカシ桔梗白散ニ
テモアマリキカヌモノ、由ク白散モ赤丸ヲ用ル如
ク少々ツ、長ク用ルハ瓜蒂ヲ用ル如ク一度用テマ
ムニアラス

○コレハ安静ノ時ニアタツテ用ル根治ノ趣向ナレ
氏此方ニテハ根治ハシカタキ者ハ桔梗白散モ赤根
治ノ効ヲ得難シ此ニ方何レ大勢ヲ衰ヘルハ方
ハヤハリ赤丸ヲ用テ日々ニ吐セシムルカ根治ノ良

術ニシカシ赤丸ハ日々ニ少々ツ、用ヘシ過服スル
片ハ蜜涎沫ヲ吐スルノミニアラス后吐血スルア
ルモノ此桔梗白散ノ主治ニ吐血則瘰癧ハ都
合ヨクユキシモノハ皆々如此ナル者ニテハナレ吐
方ニハ血症ニハアヒキモノハ吐法考ニモ心下痞硬
ナトノアル者ニテ此ヲ行フヘキト云ヘ氏先其血症
ノ有無ヲ問テ血症ナクハ用ヒヨ伝テアリ
積聚心下痞硬臍過上者問其平生無吐血欬
血衄血之患者悉可吐之後服浮心之方數十日吐ヲ行
フテ吐血ノタマハ痰物ヲ吐シ尽メイユルヲモアレ
氏多ハ血ヲ見レハ痰スルモノ
吐方考云吐血吐血
者直止其吐可也吐

鮮血者往々有之雖吐可也吐鮮血者可大恐不可不戒也治哮喘赤丸ハ日ニ九

粒三度ニ用ユルヲ極トス三丸用ハモアリイツレ赤

丸ハ腹氣ノ堅実ナラサル者ハ決メ不用之方ハ本草

ニモ回春ニモアリ名ハチカフテアリ回春ニハ紫金

丹云テアリ余ハ赤丸ノ砒石ヲ礬石ニ代用ル能ク

吐クモノ此方別ニ論メアリ箋中秘錄喘哮喘條ニ出紫金丹ヲ治

吼赤丸ト名ケシハ田中翁ニハシマル田中翁ハ辰砂

ヲ衣ニメ用ラレタリ故ニ赤丸ノ名アリ紫金丹入門

ナトニモアレハ回春ニアル者ヨシ方ニ異ナルハ

ナケレハ回春ノ主治ハヨキナルホト一日ニ九丸

ツ、用ルハ回春卷ニ哮喘門有紫金丹方 本夏方卷

ニ肺腎經病門云治多年肺氣喘急响嗽晨夕不得眠紫

金丹 信砒一錢半研飛如粉 豆豉好者一兩半水畧潤少時以紙氈乾研或膏

右以膏子和砒同杵極勻圓如麻子大每服十五圓小兒

量大小與之並用臘茶清極冷吞下臨卧以知為度

有一親表婦人患十年偏求匡者皆不効忽有一道人貨

此藥謾贈一服是夜減半數服頓愈遂多金丐得此方予

屢用以救人特為神異 此方枯砒一味ナシ枯丸アル

ハ益ヨカルヘシ而シコ、ノ主治簡ニメヨシ田中翁

ハ喘息ニハ瓜蒂ハ効ナシトテ用ヒサリシハ治吼赤

九ハ田中子ノ喘息ヲ治スル奥ノ子ノ方トセシキ赤
丸ハ・コレ程ニ丸ニ三丸ツ、日ニ三度用ユ別ニ瞑
眩ナクメ但少シツ、痰ヲ吐スルモノハ此方大分効
アリ喘息ノ発リシ時心下へ未テ居ル者ハ此方ヲ不
用喘息発リテ腹満スル者ハ此方ヲ用心下ニアル者
ハ浮心ヲ用ラレシム赤丸ト浮心ヲ表裏ニメ用シム
赤丸小兒ニハ一丸程ツ、用テヨキハ田中翁喘息ヲ
令吐ニハ腹満ノアルニハ瓜蒂ハ効ナシトテ満ナキ
処ニ用ラレタリ瓜蒂ヲ用ルニハ先吐ノ后浮心ヲ長
ク服メナニ二三愈ルアリ腹満ノアルハ赤丸ニ右ノ

三黄ノ証初メヨリ三黄シマリテハ不治ノレ故ニ
一旦瓜蒂ヲ用テアトナラハ効アルハ田中子ノ傳ニ
云喘息ニ可吐モツアリ不且吐者アリ腹満ナクメ心
下痞硬スル者ハ且吐之腹満アリテ心下痞硬セヌモ
ハ赤丸ノ所之ハ是其別ニ余ハ赤丸ノ砒石ヲ生々
乳ニ換用ユ全体紫金丹モ人言ナシハ益ヨケレ氏ナ
キ片ハ礞石ヲ用テモ良生々乳ニテモヨキハ又田中
子ノ傳ニ喘息桔梗白散ヲ用テ吐スレハ治スルモノ
アリ又赤丸ノ処へ余ハ化毒丸ヲ用ルハコレモ同ク
根治ノ手段ハ全体化毒ヲ喘息ニ用ルハ畧義ハ本末

桔梗白散瓜蒂
散ニ此スレハ吐
カタリ緩ク

紫金丹ヲ用ルハツナシ凡別ニ丸藥ヲ制スルカ面倒
サニ化毒ヲ用ルニ又紫金丹方中ノ砒石一味ヲ生々
乳ニ換テ它藥ハ紫金丹ノ通りニナシ丸トシ用ルモ
ヨシシカシ化毒ニテ随分ヨキモノニ化毒ハ腹ノ塊
ヲ目的ニ用ユ○牛胆丸方 是亦喘息ノ一奇方ニ其
方牛胆一枚未タ乾涸セスメ柔カナルヲ取り篋ニテ
胆ヲカキ取りコノゲ皮ヲ去リ半夏末ヲ入レ丸トナ
スニヨキホト入レテ煉リ既ニ丸トナリタラハ末茶
ノ内ヘ右ノ丸ヲ入レツレシ服ス日ニ三分
或五分ツハ三度用ユ右ノ化毒ヤ牛胆丸イツレモ喘

息ノ起リテアハ片ハ不用喘ノ收マリテアハ片ニ用
ルニ用ルウチニ喘方コラハ右ノ丸ハヤメテ喘治メ
后後本ノ如ク用ヘシ化毒ヤ牛胆丸ヲ平旦ニ用ルニ
ハ隨症ノ方ニ兼用スルモヨシ又本湯ナト丸藥斗シ
用テモヨキニ喘ノ發リシ片ハ湯藥ヲ用テ丸藥ハ徹
スルニ牛胆丸ハ滋補ノ藥ニテ化毒ナトモ用ラレヌ
虚弱ノ喘息ニ用ルニシカシ右ノ化毒ヤ牛胆丸ニテ
喘息ハ十ハ十ナカラ治スルトハ云レヌ者ニ一休喘
息ハ根治ノナリカタキモノニ○十五以内ノ者ニハ
喘息伝ヘ凡瓜蒂ヤ赤丸ヲ用ルニ不及メ紫丸ノ類ニ

テ解毒スルカヨシ且灸シスヘシ其穴処ハ五推ト十

三推トニ脊骨ノ黒クナルホト灸スヘシ此灸法在諸中秘録喘哮門

是常々禁灸ノ穴処ナレ氏是ラノ氏ニハ不忌ク右ノ

紫丸ノ処ニハ双紫圓ヨキ余家ニ千牛丸トテ五味

ノ方アリ千牛丸方在諸中秘録嬰孺雜病條此方双紫圓ヨリハ尚ヨシ

小兒ハ喘ノ灸メアル片ニ下劑ヲ用テモヨキモノ

大人ハ喘ハ灸メアル内ニ下劑ヲ用ヘカラス又小兒

ハ喘ハ鼈鼠霜ヲ白湯ニテ用ユコルハ作りテ居ル片

ニアラス収リテアル常ノ片用ル是根治スルツモ

リノ方々作りテ片ハ隨証方ヲ用ユ小兒ハ十五已内

ノ者シ云々叔傷寒ナトハ脈証ヲ以テメ其因シ不問

メヨキヲモアレ氏雜病ニ至テハ其因シ不知メハナ

ラヌヲアリ凡大人ノ病シミルニ十ニ八九ハ皆遺毒

ニヨル久遺毒モ瘀血ニヨル者ハ其毒或病ニモナリ

或蛇虫ニモナリテ其變イロクトナル其内梅毒癩

疾ノ毒ハ梅毒ノ毒ハ梅毒ヲナシ癩ノ毒シウケタル

モノハ癩ヲナス此ニツハ傳染スル者ニ喘息ナト

ハ皆遺毒ニヨル故ニ毒ノ治シナセハ愈ルニ喘ア

ル人ノ腹シミルニ臍ノ辺ニ塊グレクトメアルモノ

ハ喘ハ中年以上ノ人ニ至テハ大抵ハ治セヌモノ

小兒ニアリテハ愈ルモノハ小兒ハ十五歳迄ハ土竜
一味土茯苓一味煎汁ニテ用ユエ三貝ニテヨキモノ
ハ此重キハ化毒丸ハ此ヲ以テミルニモミナコレ毒
ノ治法ハ小兒頭瘡ナトアリ喘欬シナレテツイニ喘
息トナルアリ是モ毒ナレハ又人モトヨリ喘息ノ
持病アル者年老ルニ至リテ喘モ大ニユルマリ或サ
ツハリ愈ルモノアリ是血氣ヲ衰フルニ從テ毒モ消
スル故トユ

滾痰丸

控涎丹 ニ方並在
別集

○ニ方別集ニ詳ク凡痰喘下メヨキモノハ前ノ諸方
ニ此方ヲ兼用スルハ其本方ハ症ニ隨テ用之滾痰
喘息ノ發リテアル片ニテモ不大便ナトナレハ用レ
凡全体喘息ハ下スハアヒキモノハ下ニ通スレハ容
氣益上ニセマリテ劇クナルモノハ故ニ滾痰ヲ用ル
処ハ少ナキモノハ

○滾痰丸モ常ニ用ルハ喘哮家ノ不大便スルモノニ
常ニ服セシメテ大便通スレハ餘リセワシク發ラヌ
者ハ又オコリシ片ニテモ不大便スルモノナトニハ
用テヨシ

續方

紫蘇子湯

方具脚
氣條

○此方ハ痰喘氣急ノ小便不利ノ腫シナスモノ用ル
ニシカシ凡痰喘氣急ノ日シ歷テナシリツ、クレテ
腫シナス者ハ十二九死スルモノニ其内十中ニ一人
此方ニテ救ワル、モノアルニ此方ノ腫ニハ多ク彼
水結ナルモノ中腕ニアルモノニ治シ難キモコトハ
リニシカシ面浮腫位ノ一ハ紫蘇子湯ニテ隨分救ワ
ル、者ナシ凡ソモテカテ得テ大病ニ至ルモノニ故
ニ此方ノ処ニアウハ其初ニ察メ失機ノ謗リ不明ノ

処シウクルヲナカシ而シ凡痰喘ノ腫ニナル者ニモ
ニ道アルニ青竜越婢厚朴麻黃湯ナトノ表症ノ候ア
リテ未タ經歷セサル処ニアル腫ニハ即青竜越婢厚
朴麻黃湯ノ類ニテ治スルモノニコレハムツカシキ
モノニアラス但痰喘ノナシリツ、クレテ寒熱ノ表
証ノ候モナキ場ニ至リ未ニナリテ未ハルハ難治
ノモノニ紫蘇子湯ニテモ不届モノニ此方ニ用ル妙
方アルヘキマ知リタキ者ニ又喘息ヨリノ腫氣ニナ
ルモノハ十人ハ十人ニナ死スル位ノ者ニテ最危
篤ノ症ニ

○曼佗羅菴治喘息下云

○小兒暴喘俗傳為馬脾風也大小便硬宜急下之用牛

黃奪命散后用白虎湯平之馬脾風暴喘而脹滿也在百

日內者不治醫林集要 毓春園小冊

○喘吼有熱氣聚心下者吐之而手三黃一人喉作水雞

聲者進射干麻黃無効三黃治同上

○行餘醫言喘哮門治法條曰喘家用厚朴杏子張機之
成法后之議藥者終不能出于其右桔梗紫蘇迥劣況乎
皮膠麥蘖及致泥隔之害虛喘非藥可治小兒哮喘生蛭
蟬為妙十五以內可治在成人則無所見効灸法猶不治

十一盛候短氣宜熊胆丸開通鬱窒輕者半夏枳實類可
擇用之哮人宜常薄滋味若屢飽食及先食未化重餌后
食其后必哮作

○眩暈ハ常ノ目マヒモ立クラミモコモテアルハ冒
ナトモコモリテアルハ眩暈ハ痰飲ニ多クヨル者ナ
レハ一種毒ヨリ来ルモノアリ此痰飲々毒ニヨル眩
暈ハキツトシタル眩暈ハ外ニ動悸アルニヨリテチ
ヨツクト眩暈スルモノアリコレハ枝葉ニテ其本病
ノ動悸サエ治スレハ眩暈ハ自然ニヤムモノ
○眩暈ノ所因ハ多ク水飲々稀ニ気疾ニヨル者アリ
其外毒ニヨリ或諸病中ニテ逆上スルニヨリテ眩暈
スル者コレニアレハ格別制スルニ不及程ノ

○眩暈

○眩暈ハ常ノ目マヒモ立クラミモコモテアルハ冒
ナトモコモリテアルハ眩暈ハ痰飲ニ多クヨル者ナ
レハ一種毒ヨリ来ルモノアリ此痰飲々毒ニヨル眩
暈ハキツトシタル眩暈ハ外ニ動悸アルニヨリテチ
ヨツクト眩暈スルモノアリコレハ枝葉ニテ其本病
ノ動悸サエ治スレハ眩暈ハ自然ニヤムモノ
○眩暈ノ所因ハ多ク水飲々稀ニ気疾ニヨル者アリ
其外毒ニヨリ或諸病中ニテ逆上スルニヨリテ眩暈
スル者コレニアレハ格別制スルニ不及程ノ

者ニテ是輕キモノ而シテツヨキ性ニハ其ツ制セ
子ハナラヌ者而シテ水飲ヲ制スル性ニ非ス譬ハ
芎黃湯ヲ用或不大便ナレハ朱鳳ナトシ用ルノ類ニ
○虚ノ頭眩ハ起坐ニアリ実ノ頭眩ハ起ノミアリ
茯苓桂枝白朮甘草湯 心下逆満気上衝胸起則頭眩者

茯苓 八分 桂枝 六分 朮 甘草 各四分

右四味以水一合二勺煮取六勺温服

○是ハ論ニハ起則頭眩トアレハ起坐ニ不拘ツ子
○眩運ニ博ク用ルニ此眩運ハ飲ヨリ来ル者ニ飲ヨ
リ来ル者ニハヒロク用ルニ眩運ノ方イロクアレハ

此方ハ眩運ノ總主劑ニ逆満ハナクメモ用ルニ此証

ハ勿論動悸モタカフルモノ而シテ牡蠣ナトシ用
ルニ不及モノニ此方ニテオサマルモノニ叔飲ニヨ
ル眩暈ハ苓桂朮甘ノ証ニ不限凡テ小便頻數ニナリ
テ且其タヒコトニ多ク通スルモノハ小便平生ノ人
ノ倍モ通スルモノハ右ノ如ク水気モ通スルニヨリ
テ飲ヤ眩暈ノ患モ少シニテモツレニテユルムヘキ
ニカワツタモノニテ其小便多ク通メモ頭ト役ニタ
マモノニ

○此症ハ起則頭眩スルハ大法ニ卧ノ居テモ眩暈ス

ル者ニテモ心下逆満サヘアルハ用ルハツレニテモ
不治者ハ沢浮湯ヲ用ヘシ主治ハ異ナル様ナレ氏苓
桂朮甘ト同シ其内苓桂朮甘ハ眩ニオコリサメアリ
起則頭眩是也沢浮湯ハ眩ヲナシツメルハ二方ノ別
ハ苓桂朮甘ハ頭眩休作アルハ沢浮湯ハ休作ナレコ
レニテ分カクヘシ沢浮湯ハタトニ始終眩ナクメモ
冒眩ハモノニテ面カヒツハリタリナトスル候アル
モノハレカレ苓桂朮甘ハ行住坐卧ニ不拘メヒロク

眩暈ニ用ル

真武湯

方具水腫條

心下悸頭眩身瞤動振々欲擗地者

○是ハ陰症ノ眩暈ニ用ユ又陰証ニアラスメモ身ウ
チノビククメ眩暈スル者ニ用ル

○此モ傷寒論ニアル通ノ主治ニテ尽セリコレモ水
飲ニヨルモノハ傷寒金匱ノ眩暈ノ方ハ多ハレナ水
飲ニヨルモノハ真武ノユク眩暈ハ少ナキモノハ
雜病ニモ苓桂朮甘ノ眩暈ハ沢山アリ雜病ニテ真武
ノユク眩暈ニ至ルハ餘程重キモノハ前方ハ陽位ニ
アルモノ此方ハ陰位ニアルモノ能其陰陽ヲ辨メ方
シ處スヘシ

澤浮湯

心下有支飲其人苦冒眩者

澤瀉 ニク ホニ分 右二味以水一合ニ勺煮取六勺

○是ハ苓桂ホ甘ヲ與ヘテ不治片用ハク

○苓桂ホ甘ハ頭眩ニ休作アリテ不暈片ハハツキリ

トメアルモノニ汎浮湯ハタトヒ不暈片アリニモ暈

ノ気味アリテ始終ウツトリトメ冒ノ意アルモノニ

此症ニハ必冒症アルモノニ右ノ症アラハ初メヨリ

汎浮湯ヲ用ルニ必ニモ苓桂ホ甘ヲ用テ不止処ニテ

此方ヲ用ルニアラヌ扱汎浮湯ヤ苓桂ホ甘ノ場ニテ

ツヨキ眩運ニハ眩運シツ、小便ニハヒタモノユク

モノニシヤウカチナトノ如クヒタモノユクハ眩運

ノ頭モアカラヌニ小便ニハ人ニスカリテタツモノ

ニ小便セスニ居ルハ不堪ト云モノニ而メ小便ニユ

ケハ其眩暈モユルモノニ小便ツ子ヨリハ多ク利

スルモノ是水飲ニヨル故ノ更ナルヲ以テ知ヘシ其

内ハ半夏加茯苓ナトノ眩運ニハコレヲノヲハナキモ

ノニ

五苓散 臍下有悸吐涎沫而癰眩此水也 方具略

○是ハ臍下ノ動氣ヲ目的ニ用ユ此証即苓桂甘苓ノ

証ニメ眩運ヲ並タルモノニ苓桂甘苓ト大ニ近シ此

処ヘハ全体ハ苓桂甘苓ヲ用テヨキニ

三才圖會
卷之五
雜考

○是金匱ニ云テアル主治ナレ凡臍下有悸者ナラハ
苓桂甘苓ニテヨキ此ニ舉ニハ金匱ニアル故姑ク
此ニ列举ス○此ニ臍下悸吐アル故ニ此方ヲ用ル
モノニカシ吐ノ眩運スル者ハ小半夏加茯苓五
苓ニ臍下悸凡モノ一休合点ユカヌ者ナレ凡云テア
ルヲ故從ハ子ハナラヌ

小半夏加茯苓湯 方具臍
吐條 卒吐吐心下痞膈間有水眩悸者

○是ハ眩運ノ証ニメ吐吐メ心下痞塞スルモノニ用
ル其内吐吐ハ此方ノ主ク此ノ主治ニ卒吐吐云云
トアルカナハホト此通りニテ卒ニ来ル者ニ此処ノ

主治ヲツ子ニ諳記メオクヘシ不則ハ此通ノ証急ニ
来ル者ニ逢テハ大ニ狼狽ニ大患ト意得テナカクハ
半夏加茯苓トハハ意附カヌモノニ此証ヲ諳記メオ
ル片ハ安シメ此方ヲ處ニ功ヲ取ルモノニ

○此方ハ方ニ凡ハ凡ヨク大病ヲ治スルニ此ニ心下
痞硬ナクメモ眩悸吐アルハ此方ヲ用ルニ而レ凡
吐吐スレハ多ハ心下モ痞硬スルモノニ

芎黃湯 方具臍
瘡條

○是ハ毒ニヨル者ニ用ユ此方儒門夏親ノ方ニテ治
頭目昏運方トアリ往年余弱冠ノ片儒門夏親ヲ讀ミ

小自正書

眩暈ヲ治スルニ此方ヲ用テアルシ看テ大ニ信セス
眩暈ハ如此方ニテ治セラルヘキカト疑ヒ居リシム
ブレヨリ治術ニ試ミ考ルニ眩暈ニ一種毒ヨリ来ル
モノアリテ此方其毒ヨリ眩暈ニ用ルヲ初テ悟リ
タリ又丹溪一味ノ大黃ヲ酒ニテ用テ眩暈ヲ治スル
ヲ見ヘタリ方書ナトニ引テアリコレモマハリ芎黃
湯ノユキ方ニ叔芎黃湯ノ処ニテ多ハ芎黃散ヲ兼用
スル又ハ痰ナトシ兼タルモノハ滾痰丸ヲ兼用ス
ルヲモアル又芎黃湯芎黃散ヲ兼用スルハ湯ノカシ
タスクル為ニ

朱鳳散 方在別集

○此方ハ毒ニヨル者ノニアラヌ氣疾ニテ眩暈ス
ル者ニモ兼用スルヲアリ不大便ナレハ益良假令不
大便ニアラヌメモ熱ニテモアリ或古ニ胎モアリ或
肩背ヘ凝ル処ニ用ル又芎黃湯伝ヘ凡必シモ毒ニ限
ルニアラヌメモ病ニ假リ用ルヲモアル又是モ肩
背ナトヘ凝リテツレカタメニ運スルモノ問アルモ
、又其処ニハ芎黃湯ヨキモノ○丹溪ノ大黃一味
煎ニテ眩暈ニ用ルヨリハ芎黃ヨキニ此方ノユク眩
暈ハ梅毒家及ヒ煩人帶下瘀血家ノ眩暈ナトニ用ル

ヲアリシカモ多クアルモノク於血家ノ眩運ニ朱鳳
ヲ用ルハ失笑散ト大ニ近キモノク眩運ヲ制スル処
ハ反テ失笑ナトヨリ大黃ノカハヤキモノク此方或
苓桂朮甘ヤ沢浮湯ニ兼用シタキヲアルモノク眩運
ノ治法ハ苓桂朮甘ト沢浮湯トハ半夏加茯苓トニテ
大冬ハ足ルモノク眩運ハミナ水気ニヨルモノク積
気ニヨル眩運モ多ハ水気ノナス処ニ今世ニ首ヨリ
上ノ藥伝テ市井中徃々賣藥ノ看板アリ其藥ノキク
ニ即朱鳳散ニ伝芎黄湯モ散モユク処ニ於テ別ナ
ク而シ凡芎黄ハ湯ヨリ散ノカタカヨキモノク扱

芎黄湯ノユク眩運ハ是毒上攻ノ所致ニテ毒家ニア
ルモノク沢浮湯ノ如ク眩冒スル者アルモノク芎黄
湯ヲ今本邦ニテハ毒ノ上部ニアルモノニ用ル故不
学ノ医ソレヲ本来ノ主治ト思テ居ルモノアリ芎黄
湯ハ儒門夏親ニ出テ眩運ニ用ル方ニシカレ凡庸医
ハ反テ芎黄湯ノ眩運ニ用ルヲハ不知メ居ルノ眩暈
ニハナレテ毒ノ上攻ニ用ルハ本邦ニテノ用尙ク儒
門夏親ニハ治頭目昏運トアルモ毒ノ上攻ノ眩暈ニ
而シ凡但治頭目昏運伝テハバツトシタルカキカタ

一水元作九

○飲ニヨリテ来ハ眩運ニ動気アル者ハ鉄砂丸ヲ魚
用ノヨキモノニ鉄砂丸ハ脾胃丸ノ類ニテモ何ニテ
モ鉄砂ノハル丸ナレハヨキモノニ不大便ノ者ナラ
ハ砂黄丸ニテモヨキニ砂黄丸ハ和方ニテ鉄砂大黃
ニ味等分為丸ノ方ニ又コレヲノ処ニ鉄砂ヲ棄テ滾
痰丸ヲ魚用スルヲモアルニ

○凡眩暈言乱汗多下利時々自冒者虚極不治鍼灸園
小冊

○丹溪治煩人帶下頭眩專治帶而眩自安蓋頭眩頭痛
欬嗽病之標也經曰治病必求其本同上

○有早起眩暈須臾自定日以為常者正元飲下黑錫丹

要決

○

吐

反胃

噎

膈

嘈

雜

噫

氣

吐

酸

惡

心

○吐ハ廣クサス俗ニ云ル吐キカ子ハ者モ吐

吐ヨキ又無造作ニ吐クモノニテモ吐吐吐

キ吐ト吐ト本字義ハ異ナレ凡通メ泛クサス反

胃ハセマキ辞ニテ朝ニ食ノ暮ニ吐ニ暮ニ食ノ朝ニ

吐スルモノヲ斥メ云々此シ今病者ニ徴メハ朝

食暮吐ハヨク云々モノニテナルホト如此者ノ譬ハ

朝飯ヲ喫メ収リ昼飯モ収リ夜食モ収リテソレヨリ

半時許アリテ吐キ返スモノ一日三次ノ食氏ニ其

時々ニ吐クモノニモアラス又一日三度ノ食氏ニ

時々ニ吐クモノニモアラス又一日三度ノ食氏ニ

三十四 小治

三十四 小治

ナ収ル者ニモアラスノ朝ニ食スレハ暮ニ吐シ暮ニ
食スレハ朝ニ吐スルノ勘定大ニ逢フモノニ二度ノ
三度ノ食后ニハ必吐返スモノ又不思議ナル者
ニテ其吐シナスニ夜食后ニ発スル者ハ其朝ト昼ト
喫セシ食物ハ悉ク吐カユシテ其夜食ノ食更ノ一物
ハ一向ニ吐カヌモノ又夕トハ朝ニ吐ク者ハ其朝
茶粥ナトヲ喫シタル処カ其茶粥ヲハ吐カヌ昨日
ノ昼ノ食更ト昨日ノ夜食ニクセシ物斗リシ吐クモ
ノ又アトカラ其時ニ喫セシモノハ反テ吐カヌ者ニ
カワツタモノ又反胃モ輕キモノハ一日ニ二次ノ

食モミナ収リ隔日ナトニ吐クモノモアレハ先大ニ
ハ一日ノ食ハミナ収マラヌモノ又噎ハ咽喉ノ間ニ
テ食ニムセフヲ云隔ハ胸膈ノ間ニテツカユルヲ
シ云々而レハ今世ニ膈証云モノヲ見ルニ胸膈ノ間
ニテツカユル斗ニアラスナニセハハ噎シ更テ食ニ
ムセビツキカユスモノ又タマハ但胸膈ノ間ニテ
ツマル斗リナルモアレハ多ハ噎シ更ハモノノ故ニ
噎膈ノ二字ニテ病状ヲ尽スニ膈噎云テモヨキ又収
右ノ三病ノ病目ヲ云ハ、嘔吐ハヒロキ者ニテ蛇虫
ニヨルモノアリ寒ニヨルアリ熱ニヨルアリ其它諸

病ニツイテコレアリテ大ニ口キモノノ反胃ハ口
ロキ者ニテコレニモ色々アリテ今コレヲ試ムルニ
瘀血ニヨリテ来ル者多シ又噎膈モ瘀血ニヨルモノ
多クアルケレト噎膈ナ瘀血ヨリ来リ水飲ヨリ来
ル者ハ治其所ヲ得レハ愈ルモノナレトナカニ一種
不治ノ証アリ胃脘塞アリテ不通者アリ是真ノ膈噎
ニメ不治ノ証又膈噎水飲ニヨル者ハ脈証ニ何レ水
飲ノ候ヲ見ハスモノ又瘀血ニヨルモノハ其脈証ニ
何レ瘀血ノ候ヲアラハスモノ又水飲又瘀血ノ候モ
ナクメ膈噎ヲナスモノハ是真ノ膈噎ニテ不治ノ証

又真ノ膈噎ハ一月モ二月モ不大便ノ其尿至テ硬ク
乾枯ナルモノ又瘀血ナトニヨル膈噎ニモ不大便
ヲナスモアレト其當坐限リニテ真ノ膈噎ノ如ク一
月モ二月モ不大便スル辰ヲナキモノ又タトテ瘀
血又水飲ヨリ来リタル者ニテモ一月モ二月モ不大
便メ結糞乾枯スルニ至テハ不治者又是其モトハ瘀
血又水飲ヨリ来リタルモノ如ク結糞ヲナスニ至
テハコレ内気耗散津液枯竭スル者ヲ真ノ膈噎トナ
リタルモノ又故ニ不治トス膈噎五六月ハモツモノ
ニテ大抵ハ七月目ニ死スル者又長クモツモノハハ

月位ニテ歿スルモアレ氏大吟ハ七月ノニ歿スルモ
ノ又反胃吐水癖囊ノ病ニテ吐水癖囊ハ腹痛ハハ
ナレヌモノニ吐水ノ証ナトハミナ久腹痛ヨリメ吐
水ヲナスモノニ噎ニ初メヨリ吐水ヲナスモノナキ
又反胃ハ腹痛ハナキモノ多クアル

○嘔吐ハ總名ニ反胃ハ嘔吐中ノ一曲証ニ膈噎ハ嘔
吐トハ別ノ者ニ膈噎ハ嘔吐ニヨリテツキカエス者
ニアラス噎スルニヨリテツキカエスモノニ而レ氏
コレ反胃ニ近キモノ故反胃ト噎膈ト一処ニメ並ヘ
挙テアリ諸方書ニモ多ハ反胃噎膈ハ一処ニメアル

又反胃モ亦ツマルモノニカレ氏反胃ハ嘔吐ヲ主
ニメツマルヲ客トスル又噎ト膈トハコマカニワ
クレハ噎ハ咽喉ノ間ニテツキ返スヲ云膈ハ心胸ノ
間迄ユキテツキ返スヲ云而レ氏コレハワクルニ
不及モノニ噎アル者ハ膈アリ膈アル者ハ噎アル
○金匱朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化者曰胃反トアリ
実ニ正名ニ胃反ハ朝食暮吐ニ根地者ニ癖囊ハ四五
日ニ三日ノニ吐スルモノニ輕者ハ十日モ十五日モ
経テ吐スルアリ又甚キハ二三日モ吐キツケル
モアリカレ氏癖囊モ治法ニ取テハ胃反ニ属メス

ルル而レ氏小異アリ癖囊ハ腹痛アリ胃反ニハコレ
ナレ胃反伝ハ古名ニ反胃ハ後世ニテノ名ニ癖囊ハ
吐スルニツケテ煩ユルモノク吐シニクカルモノク
胃反ハ吐スルニコ、ロヤスクメ煩ナレ今世真ノ胃
反少ナレ多クハ癖囊ノ類ニ癖囊ハ腹痛ナケレハ云
レヌ程ノフク胃反ハ少ナク癖囊ハ世ニ多クアリ癖
囊ハ吐ケハ少シノ間決ヨキモノク但ウワ水ノミ吐
クモノク若此ニ痛ナクメ吐ク者ハ吐水伝テ佳ク胃
反マ吐水ニモ癖囊ノ如ク水結リモヤウアルモノク
而レ氏癖囊ノ如ク甚シカラヌ又胃反ハ水穀俱ニ吐

メ食シオモニ吐スルノ癖囊ハ水ヲガモニ吐スルノ
胃反モ尤シ下ニメ卧セハ左ノ方ハ腹カユトクサカ
ル様ニナルモノク右ニ卧メハ右ヘ下カル様ナルモ
ノク又胃反ニ塊ナキモアリ又胃反ト膈噎ト紛ル
ヲアリ意ヲ注ヘシ水飲ニヨリテ噎膈ノ状ニ似タル
アリテ食ニムセシ痛ハアリ是真ノ膈噎ノ枯燥スル
カ如キ者ニハアラサルムセフハ噎膈ニ胃反ハム
セフヲナク一旦腹中ヘ入テ吐返スモノノ前ニ云水
飲ノ膈噎ハ俗ニ痰膈伝コレノ膈ハ腹痛ナレ
○胃反ハ何レノ場ニテモ腹満ナトハ随分アル者ク

三才圖會
卷之八
雜考

○急吐反吐起リテ不日ニメ歿スルモノアリ儒門
支親トヤラニアリ伝未審訂

○膈噎ハ胃反ヨリハ難治ハ胃反ハマ、イエルモノ
ハ膈噎ハ真ノ膈噎ニアラスメモ多ハ不治ノ証アリ
又腹痛アル胃反ハ胃反ノ変ナルモノハ真ノ胃反ニ
アラス伝テモヨキホトノヲク

○膈噎ハ凡七月許ニメ歿スル者ハ四五ヶ月メニハ
腹中ノ塊悉ク分明ニ分ルモノハ手ニテ探リミルニ
実ニ洞視スルカ如キモノハ疝ノ横骨ニツキテ核ニ
三黒々タル者ノ如キツ子ニ知シ難キモノナレ氏此

片ハヨク分ルモノク

香月牛山小兒
養育草ニ云
惡心トハハチ心
持アキリ云ガ
レントヨムハ誤
アクシントヨムハ

○膈噎ノ腹ニアル塊岩嶺ノ如クナルモノハ肌表ニ
壓々トミユルニ至テハ難治ハ又膈噎ノ燥失アル者
ハ難治也右ノ二候揃フテアルハ必歿ハ一病人噎膈

ニメ食ハ止メハ即吐シ且燥屎アリ如此ナルモノハ
惡証ナレ氏腹氣未タ甚キ虚極ニ至ラス因テ大半
復湯ヲ與ルニ用ヒ日ヨリ食收リタリ

小半復湯 吐吐穀不得下者

半復 生姜 各ニ錢四分

右二味以水ニ合煮取五勺溫服

三才圖會
卷之八
雜考

○是其病因ヲ不論ノ總テノ嘔吐ニ用ル總司主劑ニ
小羊復加茯苓湯

羊復 生姜 各一匙 六分 茯苓 六分 右三味以水一合

四勺煮取三勺今以二合八勺煮取六勺

○コレモ小羊復湯ト同ノ病因ヲ不論メ用ルニ水気
ニヨル者ナレハ益ヨケレト水飲ニヨラスメモヒロ
ク嘔吐ニ用ルトメヨキク此ニ方ニ用尙アリ小羊復
ヤ加茯苓ハ心下ノ痞硬ヲ目的ニメ用テヨキ者ニ此
用尙ハ外臺大羊復湯ニ証ニ痞硬ヲ云テアル故小羊
復ニモ痞硬アルヘシト考付テ此ヲ治術試ムルニ心

下痞硬スル者果メ益効アリシカレ小羊復モ小羊復
加茯苓モ痞硬ナクメモ用レト如此目的ノキツカケア
レハ其方ヲ用ルニ大ニ用ヒヨキモノニ

○小羊復加茯苓ハ眩悸ヲ必トヒヌ小羊復ヲマリテ
モ不止者ハ小羊復加茯苓ヲ用ヒ小羊復加茯苓ヲ用テモ
不止者ハ大羊復湯ヲ用ルニ此ラハ別目的ナレト大小
柴胡ノ例ニテ輕重通用スヘシ古人モ此ラノ別ハ不
分者トシテ金匱ノ小羊復ノ証ヲ千金ニハ小羊復
加茯苓ニテアリ何レモ水飲ノナス処ノ者ニ故ニ金
匱ニモ痰飲門ニノセテアリ

○小羊复湯モ加茯苓湯モ分テ云ハ、痰飲ニヨリテ
嘔吐スル者トミユレ其原ヲ探ルニ不及ノ何ニモ
セヨ食不下者ハ此方ノ主トル処トナレバ方キテ嘔家
ノ聖藥トヒロク見テオクヘシ小羊复モ加茯苓モ温
服トアレバ少シ冷ノ用ルカヨキ冷マノ用レハ嘔
家ノウケ安排ヨキモノシ小羊复ト加茯苓湯ト大ニ
異ナルヲナシ先嘔吐アラハ小羊复ニテユキテミル
ヘシ嘔吐ノ片ハ少シシ片藥味ノ少ナキカヨキ加
茯苓水飲ニテモアル片用ル

○嘔吐小羊复加茯苓トシマリテモ効ナキ片ハ伏竜

肝シマルシ伏竜肝シマリテモ効ナキ処ハ陰陽水ヲ
ヤルシ此片ハ飲シハナレテ嘔吐ヲ專ニスル仕方シ
陰陽水ハ新汲水極滾湯ニ味等分ニスルハ陰陽水ハ
ヤハリ嘔吐ヲ治スル者シ

大半复湯 胃反嘔者 外臺曰治嘔
心下痞硬者

半复 一錢
六分 人參 三分 蜜 五錢

右一味以水二合二勺和蜜煮取二勺半

○是ハ金匱ニハ胃反嘔者トアレバコレハ反テ外臺
ノ主治カヨキハ外臺ニヨレハ泛ク用ラレ金匱ニテ
ハ狭クナリテアレシ、此方ハ前ノ小羊复マ加茯苓ニテ

効ナキ者ハ用テヨキク勿論胃ニハ聖藥ニテコレホ
トキクモノハナシ此人參ハ直根ヤ竹節ヲ用ル此
方胃反ニハヨク効アル方ニテ假令再発メモ一旦ハ
是非功アル藥ニ又余カ用竟ニ此方膈噎ニ用テ大効
アリ膈噎ニモ假令再発メモ一旦ハヨクキク藥ニ扱
ハレコニハ本分量ノ通リヲ奉タレ氏此方ノ如クニ蜜
ヲ入レテハノミエヌモノニ蜜ヲ半減程ニスヘシ五
錢メナレハニ錢メ五分ニスルニ

○是ハ上ノ小羊夏ヤ加茯苓ニテ不治者ニ用ルカ正面
ニ又此方胃反ニ用ユ小羊夏ヤ加茯苓ニテハ胃反ハ不

羊夏治大羊夏ニテハ治セラルハ是其別ニシカレ氏

此方ヲ胃反ノ藥トスルニアラスヤハリ外臺ニアル
主治從テ大羊夏ヲ嘔吐ニヒロク用ル藥ニノ反胃ニ
用ル、用竟法ホトニメニルヘシ反胃ノ藥トナシテ
ハセマウメアリ、

生姜半夏湯 胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦微心中憤
々然無奈者

羊夏 三錢 姜汁

右二味以水一合二勺煮羊夏取

八勺内姜汁四勺煮取六勺

○嘔吐ノ証ニ一種ホンマノ嘔吐テモナクシマクリ

テモナク但ギテくメ心中懊懐スル者アリソノ処へ
此ヲ用ル方ハ小羊復ト同クノ但煎法ノ異ナルノミ
○嘔吐ヤラ噦ヤラ一処ニナリシ法様ナル病人アル
モノ其処ニヨシ喘ヲ煎テモヨシ此場ハ小羊復片
大羊復片付ラレヌ処ニヨキ○大病中ナトニ嘔
モ噦モ痰モ一処ニナリシヤウナルモノアル其片
用ル此方ノ姜汁ハアトヨリ入レテ火ニカケテ温
メ用ル生姜汁ヲ用タル処ヘツ子ノ生姜ヲ入レ煎
シ用テハ大ニ効劣ハモノ
羊復心湯 嘔而腸鳴心下痞者 方具癥
症條

○是ハ勿論腸鳴モ目的ナレ片心下ノ痞硬カガモノ
目的ニ嘔而心下痞トアレハ大小羊復ト混スル様ナ
レ片大小羊復ハ痞硬輕ク羊浮ハ心下ノ痞硬ツカ
痞硬ツヨキ者ハ腸鳴ナクメモ用ル又生姜浮心ニ
不限羊浮ニモ下利ヲ煎ルモノアル
○コレモ小羊復ナト、同ク心下痞硬ナレ片コレニ
ハ腸鳴アリ又此ハ云テナケレ片下利ナト煎ル
片ハマスくヨシ腸鳴下利ナトアレハ羊浮ニテヨキ
モノ心下痞斗リナレハ小羊復ヤ加茯苓ニテモヨケ
レ片腸鳴ヤ下利ナトアリテハ小羊復ナトニテ安テ

モ居ラレヌ○是ハ腸鳴カナケ子ハナラヌ不尔
中ハ大半夏ト混スル此ニ舉スハ主治ハ千金ニア
ルモノ

生姜泻心湯 心下痞硬噫食臭腹下有水気腹中雷鳴下
利者

生姜 八分 半夏 九分 黄連 乾姜 各一分 黄芩 人参

甘草 大麥 各六分 右八味以水二合煮取一合二勺去

滓再煎取六勺

○是ハ半夏泻心ト同証ニメ噫気ヲ目的ニ用ル方ニ
シカシ此ヲハ一通リノ嘔吐ノ藥ニテ反胃ヤ膈噎ニ

用ル藥ニアラス反胃ヤ膈噎ニ用テアシキヲハナケ

レ凡キカナモノニ故ニ半夏ヤ生姜泻心ナトハ通例
ノ嘔吐ノ藥ト知ルヘシ

○是ハ食臭ナリメモヒロク用レ凡規則ヲ立シハ食

臭カ目的ノ嘔吐ニ一種食臭ノ者アルニカシ食臭

ナリメモ半夏ノ嘔ニ生姜泻心ノユクヲモアル者ニ

旋覆花代赭石湯 心下痞硬噫気不除者

旋覆花 六分 人参 四分 生姜 一钱 半夏 一分 代赭石 二分

大枣 甘草 各六分

右七味以水二合煮取一合四勺去滓再煎取一合

○是ハ生姜浮心ヲ與テモ噫氣ノ不止者ニ用ユ此方
ハ反テ反胃ヤ或俗ニ痰膈云テ留飲ニテ食ムセヒ或
ツマリスルモノアリ其症ニ用テガリニ効アルモノ
ハ浮心ナトハ大分味ノ異ル方ニコ、ハ生姜浮心ヤ
半浮ナトシヤリテモナカク不及モノ又此方小兒
ノ吐乳不止者ニモ用ユ

○是ニ噫氣不除トアレハ嘔吐ニモヨキハ半浮ヤ生
姜浮心ヲ用テモ愈サル噫ヤ嘔ニ用ルハ大法又此
方一治アリ 反胃ヤ膈噎ノ水飲ニヨリテナル者ニ
用ユ俗ニ云痰膈是ハ水飲ニヨリテ噎ヲナス者アリ

小青竜條ニ或噎トアル如キミナ水飲ニヨリテ噎ス
ル者ハ此ト同例ニ此方ヲ反胃ヤ辟囊ニ用ルハヤハ
リ痞硬カ目的ハ半浮ヤ生姜浮心モ反胃ニモ用レハ
アマリ効ナキモノハ此方ハ一ツケケ挫ケタル処ノ
方故用テ効アル者トニユ此方其処ニテハ大羊夏湯
トマキレハヤウナレハ此方ハ大羊夏ヨリハ水飲多
クアルハ又此方ヲ用ルハ硝石大圓ナトヲ用ルヲア
リ兼用スルハ

小柴胡湯 嘔而發熱者

○是ヲ嘔吐ニ用ルハ主治ニアル通り嘔而發熱者ニ

用ハハ正面ニシカレ氏此ニ一ノ試効アリ若癸熱ナ
ク氏柴胡ノ腹候ノアル者ナラハマハリ柴胡ヲ用
ツヨキハ大柴胡ヲ用ユコレハ常ニ試ミテ常ニ効ア
ルノ方々近未又治驗アリ小兒ノ吐乳ニ小羊復或柴
芩連湯ヲ用レ氏荏苒トメ不愈モノアリ能ク其腹ヲ
診スルニ胸肋膨脹セリ因テ小柴胡ヲ用ヒ即効ヲ得
タル者二人迄アリ又一兒前証ニメ不大便腹微滿セ
ルニ大柴胡ヲ用テコレモ即効ヲ得タル者一人アリ
今年右ノ三人治驗アリテ即効ヲ得タリ

大柴胡湯

以上ニ方並
具癥症條

○上ノ小柴胡ト参考ノ用

○大小柴胡ノニ方ノ証ハ傷寒論ニ尽メアリ反胃膈
噎ニ至テハ此方ニテナシラヌ者ニ但シ腹ニ柴胡ノ
候アレハ一兩日モ柴胡ヲ用テアトニテ反胃噎膈ヲ
制スルニ嘔吐ハ此方ニテ治スルモノ又小兒吐乳
熱アリテ見ツメニテモ未ハヘキカト思フ処ニ小柴
胡ニテユルメ子ハナラヌアリ

者

吳茱萸湯 食穀欲嘔者○乾嘔吐涎沫頭痛者○嘔而胸滿

吳茱萸 一錢

人參 六分

生姜 一錢

二錢

大棗 六分

右四味以水一合四勺煮取六勺

○是ヲ嘔吐ニ用ルハ外格別治驗用竟ナキハ食穀欲
嘔者ヤ嘔而胸滿スル者ナトニ用ヒ又乾嘔吐涎沫頭
痛スル者ナトニ用ルハ主治ノ通りノ持病ノ頭痛ニ
テモ新タニ發セシ頭痛ニテモ嘔吐ノアル頭痛ナレ
ハ此方ヲ用テヨキモノハ其頭痛ヲ治術ニカケテ試
ルニ多ハ過食スルカ或夜食ヲ食ヒスコメ直ニ寐タ
ルアトニテ發スルモノハ凡テ吳茱湯ヲ用ルニハ胸
ノイレルハ用レハヨクキクモノハ故ニ千金吳茱
萸湯ニモ心膈煩滿ノ字アルハ余ハ脈ニモ腹ニモ不

拘ノ胸ノイレルハ嘔吐ニハキツカケヨリ此方ヲ用
ルハ又此方頭痛嘔吐ナクモ但心膈煩テ胸ノイレ
ルハ証ノミニモ用ルハ

此方論ニアルハ此ニヤルハ勿論ニ又コノ方噎氣吞酸
ヲ治ス千金ニ此吳茱萸湯ヲ引テ治噎酢咽方トアリ
是ハ又此方三五年ノ久腹痛ニテ黃水或穀食ヲ吐ス
ル者ニ用ユヨク効アルハ又此ニ反對スル者アリ甘
草粉蜜湯ノユクハ是ハ腹氣濡弱也吳茱萸湯ハ
心下痞或硬モアルハ是其別ニイツレ久腹痛ニテ嘔
吐スルハユクハ但久腹痛ノミナレハ此方ハ

不用之全体此方與ニ誤テ甘草粉蜜湯ヲ脱メアリ千金吳茱萸湯ノ次キニ甘草粉蜜湯ヲ挙テ而メ甘草乾姜湯ヘウツルヘシ

○大半復小半復ノ二方ハ常ニ嘔スルニコレハ食スレハ嘔スルニ又吳茱萸湯ハ嘈雜ノアル嘔吐ニヨキニ是用蒼朮胸ノイレル嘔吐アルモノニ千金ノ吳茱萸湯ト此方ト大ニ異ナルヲナシ千金ニハ傷寒論ノ吳茱萸湯ヲ出メ治噫酢咽トノミアリ酢咽ハ后ノ吐酢吞酸ニ

千金吳茱萸湯

方具痰飲條

○是ハモト噫氣ト吞酸トヲ治スル藥ニ吞酸ハ俗ニスイガクヒ云々噫氣ハツ子ノガクヒ云々而メ此方ヲ嘔吐ニ通フテ用ルヲモアルニ又近比治驗アリ凡反胃癖囊ノ嘈雜ノツヨキ者ニヨク効アリ腹痛モヤミ嘔吐モ治スルモノニコレ近比ノ仕療ニ

○是ハ傷寒論ノ吳茱萸湯ニテモガセルケレ氏桂枝半復入テアル故大ニ用テヨキヲアリ此方ハ心嘈煩滿トアリテ胸ノイレル片ナトヨキモノニコレモ傷寒論ノ吳茱萸湯ニテ推セハ推サレルケレ氏傷寒論ノ方ハ至テノミニクキモノニテ嘔吐マ頭痛ナトノアル

処ニテハ、ミミクキ藥モノナレハ心憎煩満ナト

ハ、処ニテハ、ミミクキ藥ハ病人ノミエヌ者ノ其片
ナトハ、ワケテ千金ノ方、ミ用モ故ニヨキモノミ

○行餘医言噫附子酸吞酸底門治法余曰煩噫煩底在
平日飲食將息而可噫醋及腐吞酸皆灸為上若能胆凡
子亦佳

甘草乾姜湯

方具肺痿條

煩躁吐逆者

○是ハ吐逆ノ証ニテ煩躁ノアル者ナレハ勿論アタ
リ前々此ニ又煩躁ヲハナレテ煩燥ヲ目的ニセスメ
吐逆ナリ用ルコアリ其症ハ浮心湯ヲ具米湯ノ類ノ

苦味ノ方ヲ用テモ反テ激メ吐益ツヨクハナレハ
治マラヌ者アリ其片此方ヲ用レハ甘味ノ物ニテ
大ニユルミ効ヲ得ルコアリ

○甘草粉蜜湯ハ一種其症アレハ此ノ甘草干姜湯ハ
苦味ニテユカヌ吐ニ用ルアナカテ煩躁ニ不拘ニ甘
草干姜ハ吐ノミ反胃膈噎ニハユカヌ凡吐吐
ノ証ニ苦味ヲマリテユカヌ片ハ此方ヲマリテ甘味
ニテユルメテヨキコアリ○叔コノ甘草干姜湯ノ前
ニ全体ハ甘草粉蜜湯シノスヘキコノ甘草粉蜜ハ久
腹痛ニテ吐吐不止其腹ヲ按スニ濡弱或水氣ナトア

リテタトヘハ附子粳米湯ノ腹シオス様ナル腹ノコ
レハ畢竟久病ニテ冒氣ノ甲斐ナキニヨルニ其症ニ
甘草粉蜜ヲ用ルハ大ニ効アルモノニ若病ノ肯綮
ニアタルハ片ハ身体手足ニ少シウキカ出テ来ルニ此
片ニアタリテ利水ノ藥ヲ不用メ益前方ヲ連進スル
ニ尋テ水氣モ去テ全愈ルモノニコレ金匱モナキ言
ニメ吾黨屢試屢効アリウキカ不来ノ治スル者モア
レ氏ウキノ不来メ治スルハ根治セヌメ再發シ或テ
キハキトセヌ者ニウキノ来ルモノハ根治スル者ニ
猪苓散 嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者

猪苓

茯苓 白朮

各等分

右三味為散飲服方寸匕日三服○藻曰婦人擇食治方雖
多不如用此方之妙也亦治產後嘔逆此予所屢試也

○是ハ下ニアル茯苓沢浮湯ノ類方ニメ嘔吐ニ渴シ
兼タル者ニ用ルニ五苓散モ此一類ノ藥ニコレニ又
一治驗アリ余ハ此方ヲ惡阻ニ用ユ叔惡阻ノ証伝者
ハ治方ノ多キモノナレ氏猪苓散ホトキク者ハ它ニ
アマリナキニ此方ハ至極ウケアンハイヨキモノニ
此方ヲ惡阻ニ用ルハ渴不渴ヲ不問メ用ルニ又産
后ニ嘔逆シナス者アルニコレニモ此方ヨク効アリ

此モ渴ニハ不拘又傷寒論々金匱ニハ云テサケシ
氏此方々茯苓沢泻湯五苓散ハ多ハ小便不利スルモ
ノハカシナカニハ小便不利セヌ者モアル

○是ハ惡阻ノ症ニリ用テ雜病ノ嘔吐ハ余ハアマ
リ不用之而シ氏雜病ニテモ其症ニ逢フタラハ用ヘ
キ

五苓散

方具
唱條

渴欲飲水々入則吐者名曰水逆

○一通リ水逆ニリ用ル

茯苓澤泻湯

胃反吐而渴欲飲水者

茯苓

二錢

澤泻

六分

甘草

桂枝

各三分

加

羊

生姜

六分

右六味以水ニ合四勺煮五味取ハ勺内沢泻更煮取六勺

○是ハ胃反ノ藥ナレ氏平日ノ嘔吐テモ渴欲飲水者

ニハ用ル之此方ハ反胃ナトニハトウカ用ニクサウ

ナル方ナレ氏思ノ外ヨクキクモノ之此方反胃ノ渴

アルニ用レ氏渴ナクメモ水飲ニヨル嘔吐ノ症ニハ

隨分キクモノ

○以上ノ猪苓散五苓散茯苓沢泻湯ノ三方何レモ近

キ藥ニテ少シツ、ノ違ヒ之嘔吐ニ一撞利水メ治ス

ル者アリ叔前ノ猪苓散ハ惡阻ニ用覺タリ凡惡阻ハ

小羊復加茯苓ニテモウケ入レヌ者ニテモ猪苓散ハ叔

ルモノ之至テ重キ者ハ此方ニテ一旦収リテモ復再
発スルモノ之再発シタル件ハ此猪苓散ニテハキカ
メ者ナレ氏大氏七八分近ハ此方ニテ最初ニ治マリ
テソレキリニテ不発者之又茯苓沢泻湯ハ二日ニ一
度乎三日ニ一度乎吐スル者之吐ハケレキ者ハ茯苓
沢泻湯ノ症ニテモ五苓シ与ル之胃反ニモ朝食
暮吐スル者モアリ或五日ニ一吐十日ニ一吐ノ者ア
リコレハ輕キモノ之前ニ云利水ノヨキトハ別ニ水
気ノ候ナク氏アタリ前ノ治方ヲ尽メモ効シ不得者
ハ利水ノヨキアリ大羊復ハ心下痞硬メ渴ナレ右ノ

方ナトハ心下痞硬ニ不及メ渴アリ心下痞硬メ渴
アリ氏大羊復之レカレ氏渴ハケレキ件ハ心下痞硬
アリテモ羊復ハ用テトモナキヲ○吐水ニ茯苓沢
泻湯効アリ此症多クアルモノ之五苓ノユク処モア
リ凡テ吐水ハ水道ハ導ク件ハ治スルトニユ惡阻ナ
トニテ一向水飲ノ候ナケレ氏水飲ヲ導テイユルア
リ又傷寒論ニモ嘔ニ水飲ヲ導キアリ少陰篇猪苓湯
ニ欬嘔云アリ此ヲニテ推知ヘレ一病人嘔アリ浮心
ノ類ニテ効ナク五苓ニテ治シタルアリ

大黃甘草湯 食止即吐者 外臺治吐水

大黃^{一分} 甘草^{三分}

右二味以水一合八勺煮取六勺

○此方ハ即吐伝ヲ目的ニ用ル此証ハ朝食暮吐
ニテハナク食フト直キニ吐スル者ニ用ユ又外臺ニ
ハ治吐水トアルニヨリテ吐水ノ不大便スル者ニコ
レヲ用テミルニコシ迄終ニ功ヲ見ヌ

○此方外臺ニモアル通り吐水不大便ノ者或腹シオ
スニ胃中ニ何カ凝滯ナル吐水ニ用ユシカレ此方
ハスツハリトシタル藥ナレ氏自己ニモ試ミ且先輩
ノハナレヲキクニアマリ効ナキモノニ○此方膈ニ
モ反胃ニモ用テミタル此方未タミツカリト効

シエヌ効アリソフナル藥ニテ効ヲミヌ此方
ノ場ハ主治ニモアル通ノ朝食暮吐ニテハナクノ食
止即吐者ニ用ユ又食ニムセフニモ用ユ膈ノ症ニ多
ク不大便ノ者アリ幸ニ此方アリト思フテ用テミル
ニサシタル効ナキニカレ氏今食止即吐ノ症アレ
ハ此方ヲ用ルヨリ外ニヨキ方モナキニ食止即吐ハ
朝食暮吐ノ一等急ナルモノニ○大黃甘草湯真ノ胃
反伝ニ不至メモ嘔吐ノ不大便スルニ此方ヲ用テ
用ユ此方丸トナセハ用テヨク兼用ニモミヨキニ此
方ヲ丸トナシテ不大便メ吐食スルニ用ルハ尾池平

作ノ傳ニ尾池平作ハ讀列九龜度ノ儒生ナリコカ后
ニハ儒医トナリテ医業シタリシ人々大黃甘草丸
茯苓沢泻湯ヲトニ原用スルヲモアル又茯苓沢泻
湯ハ吐水ニモ吐食ニモ用ル

甘遂半复湯 方具痰飲條

○コレハモト嘔吐ノ藥ニアラサレ氏假用テ吐水ヤ
或ハ澀囊ノ類ニ用ユ

○此方吐水反胃ニ心下堅滿ノ者ニ用ル此方モ
ト水飲ニテ心下ノ堅滿スルニ用ルニヨリテ活用メ
俗ニ云吐水痰隔ノ証ニ用ルコレハ心下堅滿カナ

ケレハ用ヒラレヌ水腫ニ此方ヲ假リ用ルモ上ニ
ハリナル者ニ用ユ

附子粳米湯 方具腹痛條

○是ハ金匱ノ主治ニ尽メアリ外ニ治驗ナシ凡吳茱
萸湯ト附子粳米湯ノ類ハユク処ハチカヘ氏其因シ
云ハハ皆水飲ヨリ来ル嘔吐トシユ

○半复浮心ハ雷鳴カ目的ニ此方ハ雷鳴切痛嘔吐ノ
三症カ揃ワ子ハ不用也此方ヲ飲ニ用ルモ疝ニモ用
ルニモミナル

真武湯 方具水腫條

○是ハ腹痛ノ嘔吐スルモノコレモヨク来ル処ハ
水飲トミユルニソレ故反胃瀦囊吐水ノ類最初ハ陽
症ナレ氏后ニナレハミナ陰位ニヲテテ真武ノ証ニ
ナリテ来ルモノ

○嘔吐反胃ノ類脈弱ヲ腹濡諸症陰位ニナル者ニ用
ユ○患水氣目的ニコレハ甘遂半復湯ヤ滾痰ナトシ
用ルノウラニ此方反胃瀦囊ニモ用ユ其証腹濡弱脈
カナク或沉細モアリ又或搏擊ノ緊ノ象ヲ見ハスア
リ凡テ搏擊ノ脈云テアマリ証ト不相應ニ丈夫ナル
者ハ虚候ニ沉微細ハ附子ノユクヘキツ子ノ脈ナレ

氏又丈夫ナル様ニミユル脈モアルモノニカニ其
丈夫ナル様シ脈ニミエテモツ子ノ丈夫ナル脈トハ
子カウモノニ是即搏擊也

四逆湯 嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治

方具傷食條

○是ハ凡真武ノ証ニメ脈甚微弱或手足ノ冷ル者ニ
用ユ勿論真武ニモ四逆ニモ惡寒ハアル者ニ

○コレハ諸病ノ四逆ノ証アリテ嘔吐ノアル者ニ用
ルニ今云ハ、霍乱中ヤ傷食ノ脱証ニヨクアルモノ
ニ此方ヲ嘔吐ニ用ルハ甘草乾姜湯ニ附子ヲ加ヘタ
ルヤウナル意ニ此証吳茱萸湯ト混スル者ニナレ氏

四逆ハ多ク下利ナトツフ者ニ

安中散 弓方 治遠年日近脾疼反胃口吐酸水

甘草 十兩 縮砂 延胡 良姜 乾姜 茴香 桂枝 各五兩

牡蠣 四兩 右七味為末每二錢熱酒調下煩人淡醋湯或

鹽湯

瀉囊久ク不愈
メ右ニ朝草ノリ
シトキニ正ウノ
紫黒汁ニ吐スル
者アリ如此モノヲ
吐スルニ至ルモノハ
活路ニシモムク
ハナキモノ

○是モ反胃瀉囊吐水ニ用ユツレヨリ活用メ水飲ヨ

リ来ル嘔吐ヤ或疝ヨリ来ル嘔吐ニヒロク用ル此

ノ主治ニモアル通り此方スヘテ旧近新古シ不問メ

用ルニ安中散ハ余ハ湯ニメ用シ氏法ノ如ク散ニメ

用テヨキ方ニシカシ酒ヤ酢ニテ用テアレ氏コレハ

白湯ニテ用テモヨカルヘキ

○此方所謂瀉囊ニ用ユツレヨリ假用テ留飲家ノ心

腹痛ニ用ルニ其効多シ○此方痛ニカ目的ニ此嘔吐

アレハ瀉囊病ニ此方ヲ用テ大ニ藥煩ヲナシテ効シ

得ルアリ一病人アリ所云瀉囊病ニテ諸医ノ手ヲ

經テ愈ス治シ余ニ請フ余子ルニ安中散ヲ以テセシ

カツレヨリ一兩日ノ間大ニ嘔吐ハケニクナリテ水

ヲ吐スルヲイヨク重ク且腹痛ニキリニツヨクナリ

タリニナヤミヲツヨクナリニハ藥ノヨク肯瘥ニ中

リニ故トミユ此方ノ良医シナスモノ心得居ヘキ

ハハルクスルト狼狽ノ或方ヲ轉シナトスルハ卒
ニ効ヲ得ルヲナキニ能ク其脈症ヲ斷メ既ニ方ヲ處
シタル上ハ少シ變アリテモ駭ノカマフヲ要スルニ
特リ安中散ノミナラス百九ノ方ミナフル○瀝囊一
ニ窠囊ト云此ハ孟子ニ水ノ穴ニ滿テ右它ニ溢ル、
義ニテ名ケルモノニ外ヨリ知シヌヲナレト腹中ニ
穴アリテソレニ一杯水飲カ滿テ外ニ溢ル、ト義ニ
瀝囊ト同シトニ此目的ノ証ハ先腹痛吐水也此一証
ハナハ、ナナシ原証ハ不食ヲ過食ニ或發熱ニ或惡
寒ニ或胸中嘈雜スルニ動氣ハ必添フ者ナレト動悸

ヲ瀝囊ノ定証目的トハセラレヌ者ニ吐水ノ輕キハ
虫ツノハシルトホトナル者ニテ重キハ飲食ト吐
スル者ニ飲食モ一旦ハ是非収マル者ナレト推付吐
スル者ニ又腹侯ハ十中ノ六ハ塊物モ不移モノナレ
ト十中ノ四ハ所謂囊ニ鼠ヲ入レタル如ク彼此ト移
リ轉メ按シエラレヌ者ニ其塊物モツ子ノ如ク硬キ
者ニアラス軟ニノ一種別ノ者ニ其塊物ノ所在モ少
腹ニハナシ大腹ニアリテ或左或右定位ナキモノニ
是甚キニ至テハ歿スル者ニ歿スルモ別ニ定証ノ如
クト云ニアラス但不食羸瘦ノ歿スル者ニ其内多ハ過

食シタナル者ニ過食スル者ナラハホ一合ヲ粥ニ
メ一日ノ食分トシ此ヲ禁スルニ治方ハ輕重氏ニ安
中散ニテヨキニ是瀉囊ノ聖藥ト云ヘシ本方ニ瀉囊
ノ治法アリ蒼朮丸トテ蒼朮一味ノ方ナレ氏効ナ
シ其它茯苓芩湯大黃甘遂湯大羊復湯ナトシ用タ
レ氏一向ニ効ナシ瀉囊之目今世本方シ本源ノ如
クニ思ヒ居レ氏千金ニ其名アリシカレ氏瀉囊ノ治
法トテ千金ニ別ナシ○瀉囊第一ノ目的ハ腹シト
クト按メ居ル中ニムクムト起ルノ妊娠ノ腹シ候フ
中胎動ノアル如キモノニ此症它ノ水氣ニハ一向ナ

キ者右ノビククカコリテ来ルモノアラハ它ノ証ト
脈トシ不待メ瀉囊ト決メヨキホトノモノニ瀉囊ハ
甘物ヲ忌ムヘシ瀉囊ノ塊ハアマリニ不硬メ鞠ヲ按
ス如ク安排ニテ按メ居ル内ニモ出沒スルヲアリ時
ニヨリテハムクムト高クナルヲアルモノニ○瀉囊
ト胃反トノ別ハ瀉囊ハ吐水カ主ニナリテ吐食ヲ兼
ルモノニ而メナニ八九ハ腹痛ナキ者ニ且場トリメ
アレ氏ムクムニタルヲナシ若ムクムニタル者アル
中ハ吐食ニテモ瀉囊トスルニナレ氏ムクムメアル
中ハ必吐水スルモノニ是其別也○瀉囊ハ出沒動止

一向分ラヌモノ之或心下或腹下或肚腹或臍上ナト
ニアリテ不一樣者之大小モ亦一樣ナラヌ者之故ニ
辟囊ノ腹ハ腹侯圖説ニモ不載之○辟囊ハ腹一杯ニ
ナルアリ又徑リ一寸許ナルアリ此ヲカセハ外ヘコ
ケルモノ之心下ニアルモアリ腹下ニアルモアリ少
腹ニアル者ハナキ之○當飯四逆湯必読此方宝鑑ニ
モアリ方彙ノ疝門ニ出テアリ余ハ川練ナキ片ハ良
姜ヲ以テ代藥トス川練ハ疝ノ藥之良姜モ疝ハ辟囊
ニ用ユ此方生姜泻心附子粳米湯柴胡ノ間ニアル方
之此方余ハ安中散ヲヤリテ効ナキ処ヘヤル之カ

此方ノユク者ハ左ニツキ安中散ハ右ニツク之ナ
レ凡安中ハ左右ヲ不分メ用ユ此方ハ右ニアル者ニ
ハ先宜ニカラサル之○沉香湯ハ沉香降気湯方中加
呉茱萸牡蠣ノ方也此方留飲アリテ腹痛ハケシキ者
ニ用ユ嘔吐アル者ニハ益良凡テ安中散ノ場ヘ用テ
能ク効アリ辟囊タチノ者ニ用ユ

療胃反大驗方

前胡 生姜

各四兩

阿膠

二兩 大麻子仁

呉茱萸

各五合

桂心

三寸 甘草

五寸

大棗

十枚

右八物以酒二升水三升煮取一升七合分再服

○此方ハカワツタ方ニテ吳茱萸湯ニモヨラレヌ大
柴胡ニモヨラレヌ方ニテオカシキ者ナレ何カ知
ラス此方胃反ニヨクキクニ故ニ此方ハ余ハ吳茱湯
ヤ大柴胡ヲ用テモキカヌ片用ルニ此方ハ反胃斗リ
ニ此方煎法ハ法ノ如クナスヘシ

○此方千金卷之五十一ニアリコレハ余ハ親シク試
ミサレ凡そ人ノ試ミシキクニ効アル方ニ伝
此モ別ニ目的ナレ術ヲ尽メモ不治片ハイロクシテ
見子ハサラヌニ其片ノ具ニ

安廩湯

一帆青 茯苓 各二錢

右二味以水ニ合煮取一合溫服四五日下利為知

○此ハ反胃吐水ニ用ユ一帆青本草書用テシモノナク
又此物漢名モナレ一帆青ハ本邦ニテツケニ名レ一
帆青ハ用テミルニ水気ヲ逐フ者トミユ其症秘ハ此
ヲ用ルト腹中雷鳴ノ四五日ノ内下利メ来ルモノニ
下利メ来ル者ハコレニテ効アリトスルニ連進スヘ
シ若四五日モ用テ雷鳴モナク下利モナキハ此方ノ
効ナレトスルニ方ヲ轉スヘシ此方ヨク効アル方ニ
テ一婦人十三年ノ間反胃ヤマサリシニコレニテヤ

治せしフアリ右ノ病者ハ阿列邸ノ留主居ノ内閨
ニテアリケルコレハ余カ治驗ニアラス余カ治驗ハ
七年ノ冒反ト三年ノ反冒ト治シタリシフアリ此方
モ久近シ不問ノ用ルニ一帆布ハ生ニテ其終用テヨ
シ此方往年ハ甚秘ノ人ニモ傳ヘヌ世間ニテモ知ラ
サリシ方ニテ此方ヲ劑スルニ一帆布ノ莖ヲ去リコ
マカニキサミ茯苓ヲ末ニノ調合セシ故人誤リ認
メテ茯苓ノ末シハ石藥ナルヘシ伝一帆布ノ細カニ
剉ミシヲハ百合葉トアヤマリミテ評判セシ方ニ故
也ニ反冒ノ奇方ニ百合葉ト茯苓トノニ味ノ方ヲ傳

来メアルアリコレ此方ノ藥味ヲ謬リ見テ傳ヘタル
方也此方モ今ハ世間ニテモシリ傳ヘテ公ヤケニナ
リタリ

○此方反冒吐水及テ俗間所謂痰膈ノ証ニ用ユ此方
ノ効驗ハ甘草粉蜜湯ト上下ノ位異ニメヨク肯綮ニ
アタル片ハ泄下スルモノニコレアラハ益連進スヘ
シ且此方ヲ肯綮ニ中ル者ハ腹中雷鳴メ来ルニ方中
下ス藥品モナキニカク雷鳴メ泄下スルハ肯綮ニ中
ル伝モノニテ面白キモノニ余カ先人水腫病万方効
シナキ者ニ此方ヲ用ヒシカ同ク雷鳴下利メ愈タル

者一人アリ録ノ以テ后考ニ備フヘシ一肌青ハ生物
シ用ユ陰干モ亦可ク此方煩ハシク凡衡ニカケテ合
スヘシ甘草粉蜜湯ナトノ類モ逐一ニ衡ニカケテ劑
スヘシ○此方瀉囊ニモ反胃ニモ膈噎ニモ用ル此
症ノ目的ハ水飲アリテ腹痛嘔吐スルモノ其嘔吐
ハ吐水吐食或ムセンタリ又常ノ嘔吐ト異ク此方反
胃ニアラスメモ留飲ノアルツ子ノ嘔吐ニモヨカル
ヘシ未試ミ此方ヲ用テ効アルモノハ一日ニ五六行
モ下利スルモノニ五日モ此方ヲ用テ下利セ又者ハ
効ナシトスルモノ其下ハモノカ水浮ク一帆青ハラシ

クコレハ直見元周伝ヘル医ノ名ケシ名ク伝直見元
周ハ五六十一年己前ノ人ニメ京師ニ住ノ本草家ニ伝
安原湯ハ小劑ニメハ効ナシ本分量ニナシ水法モ率
ニソムカヌ様ニシテ用ヘシ此方水飲ノ噎ニ効アル
ニ真ノ膈噎ニハ効ナシ此方大冬三日用ルト應ト應
セサルトハ知ルモノニ應スルモノハ腹中雷鳴下
利メ四五行ツ、水浮スルモノニ此方ノ用場ハ大冬
大半復湯カ近シ但大半復ハ水気ノ候ニ不拘メ心下
痞硬シ目的トメ用ユ安原湯ハ瀉囊魚トカ雷鳴トカ
逆満ト子何シ水飲ノ候ヲ見ハス者ニテナケレハ効

ナシ一病人腹痛ノ水穀ヲ吐シ食ニ咽フ后發物ヲ吐
シ血ヲ吐メ不愈フ三年安原湯ニテ全愈ヲ得タリ又
吳茱萸湯反胃ニ用ルヲアリ或瀉囊タナニモ用テ効
アリ一病者久腹痛水穀ヲ吐ス吳茱萸湯加沉香ニテ
愈タリ此方能ク痛ヲ治ス瀉囊ニテ痛ツヨク或瀉囊
ニ類シタル水飲ノナス処ノ久腹痛ニ前ノ吳茱萸湯
加沉香ノ方大ニ良又吳茱萸湯頭痛ノミニ用テ効ア
リ又吐涎沫ノミニ用テ効アリ其頭痛ノ位ハシツカ
リト柴胡ニテモナク先与レハ柴胡トモミエル処効
アリ此方頭痛破ルカ如キ者ニ用テ効アリ又吳茱

萸湯肘後方ニハ治噫醋及醋心トアリコレニヨク効
アリ一婦人頭痛乾嘔ス余此方ヲ與テ速ニ愈タリ右
ノ病者ナトハ一月アマリニナリシカ右ノ方ニテ即
功ヲ得タリ又疝ノ胸膈ニカ、リシ者ニ用ユ又此方
吃逆ニモ用ユ又霍乱后轉筋ニ吳茱萸湯ニ加水八大ニ
効アリ吃逆ハ傷寒雜病シ不問メ用テ効アリ橘皮竹
茹湯ノ吃逆ハ飲ニヨルモノ又吳茱萸湯ノ吃逆ハ下利
又熱邪ヤ積ナトニヨリテ来ルモノ又大冬吃逆ハ飲
ヨリ来ルモノ多キ様ニ覺ユ

獨參湯

治反胃嘔吐喘促粥湯入胃即吐

張介賓
方吳崩中漏下条

○コレハ此ニアル主治ノ通りハ人參ヲ嘔吐ニ用ル
ハ后世ニテハミナ獨參ハコレハ其様ニ入用ナル藥
ニテハナケレド道具ニ備ヲクヘシ余モアマリ不用
ニ喘氣ナトツキ其人ツカレテ来リタル片獨參ヲ煎
用スルハ外ニハアマリ不用也千金ニハ人參ヲ嘔吐
ニ用テアレドコレハ一味ニアラスミナニニ味ニ
味ノ方ニテ伍合セシ方ハ叔官參モ朝鮮參ヲ用ル處
ヘ用テ効ナキ者ニアラス反胃嘔吐ノ不止証ノ獨參
ヲ用ル處ヘ官參一服ニ幾目許ニメ此ヲ傷寒論ナト
ノ藥ヲ煎スル如ク濃煎ニメ用ルニ隨分効アル者ハ

官參ハ効ナシトハ云ヘカラス

○諸方書ニ獨參ヲ反胃嘔吐ニ用タルコアリ今ニテ
モ此ヲ用ル者モアリ余未タ其効ヲ親シク試ミサレ
ド此ニ備ヘカクハ病家医者ノ模様ニヨリテ用タキ
コアリ故ニ備ヘカクハ

此方ニテ胃氣ヲ鼓舞スルハ趣意ハ

匡宗必讀云凡反胃證得藥而愈者切不可便與粥飯惟以人
參五錢陳皮二錢老黃米一兩作湯細啜旬日之后方可食
粥倉廩未固不宜便進米穀常致不救

○古今ノ方書ニ胃反ヲ治スルノ意得シ云ヒ者コレ

過タル者ナシ卓見也此モ不治ノ症ト見タラハセ
ヌシ治スヘキ症トミタラハ此法ヲ行フヘシ故ニ此
ニモ得藥而愈者伝テアルニ不可治者ハ箇様ナル
ヲシメ徒ニ其人ヲ苦マシムルハ無益ニ此ニ十日ノ
間断食メアレ凡十日ハ病者モ堪カタルモノニ故ニ
余ハ断食断飲モ一七日ヲ期トメ行フニ一七日位断
食断飲メモ病人左マテ瘦ル、者ニ非ス此ニ人參陳
皮老黃米ヲ方ヲ用テアレ凡此方ニテ其病ヲ治スル
趣向ニテハナキトミユ是ハ但此方ニテ胃氣ヲ養フ
手段トミユ而シ凡此方ハ余ハ不用ニ断食ノ片ハ方

ハ其隨症ノ劑ヲ用ルニ又李仲梓ハ断食ヲセシメテ
アレ凡余ハコレニ因テ断飲ヲサスニ断飲ノ片一切
ノ汁氣ノアルモノヲ頓ト断ツニ汁氣ノモノヲ用ル
ハ但湯藥斗リニシカシ湯藥モ此片ハ丸藥ニテカラ
ノミニサスルニシカサルニ病ヲ治スルタメノ湯液
ナレ凡此処ニテ湯藥ヲ用テハ効大ニヌルキモノニ
故ニ丸藥ニメ送下スルニモ湯液ヲ用ルヲ禁スル
ニ断飲ノ片ハ食麦ハ不禁也又断食ノ片ハノミモノ
ハ大麦ナクユルスヘシ何レ飲ヲ断片ハ食ヲユルニ
食ヲ断スル片ハ飲ヲユルスニ一方ツ、禁メ一方ツ

小便無如赤ク
ナリテヲリハ未
ル者ニ漸飲中
モ飲スル片ハ用
立ヌニ漸飲漸食
スル片ハタト根
治ハセス片二月
ハ嘔吐止ムモノ

ユルヌヘニ飲モ食モ但ニ断スル后ハ出来ヌモ
ノニ断飲ノ片ハ食ヌハ常ノ如クナサシムルニカ
シ其片ハ握リ飯ニメ喫ハシムルカヨキモノニ但飯
ノニ喫ワシメテ味噌汁ハ勿論禁スルニカニマン
サラ淡味ノ飯ノミハ喫ヘヌ者故汁氣ノナキ味ヲツ
ケタキタルモノ早ノタキタルナトノ類ハ用テモヨ
キニ断飲モ甚難義ナル者ニテ一七日ノ間仕遂ケヌ
モノ多ニ断飲メヨリ四五日メニ至シハ小便モ甚淋
瀝メ但タラクトシツクノ落ル如クニナリ其小便ス
ル片身ニ熱シ覺テ火ノ如クニ思フ様ニナリ口燥咽

渴ニナトメ如何ニ堪難キニエツナミアルモノニ其
処ヲ慰喻ノ一七日ノ間断飲サヌヘニ此片ヨク守ラ
ヌメ四五日メニテ断飲ヲ破リ水漿ノ物ヲ用ル片ハ
アト戻リメモトノ如クナリ四五日ノ間ニンバウセ
シモ徒ニ無益ノヲニナルニ断食ハ最難キモノニ而
レ其片ニアタリテ行ハナラヌ者ハ慰喻メ此
法ヲナサシムヘニ余カ友生伊豫ノ医ニ谷了閑伝者
アリ此医ナトハ反胃ニ断食ヲ行ナシニ余ハ断飲
ハ行ヒシカニ断食ハアマリムコキフト思フテ未タ
親シクセヌニ何レ断飲カ断食カ一法ヲ行フ片ハ一

且ハ必切シ癸スルモノノ重キ者ハ再癸スルヲモア
レ度一度ハ切シ見ル者ニ此法ハ通例ノ藥ヲ用テモ
効ナク手ヲ尽セシエニテスル術ニスヘテ反胃吐水
ノ類ハ全体ニノミ物ヲ減スルカヨキ者ノミ物多
ケレハ吐モハケシキモノノ扱断飲モナレ難キ者ニ
ナレ度断食ニハマサレリ断食ハ大冬ノ人ハ出来ヌ
モノノ断飲モキツフ術ナキモノトミエテ断飲ノ四
日ノ位ニハ其病人ノ死メモヨキ故水飲シテクシレ
度モノノ右ノ如ク或ニカヘテモ水飲シノミタキホ
トノ苦ミ故余程ノトミエルニ又和田泰純反胃吐

水瀉囊ノ減食ヲナサシムル法アリ其法一合ノ米ヲ
粥ニタキ日ニ六度ニ其粥ヲ喫ワシム而メ此它ニ一
切飲ミ物ナトヲ禁スルニナルホト此法ヨキニ從ヒ
用ヘシ一合ノ米ヲ粥ニ煮テ六度ニ分テ喫ワスハテ
ウト都合ノヨキモノニ断食法ヲハ申ク出来ヌヲ故
右ノ如ク法ヲ立テ減食サスカ大ニヨキモノニ此場
シ一等ハケシクユケハ断飲ニシカシコレヲノ法モ
ミナ病ノ未タ未ニナラスノ昼此迄ノ内ニ行フニモ
ハヤ未ニナリテハ行ッテモ効ナレ湯液ノ劑ヲモ禁
スルハ断飲ノ片ノミノヲ一合ノ米ヲ粥ヲ喫ワスニ

ハ其随証ノ湯液ノ劑ヲ用ルニ何モ遠慮ノナキヲ
又反胃吐水瀉囊類凡テ一切ノ臭肉ヲ禁スルニ但其
内川臭ノ鯉鮓ノ類ハユルスヘテ川鱗ハ大夏ナ
キモノニカシ江臭海臭凡ニ無鱗魚ハスヘテ病者
ハ禁スヘシ故ニ川魚ナレバ鰻鱺魚ハ禁スルニ是無
鱗臭ナレバ又瀉囊吐水ニテモ形氣未脱者ニハ斷
飲斷食ヲ行フ獨反胃ノミニアラス叔斷食ノ次手
ニヨリテ此ニ云斷食一七日ヤソコヲ行ヒトテソ
レニテ生命ヲオトスナト云フハナキモノニ余カ
知テ居ルスニ三十四日ノ間穀氣ヲ斷タル煩人アリ

タリ其人ハ車屋街妙小路エル西側臭舗ノ妻ニテア
リケル此人口舌腐爛ハケレクメ痛ミアリ腐爛ニテ
口氣モ臭惡甚ク言語モナラヌツレ故粥ヲトシ喫ス
ルヲ出未スヌル水ニ白砂糖ヲ雜セテ送り下スノミ
如此ヲ三十四日其間藥モ熱ケレハ口舌ニミコミイ
タムトテ藥汁ヲヌルクメ用タリ此片ノ藥ハ涼膈ノ
類ヲ用タリ三十五日メヨリ承煎ヲ用タリ此ヲノム
ヲ四五日ソレヨリメ粥ノ上ハ湯ヲ用テソレヨリ漸
々ニ食ニクヒツキタリコレハ余カ見知りタル内ニ
テ最ツヨキ斷食ニケルコレモ内ニナス処アリテ飲

食ヲ不欲ノ如此三十四日モ穀味ヲイレヌ者ナラハ
ナカクコレ迄ハ生シ保ツヲモナラヌハツナレ凡内
ニサス処ナリ飲食ヲ欲セスニテハナケレ凡口舌ノ
タメニ食ヲナラヌモノ故如此ナガク穀食ヲ断テ
モ生命ニ害ナカリ、レモノ

○細啜ハ所ミツ、食フヲ云々コレハ李中梓發明伝
ヘシ它ノ書ニ此術ナレシカレ此方バ不采用但術ヲ
采用ルノ今此ヲスルニハ断食ハ至テナリニクキ
者故食ヲ減セシムヘシ其食ヲ減スルニハ食ハ毎
日衡ニハカリテ日ニ何幾目ト定メテ不同ノナキ様

ニメヨホトヒタルイノニアワヌ其内余ハ大ニ一
日ニ六十目ノ食ヲ用ユ六十目テハユツナキナレ
凡ソコシコラエサスルニ藥ハ此李中梓ノ方ヲ不用
メ何レ凡對症ノ方ヲ用ルニ此術反胃瀉囊ニ用ルニ
隔噎ニハ不用○反胃ノ類ニ断食ヲ行フニ必読カ
本源ニ而シ凡断食ハニクキモノニ是モ形氣既ニ
脱メハ行ナワレヌ此法ハ藥ヲ用テ手ヲ尽メモ効
ナキ行フニ断食モ断飲モ此法ヲ行ヘハ必一度ハ
効アルモノニカレハケレキニ至リテハ復モトル
者ニ凡断食断飲ハ大ニ七日ノ間行フヘシ其上ハ出

未カヌル者又効アル者ナラハ一七日ニメ効アル
○澀囊ハ硬キ飯ヲ食スルハアヒ、濡ナル飯ヲ食
スヘシ譬ハ日ニ二度ハ濡ナル飯ヲ食シ一度ハ粥ヲ
食スルカ一度ハ軟ナル飯ヲ食シ二度ハ粥ヲ食スル
カスヘシ俗人ハ凡テ澀囊タチノ証ニハ膏粱ノモノ
ヲ禁スヘキヲ反テ艱生ニセントテ勉テ膏粱ノモノ
ヲ食セシムルハ大ニアヒキト○澀囊ノ重キニ至
テハ断食スルニカレテ断食至ラスツ子ノ澀囊ノ
艱生ハ減食スルヲ要トス日ニ米ニ合ヨリ不出様ニ
スヘシニ合ヲ過テハアヒキニカレ丈夫ノ人ハ二

合ノ米ニテハタエヌモノ故食変ノ間ニ小豆ヲタキ
テ喫ワシムヘシ小豆ハ利水ノ劑ニテヨキ者又小
麥ハ少々過食ノモト大夏ナキモノ喫スルモ佳ニ殊
ニ赤小豆ハ澀囊ニ用ルルハ其當坐ハ腹痛モユルム
モノニ小麦ハ飯ニタキテ喫ワシムヘシ澀囊ハ膏粱
ノモノヲ忌ムヘシ魚肉ナトハ一切断スヘシ青物ノ
類ハ何ニテモ忌ムヲナレバイリダレ生漬田舎
ノ類ハ青物ニテモ忌ムニ澀囊ハ食養生第一也全愈
テ后ニテモ食変ヲ慎マサレハ忽ハ子カヘリテ本ノ
如ク患ヲナレ甚キハ死ニ至ル者ニ差后一兩年ノ間

ハ最初ノ如ク養生ヲ慎ムヘシ河漏ナトハ瀉囊ニモ
大夏ナキモノハ赤小豆ハ瀉囊及反胃吐水久腹痛ニ
能ク効アル者ニ一病人反胃ニテ吐水腹痛ス百藥効
ナシ而ルニ赤小豆ヲタキテ藥餌ニシタリシカワレ
ニテ反胃治シタリ赤小豆ハ反胃ノ吐水ニテモ吐食
ニテモ用テヨキモノハ譬ハ茯苓沢瀉湯方ノ反胃ニ
用ル吐食ニテモ吐水ニテモ用ルト同シ其内吐水ノ
ミニ用テ吐食ニ通ラス方モアリ五苓散ノ水逆ノ如
キコレニ
瓜蒂散 方具傷食條 師曰反胃諸吐宜瓜蒂散吐之若其少腹有塊

動衝巨里心中熱痛飢不能食者不可吐々之必死嘯菴曰
反胃諸吐尤可吐

○反胃ノマタ吐劑ニテモ用ラレハ吐者ニハ吐方キ
ツクヨキモノハ是田中翁ノ經驗ニコレモオクレ
テハナラヌヲハ膈噎ニテハ吐スルヲハナキモノハ
假令何カラ来ル者ニテモ膈噎ハ内ノ乾クニヨルモ
ノ故吐方ノ類ハ用ラレヌ又田中子ノ傳ニ諸吐
イロクノ藥ヲ用テモ治セヌ片一吐ノ効ヲ得ルヲア
リト而シ凡其少腹云々ノ証アル者ハ吐ヲ忌ムニナ
ルホト巨里ノ動ノ元ナル者ハ瓜蒂ハ忌ムニ反胃ニ

テモルリ瓜蒂ヲ通例ノ嘔吐ニ用ルヲヨキ手段ノ其
内潴囊ナトハ動気ナクメモ吐劑ハ忌ムコレニ吐
漏ノ法ヲ行フハ反テ命期ヲ促カスニ至ル此ニ次
手ニ出シ巨里ノ動ハ一体常ニ壯健ナル人ニハナキ
モノハ故ニ巨里ハ它ノ動脈ノ地位ト違ヒ平常ノ人
ニアル者ニアラス巨里ノ動ハ十人ニ三人アル者ニ
其動アル者ハ何レ達者ナル人ニアラス何ノ云分ノ
アル人ハ故ニコレアル人ニハ吐劑ヲ禁スル又田
中翁ノ吐劑用捨ノ秘訣アリ凡吐方ヲ行フニ臍中ノ
動気ナキモノハ決メ吐方ヲ不可用也臍中ノ動ハ所

謂腎間ノ動ニテ人皆コレナクンハアラス而ルニ臍
中ニ動ナキハ是精氣ノ虚耗ニタル者ハ故ニ吐ヲ行
フヲ禁ス臍中ノ動ハ巨里ト相反ス臍中ノ動ハ十
クンハアルハカラス巨里ノ動ハナキヲヨミトス凡
勞歎ナトハ其死スルニ三月モ前ヨリ臍中ノ動其処
シハナレテ臍上ニ升リテ居ル者ナトアリコレ即臍
氣上衝ニ又凡ル前ニナレハ離ル、処テナク臍中ノ
動其辺ニナキ者ハ臍ノ脈位ヲ動キハナルハ危ニ
伝ヘ氏藥音蔡ニアタルハ其脈本位ニ飯ルヲアル
ニカレ何レ臍中ノ動ナクハ危ニト知ヘシ是緩病

中ニテノ診候ニ特リ効驗ノミニアラス而レ凡急病
ニアリテハ此例ニアラス急病ノ暴ニ来ル者ハ疾ス
ル前半時一時ホト迫ハヤナリ臍中ノ動アルモノス
急病トテモ臨終キワニナリタラハ臍中ノ動脈モ絶
ヘキナレ凡右ノ如ク疾スル半時一時前迫ハ随分臍
中ノ動アルモノ故コレニテ疾生治不治ヲ決スル
ハナラヌ又ノ扱膈噎ハ吐劑ハ用ラレヌ者ナレ凡痰
隔ナトハ吐スルヲモアリ医家ニテ云膈噎ニハ決
吐劑ナトノユクヲナキ者ス

橘皮湯 乾嘔噦若手足厥者

橘皮二錢 生姜二錢 右二味以水一合四勺煮取六勺

○按外臺名小橘皮湯

○是ハ乾嘔ト噦ニ用ルコレハ大病重病ヲ輕劑ニ
テナオス方ニタトヘハ卒ニ嘔吐ノ手足ノ厥メ居ル
処ハ小半復湯ニテ愈ルト同ニ扱嘔吐ヨリ噦ハ藥ノ
ハケ難キモノ又其片如此輕劑ニテ思ノ外愈ル者ス
此方ハ干嘔斗ニモ用ヒ噦斗ニモ用ヒ又乾嘔ト噦ト
併セアル者ハマス用ル一男子盛暑ニ方リテ霍
乱ヲ發スソレヨリメ下利嘔吐逆ノヤマス其内ニ噦
ヲ發シ脈細手足厥冷ス臣附子理中四逆加人參等ヲ

与フル伝へ凡諸薬スヘテウケ入レス医以テ必死ト
ス余ニ治ヲ請フ余与フルニ橘皮湯ヲ以テコレヲ
ウレツ、与ヘシニ遂ニウケ入ル、ヤウニナリテ治
ミタリ凡乾嘔噦ナトノハケシキハウレツ、薬ヲ送
ルヘシ方書ニ此ヲ細啜ナト、云テマルク此治驗ナ
ト即輕劑ヲ以テ重病ヲ治スルノ類ニ

○是ハ嘔噦ノ輕症ニ用ユ又ノ試効アリ霍乱上吐
下利ノ手足厥逆シ脉細ニメ欲絶殆死地ニ就ク者四
逆ヤ吳茱萸湯ノ類ヲ用テモ一呷モ不服水薬凡ニウ
ケヌモノ此方ヲ用テ收マリ宜シケレハ奇功ヲ奏ス

ルヲアルニ○此方大凡ハ嘔吐ニハ用ヒヌク噦ニハ
ヨク用ルニ乾嘔ノミナレハ外ニリコフナル薬多ク
アルニ此方ハ先ツ噦シ目的ニ用ユタトヒ嘔アルモ
噦シ魚タル者ニ用ルニ往年霍乱ニテ嘔吐噦不止附
子劑四逆ノ類モ不收危急ナル者ニ此方ニテ効ヲ得
タルヲアリ凡ソ噦ハ橘皮竹茹湯ニテ一通リハ治ス
ル者ナレ氏ソレニテ不治若クハ手足微厥ナトニ及
フ者ニ此方ヲ用ユ

破棺湯 療膈噎者

桃仁 杏仁 桑白皮

右三味以水ニ合煮取一合

○是ハ但膈症ニテ用ル藥ニテカワツタ藥ナレ
瘀血マ水飲ニヨルナトノ因シ不問ノ膈症ニ用ル
其内藥ヲ見ルニ瘀血ニヨル者トミユ此方一旦ハヨ
ク通ス者ニ此方和方ニ初ノ終リヲ不問メ用ル
○是ハ膈噎ニミ用ユヨホト効驗アル方ニ是ハ林
芳列ノ家方ニ膈噎ハ方ノ少ナキモノ其ハツニ不
治ノ病ナレハ○此方其因シ云ハ瘀血ニヨル膈
噎トミユ真ノ膈噎ハ格別ノ夏ナレハツ子ノ膈ハ
多ハ瘀血ニヨルモノ又飲ニヨル者モアリ其内瘀

血ニヨル膈ハナニ八九アリ飲ニヨル者ニニアル
瘀血ニテナス膈噎ニテモ飲シ兼ルモノニ故ニ先飲
シ制メ后血ヲ攻メ或飲シ制スル藥ニ消石大圓起磨
丸ノ類ヲ兼用スルヲモアリ后飲去テ桃核承氣ヲ用
ルヲアリ膈噎ハ瘀血ニヨルモノ故ニ破血ノ劑ヲ用
レハ血ヲ吐スル者アリテソレニテマ、愈ルモノア
リ又血ヲ吐メモソレニテ一旦効ハアリテモ全ク愈
スメ歟ニ至ルモノアリ血ニヨラヌモノナレハ破血
ノ藥ヲ用テモ血ヲ吐カヌ者ニ右ノ血ヲ吐スル者ニ
テモハヤク用レハヨケレハ遲ケレハ血ヲ吐メモ復

セヌモノ又桃核承氣ナトヲ用テ吐血セヌメ治ス
ルモアルハ硝石大圓起癆ヲトハ吐血セヌハ扱此
破棺湯モト咽喉痛ノ藥ニ膈証ニ用ルハ活用ニ咽喉
腫痛甘桔湯マ涼膈ナトヲ用テモ不愈ハ用テヨク
効アリト云此破棺湯ハモト膈ノ藥トノ覺ヘ居タ
リシニ嚮者阿列ノ医近藤周敬ナル者京師ヘ来リシ
中匠譚ニ及ヒシカタマク咽喉痛ノ方法ヲ論セシニ
此破棺湯ノ主治モト咽喉痛ニテ膈噎ニ用ルハ活用
ナルヲシキケリ余因テ考ルニ此方ノ伍スル処ヲ以
テスレハ喉癰ナトニ用テ必効アルヘシト思ハル喉

癰モ血ニヨルモノ桃仁血ヲ治スルノ効アリ而シハ
喉癰ニ効アルヘシ后未試用スヘシ近此一病人アリ
梅毒ニテ痰欬アリ咽喉痛ニ其根結喉ノ辺ニワタカ
マリテ根サシクシト腫テアリ於是投スルニ甘桔
湯杏仁桑白ノニ味ヲ加用ル且コレニ逐毒散ヲ兼用
セシニ頃日大ニ快ク結喉ノクル腫ヒタルモ痰欬
咽喉ノ痛モユルニタリ尋テ用シハ全ク功ヲ收ムヘ
シト思ハル又ナシニ云逐毒散梅毒ノ瘡シタルモ
ノ上下ヲ不論ノ其証アレハ用ルハモノ、逐毒ノ方
ハ上部ノ毒ニ尤効アリ多試ムルニ上部ノ毒ニハワ

ケテ効アルノ故此破棺湯ノ方伍ノ桑白皮ハ如何ナ
ル伍合ノ様ナレト云モノカ桑白皮ハ咽喉ニ利
アル藥ノ黄草散ノ桑白ナト此ルヘシ黄草散モヨク
キク藥ニ

治嘔吐方 水莎 良姜 木香 烏梅 乾姜

○是モ一通リノ藥ニテ治セヌ片用ニ更ニヨルトヨ
ク收リテ切ノアルモノニコレハ田間方ニテ余傳ハ
リタリ

○嘔吐其因ヲ不問メトウメカウメモ不治片此方
ニテ治スルヲアリ此方ヲコレハ虫ニヨル者ニ似タ

レ片不熱ニシカシ嘔吐ハ多ク虫ニヨル者アリ此方
サツト煎スル乎或振出シニナシ用ルモアリイツレ
アサク煎スルヨシ此方ノ分量ハ香附良姜乾姜各等分
烏梅木香丁香三分一二劑スヘシ

消黄丸

○是ハ反胃膈噎ノ類ニ腹ニ塊ノアルモノハ隨証ノ
方ヲ用テ此丸ヲ兼用スルニ

終始丸

○是モ反胃膈噎ノ瘀血ニヨル者ニ兼用スルニ
○反胃膈噎ニ瘀血ニヨル者多クアリ煩人ナレハ經

右ニ方腹ノ塊ヲ
目的ニ用ユ血
ヨル者ナラバトテ
此ラミテ手掌煩
熱ナト血症ナ
キモノノレシ不
待正腹候目的
トシテ此方ヲ用ヘ

閑ノ類男子アレハ結毒ナトニヨリテ反胃膈噎ヲナ
ス者アリ右ノニ方其処ニ用ル本方ハ逐飲ノ藥ヲ
用ル一モアレ凡大分ハ對症ノ藥ヲ用ルニカシ硝
石大圓ヲ終始丸ヲ用ル片ノ本方ハ大槩ハ飲ヲ制セ
子ハナラヌモノニ終始丸兼用ノ本劑ニハ旋覆代赭
石湯ヲ用ル一アリコレハ具合ノヨキモノニ又旋覆
代赭石湯ノ上ニ五灵脂ヲ加用ル一アリコレハ飲ヲ
逐フ手段ノ藥ニ又終始ヤ硝石大圓ヲ用ル処ニテモ
水飲ノ候一向ナキモノハ飲ヲ不制メ血ヲ逐フノ藥
ナトヲ本劑トスル一アリ硝石大圓ハ塊カ目的也硝

石大圓ハ膈ニモ反胃ニモ古来ヨリ用タル一ナニ是
余ノ用意也

滾痰丸及散

以上三方
並在別集

治一切噎氣吞酸至於噎逆呃氣及胸

閑或從胸中氣塊冲上呃吐涎飲狀如翻胃者

○此ハ主治ノ夥ニクアル者ニテナヨツト此ヘテヨ
ツト舉ニ主治ノ如ク膈噎吞酸吐酸噦ナトノ処ヘミ
ナ用ルニ尤コレハ下利アル処ヘハ不用ニ多クハ不
大便ノ者ニ用ユ

○滾痰丸ノ主治回春詳カニ故ニコニ引拔テ舉オ
キタリ此ヲ考テ用ヘシ此方痰涎ナケレハ不用ニ

カシ吞酸マ噎ニ用ルハ格別痰涎ナクメモ方モ口
シ若又水飲ツヨクノ此ノ痰涎ノ証アレハ控涎丹ヲ
用ルニシカシ凡ソレハ至テ少ナキモノ多ハ痰ニ
テ滾痰ノ症ナルモノ之故ニ此ニ控涎ノ方ハ不舉
○噎気凡ハ即膈噎也噎噎通用ス滾痰ノ方ハ膈噎々
気呃気ノ類ニ用ユ此丸痰ノ藥ノミノ如クニユレ
凡不尔ニスヘテ毒ヲ捌ク藥ノ呃吐ニハ常ニ不用久
キヲ經テ飲アル者ニ用ユ反胃ニモ此方シヤルヲア
レ凡此方ハ反胃ニハヨクシツレニハ控涎丹ヨキモ
ノ又吉益ニテハ此滾痰丸ノ沉香ヲ去テ甘遂ニカ

ユ沉香ハ仲景ノ用タル徴ナキ故ニ予ニカシ凡沉香
ハ能ク解毒降気スル者又コニ甘遂ヲ用ルナラ
ハ回春ニアリシカシ凡文法不穩塊ノ字ナクメヨシ
又胸中気塊ノ四字胸気ニ作リテヨカルヘシ

反胃灸法

上腕中腕下腕

各ニ
七壯

天杞

三七
壯

○一本堂ハ勿論諸医家者流ニモスサマニ灸スル
モノアリ而レ凡アマリキカヌ者其内此ニ舉ニ四
穴ハマダ効アル者故カキ出セシメ而レ凡反胃ハ灸
ハアマリキカヌモノニナカク灸法ニテハ治セヌ者

此ニアル壯散ハ景岳全書ヤラニアリテ故挙タレ
氏今スルハタントスルニカシ何ホト多ク灸メモ
キカヌモノニ故ニスユルナラハコレ位ニテアキラ
ツテオキテモスムナ

○此灸初発ニテ熱アリテモ用ユ陰陽シエラハス灸
スルニ

續方

治食飲輒吐方

千金卷
五十二

頓服生熟湯三升即止

○生熟湯トハ新汲水ト滾沸湯ト併セタルヲ云ニホ
草ニ陰陽水トアル是ニコレハイロイ藥ヲ用テモ嘔

吐ヤマスハ半復ナトニテモウケヌ此方ヲ用ルニ
時ニヨルトヨクキクヲアル者ニコレハ此ニモ頓服
トアリナルホトコレハ細啜ハヌキ者ニタトヒツ
キモトニテモ一度ニタント一茶盞ホカマルニ二度
モ三度モ用ルニコレニテトツクリ收マリニナラハ
アトニテ對証ノ藥ヲ用ルニ此ヲ用テモツキカユス
モノハ藥汁モ湯モ水モ吐キカユスモノニ
○嘔吐ハムツカシクナリテハ如何様ナル藥汁モウ
ケヌ甚キニ至テハ湯水モウケヌモノニ其ハ藥ナシ
ニメ医手ヲ求テ見テモ居ラレヌ其ハ陰陽水トテ

灵砂治呃吐噎
气甚者 小册

百沸湯ト新汲水ト相和モ冷暖ニ適メ用ルアリコ
レニテ呃吐ノ收マルアリ此方本草ニモアリ

○呃吐反胃吐水瀝囊ハ相近キモノハ膈噎ハ一ツハ
ナレモノハ

○灵砂丹方 灵砂一味為末糊丸一名ニ気散又青金
丹ノ名アリ本草灵砂ノ條ニ詳也主治ハ本草ニ東坡
ノ言ヲ引テアリ其主治ヲ云フ者ヨキハ此丸陰陽水
ニテ送ル此方諸吐逆ヤマサル者ニ用レ其内余ハ
反胃ノ吐食ニ專テ用ルハ反胃モ初メヨリ此丸ヲ煎

用スルニアラス其治ヲサレテモ効ノナキ片煎用ス
ルハ又東坡ノ主治ニモアル通り吐乳ニモ用ルハコ
レモ治法ヲ施シ見テモ効ナキ片煎用ルハ胃反吐食ニ
用ルニモツレハノ隨症ノ方ニ煎用スルハ此丸糊ニ
テ丸スルハ丸ノ大サ平常ノ丸ノ如クニナシ一度ニ
十丸日ニ二三度用ユ此方ハ諸呃吐イロクメモ不止
者ニ用テ効アリ一向ニ食藥モ不收半夏一味用テモ
ツキカエスモノアリ又霍乱ナトニ呃吐ノ一向ニマ
マヌ者アリソレヲノ類ニヨク効アリ何レ諸呃吐ノ
不止モノニ用ユ其内余ハ多ハ反胃ニ用ユ

○利膈散方

泉別賣藥

河豚ノ膈ヲ去リ紅花ヲツメ

テ黒焼トナシ白湯ニテ用ユ此方毒ヨリ未ル膈噎ニ

効アリ飲ヨリ未ル膈噎ニハ効ナシ膈噎ハ多ク毒ヨ

リ未ルモノニ

○膈噎薈根ヲ用テヨキヲアリ其方千金ニ出タリ

○戴帽魚 和名ヤガヤ此物膈噎ノ輕症ニ用テ効ア

リ餌食セシムルニ此臭膈噎ニハヨホトヨク効アル

モノ京近処テハ兵庫ノ辺ヨリ出ル所京ヘモ未テア

リテ魚店ニ出テアリ又魚舗ニカ子テタノンテカケ

ハガリニモツテクルニコレハ藥ケヒテモ隨分食シ

ルモノアチナキ者ニアラス千金方ニモ大帽魚ノ入

ル膈噎ノ丸藥アルニ膈噎ノ輕キハ戴帽魚ヲリ食セ

シメテモ愈ルモノ此魚冬カラ春ニカケテアル魚ト

覺ヘシニ又ケリ所鳥アリコレモ膈噎ニヨクキク者

ニ此シ一味黒焼ニメ隨症ノ方ニ兼用スルニ此鳥オ

リニハ京ヘニセモノニ未ル此鳥ハ獵師ナトモ執リ

ニクキモノ伝ケリニ山ケリ田ケリノニツアリ膈噎

ニハ山ケリヲ用ユ田ケリハ効ナシ田ケリハ田ナト

ニアルケリニ山ケリハ山ニスムケリニテ形狀各異

ニ余ハケリハ試用ヒタルヲハナケレト効アルモノ

、由ニテコレヲ用ル医マ、アル

○辟囊ニ化毒丸ヲ用ル処アリ別ニ其目的ナシ但其血氣未衰片ニ腹痛ヲ目的トメ用ルハ荻野ナトハ辟囊ニ化毒ヲ用ルニハ砂糖湯ニテ用ユニカレ氏煮サマシノ湯ニテ用ルニシクハナシ

○虚勞ノ嘈雜ニ麦門冬乾地黄ヲ蜜ニテ煉リ用ユヨク効アリ千金方ニ出タリタニカニニ味ト覺ヘシニ尚千金ニ就テ訂スヘシ

○紅螺殼未治吞酸

毓春園小冊

治驗セリヨキモノ

○三淋湯藥氣入鼻則吐或惡心絕穀心下如盤胸膈痞

塞者此方妙効

換柳子

紅花香附子

右三味各等分

一男子五六日嘔吐不止一医用藥無効嘔吐弥甚而氣之絕竟至不能言不能動手余診脈緩非死証以為癰証

泉沅香也

或痰積類廼投三淋藥入腹中氣初復正又為泉加承三

淋兼用頓安

春毓春園小冊

三淋湯ハ麻沸湯ニテ振出

ニ用ユ一切嘔吐ニ効アリ伝北尾春園ノ方也三角ヲ察子ナトハ小羊復加荻ノ場ニハ際ノ此方ヲ用タリ余ハ不用ク而レ氏諸嘔吐不止ニヨシ此方ヲ用ルモアリ又此方蛇虫之嘔吐ニ用ユ又惡阻ニタマク用

ルアリ

○平人食噎咽或胸中痛無氣力脈緩者為真膈噎反胃也此証荏苒衰憊過年就尊后足跗浮腫而反脈病而不病者死夫脈緩為真陽虛宜當溫補云云 毓春園小冊

○反胃膈噎脈滑數者問得愈矣按滑者真陽不虛脾氣不虛憊也救者熱也因痰或胃熱致之故宜順和同上

○治反胃方東門石長生右切以水二合取一合神

驗同上此方未試

○吐虫而呃用黑錫炒成灰洗米飲調服同上烏梅

蜀枳甘草粉蜜ナトリ用テモ不止者ニ用ニ云余ハ未

試也

○治產后嘔吐方 醋酒醬油等分冷飲同上是即三

杯酢也余友人効アル由ヲ云タリ未親試也

○中神宇内諸嘔吐ニテ一切ニ藥ヲウケサル者ニハ

食塩雞タマゴ大サホト白湯ニテ送下ミ一吐ヲ得テ后

必藥シウクル云

○牡蠣末 嘈雜用之妙医夏說約

へキ者ハ痢病中ノ噦ト諸病ノ末ニナリ虚羸ニタル
 片ニ至リテ噦ヲナス者トノニツハ久候凡云へキホ
 トノ者ノ諸病ノ末ニナリテ足跗ニハレヲナス片ナ
 ト噦ヲ発スルハ久候ノ噦モ常人無病ノ人ノ一時ニ
 発シタルハ何隻モナキモノノ一人アリ病患モナク
 壮健ノ人也ケルカフト噦ヲ発シ医カワルク藥ヲ与
 へシニ効ナク既ニ二月ヲ経テモヤマスツレヨリム
 テマクテヤトメ治シタリ如此類ノツ子ノ噦ハ生死
 ニカハラヌモノノ一ニヤマシメテ治スルハ
 橘皮竹茹湯 噦逆者

橘皮 ニ錢二分 竹茹 大棗 生姜 各ハ一分 甘草 五分 人參 一分
 右六味以水ニ合煮取六分
 ○右ニ云シ如ク噦ニモイロクアリテ其因ル処不一
 者ナレ凡其病因ヲ不問メヒラガレニ噦ニヒロク用
 ル方アリ此方即其物ニコレタトヘハ病因ヲ不問メ
 ハ半復湯ヲ用ルト同シ
 ○是ハ云ヘハ痰飲ニヨル噦ニ用ルトハ云ヘ凡虫凡
 ナク積聚凡ナク其因定ムヘカラサルモノハ多ハ此
 方ヲ用テヨキモノニスヘテ噦逆家ノ總司伝ヘキ藥
 也○此方噦ナラハ腹ト脉ノ様子ヲ不問メ先最初ニ

噦在傷寒莫驚
浮心刺宜之若在
膿血下利為難治
其生患刺莫驚食
痞根及穀處愈片
喘腹候可予小半
夏加茯苓湯重

用ル藥ハ橘皮湯ハ此ノ一段ツヨキモノハ橘皮湯ハ

危篤ノ場ニテモ用ルハ輕ハ橘皮竹茹湯ニテスムハ

橘皮湯ハ藥味少シクメ反テ重キ處ニユクハ霍乱ナ

トノ末ニナリ嘔ト噦ト一處ニナリ藥モ通ラス患者

ノ手ヲハナシタル片ニ此ニテ効ヲ得ルヲアリ

橘皮湯 方具吐條 乾嘔噦若手足厥者

○前條及ニ既ニ嘔吐條ニテ辨シタリ

半夏浮心湯 方具癰症條

○シヤクシテ心下痞硬スル者ナレハ此方ヲ用ス

○此ハ噦逆心下痞硬スル者是ヲ用テ心下ヲシラク

者半夏浮心加
吳或吳茱萸湯
也

片ハ其噦速ニ治ス是ハ熱噦ト見ヘタリ傷寒中ナト

ニ別シテ此症多シ若此ニテモ不治者ハコレニ吳茱

萸ヲ加用ルヲモアルハ此方何レ心下ノ痞硬カ目的

吳茱萸湯 方具吐條

○吳茱萸ハ噦逆ニ一泓ヨクキク者也幸ニ傷寒論ニ

此方アル故假リ用ルハ此方ノ噦ハ半夏浮心ト近シ

其内半夏ハ熱ニ用ヒ吳茱萸湯ハ寒熱通メ用ユコレ

タケノ違ヒナリ

○此方ヲ噦ニ用ルハ寒症陰位タチノ者ニヨシ熱ニ

ヨル者ハ人參黃連ノ類ノ方ヲ用ルニ不若クニカニ
陽位ニアルモノニテモ用テヨキヲアリ此方陰位タ
チノ者ニ用ルハ真ノ陰症ニテハ四逆湯也又傷
寒中ノ噓ニ吳茱湯ヲ用ニ傷寒中ノ噓ハ裏寒ニナ
リテハ餘リナシ熱症ニ多クアリ其症心下へ未テ半
復浮心ノ証多クアルモノニ其片ハ半浮ノニニテハ
力弱キ故吳茱湯ヲ加用ルニ能ク効アルモノニ又吳
茱湯ト四逆湯ノ間ニカニ噓ニ吳茱湯皮附子ニ
味ノ方アリヨク効アリ此方本草ニアリ重子テ方輿
ニノスヘシト思フ
按本草卷三十二吳茱湯附方引
孫氏仁存方云煮問云病深者其

声噓宜服此方如不止灸期門關元腎兪穴用吳茱湯醋
炒熱搗皮附子去皮各一兩為末麴糊丸梧子大每姜湯

下七
十九

柿蒂湯

嚴氏

治胸滿呃逆不止

柿蒂

丁香各二錢

加生姜五錢水煎服

甘草

○是

胸滿トアレ凡胸滿ニ限ラス又病因ニモ不拘

ノ用ルニ其内此主治ニモ不止トアルカナルホト此
方ハ通例ノ方ヲ用テモ治セ又片用ルニ又此ニ柿蒂
丁香トクニ合メアレ凡今コレヲ用ルニ柿蒂斗リニ
ノ丁香ナシニテモヨクキクモノニ又俗方ニ柿蒂ト
冰糖トシ一処ニ煎メ用ル方アリコレ凡ヨキモノニ

噦ニ甘キモノ、ヨキヲアルモノ

○橘皮竹茹ナトニテユカヌ者ニ用ユ或吳茱湯四逆湯ヲ用ル処ニ此湯ヲ片手ニ兼用スルアリ

○治噦因寒者方丁香柿蒂霜右二味為散用

毓春園
小冊

甘草乾姜湯

方臭勞
病餘

○コレハ苦味ヲ用テモヤマヌ片用ルルコレモ寒熱
氏ニ用ルル其内寒証ノ方方モニヤル

四逆湯

方臭傷
食餘

○此ハウケムキノ寒症ノミヤクリ也

○大病中ノ噦逆ニ此証多シ后世家ハ此ニ附子理中
ヲ用レ氏四逆湯ノ本分量ニ用ルル効アルニシカ

サルル○痢疾發噦吐蛇者四逆湯參附湯或吳茱萸湯

毓春園
小冊

小承氣湯

方臭大
便閉餘

治大便不通噦數譫語

○是ハ不大便カ目的也主治ニ譫語ヲ云テアレ氏ソ
レニハ不拘ニ九噦アルモノ此ヲ診スルニ腹微滿ノ
不大便スル者ナラハ此方ヲ用ル

○此金匱ノ主治正ニケレ氏今此ヲ活用メ胃中ニ滯
滯アルト思フ者ニ用ユソノ処ニ此方ヲ用テ効ヲ得

ルヲ多シ其片ハ謔語ヤ舌胎ニ不拘メ但腹候ト不大
便トニテ用ヘシ余モト此方ヲ擴充メ用シハ噦ノ奇
方ニ平胃散ヲ用テアリテ珍重スルアリ京師ノ大家
ノ医ニカロソカニ此方ヲ用ル人ナトアリナルホト
コレヲミルニイカニモ効驗アリ因テ謂フニ噦ノ胃
中ノ鬱塞ヨリ来ル者アルヲシカラハトテモノ
ナラハ平胃ヨリハ承氣ヲ用ルカ其効速カナルヘシ
ト按メ后此症ニ會テ承氣ヲ試ミシニ果メ即効アリ
理中四逆吳茱萸湯ノ類ノ反對トミヘタリ叔平胃散
効アルノ方広ヘ凡但コレテ噦ヲ治スルノ妙劑ト竟

タル者可咲叔平生不大便家ノ噦ニハ承氣ニ不限通
仙丸ナトニテ下メモソレニテユルムヲアル者ニ

一方 艾肉ニ戔 甘草一戔 右ニ味以水一合半煮取一合

○是モ田間ヨリ傳ハリタル奇良ニコレモ通例ノ藥
ヲ用テモヤマヲ用ユコレモヨクキクモノト叔此
方傳來ノ分量ハ右ノ通りナレ凡今此ヲ劑スルニハ
羊減ニメ羊劑ノ量ヲ右ノ通りノ水量ニ煎メ用ヘシ
艾肉ハノミニクキ者ニテ羊減ニメモアマリノミヨ
キモノニアラス此方ニテモ初メ服スル片ハ止ミ難
キ勢ノ様ニミユルモノナレ凡再三オシテ用レハ后

ニハ治スルモノコレヲ如キ奇方ハ彼此ト手シ
尽メモ不愈ハイロクニテミルアリ其片ノ具
又方 刀豆 二個 右一味剉以水一合并温服又燒存性白

湯調服ニ錢即効

○コレモ余モ田間ヨリ傳ハリニ方ナレ本草ニ
アル又田春ナトニモコレハ生ニテモク
ロヤキニテモ何シニテモ効アルモノノ嗽ハイロク
一モモ治セ又者アル故奇方モ用子ハナラヌアルモ
ノ此方ノ如キモ初メヨリ用ルニアラヌ而初メ
ヨリ此方ヲ用ル医者ナトモアリテ時々効アル方ニ

滾痰丸

方在
別集

○痰飲ヨリノ癡嗽スルアリ滾痰丸主之又痰飲家ニ
真ノ嗽ニアラヌメキチツマルアリ其処ニモ用ユ
痰飲ヨリ未ル嗽ノ候ハ証マ腹侯ナト参考メ知ヘシ
其人痰飲ニヨリテ欬嗽スルト痰沫ヲ吐ク子或痰ニ
テ胸塞リテ嗽スルナトノ類是ノ右ノ証ニ滾痰ヲ用
テソレニテモ不治ハ或灸ナトヲ行フテ見ルヲア
リ痞根ナトニスルヲモアルニ

灸法 気海 期門 関元 腎俞 ○一男子痢重嗽
起灸痞根及数所得愈

○凡噦ノ灸ハミナ寒証ノ者ニ用ユ熱証ノ者ハ灸ノ
假使一應効アリ疔復ハ子カヘルモノハ痢病后ノ噦
逆呉茱萸湯ニテ治シタル者一人アリ灸ニテ治シタ
ルモノ一人アリ其它ハミナ灸タリスヘテ痢后ノ噦
ハ必灸云ホトノヲ云

○舊本ニ黃連解毒ヲ載テアリ是ハ熱ニテ灸スルモ
ハ熱毒后腫物ナト内攻ニヨリテ出ル噦ニ用ル
是熱噦テ古人黃連解毒ヲ用テアレ疔アマリイラヌ
藥ハ此場ハ大ハ浮心劑ニテスムハ故ニ今本ニハ劑

リ去タリ

○噦逆猪胆一味為丸用ルモ亦効アルモノ云

○藏書

