



門中
補 595
卷 18

御纂醫宗金鑑卷二十三

訂正仲景全書金匱要略註下之二目錄

藏書

圖

婦人妊娠篇第二十

桂枝茯苓圓

附子湯

膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏圓

當歸貝母苦參圓

目錄

葵子茯苓散

當歸散

白朮散

婦人產後篇第二十一

枳實芍藥散

下瘀血湯

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大圓

白頭翁加甘草阿膠湯

婦人雜病篇第二十二

半夏厚朴湯

甘草小麥大棗湯

溫經湯

土瓜根湯

旋覆花湯

膠薑湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石湯

紅藍花酒

腎氣圓

蛇床子散

狼牙湯

小兒疳蟲蝕齒方

雜療篇第二十三

四時加減柴胡飲子

長服訶黎勒圓

三物備急圓

紫石寒食散

治尸厥方 共二方

救卒死方 共五方

救卒死壯熱方

救卒死兩目閉者方

救卒死而張口反折者方

救卒死四肢不收失便者方



救小兒卒死吐利不知是何病方

救卒死客忤二方

救自縊方

療中暈方

救溺死方

馬隆及一切筋骨損方

御纂醫宗金鑑卷二十三

仲景全書金匱要略註下之二



妊娠病脈證并治第二

師曰婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

註

婦人經斷得平脈無寒熱則內外無病其人渴不能食乃妊娠惡阻之漸也故陰脈雖小弱亦可斷為有孕但惡阻於法六十日當有

此證設醫不知是孕而治逆其法却一月卽有此證也若更加吐下者則宜絕止醫藥聽其自愈可也然脈平無寒熱用桂枝湯與妊娠渴不能食者不合且文義斷續不純其中必有脫簡

集註

徐彬曰平脈者不見病脈一如平人也陰脈小弱者脈形小不大軟弱無力非細也諸脈既平而獨下焦陰脈微見不同是中上二焦無病乃反見渴不能食之證則渴非上焦之熱不能食亦非胃家之病矣少陽有嘿嘿不欲食之證今無寒熱亦無少陽表證可疑矣是渴乃陰火上熾不能食乃惡心阻食陰脈小乃胎元蝕氣故曰名妊娠也

李彭曰此節病證卽妊娠惡阻是也寸爲陽脈主氣尺爲陰脈主血陰脈小弱者血不足也血以養胎則液竭而渴又脾爲坤土厚德載物胎氣賴以奠安不能食者脾氣弱也凡有他病而渴不能食者脈必不平而有寒熱

今雖不能食反得平脈又無寒熱故主妊娠

桂枝湯方

見下利中

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者為癥痼害妊娠六月動者前三月經水利時胎也下血者後斷三月衄也所以血不足者其癥不去故也當下其癥桂枝茯苓丸主之

註

經斷有孕名曰妊娠妊娠下血則為漏下婦人宿有癥痼之疾而育胎者未及三月而得漏下下血不止胎動不安者此為癥痼害之

也已及六月而得漏下下血胎動不安者此亦癥痼害之也然有血衄成塊者以前三月經雖斷血未盛胎尚弱未可下其癥痼也後三月血成衄胎已強故主之桂枝茯苓丸當下其癥痼也此示人妊娠有病當攻病之義也此條文義不純其中必有關文姑存其理可也

集註

婁全善曰凡胎動多當臍今動在臍上者故知是癥也

程林曰此有癥病而懷胎者雖有漏血不止皆癥瘕之爲害非胎動胎漏之證下其癥瘕妊娠自安此內經所謂有故無殞亦無殞也方氏曰胎動胎漏皆下血而胎動有腹痛胎漏無腹痛故胎動宜行氣胎漏宜清熱魏荔彤曰胎與衄之辨當於血未斷之前三月求之前三月之經水順利則經斷必是胎前三月有曾經下血者則經斷必成衄

桂枝茯苓丸

桂枝

茯苓

牡丹

桃仁

芍藥

各等分
右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三丸

婦人懷娠六七月脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子藏開故也當以附子湯溫其藏

註 婦人懷娠六七月脈弦發熱似表證也若其

胎愈脹腹痛惡寒而無頭痛身痛則非表證也少腹如扇狀其惡寒如扇風之侵襲也所以然者因其人陽虛子藏開寒邪侵入故用附子湯溫子藏而逐寒但方缺文亦不純必有殘缺

集註

程林曰胎脹腹痛亦令人發熱惡寒少腹如扇者陰寒勝也妊娠陰陽調和則胎氣安今陽虛陰盛不能約束胞胎故子藏為之開也附子湯用以溫經

李彭曰按子藏即子宮也臍下三寸為關元關元左二寸為胞門右二寸為子戶命門為女子繫胞之處非謂命門即子藏也蓋命門是穴名在腰後兩腎中附脊骨之第十四椎之兩旁今經文明說少腹如扇者子藏開則子藏在少腹明矣豈有在少腹者而反謂其在脊後者乎此悞也
尤怡曰脈弦發熱有似表證而乃身不痛而腹反痛背不惡寒而腹反惡寒甚至少腹陣

陣作冷若或扇之者其所以然者子藏開不能闔而風冷之氣乘之也夫藏開風入其陰內勝則其脈弦為陰氣而發熱且為格陽矣胎脹者熱則消寒則脹也附子湯方未見然溫裏散寒之意槩可推矣

師曰婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻膠艾湯主之

註

五六月墮胎者謂之半產婦人有漏下下血之疾至五六月墮胎而下血不絕者此癥瘕之害也若無癥瘕下血惟腹中痛者則為胞阻胞阻者胞中氣血不和而阻其化育也故用芎歸膠艾湯溫和其血血和而胎育也

集註

程林曰漏下者妊娠經來脈經以陽不足謂之激經也半產者以四五月墮胎墮胎必傷其血海血因續下不絕也若妊娠下血腹中痛為胞阻則用膠艾湯以治

尤怡曰婦人經水淋瀝及胎產前後下血不

止者皆衝任脈虛而陰氣不能守也是惟膠艾湯能補而固之

芎歸膠艾湯方

芎藭

阿膠

甘草

艾葉

當歸

芍藥

乾地黄

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠令消盡溫服一升日三服不差更作

婦人懷娠腹中疝痛當歸芍藥散主之

按 妊娠腹中急痛用此方未詳其義必是脫簡不釋

當歸芍藥散方

當歸 三兩

芍藥 一斤

茯苓 四兩

白朮 四兩

澤瀉 半斤

芎藭 半斤

右六味杵為散取方寸匕酒和日三服

妊娠嘔吐不止乾薑人參半夏丸主之

註 妊娠嘔吐謂之惡阻、惡阻者、謂胃中素有寒、飲惡阻其胎而妨飲食也、主之以乾薑去寒、半夏止嘔、惡阻之人、日日嘔吐必傷胃氣、故又佐人參也。

集註

程林曰寒在胃脘則令嘔吐不止故用乾薑散寒半夏生薑止嘔人參和胃半夏乾薑能下胎婁全善云余治娠阻病累用半夏未嘗動胎亦有故無殞之義臨病之工何必拘泥尤怡曰此益虛溫胃之法為妊娠中虛而有寒者設也夫陽明之脈順而下行者也有寒則逆有熱亦逆逆則飲必從之而妊娠之體精凝血聚每多蘊而成熱者矣按外臺方青竹茹橘皮半夏各五兩生薑茯苓各四兩麥冬人參各三兩為治胃熱氣逆嘔吐之法可補仲景之未備也

乾薑人參半夏丸方

乾薑

人參

各一兩

半夏

二兩

右三味末之以生薑汁糊為丸加梧子大飲服十丸日三服

妊娠小便難飲食如故當歸貝母苦參丸主之

按方證不合必有脫簡不釋

當歸貝母苦參丸方

當歸

貝母

苦參

各四兩

右三味末之煉蜜為丸如小豆大飲服三丸加至十丸

妊娠有水氣身重小便不利灑淅惡寒起即頭眩
葵子茯苓散主之

註

妊娠外有水氣則浮腫灑淅惡寒水盛貯於肌膚故身重內有水氣則小便不利水盛阻遏陽氣上升故起即頭眩也用葵子茯苓者是專以通竅利水為主也

葵子茯苓散方

葵子 一升

茯苓 三兩

右二味杵為散飲服方寸七日三服小便利

則愈

婦人妊娠宜常服當歸散主之

註

妊娠無病不須服藥若其人瘦而有熱恐耗血傷胎宜常服此以安之

集註

尤怡曰妊娠最慮熱傷故於芎歸芍藥養血之中用黃芩清熱佐白术和胃也震亨稱黃芩白术為安胎聖藥夫芩术非能安胎者也芩去其濕熱其胎自安耳

當歸散方

當歸

黃芩

芍藥

芎藭

白术

半斤

各一斤

右五味杵為散酒飲服方寸七日再服妊娠常服即易產胎無苦疾產後百病悉主之

妊娠養胎白术散主之

註

妊娠婦人肥白有寒恐其傷胎宜常服此

集註

尤怡曰妊娠傷胎有因熱者亦有因寒者隨人藏氣之陰陽而各異也當歸散正治熱之

劑白朮散君白朮和胃臣川芎調血使蜀椒
去寒佐牡蠣安胎也則正治寒之劑也仲景
並列於此其所以昭示後人者深矣

白朮散方

白朮

芎藭

蜀椒

三分
去汗

牡蠣

右四味杵爲散酒服一錢七日三服夜一服
但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芎藭心煩吐
痛不能食飲加細辛一兩半夏大者二十枚

服之後更以醋漿水服之若嘔以醋漿水服
之復不解者小麥汁服之已後渴者大麥粥
服之病雖愈服之勿置

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰已下重如有
水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺
瀉勞宮及關元小便微利則愈

按文義未詳此穴刺之落胎必是錯簡不釋

婦人產後病脈證并治第二十一

問曰新產婦人有三病一者病瘧二者病鬱冒三

者大便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘵亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難

註

新產之婦畏其無汗若無汗則榮衛不和而有發熱無汗似乎傷寒表病者但舌無白胎可辨也故喜其有汗而又恐汗出過多表陽不固風邪易入而爲項強腰背反張之瘵病也新產之婦畏血不行若不行則血瘀於裏而有發熱腹痛似乎傷寒裏病者但以舌無黃胎可辨也故喜其血下而又恐血下過多陰亡失守虛陽上厥而爲昏冒不省合目汗出之血暈也新產雖喜其出汗喜其血行又恐不免過傷陰液致令胃乾腸燥而有潮熱譫語大便鞭難似乎陽明胃家實者故仲景於產後首出三病不只爲防未然之病而更爲辨已然之疑也昏冒而曰鬱冒者謂陰陽虛鬱不相交通而致冒也

集註

尤怡曰瘵筋病也血虛汗出筋脈失養風入

而益其勁也鬱冒神病也亡陰血虛陽氣遂厥而陰復鬱之則頭眩而目昏大便難者液病也胃藏津液滲灌諸陽亡津液胃燥則大腸失其潤而便難也三者不同其爲亡血傷津則一也

產婦鬱冒其脈微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之病解能食七八日更發熱者此爲胃實大承氣湯主之

註

此承上條互詳其義以明其治也產婦昏冒脈微弱者是氣血俱虛應得之診也不能食者是胃氣未和應得之候也大便反堅者是腸胃枯乾應得之病也究之鬱冒所以然者由血虛則陰虛陰虛則陽氣上厥而必冒也冒家欲解必大汗出者是陽氣鬱得以外洩而解也故產婦喜汗出也由此推之血瘀致

御醫醫案全錄 卷二十三 三
冒解必當血下是陰氣鬱得以內輸而解也
最忌者但頭汗出則爲陰亡下厥孤陽上出
也大便堅嘔不能食用小柴胡湯必其人舌
有胎身無汗形氣不衰者始可故病得解自
能食也若有汗當減柴胡無熱當減黃芩嘔
則當倍薑半虛則當倍人參又在臨證之變
通也大便堅七八日更發熱用大承氣湯亦
必其人形氣俱實胃強能食者始可也若氣
弱液乾因虛致燥難堪攻下者則又當內用
元明粉以軟堅燥外用諸導法以潤廣腸緩
緩圖之也

集註

尤怡曰鬱冒雖有客邪而其本則爲裏虛故
其脈微弱也嘔不能食大便反堅但頭汗出
津液上行不下逮之象所以然者亡陰血虛
孤陽上厥而津液從之也厥者必冒冒家欲
解必大汗出者陰陽乍離故厥而冒及陰陽
復通汗乃大出而解也產婦新虛不宜多汗
而此反喜汗出者血去陰虛陽受邪氣而獨

盛汗出則邪去陽弱而後與陰相和所謂損陽而就陰是也

小柴胡湯

見嘔吐中

大承氣湯

見痙病中

產婦腹中疝痛當歸生薑羊肉湯主之并治腹中寒疝虛勞不足

註

產後暴然腹中急痛產後虛寒痛也主之當歸生薑羊肉湯者補虛散寒止痛也并治虛勞不足寒疝腹痛者亦以其虛而寒也

集註

程林曰產後血虛有寒則腹中急痛內經曰味厚者為陰當歸羊肉味厚者用以補產後之陰佐生薑以散腹中之寒則疝痛自止夫辛能散寒補能去弱三味辛溫補劑也故并主虛勞寒疝
魏荔彤曰妊娠之疝痛胞阻於血寒也產後腹中疝痛者裏虛而血寒也一阻一虛而治法異矣

當歸生薑羊肉湯方

見寒疝中

產後腹痛煩滿不得臥枳實芍藥散主之

註

產後腹痛不煩不滿裏虛也今腹痛煩滿不得臥裏實也氣結血凝而痛故用枳實破氣結芍藥調腹痛枳實炒令黑者蓋因產婦氣不實也并主癰膿亦因血為氣凝久而腐化者也佐以麥粥恐傷產婦之胃也

集註

尤怡曰產後腹痛而至煩滿不得臥知血鬱而成熱且下病而礙上也與虛寒疝痛不同矣

枳實芍藥散方

枳實

燒令黑勿太過

芍藥

等分

右二味杵為散服方寸七日三服并主癰膿以麥粥下之

師曰產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利

註

產婦腹痛屬氣結血凝者枳實芍藥散以調之假令服後不愈此為熱灼血乾著於臍下

而痛非枳實芍藥之所能治也宜下瘀血主
之下瘀血湯攻熱下瘀血也並主經水不通
亦因熱灼血乾故也

下瘀血湯方

大黃 三兩

桃仁 二十枚

蟅蟲 二十枚
熬去足

右三味末之煉蜜和為四丸以酒一升煎一
丸取八合頓服之新血下如豚肝

集註程林曰蟅蟲主開血閉大黃主攻瘀血桃仁

主破死血

產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡露不盡不
大便煩躁發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩躁
者不食食則譫語至夜即愈宜大承氣湯主之熱
在裏結在膀胱也

按

熱在裏結在膀胱也之八字當在本條上文
惡露不盡之下未有大承氣湯下膀胱血之
理必是傳寫之譌再倍二字當是衍文

註無太陽證無表證也少腹堅痛有裏證也因

其產後七八日有畜血裏證而無太陽表證則可知非傷寒太陽隨經瘀熱在裏之病乃產後惡露未盡熱結膀胱之病當主以下瘀血可也若不大便不食譫語煩躁發熱日晡更甚至夜即愈此爲胃實之病非惡露不盡之病以其日晡更甚至夜即愈則可知病不在血分而在胃也故以大承氣湯下之

集註

李彭曰此一節具兩證在內一是太陽畜血證一是陽明裏實證因古人文法錯綜故難

辨也無太陽證謂無表證也少腹堅痛者以肝藏血少腹爲肝經部分故血必結於此則堅痛亦在此此惡露不盡是爲熱在裏結在膀胱此太陽畜血證也宜下去瘀血若不大便煩躁脈實譫語者陽明裏實也再倍發熱者熱在裏蒸蒸發於外也陽明旺於申酉戌日晡是陽明向旺時故煩躁不能食病在陽而不在陰故至夜則愈此陽明府病也宜大承氣湯以下胃實

按傷寒論曰陽明病不能食攻其熱必噦以胃中虛冷故也又云發熱者尤當先解表乃可攻之況在產後豈可妄議攻下哉必認證果真方可用此

產後風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證續在耳可與陽旦湯

註

產後續感風邪數十日不解頭微痛惡寒時熱汗出表未解也雖有心下悶乾嘔之裏但有桂枝證在可與陽旦湯解表可也陽旦湯

即桂枝湯加黃芩陽旦證即桂枝證也

集註

沈明宗曰上下三條乃產後感冒證也世謂

產後氣血兩虛不論外感內傷皆以補虛為主而仲景拈傷寒中之風傷衛發熱仍以表裏陰陽去邪為訓故云產後中風數十日不解頭微痛惡寒時時有熱汗出乃太陽表未解也但心下悶乾嘔是外邪入於胸中之裏太陽表裏有邪謂之陽旦證故以桂枝湯加

黃芩而爲陽旦湯以風邪在表故用桂枝解肌邪入胸膈之間當以清涼解其內熱故加黃芩正謂不犯其虛是益其餘不補正而正自補不驅邪而邪自散斯爲產後感冒入神之妙方也奈後人不察其理反謂芍藥酸寒能伐生生之氣桂枝辛熱恐傷其血棄而不用以致病劇不解只因未窺仲景門墻耳故千金方以此加飴糖當歸爲當歸建中湯治產後諸虛或外感病推仲景之意嘗以此湯加減出入治產後諸病屢獲神效故表出之尤怡曰夫審證用藥不拘日數表裏旣分汗下斯判上條裏熱成實雖產後七八日與大承氣而不傷於峻此條表不解雖數十日之久與陽旦湯而不慮其散非通於權變者未足語此也

陽旦湯方

卽桂枝湯內加黃芩桂枝湯方見下利中

產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯主之

按

產後中風之下當有病瘥者之三字始與方

合若無此三字則人參附子施之於中風發熱可乎而又以竹葉命名者何所謂也且方內有頸項強用大附子之文本篇有證無方則可知必有脫簡

註產後汗多表虛而中風邪病瘧者主之竹葉湯發散太陽陽明兩經風邪用竹葉為君者以發熱面正赤有熱也用人參為臣者以產後而喘不足也頸項強急風邪之甚故佐附子嘔者氣逆故加半夏也

集註程林曰產後血虛多汗出喜中風故令病瘧今證中未至背反張而發熱面赤頭痛亦風瘧之漸也

竹葉湯方

竹葉 一把

葛根 二三兩

防風 一兩

桔梗

桂枝

人參

甘草 各一兩

附子 一枚

大棗 十五枚

生薑 三兩

右十味以水一斗煮取二升半分溫三服溫
覆使汗出頸項強用大附子一枚破之如豆
大前藥揚去沫嘔者加大半夏半升洗

婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之

按此條文義證藥未詳

竹皮大丸方

生竹茹 二分

石膏 二分

桂枝 一分

甘草 七分

白薇 一分

右五味末之棗肉和丸彈子大以飲服一丸

日二夜二服有熱者倍白薇喘者加栝實一

分

集解

濟陰綱目云中虛不可用石膏煩亂不可用

桂枝此方以甘草七分配眾藥六分又以棗

肉為丸仍以一丸飲下可想其立方之微用

藥之難審虛實之不易也仍飲服者尤慮夫

虛虛之禍耳用是方者亦當深省

產後下利及虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之

按此條文義證藥不合不釋

白頭翁加甘草阿膠湯方

白頭翁

甘草

阿膠各二兩

秦皮

黃連

藥皮各三兩

右六味以水七升煮取二升半內膠令消盡分溫三服

婦人雜病脈證并治第二十二

婦人之病因虛積冷結氣為諸經水斷絕至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成肺癰形體損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇疼痛與臟相連或結熱中痛在關元脈數無瘡肌若魚鱗時著男子非止女身在下來多經候不勻令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣街氣衝急痛膝脛疼煩奄忽眩冒狀如厥癩或有憂慘悲傷多嘆此皆帶下非有鬼神久則羸瘦脈虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實緊弦行其鍼藥治危得安其雖同病脈各異源子當辯記勿謂不

然

按

此條爲婦人雜病提綱當冠篇首以揭病情在下來多之來字當是未字本條皆經水斷絕之病若係來多則與上文不合與下文經候不勻亦不合又本條內有此皆帶下一句

當在非有鬼神之下文義相屬是傳寫之譌

註

此條爲婦人諸病綱領其病之所以異於男子者以其有月經也其月經致病之根源則多因虛損積冷結氣也三者一有所感皆能

使經水斷絕至有歷年寒積胞門以致血凝氣結而不行者先哲云女子以經調爲無病若經不調則變病百出矣以下皆言三者阻經之變病其變病之不同各因其人之臟腑經絡寒熱虛實之異也如寒外傷經絡其人上焦素寒則凝堅在上故上焦胸肺受病也形寒傷肺則氣滯阻飲故嘔吐涎唾也若其人上焦素熱寒同其化久則成熱熱傷其肺故成肺癰而形體損瘦也若其中焦素寒

則在中盤結故繞臍疝痛也或兩脇疼痛是
中焦之部連及肝臟故也或其人中焦素熱
則不病寒疝而病結熱於中矣中熱故不能
爲寒疝而繞臍之痛仍在關元也其人脈數
當生瘡若無瘡則熱必灼陰皮膚失潤故肌
粗若魚鱗也然此嘔吐涎唾寒疝疼痛肌若
魚鱗等病亦時著男子非止女子病也在下
未多謂經候不勻而血不多下也邪侵胞中
乃下焦之部故病陰中掣痛少腹惡寒也或
痛引腰脊下根氣衝急痛腰膝疼煩皆胞中
衝任爲病所必然也或痛極奄忽眩冒狀如
厥癩亦痛甚之常狀也若其人或有憂慘悲
傷多嗔之遇而見此眩冒厥巔之證實非有
鬼神也凡此胞中衝任血病皆能病帶故諺
曰十女九帶也然帶下病久津液必傷形必
羸瘦診其脈虛審其多寒豈止病此三十六
病而千變萬端矣雖千變萬端然必審脈陰
陽虛實緊弦與病叅究行其鍼藥治危得安

也其有病雖同而脈不同者則當詳加審辨
故曰子當辨記勿謂不然也

婦人咽中如有炙臠半夏厚朴湯主之

註咽中如有炙臠謂咽中有痰涎如同炙肉咯

之不出嚥之不下者即今之梅核氣病也此
病得於七情鬱氣凝涎而生故用半夏厚朴
生薑辛以散結苦以降逆茯苓佐半夏以利
飲行涎紫蘇芳香以宣通鬱氣俾氣舒涎去
病自愈矣此證男子亦有不獨婦人也

集註尤怡曰凝痰結氣阻塞咽嗑之間千金所謂

咽中帖帖如有炙肉吞之不下吐之不出者
是也

半夏厚朴湯方

半夏 一升

厚朴 三兩

茯苓 四兩

生薑 五兩

乾蘇葉 二兩

右五味以水七升煮取四升分溫四服日三
夜一服

婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘
麥大棗湯主之

按甘草小麥大棗湯方義未詳必是譌錯

註藏心藏也心靜則神藏若為七情所傷則心
不得靜而神躁擾不寧也故喜悲傷欲哭是
半夏神不能主情也象如神靈所憑是心不能神
明也即今之矢志癲狂病也數欠伸喝欠也
喝欠頓悶肝之病也母能令子實故證及也

甘草小麥大棗湯方

甘草 三兩

小麥 一升

大棗 十枚

右三味以水六升煮取三升溫分三服亦補
脾氣

婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎
沫小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

註吐涎沫形寒飲冷也不溫散而反下之則寒
飲虛結成痞鞭也當先治其吐涎沫以小青
龍湯治外寒內飲俟涎沫止以半夏瀉心湯

乃治痞也

集註

尤怡曰吐涎沫上焦有寒飲也不與溫散而反下之則寒內入而成痞然雖痞而猶吐涎沫是寒飲未已不可治痞當先治飲而後治痞亦如傷寒例表解乃可攻痞也

小青龍湯方

見肺癰中

瀉心湯方

見驚悸中

問曰婦人年五十所病下利數十日不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之當以溫經湯主之

按

所病下利之利字當是血字文義相屬必是傳寫之譌

註

婦人年已五十衝任皆虛天癸當竭地道不通矣今下血數十日不止宿瘀下也五心煩熱陰血虛也唇口乾燥任衝血傷不上榮也少腹急滿胞中有寒瘀不行也此皆曾經半

產崩中新血難生瘀血未盡風寒客於胞中
爲帶下爲崩中爲經水愆期爲胞寒不孕均
用溫經湯主之者以此方生新去瘀煖子宮
補衝任也

集註

李彰曰婦人年五十則已過七七之期任脈
虛太衝脈衰天癸竭地道不通時也所病下
利據本文帶下觀之當是崩淋下血之病蓋
血屬陰陰虛故發熱暮亦屬陰也任主胞胎
衝爲血海二脈皆起於胞宮而出於會陰正

當少腹部分衝脈俠臍上行故衝任脈虛則
少腹裏急有乾血亦令腹滿內經云任脈爲
病女子帶下瘕聚是也手背爲陽掌心爲陰
乃手三陰過脈之處陰虛故掌中煩熱也陽
明脈俠口環唇與衝脈會於氣街皆屬於帶
脈難經云血主濡之以衝脈血阻不行則陽
明津液衰少不能濡潤故唇口乾燥斷以病
屬帶下以曾經半產少腹瘀血不去則津液
不布新血不生此則唇口乾燥之所由生也

溫經湯方

吳茱萸 三兩

當歸

芍藥

芍藥 各二兩

人參

桂枝

牡丹皮

阿膠

生薑 各二兩

甘草 二兩

半夏 半升

麥門冬 一升 去心

右十二味以水一斗煮取三升分溫三服

亦主婦人少腹寒久不受胎兼取崩中去血

或月水來過多及至期不來

集解

李彭曰內經云血氣虛者喜溫而惡寒寒則

凝澁不流溫則消而去之此湯名溫經以瘀

血得溫即行也方內皆補養氣血之藥未嘗

以逐瘀為事而瘀血自去者此養正邪自消

之法也故婦人崩淋不孕月事不調者並主

之

帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者土瓜根

散主之

按再字當是不字若是再字一月兩來與上文不利不合是傳寫之譌

註

此亦前條在下未多經候不勻之證帶下胞中病也胞中有宿瘀從氣分或寒化則為白帶從血分或熱化則為赤帶從氣血寒熱錯雜之化則為雜色之帶也若兼經水不利少腹滿痛乃有瘀血故也其經至期不見主以土瓜根散者土瓜能逐瘀血廔蟲能開血閉桂枝合芍藥舒陽益陰通和營氣則瘀去血和經調帶止矣

土瓜根散方

土瓜根

芍藥

桂枝

廔蟲 各三分

右四味杵為散酒服方寸七日三服

寸口脈弦而大弦則為減大則為朮減則為寒朮則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下旋覆花湯主之

按

此條詳在傷寒論辨脈法篇錯簡在此旋覆

花湯主之一句亦必是錯簡半產漏下則氣已下陷焉有再用旋覆下氣之理

旋覆花湯方

旋覆花 三兩

葱 十四莖

新絳 少許

右三味以水三升煮取一升頓服之

婦人陷經漏下黑不解膠薑湯主之

註 陷經者謂經血下陷即今之漏下崩中病也

黑不解不成文膠薑湯方亦缺

集註 李彭曰陷經漏下謂經脈下陷而血漏下不

止乃氣不攝血也黑不解者瘀血不去則新

血不生榮氣腐敗也然氣血喜溫惡寒用膠

薑湯溫養氣血則氣盛血充推陳致新而經

自調矣

按 此條文義必有缺誤姑採此註以見大意

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生後者此

為水與血俱結在血室也大黃甘遂湯主之

註 敦大也少腹胞之室也胞為血海有滿大之

狀是血畜也若小便微難而不渴者水亦畜也此病若在生育之後則為水與血俱結在血室也主之大黃甘遂湯是木血並攻之法也

大黃甘遂湯方

大黃

四兩

甘遂

二兩

阿膠

二兩

右三味以水三升煮取一升頓服之其血當下

婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

註 詳見傷寒論少陽篇內不復釋

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈

註 詳見傷寒論少陽篇內不復釋

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除

脈遲身涼和胸脇滿如結胸狀讖語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

註 詳見傷寒論少陽篇內不復釋

陽明病下血讖語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實而瀉之澱然汗出即愈

註 詳見傷寒論陽明篇內不復釋

婦人經水不利下抵當湯主之

註 婦人經水不利下言經行不通利快暢下也乃婦人恒有之病不過活瘀導氣調和衝任

足以愈之今日抵當湯主之夫抵當重內並無少腹結痛大便黑小便利發狂寒熱等證恐藥重病輕必有殘缺錯簡審之

抵當湯方

水蛭 三十箇熬 蟲蟲 三十枚熬

桃仁 二十箇 去皮尖 大黃 三兩 酒浸

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升

婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物
礬石丸主之

註藏陰內也不止不去也經水閉而不通瘀宿

血也陰中堅塊不去血乾凝也下白物化血

成帶也用礬石丸坐藥治之此方治下白物

若從濕化者可也恐未能攻堅癖乾血

集尤怡曰藏堅癖不止者子藏乾血堅凝成癖

而不去也乾血不去則新血不榮而經閉不

利矣由是蓄洩不時胞宮素濕所積之血與

濕化而成白物時時自下是宜先去其藏之

濕礬石燥濕木杏仁潤乾血也

礬石丸方

礬石 三分燒

杏仁 一分

右二味末之煉蜜和丸如棗核大內藏中劇
者再內之

婦人六十二種風及腹中血氣刺痛紅藍花酒主
之

註六十二種風無可考腹中血氣刺痛用紅藍

花酒通經行血誠要方也

紅藍花酒方

紅藍花 一兩

右一味以酒一大升煎減半頓服一半未去再服

婦人腹中諸疾痛當歸芍藥散主之

註

諸疾腹痛謂婦人腹中諸種疾痛也既曰諸疾痛則寒熱虛實氣食等邪皆令腹痛豈能以此一方藥治諸疾痛耶當歸芍藥散主之

必是錯簡

見妊娠中

當歸芍藥散方

見妊娠中

婦人腹中痛小建中湯主之

註

若因木盛土衰中虛急痛者用此補虛緩中定痛可也

小建中湯方

見虛勞中

問曰婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈宜腎氣丸主之

註 病不在胃故飲食如故也病在於胞故不得
 溺也陽氣不化故煩熱也水不得下行故倚
 息不得臥也名曰轉胞以胞系乖戾不爽也
 故致此病但當利小便則愈主之腎氣丸以
 溫行下焦陽氣陽氣化則溺出諸病自解矣
 胞者乃謂尿胞非血胞也

集註

趙良曰此方在虛勞中治腰痛小便不利小
 便拘急此亦用之何也蓋因腎虛用之也用
 此補腎則氣化氣化則水行而愈矣然轉胞

之病豈盡由下焦腎虛氣不化出致耶或中
 焦脾虛不能散精歸於胞及上焦肺虛不能
 下輸布於胞或胎重壓其胞或忍溺入房皆
 足成此病必求其所因以治之也

腎氣丸方

乾地黄 八兩

薯蕷 四兩

山茱萸 四兩

澤瀉 三兩

茯苓 三兩

牡丹皮 三兩

桂枝

附子 炮各一兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸
加至二十五丸日再服

集解

李彬曰方名腎氣丸者氣屬陽補腎中真陽
之氣也內具六味丸壯腎水以滋小便之源
附桂益命門火以化膀胱之氣則薰蒸津液
水道以通而小便自利此所以不用五苓散
而用腎氣丸也

婦人陰寒溫中坐藥蛇床子散主之

註

陰寒前陰寒也治以溫中坐藥蛇床子性溫

熱能壯陽故納之以助陽驅陰也

集註

沈明宗曰此治陰掣痛少腹惡寒之方也胞
門陽虛受寒現證不一非惟少腹惡寒之一
證也但寒從陰戶所受不從表出當溫其受
邪之處則病得愈故以蛇床子一味大熱溫
助其陽納入陰中俾子宮得暖邪去而病自
愈矣

蛇床子散方

蛇床子仁

右一味末以白粉少許和合相得如棗大綿裹內之自然溫

少陰脈滑而數者陰中卽生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯洗之

註陰中卽前陰也生瘡蝕爛乃濕熱不潔而生
蠶也用狼牙湯洗之以除濕熱殺蠶也狼牙
非狼之牙乃狼牙草也如不得以狼毒代之
亦可其瘡深洗不可及則用後法也

集李彭曰少陰屬腎陰中腎之竅也內經曰滑

者陰氣有餘又云數則爲熱故陰中生瘡蝕
爛皆濕熱所致狼牙味苦性寒寒能勝熱苦
能殺蟲故主洗之

狼牙湯方

狼牙 四兩

右一味以水四升煮取半升以綿纏筋如繭
浸湯漚陰中日四遍

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎導
之

按膏髮煎導之之五字當是衍文此穀氣之實也之下當有長服訶梨勒丸之六字後陰下氣謂之氣利用訶梨勒散前陰下氣謂之陰吹用訶梨勒丸文義始屬藥病亦對蓋訶梨勒丸以訶梨勒固下氣之虛以厚朴陳皮平穀氣之實亦相允合方錯簡在雜療篇內下小兒疳蟲蝕齒一方殺蟲解毒或另有小兒門或列在雜方內今於婦人雜病之末亦錯簡也

註腎虛不固則氣下泄陰吹而正喧謂前陰出氣有聲也此穀氣之實謂胃氣實而腎氣虛也以訶梨勒丸固下氣而瀉穀氣也

膏髮煎方 見黃疸中

小兒疳蟲蝕齒方

雄黃 葶藶

右二味末之取臘月猪脂鎔以槐枝綿裹頭四五枚點藥烙之

雜療方第二十三

退五藏虛熱四時加減柴胡飲子方

冬三月加柴胡 八分 白朮 八分

陳皮 五分 大腹檳榔 四枚并皮子者

生薑 五分 桔梗 七分

春三月加枳實 減白朮 共六味

夏三月加生薑 三分 枳實 五分

甘草 三分共八味 秋三月加陳皮 三分共六味

右各咬咀分為三貼一貼以水三升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服如四體

壅添甘草少許每貼分作三小貼每小貼以

水一升煮取七合溫服再合滓為一服重煮

都成四服 疑非仲景方

按 此方證不屬不釋

長服訶梨勒丸方

訶梨勒 陳皮

厚朴 各三兩

右三味末之煉蜜丸如桐子大酒飲服二十

丸加至三十九

按此方當在前篇穀氣之實也之下

三物備急方

大黃 一兩
乾薑 一兩

巴豆 一兩去皮心
熬外研如脂

右藥各須精新先搗大黃乾薑為末研巴豆
內中合治一千杵用為散蜜和丸亦加密器
中貯之莫令泄氣主心腹諸卒暴百病若中
惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤停
尸卒死者以煖水苦酒服大豆許三四丸或
不下捧頭起灌令下咽須臾當差如未差更
與三丸當腹中鳴即吐下便差若口噤亦須
折齒灌之

方名備急者以備暴然諸腹滿腹急痛及中

惡客忤噤閉卒死者也若口噤亦須折齒灌
之是恐人不急救則死之義然不如後人管
吹入鼻中之法為良

集李彭曰人卒得病欲死者皆感毒厲邪陰不

正之氣而然三物相須能蕩邪安正或吐或

御纂醫宗金鑑 卷三十三 下使穢氣上下分消誠足備一時急需也

治傷寒令愈不復紫石寒食散方

紫石英

赤石脂亦人不食鍾乳 碓煉

栝蔞根 防風

桔梗 文蛤

鬼臼 各十分 太乙餘糧 十分燒

乾薑 附子炮去皮

桂枝去皮各四分

右十三味杵為散酒服方寸匕

按方未詳不釋

尸厥脈動而無氣氣閉不通故靜而死也治方

菖蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑着舌下

註形如不病人有氣而脈動失常名曰行屍卒

死不知人無氣而脈動如故名曰尸厥尸厥

乃正氣暴然為邪氣閉塞不通故靜而似死

用菖蒲內鼻桂着舌下是通心神啓陽氣也

又方

別取左角髮方寸燒末酒和灌令入喉立起

方解 菖蒲吹鼻桂著舌下而不愈者則用此法是

以髮乃血之餘血乃心所生用燒則發其陽
用酒則行氣血用本人者喜一氣相通也

救卒死方

薤搗汁灌鼻中

方解 卒然昏死皆尸厥也薤白類蒜而小北人謂

之小根菜南人謂之釣喬是也其味極辛搗
汁灌鼻亦通竅取嚏之意也

又方

雄鷄冠割取血管吹內鼻中

豬脂如鷄子大苦酒一升煮沸灌喉中

鷄肝及血塗面上以灰圍四旁立起

大豆二七粒以鷄子白并酒和盡以吞之

方解 雄鷄冠血及肝卵白豬脂大豆酒醋等物無

非用陽物以勝陰崇也管吹內鼻中謂將鷄
冠血或合熱酒含在不病人口內以葦管或
筆管插入病人鼻孔中使氣連藥吹之其藥

自能下咽氣通噤自開也

救卒死而壯熱者方

礬石半觔以水一斗半煮消以漬脚令没踝

註厥而身壯熱者陽厥府病也外以礬水浸脚

蓋以厥起於下而收攝陽氣也

集程林曰厥陽獨行故卒死而壯熱岐伯曰血

之與氣并走於上則為大厥厥則暴死礬石收攝藥也以之浸足而收斂其厥逆之氣

救卒死而目閉者方

騎牛臨面搗薤汁灌耳中吹皂莢鼻中立效

救卒死而張口反折者方

灸手足兩爪後十四壯了飲以五毒諸膏散有

巴豆者

註卒死張口反折者用灸以通陽氣但飲以五

毒諸膏方

救卒死而四肢不收失便者方

馬屎一升水三斗煮取二斗以洗之又取牛洞

稀糞也一升溫酒灌口中灸心下一寸臍上三寸

臍下四寸各一百壯差

註尸厥目閉口張失便反張四肢不收陰厥藏病也有如是之證者用騎牛臨面之法正所以厭邪也薤汁灌耳皂角吹鼻皆通其諸竅而閉塞者可通也灸手足甲後以通外陽法也馬屎取吐之法灸中皖關元以通內陽之法也

救小兒卒死而吐利不知是何病方

狗屎一丸絞取汁灌之無濕者水煮乾者取汁

方解凡屎皆發陽氣用狗屎亦取發陽氣也

救卒死客忤死還魂湯主之方

麻黃 三兩 去節 杏仁 七十個 去皮尖

甘草 一兩 炙

右三味以水八升煮取三升去滓分令咽之

通治諸感忤

註中惡客忤便閉裏實者仲景用備急丸可知無汗表實者不當用備急丸通裏當用還魂湯以通表也通裏者抑諸陰氣也通表者扶

諸陽氣也昧者不知以麻黃爲入太陽發汗之藥抑知不溫覆取汗則爲入太陰通陽之藥也陽氣通動魂可還矣

又方

韭根 一把

烏梅 二七個

吳茱萸 半升炒

右三味以水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者死煮取三升去滓分飲之

方 韭根吳茱萸烏梅之治亦收陽氣法也浮爲

陽沉爲陰陽生陰死義也

救自縊死旦至暮雖已冷必可治暮至旦小難也恐此當言分氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微溫者一日已上猶可治之

方

徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以脚踏其兩肩手少挽其髮常弦弦勿縱之一人以手按揉胸止數動之一人摩捋臂脛屈伸之若已僵但漸漸強屈之并按其腹如此一炊頃氣

從口出呼吸眼開而猶引按莫置亦勿苦勞之
須臾可少桂湯及粥清含之令濡喉漸漸能嚥
及稍止更令兩人以兩管吹其兩耳朵此法最
善無不活者

註

旦至暮陽氣有餘陽主生故雖已冷必可治
也暮至旦陰氣有餘陰主死故稍難也自縊
之人必可治者恐此當有言語忿爭氣盛不
散故可治也暮至旦固難治然遇夏時夜短
於晝又熱皆陽氣有餘猶應可治又云心下

若微溫者雖一日已上猶可治之觀此諄諄
告切仲景仁心惟恐人畏其繁瑣而不治也
此法嘗試之十全八九始知言果不謬弦弦
猶言緊緊也揉胸按腹摩臂脛屈伸之皆引
導其氣之法也

凡中暍死不可使得冷得冷便死療之方

屈草帶繞暍人臍使三兩人溺其中令溫亦可
用熱泥和屈草亦可扣瓦碗底按及車釭以著
暍人取令溺須得流去此謂道路窮卒無湯當

令溺其中欲使多人溺取令溫若湯便可與之不可泥及車缸恐此物冷暍既在夏月得熱泥土暖車缸亦可用也

註中暑卒死之人不可置放陰涼之處恐其閉熱在內猶被凍之人不可沃以熱湯恐其閉寒在內反為大害也

救溺死方

取竈中灰二石餘以埋人從頭至足水出七孔即活嘗試蠅子落水而死者用竈灰埋之自活

集解李昶曰竈灰得火土相生之氣以埋人則外

溫衛氣而內滲水濕故能使水出七孔而活

治墜馬及一切筋骨損方

大黃 一兩切浸湯成汁 緋帛 如手大燒灰

亂髮 如鷄子大燒灰用 久用炊單布 一尺燒灰

敗蒲 一握三寸 桃仁 四十九箇去皮尖蒸

甘草 如中指節炙剉

其

右七味以童子小便量多少煎湯成內酒一大盞次下大黃去滓分溫三服先剉敗蒲席

半領煎湯浴衣被蓋覆斯須通利數行痛處立差利及浴水赤勿怪卽瘀血也

註外浴以散其瘀內服以下其瘀斯兩得之矣

集徐彬曰從高墜下法當救損傷筋骨爲主然

頓跌之勢內外之血必無不瘀瘀不去則氣

不行氣不行則傷不愈故以桃仁大黃逐瘀

爲主緋帛紅花之餘亂髮血之餘合童便以

消瘀血湯浴能活周身氣血然筋骨瘀血必

有熱氣滯鬱故以炊單布受氣最多而易消

者以散滯以通氣從其類也加少炙甘草補中

以和諸藥也

