



和武
595
22

二十九
三十





御纂醫宗金鑑卷二十九

刪補名醫方論卷四目錄

黃連解毒湯

三黃湯

二黃湯

三黃石膏湯

涼膈散

竹葉黃耆湯

清胃散

導赤散

五淋散

八正散

逍遙散

龍膽瀉肝湯

左金丸

瀉青丸

當歸龍薈丸

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

清燥救肺湯

麥門冬湯

人參清肺湯

人參定喘湯

人參瀉肺湯

瀉白散

阿膠散

二陳湯

溫膽湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

外臺茯苓飲

御纂醫宗金鑑卷二十九



利補名醫方論卷四

黃連解毒湯

治一切陽熱火盛面赤口乾狂燥心煩錯語不眠大熱乾嘔吐血衄血及下後而便不實熱仍不已者

黃連

梔子 各等分

黃蘗

黃芩

水煎服

集注

汪昂曰寒極曰陰毒熱極曰陽毒是方名曰黃連解毒是君以黃連直解心經火毒也黃芩瀉肺經火毒黃蘗瀉腎經火毒梔子通瀉三焦火毒使諸火毒從膀胱出若大便秘實者加大黃名梔子金花湯利大便是使火毒從大小二便而出也蓋陽盛則陰衰火盛則水衰故用大苦大寒之藥抑陽而扶陰瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也然非實熱不可輕投

按

黃連解毒湯白虎湯三黃石膏湯大青龍湯皆治表裏俱熱證然大青龍湯治表實壯熱裏熱之淺在肌三黃石膏湯治表實壯熱裏熱之深在胃故一以石膏佐麻桂一以石膏佐麻豉均發太陽之表解陽明之裏也大青龍湯則更以杏草薑棗佐麻黃其意專發熱鬱之在肌也三黃石膏湯則更以芩連梔蘗佐石膏其意專瀉熱深之在胃也白虎湯治表熱在肌裏熱在胃所以不用麻桂以發太

陽專主石膏而清陽明也解毒湯治表熱在三陽裏熱在三焦所以亦不以麻桂發太陽表亦不以石膏清陽明裏而專以三黃瀉上下內外之實火也此皆太陽之邪侵及陽明而未入府成實者也若已入府成實則又當從事乎三承氣湯以下其熱也

三黃湯

治三焦實熱一切有餘火證大便秘結者

黃芩

大黃各等分

黃連

水煎服

一黃湯

治上焦火旺頭面大腫目赤腫痛心胸咽喉口舌耳鼻熱盛及生瘡毒者

黃芩

黃連

甘草 各等分

水煎食後服

註

三黃湯用黃芩瀉上焦火黃連瀉中焦火大黃瀉下焦火三焦實火大便實者誠為允當若大便不實者黃連解毒湯證也以大黃易黃蘗者因其下焦熱結未實也加梔子者使其熱不從大便出而從小便出也上中二焦實火用涼膈散若夫上焦實火則以此湯之大黃易甘草名二黃湯使芩連之性緩緩而下留連膈上張潔古以涼膈散減消黃加桔梗亦此義也雖同一瀉火之劑而其中上下緩急輕重之不同此皆加減轉換法也不可不知

三黃石膏湯

治傷寒陽證表裏大熱而不得汗或已經汗下
過經不解六脈洪數面赤鼻乾舌燥大渴煩躁
不眠譫語鼻衄發黃發疹發斑以上諸證凡表
實無汗而未入裏成實者均宜主之

石膏 兩半

黃芩

黃連

黃蘗

麻黃 已上各
七錢

淡豆豉 二合

梔子 三十
箇

每服一兩加葱三根水煎熱服氣實者倍服
仲景於表裏大熱立兩解之法如大青龍湯
治表裏大熱表實無汗故發汗汗出而兩得
解也白虎湯治表裏大熱因表有汗不主麻
桂因裏未實不主消黃惟以膏知甘草外解
陽明之肌熱內清陽明之府熱表裏清而兩
得解也若夫表實無汗熱鬱營衛裏未成實
熱盛三焦表裏大熱之證若以大青龍湯兩
解之則功不及於三焦若以白虎湯兩解之

則効不及於營衛故陶華製此湯以二黃瀉
三焦之火盛佐梔子屈曲下行使其在裏諸
熱從下而出以麻黃開營衛之熱鬱佐豉葱
直走皮毛使其在表之邪從外而散石膏倍
用重任之者以石膏外合麻豉取法乎青龍
是知解諸表之熱不能外乎青龍也內合三
黃取法乎白虎是知解諸裏之熱不能外乎
白虎也且麻豉得石膏三黃大發表熱而不
動裏熱三黃得石膏麻豉大清內熱而不礙

和集醫方卷之二十九 刪補名醫方論四

外邪是此方擅表裏俱熱之長亦得仲景之心法者也若表有微汗麻黃減半桂枝倍加以防外疎裏有微澹則減去石膏倍加葛根以避中虛也

涼膈散

治心火上盛中焦燥實煩躁口渴目赤頭眩口瘡唇裂吐血衄血大小便秘諸風癰癢胃熱發斑發狂及小兒驚急痘瘡黑陷

連翹 四兩 大黃 酒浸

黃芩 酒炒 薄荷 一兩

甘草 二兩 梔子 炒

芒消

右為末每服三錢加竹葉生蜜煎

集註 汪昂曰此上中二焦瀉實火藥也熱淫於內
治以鹹寒佐以苦甘故以連翹黃芩竹葉薄
荷散火於上而以大黃芒消之猛利蕩熱於
中使上升下行而膈自清矣用甘草生蜜者
病在膈甘以緩之也古方用涼膈散居多本
方加菖蒲遠志名轉舌膏治心經蘊熱加青
黛藍根名活命金丹治肝經風熱張潔古減
去消黃加桔梗為之舟楫浮而上行治上焦
諸熱便不實者宜之不可以此方過瀉而輕

竹葉黃耆湯

治消渴氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉

生地黃 各二錢

黃耆

麥冬

當歸

川芎

黃芩

甘草

芍藥

人參

半夏

石膏 各一錢

右水煎服

集註

柯琴曰氣血皆虛胃火獨盛善治者補瀉兼施寒之而不至損陽溫之而不至助火扶正而邪却矣四君子氣藥也加黃耆而去苓朮者恐火就燥也四物湯血藥也倍地黃而用生者正取其寒也人參黃耆甘草治煩熱之聖藥是補中有瀉矣且地黃之甘寒瀉心腎之火竹葉助芍藥清肝膽之火石膏佐芍藥清脾胃之火麥冬同黃芩清肺腸之火則胃火不得獨盛而氣血之得補可知惟半夏一味溫中辛散用之大寒劑中欲其通陰陽之路也岐伯治陰虛而目不瞑者飲以半夏湯覆杯則臥今人以爲燥而渴者禁用是不明陰陽之理耳

按

是方卽竹葉石膏湯加生地當歸白芍川芎黃耆黃芩也彼則治傷寒解後煩渴少氣氣逆欲吐此則治消渴氣血虛胃火盛因其氣虛故加黃耆佐人參甘草以補氣因其血虛故加歸芍芍地以補血因其胃火盛故加黃

芩佐石膏以清胃火其煩渴則一故餘藥皆同也於此二方推之用半夏之意自可知矣故脾者為胃行其津液也脾濕胃燥津液不行得火則化痰得寒則成飲胃火清脾濕燥其痰飲自除矣半夏消痰破飲使未化痰之津液回清而已成痰之濁液自化非他藥所可比倫也故二方於胃火盛燥渴中同用之

清胃散

治胃經濕熱齒齦腫痛或牽引頭腦或面發熱

升麻 甘草

生地黃 川黃連

牡丹皮 當歸

水煎服

集註羅謙輔曰陽明胃多氣多血又兩陽合明為

熱盛是以邪入而為病常實若大渴舌胎煩躁此傷氣分熱聚胃府燥其津液白虎湯主

之若醇飲肥厚炙燂過用以致濕熱壅於胃
府逆於經絡而為是病此傷血分治宜清胃
方中以生地益陰涼血為君佐之以丹皮去
蒸而疏其滯以黃連清熱燥濕為臣佐之以
當歸入血而循其經仍用升麻之辛涼為本
經捷使引諸藥直達血所則咽喉不清齒齦
代腫痛等證廓然俱清矣

導赤散

治心熱口糜舌瘡小便黃赤莖中作痛熱淋不
利

生地

木通

甘草稍

右三味水煎服

註

赤色屬心導赤者導心經之熱從小腸而出
以心與小腸為表裏也然所見口糜舌瘡小
便黃赤莖中作痛熱淋不利等證皆心熱移

於小腸之證故不用黃連直瀉其心而用生
 地滋腎涼心木通通利小腸佐以甘草稍取
 易瀉最下之熱莖中之痛可除心經之熱可
 導也此則水虛火不實者宜之以利水而不
 傷陰瀉火而不伐胃也若心經實熱須加黃
 連竹葉甚者更加大黃亦釜底抽薪之法也

淋散言之也

治膀胱結熱水道不通淋澀熱痛或尿如豆汁
 或成砂石或如膏膿或小便血

赤苓 一錢五分

赤芍 一錢

梔仁 一錢

當歸

甘草 各錢二分

右五味加燈心水煎服

正散

麥冬

梔子

於小腸之證故不用此藥也其心而用生
地滋腎涼心木通通利小便佐以甘草精取
易瀉最下之熱蓋中之痛可除心經之熱可
專也此則水虛火不實者宜之以利水而不
傷陰瀉火而不伐胃也若心經實熱須加黃
連竹葉甚者更加大黃亦釜底抽薪之法也

書之

五淋散

治膀胱結熱水道不通淋澀熱痛或尿如豆汁

或成砂石或如膏膿或小便血

赤苓 一錢五分

赤芍 一錢

梔仁 一錢

當歸

甘草 各錢二分

右五味加燈心水煎服

八正散

瞿麥

梔子

蕭蓄

大黃

木通

滑石

車前子

甘草

各一錢

加燈心一錢煎服 朱震亨方加木香一錢

註

通調水道下輸膀胱三焦之職也受藏津液
氣化能出膀胱之職也若水道不輸則內蓄
喘脹外泛膚腫三焦之病也若受藏不化則
諸淋澀痛癰閉不通膀胱之病也經曰陰無
陽無以生陽無陰無以化故陰陽偏盛皆不

生化也陽盛陰虛而膀胱之氣不化為病者
通關九證也陰盛陽虛而膀胱之氣不化為
病者腎氣丸證也此關乎氣化陰陽之為病
也經曰下虛則遺尿又曰膀胱不約為遺尿
經曰胞移熱於膀胱則癰又曰膀胱不利為
癰故虛而寒者藏而不能約實而熱者約而
不能出也膀胱氣虛無氣以固則藏而不約
不禁遺失之病生補中固真湯證也膀胱氣
熱壅結不行則約而不出淋澀癰閉之病生

八正五淋散證也此不全關乎氣化而又關乎虛寒實熱之爲病也八正五淋皆治淋澀癃閉之藥而不無輕重之別輕者有熱未結雖見淋澀尿赤豆汁砂石膏血癃閉之證但其痛則輕其病不急宜用五淋散單清水道故以梔苓清熱而輸水歸芍益陰而化陽復佐以甘草調其陰陽而用稍者意在前陰也重者熱已結實不但痛甚勢急而且大便亦不通矣宜用八正散兼瀉二陰故於羣走前陰藥中加大黃直攻後竅也丹溪方加木香者其意亦以氣化者與

逍遙散

治肝家血虛火旺頭痛目眩煩赤口苦倦怠煩渴抑鬱不樂兩脇作痛寒熱小腹重墜婦人經水不調脈弦大而虛

芍藥 酒炒 當歸

白朮 炒 茯苓

甘草 炙 柴胡 各二錢

引用煨薑三片薄荷少許煎服加味道遙散即此方加丹皮山梔 各五分炒

集註 趙羽皇曰五藏苦欲補瀉云肝苦急急食甘以緩之蓋肝性急善怒其氣上行則順下行則鬱鬱則火動而諸病生矣故發於上則頭眩耳鳴而或爲目赤發於中則胸滿脇痛而或作吞酸發於下則少腹疼痛而或溲溺不利發於外則寒熱往來似瘧非瘧凡此諸證何莫非肝鬱之象乎而肝木之所以鬱其說有二一爲土虛不能升木也一爲血少不能養肝也蓋肝爲木氣全賴土以滋培水以灌溉若中土虛則木不升而鬱陰血少則肝不滋而枯方用白朮茯苓者助土德以升木也當歸芍藥者益榮血以養肝也薄荷解熱甘草和中獨柴胡一味一以爲厥陰之報使一以升發諸陽經云木鬱則達之遂其曲直之性故名曰逍遙若內熱外熱盛者加丹皮解肌熱炒梔清內熱此加味逍遙散之義也

龍膽瀉肝湯

治脇痛口苦耳聾耳腫筋痿陰濕熱癢陰腫白

濁洩血

龍膽草

酒炒

黃芩

炒

梔子

酒炒

澤瀉

木通

車前子

當歸

酒洗

柴胡

甘草

生地

酒炒

水煎服

註 脇痛口苦耳聾耳腫乃膽經之為病也筋痿
陰濕熱癢陰腫白濁洩血乃肝經之為病也
故用龍膽草瀉肝膽之火以柴胡為肝使以
甘草緩肝急佐以芩梔通澤車前輩大利前
陰使諸濕熱有所從出也然皆瀉肝之品若
使病盡去恐肝亦傷矣故又加當歸生地補
血以養肝蓋肝為藏血之藏補血即所以補
肝也而妙在瀉肝之劑反作補肝之藥寓有
戰勝撫綏之義矣

左金丸

治肝藏火實左脇作痛

黃連 六兩 炒

吳茱萸 一兩 湯泡

右為末作丸

集註 胡天錫曰此瀉肝火之正劑肝之治有數種

水衰而木無以生地黄丸乙癸同源是也土
衰而木無以植參苓甘草劑緩肝培土是也
本經血虛有火用逍遙散清火血虛無水用
四物湯養陰至於補火之法亦下同乎腎而

瀉火之治則上類乎心左金丸獨用黃連為君從實則瀉子之法以直折其上炎之勢吳茱萸從類相求引熱下行并以辛燥開其肝鬱懲其扞格故以為佐然必本氣實而土不虛者庶可相宜左金者木從左而制從金也

瀉青丸

治肝火風熱不能安臥多驚多怒目赤腫痛及小兒急驚抽搐

龍膽草

山梔

大黃

酒蒸

川芎

當歸

羌活

防風

等分蜜丸竹葉湯下

註

龍膽草直入肝經以瀉其火佐梔子大黃使

其所瀉之火從大小二便而出是治火之標也肝主風風能生火治肝不治風非其治也故用羌活防風散肝之風即所以散肝之火是治火之本也肝之情欲散故用川芎之辛以散之肝之質喜滋故用當歸之濡以潤之是於瀉肝之中寓有養肝之意瀉肝者瀉肝之病也養肝者悅肝之神也蓋肝木主春乃陽升發動之始萬物生化之源不可傷也

當歸龍薈丸

治肝經實火頭運目眩耳聾耳鳴驚悸搖擗躁擾狂越大便秘結小便澀滯或胸脇作痛陰囊腫脹凡屬肝經實火皆宜服之

當歸 一兩

黃連 一兩

黃芩 一兩

龍膽草 一兩

梔子仁 一兩

大黃 五錢

蘆薈 五錢

青黛 五錢

木香 二錢五分

黃蘗 一兩

麝香 五錢 另研

右為末炒神麩糊丸每服二十九丸薑湯下

集註

汪昂曰肝木為生火之本肝火盛則諸經之

火相因而起為病不止一端矣故以當歸蘆

薈龍膽草青黛直入本經氣血兩途先平其

甚者而諸經之火無不漸平矣佐以黃芩瀉

肺火黃連瀉心火黃蘗瀉腎火大黃瀉腸胃

火梔子瀉三焦火備舉大苦大寒而直折之

使上中下三焦之火悉從大小二便利出少

加木香麝香者取其調氣開竅靈通周至也

然非實火不可輕投

越婢加半夏湯

治欬而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脈浮

大者

麻黃 六兩

石膏 半觔

生薑 三兩

甘草 二兩

半夏 半升

大棗 十五枚

右六味以水六升先煮麻黃去沫內藥取三

升分溫三服

小青龍加石膏湯

治肺脹欬而上氣煩躁而喘衄浮者心下有水氣

麻黃 三兩

桂枝 三兩

細辛 三兩

芍藥 三兩

半夏 半升

石膏 三兩

乾薑 三兩

五味子 半升

甘草 三兩

右九味以水一斗煮麻黃去沫內諸藥取三升強人服一升羸者減之日三服小兒服四

合

集註

喻昌曰前一方麻黃湯中以桂杏易石膏以
衄大有熱而加薑棗則發散之力微而且緩
也後一方小青龍湯中加入石膏以證兼煩
躁雖宜汗散寒飲猶防助熱傷津也越婢方
中有石膏半夏二物協力建功石膏清熱藉
辛熱亦能豁痰半夏豁痰藉辛涼亦能清熱
前麥冬湯方中下氣止逆全藉半夏入生津
藥中此二方又藉半夏入清溫劑中仲景加

減成方無非化裁後學矣

前麥冬... 中... 辛... 大... 合

清燥救肺湯

治諸氣膈鬱諸痿喘嘔

桑葉 三錢 經霜者

石膏 二錢 五分炒

甘草 一錢

胡麻仁 一錢 炒研

真阿膠 八分

人參 七分

麥冬 一錢 二分

杏仁 七分 去皮尖炒黃

枇杷葉 一片 去毛蜜炙

右九味以水一碗煎六分頻頻二三次滾熱

服

痰多加貝母栝蘂

血枯加生地

熱甚加犀角羚羊角或加牛黃

集註

喻昌曰按諸氣贖鬱之屬於肺者屬於肺之

燥也而古今治氣鬱之方用辛香行氣絕無

一方治肺之燥者諸痿喘嘔之屬於上者亦

屬於肺之燥也而古今治法以痿嘔屬陽明

以喘屬肺是則嘔與痿屬之中下而惟喘屬

上矣所以亦無一方及於肺之燥也即喘之

屬於肺者非表即下非行氣即泄氣間有一

二用潤劑者又不得其肯綮今擬此方名清

燥救肺大約以胃為主胃土為肺金之母也

其天冬知母能清金滋水以苦寒而不用至

如苦寒降火之藥尤在所忌蓋肺金自至於

燥所存陰氣不過一綫耳倘更以苦寒下其

氣傷其胃其人尚有生理乎誠倣此增減以

救肺燥變生諸證庶克有濟

柯琴曰古方用香燥之品以治氣鬱不獲奏

效者以火就燥也惟繆仲醇知之故用甘涼
滋潤之品以清金保肺立法喻昌宗其旨集
諸潤劑而製清燥救肺湯用意深取藥當無
遺蘊矣

按

經云損其肺者益其氣肺主諸氣故也然火
與元氣不兩立故用人參甘草甘溫而補氣
氣壯火自消是用少火生氣之法也若夫火
燥臍鬱於肺非佐甘寒多液之品不足以滋
肺燥而肺氣反爲壯火所食益助其燥矣故

麥門 佐以石膏麥冬桑葉阿膠胡麻仁輩使清肅
火令行而壯火亦從氣化也經曰肺苦氣上逆
麥急食苦以降之故又佐以杏仁枇杷葉之苦
人以降氣氣降火亦降而制節有權氣行則不
鬱諸痿喘嘔自除矣要知諸臍鬱則肺氣必
大虛若泥於肺熱傷肺之說而不用人參鬱
必不開而火愈熾皮聚毛落喘咳不休而死
矣此名之救肺涼而能補之謂也若謂實火
可瀉而久服苓連苦從火化亡可立待耳

何高而八頭本數苦勞火外寸四立於耳
突此各之效報新而並蘇之請少吞晴實火
必不關而火愈熱其乘手故謂之不為而亦
大直苦或飲煎熱飲胡之信而不用人參鬱
鬱諸熱謂謂自斜突要映諸熱鬱限報於
以斜廉廉斜火衣斜而階消亦鬱於不限不
於食苦以斜之始又武以杏之味藥之苦
合行而共火亦於廉外也孫曰報苦於上後
武以百膏麥冬桑葉四煎時煎之輩外微德

麥門冬湯

火逆上氣咽喉不利止逆下氣者主之

麥門冬 七升

半夏 一升

人參 三兩

甘草 二兩

粳米 三合

大棗 十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升

日三服夜一服

集註

喻昌曰此方治胃中津液乾枯虛火上炎治
本之良法也夫用降火之藥而火反升用寒

涼之藥而熱轉熾者徒知與火熱相爭弗知
補正氣以生津液不惟無益而反害之矣凡
肺病有胃氣則生無胃氣則死胃氣者肺之
母氣也本草有知母之名謂肺藉其清涼知
清涼爲肺之母也又有貝母之名謂肺藉其
豁痰豁痰爲肺之母也然屢施於火逆上氣
咽喉不利之證而屢不應者名不稱矣孰知
仲景妙法於麥冬人參甘草大棗粳米大補
中氣以生津液隊中又增入半夏辛溫之味
以開胃行津而潤肺豈特用其利咽下氣哉
顧其利咽下氣非半夏之功實善用半夏之
功也

人參清肺湯

治肺胃虛寒咳嗽喘急坐臥不安並治久年勞嗽吐血腥臭

人參

阿膠

骨皮

知母

烏梅

粟殼

炙草

杏仁

桑皮

各等分

加棗子煎服

人參定喘湯

人參

麻黃

阿膠

五味

粟殼

甘草

半夏麩

各一錢

桑皮

二錢

生薑三片水煎服

人參瀉肺湯

治肺經積熱上喘胸膈脹滿痰多大便瀼

人參

黃芩

梔子

枳殼

薄荷

甘草

連翹

杏仁

桑皮

大黃

桔梗

水煎服

集註

王又原曰經云邪之所湊其氣必虛又肺爲嬌藏其不堪破耗也明矣自肺熱傷肺之說行曰保肺補肺衆共譁之曰清肺瀉肺藥與

和之豈知古人清肺瀉肺等湯而必皆以人參立名夫亦可曉然於肺氣之不可耗而人參之在所必用也肺體清而法天下濟而司降令一切渾濁不得上干者皆胸中之氣健運行而不息也若肺氣少弛則降下失令渾濁之氣遂逆上行此爲咳嗽爲喘急肺葉脹舉胸膈緊痛移熱大腸大便艱澇種種顯有餘之象實種種爲不足之徵故不問內傷外感爲熱爲寒要以人參保定肺氣爲主或佐骨皮知母阿膠滋之烏梅五味鷲粟殼歛之半夏麩生薑降之杏仁桑皮枳殼桔梗利之梔子黃芩連翹涼之麻黃薄荷發之大黃下之總恃人參之大力握樞而運已入之邪易出而將來之邪無從入也肺邪得諸藥以俱出而肺氣不隨諸藥以俱出也然則人參亦何嘗傷肺乃畏而不敢用耶又謂風寒咳嗽忌用五味子嗽用粟殼止嗽如神切肺如刀然此無本之言不知始自何出皆因不讀本

草不知藥之性味功能以譌傳譌也近世之醫亦不能辨惟識者察之

瀉白散

治肺氣鬱熱咳嗽而喘面腫身熱

桑白皮

地骨皮

甘草

水煎服

集註

李楚重曰經云肺苦氣上逆上逆則上焦鬱熱氣鬱生涎火鬱生熱因而制節不行壅甚為喘滿腫嗽白者肺之色瀉白瀉肺氣之有餘也君以桑白皮質液而味辛液以潤燥辛

以瀉肺臣以地骨皮質輕而性寒輕以去實
 寒以勝熱甘草生用瀉火佐桑皮地骨皮瀉
 諸肺實使金清氣肅而喘嗽可平較之黃芩
 知母苦寒傷胃者遠矣夫火熱傷氣救肺之
 治有三實熱傷肺用白虎湯以治其標虛火
 刑金用生麻散以治其本若夫正氣不傷鬱
 火又甚則瀉白散之清肺調中標本兼治又
 補二方之不及也

阿膠散

治肺虛有火嗽無津液咳而哽氣者

真阿膠 一兩

牛蒡子 二錢半炒

馬兜鈴 五錢炒

杏仁 七錢

炙甘草 五錢

糯米 一合

每服兩許水煎服

集註程應旄曰痰帶紅線嗽有血點日漸成痿緣

肺處藏之最高葉間布有細竅氣從此出入
 呼吸成液灌溉周身所謂水出高原也一受

火炎吸時徒引火升呼時並無液出久則肺竅俱閉喉間或癢或瘡六葉遂日焦枯矣今用阿膠為君者消竅痰也用杏仁大力子宣竅道也馬兜鈴者清竅熱也糯米以補脾母氣到則肺自輕清無礙矣

二陳湯

治肥盛之人濕痰為患喘嗽脹滿

半夏 三錢 製 茯苓 三錢

陳皮 二錢 去白 甘草 一錢

右四味加薑三片水煎服

集註 李中梓曰肥人多濕濕挾熱而生痰火載氣

而逆上半夏之辛利二便而去濕陳皮之辛通三焦而理氣茯苓佐半夏共成燥濕之功甘草佐陳皮同致調和之力成無已曰半夏

行水氣而潤腎燥經曰辛以潤之是也行水則土自燥非半夏之性燥也或曰有痰而渴宜去半夏代以貝母吳琨曰渴而喜飲小便利者易之不能飲水小便不利雖渴宜半夏也此濕為本熱為標所謂濕極而兼勝已之化非真象也又東用之人濕熱生痰故朱震亨主之加枳實砂仁名枳實二陳湯其性較急也先哲云二陳為治痰之妙劑其於上下左右無所不宜然祇能治實痰之標不能治

溫膽湯

治熱嘔吐苦虛煩驚悸不眠痰氣上逆

竹茹

枳實

半夏

甘草

陳皮

茯苓

生薑

右七味水煎服

集註 羅謙輔曰膽為中正之官清靜之府喜寧諡

惡煩擾喜柔和惡壅鬱蓋東方木德少陽溫

虛痰之本虛痰之本在脾胃治者詳之

三十六葉脫今臨他本神之神

和之氣也若病後或久病而宿有痰飲未消
胸膈之餘熱未盡必致傷少陽之和氣以故
虛煩驚悸者中正之官以熇蒸而不寧也熱
嘔吐苦者清靜之府以鬱炙而不謐也痰氣
上逆者木家挾熱而上升也方以二陳治一
切痰飲加竹茹以清熱加生薑以止嘔加枳
實以破逆相濟相須雖不治膽而膽自和蓋
所謂膽之痰熱去故也命名溫者乃謂溫和
之溫非謂溫涼之溫也若謂膽家真畏寒而
怯而溫之不但方中無溫膽之品且更有涼
胃之藥也

小半夏湯

嘔家本渴渴為欲解今反不渴心下有支飲故也

半夏 一升

生薑 半觔

以水七升煮取一升半分溫再服

小半夏加茯苓湯

治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者

半夏 一升

生薑 半觔

茯苓 三兩

煎服如前

外臺茯苓飲

治心胸中有痰飲宿水自吐出水復心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓 三兩

人參 三兩

白朮 三兩

枳實 二兩

橘皮 二兩

生薑 四兩

右六味水六升煮取一升八合分三服如人行八九里再進之

集註趙良曰嘔為痰飲動中湧而出之嘔盡本當

渴渴則可徵支飲之全去今反不渴是其飲尚留去之未盡也用半夏之辛溫生薑之辛散散其欲出之飲則所留之邪自盡矣半夏生薑皆味辛可治膈上痰心下堅嘔逆日眩然悸必心受水凌故加茯苓以去水伐腎邪安心神也後方加人參枳實橘皮此由上中二焦氣弱水飲入胃脾不能輸歸於肺肺不能通調水道以致停積為痰為宿水吐之則

下氣因而上逆虛與氣結滿不能食當補益
 中氣以人參白朮為君茯苓逐宿水枳實破
 諸氣為臣開脾胃宣揚上焦發散凝滯則陳
 皮生薑為使也其積飲既去而虛氣塞滿其
 中不能進食此證最多

御纂醫宗金鑑卷三十

刪補名醫方論卷五目錄

礞石滾痰丸

指迷茯苓丸

金匱枳朮湯

桂苓甘朮湯

疏鑿飲子

葶藶大棗瀉肺湯

蘇葶定喘丸

石印醫宗金鑑卷三十一

舟車神祐丸

實脾飲

清脾飲

芍藥湯

溫脾湯

大黃附子湯

越鞠湯丸

四磨飲

備急丸

磁硃丸

石斛夜光丸

洗刀散

失笑散

獨聖散

大黃廬蟲丸

仙方活命飲

托裏消毒散

印醫宗金鑑卷三十一 目錄

二

御纂醫宗金鑑卷三十

刪補名醫方論卷五

礞石滾痰丸

治實熱老痰之峻劑虛寒者不宜用

黃芩

八兩

大黃

八兩 酒蒸

沉香

五錢 忌火

礞石

一兩 焰消煨過 埋地內七日用

右四味為細末水丸川椒大量人大小用之
用溫水一口送過咽即仰臥令藥徐徐而下
半日不可飲食勿起身行動言語待藥氣自

胃口漸下二腸然後動作飲食服後喉間稠
黏壅滯不快此藥力相攻故痰氣泛上也少
頃藥力至而漸逐惡物入腹下腸效如響應
指迷茯苓丸 治中焦停痰伏飲

半夏

二兩

茯苓

一兩

枳殼

五錢

風化消

二錢半

右四味薑汁糊爲丸

註

經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾游者運
行也溢者滲溢也輸者輸布也精氣者水化

之精氣也言入於胃運行水化之精氣滲溢
於腸胃之外而上輸布於脾也又曰脾氣散
精上歸於肺言水之清者上升猶天之雨露
也又曰通調水道下輸膀胱言水之濁者下
降猶地之江河也此皆言水自濁化清由府
輸藏自清分濁由藏輸府水之運行循環也
又曰水精四布五經並行言水發源於脾周
布四藏並行五經也此皆言水內養藏府外
滋百骸水之變化精微也如是者何痰之有

若飲食失度不和於中水精不滲溢於外直
下走大小腸而爲泄瀉矣若三焦失運氣不
蒸化水之清者不升水之濁者不降精化爲
水則內停作脹外泛作腫上攻喘呼下蓄淋
悶矣若上焦氣不清肅不能輸布留於胸中
水之精者悉變爲濁陽盛煎灼成痰陰盛凝
蓄爲飲也故治痰者以清火爲主實者利之
虛者化之治飲者以燥濕爲主實者逐之虛
者溫之所以古人治飲有溫補之法而治痰

則無之也王隱君製礞石滾痰丸治老痰一
方用黃芩清胸中無形諸熱大黃瀉腸胃有
質實火此治痰必須清火也以礞石之燥悍
此治痰必須除濕也以沉香之速降此治痰
必須利氣也二黃得礞石沉香則能迅掃直
攻老痰巢穴濁膩之垢而不少留滾痰之所
由名也若陽氣不盛痰飲兼作又非此方所
宜當以指迷茯苓丸合而治之用半夏燥濕
茯苓滲濕風消軟堅枳殼利氣別於二陳之

甘緩遠於大黃礞石之峻悍殆攻中之平劑
歟

金匱枳朮湯

治心下鞭如大盤邊旋如杯水飲所作

枳實 七枚

白朮 二兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中
鞭卽散

註

心下胃之上脘也上脘結鞭如盤邊旋如杯
謂時大時小水氣所作非有形食滯也用枳
實以破結氣白朮以除水濕溫服三服則腹
鞭結開而鞭消矣李杲法仲景以此方倍白

木是以補為主也此方君枳實是以瀉為主也然一緩一急一補一瀉其用不同只此多寡轉換之間耳

桂苓甘木湯

治心下有痰飲胸脇支滿目眩又曰短氣有微飲當從小便去之桂苓甘木湯主之腎氣丸亦主之

茯苓 四兩

桂枝 三兩

白朮 三兩

甘草 三兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

集註 趙良曰靈樞謂心胞絡之脈動則病胸脇

滿者謂痰飲積於心胞其病則必若是也目
眩者痰飲阻其胸中之陽不能布精於上也
茯苓淡滲逐飲出下竅因利而去故用以爲
君桂枝通陽輸水走皮毛從汗而解故以爲
臣白朮燥濕佐茯苓消痰以除支滿甘草補
中佐桂枝建土以制水邪也夫短氣有微飲
此水飲停蓄呼吸不利而然也金匱並出二
方妙義益彰呼氣之短用苓桂朮甘湯之輕
清以通其陽陽化氣則小便能出矣吸氣之

短用腎氣丸之重降以通其陰腎氣通則關
門自利矣

按

風水陽水也石水陰水也陽水多實陰水多
虛陽水在上故多喘陰水在下故多滿所以
治陽水用散用攻治陰水用溫用補然陰中
必有陽此方治陰水之在陽而上者也腎氣
丸治陰水之在陰而下者也於此推之陽中
亦必有陰故有小青龍湯五苓散之治法也
今舉世不分陰陽虛實皆以金匱腎氣湯治

之服之不效終不改轍每至吐血而死良可嘆也

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

疏鑿飲子 依不升煎好一以和吐薑好淡以行水

治偏身水腫喘呼口渴大小便秘二益助肉不

羸活 大身小青秦艽 治寒寒實中官水腫

檳榔 治疝氣壅滯大腹皮 治宿食水腫寒

商陸 治水腫疝氣扶苓皮 治水腫疝氣

椒目 治水腫疝氣木通 治水腫疝氣

澤瀉 治水腫疝氣赤小豆 等分

加薑皮水煎服

註 經曰三焦者決瀆之官水道出焉若水飲阻

於內風寒束於外則三焦之氣化不行上焦之如霧中焦之如漚同爲下焦之如瀆也以致水氣外泛皮膚作腫內停腹裏作脹上攻喘咳嘔逆下蓄小便不利種種諸證而治法總不外乎表裏也小青龍湯真武湯越婢湯五苓散疏鑿飲子五方皆治有水氣兼表裏證之藥也小青龍湯治表裏寒實中有水氣真武湯治裏有虛寒中兼水氣二證俱內不作脹外不作腫故一以麻桂輩散寒以行水

一以薑附輩溫寒以制水也越婢湯治表裏實熱中有水氣五苓散治表裏虛熱中有水氣故一以麻黃石膏散膚之水清肌之熱以消腫也一以桂苓朮澤解肌表熱利所停水以止吐也疏鑿飲子治表裏俱實不偏寒熱而水濕過盛遍身水腫喘脹便秘者故以商陸爲君專行諸水佐羌活秦艽腹皮苓皮薑皮行在表之水從皮膚而散佐檳榔赤豆椒目澤瀉木通行在裏之水從二便而出上下

內外分消其勢亦猶神禹疏鑿江河之意也
至於越婢湯加半夏者因喘氣上逆用之降
逆也加附子者因汗出惡風散表固陽也小
青龍湯加石膏者因喘而煩燥用之兼清胃
熱也五苓散以木桂易滑石阿膠名豬苓湯
專清陰兼治水也真武湯去生薑加人參名
附子湯專溫陽不治水也由此可知仲景用
方於羣溫劑中加以大寒之品大寒劑中加
以辛熱之品去桂枝加滑石則不走外去
薑加人參則不治水其轉換變化神妙如此
拘拘之士不足語也

蘇子定喘丸
治肺癰喘不得臥及水飲攻肺喘急者

葶藶大棗瀉肺湯

葶藶 一兩

大棗 十枚

以水五鍾先煮棗三鍾去棗內葶藶煮取一鍾半頓服弱者減服戒鹽醬

蘇子定喘丸

治飲停上焦攻肺喘滿不得臥面身水腫小便不利者

葶藶子

研泥

南蘇子

研泥

各等分合均用棗肉為小丸陰乾磁罐盛之
恐滲去油性減去藥力每服三錢於夜三更
時白湯下以利四五次為度利多則減服之
利少則加服之次日身軟則隔一日或隔二
日服之形氣弱者先減半服之俟可漸加戒
鹽醬服之即奏奇功如不嚴戒一切鹹物即
對證用藥萬無一生

舟車神祐丸

又名淨府丸

治水腫水脹形氣俱實

黑牽牛

四兩 炒

大黃

酒浸

甘遂

一兩 麵裹煨

大戟

一兩 麵裹煨

芫花

一兩 醋炒

青皮

一兩 炒

橘紅

一兩

木香

五錢

檳榔

五錢

輕粉

一錢

右為末水丸每服五分五更白滾水下大便
利三次為度若一二次不通利次日仍服或
六分七分漸加至一錢若服後大便利四五
次或形氣不支則減其服三分二分俱可或

隔一二三日服一次以愈爲度甚者忌鹽醬
百日

註

葶藶大棗湯蘇葶定喘丸舟車神祐丸三方
皆治腫脹之劑然葶藶大棗湯治水停胸中
肺滿喘急不得臥皮膚浮腫中滿不急者故
獨用葶藶之苦先瀉肺中之水氣佐大棗恐
苦甚傷胃也蘇葶定喘丸卽前方加蘇子以
降氣氣降則水降氣降則輸水之上源水降
則開水之下流也舟車神祐丸治水停諸裏

上攻喘咳難臥下蓄小便不利外薄作腫中
停脹急者故備舉甘遂大戟芫花牽牛大黃
直攻水之巢穴使從大小二便而出佐青皮
陳皮木香以行氣使氣行則水行腫脹兩消
其尤峻厲之處又在少加輕粉使諸攻水行
氣之藥迅烈莫當無微不入無窮不達用之
若當功效神奇百發百中然非形實或邪盛
者不可輕試苟徒利其有劫病之能消前旋
腫用者慎之

實脾飲
治身重懶食肢體浮腫口中不渴二便不實
白朮 土炒
茯苓
甘草 炙
厚朴 薑炒
大腹子
木香
木瓜
附子
乾薑
加薑棗煎服
氣虛者加人參

實脾飲
治身重懶食肢體浮腫口中不渴二便不實
白朮 土炒
茯苓
甘草 炙
厚朴 薑炒
大腹子
木香
木瓜
附子
乾薑
加薑棗煎服
氣虛者加人參

註 脾胃虛則土不能制水水妄行肌表故身重
浮腫用白术甘草生薑大棗以實脾胃之虛
也脾胃寒則中寒不能化水水停腸胃故懶
食不渴二便不實用薑附草果以溫脾胃之
寒更佐大腹茯苓厚朴木瓜者以導水
利氣蓋氣者水之母也土者水之防也氣行
則水行土實則水治故名曰實脾也然此方
導水利氣之力有餘陰水寒勝而氣不虛者
固所宜也若氣少聲微則必以理中湯加附
子數倍茯苓以君之溫補元氣以行水爲萬
當也

按 苓桂术甘湯實脾飲腎氣丸皆治陽虛水氣
之證苓桂术甘湯治上焦陽虛不能輸布水
留於上心下逆滿氣上衝胸故用苓桂术甘
之品扶陽通氣輸水道也實脾飲治中焦陽
虛不能蒸化水漬於中外泛作腫二便通利
故用薑附苓术之劑培土溫中勝寒濕也腎
氣丸治下焦陽虛不能行水小便不利肢體

浮腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也

此方治陽虛水腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也
此方治陽虛水腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也
此方治陽虛水腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也
此方治陽虛水腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也
此方治陽虛水腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也
此方治陽虛水腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也
此方治陽虛水腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也
此方治陽虛水腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也
此方治陽虛水腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也
此方治陽虛水腫喘急腹脹故用桂附地苓之輩溫而補之以行水也

清脾飲

治痰積成瘧無表裏證者

青皮 厚朴

草果 半夏

柴胡 白朮

甘草 茯苓

黃芩

水煎服

註 瘧為少陽病兼太陽表者麻桂各半湯汗之

兼陽明裏者大柴胡湯下之若不兼表裏或
已汗下而仍作者當從少陽和解法也是方
以小柴胡四君二湯合劑清少陽而顯及於
脾故名曰清脾也減人參者以氣不虛也加
草果厚朴氣味俱厚之品取以輸胃之積加
青皮佐茯苓半夏用以破痰之原先哲云無
痰不成瘧無積不成瘧此湯是也若夫氣虛
者仍加人參氣實者更加檳榔熱多者加石
膏汗多者加桂枝自當臨病斟酌也

其藥湯

治滯下赤白便膿血後重窘痛

芍藥 二兩

當歸 五錢

黃連 五錢

黃芩 五錢

檳榔 三錢

木香 三錢

甘草 三錢

每服半兩水煎服痢不減加大黃

註
滯下起於夏秋非外因濕暑即內因生冷濕
蒸熱鬱釀成初起府病久則傳藏府病易治

藏病難治府者何病在大腸則從金化故其
色白病在小腸則從火化故其色赤所以赤
痢多噤口以小腸近胃穢氣易於上攻而爲
嘔逆不食也藏者何傳心則熱不休下利血
水傳腎則利不止如屋漏水傳脾則水漿不
入噦逆不食此湯治初病在府之方也用當
歸白芍以調血木香檳榔以調氣血和則膿
血可除氣調則後重自止芩連燥濕而清熱
甘草調中而和藥若窘迫痛甚或服後痢不
減者加大黃通因通用也

主

調治不

厚朴

溫脾湯

主治錮冷在腸胃間泄瀉腹痛宜先取去然後調治不可謂虛以養病也

厚朴 二兩

乾薑 二兩

甘草 二兩

桂心 二兩

附子 二兩

大黃 四錢

右咬咀取一兩水二鍾煎六分頓服

集註 喻昌曰許叔微製此方深合仲景以溫藥下之之法其大黃止用四錢更為有見夫錮冷

在腸胃而泄瀉矣即溫藥中寧敢用大黃之
 猛重困之乎減五之一乃知許叔微之得於
 仲景深也仲景云病人舊微澹者梔子湯不
 可與服又云太陰病脈弱便利設當行大黃
 芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也即
 是觀之腸胃錮冷之泄瀉而可恣用大黃耶
 不用則溫藥恐不能制而洞下之勢或至轉
 主增裁酌用之真足法矣

大黃附子湯

主治脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以溫藥
 下之

大黃

二兩

附子

二枚
炮

細辛

二兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強
 人取二升半分三服服後如人行四五里再
 進

集註

喻昌曰仲景治傷寒熱邪痞聚心下而挾陽

虛陰盛之證用附子瀉心湯之法矣其雜證
脇下偏痛發熱爲陽其脈弦緊爲陰是則知
陽中陰邪上逆也復立此溫藥下之一法然
仲景諄諄傳心後世領略者鮮金匱又別出
一條云其脈數而緊乃弦狀如弓弦按之不
移數脈弦者當下其寒脈緊而遲者必心下
堅脈大而緊者陽中有陰可下之讀者罔識
其旨詎知皆以溫藥下之之法耶其曰當下
其寒謂陽中有陰實之邪可下其金鍼不躍

躍乎

張璐曰三承氣湯公爲寒下之柔劑白散備急
丸爲熱下之剛劑附子瀉心湯大黃附子湯
爲寒熱互結剛柔並濟之和劑近世但知寒
下一途絕不知有溫下一法蓋暴感之熱結
可以寒下久積之寒結亦可寒下乎是以備
急等法所由設也然此僅可治寒實之結設
其人稟質素虛雖有實邪固結敢用剛猛峻
劑攻擊之乎故仲景又立附子瀉心湯用苓

連佐大黃以祛膈上之熱痞即兼附子之溫
 以散之大黃附子湯用細辛佐附子以攻脇
 下寒結即兼大黃之寒以導之寒熱合用溫
 攻並施此聖法昭然不可思議者也

越鞠湯丸

治一切濕痰食火氣血諸鬱

香附

蒼朮

撫芎

神麴

山楂仁

水煎服或作丸

註

夫人以氣為本氣和則上下不失其度運行
 不停其機病從何生若飲食不節寒溫不適
 喜怒無常憂思無度使冲和之氣升降失常

以致胃鬱不思飲食脾鬱不消水穀氣鬱胸
 腹脹滿血鬱胸膈刺痛濕鬱痰飲火鬱為熱
 及嘔吐惡心吞酸吐酸嘈雜噯氣百病叢生
 故用香附以開氣鬱蒼朮以除濕鬱撫芎以
 行血鬱山梔以清火鬱神麩以消食鬱此朱
 震亨因五鬱之法而變通者也五藥相須共
 收五鬱之效然當問何鬱病甚便當以何藥
 為主至若氣虛加人參氣痛加木香鬱甚加
 鬱人金懶食加穀蘖脹加厚朴痞加枳實嘔痰

加薑夏火盛加萸連則又存乎臨證者之詳
 治審也感傷上氣喘急胸膈不快妨悶不食

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎三五沸放溫空
 心服

註集

王又原曰經云聖人嗇氣如持至寶庸人役

物而反傷太和此七情隨所感皆能為病然
 吐吞氣行而愈弱者氣著為病愚者不察

故用香附以開氣鬱者木以除濕鬱者以
行血鬱者以清火鬱神鬱以消食鬱此朱
震亨因五鬱之法而變通者也五藥相須其
收五鬱之效然當問何鬱病甚便當以何藥
審出至若氣虛加人參氣痛加木香鬱甚加
川薑夏火盛加黃蘗限又并平調蘊香也

四磨飲

治七情感傷上氣喘急胸膈不快妨悶不食

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎三五沸放溫空

心服

集註

王又原曰經云聖人嗇氣如持至寶庸人役

物而反傷太和此七情隨所感皆能為病然
壯者氣行而愈弱者氣著為病愚者不察一

遇上氣喘急滿悶不食謂是實者宜瀉輒投
破耗等藥得藥非不暫快初投之而應投之
久而不應矣夫呼出爲陽吸入爲陰肺陽清
肅則氣下行腎陰寧謐則氣歸攝不復散而
上逆矣若正氣旣衰卽欲削堅被滯則邪氣
難伏法當用人參先補正氣沉香納之於腎
而後以檳榔烏藥從而導之所謂實必顧虛
瀉必先補也四品氣味俱厚磨則取其氣味
俱足煎則取其氣味純和氣味齊到效加桴

鼓矣

備急丸

治寒氣冷食稽留胃中心腹滿痛大便不通者

大黃

二兩

乾薑

二兩

巴豆

一兩
去皮研如脂

先搗大黃乾薑為末內巴豆合搗千杵和蜜
丸如豆大藏密器中勿洩氣候用每服三四
丸煖水或酒下

金匱主中惡心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口
噤如卒死者捧頭起灌令下咽須臾當差不

差更與三九當腹中鳴卽吐利便差若口噤者須化開從鼻孔用葦管吹入自下於咽

集註

柯琴曰大便不通當分陽結陰結陽結有承

氣更衣之劑陰結又製備急白散之方金匱用此治中惡當知寒邪卒中者宜之若用於溫暑熱邪速其死矣是方允爲陰結者立乾薑散中焦寒邪巴豆逐腸胃冷積大黃通地道又能解巴豆毒是有制之師也然白散治寒結在胸故用桔梗佐巴豆用吐下兩解法

此則治寒結腸胃故用大黃佐薑巴以直攻其寒世徒知有溫補之法而不知有溫下之法所以但講寒虛不議及寒實也

按

世人之情惟知畏貧不知畏禍因其貧遺其禍病人之情亦多如是惟知畏虛不知畏病因其虛忘其病殊不知虛猶貧也病猶禍也虛而有病猶夫貧者有禍也去其禍而但貧猶可安也實而有病猶夫富者有禍也不去其禍而其富未可保也最可笑者近世之醫

從纂醫書全錄 卷三十一
臨診病家外飭小心中存不決且諉言虛不
可攻縱使病去正氣難復病人畏懼自然樂
從受病淺者幸而自愈設不愈者另延醫至
詎病者先意難入攻病之藥尚未入口衆議
咻咻致明通之士拂袖而去坐而待斃終不
悟爲庸工之所誤也醫者久擅其術初心原
爲自全恬不知恥久之亦竟以爲養病爲能
攻病爲拙而舉世之病者皆昧昧於治病也
嘗考孫思邈以仲景麻黃桂杏甘草之還魂

湯治卒中昏冒口噤握固李杲以仲景巴豆
治大黃乾薑之備急丸治卒中暴死腹痛滿閉
黑下咽立效豈二人不知虛實耶蓋上工之醫
未診病時並不先存意見亦不生心自全有
是病但用是藥耳柯琴曰備急丸治寒結腸
胃白散治寒結在胸於此又可知還魂湯治
寒結在胸之表以散無形之邪氣也白散治
寒結在胸之裏以攻有形之痰飲也備急丸
治寒結在腸胃以攻不化之糟粕也

胃
景微卧用鼻
朱等祿却並不
不即立效豈二
大黃葶藶之
景微卒中昏冒口

磁硃丸

治神水寬大漸散昏如霧露中行漸覩空中有
黑花覩物成二體及內障神水淡綠色淡白色
又治耳鳴及聾

磁石 二兩
辰砂 一兩

神麴 三兩生更以一兩水和
餅煮浮入前藥煉蜜為丸

每服十丸加至三十丸空心米湯下

集註 王又原曰五藏六府之精皆上注於目則目
之能視者氣也目之所以能視者精也腎為

藏精故神水發於腎心爲離照故神光發於
心光發陽而外映有陰精以爲守則不散而
常明水發陰而凝靜有陽氣以爲布則洞悉
而不窮惟心腎有虧致神水乾涸神光短少
昏眊內障諸證所由作也磁石直入腎經收
散失之神性能引鐵吸肺金之氣歸藏腎水
硃砂體陽而性陰能納浮游之火而安神明
水能鑿火能燭水火相濟而光華不四射與
然目受藏府之精精神裨於穀神麴能消化五
穀則精易成矣蓋神水散大緩則不收賴鎮
墜之品疾收而吸引之故爲救急之劑也其
治耳鳴耳聾等證亦以鎮墜之功能治虛陽
之奔耳

柯琴曰此丸治癲癘之聖劑蓋狂癡是心腎
脾三藏之病心藏神脾藏意與智腎藏精與
志心者神明之主也主不明則十二官危使
道閉塞而不通形乃大傷卽此謂也然主何
以不明也心法離而屬火真水藏其中若天

一之真水不足地二之虛火妄行所謂天氣者蔽塞地氣者冒明日月不明邪害空竅故目多妄見而作此奇疾也非金石之重劑以鎮之狂必不止硃砂稟南方之赤色入通於心能降無根之火而安神明磁石稟北方之黑色入通於腎吸肺金之氣以生精墜炎上之火以定志二石體重而主降性寒而涼陰志同道合奏功可立俟矣神麩推陳致新上交心神下達腎志以生意智且食入於陰長氣於陽奪其食則已此內經治狂法也食消則益智明而精神治是用神麩之旨乎煉蜜和丸又甘以緩之矣

味甘以對之矣

意醫... 其用... 甘平...

... 此內...

石斛夜光丸

治神水寬大漸散昏如霧露空中有黑花及者

物成二神水淡綠淡白色者

天門冬 二兩

兔絲子 七錢

人參 二兩

茯苓 二兩

甘菊花 七錢

乾山藥 七錢

麥冬 一兩

熟地 一兩

肉蓯蓉 五錢

青菴子 五錢

生地 一兩

枸杞 七錢

羚羊角 五錢

草决明 八錢

石斛 七錢

杏仁 七錢

蒺藜 五錢

川芎 五錢

甘草 五錢

黃連 五錢

防風 五錢

枳殼 五錢

烏犀 五錢

牛膝 七錢五分

右為細末煉蜜丸桐子大每服三五十九溫酒鹽湯下

集羅謙輔曰此方為陽衰陰弱不能升精於口

而設故曰科與千金磁硃丸並重治證亦同然磁硃為鎮墜藥此為美補藥鍼經曰五藏六府精氣皆上於目而為之精故夫目之精明者陰陽合傳而為精明者也若腎肝虛則陰弱不能斂精以升養神水於內脾肺虛則陽衰不能攝陰而浮散神光於外以致神水寬大覩物成二此其治法其營在肝其主在腎其合在脾能合腎脾之陰而使肝達之則必能歸精於兩眸而繼明如晝夜矣是方先

補腎肝以二冬二地兔絲枸杞五味牛膝菴
 蓉羣隊滋陰之品以之強陰填精斂氣安神
 養血此壯水之主亦所以生水也復以人參
 炙草茯苓山藥培補中宮使調合陰陽也佐
 之以蒺藜甘菊川芎枳殼防風行肝達氣青
 箱決明子解結散滯黃連烏犀羚羊清火瀉
 熱然必取石斛之妙合脾腎者清而行之要
 使升精歸明之用藏府合德專精致一耳其
 以爲丸者補上治下利以緩利以久不利以

洗刀速也

治風熱上攻火眼赤痛驟生雲翳外障遮睛

防風 一錢

石膏 一錢

滑石 一錢

歸尾 一錢

赤芍 八分

羌活 八分

荆芥 五分

黃芩 五分

連翹 五分

川芎 五分

桔梗 五分

麻黃 五分

白朮 五分

大黃 五分

洗刀散

洗刀散

治風熱上攻火眼赤痛驟生雲翳外障遮睛

防風 一錢

石膏 一錢

滑石 一錢

歸尾 一錢

赤芍 八分

羌活 八分

荆芥 五分

黃芩 五分

連翹 五分

川芎 五分

桔梗 五分

麻黃 五分

白朮 五分

大黃 五分

芒消 五分

獨活 五分

元參 五分

大賊 五分

菊花 五分

白蒺藜 五分

蟬退 五分

草决明 五分

薄荷 四分

梔子 四分

蔓荆子 四分

細辛 三分

甘草 三分

加清茶葉五分水煎服

註 日之病內障者昏暗不明而不腫痛得之於

內七情動中勞傷心腎也外障者赤腫而痛
 睛不昏暗得之於六淫所襲熱蘊經絡也故
 內障多虛外障多實子和日眼無火不病非
 止內障正指外障而立言也外障赤腫而痛
 者或散外邪或瀉內熱或併解之可立愈也
 其有風火上攻留而不散凝結雲翳掩其光
 明者又非或散或下所能即愈也洗刀散方
 既可以攻風熱又可以去雲翳是一方而兼
 擅其長也方中用防風通聖散全劑是主以

去風熱也倍歸尾赤芍是治風先治血血行
 風自滅也加羌獨活蔓荊子倍防風是祛風
 而專在太陽表也太陽之裏少陰也故又加
 細辛直走少陰加元參下安腎火是治表而
 顧及其裏也其加木賊蟬蛻草決明白蒺藜
 菊花者是佐諸祛風清熱之羣藥以消風熱
 驟壅之雲翳也

失笑散

治產後心腹絞痛欲死或血迷心竅不省人事

五靈脂

蒲黃 等分

每服三錢酒煎服

獨聖散 附

南山查肉

炒一兩

水煎用童便沙糖和服

集 吳于宣曰經云心主血脾統血肝藏血故產
註 後瘀血停滯三經皆受其病以致心腹瘀痛

惡寒發熱神迷眩運胞膈滿悶凡茲者由寒
凝不消散氣滯不流行惡露停留小腹結痛
迷悶欲絕非純用甘溫破血行血之劑不能
攻逐蕩平也是方用靈脂之甘溫走肝生用
則行血蒲黃辛平入肝生用則破血佐酒煎
以行其力庶可直抉厥陰之滯而有推陳致
新之功甘不傷脾辛能散瘀不覺諸證悉除
直可以一笑而置之矣至獨聖散用山查一
味濃煎與沙糖童便同服者何也山查不惟
消食健脾功能破瘀止兒枕痛更益以沙糖
之甘逐惡而不傷脾童便之鹹入胞而不涼
下相得相須功力甚偉名之曰獨聖誠不虛
也

大黃廩蟲丸

治五勞七傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑

大黃 十兩

桃仁 四兩 去皮尖炒

杏仁 四兩 去皮尖炒

黃芩 二兩 炒

甘草 三兩

芍藥 四兩 炒

地黃 十兩

乾漆 一兩 炒

蝨蟲 一兩 五錢 去翅足炒

水蛭 百枚 炙黃

蟻螬 一兩 五錢 炒

廩蟲 一兩 去頭足炒

右十二味為末蜜丸如小豆大酒服五丸日

三服

集註

李中梓曰勞傷之證肌膚甲錯兩目黯黑此
內有瘀血者也瘀之日久則必發熱熱涸其
液則血乾於經隧之間愈乾愈熱愈熱愈乾
而新血皆損人之充養百骸光華潤澤者止
藉此血血傷則無以沃其膚故甲錯也目得
血而能視血枯則無以榮其目故黯黑也仲
景洞見此證補之不可涼之無益而立此方
經曰血主濡之故以地黃爲君堅者削之故

以大黃爲臣統血者脾也脾欲緩急食甘以
緩之又酸苦湧泄爲陰故以甘芍桃仁爲佐
鹹走血苦勝血故以乾漆之苦四蟲之鹹爲
使夫濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新
血不生今人遇一勞證便用滋陰之藥服而
不效坐以待斃術豈止此耶

不於坐以於... 仙方活命飲... 治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰又止痛消毒之聖藥也

仙方活命飲

附薛已治瘍通方

治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰又止痛消毒之聖藥也

穿山甲 白芷

防風 皂角刺

乳香 沒藥

當歸尾 赤芍

花粉 貝母

陳皮 金銀花

甘草

右十三味用酒一碗煎數沸服

集註

羅謙輔曰此瘍門開手攻毒之第一方也經

云營氣不從逆於肉理故癰疽之發未有不從營氣之鬱滯因而血結痰滯蘊崇熱毒爲患治之之法妙在通經之結行血之滯佐之以豁痰理氣解毒是方穿山甲以攻堅皂刺以達毒所白芷防風陳皮通經理氣而疏其滯乳香定痛和血沒藥破血散結赤芍歸尾

以驅血熱而行之以破其結佐以貝母金銀花甘草一以豁痰解鬱一以散毒和血其爲潰堅止痛宜矣然是方爲營衛尚強中氣不虧者設若脾胃素弱營衛不調則有托裏消毒散之法必須斟酌而用此薛已所論千古不易之治也因附治瘍用方之法於後使學者服膺云

薛已曰治瘍之法若腫高焮痛者先用仙方活命飲解之後用托裏敗毒散漫腫微痛者

用托裏散如不應加薑桂若膿出而反痛氣血虛也八珍散不作膿不腐潰陽氣虛也四君加歸耆肉桂不生肌不收斂脾氣虛也四君加芍藥木香惡寒憎寒陽氣虛也十全大補加薑桂補熱內熱陰血虛也四物加參耆欲嘔作嘔胃氣虛也六君加炮薑自汗盜汗五藏虛也六味丸料加五味子食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏喘促咳嗽脾肺虛也前湯加麥冬五味欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子理中湯熱渴淋秘腎虛陰火也加減八味丸大凡怯弱之人不必分其腫潰惟當先補胃氣蓋瘡瘍之作緣陰陽虧損其膿既泄氣血愈虛豈有不宜補者哉或疑參耆滿中間有用者又加發散敗毒所補不償所損又或以有疾不服補劑因而致誤者多矣可勝惜哉

托裏消毒散

人參

黃耆

白朮

茯苓

當歸

川芎

白芍

金銀花

白芷

甘草

連翹

水煎服

註

參耆朮苓草以益氣分歸芍芍以滋血分銀

花白芷連翹以解毒

