



中武  
595  
30

四十二

四十三





武  
門  
595  
卷  
30

御纂醫宗金鑑卷四十二



雜病心法要訣目錄



霍亂

嘔吐噦

翻胃噎膈

泄瀉

痢疾

黃疸

目錄



積聚

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

疝

御纂醫宗金鑑卷四十二

編輯雜病心法要訣

瘧疾總括

夏傷於暑舍營內秋感寒風并衛居比時或為外邪束暑汗無出病瘧疾

註

經曰瘧瘧皆生於風謂四時病瘧未有不因風寒外束暑邪內伏者也又曰瘧者風寒之氣不常也此言比時病瘧者也又曰夏傷於暑秋為瘧瘧又曰夏暑汗不出者秋成風瘧



謂夏傷於暑其邪甚者即病暑其邪微者則舍於營復感秋氣寒風與衛并居則暑與風寒合邪始成瘧病也其不即病傷寒者亦以有暑邪預伏於營中也蓋有風無暑惟病風

亦有暑無風惟病暑必風暑合邪始病瘧也

夏日作間作營內邪如寒風并營此謂之瘧也  
瘧隨經絡循伏營深入脊內注伏衝橫連膜原薄藏府會衛之時正邪爭得陰內薄生寒慄得陽外出熱蒸蒸邪淺日作日會衛邪深間作衛遲逢

注

瘧氣之邪伏藏於營隨其經絡循脊脊之表而下此初病邪淺傳舍之次也其邪深者則入脊脊之內伏注於衝脈橫連諸經脂膜之原內及藏府此邪漸深傳舍之次也衛氣者一日一夜周於身每至明旦則出足太陽睛明大會於風府腠理乃開開則所容營衛之邪入邪入得陰內薄則生寒得陽外出則生熱內外相薄邪正交爭而病乃作也病初邪淺者衛行未失常度其邪日與衛會故日作



也病久邪深者衛行遲失常度其邪不能日  
與衛會故間日乃作也時有間二日間三日  
或至數日作者亦衛氣行愈遲會愈遲故作  
愈遲也

瘧晝夜作

衛不循經行脈外陽會晝發陰夜發邪退自然歸  
陽分病進每必入陰家

註營氣循經而行脈中衛氣不循經而行脈外  
惟日行於三陽夜行於三陰故邪在三陽之

淺者則晝發邪在三陰之深者則夜發病邪  
將退者夜發退爲晝發此爲去陰就陽則病  
欲已也病邪漸進者晝發進爲夜發此爲去  
陽入陰則病益甚也

瘧蚤晏作

衛氣平旦會風府邪傳日下一節間從頭循下故  
益晏下極復上蚤之緣

註

衛氣流行每日平旦會於風府而邪氣中人  
從頭項歷風府下循背腰日下傳脊之一節



邪與衛會日晚故作日益晏也邪傳下極氾  
衝其氣復上行邪與衛會日蚤故作日益蚤  
也

瘧疾治法

瘧初氣實汗吐下表裏俱清用解方清解不愈方  
可截久瘧形虛補自當

註瘧初氣實均宜汗吐下有表裏證汗下之胸  
滿嘔逆有飲者吐之表裏俱清宜用和解清  
解不愈表裏無證可用截藥止之久瘧形

氣虛宜用補劑自當然也

桂麻各半湯

瘧初寒熱兩平者桂麻各半汗方療汗少寒多麻  
倍入汗多倍桂熱加膏

註瘧病初起寒熱不多不少兩平者宜桂麻各  
半湯汗之汗少寒多熱少者倍麻黃湯汗之  
汗多寒少熱平者倍桂枝湯汗之熱多者更

加石膏

麻黃羌活湯



桂枝羌活湯

麻黃羌活加半夏湯

白虎湯

白虎桂枝湯

柴胡白虎湯

柴胡桂枝湯

寒多寒瘧而無汗麻黃羌活草防尋熱多有寒爲  
風瘧減麻添桂嘔半均先熱後寒名溫瘧白虎  
多合桂君瘧瘧但熱柴白虎牝瘧惟寒柴桂親

此皆諸瘧初起之汗法也先傷於寒後傷於  
風先寒後熱寒多熱少無汗謂之寒瘧宜用  
麻黃羌活湯卽麻黃羌活防風甘草也先傷  
於寒後傷於風先寒後熱熱多寒少有汗謂  
之風瘧宜用桂枝羌活湯卽桂枝羌活防風  
甘草也二證嘔者均加半夏先傷於風後傷  
於寒先熱後寒謂之溫瘧宜用白虎湯汗多  
合桂枝湯陽氣盛陽獨發則但熱而不寒謂  
之瘧瘧宜用柴胡白虎湯卽小柴胡合白虎



湯也陰氣盛陰獨發則但寒而不熱謂之牝  
瘧宜用柴胡桂枝湯即小柴胡合桂枝湯也  
草果柴平湯

### 大柴胡湯

食瘧痞悶噫惡食草果小柴平胃宜瘧裏便鞭大  
柴下消檳果朴量加之

註 因食而病瘧者則痞悶噫氣惡食宜小柴胡  
合平胃散加草果熱少既瘧有裏不清便鞭  
者宜大柴胡湯加芒消厚朴草果檳榔下之

### 清脾飲

瘧疾已經汗吐下清解未盡寒熱方清脾白朮青  
朴果小柴參去入苓薑氣虛加參痰橘半飲多宜  
逐倍薑榔渴熱知膏天花粉食滯麥麩濕澤蒼

註 瘧疾已經或汗或吐或下表裏無證法當清

解宜用清脾飲和之即白朮青皮厚朴草果  
柴胡黃芩半夏甘草茯苓生薑也氣虛者加  
人參痰多者加橘紅倍半夏飲多者倍生薑  
加檳榔渴熱者加知母石膏天花粉食滯者



加麥芽神麩濕盛者加澤瀉蒼朮

久瘧虛瘧勞瘧

久瘧氣虛脾胃弱四獸益氣等湯斟酌勞瘧鱉甲十  
全補熱除者桂入柴芩

註 久患瘧疾形氣俱虛脾胃弱不思食宜用四

獸飲補中益氣等湯斟酌治之久病勞損氣

血兩虛而病瘧疾名曰勞瘧宜用十全大

補湯倍加鱉甲熱沫盡溼去黃者肉桂加柴

胡黃芩也

柴胡截瘧飲

蜜佗僧散

諸瘧發過三五次表裏皆清截法先未清截蚤發  
不已已清不截正衰難截虛柴胡截瘧飲小柴梅  
桃櫟常山截實不二佗僧散燒酒冷調服面南

註 凡瘧按法治之發過三五次表裏無證當先

以截瘧藥截之若表裏未清截蚤則瘧疾必  
復發之不已表裏已清不截則正衰邪盛而  
難治也截不足人之瘧宜用小柴胡湯加常



山檳榔烏梅桃仁薑棗煎併滓露一宿次日  
發前一二時小溫服惡心以糖拌烏梅肉壓  
之截有餘人之瘧宜用不二飲全方或蜜佗  
僧細末大人七分小兒量之冷燒酒調面南  
如前法服之一服不愈再服必止戒鷄魚豆  
腐麵食羹湯熱粥熱物菜時時飲小柴胡  
瘧瘧瘧母正穴寒裏背背結去去未背背  
瘧瘧經年久不愈瘧母成塊結癖癥形實控涎或  
化滯攻後餘法與前同

註瘧瘧經年不愈之老瘧也瘧母久瘧腹中成  
塊癖也形實宜用控涎丹以攻痰飲或用化  
滯丸以攻積滯攻後之餘法與前所治瘧法  
同也

桂枝麻黃柴胡四物去杏仁加桃仁湯

瘧在夜發三陰瘧桂麻柴物杏易桃鬼瘧尸注多  
惡夢恐怖蘇合效功高用蘇合香散代之

註瘧在夜發名曰三陰瘧疾初熱宜用桂枝湯  
麻黃湯小柴胡湯四物湯方合劑以杏仁易



桃仁增損汗之汗解之後餘同前法鬼瘧亦  
多在夜發由尸氣注之比三陰瘧疾則夜多  
惡夢時生恐怖宜用蘇合香丸治之

霍亂總括

揮霍變亂生倉卒心腹大痛吐利兼吐瀉不出乾  
霍亂舌卷筋縮入腹難

註 欲吐不吐欲瀉不瀉心腹大痛名曰乾霍亂

又名攪腸痧若舌卷筋縮則卵陰入腹難治

也

藿香正氣散六一甘藷煎寒濕氣滯中惡

二香湯則史氏林當歸煎木瓜吳萸人暑合香

甘露飲善食木蘇瀝氣散五瀝六藿藜刺半芥



霍亂風寒暑食水雜邪為病正氣方藿蘇陳半夏  
苓草芷桔腹皮厚朴當轉筋木瓜吳萸入暑合香  
藿濕入蒼暑熱六一甘露飲寒極烏附理中湯

註

霍亂之病得之於風寒暑食水邪雜揉為病  
亂於腸胃清濁相干故心腹大痛吐瀉也藿  
香正氣湯即藿香蘇葉陳皮半夏茯苓甘草  
白芷桔梗大腹皮厚朴也暑則吐多合香藿  
飲名二香湯濕則瀉多加蒼朮暑熱甚者用  
辰砂六一散或五苓散加石膏滑石寒水石

噎名甘露飲寒極肢厥脈伏者用炮川烏炮川  
三陽附合理中湯乾枯賁幽魄不通賁門不納為  
噎膈幽門不放翻胃成二證留連傳導隘魄門應  
自瀉於行胸痛便秘如羊糞吐沫嘔血命難生

註

三陽熱結謂胃小腸大腸三府熱結不散灼  
傷津液也胃之上口為賁門小腸之上口為  
幽門大腸之下口為魄門三府津液既傷三  
門自然乾枯而水穀出入之道不得流通矣  
賁門乾枯則納入水穀之道路狹隘故食不



霍亂風寒暑食水雜邪為病正氣方弱藹陳  
苓草芷桔腹皮厚朴當轉筋木瓜吳茱入善合香  
需濕入蒼者熱六一甘露飲寒極烏附理中湯

註 霍亂之病得之於風寒暑食水邪雜按為病

亂於腸胃清濁相干故心腹大痛吐瀉也

香正氣湯即霍亂者藹陳文華黃連等

白芷桔梗大腹散厚朴小

痢合聖中湯

各甘靈燿寒蘇玆煎瀉丹香用厥臥急臥

噎膈翻胃總括

三陽熱結傷津液乾枯賁幽魄不通賁門不納為  
噎膈幽門不放翻胃成二證留連傳導隘魄門應  
自瀉於行胸痛便艱如羊糞吐沫嘔血命難生

註

三陽熱結謂胃小腸大腸三府熱結不散灼

傷津液也胃之上口為賁門小腸之上口為

幽門大腸之下口為魄門三府津液既傷三

門自然乾枯而水穀出入之道不得流通矣

賁門乾枯則納入水穀之道路狹隘故食不



能下爲噎塞也幽門乾枯則放出腐化之道  
路狹隘故食入反出爲翻胃也二證留連日  
久則大腸傳導之路狹隘故魄門自應燥澇  
難行也胸痛如刺胃腕傷也便如羊糞津液  
枯也吐沫嘔血血液不行皆死證也

八參利膈丸

汞硫散

五汁大黃清燥熱丁沉君子理虛寒便秘壅遏應  
利膈吐逆不止汞硫先利膈小承參草木歸藿檳

桃麻蜜丸汞一硫二研如墨老酒薑汁服即安

註

五汁謂五汁飲以清燥乾也大黃謂大黃湯

即大黃一味用薑汁炙大黃片變黑黃色量

人強弱每服二三錢加陳倉米一撮葱白二

莖煎去滓服以治熱結也丁香沉香加入四

君子六君子理中湯內治虛寒也利膈謂利

膈丸即枳殼厚朴大黃人參甘草木香當歸

藿香檳榔桃仁火麻仁蜜爲丸也汞硫謂汞

四硫散也



四君子湯

四物湯

二陳湯

二十四味流氣飲

氣少血枯四君子湯痰多氣滯二陳流餘者亦同嘔

吐法竭思區畫待天休

計氣少者宜四君子湯血枯者宜四物湯痰多

宜二陳湯氣滯者宜二十四味流氣飲其餘

之治法同嘔吐此病雖竭心思區畫亦不

盡人事以待天命也



蓋人專以谷天命也

嘔吐噦總括

有物有聲謂之嘔有物無聲吐之微無物有聲噦

乾嘔面青指黑痛厥凶

註面色青指甲黑也中痛不止肢厥不回其凶

可知也

小半夏湯

橘皮半夏湯

大半夏湯

黃連半夏湯



丁萸六均湯

嘔吐半薑為聖藥氣盛加橘虛蜜參熱盛薑連便閉下寒盛丁萸薑六君

註便閉謂大小二便閉而不行宜攻下也初吐切不可下恐逆病勢也

五汁飲

硫汞散

化滯丸

潤燥止吐五汁飲蘆薈甘蔗竹瀝薑嘔吐不下硫

汞墜積痛作吐化滯良

註

五汁飲即蘆薈蒴薺甘蔗竹瀝薑汁也嘔吐

諸藥湯水到咽即吐者宜用二墜之藥以石

硫黃二錢水銀一錢同研如煤色極細用老

酒薑汁調服稍點白滾湯亦可頓服之其藥

即不能吐出次日大便出黑色穢物諸湯水

藥服之則不吐也如不大便黑色再服以大

便利為度吐而痛者乃積也宜化滯丸



行集... 卷之...  
 對... 濕瀉... 寒瀉... 瀉... 瀉...  
 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉...  
 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉... 瀉...

諸泄總括

濕瀉

濡瀉

水瀉

洞瀉

寒瀉

殮瀉

脾瀉

腎瀉

濕勝濡瀉即水瀉多冰腸鳴腹不疼寒濕洞瀉即  
 寒瀉鳴澆清徹痛雷鳴完穀不化名殮瀉土衰木  
 盛不升清脾虛腹滿食後瀉腎瀉寒虛晨數行

註

濡者水也洞者直傾下也鳴澆如鴨屎之澆  
 澄徹清冷也痛腹痛也雷鳴腸鳴甚也不升  
 清謂清氣在下不止升也脾瀉脾虛也食瀉



飲食後卽瀉也晨數行每至蚤晨行瀉數次也

食瀉 胃瀉 飲瀉 痰瀉

火瀉 暑瀉 滑瀉 大瘕瀉

傷食作瀉卽胃瀉噫氣腹痛穢而黏渴飲瀉復渴飲瀉時瀉時止却屬痰火瀉陣陣痛飲冷暑瀉面垢汗渴煩滑瀉日久不能禁大瘕今時作痢看

註 過食作瀉名曰食瀉卽胃瀉也穢而黏所瀉之物臭而黏也渴而飲飲而瀉瀉而復渴渴

而復飲飲而復瀉飲瀉也時或瀉時或不瀉屬痰瀉也陣陣謂瀉一陣痛一陣也大瘕瀉卽今時之痢疾病也

泄瀉死證

泄瀉形衰脈實大五虛噦逆手足寒大孔直出無禁止下瀉上噉命多難

註 五虛謂脈細皮寒氣少水漿不久大便不禁

也大孔謂肛門大孔不禁也

參苓白朮散



濕瀉胃苓分清濁寒瀉理中附子添殮瀉升陽益  
胃治倍加芍藥減黃連脾瀉參苓白朮散扁豆四  
君蓮肉攢薏苡山藥縮砂桔腎瀉二神四神丸

註參苓白朮散即扁豆人參白朮茯苓炙草蓮

肉薏苡仁山藥縮砂桔梗也二神丸即補骨  
脂肉豆蔻本方加吳茱萸五味子名四神丸

青六散

芍藥苓連葛根湯

八柱散

食瀉實下虛消導飲瀉實者神祐斟虛者春澤甘  
露飲痰瀉實攻虛六君火瀉草芍苓連葛暑瀉紅  
麴六一勻滑瀉八柱理中附粟殼烏梅訶薤尋

註食瀉形氣實者宜大承化滯等藥下之形氣

虛者宜枳朮平胃等消導之神祐斟謂雖當

用神祐丸逐飲然亦斟酌不可過也春澤謂

春澤湯也甘露飲謂五苓甘露飲也芍藥苓

連葛根湯即甘草芍藥黃苓黃連葛根也青

六散即六一散加紅麴也八柱散附子理中



湯加罌粟殼烏梅訶子肉蔻也

瀉心導赤散

茯苓車前子飲

苓桂理中湯

口糜泄瀉雖云熱上下相移亦必虛心脾開竅於舌口小腸胃病化職失糜發生地通連草瀉下參苓白朮宜尿少茯苓車前飲火虛苓桂理中醫

註口瘡糜爛泄瀉一證古經未載以理推之雖云屬熱然其上發口糜下瀉即止泄瀉方止

口糜即生觀其上下相移之情狀亦必純實熱之所為也心之竅開於舌脾之竅開於口心脾之熱故上發口舌瘡赤糜爛胃主消化水穀小腸主盛受消化心脾之熱下移小腸胃府則運化之職失矣故下注泄瀉也口糜發時晚用瀉心導赤散滾湯淬服之即生地木通黃連甘草稍也下泄瀉時蚤晚用參苓白朮散糯米湯服之若小便甚少下利不止則為水走大腸宜用茯苓車前子二味各等



分煎湯時時代飲利水導熱若服寒涼藥口  
瘡不效則爲虛火上泛宜用理中湯加肉桂  
大倍茯苓降陽利水降陽而口糜自消水利  
泄瀉自止可並愈也

痢疾總括

大瘕小腸大腸瀉腸癖滯下古痢名外因風暑濕  
蒸氣內因不謹飲食生白痢傷氣赤傷血寒虛微  
痛熱窘疼實墜糞前虛墜後濕熱寒虛初久稱

註

大瘕瀉者裏急後重數至圜而不能便莖中  
痛也小腸瀉者溲澁而便膿血少腹痛也大  
腸瀉者食已窘迫大便色白腸鳴切痛也腸  
癖者飲食不節起居不時陰受之則入五藏  
膜脹閉塞下爲殭瀉久爲腸癖腹痛下血也



滯下者積汁垢膩與濕熱滯於腸中因而下也此皆古痢之名也然痢之爲病裏急後重下利膿血小便赤澁裏急者腹痛積滯也後重者下墜氣滯也小便赤澁者濕熱鬱滯也皆因外受風暑濕蒸之氣內傷生冷飲食過度而生也白痢自大腸來大腸與肺爲表裏肺主氣故屬傷氣也赤痢自小腸來小腸與心爲表裏心主血故屬傷血也寒閉痛甚寒開痛微痢開病減故痛微也虛者少氣氣無

壅滯故亦痛微也熱者多實性急不得舒通故窘痛甚也後墜下迫肛門糞出墜止爲糞前墜乃滯也故曰實墜糞出更墜爲糞後墜非滯也故曰虛墜初痢多屬濕熱久痢多屬寒虛也

噤口痢	水穀痢	風痢	休息痢
熱痢	寒痢	濕痢	五色痢

噤口飲食俱不納水穀糟粕雜血膿風痢墜重圜清血休息時作復時停熱痢魚腦稠黏穢寒痢稀



解白清腥濕痢黑豆汁渾濁五色相雜藏氣凶

註

噤口痢者下利不食或嘔不能食也水穀痢者糟粕膿血雜下也風痢者似腸風下清血而有墜痛也休息痢者時發作時停止也五色痢者五色膿血相雜而下也若有藏腐屍臭之氣則凶

痢疾死證

水漿不入利不止氣少脈細皮膚寒純血噤口嘔藏氣身熱脈大命難全

註

下利不止水漿不入氣少脈細皮膚寒死於陽絕也下利純血噤口嘔逆藏氣身熱脈大死於陰絕也

倉廩湯

大黃黃連湯

初痢表熱宜倉廩裏熱衝心大黃連寒痢理中訶藳縮附白桂赤不須言

註

初痢有表證發熱者不宜攻之法當先解其外用倉廩湯汗之裏熱盛上衝心作嘔噤口



者法當先攻其裏用大黃黃連好酒煎服攻之寒痢宜用理中湯加訶子肉蔻縮砂白多者加附子赤多者加肉桂也

芍藥湯

初痢內外無大熱芩連枳木芍歸柳桂草尿澀滑石倍利數窘痛入大黃

註

初痢外無表熱內熱不盛宜用芍藥湯即黃芩黃連枳實木香芍藥當歸檳榔甘草肉桂少許也小便澀赤加滑石下利次數無度下

墜痛甚入大黃也

香連和胃湯

參連開噤湯

貼臍法

痢疾下後調氣血宜用香連和胃湯黃芩芍藥香連草陳皮白朮縮砂當赤虛更加椿榆炒白虛參苓共炒薑噤口參連石蓮子貼臍王瓜藤散良

註

痢疾攻後病勢大減宜調氣血用香連和胃湯即黃芩芍藥木香黃連甘草陳皮白朮縮



砂當歸也赤痢下血多虛者當澁之加炒椿  
根白皮炒地榆白痢日久氣虛者加人參茯  
苓炒乾薑以補之實而噤口堪下者以大黃  
黃連湯下之不堪下者內以人參黃連石蓮  
子煎湯徐徐服之下咽卽好外以貼臍王瓜  
藤散卽王瓜藤莖葉經霜者燒灰香油調納  
臍中卽有效也

### 真人養藏湯

久痢寒熱烏梅治寒虛滑痢養藏湯參朮肉蔻歸

### 訶桂芍藥罌粟草木香

註

久痢藏有寒熱不分者宜用烏梅丸調和之

寒虛滑脫者宜用養藏湯溫補之卽人參白

朮肉蔻當歸訶子肉桂芍藥罌粟殼甘草木

香也

### 香連平胃散

胃風湯

水穀調中益氣治濕痢香連平胃方虛濕風痢胃  
風治桂粟八珍減地黃



註  
水穀痢者乃脾胃虛腐化不及宜調中益氣  
湯濕痢宜木香黃連合平胃散方濕而虛者  
宜用胃風湯卽肉桂粟米八珍湯減地黃也  
五色痢休息痢治法

五色休息皆傷藏澁蚤滯熱蘊於中補之不應脈  
有力日久仍攻餘法同

註  
五色休息二利皆因用止澁藥蚤或因滯熱  
下之未盡蘊於腸胃傷藏氣也用一切補養  
之藥不應則可知初病非止澁太蚤卽下之

未盡也診其脈若有九雖日久仍當攻也其  
餘治法與諸痢同



疸證總括

面目身黃欲安臥小便渾黃疸病成已食如飢飽  
煩眩胃疸穀疸酒疸名女勞額黑少腹急小便自  
利審癥生黃汗微腫皆濕熱陰黃重痛厥如水

註

面目身黃但欲安臥小便黃渾此黃疸病已  
成也如已食如飢食難用飽飽則心煩頭眩  
此欲作胃疸胃疸者即穀疸也若已見黃色  
疸已成矣得之於胃有濕熱大饑過食也酒  
疸者得之於飲酒無度而發是病也女勞疸



者疸而額黑少腹急小便自利得之於大勞  
 大熱與女交接也瘀血發黃亦少腹急小便  
 自利但不額黑耳詳在傷寒門黃汗者汗出  
 黃色染衣面目微腫得之於素有濕熱汗出  
 入水浴之也此皆濕熱而成惟陰黃則屬濕  
 寒陰黃者身重而痛厥冷如水詳在傷寒門  
 疸病死證

疸過十日而反劇色若烟熏目暗青喘滿渴煩如  
 啖蒜面黧汗冷及天行

仲景曰黃疸之病當以十八日為期治之十

日以上宜差反劇為難治也色若烟熏目神  
 暗青陽黃死證也喘滿渴煩不已心胸如啖  
 蒜刺痛黃毒入腹死證也面色黧黑冷汗漿  
 漿陰黃死證也天行疫癘發黃名曰瘟黃死  
 人最暴也

麻黃茵陳醇酒湯

茵陳蒿湯

梔子蘘皮湯



茵陳五苓散

表實麻黃茵陳酒裏實茵陳梔子大黃無證茵陳梔子藥尿少茵陳五苓湯

註

諸疸表實無汗者以麻黃茵陳無灰好酒煎服汗之裏實不便以茵陳梔子大黃下之無表裏證以茵陳梔子藥皮清之小便短少以茵陳五苓散利之

胃疸湯

穀疸熱實宜乎下不實宜用胃疸湯茵陳胃苓減

草朴連梔防已葛秦方

註

胃疸湯即茵陳蒼朮陳皮白朮茯苓猪苓澤瀉黃連梔子防已葛根秦艽也

茵陳解醒湯

梔子大黃湯

蔓菁散

加味玉屏風散

酒疸虛茵解醒湯實用梔鼓枳大黃黃汗一味蔓菁散石膏茵陳蒼朮防



註

酒疸虛者用茵陳解醒湯即葛花解醒湯加茵陳也實者用梔子大黃湯即梔子淡豆豉枳實大黃也黃汗宜用蔓菁子一味為細末每服二錢日三并華水調服小便白則愈或用加味玉屏風散即石膏茵陳黃耆白朮防風也

石膏散

腎疸湯

女勞實者膏滑麥女勞虛者腎疸醫升陽散火減

去芍加苓藥麩四苓俱

註

石膏散即煨石膏飛滑石各等分每服二錢大麥湯調服腎疸湯即升陽散火湯減去芍藥乃升麻蒼朮防風獨活柴胡羌活葛根人參甘草加入黃芩黃蘗神麩白朮茯苓猪苓澤瀉也



積聚總括  
 五積六聚本難經七癥八瘕載千金腸覃石瘕辨  
 月事疝瘕之名別淺深藏積發時有常處府聚忽  
 散無本根癥類積疝瘕聚瘕腸滿汁溢外寒因  
 註  
 五積六聚之名本乎難經五積者肥氣伏梁  
 痞氣息賁奔豚也六聚者積之着於孫絡緩  
 筋募原膂筋腸後輸脈也七癥八瘕之名載  
 千金方七癥者蛟蛇蠶肉髮虱米也八瘕者  
 青黃燥血脂狐蛇蠶也腸覃者積在腸外狀

積聚總括

五積六聚本難經七癥八瘕載千金腸覃石瘕辨  
 月事疝瘕之名別淺深藏積發時有常處府聚忽  
 散無本根癥類積疝瘕聚瘕腸滿汁溢外寒因

註

五積六聚之名本乎難經五積者肥氣伏梁  
 痞氣息賁奔豚也六聚者積之着於孫絡緩  
 筋募原膂筋腸後輸脈也七癥八瘕之名載  
 千金方七癥者蛟蛇蠶肉髮虱米也八瘕者  
 青黃燥血脂狐蛇蠶也腸覃者積在腸外狀



如懷子月事以時而下石瘕者積在胞中狀如懷子月事不以時下故曰辨月事也瘕者外結募原肌肉之間癖者內結隱僻脊脊腸胃之後故曰別淺深也然積者屬藏陰也故發有常處不離其部聚者屬府陽也故發無根本忽聚忽散瘕不移而可見故類積類瘕也瘕能移有時隱故類聚類癖也積聚瘕瘕腸覃石瘕瘕癖之疾皆得之於喜怒不節則傷藏飲食過飽則傷府腸胃填滿汁液外溢

爲外寒所襲與內氣血食物凝結相成也

### 積聚難證

積聚牢堅不軟動胃弱溏瀉不堪攻奔豚發作狀欲死氣上衝喉神怖驚

註

積聚牢固不動堅硬不軟則病深矣胃弱食少大便溏瀉不堪攻矣五積之中奔豚最爲難治若更發作正氣虛不能支其狀欲死從少腹起氣上衝喉神色驚怖皆惡候也

### 積聚治法



積聚胃強攻可用攻虛兼補正邪安氣食積癖宜  
化滯溫白桃仁控涎丹

註積聚宜攻然胃強能食始可用攻若攻虛人  
須兼補藥或一攻三補或五補一攻攻邪而  
不傷正養正而不助邪則邪正相安也凡攻  
氣食積癖宜用秘方化滯丸方在內傷門攻  
積聚癥瘕宜用溫白丸卽萬病紫苑丸方倍  
川烏攻血積血瘕宜用桃仁煎卽桃仁大黃  
各一兩蠹虫炒五錢朴消一兩共爲末先以

醇醋一觔用砂器慢火煎至多半鍾下末藥  
攪良久爲小丸前一日不喫晚飯五更初溫  
酒送下一錢取下惡物如豆汁鷄肝未下次  
日再服見鮮血止藥如無蠹虫以麤虫代之  
然不如蠹虫爲愈也攻痰積宜用控涎丹方  
在痰飲門



一曰丹毒... 二曰丹毒... 三曰丹毒... 四曰丹毒... 五曰丹毒... 六曰丹毒... 七曰丹毒... 八曰丹毒... 九曰丹毒... 十曰丹毒... 十一曰丹毒... 十二曰丹毒... 十三曰丹毒... 十四曰丹毒... 十五曰丹毒... 十六曰丹毒... 十七曰丹毒... 十八曰丹毒... 十九曰丹毒... 二十曰丹毒... 二十一曰丹毒... 二十二曰丹毒... 二十三曰丹毒... 二十四曰丹毒... 二十五曰丹毒... 二十六曰丹毒... 二十七曰丹毒... 二十八曰丹毒... 二十九曰丹毒... 三十曰丹毒... 三十一曰丹毒... 三十二曰丹毒... 三十三曰丹毒... 三十四曰丹毒... 三十五曰丹毒... 三十六曰丹毒... 三十七曰丹毒... 三十八曰丹毒... 三十九曰丹毒... 四十曰丹毒... 四十一曰丹毒... 四十二曰丹毒... 四十三曰丹毒... 四十四曰丹毒... 四十五曰丹毒... 四十六曰丹毒... 四十七曰丹毒... 四十八曰丹毒... 四十九曰丹毒... 五十曰丹毒... 五十一曰丹毒... 五十二曰丹毒... 五十三曰丹毒... 五十四曰丹毒... 五十五曰丹毒... 五十六曰丹毒... 五十七曰丹毒... 五十八曰丹毒... 五十九曰丹毒... 六十曰丹毒... 六十一曰丹毒... 六十二曰丹毒... 六十三曰丹毒... 六十四曰丹毒... 六十五曰丹毒... 六十六曰丹毒... 六十七曰丹毒... 六十八曰丹毒... 六十九曰丹毒... 七十曰丹毒... 七十一曰丹毒... 七十二曰丹毒... 七十三曰丹毒... 七十四曰丹毒... 七十五曰丹毒... 七十六曰丹毒... 七十七曰丹毒... 七十八曰丹毒... 七十九曰丹毒... 八十曰丹毒... 八十一曰丹毒... 八十二曰丹毒... 八十三曰丹毒... 八十四曰丹毒... 八十五曰丹毒... 八十六曰丹毒... 八十七曰丹毒... 八十八曰丹毒... 八十九曰丹毒... 九十曰丹毒... 九十一曰丹毒... 九十二曰丹毒... 九十三曰丹毒... 九十四曰丹毒... 九十五曰丹毒... 九十六曰丹毒... 九十七曰丹毒... 九十八曰丹毒... 九十九曰丹毒... 一百曰丹毒...

疝證總括

經云任脈結七疝子和七疝主於肝肝經過腹環  
 陰器任脈循腹裏之原疝證少腹引陰痛衝上衝  
 心二便難厥吐瘕癥狐出入潰膿癰秘木癩頑

註

經曰任脈為病男子內結七疝女子帶下瘕  
 聚瘕聚者即女子之疝也七疝主任者原以  
 任脈起中極循腹裏也七疝主肝者蓋以肝  
 經過腹裏環陰器也是以諸疝病無不由是  
 二經故主之也疝病之證少腹痛引陰丸氣



上衝心不得二便者爲衝疝也少腹痛引陰  
丸肝之逆氣衝胃作吐者爲厥疝也少腹之  
氣不伸左右癥塊作痛者爲瘕疝也臥則入  
腹立則出腹入囊似狐之晝則出穴而溺夜  
則入穴而不溺者爲狐疝也少腹痛引陰丸  
橫骨兩端約文中狀如黃瓜內有膿血者爲  
瘕疝也少腹痛引陰丸小便不通者爲瘕疝  
也少腹不痛陰囊腫大頑硬者爲癰疝也  
疝證同名異辨

血疝便毒潰魚口瘻癩氣墜筋卽疝水疝胞痺皆  
瘕疝衝似小腸腰痛連

註有謂血疝者其證卽便毒魚口也瘻疝者其  
證卽癩疝也氣疝者卽偏墜也筋疝者卽下  
疝也水疝小便不通胞痺卽膀胱氣皆瘕疝  
也衝疝證似小腸氣而更連腰痛也

諸疝治法

治疝左右分氣血尤別虛濕熱與寒寒收引痛熱  
多縱濕腫重墜虛輕然



註

疝病凡在左邊陰丸屬血分凡在右邊陰丸屬氣分凡寒則收引而痛甚熱則縱而痛微凡濕則腫而重墜而虛亦腫墜但輕輕然而不重也

當歸溫疝湯

烏桂湯

中寒冷疝歸芍附桂素苧棟澤萸苓外寒入腹川烏蜜肉桂芍草棗薑同

註 當歸溫疝湯即當歸白芍附子肉桂延胡索

小茴香川棟子澤瀉吳茱萸白茯苓也烏桂湯即川烏蜂蜜肉桂白芍藥炙甘草生薑大棗也

烏頭梔子湯

外寒內熱烏梔炒水酒加鹽疝痛安癩疝不問新與久三層茴香自可痊

註 此茴香丸方在醫宗必讀

十味蒼蘘散

醇酒厚味濕熱疝不謹房勞受外寒蒼蘘香附青



益草茴索查桃附子煎

註此散即蒼朮黃蘗香附青皮益智甘草小茴

香南山查元胡索桃仁附子也

茴棟五苓散

大黃皂刺湯

膀胱水疝尿不利五苓茴棟與葱鹽煎鞭血疝宜  
乎下大黃皂刺酒來煎

註大黃皂刺湯即大黃皂刺各三錢酒煎服也

羊肉湯

血分寒疝女產後臍腹連陰脹痛疼羊肉一筋薑  
五兩當歸三兩水八升

奪命湯

衝疝厥疝痛上攻臍悸奔豚氣上行吳茱一味為  
君主肉桂澤瀉白茯苓

青木香丸

氣疝諸疝走注痛青木香附吳萸良巴豆拌炒川  
棟肉烏藥葶澄小茴香

註青木香丸即青木香五錢酒醋浸炒吳茱萸



一兩香附醋炒一兩葶澄茄五錢烏藥五錢  
小茴香五錢巴豆仁二十一粒研碎拌炒川  
棟肉五錢為末合均葱涎為小丸每服三錢  
酒鹽任下立愈及能醫一切疝痛神效

茴香棟實丸

棟實狐疝一切疝棟肉茴香馬蘭芫三莢二皮各  
一兩仍宜急灸大敦安

註

茴香棟實丸治狐散及一切諸疝即川棟肉  
小茴香馬蘭花芫花醋炒變焦色山茱萸吳

茱萸食茱萸青皮陳皮各一兩為末醋糊為

小丸酒送二錢

按大敦肝經穴在足大指甲後有毛處諸疝均

宜灸之即安

牙齒口舌

咽喉

背脊痛

心腹諸痛

胎前痛



宜灸之咱安

大婢用醫穴耳大許甲針育手裏諸諸性  
小飲酉蒸二疑

菜黃食菜黃青史刺史各一兩為末醋味

御纂醫宗金鑑卷四十三

編輯雜病心法要訣目錄

頭痛眩暈

眼目

牙齒口舌

咽喉

肩背痛

心腹諸痛

胸脇痛



腰痛

小便閉癢遺尿不禁

大便燥結

御纂醫宗金鑑卷四十三

編輯雜病心法要訣

頭痛眩暈總括

頭痛痰熱風濕氣或兼氣血虛而疼在右屬氣多  
痰熱左屬血少更屬風因風眩暈頭風痛熱暈煩  
渴火上攻氣鬱不伸痰嘔吐濕則重痛虛動增

註

頭痛屬痰屬熱屬風屬濕屬氣或兼氣虛血  
虛因風而痛謂之頭風必眩暈因熱而痛暈  
者則煩渴因氣鬱而痛暈者則志意不伸因



痰而痛暈者則嘔吐痰涎因濕而痛暈者則  
頭重不起因虛而痛暈者動則更痛更暈也  
頭痛眩暈死證

真頭腦痛朝夕死手足厥逆至節青瀉多眩暈時  
時冒頭卒大痛目昏凶

許真頭痛痛連腦內手足青冷至肘膝之節朝  
發夕死凡頭痛眩暈時時迷冒及頭目卒然  
大痛目視不見或瀉多之後皆凶證也

葶芫散

芎芷石膏湯

頭風嗜鼻熱葶芫濕盛瓜蒂入茶茗風盛日久三  
聖散內服芎芷石膏靈芎芷石膏菊羌藁苦加細  
辛風防荆熱加梔翹芩薄荷草便秘尿紅消黃攻

註一切頭風兼熱者以葶芫散嗜鼻即葶芫一  
味爲末用豬膽汁拌過嗜之作嚏立愈一切  
頭風兼濕者以瓜蒂松蘿茶二味爲末嗜之  
出黃水立愈頭風風盛時發日久不愈則多  
令人目昏以三聖散嗜之方在中風門內用



芎芷石膏湯卽芎芷石膏菊花羌活藁本也  
苦痛者加細辛風盛目昏加防風荆芥穗熱  
盛加梔子連翹黃芩薄荷甘草大便秘小便  
赤加消黃攻之自愈也

茶調散

清震湯

滾痰丸

人參芎附湯

風熱便利茶調散雷頭荷葉蒼朮升痰熱滾痰芎

作引虛寒真痛附參芎

註 雷頭風痛頭面疙瘡耳聞雷聲宜清震湯卽

荷葉蒼朮升麻也人參芎附湯卽人參川芎

川附也

芎犀丸

偏正頭風芎犀丸血虛四物薄羌天氣虛補中加

芎細氣逆降氣黑鉛丹

註 血虛面少血色或久脫血也天天麻也降氣

蘇子降氣湯也



芎麻湯

半夏白朮天麻湯

欲吐暈重風痰痛芎麻湯下白丸寧虛者六君者  
乾蘘天麻麩蘘澤蒼同

註 麻天麻也白丸青州白丸子也虛者謂風痰

兼氣虛者宜半夏白朮天麻湯即六君子加

黃耆乾薑黃蘘天麻神麩麥蘘澤瀉蒼朮也

荆穗四物湯

頭暈頭痛同一治血虛物穗氣補中氣血兩虛十

全補上盛下虛黑錫靈

註 頭暈之虛實寒熱諸證同乎頭痛一治法也

其有因血虛宜用荆穗四物湯即當歸川芎

白芍熟地黃荆芥穗也氣虛宜用補中益氣

湯氣血兩虛宜用十全大補湯上盛下虛宜

用黑錫丹為眼氣之精為白眼筋之精為黑

子血之精為絡背肉之精為

之精而與



目無難辨  
醫家血兩盡宜用十全大補湯土益不盡宜  
白芍藥此黃陳茶蘇也尿盡宜用蘇中益尿  
其有因血盡宜用脾蘇四妙湯當補脾胃  
其有因血盡實寒熱當用平更宜一合也  
全蘇土益不盡黑邊靈

眼目總括

目為五藏六府精氣白筋黑骨精瞳血為皆絡肉  
約束畏擷系屬腦項中經熱膜開因風入合邪上  
攻赤腫疼輕者外障生雲翳重者積熱頓傷睛

註

經曰五藏六府之精氣皆上注於目而為之  
精精之窠為眼氣之精為白眼筋之精為黑  
眼骨之精為瞳子血之精為絡皆肉之精為  
約束即眼胞也畏擷筋骨血氣之精而與脈  
系上屬於腦後出於項中因經熱蒸開膜理



故風邪得以入之風熱之邪台上攻於目赤  
腫疼痛輕者則爲外障或暴生雲翳重者則  
積熱之甚陡然痛傷睛也

外障病證

火眼赤腫淚澁痛鞭腫多熱軟多風臉粟爛弦雞  
蠅肉努肉赤脈貫瞳睛血灌瞳人高突起旋螺尖  
起懈睛疼拳毛風淚風痒極赤膜下垂黃膜衝

註風熱上攻目赤腫痛多淚隱澁難開火眼也  
腫而硬者屬熱盛也宜先下之腫而軟者屬

風盛也宜先發散兩臉上下初生如粟漸大  
如米或赤或白不甚疼痛謂之臉生風粟兩  
臉粘睛赤爛痒痛經年不愈謂之爛弦風又  
名赤睛臉內如鷄冠蠅肉此皆脾經風熱爲病  
楚羞明謂之鷄冠蠅肉此皆脾經風熱爲病  
也兩眦筋膜努出謂之努肉攀睛兩眦赤脈  
漸漸侵睛謂之赤脈貫睛兩眼混赤如朱痛  
如鍼刺謂之血灌瞳人兩眼痒痛忽然突起  
謂之突起睛高日中大痛忽生翳膜狀如旋



從醫圖說卷四十一  
螺謂之旋螺尖起日中大痛忽然瞳睛努如  
蟹目謂之蟹睛疼痛又名損翳此皆肝心二  
經積熱也兩臉燥急睫毛倒刺謂之倒睫拳  
毛兩目衝風淚出涓涓冬月尤甚謂之迎風  
流淚兩目連背痒極不痛謂之風痒難任目  
中從下忽生黃膜侵睛疼痛謂之黃膜上衝  
目中從上忽生赤膜垂下遮睛謂之赤膜下  
垂又名垂簾翳此皆心肝脾三經風熱爲病  
也

內障病證

內障頭風五風變珠白黃綠不光明頭風痛引目  
無淚相注如坐暗室中綠風頭旋連鼻痛兩角相  
牽引目疼時或白花紅花起同綠黑花爲黑風烏  
花不旋漸昏暗黃風雀目久金睛青風微旋不痒  
痛青花轉轉目昏蒙

註

內障之病每因頭風五風變成初病瞳珠漸  
漸變色睛裏隱隱似翳或白或黃或綠雖與  
不患之眼相似然無精彩光明射人病頭風



者發則頭痛引目無淚或左目或右目或先  
左目或後右目相注不定如坐暗室之中此  
頭風傷目之漸也綠風者頭旋兩角連鼻相  
牽引目疼痛時或見起白花紅花此綠風傷  
目之漸也黑風者證同綠風時時見起黑花  
此黑風傷目之漸也烏風者亦同黑風但不  
旋暈而見烏花漸漸昏暗此烏風傷目之漸  
也黃風者久病雀目瞳睛金色此黃風傷目  
之漸也青風者頭微旋不痒不痛但見青花

轉轉日漸昏蒙此青風傷目之漸也

### 菊花通聖散

洗刀散

暴發火眼通聖菊外障等證減加方風盛羌加防  
麻倍熱盛加連倍消黃痛生翳膜多傷目洗刀更  
入細獨羌元參木賊白蒺藜草決蟬蛻蔓青箱

註

菊花通聖散卽防風通聖散加菊花也洗刀  
散卽本方更加細辛羌獨蔓荆青箱子等藥  
也



內外障治

外障無寒一句了五輪變赤火因生內障有虛心腎弱故如不病損光明火能外鑑水內照養神壯水自收功五風內變諸翳障眼科自有法能攻

註外障目病子和曰日不因火不病所以五輪

變赤氣輪白睛火乘肺也肉輪目胞火乘脾也風輪黑睛火乘肝也水輪瞳人火乘腎也血輪兩眦火自甚也故能治火者一句便了也治火之法在藥則鹹寒吐之下之在鍼則

神庭上星顙會前項百會刺之翳者可使立退痛者可使立已昧者可使立明腫者可使立消矣內障目病雖亦無寒然有虛也虛或兼熱亦屬虛熱故不赤腫疼痛如不病眼人但不精彩光明也心虛則神不足神者火也火內暗而外明故不能外鑑而失其光明也腎虛則精不足精者水也水外暗而內明故不能內照而失其光明也心虛者則養心神腎虛者則壯腎水自可收功於不明也其五



風內變諸翳如圓翳水翳清翳遊翳散翳橫  
翳浮翳沉翳偃月棗花黃心黑風等翳俱列  
在眼科方書自有治法難以盡述此特其大  
槩耳

牙齒口舌總括

牙者骨餘屬乎腎牙齦手足兩陽明齒長豁動爲  
腎憊牙疼胃火風寒蟲不怕冷熱爲風痛火腫喜  
冷得寒疼寒不腫蛀喜熱飲蟲牙蝕盡一牙生

註牙齒者骨之餘屬乎腎也若無故齒長疎豁

骨而動則爲腎衰憊也上牙齦屬足陽明下牙  
齦屬手陽明牙痛皆牙齦作痛惟寒牙痛則  
爲客寒犯腦多頭連齒痛爲寒邪也故喜熱  
飲不腫不蛀也餘者皆爲胃火邪風濕熱也



火牙疼多腫喜飲冷得寒則更疼者讐仇之意也蟲牙則一牙作痛蝕盡一牙又蝕一牙作痛也

骨槽風

牙疔瘡

骨槽齧頰腫硬疼牙齧腐爛出血膿牙疔腫硬潰血臭皆因痘疹癖疾成

骨槽風者牙齧連頰硬腫疼痛牙齧腐爛出血膿也牙疔以骨槽潰後腫硬不消然出臭

血而不出膿水也且皆痘疹癖疾之後而成也

清胃散

清胃血分火牙痛生地歸連升牡饒氣分宜加荆防細積熱涼膈入升膏

註

胃火牙痛赤腫出血者則為血分宜用清胃散即生地當歸黃連升麻牡丹皮也饒者倍加升麻丹皮也若腫痛牙齧不出血者則為氣分宜加荆芥防風細辛以散其熱若腸胃



積熱腫痛爛臭宜用涼膈散加升麻石膏以  
下其熱可也

溫風散

溫風風牙歸芎細草芡藁芷露蜂房寒牙痛加羌  
麻附半服含漱吐涎良

註

不甚腫痛不怕冷熱為風牙痛宜用溫風散  
即當歸川芎細辛草芡藁本白芷露蜂房也  
不腫痛甚喜飲熱湯為寒牙痛宜本方再加  
羌活麻黃川附子溫而散之二方俱服一半

含漱一半連涎吐之自好也

一笑丸

玉池散

薰藥

諸牙椒巴飯丸咬玉池藁芷骨槐辛歸芎大豆升  
防草蟲牙葱韭子烟薰

註

諸牙謂諸牙痛也均宜一笑丸即川椒七粒  
為末巴豆一粒去皮研勻飯為丸綿裹咬痛  
處吐涎即止均宜用玉池散即藁本白芷地



骨皮槐花細辛當歸川芎黑豆升麻防風甘  
草煎湯熱漱冷吐蟲牙亦宜此咬漱更須用  
韭子或葱子置小爐中燒之擱在大水碗內  
覆以漏斗口向蟲牙痛處薰之其蟲極小皆  
落水碗之中累效

### 蕪荑消疔湯

牙疔雖有專科治然皆未曉累攻神能食便軟猶  
當下雄蕪荑黃薈二連苓

註

牙疔一病殺人最速雖有專科然皆未曉

攻之法累攻者今日攻之明日又攻之以腫  
硬消黑色變臭氣止爲度若不能食或隔一  
日或隔二三日攻之攻之後漸能食不必戒  
口任其所食雖大便溏仍量其輕重攻之自  
見其神若竟不思食難任攻下則死證也攻  
藥用蕪荑消疔湯卽雄蕪荑生大黃蘆薈  
川黃連胡黃連黃芩也

### 口舌證治

脣口屬脾舌屬心口舌瘡糜蘊熱深且淡脾和臭



胃熱五味內溢五熱淫木舌重舌舌腫大脣腫脣  
瘡緊繭脣暴發赤痛多實熱淡白時痛每虛因

註

口舌生瘡糜爛名曰口糜乃心脾二經蘊熱  
深也平人口淡故曰脾和口出氣臭則爲胃  
熱不因食五味而口內溢酸味者乃肝熱淫  
脾也苦味者心熱淫脾也甘味者本經熱自  
淫也辛味者肺熱淫脾也鹹味者腎熱淫脾  
也木舌謂舌腫硬不痛也重舌謂舌下腫似  
舌也舌腫謂舌腫大也脣腫謂脣腫痛厚也

脣瘡謂脣腫潰裂成瘡也緊繭脣謂脣緊小  
燥裂也以上之證皆屬心脾胃經蘊熱若暴  
發赤腫痛甚多爲實熱宜以涼膈散梔子金  
花湯急下其熱可卽愈也若日久色淡瘡白  
時痛不痛每屬虛熱宜清心蓮子飲知蘂四  
物湯補中兼清可也或服涼藥久不愈者以  
七味地黃湯冷服引火歸原不效甚者加附  
子可立愈也



咽喉總括

胸膈風熱咽喉痛邪盛單雙乳蛾生熱極腫閉名  
喉痹語言難出息不通痰盛涎繞喉間響內外腫  
閉纏喉風喉痹纏喉皆危證潰後無膿腫閉凶

註胸膈上有風熱則咽喉腫痛風熱之邪若盛

則生單雙乳蛾在會厭兩傍高腫似乳蛾故名也熱極則腫閉湯水不下言語難出呼吸不通名曰喉痹若熱極更兼痰盛則痰涎繞於喉間聲響咽喉內外腫閉湯水不下名曰



從醫圖考卷之金鑑  
卷四十一  
三  
纏喉風皆危病也或服藥或吹藥或鍼刺潰  
破出膿血則愈若潰後不出膿血仍然腫閉  
湯水不下則死矣

如意勝金錠

雄黃解毒丸

咽痛消毒涼膈散單雙乳蛾刺血痊喉痺纏喉勝  
金錠急攻痰熱解毒丸昏噤牙關湯不下從鼻吹  
灌度喉關吐下之後隨證治潰爛珍珠散上安

註  
咽喉初起腫痛宜用消毒涼膈散即防風荆

芥牛蒡子梔子連翹薄荷黃芩甘草大黃芒  
消也單雙乳蛾則刺少商出血在左刺左在  
右刺右在左右刺左右也喉痺纏喉初起病  
勢未甚或狀如傷寒宜服如意勝金錠即硫  
黃川芎臘茶火消薄荷生川烏生地黃各等  
分爲末葱自然汁合爲錠重一錢薄荷湯磨  
化服甚者連進三次若痰涎壅盛喉間內外  
腫閉湯水難下病勢危急宜用雄黃解毒丸  
即雄黃水飛鬱金細末各二錢半巴豆仁肥



白者十四粒微去油以成散爲度合均醋糊  
爲丸如棗豆茶清下七丸便利吐痰則愈若  
昏冒牙關緊急湯不能下將藥用醋化開十  
丸按中風門之法嚙入鼻內吐下則愈其後  
隨證調治可也若雖愈咽喉潰爛以珍珠散  
上之卽好

吹喉七寶散

咽喉諸證七寶散消皂蜚雄礪二礬細研如塵取  
一字吹中患處效如神

註

咽喉諸證謂咽喉腫痛單雙乳蛾喉痹纏喉  
也七寶散卽火消牙皂全蜚雄黃礪砂白礬  
膽礬也



肩背總括

通氣防風湯

通氣太陽肩背痛羌獨藁草蔓防芎氣滯加木陳  
香附氣虛升柴參耆同血虛當歸白芍藥血瘀薑  
黃五靈紅風加靈仙濕二朮研送白丸治痰凝

註

李杲羌活勝濕湯又名通氣防風湯治太陽  
經風濕肩背痛卽羌活獨活藁本甘草蔓荆  
子防風川芎也兼氣鬱滯痛者則常常作痛  
加木香陳皮香附也氣虛鬱痛者則時止時



痛加升麻柴胡人參黃耆也血虛鬱痛者則  
夜甚時止加當歸白芍藥也血瘀鬱痛者則  
夜痛不止加薑黃五靈脂紅花也風氣鬱盛  
者痛則項肩強加威靈仙也濕氣鬱甚者痛  
則肩背重加蒼朮白朮也痰風凝鬱者痛則  
嘔眩用本湯研送青州白丸子也

### 心腹諸痛總括

心痛岐骨陷處痛橫滿上胸下胃脘當臍脾腹連  
腰腎少腹小大腸脇肝蟲痛時止吐清水疰卽中  
惡寒外干悸分停飲與思慮食卽停食冷內寒水  
停痰飲熱胃火氣卽氣滯血瘀緣隨證分門檢方  
治真心黑厥至節難

註

岐骨陷處痛名心痛橫滿連胸名肺心痛下  
連胃脘名胃心痛連臍名脾心痛連腰名腎  
心痛連少腹名大腸小腸痛連脇名肝心痛



時止吐清水名蟲心痛中惡腹痛名疰痛寒  
邪外干名中寒痛悸而痛名悸心痛水停心  
下屬飲也思慮傷心屬傷也停食痛停水痛  
停痰痛胃火痛氣滯痛血瘀痛皆不死之證  
也當分門施治惟真心痛面色黑四肢逆冷  
至節死證也

化滯丸

清中湯

攻濕積熱求化滯攻寒積水備急丹火痛一陳梔

連薤蟲用烏梅飲控涎

註

化滯丸成方也清中湯卽陳皮半夏茯苓甘

草薑炒山梔黃連草豆蔻也

木香流氣飲

七情鬱結流氣飲思慮悸痛歸脾湯內寒理中外  
五積疰痛備急血抵當

小建中湯

木來乘土腹急痛緩肝和脾小建中血虛寒痛羊  
肉治氣虛理中加陳青



註 羊肉謂羊肉湯也

烏頭梔子湯

刮諸鬱痛烏梔子刮而復痛入元明已經吐下或虛久急痛欲死求鴉鳴

註

諸鬱謂諸寒火鬱而痛也寒多炮川烏為主熱多薑炒梔子為主元明元明粉也鴉鳴謂以真鴉片末或加麝香少許飯丸如桐子大每服三五丸引在本草名一粒金丹

胸脇總括

栝萋薤白白酒湯

栝萋薤白半夏湯

栝萋薤白白酒湯胸痹胸背痛難當喘息短氣時咳唾難卧仍加半夏良

註 栝萋薤白白酒湯即栝萋實小根菜水白酒

煎也

顛倒木金散

胸痛氣血熱飲痰顛倒木金血氣安飲熱大陷小



陷治頑痰須用控涎丹

註

胸痛之證須分屬氣屬血屬熱飲屬老痰顛  
倒木金散即木香鬱金也屬氣鬱痛者以倍  
木香君之屬血鬱痛者以倍鬱金君之為末  
每服二錢老酒調下虛者加人參更效胸中  
有痰飲熱作痛者輕者小陷胸湯重者大陷  
胸湯丸治之若吐唾稠黏痰盛則用控涎丹

枳芎散

枳橘散

柴胡疎肝湯

加味逍遙散

左金丸

當歸龍薈丸

脇痛左屬痰留血輕金芎枳草重攻右屬痰氣重  
逐飲片薑橘枳草醫輕肝實太息難轉側肝虛作  
痛引肩胸實用疎肝柴芍草香附枳陳與川芎肝  
虛逍遙加芎細陳皮生薑緩其中肝虛左金實龍  
薈一條扛起積食攻



註

左屬瘀血輕謂瘀血輕者宜用枳芎散重攻  
謂瘀血重者宜以攻血之劑也枳芎散即枳  
殼撫芎鬱金甘草也右屬痰氣重逐飲謂以  
控涎十棗逐痛之重者也枳橘散即枳殼橘  
皮片子薑黃甘草醫痛之輕者也柴胡疎肝  
散即柴胡白芍甘草香附枳殼陳皮川芎也  
逍遙散即白朮茯苓當歸白芍柴胡炙草薄  
荷少許加川芎細辛陳皮生薑也左金即左  
金丸吳茱萸黃連也肝實火旺者當歸龍薈

痰飲

丸積食者以化滯丸積飲者以控涎丹



腰痛總括

腰痛腎虛風寒濕痰飲氣滯與血瘀濕熱閃挫凡九種面忽紅黑定難醫

註腰痛之證其因不同有腎虛有風有寒有濕

有痰飲有氣滯有血瘀有濕熱有閃挫凡患腰痛極甚而面色忽紅忽黑是為心腎交爭難治之證也

安腎丸

腰痛悠悠虛不舉寄生青娥安腎丸胡盧骨脂川



棟續桃杏苧苓山藥鹽

註寄生謂獨活寄生湯青娥丸即補骨脂杜仲

核桃仁也安腎丸即胡盧巴補骨脂川棟肉

川續斷桃仁杏仁小苧香苳苓山藥也鹽鹽

湯為引也

羌活勝濕湯

通經丸

腰痛屬寒得熱減五積吳萸桃杜安寒濕重著勝  
濕附內實通經硫麵牽風痛無常掣引足經虛當

用寄生痊經實非汗不能解續命湯加牛杜穿

註五積散加吳茱萸桃仁杜仲羌活勝濕湯即

防風通氣湯加附子也通經丸即硫黃黑牽

牛頭末麥麩合丸煮浮起服方出本草小續

命湯加牛膝杜仲炒穿山甲也

通氣散

活絡丹

氣滯閃挫通氣散木陳穿索草苧牽血瘀不移如

錐刺日輕夜重活絡丹



註 通氣散即木香陳皮穿山甲元胡索甘草小  
茴香白牽牛也活絡丹即川烏草烏南星地  
龍乳香沒藥也加五靈脂麝香丸效

蒼蘘散

煨腎散

濕熱注足蒼蘘二妙牛杜已瓜芎腰如物覆濕  
痰畜煨腎椒鹽遂有功

註

蒼蘘散即蒼朮黃蘘牛膝杜仲防已木瓜川  
芎也煨腎散即猪腰子剖開入川椒食鹽甘

小便遂末濕紙裹煨熟而食之

膀胱熱結為癃閉寒虛遺尿與不禁閉即尿閉無  
滴出少腹脹滿痛難伸癃即淋瀝點滴出莖中澀  
痛數而動不知為遺知不禁石血膏勞氣淋分  
膀胱熱結輕者為癃重者為閉膀胱寒虛輕  
者為遺尿重者為不禁閉者即小便閉無點  
滴下出故少腹滿脹痛也癃者即淋瀝點滴  
而出一日數十次或動出無度故莖中澀痛  
也不知而尿出謂之遺尿知而不能固謂之



後末點熱異熱無言食之

小便閉癰遺尿不禁總括

膀胱熱結為癰閉寒虛遺尿與不禁閉即尿閉無  
滴出少腹脹滿痛難伸癰即淋瀝點滴出莖中溢  
痛數而勤不知為遺知不禁石血膏勞氣淋分

詳

膀胱熱結輕者為癰重者為閉膀胱寒虛輕  
者為遺尿重者為不禁閉者即小便閉無點  
滴下出故少腹滿脹痛也癰者即淋瀝點滴  
而出一日數十次或勤出無度故莖中溢痛  
也不知而尿出謂之遺尿知而不能固謂之



小便不禁

小便閉遺尿死證

嘔噦尿閉爲關格若出頭汗命將傾傷寒狂冒遺尿死尿閉細瀝不能生

註

上爲嘔噦不入下爲小便不通則陰陽之氣關格若出頭汗則爲陽絕故命傾也傷寒狂冒屬陽邪盛遺尿屬陰不守若尿閉岷細瀝知陰亦竭故俱死也

治癰閉熨吐汗三法

陰陽熨臍葱白麝冷熱互熨尿自行宣土木通葱探吐達外葱湯薰汗通

註

用葱白一觔細剉入麝香五分拌勻分二包置臍上先以炭火熨斗熨之半炷香時換一包以冷水熨斗熨之互相遞熨以尿通爲度服諸藥不效或服藥卽時吐出或服攻下藥不利宜用宣上法以木通老葱煎湯服頃時探吐再服再吐以尿通爲度服諸藥不效或身無汗宜用達外法以葱湯入木桶內令病



人坐於杌上沒臍爲度匝腰繫裙以覆之少  
時汗出其尿自出欲尿時不可出桶卽於桶  
內溺之恐出桶氣收而尿又回也

小便不通

通關丸

熱實不化大便鞭癢閉八正木香痊陽虛不化多  
厥令惡寒金匱腎氣丸陰虛不化發午熱不渴知  
藥桂通關氣虛不化不急滿倦怠懶言春澤煎

註小便不通熱實者宜用八正散加木香陽虛

者宜用金匱腎氣丸陰虛者宜用通關丸卽  
知母黃藥肉桂少許也氣虛宜用春澤湯卽  
五苓散加人參也

八正散

石淋猶如縑結錯是因濕熱煉膀胱一切熱淋八  
正扁通滑梔瞿草車黃

註八正散卽扁蓄木通瞿麥梔子滑石甘草車

前子大黃也

小蘗飲子



血淋心遺熱小腸實熱仍宜下之良清熱小薊梔  
滑淡歸藕通蒲草地黃

註 淡淡竹葉也藕藕節也蒲蒲黃也

海金沙散

鹿角霜丸

膏淋尿濁或如涕精濁俱出海草滑熱盛八正加  
蒼朮虛用秋苓鹿角佳

註 海海金沙也秋秋石也苓茯苓也鹿角鹿角

霜糯米糊為丸也

加味八正散

氣淋肺熱難清肅八正石葦木葵沉內傷氣虛不  
能化五苓益氣自通神

註 八正散加石葦木香冬葵子沉香五苓合補

中益氣湯

補中益氣湯合五苓散

清心蓮子飲

勞淋內傷補中苓腎氣知蘖過淫成勞心清心蓮  
地骨耆苓車麥草參苓



註  
 內傷勞脾用補中益氣湯合五苓散勞腎陽  
 虛用金匱腎氣湯陰虛用知藥地黃湯思慮  
 勞心用清心蓮子飲是方即蓮子地骨皮黃  
 耆黃芩車前子麥門冬生甘草人參白茯苓  
 也

琥珀散

痰淋七氣白丸子熱燥清熱用滋陰諸淋平劑琥  
 珀木葵蓄通滑歸鬱金

註  
 七氣湯見諸氣門青州白丸子見類中風門

滋陰通關丸也木木香也葵冬葵子也

桂附地黃丸

補中益氣湯加白果方

坎離既濟湯加山萸肉五味子方

遺尿不禁淋尿白桂附補中白果煎補之不應或  
 尿赤生地知藥萸味攢

註  
 遺尿不禁及諸淋尿色白者皆屬寒虛寒者  
 用桂附地黃湯加白果虛者用補中益氣湯  
 加白果凡遺尿不禁諸淋尿色赤者或補之



不應者亦有熱虛用坎離既濟湯即生地知  
母黃蘗加山萸肉五味子也

*（Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 補劑散諸丸 and 滋潤散諸丸）*

大便燥結總括

熱燥陽結能食數寒燥陰結不食遲實燥食積熱  
結胃食少先鞭後溏脾氣燥阻隔不降下血燥乾  
枯老病虛風燥久患風家候直腸結鞭導之宜

註

熱燥即陽結也能食而脈浮數有力與三陽  
熱證同見者也寒燥即陰結也不能食而脈  
沉遲有力與三陰寒證同見者也實燥即胃  
實鞭燥也與腹滿痛同見者也虛燥即脾虛  
先鞭後溏之燥也與少氣腹縮同見者也氣



燥即氣道阻隔之燥也與噎膈反胃同見者也血燥即血液乾枯之燥也與久病老虛同見者也風燥即久患風病之燥也從風家治直腸結即燥屎巨鞭結在肛門難出之燥也從導法治之

結燥治法

溫脾湯

握藥法

熱實脾約三承氣寒實備急共溫脾大薑附桂

草朴寒虛硫半握藥醫虛燥益氣消黃入血燥潤腸與更衣氣燥四磨參利膈風燥搜風順氣宜

註

溫脾湯即大黃乾薑附子肉桂甘草厚朴也硫半丸即硫黃半夏也握藥即巴豆仁乾薑韭子良薑硫黃甘遂白檳榔各五分為末合均飲和分二粒先以花椒湯洗手麻油塗手心握藥移時便瀉欲止則以冷水洗手益氣即補中益氣湯加大黃朴消潤腸丸即當歸生地枳殼桃仁火麻仁各等分為末蜜丸米



飲早服更衣丸即生蘆薈硃砂末等分飯丸  
酒服四磨湯即人參烏藥沉香檳榔也參利  
膈即人參利膈丸也搜風順氣即搜風順氣  
丸也

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*



