



武
95
31

四十四



門武
號 595
卷 31

御纂醫宗金鑑卷四十四

婦科心法要訣目錄

御纂

婦科總括

天癸月經之原

婦人不孕之故

月經之常

月經異常

外因經病

藏書

藏書

內因經病

不內外因經病

血色不正病因

氣穢清濁病因

愆期前後多少病因

經行發熱時熱

經行寒熱身痛

經行腹痛

經行瀉吐

錯經妄行成吐衄崩

經水過多兼時下白帶

調經證治

四君子湯

異功散

六君子湯

香砂六君子湯

七味白朮散

參苓白朮散

歸脾湯

逍遙散

八珍湯

十全大補湯

雙和飲

人參養榮湯

理中湯

四物湯

桂枝四物湯

麻黃四物湯

柴胡四物湯

玉燭散

先期證治

芩連四物湯

地骨皮飲

膠艾四物湯

芩朮四物湯

桃紅四物湯

當歸補血湯

聖愈湯

薑苓四物湯

佛手散

過期證治

過期飲

雙和飲

聖愈湯

人參養榮湯

經行發熱時熱證治

錯加味地骨皮飲

六神湯

逍遙散

經行寒熱身痛證治

羌桂四物湯

逍遙散

黃耆建中湯

經行腹痛證治

當歸建中湯

加味烏藥湯

琥珀散

大溫經湯

吳茱萸湯

經行吐瀉證治

參苓白朮散

理中湯

益心白朮散

香砂六君子湯

錯經妄行吐衄崩證治

三黃四物湯

澤角地黄湯

經閉門

血滯經閉

血虧經閉

血枯經閉

經閉久嗽成勞

婦人經斷復來

室女經來復止

師尼室寡經閉

血滯經閉證治

三和湯

吳茱萸湯

琥珀散

四物湯

血枯血虧經閉證治

六味地黄湯

玉燭散

養榮湯

十全大補湯

經閉久嗽成勞證治

切勞散

婦人經斷復來證治

芩心丸

益陰煎

十全大補湯

八珍湯

逍遙散

歸脾湯

室女師尼寡婦經閉證治

大黃廬蟲丸

澤蘭葉湯

栝子仁丸

逍遙散

婦病難治

診看婦人須先問經期妊娠

御纂醫宗金鑑卷四十四

編輯婦科心法要訣

調經門

婦科總括

男婦兩科同一治所異調經崩帶癥嗣育胎前並產後前陰乳疾不相同

註 婦人諸病本與男子無異故同其治也其異

於男子者惟調經經閉帶濁崩漏癥瘕生育子嗣胎前產後諸病及乳疾前陰諸證不相

同耳故立婦人一科以分門而詳治焉業是科者必先讀方脈心法諸書然後讀此自有豁然貫通之妙

天癸月經之原

先天天癸始父母後天精血水穀生女子二七天癸至任通衝盛月事行

註先天天癸謂腎間之動氣乃稟自父母資其始也後天精血謂水穀之所化得之形成之後資其生也經曰女子一七而腎氣盛謂腎

間動氣盛也二七而天癸至謂先天天癸水中之動氣至於女子胞中也衝為血海任主胞胎衝任皆起於胞中所以任脈通太衝脈盛月事以時下故能有子也

婦人不孕之故

不予之故傷任衝不調帶下經漏崩或因積血胞寒熱痰飲脂膜病子宮

註女子不孕之故由傷其任衝也經曰女子二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下

故能有子若爲三因之邪傷其衝任之脈則
有月經不調赤白帶下經漏經崩等病生焉
或因宿血積於胞中新血不能成孕或因胞
寒胞熱不能攝精成孕或因體盛痰多脂膜
壅塞胞中而不孕皆當細審其因按證調治
自能有子也

月經之常

月經三旬時一下兩月並月三居經一年一至爲
避年一生不至孕暗經

註女子陰類也以血爲主其血上應太陰下應

海潮月有盈虧潮有朝夕月經三旬一下與
之相符故又謂之月水月信也女子月經一
月一行者其常也或先或後乃其病也然亦
有兩月一行謂之並月者有三月一行謂之
居經者有一年一行謂之避年者有一生不
行而依然能孕育謂之暗經者此所稟之不
同而亦非病不須治也

月經異常

經期吐血或衄血上溢妄行曰逆經受孕行經曰
垢胎受孕下血漏胎名

註婦女月經一月一下此其常也若經行而吐
血衄血上溢妄行者是謂逆經有受孕之後
月月行經而產子者是謂垢胎有受孕數月
其血忽下而胎不墮者是謂漏胎此皆月經
之異乎常者也

外因經病

天地溫和經水安寒凝熱沸風盪然邪入胞中任

衝損婦人經病本同參

註經曰天地溫和則經水安靜天寒地凍則經
水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則
經水波湧而隴起六淫之邪入於胞中則損
傷衝任故婦人經病本此同參也如寒則血
凝熱則血沸風則血盪然波湧而大下亦猶
經水之被寒熱風而不得安瀾也

內因經病

婦人從人不專主病多憂忿鬱傷情血之行止與

順逆皆由一氣率而行

註

婦人從人凡事不得專主憂思忿怒鬱氣所傷故經病因於七情者居多蓋以血之行止順逆皆由一氣率之而行也

不內外因經病

血者水穀之精氣若傷脾胃何以生不調液竭血枯病合之非道損傷成

註

血者水穀之精氣也在男子則化為精在婦人則化為血上為乳汁下為月水若內傷脾胃健運失職飲食減少血無以生則經必不調亦有女子天癸既至踰期不得與男子合未期思與男子合與夫經正行時而合此皆合之非道亦致不調或過淫合多則液竭產多乳衆則血枯亦皆能損傷陰血致成經病也

血色不正病因

血從陽化色正紅色變紫黑熱之徵黃泔淡紅濕虛化更審瘀塊黯與明

註 血屬陰從陽化故其色以正紅爲正雖有經病亦易爲治也若色變深紅紫黑乃熱之徵也或黃如米泔乃濕化也淺淡紅白乃虛象也更當審其有瘀有塊色黯色明以治之若黯而紫黑兼見冷證多屬寒凝若明而紫黑兼見熱證多屬熱結也

氣穢清濁病因

熱化稠黏臭必穢寒化清澈臭則腥內潰五色有臟氣時下而多命必傾

註 凡血爲熱所化則必稠黏臭穢爲寒所化則必清澈臭腥若是內潰則所下之物雜見五色似乎膿血若更有臟腐敗氣且時下不止而多者是危證也其命必傾矣

愆期前後多少

經來前後爲愆期前熱後滯有虛實淡少爲虛不脹痛紫多脹痛屬有餘

註 經來或前或後謂之愆期皆屬經病經來往前趕日不足三旬者屬血熱若下血多色深

紅而濁則爲有餘之熱若下血少色淺淡而清則爲不足之熱也經來往後退日過三旬後者屬血滯若色淺淡血少不脹痛者則屬氣虛血少滯滯不足之病若色紫血多腹脹痛者則屬氣實血多瘀滯有餘之病也

經行發熱時熱

經行發熱時潮熱經前血熱經後虛發熱無時察客熱潮熱午後審陰虛

註 經行發熱時熱潮熱之病若在經前則爲血

熱之熱經後則爲血虛之熱發熱時熱多是外感須察客邪之熱午後潮熱多屬裏熱當審陰虛之熱也

經行寒熱身痛

經來寒熱身體痛當分榮衛與虛實有汗不脹衛不足無汗不脹榮有餘

註

經來之時惡寒發熱身體疼痛者當分榮衛虛實若發熱惡寒身痛不脹而有汗者屬衛虛榮不足若發熱惡寒身脹痛而無汗者屬

榮實衛有餘也

經行腹痛

腹痛經後氣血弱痛在經前氣血凝氣滯腹脹血滯痛更審虛實寒熱情

註

凡經來腹痛在經後痛則為氣血虛弱經前痛則為氣血凝滯若因氣滯血者則多脹滿因血滯氣者則多疼痛更當審其凝滯作脹痛之故或因虛因實因寒因熱而分治之也

經行瀉吐

經行泄瀉是脾虛鴨澹清痛乃寒濕胃弱飲傷多嘔飲食傷必痛吐其食

註

經行泄瀉乃脾虛也若鴨澹冷痛是寒濕也經行嘔吐是胃弱也若嘔出涎飲則是傷飲若吐出食物則是傷食然傷食者多痛而吐食傷飲者不痛而嘔飲也

錯經妄行或吐衄崩

逆行吐血錯行崩熱傷陰陽絡妄行血多熱去當用補血少雖虛須主清

註 婦女經血逆行上為吐血衄血及錯行下為崩血者皆因熱盛也傷陰絡則下行為崩傷陽絡則上行為吐衄也若去血過多則熱隨血去當以補為主如血少熱尚未減雖虛仍當以清為主也

經水過多兼時下白帶

多清淡淡虛不攝稠黏深紅熱有餘兼帶時下濕熱穢形清腥穢冷濕虛

註

經水過多清稀淺紅乃氣虛不能攝血也若

稠黏深紅則為熱盛有餘或經之前後兼赤白帶而時下臭穢乃濕熱腐化也若形清腥穢乃濕痰寒虛所化也

調經證治

四君子湯

異功散

六君子湯

香砂六君子湯

七味白朮散

參苓白朮散

歸脾湯

逍遙散

八珍湯

十全大補湯

雙和飲

養榮湯

理中湯

補養元氣四君子參苓朮草棗生薑麩功加陳皮

理氣虛痰橘半六君湯嘔吐香砂六君子渴瀉七

味藿葛香脾瀉參苓白朮散薏枯山蓮砂扁方思

慮傷脾損心血歸脾歸耆棗遠香減參加柴歸芍

薄逍遙調肝理脾方合物八珍兼補血耆桂十全

大補湯去參苓朮雙和飲去芍加陳養榮湯脾胃

虛寒吐且瀉理中減苓加乾薑

註

四君子湯補養元氣虛弱通用之方即八參

茯苓白朮炙草引用棗薑也異功散是於補

氣中兼理其氣即四君子湯加陳皮也六君

子湯治脾虛痰飲即四君子湯加橘紅半夏也香砂六君子湯治胃虛嘔吐即六君子湯加藿香砂仁也七味白朮散治脾虛渴瀉即四君子湯加藿香葛根木香也參苓白朮散治脾胃虛瀉即四君子湯加薏苡桔梗山藥蓮肉砂仁扁豆也歸脾湯治思慮損傷心脾氣血即四君子加當歸黃耆棗仁遠志木香也逍遙散調肝理脾即四君子湯減人參加柴胡當歸白芍薄荷也八珍湯於補氣中兼補其血即四君子湯合四物湯也十全大補湯大補氣血即八珍湯加黃耆肉桂也雙和飲平補氣血即十全大補湯減人參茯苓白朮也人參養榮湯於補氣中專養榮血即十全大補湯減川芎加陳皮也理中湯治脾胃虛寒吐瀉即四君子湯去茯苓加乾薑也

四物湯

桂枝四物湯

麻黃四物湯

柴胡四物湯

玉燭散

婦人血病主四物歸芍白芍熟地黃血瘀改以赤芍藥血熱易用生地黃表熱有汗合桂草表熱無汗合麻黃少陽寒熱小柴並陽明熱合調胃湯

註

四物湯乃婦人經產一切血病通用之方故主之也其方即當歸川芎白芍藥熟地黃凡血瘀俱減白芍藥改用赤芍藥破之血熱俱去熟地黃易用生地黃涼之風感太陽衛分發熱有汗本方合桂枝湯以桂枝甘草解之

名桂枝四物湯寒傷太陽榮分發熱無汗本方合麻黃湯以麻黃杏仁桂枝甘草發之名麻黃四物湯邪傳少陽半表半裏往來寒熱本方合小柴胡湯以柴胡黃芩半夏人參甘草和之名柴胡四物湯邪傳陽明裏熱便結本方合調胃承氣湯以大黃朴消甘草下之名玉燭散

先期證治

芩連四物湯

地骨皮飲

膠艾四物湯

芩朮四物湯

桃紅四物湯

當歸補血湯

聖愈湯

薑芩四物湯

佛手散

芎歸湯

先期實熱物芩連虛熱地骨皮飲丹血多膠艾熱
芩朮逐瘀桃紅紫塊黏血少淺淡虛不攝當歸補
血歸耆先虛甚參耆聖愈補熱滯薑芩丹附延逐
瘀芎歸佛手散又名芎歸效若仙

註

經水先期而至屬熱而實者用四物湯加黃
芩黃連清之名芩連四物湯屬熱而虛者用
四物湯加地骨皮丹皮涼之名地骨皮飲血
多無熱者用四物湯加阿膠艾葉止之名膠

艾四物湯血多因熱者用四物湯加黃芩白
朮和之名芩朮四物湯若血多有塊色紫稠
粘乃內有瘀血用四物湯加桃仁紅花破之
名桃紅四物湯先期血少淺淡乃氣虛不能
攝血也用當歸補血湯補之其方卽當歸黃
耆也若虛甚者則當用四物湯加人參黃耆
補之名聖愈湯若血澁少其色赤者乃熱盛
滯血用四物湯加薑黃黃芩丹皮香附延胡
通之名薑芩四物湯逐瘀須用佛手散卽四
物湯去生地白芍又名芎歸湯逐瘀血其效
如神也

過期證治

過期飲

過期血滯物桃紅附莪桂草木香通血虛期過無
脹熱雙和聖愈及養榮

註

經水過期不至因血氣凝滯脹痛者用過期
飲其方卽四物湯加桃仁紅花香附莪朮
桂甘草木香木通也若過期不至並不脹痛

者乃無血可行是血虛也宜用雙和飲聖愈湯人參養榮湯

經行發熱證治

加味地骨皮飲

六神湯

經來身熱有表發內熱地骨加胡連經後六神加者骨逍遙理脾而清肝

註

經來發熱有表邪證者用前桂枝四物等湯發之若內熱者用地骨皮飲加胡連清之名

加味地骨皮飲經後發熱乃血虛內熱用四

物湯加黃耆地骨皮補而涼之名六神湯若

脾虛肝熱用逍遙散理脾而清肝

逍遙散

方見前

經行身痛證治

羌桂四物湯

黃耆建中湯

經來身痛有表發無表四物羌桂枝經後血多黃耆建耆桂芍草棗薑飴

註

經來時身體痛疼若有表證者酌用前麻黃
 四物桂枝四物等湯以發之若無表證者乃
 血脈壅阻也宜用四物湯加羌活桂枝以疏
 通經絡名羌桂四物湯若經行後或血去過
 多者乃血虛不榮也宜用黃耆建中湯以補
 之其方即小建中湯桂枝白芍甘草薑棗飴
 糖加黃耆也

經行腹痛證治

當歸建中湯

加味烏藥散

琥珀散

經後腹痛當歸建經前脹痛氣為殃加味烏藥湯
 烏縮延草太香香附榔血凝碍氣疼過脹本事琥
 珀散最良稜莪丹桂延烏藥寄奴當歸芍地黃

註

經後腹痛或去血過多乃血虛也宜用當歸
 建中湯補之其方即小建中湯加當歸也經
 前腹脹痛乃血氣凝滯若脹過於痛是氣滯
 其血也宜用加味烏藥湯開之其方即烏藥

縮砂延胡索甘草木香香附檳榔也若痛過於脹是血凝碍氣也宜用琥珀散破之其方卽三稜莪朮丹皮官桂延胡索烏藥劉寄奴當歸赤芍生地黃也

大溫經湯

吳茱萸湯

胞虛寒病大溫經來多期過小腹疼歸芍芎草人參桂吳丹膠半麥門冬不虛胞受風寒病吳茱萸湯更加風藁細乾薑茯苓木減去阿膠參芍芎

註

凡胞中虛寒一切經病皆因經水來多胞虛受寒所致或因受寒過期不行小腹冷痛者宜用大溫經湯卽當歸川芎白芍炙草人參肉桂吳茱萸丹皮阿膠半夏麥門冬也若胞中不虛惟受風寒爲病宜吳茱萸湯依大溫經湯方更加防風藁本細辛乾薑茯苓木香減去阿膠人參白芍藥川芎卽是吳茱萸湯也

經行吐瀉證治

經瀉參苓白朮散鴨澹清痛理中湯肌熱渴瀉七
味散嘔飲香砂六君湯

註

經來惟瀉乃脾虛也宜用參苓白朮散鴨澹
清瀉冷痛乃虛寒也宜用理中湯肌熱渴瀉
乃虛熱也宜用七味白朮散嘔飲痰水乃虛
濕也宜用香砂六君子湯

經行吐衄證治

三黃四物湯

犀角地黄湯

經前吐衄爲熱壅三黃四物大芩連經後吐衄仍
有熱犀角地黄芍牡丹

註

經前吐血衄血乃內熱壅迫其血宜用三黃
四物湯瀉之其方卽四物湯加大黃黃芩黃
連經後吐血衄血雖仍有熱亦不宜瀉但當
用犀角地黄湯清之其方卽犀角生地黃赤
芍藥牡丹皮也

調經門彙方

四君子湯

婦科心法要訣

卷四十四

婦科心法要訣

七

人參

白朮

土炒

茯苓

各二錢

甘草

一錢

右剉薑棗水煎服

異功散

人參

白朮

土炒

茯苓

各二錢

甘草

五分

陳皮

二錢

右剉加生薑水煎服

六君子湯

人參

白朮

土炒

茯苓

半夏

陳皮

各一錢

甘草

五分

右剉薑棗水煎服

香砂六君子湯

即本方加藿香葉砂仁

七味白朮散

人參

白朮

土炒

茯苓

各一錢五分

甘草

五分

藿香

木香

乾葛 各一錢

右剉水煎服

參苓白朮散

人參

白朮 土炒

茯苓

山藥 炒

甘草

蓮肉 去心

白扁豆 各一錢五分 薑汁炒

薏苡仁 炒

砂仁

桔梗 各八分

右為細末每服二錢薑棗湯調服

歸脾湯

人參

黃耆 炙

白朮 土炒

茯神

當歸

龍眼肉

遠志 去心

棗仁 各一錢 炒

木香

甘草 各五分 炙

右剉薑棗水煎服

逍遙散

當歸 酒洗

白芍 酒炒

白茯苓

柴胡 各一錢

甘草

五分

白朮

一錢 土炒

右剉散水一盞半加薄荷煎服

八珍湯

人參

白朮

土炒

茯苓

甘草

熟地

當歸

川芎

白芍

各等分

右加薑棗煎服

十全大補湯

人參

白朮

茯苓

黃耆

當歸

熟地

白芍

川芎

各一錢

肉桂

甘草

各五分

右薑棗水煎服

雙和飲

即十全大補湯去人參白朮茯苓

人參養榮湯

即十全大補湯去川芎加陳皮

理中湯

白朮

人參

乾薑

甘草

各一錢

右剉水煎服

四物湯

熟地 二錢

川芎 一錢

白芍 二錢

當歸 二錢

右為粗末水煎服

芩連四物湯

即本方加黃芩黃連

芩朮四物湯

即本方加黃芩白朮

桃紅四物湯

即本方加桃仁紅花

羌桂四物湯

即本方加羌活桂枝

柴胡四物湯

川芎

當歸

白芍

熟地

各一錢五分

柴胡

人參

黃芩 各二錢

甘草 五分

半夏 二錢

製

右為末每五錢水煎服

玉燭散

當歸

川芎

熟地

白芍

大黃

芒消

甘草

各一錢

右剉每服八錢水煎食前服

地骨皮飲

當歸

生地

各二錢

白芍

一錢

川芎

八分

牡丹皮

地骨皮

各二錢

水煎服

膠艾四物湯

熟地

當歸

川芎

白芍

阿膠

蛤粉末炒成珠

艾葉

各一錢

甘草

五分

右剉水酒各半煎空心服

桂枝四物湯

當歸

熟地

川芎

白芍

各二錢

炒三錢

桂枝

甘草

二錢

炒一錢

薑棗煎服

麻黃四物湯

當歸

熟地

白芍

川芎

各二錢

麻黃

桂枝

各一錢

杏仁

二十粒

甘草

一錢

薑棗煎服

當歸補血湯

當歸

黃耆

三錢

蜜炙一兩

右水煎服

聖愈湯

熟地

白芍

酒拌蒸半日

酒拌

川芎

人參

各七錢五分

當歸

黃耆

酒洗

各五錢

右水煎服

薑苓四物湯

當歸

熟地

赤芍

川芎

薑黃

黃芩

丹皮

延胡索

香附

各等分製

水煎服

佛手散

又名芎歸湯

川芎

二兩

當歸

三兩

右為細末每服二錢水二盞酒二分煎七分

溫服

過期飲

熟地

白芍

炒

當歸

香附

各二錢

川芎

一錢

紅花

七分

桃仁泥

六分

蓬莪朮

木通

各五分

甘草

炙

肉桂 各四分
木香 八分

右水二鍾煎一鍾食前溫服

加味地骨皮飲

生地 當歸

白芍 各二錢
川芎 八分

牡丹皮 地骨皮 各三錢

胡連 一錢

右水煎服每服二匙水二盞煎一公煎十分

六神湯

熟地 當歸

白芍 川芎 各等分

黃耆 地骨皮 各等分

右咬咀水煎

小建中湯

白芍 三錢 桂枝 一錢

甘草 八分

右薑棗水煎服

黃耆建中湯

黃耆

炙

肉桂

各一兩

白芍

二兩
炒

甘草

七錢
炙

右每服五錢薑棗水煎服日二三服

如虛甚者加附子

當歸建中湯

當歸

一兩

白芍

二兩
炒

肉桂

一兩

甘草

七錢
炙

右咬咀每服三錢加生薑棗水煎空心服

加味烏藥湯

烏藥

縮砂仁

木香

延胡索

香附

製

甘草

大檳榔 各等分

右細剉每服七錢生薑三片水煎溫服

琥珀散

三稜 酒洗 莪朮 酒洗

赤芍

當歸

劉寄奴

丹皮

熟地

官桂

烏藥

延胡索

各一兩

右前五味用烏豆一升生薑半觔切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調下空心食前服

大溫經湯

吳茱萸

湯泡

丹皮

白芍

人參

肉桂

當歸

川芎

阿膠

碎炒

甘草

各一錢

麥冬

二錢
去心

半夏

二錢
製

右加生薑水煎食前服

吳茱萸湯

當歸

肉桂

吳茱萸

丹皮

半夏

製

麥冬

各二錢

防風

細辛

藁本

乾薑

茯苓

木香

炙甘草

各一錢

水煎服

三黃四物湯

當歸

白芍

川芎

生地

黃連

黃芩

大黃

右剉水煎服

大黃量虛實用

犀角地黃湯 胞中狀如懷子不經行胞閉熱氣迫

芍藥 七錢半

生地 半觔

牡丹皮

一兩 去心淨酒浸

犀角

一兩 如無以川升麻代

右咬咀每服五錢水煎服時下皆生於女子

有熱如狂者加黃芩二兩氣客於下故病而

瘦而不病肺勞也經日月事不來者胞脈閉

茯苓 燕 咬 玢 香 咬 黃 芩 二 兩

炙 甘草 知 母 葶 朮 正 磁 石 煎 服

單 煎 一 兩 取 無 以 川 升 麻 升

三 錢 丹 史 一 兩 去 心 煎 服

芒 藥 十 錢 半 半 煎 半 煎

單 煎 此 黃 芩

生 地

黃 大 黃 量 盡 實 用 煎 服

大 芍 藥 水 煎 服

經 閉 門

血 滯 經 閉

石 痕 寒 氣 客 胞 中 狀 如 懷 子 不 經 行 胞 閉 熱 氣 迫 肺 欬 傷 心 氣 血 不 流 通

註

經 曰 石 痕 生 於 胞 中 寒 氣 客 於 子 門 子 門 閉 寒 氣 不 得 通 惡 血 當 瀉 不 瀉 酥 以 留 止 日 以 益 大 狀 如 懷 子 月 事 不 以 時 下 皆 生 於 女 子 可 導 而 下 此 論 經 閉 因 寒 氣 客 於 下 故 病 血 痕 而 不 病 肺 勞 也 經 曰 月 事 不 來 者 胞 脈 閉

也胞脈者屬心而絡於胞中今氣上迫於肺
心氣不得下通故月事不來也此論胞脈閉
因熱氣攻於上故迫肺作欬病肺勞而不病
血痕也

血虧經閉

二陽之病發心脾不月有不得隱曲血枯其傳為
風消息賁者死不能醫

註

二陽者陽明胃也女子有隱曲不得之情則
心脾氣鬱不舒以致二陽胃病飲食日少血

無以生故不月也血虛則生內熱愈熱愈虛
肌肉乾瘦如風之消物故名曰風消也火盛
無制心乘肺金金氣不行不能運布水精留
於胸中津液悉化為痰咳嗽不已日久成勞
人傳為息賁則不能醫矣息賁者喘也

血枯經閉

脫血過淫產乳衆血枯漸少不行經骨蒸面白兩
顴赤懶食消瘦咳嗽頻

註 失血過多面與爪甲之色俱淺淡黃白乃脫

血病也或因過淫精竭或因產多乳衆傷血
血枯經來漸少二三月後經閉不行以致證
見骨蒸肌熱面色枯白兩顴紅赤懶於飲食
皮乾消瘦咳嗽頻頻不已多成虛損之證
久嗽成勞

男勞已詳心法內女損陰血傳風消或因病後素
稟弱經閉咳嗽血風勞

註 男子虛勞治法已詳於雜病心法要訣虛勞
門內女子之勞多因損其陰血或因病後傷

其陰血或因素稟陰血不足然必見陰虧骨
蒸血枯經閉咳嗽日久不已之證始名曰勞
若不咳嗽則謂之虛不可謂之勞也風消者
古勞證名也女子曰血風勞者蓋以內經曰
勞風發於肺下是謂虛病之人感受風邪則
肺受之故始病必先咳嗽也若不先解風邪
而卽補者未有不因久嗽不已而成勞者也
故曰血風勞也

婦人經斷復來

御纂醫宗金鑑 卷四十四
婦人七七天癸竭不斷無疾血有餘已斷復來審其故邪病相干隨證醫

註
婦人七七四十九歲時天癸竭地道不通當月水不下若月水不斷不見他證乃血有餘不可用藥止之若已斷或一年或三五年復來者當審其有故無故是何邪所干隨證醫治也

室女經來復止

室女經來復不來若無所苦不爲災必是避年未

充足若見虛形命可哀

註
室女年幼氣血尙未充足有經來數月復又不來者若無他證所苦則不得謂之災疾必是避年或氣血未充若兼見虛損形狀則爲室女血枯經閉童勞多屬難治故曰命可哀也

師尼室寡經閉

師尼室寡異乎治不與尋常婦女同診其脈弦出寸口知其心志不遂情調經若不先識此錯雜病

狀豈能明和肝理脾開鬱氣清心隨證可收功

註

師道姑也尼女僧也室未適夫之女也寡少而亡夫之婦也異乎治者謂不與尋常婦女同其治也如診其脈弦出寸口則知其心志不遂情志之為病也凡欲調婦女一切經病若不先識此因則不能明情志錯雜難名之病狀也治此證者當以和肝理脾開鬱清心隨證施治自可收功也

血滯經閉證治

三和湯

石瘦帶表吳茱萸攻理琥珀散最宜胞閉三和湯
四物消黃連薄荷草苧梔

註

寒氣客於胞中血留不行而成石瘦兼表證多者宜吳茱萸湯溫散之裏證多者宜琥珀散攻之胞脈閉上迫於肺心氣不得下通故月事不來宜三和湯清之即四物湯合涼膈散乃樸消大黃連翹薄荷甘草梔子黃芩也
如大便不實者去消黃

吳茱萸湯

琥珀散

四物湯

方俱見前
調經門

血枯血虧經閉證治

六味地黃湯

胃熱燥血玉燭散失血血枯養榮湯地黃湯治房
勞損萸藥苓丹澤地良乳衆血枯經若閉須用十
全大補方

註經曰二陽之病發心脾女子不月一陽胃

胃熱甚則燥其血血海乾枯故月事不下宜
以玉燭散泄其胃熱則經血自行若因素有
吐衄之證或生育過多則血海乾枯及房勞
過傷陰血乳衆傷其血液皆足以致經閉失
血多者宜養榮湯主之房勞過者以六味地
黃湯滋之卽山萸山藥白茯苓丹皮澤瀉熟
地黃也乳衆者以十全大補湯培補之

玉燭散

養榮湯

十全大補湯 俱見前調經門

經閉久嗽成勞證治

劫勞散

月水不行蒸潮汗食減咳嗽血風勞劫勞散用參

苓芍歸地甘耆半味膠

註

經閉久嗽又見骨蒸潮熱盜汗自汗飲食減

少之證則為之血風勞宜用劫勞散即人參

茯苓白朮當歸生地甘草黃耆半夏五味子

阿膠也

婦人經斷復來

芩心丸

益陰煎

經斷復來血熱甚芩心醋丸溫酒吞益陰知藥龜

生地縮砂炙草棗薑尋血多熱去傷衝任十全大

補與八珍暴怒憂思肝脾損逍遙歸脾二藥斟

註

婦人七七四十九歲後天癸不行若止而復

來無他證者乃血有餘不得用藥止之若因

血熱者宜芩心丸用黃芩心末二兩醋丸溫

酒送下或用益陰煎即知母黃蘗龜板生地
縮砂炙草也若血去過多熱隨血去衝任虛
損其血不固者宜十全大補湯八珍湯若因
怒氣傷肝肝不藏血憂思傷脾脾不攝血者
宜於逍遙散歸脾湯二方斟酌用之

十全大補湯

八珍湯

逍遙散

歸脾湯

俱見前
調經門

室女師尼寡婦經閉證治

大黃廔蟲丸

澤蘭葉湯

栢子仁丸

室女經閉多血結大黃廔蟲桃杏仁蟲蛭蟻螬甘
草芍乾漆生地及黃芩不足澤蘭歸草芍栢子仁
丸用栢仁熟地澤蘭牛卷續相兼久服自然行師
尼寡婦逍遙散附蘭丹地鬱梔芩

註 室女經閉多有氣血凝結者宜用大黃廔蟲

丸破血行氣其經自通方用大黃廬蟲桃仁
杏仁蟲蟲水蛭蟻螬甘草白芍乾漆生地黃
芩蜜丸服若其人虛弱不任攻下則用澤蘭
葉湯卽澤蘭葉當歸甘草白芍也兼服栝子
仁丸方用栝子仁熟地澤蘭葉牛膝卷栝續
斷丸服煎丸並進久久其血自行至於師尼
寡婦經閉之證多屬鬱熱宜用逍遙散加香
附澤蘭葉丹皮生地鬱金黑梔黃芩以和肝
理脾清心開鬱其經自通也

逍遙散 方見前
調經門

婦病難治

諺云婦病不易治蓋以幽居一情鬱疑執拗不喜望
聞問諱疾忌醫術莫施

註寇宗奭曰寧治十男子莫治一婦人謂婦人
之病多不易治也蓋以婦人幽居情鬱憂恚
愛憎多疑所懷不遂性執偏拗診時又不令
醫師觀形望色聞聲問病富貴之家居奧室
之中處幃幔之內且復以帕蒙手旣不能行

望色之神又不能盡切脈之巧未免詳問問之覺繁反謂醫學不精往往並藥不信不知問非易事非精於醫者必不能問也夫望聞問切四者欲去其三卽是神醫亦無由施其術也此古今之通患謂之曰婦人不易治不誠然哉

診看婦人須先問經期妊娠

未診婦人女子病先問經期與妊娠不詳誤藥細事疑似難明昧所因

註
未診婦人女子之病必先問經期與有無妊娠若不詳細審問倘用藥誤觸之則所關匪細多變生他證疑似難明豈不昧其病之所因哉

經閉門彙方

三和湯

當歸

川芎

大黃

朴消

白芍

地黃

黃芩

梔子

連翹

薄荷

甘草

各等分

右剉每服八錢水煎服

六味地黃湯

熟地

八錢

山萸肉

山藥

各四錢

丹皮

澤瀉

茯苓

各三錢

右清水煎服

劫勞散

白芍

六兩

黃耆

四兩

甘草

炙

人參

去蘆

當歸

去蘆酒洗

熟地

洗淨焙乾

五味子

阿膠

各一兩
炒珠

右咬咀每服三錢水一盞生薑七片棗三枚

煎至九分溫服無時日三

芩心丸

用黃芩心枝條者三兩

米泔浸七日炙乾又
浸又炙如此七次

右爲末醋丸如桐子大每服七十九空心溫酒送下日進二服

益陰煎

生地 三錢

知母

黃蘗 各二錢

龜板 四錢 醋炙

縮砂仁

甘草 各一錢 炙

右剉水煎服

大黃廬蟲丸

大黃

赤芍

桃仁

杏仁

乾漆

甘草

廬蟲

蟲蟲

蛭蟲

蟻螞

黃芩

石末煉蜜丸每服丸數量虛實增減

澤蘭葉湯

澤蘭葉 三兩

當歸

白芍 各一兩

甘草 五錢

右為粗末每服五錢水二盞煎一盞溫服

栢子仁丸

栢子仁

炒另研

牛膝

酒洗

卷栢

各五錢

澤蘭葉

續斷

各二兩

熟地

三兩五錢酒浸半日石白內杵成膏

右為細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三

十九

