



四十五
四十六

中武
595
32



門中武
595
卷 32

御纂醫宗金鑑卷四十五

婦科心法要訣目錄



崩漏總括

崩漏證治

荆芩四物湯

加味四物湯

膠艾四物湯

琥珀散



八珍湯

十全大補湯

益氣養榮湯

補中益氣湯

益胃升陽湯

調經升陽除濕湯

失笑散

地榆苦酒煎

帶下門 全錄卷四十五

五色帶下總括血虛血熱

帶下證治

吳茱萸湯

補中益氣湯

六君子湯

六味地黃湯

歸脾湯

四物湯

清白散

四君子湯

導水丸

萬安丸

威喜丸

固精丸

加味四物湯

逍遙散

癥瘕積痞痞癖疝諸證門

癥瘕積聚痞痰血血蠱總括

癥瘕證治

大七氣湯

食癥證治

烏藥散

血癥證治

血竭散

痞證治

助氣丸

積聚證治

開鬱正元散

瘀血血蟲證治

桃奴散

失笑散

玉燭散

痘癖疔證總括

痘癖證治

葱白散

疔病證治

當歸散

治諸積大法

嗣育門

胎孕之原

男女完實

種子時候

分男女論

雙胎品胎

脈見有子

胎男女論

辨別孕病

分經養胎

受孕分房靜養

安胎母子二法

胎前用藥三禁

安胎審宜調治

御纂醫宗金鑑卷四十五

編輯婦科心法要訣

崩漏門

崩漏總括

淋瀝不斷名爲漏忽然大下謂之崩紫黑塊痛多
 屬熱日久行多損任衝脾虛不攝中氣陷暴怒傷
 肝血妄行臨證審因須細辨虛補瘀消熱用清
 註 婦人經行之後淋瀝不止名曰經漏經血忽
 然大下不止名爲經崩若其色紫黑成塊腹

脇脹痛者屬熱瘀若日久不止及去血過多而無塊痛者多係損傷任衝二經所致更有憂思傷脾脾虛不能攝血者有中氣下陷不能固血者有暴怒傷肝肝不藏血而血妄行者臨證之時須詳審其因而細細辨之虛者補之瘀者消之熱者清之治之得法自無不愈

崩漏證治

荆芩四物湯

崩漏血多物膠艾熱多知栢少芩荆漏瀉香附桃紅破崩初脹痛琥珀攻日久氣血衝任損八珍大補養榮寧思慮傷脾歸脾治傷肝逍遙香附青

註

崩血漏血去血過多者宜用膠艾四物湯補之如屬熱多者宜用知蘖四物湯清之熱少者宜用荆芩四物湯和之若漏血濇少此屬血滯宜用四物湯加香附桃仁紅花破之若崩血初起脹痛此屬瘀凝宜用琥珀散攻之崩漏日久氣血已虧衝任傷損者宜用八珍

湯十全大補湯人參養榮湯量補其損傷若因思慮傷脾者宜用歸脾湯補之恚怒傷肝者宜用逍遙散加炒香附青皮平之

膠艾四物湯

四物湯

琥珀散

八珍湯

十全大補湯

人參養榮湯

歸脾湯

逍遙散

方俱見前調經彙方內

補中益氣湯

益胃升陽湯

氣陷補中益氣舉保元升柴歸朮陳益胃升陽加

苓麩腹痛加芍嗽減參

註

崩漏日久脾傷食少中氣下陷不能載血者

宜用補中益氣湯益胃升陽湯升舉之補中

益氣湯即人參黃耆甘草保元湯加升麻柴

胡當歸白朮陳皮也益胃升陽湯即補中益氣湯加黃芩神麩也若腹痛者宜加白芍藥有熱者用黃芩無熱者用肉桂調之咳嗽者肺熱也減人參

調經升陽除濕湯

夾水水瀉不甚弱調經升陽除濕湯者草升柴歸蒼朮羌獨藁本蔓荆防

註 崩漏下血夾水或日水瀉一二次形氣不甚

弱者宜用調經升陽除濕湯其方即黃耆甘

草升麻柴胡當歸蒼朮羌活獨活藁本蔓荆子防風也以風藥先勝其濕若形氣虛弱者則當加人參陳皮合補中益氣湯補中勝濕可也

失笑散

地榆苦酒煎

殺血心痛失笑散蒲黃五靈脂定疼崩血不已防滑脫地榆苦酒煎止崩

註 崩血心腹痛甚者名曰殺血心痛乃血滯不

散宜用失笑散其方即蒲黃五靈脂也先定其痛痛止然後隨證治之若崩血補之仍然不止者當防其滑脫宜用地榆一兩醋煎露一宿次早溫服立止止後隨證治之名地榆苦酒煎

崩漏門彙方

補中益氣湯

黃耆 人參

白朮 甘草 各一錢

當歸 陳皮 各七分

升麻 柴胡 各三分

右剉薑棗水煎服

益胃升陽湯

黃耆 二錢 人參 一錢 有嗽去之

神麩 一錢五分 白朮 三錢

當歸 酒洗 陳皮

甘草 各一錢 升麻

柴胡 各五分 生黃芩 二錢 秋涼不用

右為麤末每服三錢或五錢如食添再加之
如食減只服三錢或更減之不可多服水煎
去滓熱服

升陽除濕湯

黃耆 蒼朮

羌活 各一錢五分 防風

藁本 升麻

柴胡 甘草 各一錢

獨活 五分 蔓荊子 七分

右咬咀水五大盞煎至一大盞去滓稍熱服
空心服畢待少時以蚤膳壓之

失笑散

五靈脂 蒲黃 各等分

右為末先用醞醋調二錢熬膏入水一盞煎
至七分食前熱服良驗

地榆苦酒煎

地榆 一兩

醋煎露一宿次蚤溫服立止止後隨證調治

之 苦酒即醋也

帶下門

五色帶下總括

帶下勞傷衝與任邪入胞中五色分青肝黃脾白
主肺衄血黑腎赤屬心隨人五臟兼濕化治從補
瀉燥寒溫更審瘡膿瘀血化須別胞膀濁與淫

註

帶下者由於勞傷衝任風邪入於胞中血受
其邪隨人藏氣濕熱濕寒所化故色青者屬
肝為風濕色赤屬心為熱濕色黃屬脾為虛
濕色白屬肺為清濕色黑屬腎為寒濕也其

從補從瀉從燥從瀉從寒從溫則隨證治之
更審其帶久淋瀝之物或臭或腥穢乃敗血
所化是胞中病也若似瘡膿則非瘀血所化
是內癰膿也若如米泔兼尿竅不利乃膀胱
白濁病也若尿竅通利從精竅出或如膠黏
乃胞中白淫病也

帶下證治

邪入胞中吳茱萸赤黏連梔青防梔白主益氣黑
六味黃淡六君或歸脾

註 帶下因六淫之邪入於胞中者宜吳茱萸湯

若色赤色黃而濁黏者熱也色黃者加黃連
梔子色青者加防風梔子若色白色黑而清
稀者虛寒也色白者用補中益氣湯色黑者
用六味地黃湯色黃而淡者宜六君子湯或
加味歸脾湯分證調治可也

吳茱萸湯

補中益氣湯

六味地黃湯

御真經卷之三

卷四十五

婦科心法要訣

八

六君子湯

歸脾湯 方俱見首卷彙方

加味四物湯

胞中冷痛乃寒濕四物附子桂薑宜臭腥兼合知藥用久滑升柴龍牡脂

註帶下而胞中熱痛乃熱濕也今胞中冷痛乃

寒濕也宜四物湯加川附子炮薑官桂服之

日久滑脫者加升麻柴胡舉之龍骨牡蠣赤

石脂潛之

四物湯

方見前調經門彙方內

清白散

帶下濕熱清白散四物薑炭草藥椿赤榆荆苓濕

二朮滑加龍牡久合君

註帶下五色帶下也皆濕熱所化宜用清白散

其方即四物湯加薑炭甘草黃蘗椿皮也色

赤加地榆荆芥黃芩濕加蒼朮白朮滑加龍

骨牡蠣久則合四君子湯也

四物湯

四君子湯

俱見前調經門彙方內

導水丸

萬安丸

帶下有餘皆濕化少腹脹疼污水綿導水牽滑苓
軍熱萬安牽椒茴木寒

註

五色帶下皆從濕化若少腹脹痛污水綿綿
屬濕熱者宜用導水丸其方即牽牛滑石黃
芩生軍治熱有餘也屬濕寒者宜用萬安丸
其方即牽牛胡椒小茴香木香治寒有餘者

也

威善丸

固精丸

瘀化瘡膿濁淫病虛實寒熱酌其宜威善蠟苓固
精菟韭味桑苓龍牡脂

註

帶下有因瘀血所化或瘡瘍膿出及白濁白
淫者皆帶下類也其虛實寒熱當酌其宜藥
不用威善丸即黃蠟茯苓也固精丸即菟絲子
韭菜子五味子桑螵蛸茯苓龍骨牡蠣赤石

脂也 正和子 藥性論 治骨節疼痛 亦治

帶下門彙方

清白散

當歸

黃蘗

鹽水泡

白芍 炒

檮根皮

酒炒

生地

川芎

貝母 各一錢

炮薑

甘草 各五分

右剉生薑三片水煎服

導水丸

牽牛 頭末

滑石 水飛

黃芩

川大黃

右末蒸餅為丸量虛實服

萬安丸

牽牛 頭末

胡椒

木香

小茴香

各等分 焙

右末水泛為丸量虛實服

威喜丸

白茯苓 四兩去皮作塊用猪苓二錢半同於磁器內煮二十餘沸出晒乾不用猪苓

黃蠟 四兩

右以茯苓為末煉黃蠟為丸如彈子大空心細嚼滿口生津徐徐咽服以小便清為度忌米醋只喫糠醋忌動氣

固精丸

牡蠣 煨粉

菟絲子 酒蒸焙

韭子 炒

龍骨 水炙

五味子

白茯苓

桑螵蛸 酒炙

白石脂 各等分

右為末酒糊丸如桐子大每服七十九空心鹽湯下

癥瘕痞癖諸證門
此類皆因血毒氣滯而成凡此諸症皆由血毒氣滯而成凡此諸症皆由血毒氣滯而成凡此諸症皆由血毒氣滯而成

癥瘕痞癖諸證門

癥瘕積聚痞瘕血血蠱總括

五積六聚分藏府七癥八瘕氣血凝癥積不動有

定處瘕聚推移無定形痞悶不宜氣壅塞未成堅

塊血瘕名蓄久不散成血蠱產後經行風冷乘

計 五藏氣積名曰積故積有五證六府氣聚名

曰聚故聚有六證難經有心肝脾肺腎五藏

之積而無六聚蓋以積為血病而聚為氣病

也故李杲有五積丸方治法巢氏病源載七

醫學圖考全錄 卷四十五 癥瘕痞癖諸證門

癥八瘕但有八瘕名證而無七瘕病形其他
方書亦不概見大抵又以瘕為氣病而瘕為
血病也夫病皆起於氣必氣聚而後血凝不
必過泥於黃青燥血脂狐蛇蠶等名但以牢
固不移有定處者為瘕為積推移轉動忽聚
忽散者為瘕為聚可也故曰瘕者徵也言有
形可徵也瘕者假也言假物成形也若夫痞
者痞悶不通氣道壅塞之謂也瘀血者血瘀
腹中未成堅塊也蓄之既久必成血蠱矣凡
此諸證皆由新產之後經行之時不知調護
以致風冷外襲邪正相搏結於腹中而成也

癥瘕證治

大七氣湯

婦人一切癥瘕病上下攻疼七氣湯藿香益智稜
莪朮甘桔青陳肉桂香

註

婦人一切癥瘕隨氣上下攻築疼痛者宜大
七氣湯其方即藿香葉益智仁京三稜蓬莪
朮甘草桔梗青皮陳皮肉桂心木香也

食癥證治

烏藥散

經行產後食生冷臟氣相搏結塊形牢固不移日漸長開滯消積溫散行烏藥散烏桃菘朮木香當歸青桂心

註

婦人經行產後食生冷之物與臟氣互相搏聚結成堅塊牢固不移日漸長大者治宜開滯消積用烏藥散即烏藥桃仁菘朮木香當歸青皮桂心以溫散之自愈

血癥證治

血竭散

乘臟虛兮風冷干飲食內與血相搏因成血癥堅牢固脇腹脹痛熱而煩少食多忘頭汗出血竭歸芍蒲桂延

註

婦人產後經行之時臟氣虛或被風冷相干或飲食生冷以致內與血相搏結遂成血癥牢固不移脇腹脹痛內熱心煩食少善忘但頭汗出者宜用血竭散即血竭當歸赤芍蒲

黃桂心延胡索也

痞證治

助氣丸

三焦痞滿胸膈悶氣不宣通助氣清白朮三棱蓬
莪朮枳殼檳榔香與陳

註

婦人胸膈痞悶謂之痞由於氣壅不宣所致

宜助氣丸卽青皮白朮三棱莪朮枳殼檳榔
木香陳皮爲丸服也

積聚證治

開鬱正元散

積聚通用正元散芎朮青陳麩麥延香砂海粉查
甘桔痰飲食積血氣搏

註

五積六聚乃痰飲食積氣血搏結而成通用

開鬱正元散其方卽茯苓白朮青皮陳皮神
麩麥芽延胡索香附砂仁海粉山查甘草桔
梗也用以健脾消食化痰滲飲理氣和血則
積聚未有不愈者矣

瘀血血蠱證治

桃奴散

腹中瘀血未成形面黃發熱腹脹疼產後經來風冷客血室之內有瘀停產後惡露失笑散經閉瘀凝玉燭攻血蠱桃奴猥鼠糞延桂砂桃附五靈

註

婦人產後經行之時傷於風冷則血室之內

必有瘀血停留未成堅塊故不名癥瘕也其人必面色萎黃臍腹脹痛內熱晡熱若產後惡露不行者宜失笑散若經閉不通瘀血凝聚者宜玉燭散瘀血不行蓄之既久必成

蠱宜用桃奴散即桃奴猥鼠糞延胡索桂心

砂仁桃仁香附五靈脂也猥鼠糞一名兩頭

尖即雄鼠屎桃奴即桃樹上未成不落之乾

桃子也

失笑散

方見首卷崩漏

玉燭散

方見首卷彙方內

疝瘕疝證總括

臍旁左右一筋疼突起如弦疝證名僻在兩肋名曰癰高起如山疝病稱必引少腹腰脇痛三證皆

由風冷成或作或止因寒發痛時方見不痛平

註

婦人臍之兩旁有筋突起疼痛大者如臂小者如指狀類弓弦者名曰疝瘕在兩肋之間者名曰瘕若小腹牽連腰脇疼痛高起者謂之疝名雖有三其實皆因風冷客於胞中而然故其發作皆因再受風冷發則痛痛則見不痛則平復如初也

疝瘕證治

葱白散

婦人疝瘕腹肋痛風冷血氣結而成葱白四物麥

苓枳桂朴薑香青莪稜茴香麩麥苦楝子葱鹽煎

服訶黃散

註

婦人疝瘕腹肋疼痛者皆因風冷與氣血搏結而成宜用葱白散溫散之其方卽四物湯加人參茯苓枳殼肉桂厚朴乾薑木香青皮莪朮三稜茴香麩麥苦楝子葱白食鹽煎服也大便結燥去鹽加大黃如大便自利

加訶子

四物湯 方見首卷彙方內

疝病證治

當歸散

婦人疝病氣攻冲脇腹刺痛當歸芎藭甲吳萸桃仁芍桂榔青木大黃蓬

註

婦人疝病攻衝刺痛多因風冷寒濕客於胞門血室故其病皆屬厥陰肝經宜當歸散即當歸川芎鱉甲吳萸黃桃仁赤芍肉桂檳榔青皮木香大黃蓬莪朮也

治諸積大法

形虛病盛先扶正形證俱實去病急大積大聚衰其半須知養正積自除

註

凡治諸癥積宜先審身形之壯弱病勢之緩急而治之如人虛則氣血衰弱不任攻伐病勢雖盛當先扶正氣而後治其病若形證俱實宜先攻其病也經云大積大聚衰其半而止蓋恐過於攻伐傷其氣血也羅天益曰養正積自除可謂得經旨者矣

癥瘕積痞血蠱門彙方

大七氣湯

三稜

莪茂

各煨切

青皮

去穰

陳皮

去白

木香

藿香

益智仁

桔梗

肉桂

甘草

各七錢半

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前溫

服

烏藥散

烏藥

莪茂

桂心

當歸

炒

桃仁

青皮

木香

各等分

右為末每服二錢熱酒調下

血竭散

真血竭

如無紫礦代

當歸

赤芍

蒲黃

延胡索

右等分研細頻篩再研取盡為度每服一錢
用童便合好酒半大盞煎一沸溫調下方產
下時一服上牀良久再服其惡血自循經下
行不致衝上免生百病

助氣丸

京三稜

蓬莪茂 二味各用濕紙包灰火中煨透

切片各二觔

青皮 去白

陳皮 去白

白木 各十五兩

枳殼 炒去穰

檳榔

木香 各十兩

右為末糊丸桐子大每服五十丸滾水下

開鬱正元散

白木

陳皮

青皮

香附

山查

海粉

桔梗

茯苓

砂仁

延胡索

麥芽

炒

甘草

炙

神麴

各等分 炒

右剉每服一兩生薑三片水煎服

桃奴散

桃奴

炒

雄鼠糞

炒兩頭尖者是

延胡索

肉桂

五靈脂

末 酥炙 罌子香 附子

炒

砂仁

各等分

桃仁

各等分

右為末每服三錢酒調下

莪茂

川大黃

各七分

當歸右為末每服一錢水一盞入乾燕脂一錢同

赤煎六分服食後

川芎

人參

茯苓

枳殼

肉桂

厚樸

乾薑

木香

青皮

莪茂

三棱

茴香

神麴

芩朮

神麴

右到每服一兩生薑三片水煎服

桃奴散

桃奴

延胡索

五厘大分服食新

水為末每服一匙水一盞人蔘燕部一匙同

芩朮

川大黃

葱白散

當歸

熟地

赤芍

川芎

人參

茯苓

枳殼

肉桂

厚樸

乾薑

木香

青皮

莢茂

三稜

茴香

神麴

麥芽

苦楝子

各等分

右末加葱白三寸食鹽五分煎服三錢

大便結燥去鹽加大黃便自利加訶子

當歸散

當歸

川芎

各二錢

鯨甲

三錢
醋炙

吳茱萸

桃仁

十五粒

赤芍

肉桂

各一錢

檳榔

青皮

各八分

木香

嗣育門

胎孕之原

天癸先天身氣精血後天化成形男子二八天

癸至屬陽應日精日盈女子二七天癸至屬陰應

月血月通男女媾精乃有子乾道男成坤女成

註

天癸乃父母所賦先天身之真氣也精血

水穀所化後天成形之本也男子二八先天

腎氣盛天癸至與後天所生之精會合而盈

然男子屬陽陽應日故精盈而日舉也女子

二七先天腎氣實天癸至與後天所生之血
 會合而盛然女子屬陰陰應月故血盛而月
 下也所以至期男女媾其先天真氣後天精
 血陰陽會和乃能有子也當此陰陽會合時
 陽盛自然成男是乾道成男也陰盛自然成
 女是坤道自然成女也
 男女完實
 精通必待三十聚天癸二十始適人皆欲陰陽完
 實後育子堅壯壽偏增

註

男子十六而精通必待三十一而娶女子十四
 而天癸至必待二十一而嫁者皆欲陰陽完實
 然後交而孕孕而育育而其子必堅壯長壽
 也今未笄之女天癸始至已近男色則陰氣
 早瀉未完而傷未實而動所以雖交而不孕
 孕而不育育而其子必脆弱不壽也
 種子時候
 男子聚精在寡慾交接乘時不可失須待細蘊時
 候至樂育難恐是真機

御製醫部全錄卷之五
註 聚精之道惟在寡慾交接女子必乘其時不
畏不可失之遲早蓋婦人一月經行一度之後必
有一日網蘊之時氣蒸而熱如醉如痴有欲
交接不可忍之狀乃天然節候是成胎生化
之真機也

分男女論

精血先後分男女或以奇偶少多分或以子宮左
右定是皆不曉箇中因欲識此中真消息乾道陽
男坤女陰

註 分男女之說先賢有以血先至裹精則成男
精先至裹血則成女精血散分並裹則為駢
胎品胎之原者有以月水盡後一三五日成
男二四六日成女與夫經水斷後一二日成
男四五日成女者有以受氣於左子宮成男
受氣於右子宮成女者皆各執一見殊為不
曉此中因也蓋獨男獨女之胎可以日數論
駢胎品胎或男或女亦可以日數論乎稽之
史載一產三子四子有半男半女或男多女

少男少女多者則一三五日為男二四六日
 為女之說不可憑矣抑豈有一日受男而二
 日復受女之理乎丹田命門也在男子曰精
 室在女子曰子宮形如合鉢並無兩岐可分
 曰左右則是有兩子宮矣此說尤屬不經然
 則何以定之亦惟以會合天人陽盛乾道成
 男陰盛坤道成女斯足為確論耳

雙胎品胎

古以雙胎精氣盛不成男女或求至巽陽變常駁

氣盛事之所有理難明

註

古以雙胎乃精氣有餘岐而分之血因分而
 攝之故也若男同孕者剛日陽時也女同孕
 者柔日陰時也男女同孕者剛日陰時或柔
 日陽時也其他或有不成男女男不可為父
 女不可為母與男女之兼形者又皆陰陽變
 常駁氣所感事之所有理之所無莫可稽考
 者也

少娠見有子

少陰動甚知有子陰搏陽別尺寸憑但搏不滑胎
三月搏而滑石五月形

註

少陰督脈動甚者有子脈也但當憑其兩尺
陰脈搏指有力兩寸陽脈不搏指而別於兩
尺斯為有子脈無疑也其但搏不滑者主三
月之胎搏而滑者主五月之胎也

胎男女辨

上小下大女腹箕中正圓高男腹釜右疾為女左
疾男胎氣鍾於陰陽主

註

上小下大如箕之形蓋以女胎面向母腹其
足膝抵腹故有是形也中正圓高如釜之形
蓋以男胎面向母背則背脊抵腹故有是形
也右手屬陰脈疾為女左手屬陽脈疾為男
是胎氣鍾於陰則右盛主女鍾於陽則左盛
主男也

辨別孕病

孕病不分須診乳五月之後乳房升何以知其母
子吉身雖有病脈和平

註 婦人經水不至不分是孕是病者五個月之後以孕婦乳房辨之若乳房升大有乳者是胎若乳房不大無乳者是病也凡孕婦有病其險可知亦何以知其母子俱吉惟診其脈象和平則雖有病知均吉無慮也

分經養胎

分經養胎不足憑無所專養論不經形始未分無不具陰陽之道漸分形

註 巢元方曰妊娠一月名胚胎足厥陰脈養之

二月名始膏足少陽脈養之三月名始胎手心主脈養之當此時血不流行形象始化四月始受水精以成血脈手少陽脈養之五月始受火精以成氣足太陰脈養之六月始受金精以成筋足陽明脈養之七月始受木精以成骨手太陰脈養之八月始受土精以成膚革手陽明脈養之九月始受石精以成毛髮足少陰脈養之十月五藏六府關節人神皆備又有推巢元方養胎之說謂四時之令

御製醫宗金鑑 卷四十五
必始於春所以一月二月間是足厥陰少陽
木也三月四月間手厥陰少陽火也五月六
月間足太陰陽明土也七月八月間手太陰
陽明金也九月十月間足少陰太陽水也惟
手少陰太陽二經無所專養者以君主之官
無爲而已此說更爲不經夫男女交接精血
聚而成胚此孕形之始也雖未分身軀藏府
而其理無不具也猶太極渾然包羅萬象而
陰陽之一氣氤氳浸漸化生而成子母分形
自然而然如草木成熟殼脫蒂落也

受孕分房靜養

受孕分房宜靜養謹戒食味使脾安調其喜怒防
驚恐慎厥起居避風寒

註

受孕之後分房靜養恐動相火致生胎毒謹
戒飲食五味使其脾胃調和母之氣血易生
子之形成必育內調七情外避風寒起居安
順不持重用力不安逸多睡不登高涉險則
母無病子亦安矣

安胎母子二法

安胎之道有二法母病胎病要詳分母病動胎但治母子病致母審胎因

註

安胎之道有二法母病胎病當詳分而施治也凡因母病以致胎動者但療其母母安則胎自安或因胎病有所觸動以致母病者但宜安胎胎安則母自愈矣

胎前用藥三禁

胎前清熱養血主理脾疏氣是為兼三禁汗下利

小便隨證虛實寒熱看

註

丹溪曰胎前當清熱養血為主恐傷陰血也理脾脾健則氣血易生疏氣氣順則氣血調和理脾疏氣兼以清熱養血則胎自安矣三禁者汗下利小便也蓋恐過汗亡陽傷氣過下亡陰傷血利小便傷津液也然又當隨證詳審表裏虛實寒熱以施其治不可過峻也

安胎審宜調治

形瘦不宜過熱品體盛補氣恐動痰安胎芩朮為

要藥佐以他藥任抽添火盛倍苓痰倍朮血虛四
物氣四君杜續膠艾胎不穩氣盛蘇腹枳砂陳

註

形瘦之人多火過用溫熱則傷陰血肥盛之
人多痰過於補氣恐壅氣動痰白朮消痰健
脾條苓清熱養陰二味爲安胎要藥若有他
證則以藥佐之或減白朮加條苓或加白朮
減條苓任其抽添如火盛則當倍苓以清火
痰盛則當倍朮以消痰血虛則合四物湯以
補血氣虛則合四君湯以補氣胎不安穩更

佐以杜仲續斷阿膠艾葉以安之若氣盛胎
高則加紫蘇大腹皮枳殼砂仁陳皮以舒之

四物湯

四君子湯

方俱見首卷彙方內

嗣育門彙方

加味地黃丸

治婦人經水不調必不能受孕即使受之亦不
全美宜常服此方

熟地

四兩

山萸肉

山藥 各二兩 牡丹皮

白茯苓 各一兩五錢 澤瀉

香附 各一兩 童便浸三次

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十九白沸湯送下

滌痰湯

治婦人肥盛者多不受孕以身中有脂膜閉塞

子宮也以此湯送後丸藥

當歸 一兩 茯苓 四兩

川芎 七錢五分 白芍藥

白朮 土炒 半夏 製

香附米 陳皮

甘草 各一兩

右作十貼每貼薑三片水煎吞後丸子

滌痰丸

白朮 二兩 土炒 半夏麴

川芎 香附米 各一兩

神麴 炒 茯苓 各五錢

橘紅 四錢

甘草 二錢

右為末粥丸每服八十丸

如熱者加黃連枳實 各一兩

大補丸

治婦人瘦弱多由血少不能受孕宜常服此方

天冬 去心

麥冬 去心

菖蒲

茯苓

人參

益智仁

枸杞子

地骨皮

遠志肉

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下三十

丸

菘蓉菟絲子丸

此方不寒不熱助陰生子

肉菘蓉 一兩三錢

覆盆子

蛇牀子

川芎

當歸

菟絲子 各一兩二錢

白芍藥 一兩

牡蠣 鹽泥固煨

御製醫宗金鑑 卷四十五 編輯婦科心法要訣 三

烏鰂魚骨 各八錢 五味子

防風 各六錢 條芩 五錢

艾葉 三錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服三四十九鹽湯下早晚皆可服

調經丸

理氣養血調經種子

香附 八兩 川杜仲 薑汁炒

大川芎 白芍藥

當歸 去尾 懷生地

陳皮 小茴香 酒炒

延胡索 畧炒 肉蓯蓉 酒炒

舊青皮 麩炒 台烏藥 炒

枯黃芩 酒炒 烏鰂魚骨 以上各四兩 酥炙

右十四味稱足真正好醋和麩打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心好酒送下一方無陳皮地黃有人參黃耆各二兩

御纂醫宗金鑑卷四十六

編輯婦科心法要訣目錄

胎前諸證門

胎前總括

惡阻總括

惡阻證治

保生湯

加味六君湯

加味溫膽湯

胞阻證治

加味平胃散

延胡四物湯

加味膠艾四物湯

蜜消湯

膠艾四物湯

加味芎歸飲

導赤散

五苓散

子腫子氣子滿脆脚皺脚證治

茯苓導水湯

子煩證治

知母飲

子懸胎上逼心證治

紫蘇飲

子癇證治

羚羊角散

鈎藤湯

子嗽證治

枳桔二陳湯

桔梗湯

轉胞證治

舉胎四物湯

阿膠五苓散

子淋證治

加味五淋散

激經胎漏尿血總括

激經胎漏尿血證治

阿膠湯

黃耆湯

銀芩酒

加味四物湯

胎不安小產墮胎總括

胎不安小產墮胎證治

加味聖愈湯

加味佛手散

十聖散

加味芎藭湯

益母丸

墮胎下血不止證治

瘀血不出證治

獨參湯

回生丹

子死腹中證治

佛手散

平胃散

辨子母存亡

胎兼癥瘕

胎不長證治

子瘖證治

子啼腹內鐘鳴證治

黃連煎

藏燥證治

甘麥大棗湯

鬼胎總括

腸覃石瘕證治

香棱丸

胎前母子盛衰

胎前諸證門

胎前總括

胎前諸證門

胎前總括

御纂醫宗金鑑卷四十六

編輯婦科心法要訣

胎前諸證門

胎前總括

妊娠胎前病惡阻胞阻腫滿氣煩懸痛嗽轉胞與
子淋激經胎漏胎不安小產死胎胎不長子瘖臟
燥鬼胎連餘病當參雜證治須知刻刻顧胎原

註此言妊娠胎前有惡阻胞阻子腫子滿子煩

子懸子痛子嗽轉胞子淋激經胎漏胎動不

安小產墮胎子死腹中胎萎不長子瘖臟燥
鬼胎等證皆當一一詳辨熟記其餘胎前傷
寒傷食瘧痢霍亂泄瀉當於雜證門中叅考
治之但須時刻保護胎原不致誤犯為要也

惡阻總括

惡心嘔吐名惡阻擇食任意過期安重者須藥主
胃弱更分胎逆痰熱寒

註

婦人受孕月餘之後時時嘔吐者名曰惡阻
若無他病擇食者須隨其意而與之輕者過

期自然勿藥而愈重者須以藥治之當以胃
弱為主更審其或因胎氣阻逆或痰飲阻逆
與夫兼熱兼寒而分治之

惡阻證治

保生湯

胎氣阻逆惟嘔吐無他兼證保生湯砂朮香附烏
陳草量加參枳引生薑

註

惡阻有因胎氣阻逆者乃受胎後胞門閉塞
藏氣內阻挾胎氣上逆於胃故令惡心嘔吐

也若平素胃虛所致雖無痰飲寒熱相兼而亦有惡阻證者宜用保生湯即砂仁白朮香附烏藥陳皮甘草也引用生薑者以止其嘔也若氣弱者量加人參氣實者量加枳殼加味六君湯

痰飲惡阻吐痰水煩眩加味六君湯枇杷藿香旋縮枳熱秘苓軍寒桂薑

註惡阻因於痰飲者其吐必多痰水且心煩頭目眩暈必其人平素胃虛中停痰飲也宜用

加味六君湯於六君湯內加枇杷葉藿香旋覆花縮砂枳殼若胃熱便秘加黃芩大黃以利之胃寒喜熱加肉桂乾薑以溫之

六君湯 方見首卷

加味溫膽湯

熱阻惡食喜涼漿心煩憤悶溫膽湯橘半茯苓與枳竹更加苓連蘆麥蘆

註惡阻因於胃熱者必嘔吐心中熱煩憤悶喜飲涼漿也宜用加味溫膽湯其方即陳皮半

夏茯苓甘草枳實竹茹名溫膽湯更加黃芩
黃連蘆根麥門冬引生薑也

胞阻總括

妊娠腹痛名胞阻須審心腹少腹間傷食心胃胎
腰腹少腹胞寒水尿難

註

孕婦腹痛名爲胞阻須審其痛或上在心腹
之間者多屬食滯作痛或下在腰腹之間者
多屬胎氣不安作痛若在少腹之間者則必
因胞血受寒或停水一尿難作痛也

胞阻證治

加味平胃散

延胡四物湯

心胃痛多傷食滯蒼朴陳甘果枳麩便秘加軍倍

甘草胎動延胡四物宜

註

孕婦心胃作痛者多因傷食停滯宜平胃散

即陳皮厚朴蒼朮甘草也加草果枳殼神麩

以消之若更大便秘結日久則加消黃以攻
之然必倍甘草以緩其峻性庶不傷胎若腰

腹作痛胎動下血則當用四物湯君以延胡以定痛而保胎也

四物湯

方見首卷

加味膠艾四物湯

蜜消湯

腹腰痛甚防胎墮膠艾四物杜酒葱外邪宜加羌獨活內熱便秘蜜消攻

註

胞蒂繫於腰凡腹腰痛者須防胎墮宜用膠

艾四物湯加杜仲大豆淋酒葱白以定痛而

保胎若因外感風寒之邪則加羌活獨活以散之若內熱大小便閉者則用蜂蜜芒消煎湯以攻之經曰有故無隕是也

膠艾四物湯

方見首卷

加味芎歸飲

導赤散

五苓散

胞血受寒少腹疼參吳膠艾草歸芎尿澁熱甚導赤散木通生地甘草靈水盛陽虛五苓效木澤肉

桂茯豬苓

註

少腹作痛者乃胞中之血受寒也宜加味芎歸飲溫之其方即人參吳茱萸阿膠蘄艾炙甘草當歸川芎也若因尿澀而痛則是膀胱水病熱甚則以導赤散清利之其方即生地木通甘草也若水盛陽虛不化則以五苓散滲利之其方即茯苓白朮澤瀉豬苓肉桂也

子腫子氣子滿脆腳皺腳總括

頭面四肢腫子腫自膝至足子氣名腫脹喘滿

子滿但腳腫者脆皺稱

註

頭面徧身浮腫小水短少者屬水氣為病故名曰子腫自膝至足腫小水長者屬濕氣為病故名曰子氣徧身俱腫腹脹而喘在六七箇月時者名曰子滿但兩腳腫而膚厚者屬濕名曰皺腳皮薄者屬水名曰脆腳大凡水之為病多喘促氣之為病多脹滿喘促屬肺脹滿屬脾也以其人素有水氣濕邪故受孕有腫滿之證兒未成形被水浸漬其胎每致

損壞成形尚可調治故在五六月後有是證者多有生育者也

子腫子氣子滿脆腳皺腳證治

茯苓導水湯

妊娠腫滿與子氣水氣濕邪脾肺間水氣浸胎喘難卧濕氣傷胎脹難堪均宜茯苓導水治香瓜檳腹四苓攢桑砂蘇陳脹加枳腿腳防已喘葶添

註 妊娠水腫脹滿子氣皺腳脆腳等證皆由水

氣濕邪傷於脾肺為病也若水氣盛而浸胎

則必喘而難卧若濕氣盛而傷胎則脹滿難

堪皆宜用茯苓導水湯治之方用木香木瓜

檳榔大腹皮白朮茯苓豬苓澤瀉桑皮砂仁

蘇葉陳皮以和脾肺而利水濕脹甚者加枳

殼以破結腿腳腫者加防已以利下濕喘者

加苦葶藶以泄上水也

子煩證治

知母飲

孕婦時煩名子煩胎熱乘心知母痊子芩知麥苓

從醫醫宗全錄 卷四十一
耆草犀熱參虛膏湯煎

註

孕婦別無他證惟時時心煩者名曰子煩田
胎中鬱熱上乘於心也宜用知母飲即子苓
知母麥冬茯苓黃耆甘草熱甚者加犀角氣
虛加人參口渴加石膏煎服

子懸胎上逼心證治

紫蘇飲

胸膈脹滿子懸名喘甚由胎上逼心紫蘇飲用歸
芎芍陳腹蘇甘虛入參

註

孕婦胸膈脹滿名曰子懸更加喘甚者名曰
胎上逼心俱宜紫蘇飲即當歸川芎白芍陳
皮大腹皮蘇梗葉甘草虛者加人參煎服

子癇證治

羚羊角散

釣藤湯

暴仆抽搐不識人須臾自醒子癇名羚羊角散防
獨杏五加棗草薏苡仁茯苓木香羚羊角抽搐釣
藤湯寄生人參茯神歸桔梗口喎肢廢中風成

註 孕婦忽然顛仆抽搐不省人事須臾自醒少頃復如好人謂之菴菴乃肝心二經風熱所致宜用羚羊角散白僵毛觸活杏仁酸棗仁五加皮甘草薏苡仁甘草不香羚羊角也抽搐甚者用釣藤湯乃釣藤桑寄生人參茯苓神當歸桔梗也若口眼喎斜半身不遂則已成中風廢證當參風門治之

子嗽證治

枳桔二陳湯

桔梗湯

妊娠咳嗽名子嗽陰虛痰飲感風寒痰飲二陳加枳桔風寒桔梗湯可安紫蘇桔梗麻桑杏赤苓天冬合貝前久嗽陰虛宜清潤麥味地黃湯自痊

詩

妊娠咳嗽謂之子嗽嗽久每致傷胎有陰虛火動痰飲上逆有感冒風寒之不同因痰飲者用二陳湯加枳殼桔梗治之因感冒風寒者用桔梗湯即紫蘇葉桔梗麻黃桑白皮杏仁赤茯苓天冬百合川貝母前胡也若久嗽

屬陰虛宜滋陰潤肺以清潤之用麥味地黃湯治之

六味地黃湯 方見首卷

轉胞證治

舉胎四物湯

阿膠五苓散

飲食如常煩不卧不得小便轉胞稱舉胎救急丹
溪法四物升麻參朮陳服後探吐吐再服不應阿
膠入五苓

註 妊娠胎壓胞系了戾不得小便飲食如常心

煩不得卧者名曰轉胞宜用丹溪舉胎法令

穩婆香油塗手舉胎起則尿自出以暫救其

急然後以四物湯加升麻人參白朮陳皮煎

服服後以指探吐吐後再服再吐如此三四

次則胎舉而小便利矣如不應則是有飲用

五苓散加阿膠以清利之

四物湯 方見首卷

子淋證治

加味五淋散

子淋頻濁窘澁疼五淋梔苓歸芍芩甘草再加生地澤車前滑石木通尋

註 孕婦小便頻數窘澁點滴疼痛名日子淋宜

五淋散即黑梔赤茯苓當歸白芍黃芩甘草加生地澤瀉車前子滑石木通以清熱而利水則小便自通矣

激經胎漏尿血總括

妊娠經來名激經胎漏下血腹不疼若是傷胎腹

必痛尿血漏血要分明

註 婦人受孕之後仍復行經者名曰激經為血

有餘若孕婦無故下血或下黃汁豆汁而腹不痛者謂之胎漏若其胎已傷而下血者其腹必疼孕婦又有尿血一證腹亦不痛然與胎漏之證又不同蓋尿血出於溺孔漏血出自人門三者俱下血而各不同治者不可不詳辨也

激經胎漏尿血證治

阿膠湯

黃耆湯

銀芩酒

加味四物湯

激經無病不須治子大能食經自停胎漏下血多
因熱四物阿膠梔側芩或下黃汁豆汁棧黃耆糯
米芩根銀若是尿血膀胱熱四物血餘其芩根

註

激經無他證相兼者不須用藥其胎壯子大
能食其血而經自停若胎漏下血多屬血熱

宜阿膠湯清之其方卽四物湯加阿膠黑梔
側栢葉黃芩也或漏下黃汁或如豆汁甚多
者其胎乾枯必倚而墮宜用黃耆湯卽黃耆
二兩糯米一合煎服或銀芩酒卽芩麻根紋
銀煎酒服若尿血則是膀胱血熱宜四物湯
加血餘白茅根以涼之

四物湯

方見首卷

胎不安小產墮胎總括

氣血充實胎自安衝任虛弱損胎原暴怒房勞傷

肝腎疾病相干跌撲顛五月成形名小產未成形
象墮胎言無故至期數小產須慎胎爲慾火煎

註

孕婦氣血充足形體壯實則胎氣安固若衝
任二經虛損則胎不成實或因暴怒傷肝房
勞傷腎則胎氣不固易致不安或受孕之後
患生他疾干犯胎氣致胎不安者亦有之或
因跌撲築磕從高墜下以致傷胎墮胎者亦
有之然小產墮胎亦自有別五七月已成形
象者名爲小產三月未成形象者謂之墮胎

以上小產墮胎皆出有因若懷胎三五七月
無故而胎自墮至下次受孕亦復如是數數
墮胎則謂之滑胎多因房勞太過慾火煎熬
其胎因而不安不可不慎者也

胎不安小產墮胎證治

加味聖愈湯

加味佛手散

十聖散

加味芎藭湯

益母丸

胎傷腹痛血未下聖愈湯加杜續砂下血腹痛佛手散膠艾杜續木芥加十全續縮減苓桂因病傷胎十聖誇跌撲芎藭調益母怒勞逍遙地黃佳

註

妊娠胎傷若腹痛不下血者宜用聖愈湯加杜仲續斷砂仁安之若下血腹痛者宜用佛手散加阿膠蘄艾杜仲續斷白朮條芩安之若因母病以致傷胎欲墮者宜十聖散即十全大補湯減茯苓肉桂加續斷砂仁若因跌

撲築磕傷胎欲墮者宜芎藭湯調益母丸服之芎藭湯即川芎當歸也若暴怒房勞傷肝腎以致胎動不安者宜逍遙散地黃湯治之

聖愈湯

佛手散

逍遙散

地黃湯

方俱見首卷

墮胎下血不止血瘀不出證治

獨參湯

回生丹

墮胎暴下血不止面黃唇白獨參湯惡血不出疑
脹痛回生益母酌相當

註 妊娠胎墮後血暴下不止面黃唇白者名脫

榮宜用獨參湯峻補其氣以生其血所謂無

形能生有形也若惡血瘀滯不行腹脇脹痛

者宜於回生丹益母丸酌其虛實緩急相當

而用之

回生丹

見產後彙方

子死腹中總括

子死腹中須急下舌青腹痛冷如冰時久口中穢
氣出寒熱峻緩詳斟平

註

凡一應傷胎子死腹中者須當急下勿使上

奔心胸然必驗其舌青面赤肚腹脹大腹冷

如冰久之口中有穢氣出者方可議下然猶

必審其人之虛實寒熱或宜寒下熱下峻下

緩下隨其宜而施之

子死腹中證治

佛手散

平胃散加芒消方

下胎緩劑佛手散峻劑平胃加芒消宜熱宜寒須細審產婦虛實莫溷淆

註孕婦子死腹中宜下者緩下用佛手散峻下

用平胃散加芒消或宜寒下或宜熱下須細詳審而投之蓋以產母之虛實或緩或峻

不可溷淆輕率以致誤也

佛手散 方見首卷

辯子母存亡

妊娠一切垂危候母子存亡可預推面赤舌青必子死面青舌赤母命危面舌俱青口吐沫子母俱亡二命虧

註凡妊娠一切凶危之候欲知母子存亡者當

於孕婦面舌之色定之若面赤舌青則其子

必死面青舌赤則其母必亡若面舌二者俱

見青色口角兩邊流涎沫者則子母二命俱

不能保也

胎兼癥瘕

妊娠有病當攻下衰其大半而止之經云有故而無殞與病適當又何疑

註

凡孕婦素有癥瘕舊疾或有新病應攻下者但攻其大半餘俟其自消不可盡攻經云有故無殞言藥雖峻有病則病受之不能傷胎也攻其大半與病相當又何疑於有妊必不可攻之說耶

胎不長證治

八珍湯

六君子湯

胎萎不長失滋養氣血不足宜八珍脾虛胃弱六君子穀化精微氣血生

註

妊娠五六月胎萎不長由於妊母稟賦虛弱者宜用六君子湯但使飲食強壯俾水穀運化精微則氣血日生而胎自長矣

八珍湯

六君子湯

方俱見首卷

子瘖證治

子瘖聲啞細無音非謂絕然無語聲九月胎盛阻其脈分曉之後自然通

註

妊娠九月孕婦聲音細啞不響謂之子瘖非似子啞絕然無語也蓋少陰之脈絡於舌本九月腎脈養胎至其時胎盛阻遏其脈不能上至舌本故聲音細啞待分娩之後腎脈上通其音自出矣

子啼腹內鐘鳴證治

黃連煎

腹內鐘鳴與兒哭子啼之證出偶然空房鼠穴土能治黃連煎湯亦可捐

註

孕婦腹內有鐘聲或嬰兒在內啼哭者名曰子啼古書雖載其證然不經見或偶然有之古方用空房中鼠穴土同川黃連煎湯名黃連煎飲之自愈

臟燥證治

甘麥大棗湯

臟燥無故自悲傷象若神靈大棗湯甘草小麥與大棗方出金匱效非常

註 孕婦無故時時傷悲哀痛象若神靈憑依者

名曰臟燥宜用金匱甘麥大棗湯服之其方即甘草小麥大棗三味煎服其效非常也

鬼胎總括

邪思情感鬼胎生腹大如同懷子形豈緣鬼神能交接自身血氣結而成

註

鬼胎者因其人思想不遂情志相感自身氣血凝結而成其腹漸大如懷子形狀古云實有鬼神交接其說似屬無據婦人石瘕腸覃二證亦俱如懷孕之狀由氣血凝結而成則可知其必無是理矣

腸覃石瘕證治

香稜丸

腸覃石瘕氣血分寒客腸外客子門二證俱如懷子狀辨在經行經不行石瘕吳萸湯最效腸覃香

稜丸若神丁木茴香川棟子青皮廣茂與三稜

註

經云寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮
因有所繫痠而內着惡氣乃起瘕肉乃生始
如雞卵稍以益大如懷子狀按之則堅推之
則移月事以時下石痠生於胞中寒氣客於
子門子門閉塞氣不得通惡血當下不下血
以留止日以益大狀如懷子月事不以時下
皆生於女子可導而下由經文觀之二證雖
皆如懷子狀腸單氣病而血不病故月事以

時下石痠先氣病而後血病故月事不來也

石痠宜吳萸湯腸單宜香稜丸即木香丁香

茴香川棟子青皮廣茂三稜醋煮麩糊為丸

也

吳茱萸湯

方見首卷

胎前母子盛衰

母盛子衰胎前病母衰子盛產後殃子母平和無
衰盛坦然分娩不須忙

註

此言觀孕婦與所懷之胎有盛衰之辨也若

妊娠母氣血壯盛而胎元弱者胎前必多病若孕婦衰弱而胎元壯實則產後其母必多病若子母俱和平無偏盛偏衰則胎前產後均平安無疾可坦然無憂也

胎前有餘詳不足產後不足審有餘產後惟多虧損病胎前子母盛衰知

註

古云胎前無不足產後無有餘此言其常也然胎前雖多有餘之證亦當詳察其亦有不

斷艾 各八分

右加葱白三寸大豇豆淋酒煎服

蜜消煎

蜂蜜 芒消

右煎溶化服

加味芎歸飲

川芎 二錢 當歸 五錢

人參 一錢 吳茱萸 五分

阿膠 二錢 斷艾 八分

甘草 五分

右剉水煎服

導赤散

生地 三錢

木通 二錢

甘草稍 一錢

燈心 一團煎服

五苓散

白朮 土炒

茯苓

猪苓

澤瀉 各二錢半

桂 三分

右剉作一服水煎服

茯苓導水湯

茯苓

檳榔

猪苓

縮砂

木香

陳皮

澤瀉

白朮

木瓜

大腹皮

桑白皮

蘇梗 各等分

右加薑煎服

木 脹加枳殼

喘加苦葶藶子

木 腿脚腫加防已

知母飲

知母

麥冬

甘草 各五錢

黃耆

于菀 各七錢五分

右以水一盞煎至七分去滓

竹瀝一合温服

紫蘇飲

當歸

川芎

白芍 各二兩

陳皮

蘇莖葉

大腹皮 各一兩

甘草 五錢

人參 量虛實用

右以水一盞煎至五分生薑五片煎至一

盞去滓服日進二服

有熱加黃芩竹茹

心煩加羚羊角

有食加神麴山查

羚羊角散

羚羊角鎊

獨活

酸棗仁

五加皮

防風

薏苡仁

杏仁

當歸酒浸

川芎

茯神各五分
去木

甘草

木香各二分

右吹咀加生薑五片水煎服

釣藤湯

釣藤鈎

當歸

茯神

人參各一兩

苦桔梗

一兩五錢 桑寄生五錢

右為粗末每服五六錢水二盞煎至一盞去

滓溫服無時忌猪肉菘菜

煩熱加石膏二兩半

臨產月加桂心一兩

枳桔二陳湯

陳皮

半夏

茯苓

各二錢

甘草

五分

枳殼

桔梗

各一錢

右剉薑煎服

桔梗湯

天冬

去心

赤苓

各一錢

桑皮

桔梗

紫蘇

各五分

麻黃

三分

貝母

人參

甘草

各二分

右剉加生薑水煎服

一方有杏仁無貝母

舉胎四物湯

當歸

白芍

熟地

川芎

人參

白朮

陳皮

升麻

各二錢

各一錢

右劉水煎服

麥味地黃湯

熟地 四錢

川黃肉 二錢

山藥 二錢

白瀉

茯苓

丹皮 各一錢五分

麥冬 二錢

五味子 十二粒

右劉水煎服

五淋散

赤芍

山梔子 各二錢

赤茯苓 一錢二分 當歸 一錢

子芩 六分 甘草 五分

右水煎服

湯

阿膠 炙燥 熟地 焙

艾葉 微炒 芎藭

當歸 切焙 杜仲 去粗皮炙剉

白朮 各一兩

右以咀每服四錢水一盞半棗三枚擘破

煎至八分去滓食前温服

黃耆湯

糯米 一合

黃耆 二兩

川芎 一兩

右細剉水二大盞煎至一盞温服一方無芎

銀芎酒

苧麻根 二兩

紋銀 五兩

清酒 一盞

右以水二大盞煎至一大盞去渣分温二服

十聖散

人參

黃耆

白朮

熟地黄

砂仁 各五分

甘草 炙

當歸

川芎

白芍 各一錢

川續斷 八分

右剉水煎服

獨參湯

用好人參 二兩 或四兩

右水煎徐徐服

益母丸

益母草

五月五日或六月六日採之陰乾忌鐵器

右一味以石器碾為細末煉蜜丸彈子大每用一丸童便好酒各半研化服之

六味地黃丸

熟地

八兩蒸曬九次

山藥

四兩

茯苓

三兩乳拌

山萸肉

四兩酒浸

丹皮

三兩

澤瀉

三兩

煉蜜為丸如梧桐子大每服三錢

桂附地黃丸

即六味地黃丸加肉桂附子

黃連煎

黃連

青右一味煎湯調空房中鼠穴內土服

甘麥大棗湯

甘草

三兩

小麥

一升

大棗

十枚

右以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

香棱丸

木香

丁香 各半兩

枳殼

三棱 酒浸一夕

莪茂

同炒待巴豆黃色去巴豆不用

青皮

川棟子肉

藜香

各等分

黃蘗右為末醋煮麵糊丸如桐子大硃砂為衣
掛服三十九薑鹽湯送下或溫酒下無時

