



四十七
四十八

七武
595
33



御纂醫宗金鑑
婦科心法要訣
目錄

御纂醫宗金鑑卷四十七

婦科心法要訣目錄

生新書

臨產

產室

擇收生婆

驚生

試胎弄胎

坐草

御纂醫宗金鑑 卷四十七 目錄

國醫

國醫

臨盆

交骨不開

開骨散

盤腸生

補中益氣湯

十全大補湯

草薢貼法

酥油潤法

難產

產後門

胞衣不下證治

奪命散

產門不閉證治

十全大補湯

血暈證治

清魂散

佛手散

醋漆薰法

惡露不下證治

失笑散

聖愈湯

惡露不絕證治

加味十全大補湯

佛手散

頭疼證治

芎歸湯

八珍湯

心胃痛證治

大巖蜜湯

玉燭散

腹痛證治

失笑散

香桂散

異功散

少腹痛證治

延胡索散

吳茱萸湯

五苓散

脇痛證治

延胡索散

四君子湯

八珍湯

腰痛證治

佛手散

加味六味地黃湯

遍身疼痛證治

越痛散

加味四物湯

腹中塊痛證治

延胡索散

吳茱萸湯

筋攣證治

加味四物湯

八珍湯

傷食嘔吐證治

六君子湯

二陳湯

呃逆證治

丁香豆蔻散

茹橘飲

氣喘證治

參附煎

二味參蘇飲

浮腫證治

枳朮湯

小調中湯

小調經散

茯苓導水湯

發熱證治

加味四物湯

加味異功散

六君子湯

生化湯

四物湯

十全大補湯

八珍湯

當歸補血湯

參附湯

寒熱證治

柴胡四物湯

生化湯

更生散

自汗頭汗證治

當歸六黃湯

黃耆湯

參附湯

中風證治

十全大補湯

瘧病證治

加味八珍湯

痰痰抽搐證治

加味八珍湯

不語證治

加味八珍湯

星連二陳湯

七珍散

八珍湯

二陳湯

御纂醫宗金鑑卷四十七

編輯婦科心法要訣

生育門

臨產

妊娠臨產要安詳腹內雖疼切莫慌舒身仰卧容胎轉靜待生時不用忙

註

妊娠月足臨產腹內如覺動轉疼痛須要安詳莫白慌亂舒體仰卧時時緩步使兒身轉正靜以待之至其生育之時自然順生不用

忙也

產室

產室寒溫要適時嚴寒酷熱總非宜夏要清涼冬要煖病者醫人俱要知

註

產室之內四時俱要寒溫適中若太熱太寒均不相宜夏月必須清涼勿令炎熱致產母中暑暈迷倘有其事不妨少與凉水以解之冬月必須溫暖勿令寒冷以致血凝難產當多備火爐使產母腰背下身就火烘之此篇

產之家及醫人皆當知之者也

擇收生婆

臨產穩婆須預擇老成歷練又精明無故莫教使手法寬心寧耐待時生

註

臨產之家必用收生婆須預先擇老成歷練明白經事之人無故切勿令其先使手法如試水探漿等事但囑令寬心寧耐以待生時可也

驚生

人語喧譁產母驚心虛氣怯號驚生急須止靜休
嘈雜產母心安胎自寧

註產房之內不可多人人多則語聲喧譁產母
之心必驚驚則心氣虛怯至產時多致困乏
號曰驚生有如此者須急急摒出只留服役
一二人使寂靜而無嘈雜之聲則母心始安
安則其胎亦寧靜矣

試胎弄胎

月數未足腹中痛痛定如常名試胎臨月腹痛腰
不痛或作或止名弄胎二者均非正產候但須寧
靜莫疑猜

註妊娠八九個月時或腹中痛痛定仍然如常
者此名試胎宜養血以安其胎若月數已足
腹痛或作或止腰不痛者此名弄胎不宜輕
動二者均非正產之時切勿躁擾疑惑惟宜
寧靜以待其時

坐草

坐草須知要及時兒身未順且遲遲若教產母用

力早逼胎不正悔難追

註

凡產婦坐草最要及時不可太早若兒身未順寧可遲遲覓心以待倘坐草太早非正產之時妄使產母用力往往逼胎不正遂至橫倒者有之雖悔無及矣

臨盆

兒身轉順頂當門胞漿已破腹腰疼中指跳動穀道挺臨盆用力送兒生

註

凡兒之生自有其時時至則兒身轉順頭頂

正當產門胞漿大來腰重腹痛穀道挺迸產母中指中節或本節跳動此方為正產之時方可臨盆用力送兒自順生矣

交骨不開

交骨不開須細審或因不足或初胎總宜開骨通陰氣佛手龜板婦髮灰若因不足加參妙一服能令骨立開

註

產婦交骨不開有因氣血不足者有因初次胎產者二者均宜用開骨散通其陰氣其方

御製醫方全錄 卷四十一
卽佛手散加敗龜板與生過子女婦人頭髮也氣血不足者加人參服之可使其骨立開

盤腸生

盤腸未產腸先出已產嬰兒腸不收頂貼草麻服升補腸乾潤以奶酥油

註

妊娠婦人有盤腸生者臨產之時其腸先拖出及兒已產下其腸有仍不收者須以草麻仁鵝爛貼於頂心內服升補之劑如補中益氣湯或八珍十全大補等湯加升麻以升補之其腸自收矣

補中益氣湯

十全大補湯

方俱見首卷

難產

難產之由不一端胎前安逸過貪眠驚恐氣怯用力早胞破血壅血漿乾

註

妊娠難產之由非只一端或胎前喜安逸不耐勞碌或過貪眠睡皆令氣滯難產或臨產驚恐氣怯或用力太早則產母困乏難產或

胞傷血出血壅產路或胞漿破早漿血乾枯
皆足以致難產臨證之工不可不審也

產後門

胞衣不下證治

胞衣不下因初產用力勞乏風冷凝下血過多產
路澁血入胞衣腹脹疼急服奪命沒竭散勿使冲
心喘滿生諭令穩婆隨胎取休驚產母莫教聞

註產婦胞衣不下者或因初產用力困乏風冷

相干致血瘀凝或因下血過多血枯產路乾
澁或血入胞衣脹滿疼痛皆能使胞衣不下
均當急用奪命散即沒藥血竭二味為散

免致上攻心胸脹滿喘急為害不小且宜諭令穩婆隨胎取下莫使產母聞之恐被驚則愈難下也

產門不閉證治

產門不閉由不足初產因傷必腫疼不足十全大補治甘草湯洗腫傷平

註

凡產後玉門不閉者多由氣血不足所致亦有因初產傷重者必腫而疼也氣血不足者用十全大補湯治之因傷腫痛者濃煎甘草

湯洗之其腫傷自平

十全大補湯 方見首卷

血暈證治

清魂散

產後血暈惡露少面唇色赤是停瘀惡露去多唇面白乃屬血脫不須疑虛用清魂荆芥穗人參芎草澤蘭隨腹痛停瘀佛手散醋漆薰法總相宜

註

產後血暈有因惡露去少內有停瘀上攻迷暈者面唇必赤色有因去血過多血脫而暈

者面唇必色白血弱者宜用清魂散即荆芥
穗人參川芎甘草澤蘭葉也若停瘀腹痛者
用佛手散二者俱宜頻燒乾漆及用火燒鐵
釘淬醋不時薰之

佛手散 方見首卷

惡露不下證治

惡露不下是何因風冷氣滯血瘀凝若還不下因
無血面色黃白不脹疼風冷血凝失笑散去多聖
愈補而行

計產後惡露不下有因風冷相干氣滯血凝而

不行者必腹中脹痛有因產時去血太多無
血不行者面色必黃白腹必不疼以此辨之
血凝者用失笑散逐而行之無血者用聖愈
湯補而行之

失笑散

聖愈湯 方俱見首卷

惡露不絕證治

惡露不絕傷任衝不固時時淋漓行或因虛損血

不攝或因瘀血腹中停審色汚淡臭腥穢虛補實
攻要辨明虛用十全加膠續瘀宜佛手補而行

註

產後惡露乃裏兒汚血產時當隨胎而下若
日久不斷時時淋漓者或因衝任虛損血不
收攝或因瘀行不盡停留腹內隨化隨行者
當審其血之色或汚濁不明或淺淡不鮮或
臭或腥或穢辨其為實為虛而攻補之虛宜
十全大補湯加阿膠續斷以補而固之瘀宜
佛手散以補而行之

十全大補湯

佛手散

方俱見首卷

頭疼證治

產後頭疼面黃白無表無裏血虛疼惡露不行兼
腹痛必因瘀血上攻冲逐瘀芎歸湯最效虛用八
珍加蔓荊

註

產後頭疼若面色黃白無寒熱身痛之表證
又無便秘之裏證則是因產後去血過多血
虛頭痛也若惡露不行兼腹痛者乃屬瘀血

上攻之痛也去瘀以芎歸湯補虛以八珍湯

加蔓荊子

八珍湯

方見首卷

心胃痛證治

大巖蜜湯

心痛厥逆爪青白寒凝大巖蜜溫行四物去芎加
獨活薑桂茺草遠辛因食惡食多嘔吐麩麥香
砂入二陳大便燥結小便赤兼熱飲冷玉燭攻

註

產後心胃痛若四肢厥逆爪甲青白乃風冷

寒凝氣血滯澁宜用大巖蜜湯溫以行之即

生地當歸赤芍獨活乾薑桂心吳茺草甘草

遠志細辛也若因飲食停滯中脘作痛必惡

食嘔吐宜二陳湯加神麩麥芽木香砂仁若

大便結硬小便赤澁渴欲飲冷者乃內有實

熱也宜玉燭散攻之

玉燭散

方見首卷

腹痛證治

香桂散

去血過多血虛痛去少瘰癧有餘疼傷食惡食多
脹悶寒入胞中見冷形血虛當歸建中治瘰癧失
笑有奇功傷食異功加查麩胞寒香桂桂歸芎

註

產後腹痛若因去血過多而痛者為血虛痛
若因惡露去少及瘀血壅滯而痛者為有餘
疼若因傷食而痛者必惡食脹悶若因風寒
乘虛入於胞中作痛者必見冷痛形狀血虛
宜當歸建中湯血瘀宜失笑散傷食宜異功
散加山查神麩胞寒宜香桂散即佛手散

正苓桂心也

當歸建中湯

失笑散

異功散 方俱見首卷

少腹痛證治

延胡索散

少腹痛微名見枕硬痛尿利血瘀疼尿澁淋痛蓄
水證紅腫須防癰疔癰兒枕瘀血延胡散歸芍蒲
桂琥珀紅蓄水須用五苓散癰疔吳萸溫散行

註
產後少腹痛其痛若微乃產時血塊未淨名
見枕痛若少腹堅硬小便利者為瘀血痛少
腹硬而小便不利淋澁脹痛者乃蓄水作痛
若堅硬紅腫而痛者須防成癩疝癰之證因
見枕瘀血者宜延胡索散即當歸赤芍蒲黃
肉桂琥珀紅花也因水蓄者宜五苓散若將
成癩疝癰者當以吳茱萸湯溫散之

吳茱萸湯

方見首卷

五苓散

方見三卷

脇痛證治

脇痛瘀滯犯肝經左血右氣要分明血用延胡散
可治氣宜四君加柴青去血過多屬虛痛八珍加
桂補其榮

註

產後脇痛因氣血瘀滯干犯肝經在左多屬
血在右多屬氣血宜延胡索散氣宜四君子
湯加柴胡青皮若因去血過多而痛者為虛
痛宜八珍湯加肉桂以補其榮血自愈

四君子湯

八珍湯 方俱見首卷

腰痛證治

腰疼下注兩股痛風冷停瘀滯在經佛手散加獨活桂續斷牛膝桑寄生血多三陰傷氣血地黃桂附續杜尋

註

產後腰疼下注兩股皆痛者乃產時風冷乘之瘀血滯於肝經宜用佛手散加獨活肉桂續斷牛膝防風桑寄生以溫散而行之若因去血過多三陰經氣血虧損者則當用六味

地黃湯加肉桂附子續斷杜仲以溫補之

佛手散

六味地黃湯

方俱見首卷

徧身疼痛證治

起痛散

產後身疼榮不足若因客感表先形起痛散用歸耆朮牛膝甘獨薤桂心血瘀面唇多紫脹四物秦艽桃沒紅

註 產後徧身疼痛多因去血過多榮血不足或

因風寒外客必有表證二者俱宜用越痛散
卽當歸黃耆白朮牛膝甘草獨活薤白桂心
也若面唇紫色身脹痛者必是停瘀所致宜
用四物湯加秦艽桃仁沒藥紅花以行之

四物湯

方見首卷

腹中塊痛證治

產後積血塊冲疼多因新產冷風乘急服延胡散
可逐日久不散血痕成更有寒疝亦作痛吳萸溫
散不須攻

註

產後腹中有塊堅硬攻痛多因新產之後風

冷乘虛而入以致瘀血凝結宜服延胡索散
以逐之若遲久不散必結成血痕矣又有寒
疝之證亦在少腹中攻築而痛此屬寒氣滯
澁宜用吳萸萸湯溫散其寒自愈不必攻也

吳萸萸湯

方見首卷

筋攣證治

產後筋攣雞爪風血虧液損復乘風無汗養榮兼
散邪四物柴瓜桂釣藤有汗八珍加桂枝黃耆阿

膠大補榮

註

產後筋脈拘攣疼痛不能舒展俗名雞爪風皆由產後血液虧損不能榮筋又被風乘故令拘攣疼痛也無汗者宜於養榮之中兼祛外邪用四物湯加柴胡木瓜桂枝釣藤若有汗者宜八珍湯加桂枝黃耆阿膠以大補其榮血可也

四物湯

八珍湯

方俱見首卷

傷食嘔吐證治

產後傷食心下悶惡食嘈雜吞吐酸六君子香砂共嘔逆痰涎二陳煎

註

產後過食肉麵傷於飲食者必心胸飽悶惡聞食氣懊懣嘈雜吞酸吐酸宜用六君子湯加山查神麩香附縮砂以補而消之若更嘔逆痰涎必是兼痰兼飲宜二陳湯加減調治

六君子湯

見首卷

二陳湯

見三卷

行身醫宗金鑑 卷四十一 三
呃逆證治

丁香豆蔻散

茹橘飲

產後呃逆胃虛寒丁香白蔻伏龍肝桃仁吳萸湯
中服不應急將參附添熱湯面紅小便赤竹茹乾
柿橘紅煎

註

產後呃逆皆因氣血兩傷脾胃虛寒中焦之
氣厥而不順所致宜服丁香豆蔻散卽丁香
白豆蔻伏龍肝爲末也用桃仁吳萸煎湯

沖服如不效當以參附湯峻補之若發熱而

紅小便赤色屬熱實者宜用竹茹乾柿橘紅

煎服之名茹橘飲

氣喘證治

二味參蘓飲

產後氣喘爲危候血脫氣散參附煎敗血上攻面
紫黑二味參蘓奪命痊

註

產後氣喘極危證也因下血過多榮血暴竭
衛氣無倚孤陽上越宜驟補其氣用參附煎

湯不時飲之若因惡露不行敗血上攻於肺而喘者必面色紫黑宜奪命散下瘀瘀去喘自定虛者參蘓飲即人參一兩為末蘓木二兩煎湯冲服也

浮腫證治

枳朮湯

小調中湯

產後腫分氣水血輕浮脹滿氣之形水腫喘嗽小便澀皮如熟李血之情氣腫枳朮湯最效水腫積

苓導水靈血腫調中歸芍木茯苓陳煎冲小調經歸芍珀麝辛桂沒理氣調榮瘀血行

註

產後浮腫由於敗血乘虛流入經絡血化為水故令浮腫然有氣腫水腫之別不可不辨也若輕虛浮腫心胸脹滿者因素有水飲所作名曰氣分也宜用枳朮湯即枳實白朮煎湯服之若喘嗽小便不利者則為水腫宜茯苓導水湯利之若皮如熟李或偏身青腫者則為血分宜小調中湯治之其方即當歸白

芍藥白朮茯苓陳皮煎湯沖小調經散服之
即當歸赤芍琥珀麝香細辛肉桂心沒藥也

茯苓導水湯 方見三卷

發熱總括

產後發熱不一端內傷飲食外風寒瘀血血虛與
勞力三朝蒸乳亦當然陰虛血脫陽外散攻補溫
涼細細參

註產後發熱之故非止一端如食飲太過胸滿

嘔吐惡食者則為傷食發熱若蚤起勞動感
受風寒則為外感發熱若惡露不去瘀血停
留則為瘀血發熱若去血過多陰血不足則
為血虛發熱亦有因產時傷力勞乏發熱者
三日蒸乳發熱者當詳其有餘不足或攻或
補或用涼藥正治或用溫熱反治要在臨證
細細參考也

發熱證治

加味四物湯
加味異功散

生化湯

產後發熱多血傷大法四物加炮薑頭疼惡寒外感熱四物柴胡葱白良嘔吐脹悶傷食氣異功查麩厚朴薑脾不化食六君子瘀血腹痛生化湯當歸川芎丹參共桃仁紅花炮乾薑

註 產後發熱多因陰血暴傷陽無所附大法宜

四物湯加炮薑從陰引陽為正治若頭疼惡寒而發熱者屬外感不當作傷寒治惟宜用四物加柴胡葱白服之若嘔吐脹悶屬傷食

若倦怠氣乏者屬傷氣宜用異功散加山查神麩厚朴生薑治之若因脾虛不能化食而停食發熱者宜六君子湯若因瘀血發熱者必兼腹痛宜用生化湯即當歸川芎丹參桃仁紅花薑炭也

六君子湯

異功散

四物湯 方俱見首卷

勞力發熱用十全氣血兩虛八珍痊血脫躁熱補

血效虛陽外越參附煎

註產後發熱因產時用力勞乏者宜十全大補

湯氣血兩虛者八珍湯去血過多血脫煩躁
乾渴面赤而熱者宜當歸補血湯若陰血暴
脫孤陽無附而外越發熱者急進參附湯遲
則必大汗大喘是陽欲亡雖藥必無救矣

十全大補湯

八珍湯

當歸補血湯

方俱見首卷

寒熱總括

寒熱往來遞更換乍寒乍熱時熱寒寒熱似瘧按
時發壯熱憎寒熱畏寒

註產後寒熱名既不同其證亦異當先明辨之

如日寒熱往來者謂寒去熱來熱去寒來遞
相更換也日乍寒乍熱者謂有時寒有時熱
寒熱無定時也日寒熱似瘧者謂或先寒後
熱或先熱後寒一定不移至其時而始作也
日壯熱憎寒者謂其身既壯熱而復時時畏

寒也

往來寒熱陰陽格時熱時寒榮衛乖寒熱似瘧瘵兼食壯熱憎寒帶表推

註

產後血氣虛損陰陽不和則寒熱往來陰陽相乘榮衛不調則時寒時熱敗血不散飲食停滯則寒熱似瘧汗出遇風則壯熱憎寒有諸內自形諸外辨之既明然後治無不愈矣

寒熱證治

往來寒熱陰陽格柴胡四物各半湯榮衛不和乍

寒熱歸芍芎參甘草薑寒熱似瘧瘵兼食生化柴

胡查麩良憎寒壯熱更生散歸地芎參荆穗薑

註

產後陰陽不和往來寒熱者宜柴胡四物湯

若榮衛不調乍寒乍熱者用憎損四物湯其

方卽當歸白芍川芎人參甘草乾薑也若停

痰兼食寒熱似瘧者用生化湯加柴胡山查

神麩若感受風寒憎寒壯熱者宜更生散卽

當歸熟地川芎人參荆芥穗乾薑也

柴胡四物湯

方見首卷

自汗頭汗總括

產後陰虛陽氣盛微微自汗却無妨頭汗陰虛陽上越周身大汗是亡陽

註

產後血去過多則陰虛陰虛則陽盛若微微自汗是榮衛調和故雖汗無妨若周身無汗獨頭汗出者乃陰虛陽氣上越之象也若頭身俱大汗不止則恐有亡陽之慮矣

自汗頭汗證治

當歸六黃湯

黃耆湯

虛熱上蒸頭汗出治用當歸六黃湯黃芩連藥炒黑用歸耆生熟二地黃自汗黃耆湯牡蠣耆朮苓甘麥地防大汗不止陽外脫大劑參附可回陽

註

產後亡血陰虛陽熱上蒸頭上汗出至頸而還者宜當歸六黃湯即黃連黃芩黃蘗當歸黃耆生地熟地也內芩連藥三味俱炒黑用若自汗太甚宜黃耆湯即牡蠣粉黃耆白朮茯苓甘草麥冬熟地防風也若陰血大脫孤

陽外越大汗不止非大劑參附不能回陽也

中風證治

產後中風惟大補火氣風痰末治之十全大補為
主劑臨證詳參佐使宜

註產後氣血大虛雖患中風惟宜大補即有火

熱風痰氣閉亦當末治總以十全大補湯主

之臨證詳參其火氣風痰而佐使之

十全大補湯 方見首卷

瘧病證治

加味八珍湯

新產血虛多汗出易中風邪瘧病成口噤項強身
反折八珍者附桂防風搖頭氣促寒不止兩手撮
空莫望生

註產後血氣不足藏府皆虛多汗出腠理不密

風邪乘虛入遂成瘧證手三陽之筋結於

頷頰風入頷頰則口噤陰陽經絡周環於身

風中經絡則頭項肩背強直如角弓反張之

狀產後患此皆屬虛象惟宜用八珍湯加黃

者附子肉桂大補其陰陽少佐防風以治之
若見頭搖喘促汗出不止兩手撮空者則為
真氣去邪氣獨留必死之候故曰莫望生也

八珍湯

方見首卷

瘵癯抽搐證治

加味八珍湯

陰血去多陽氣熾筋無所養致抽搐發熱惡寒煩
又渴八珍丹地鈞藤鈎抽搐無力戴眼折大汗不
止命將休

註

產後血去太多陽氣熾盛筋無所養必致瘵
癯抽搐發熱惡寒心煩口渴不宜作風治惟
當氣血兼補用八珍湯加丹皮生地鈞藤鈎
治之若無力抽搐戴眼反折大汗不止者則
為不治之證故曰命將休也

八珍湯

方見首卷

不語證治

加味八珍湯

星連二陳湯

七珍散

產後不語分虛實痰熱乘心敗血衝氣血兩虛神鬱胃實少虛多要辨明虛用八珍籐菖志痰熱星連入二陳敗血衝心七珍散芎地辛防殊蒲參

註產後不語須分虛實治之有痰熱乘心者有

敗血衝心者有氣血兩虛而鬱胃神昏者大抵產後屬虛者多而實者少也虛宜八珍湯加釣藤菖蒲遠志痰熱宜二陳湯加膽星黃連敗血冲心宜七珍散即川芎生地細辛防

御纂 風殊砂菖蒲人參也

八珍湯 方見首卷

安訣目錄

二陳湯 方見三卷

茯神散

加味歸脾湯

妄言見鬼發狂證治

妙香散

小調經散

虛煩證治

七珍散

產後不語分虛實以法氣心散血衝氣逆

胃實少虛多哭辨明虛用八珍散

血衝心七珍散

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

血衝心者有氣血逆而

御纂醫宗金鑑卷四十八

編輯婦科心法要訣目錄

驚悸恍惚證治

茯神散

加味歸脾湯

妄言見鬼發狂證治

妙香散

小調經散

虛煩證治

人參當歸湯

當歸補血湯

失笑散

發渴證治

參麥飲

加味四物湯

竹葉歸耆湯

四物湯

欬嗽證治

旋覆花湯

麥味地黄湯

加味佛手散

六味地黄湯

衄血證治

人參澤蘭葉湯

痢證總括

痢疾證治

槐連四物湯

芍藥湯

真人養藏湯

四物湯

十全大補湯

人參敗毒散

香連丸

加味四物湯

四物湯

瘧疾

加味生化湯

加味二陳湯

藿香正氣湯

生化湯

二陳湯

葶勞虛羸總括

葶勞虛羸證治

三合散

六君子湯

八珍湯

十全大補湯

益氣養勞湯

血崩

加味十全大補湯

加味逍遙散

十全大補湯

逍遙散

佛手散

失笑散

大便秘結

小便淋閉

加味四物湯

四物湯

小便頻數不禁淋瀝

黃耆當歸散

加味地黃湯

補中益氣湯

六味地黄湯

大便出血

加味芩連四物湯

芩連四物湯

歸脾湯

補中益氣湯

敗血成癰

大加味生化湯

生化湯

產後虛實宜審

御纂醫宗金鑑卷四十八

編輯婦科心法要訣

驚悸恍惚證治

茯神散

加味歸脾湯

產後血虛心氣弱驚悸恍惚不安寧養心須用茯
神散參耆地芍桂茯神琥珀龍齒歸牛膝蔓思歸
脾砂齒靈

註 產後血虛心氣不守神志怯弱故令驚悸恍

惚不寧也宜用茯神散其方乃人參黃耆熟地白芍桂心茯神琥珀龍齒當歸牛膝也若因憂愁思慮傷心脾者宜歸脾湯加硃砂龍齒治之

歸脾湯

方見首卷

妄言見鬼發狂證治

妙香散

產後譫狂見鬼神敗血冲心小調經心虛悶亂妙香散二茯參耆遠志辰甘桂木麝山藥末歸地

調效若神

註

產後敗血冲心狂亂見鬼譫言妄語者宜服小調經散若因心血虛神不守舍而悶亂者則用妙香散即茯苓茯神人參黃耆遠志辰砂甘草桔梗木香麝香山藥爲散以當歸熟地煎湯調服即愈其效如神

虛煩證治

人參當歸湯

產後血虛煩短氣人參當歸湯最良參麥歸芍熟

地桂瘀血衝心失笑方去血過多煩躁甚須用當歸補血湯

註

產後血虛心煩短氣者宜人參當歸湯即人參麥冬當歸白芍熟地肉桂也若因敗血冲心者宜服失笑散若去血過多煩而躁者乃亡血證也宜當歸補血湯

當歸補血湯

失笑散

方俱見首卷

發渴證治

參麥飲

加味四物湯

竹葉歸耆湯

氣虛津短參麥飲血虛四物粉麥煎渴甚竹葉歸耆效參朮歸耆竹葉甘

註

產後氣虛津液不足而渴者宜參麥飲即人參麥冬五味子也血虛而渴者宜四物湯加花粉麥冬若渴甚不解者用竹葉歸耆湯其方乃人參白朮當歸黃耆竹葉甘草煎服也

四物湯

方見首卷

欬證治

旋覆花湯

麥味地黃湯

加味佛手散

產後欬嗽感風寒旋覆花湯荆穗前麻杏半苓赤芍藥五味甘草棗薑煎虛火上炎冲肺嗽麥味六黃滋化源瘀血入肺佛手散加入桃紅杏貝延詳產後欬嗽若因起動太蚤感冒風寒者用

覆花湯即荆芥穗前胡麻杏黃杏仁半夏茯苓赤芍藥五味子甘草旋覆復棗薑也若因陰虛火炎上燥肺金而嗽者宜六味地黃加麥冬五味子名麥味地黃湯滋其化源若因瘀血上冲入肺而嗽者宜佛手散加桃仁紅花杏仁川貝母延胡索以破其瘀其嗽自愈

六味地黃湯

佛手散

方俱見首卷

衄血證治

人參澤蘭葉湯

產後口鼻黑而衄胃絕肺敗藥難醫參蘭丹膝生熟地童便多冲冀萬一

註產後惡露不下虛火載血上行溢出鼻竅不

循經衄變黑色見於口鼻為熱極反兼水化

故曰胃絕肺敗藥難醫也或用人參澤蘭葉

湯即人參澤蘭葉丹皮牛膝生地熟地煎湯

多冲童便飲之間有得生者然亦希冀於萬

一者耳

痢證總括

產後痢名產子痢飲食生冷暑寒干裏急後重有餘病日久滑脫不足看赤黃稠黏多是熱清澈鴨溇定屬寒寒熱溫清調補澁虛實新久要詳參

註產後痢者名產子痢多因飲食不調貪食生

冷或起居不慎衝寒受暑所致若腹中疴痛

裏急後重者屬有餘之證若日久虛寒滑脫

者屬不足之證痢色黃赤稠黏多屬於熱清

稀澄澈如鴨糞者則屬於寒治之之法熱者

清之寒者溫之冷熱不和者調之虛者補之
實者瀉之虛實新久之間宜細心詳參也

痢疾證治

槐連四物湯

芍藥湯

真人養藏湯

熱痢槐連四物效冷熱有餘芍藥湯芍藥苓連歸
木草枳桂墜枳痛大黃虛寒滑脫參朮桂芍藥訶
蔻廣木香甘草粟殼名養藏日久十全大補良

註

熱者清之故熱痢宜槐連四物湯即四物湯
加槐花黃連以清熱而堅腸也冷熱不和者
調之故宜芍藥湯即白芍藥黃芩黃連當歸
木香甘草肉桂枳榔墜者倍加枳榔痛加生
大黃也若虛寒滑脫則宜溫補而固澁之宜
真人養藏湯即人參白朮白芍藥肉桂肉豆
蔻訶子木香甘草罌粟殼同煎服也若日久
不止氣血大虛宜十全大補湯補之

四物湯

十全大補湯 方俱見首卷

人參敗毒散

香連丸

加味四物湯

有表痢用敗毒散羌獨枳梗共柴前參苓芍草薑
葱引暑濕成痢用香連血滲大腸成血痢四物膠
榆餘鯽添

註

外感風寒成痢者宜人參敗毒散即羌活獨

活枳殼桔梗柴胡前胡人參茯苓川芎甘草

薑葱引也若因暑濕致痢宜香連丸即黃連

木香為丸也若敗血滲入大腸成血痢者宜

四物加阿膠地榆血餘烏鯽魚骨服之

四物湯 方見首卷

瘧疾

加味生化湯

加味二陳湯

藿香正氣湯

產後瘧多因瘀血榮衛不和熱又寒生化湯中加

柴甲痰食二陳查朴添外感不正正氣散陳半夏
木蘇朴甘腹皮桔梗藿香芷引加薑棗一同煎

註

產後患瘧多因瘀血停留榮衛不和故寒熱
往來也宜用生化湯加柴胡鱉甲服之若因
痰飲食積者宜二陳湯加山查厚朴若果外
感風寒方可用藿香正氣散治之其方即陳
皮半夏茯苓白朮蘇葉厚朴甘草大腹皮桔
梗藿香白芷也

一陳湯

方見三卷

蓐勞虛羸總括

產後失調氣血弱風寒外客內停瘀飲食過傷兼
勞怒不足之中挾有餘寒熱往來臍腹痛懶食多
眠頭暈迷骨蒸盜汗痰嗽喘面黃肌瘦力難支蓐
勞先須調脾胃後調榮衛補其虛

註

產後氣血兩虛起居不慎風寒外襲瘀血內
停更或飲食厚味過傷憂勞忿怒乃不足之
中挾有餘之證致生寒熱往來臍腹脹痛懶
進飲食喜眠卧起則頭暈昏迷骨蒸潮熱盜

汗自汗痰喘咳嗽面色萎黃肌肉削瘦氣力
難支名爲蓐勞醫治甚難凡欲療斯疾者必
當先調理其脾胃使飲食強健能勝藥力然
後調其榮衛補其虛損始能痊愈

蓐勞虛羸證治

三合散

扶脾益胃六君子穀化精微氣血強能食漸覺精
神爽調衛和榮三合良八珍去朮小柴共隨證加
減效非常病退虛羸補氣血八珍十補養榮方

註產後蓐勞治法當先扶脾益胃宜六君子湯

加減用之使脾胃強壯能食能消則後天水
穀之氣化生精微氣血自然壯盛精神自然
漸爽然後調其衛氣和其榮血宜三合散卽
八珍湯去白朮加小柴胡湯乃人參柴胡黃
芩半夏甘草也隨證加減治之如寒熱往來
臍腹脹痛則去人參黃芩生地加延胡桃仁
如懶食喜睡頭眩則去柴胡加黃耆縮砂陳
皮如骨蒸盜汗自汗則去川芎柴胡加鱉甲

地骨皮牡蠣如痰喘咳嗽則去人參柴胡加
麥冬川貝母百合如面黃肌瘦乏力則去柴
胡川芎加黃耆倍用人參臨證消息之服後
如諸證已痊惟覺虛羸者則以八珍十全養
榮等方培補之

六君子湯

八珍湯

十全大補湯

益氣養榮湯

方俱見首卷

血崩

加味十全大補湯

加味逍遙散

產後亡血更血崩血脫氣陷病非輕十全大補膠
升續棗仁山萸薑炭尋若因暴怒傷肝氣逍遙梔
地白茅根瘀停少腹多脹痛佛手失笑效如神

註

產後陰血已亡更患崩證則是血脫氣陷其
病非輕當峻補之宜用十全大補湯加阿膠
升麻續斷棗仁山萸炮薑炭以升補其脫陷

可也若因暴怒傷肝血妄行者宜逍遙散加
黑梔生地白茅根以清之若因內有停瘀者
必多小腹脹痛當用佛手散失笑散以補而
逐之

十全大補湯

逍遙散

佛手散

失笑散

方俱見首卷

大便秘結

產後去血亡津液胃燥腸枯大便難飲食如常無
所苦不須妄下損真元量其虛實通利導血旺津
回聽自然

註

產後去血過傷其津液多致胃燥腸枯故令
大便秘結若飲食如常無脹滿之苦者不宜
輕下反傷元氣惟宜量其虛實用諸導法待
血旺津回大便自然順利也

小便淋閉

加味四物湯

產後淋閉腹脹痛熱邪挾血滲胞中四物蒲瞿桃
仁膝滑石甘草木香通

註

產後熱邪挾瘀血流滲胞中多令小便淋閉
宜四物湯加蒲黃瞿麥桃仁牛膝滑石甘草
稍木香木通治之

四物湯

方見首卷

小便頻數不禁淋瀝

黃耆當歸散

加味地黃湯

產後小便數且白腎虛不固自遺尿因產傷胞多
淋瀝頻數補中益氣宜胞傷黃耆當歸治參耆朮
芍草當歸不禁六味加桂附益智蠔蛎補骨脂

註

產後氣虛下陷多令小便頻數而色白腎虛
不固小便自遺因產時穩婆不慎傷其胞脬
多致小便淋瀝氣虛頻數者宜補中益氣湯
升舉之傷胞淋瀝者宜黃耆當歸散補之其
方卽黃耆當歸人參白朮白芍甘草也引用
豬草胞同煮服腎虛遺尿不禁者宜六味地

黃湯加肉桂附子名桂附地黃湯更加益智仁桑螵蛸補骨脂治之

補中益氣湯

六味地黃湯

方俱見首卷

大便出血

加味芩連四物湯

產後便血大腸熱四物芩連酒炒黑地榆阿膠荆穗炒蜜製升麻棕櫚灰脾虛不攝歸脾效氣虛下陷補中宜

註

產後大便出血有因大腸經熱者宜芩連四物湯黃芩黃連俱酒炒黑用更加地榆阿膠荆芥穗微炒蜜製升麻棕櫚皮灰治之若因脾虛不能攝血者宜歸脾湯中氣下陷者補中益氣湯

芩連四物湯

歸脾湯

補中益氣湯

方俱見首卷

敗血成癰

加味生化湯

榮氣不從逆肉理敗血留內發癰疽只用生化加連翹銀花甘草乳沒宜切勿敗毒施過劑致令潰腐必難醫

註

產後氣血兩虛榮氣不從逆于肉理或敗血留內結成癰疽者只宜用生化湯加連翹金銀花甘草節乳香沒藥治之切不可用寒涼敗毒之藥恐潰後肉爛必難醫治

產後虛實宜審

震亨產後惟大補從政莫作不足看二說須合形證脈攻補虛實仔細參

註

朱震亨云產後氣血兩虛惟宜大補雖有他證以未治之張從政云產後慎不可作諸虛不足治之二說各有偏處當合形證脈三者細參方不致誤

產後門彙方

開骨散

當歸

五錢

龜板

三錢

醋炙研

川芎 二錢

婦人髮 一團

水煎服

奪命散

沒藥

血竭 各等分

右研為細末纔產下便用童便細酒各半盃煎一兩沸調下二錢良久再服其惡血自下
行便不衝上免生百疾

清魂散

澤蘭葉

人參 各二錢

川芎 五錢

荊芥穗 一兩

甘草 二錢

右為末用溫酒熱湯各半盃調一錢灌之下

咽眼即開氣定即醒

大巖蜜湯

當歸

熟地

白芍 各二錢

乾薑

肉桂 各一錢

吳茱萸

獨活

遠志 炙

細辛

甘草 各八分

右水煎服

香桂散

當歸

肉桂

川芎 各等分

右為末酒調服

延胡索散

當歸

赤芍

生蒲黃

桂心

桂心

各一錢

細辛

麝香

各五分

右為細末每服五分薑汁溫酒各少許調服

更生散

當歸

生地

川芎

人參 各二錢

荆芥穗

三錢

乾薑

八分

水煎服

當歸六黃湯

當歸

熟地 自製

黃耆 各二錢

生地

黃蘗 炒黑

黃芩 炒黑

黃連 各一錢 炒黑

右水煎服

黃耆湯

黃耆 三錢 炙

牡蠣粉 二錢

白朮 二錢 土炒

茯苓 一錢

麥冬 二錢

熟地 三錢

琥珀

紅花

延胡索 各等分

右以好醋浸一宿焙乾為末每服二錢酒調

起痛散

當歸

官桂

白朮

黃耆

獨活

牛膝

生薑 各五錢

甘草 炙

薤白 各三錢半

桑寄生 五錢

丁香豆蔻散

公丁香

白豆蔻仁

伏龍肝 各等分

右為末生薑湯點服

茹橘飲

竹茹

橘紅 各三錢

乾柿 一枚

水薑煎服

參附湯

人參 一兩

附子 五錢

右作一服薑棗水煎徐徐服

去人參加黃耆名耆附湯

三味參蘓飲

人參 一兩

蘓木 二兩

右以蘓木煎湯冲人參末服

枳朮湯

枳實 二兩

白朮 二兩

水薑煎服

小調中湯

茯苓

當歸

白芍

陳皮

白朮

一錢五分

右作一劑煎湯服

小調經散

白芍

當歸

沒藥

琥珀

防風

一錢

甘草

七分

右加浮小麥一合煎服

七珍散

人參

石菖蒲

生地

川芎

細辛

一錢

防風

辰砂

各五錢
另研

右為細末每服一錢薄荷煎湯調服

茯神散

茯神 一兩 去木

人參

黃耆 炙

赤芍

牛膝

琥珀

龍齒 各一錢五分 研

生地 一兩五錢

桂心 五錢

當歸 二兩

人右為末每服三錢水煎服

妙香散

甘草 五錢 炒

遠志 製去心

山藥 蒸汁炙

茯苓

茯神 去木

黃耆 各一兩 炙

人參

桔梗 各五錢

辰砂 三錢 另研

麝香 二錢 另研

木香 一錢五分

右為細末每服二錢當歸熟地煎湯調下

參麥飲

人參

麥冬

右水煎服

人參當歸湯

人參

當歸

熟地

麥冬

白芍

各二錢

五味子

三分

桂枝

一錢

右剉水煎服

竹葉歸耆湯

人參

白朮

土炒

當歸

黃耆

各二錢

竹葉

二十片

甘草

五分

右剉水煎服

旋覆花湯

旋覆花

赤芍藥

荆芥穗

半夏麴

前胡

甘草

炙

茯苓

五味子

杏仁

去皮尖麩炒

麻黃

各等分

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至七分去滓食前溫服有汗不宜用

人參澤蘭葉湯

人參 五錢

澤蘭葉

丹皮

牛膝 各二錢

生地 三錢

熟地 五錢

藕節五枚煎冲童便服

槐連四物湯

當歸

川芎

赤芍藥

生地

槐花

黃連 各一錢

御米殼 五分
去蒂密炙

右剉水煎服

芍藥湯

芍藥

當歸

黃連

檳榔

木香

甘草

桂

黃芩

右每服半兩水煎如不減加大黃此證又有
因中氣虛弱脾氣鬱結者治當審察

真人養藏湯

人參

白米

白芍藥

肉桂

內苳蔻

訶子

木香

甘草

罌粟殼

各八分

右剉薑棗煎服

人參敗毒散

羌活

獨活

柴胡

前胡

各一錢五分

枳殼

桔梗

人參

茯苓

各一錢

川芎

甘草

五分

右剉薑葱煎服

香連丸

黃連

十二兩

吳茱萸

十兩

去枝梗

右先將二味用熱水拌和入磁器內置熱湯
炖一日同炒至黃連紫黃色去茱萸用連為末

每末四兩八木香末一兩淡醋米飲爲丸
桐子大每服二三十九丸滾湯下久痢中氣下
陷者用補中益氣湯下中氣虛者用四君子
下中氣虛寒者加薑桂

藿香正氣散

藿香 一錢五分

桔梗

大腹皮

紫蘓

茯苓

白朮 炒

白芷

半夏麩

陳皮

厚朴 各一錢

甘草 五分

右剉加薑棗水煎服

三合散

當歸

白芍

茯苓

熟地 各一兩

柴胡

人參 各一兩五錢

黃芩

半夏 製

甘草

各六錢

川芎 一兩

右為粗末每服一兩水一鍾半煎服日三

黃耆當歸散

人參

白朮 土炒

黃耆

當歸

白芍 各三錢

甘草 八分

右剉薑棗水煎服

桂附地黃湯 桂附地黃湯

熟地 四錢

山萸肉

山藥 各二錢

丹皮

澤瀉

茯苓 各一錢五分

附子 製

肉桂 各一錢

右剉水煎服

圓生丹

錦紋大黃 一筋

蘇木 三兩 打碎用河水五

大黑豆 三升

熟去豆不用將殼曬乾其汁留用

紅花 三兩

渣取汁聽用 炒黃色入好酒四碗煎三五滾去

米醋 九筋

陳者佳

將大黃末一筋入淨鍋下米醋三筋文火熬

御製醫宗金鑑 卷四十八
之以長木筋不住手攪之成膏再加醋三觔
熬之又加醋三觔次第加畢然後下黑豆汁
三碗再熬次下藕木汁次下紅花汁熬成大
黃膏取入瓦盆盛之大黃鍋粑亦鏟下入後
藥同磨

人參

當歸

酒洗

川芎

酒洗

香附

醋炒

延胡索

酒炒

蒼朮

米泔浸炒

蒲黃

隔紙炒

茯苓

桃仁

各一兩
去皮尖油

川牛膝

五錢
酒洗

甘草

炙

地榆

酒洗

川羌活

廣橘紅

白芍

各五錢
酒炒

木瓜

青皮

各三錢
去穰炒

乳香

沒藥

各二錢

益母草

三兩

木香

四錢

白朮

三錢
米泔浸炒

烏藥

二兩五錢
去皮

良薑

四錢

馬鞭草

五錢

秋葵子

三錢

行錄醫方不金錄

熟地

一兩酒浸九次
蒸曬如法製就

三稜

五錢
醋浸透紙裹煨

五靈脂

五錢
化焙乾研細

山萸肉

五錢
酒浸蒸搗

右三十味并前黑豆殼共晒為末八石臼內

下大黃膏拌勻再下煉熟蜜一筋共搗千杵

取起為丸每丸重二錢七八分靜室陰乾須

二十餘日不可口晒不可火烘乾後只重二

錢有零鏤蠟護之即蠟丸也用時去蠟殼調

服

