



四十九
五十

7武9
595
34





御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣目錄



乳汁不行證治

加味四物湯

湧泉散

乳汁自湧證治

兔懷散

麥芽煎

御纂醫宗金鑑

卷四十九

目錄



乳癰飲 乳巖妬乳乳懸總括

乳癰證治

消毒飲

加味消毒飲

益氣養榮湯

吹乳證治

栝萸散

外敷法

乳巖證治

十六味流氣飲

青皮甘草散

十全大補湯

八珍湯

歸脾湯

妬乳乳懸證治

鹿角散

連翹散

前創芎歸飲

和集醫書卷之三

目錄

前陰諸證門

陰腫證治

龍膽湯

薰洗法

騰熨法

陰痛證治

加味道遙散

乳香四物敷法

道遙散

四物湯

陰癢證治

桃仁雄黃膏

道遙散

龍膽瀉肝湯

陰挺證治

蛇床洗法

藜蘆敷法

道遙散

龍膽瀉肝湯

陰瘡證治

加味四物湯

四物湯

加味逍遙散

補中益氣湯

陰痔證治

烏頭薰去

逍遙散

歸脾湯

補中益氣湯

陰冷證治

溫中坐藥

桂附地黃丸

陰吹證治

膏髮煎

十全大補湯

交接出血證治

加味歸脾湯

桂心金墨散

雜證門

熱入血室

加味小柴胡湯

刺期門法

清熱行血湯

血分水分總括

血分證治

加味小調經散

水分證治

茯苓導水丸

夢與鬼交證治

加味歸脾湯

歸脾湯

梅核氣證治

半夏厚樸湯

血風瘡證治

加味逍遙散

益氣養榮湯

廉瘡證治

桂附地黄丸

人參敗毒散

補中益氣湯

六味地黄丸

足跟痛證治

大味地黄丸

八珍湯

御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣

乳證門

乳汁不行證治

加味四物湯

產後血虛乳汁少四物花粉不留行木通豬蹄湯

熬服葱白煎湯乳房淋

產後乳汁不行因去血過多血少不行者宜

四物湯加花粉王不留行木通豬蹄熬湯煎

藥服外用葱白煎湯時時淋洗乳房以通其氣

湧泉散

氣喘壅塞乳脹痛湧泉散用白丁香王不留行天

花粉漏蘆蘊蠶豬蹄湯

註

產後乳汁不行因瘀血停留氣喘壅滯者其乳必脹痛宜用湧泉散即白丁香王不留行

花粉漏蘆蘊蠶豬蹄湯煎服也

乳汁自湧證治

兔懷散

麥芽煎

產後乳汁暴湧出十全大補倍參者食少乳多欲

迴乳兔懷紅花歸芎膝無兒食乳乳欲斷炒麥芽

湯頻服宜

註

產後乳汁暴湧不止者乃氣血大虛宜十全大補湯倍用人參黃耆若食少乳多欲迴其

乳者宜兔懷散即紅花歸尾赤芍牛膝也若

無兒食乳欲斷乳者用麥芽炒熟熬湯作茶

飲之

乳證總括

乳房忽然紅腫痛往來寒熱乳癰成乳被兒吹因
結核堅硬不通吹乳名初起結核不腫痛年深內
潰乳巖凶乳頭生瘡名妬乳細長垂痛乳懸稱

註

婦人乳房忽然紅腫堅硬疼痛增寒壯熱頭
痛者此欲成乳癰也若乳兒之時乳被兒口
中氣吹以致乳管不通結核者名曰吹乳更
有乳內結核如圍棋子不腫不痛但堅硬不

散日久內潰者謂之乳巖其證甚凶若乳頭
生小細瘡痛者為妬乳若瘀血上攻乳房忽
然細小下垂長過於腹此名乳懸惟產後有
之

乳癰證治

消毒飲

乳癰初起消毒飲青芷歸柴浙貝蠶花粉良花甘
草節寒熱荆防羌獨添膿成皂刺穿山甲潰後益
氣養榮煎

註乳癰乃陽明厥陰二經風熱壅盛初起宜服
 消毒飲即青皮白芷當歸柴胡浙貝母僵蠶
 花粉金銀花甘草節也若兼曾寒壯熱者加
 荆芥防風羌活獨活以解散之若服後不消
 其膿已成者宜加皂角刺穿山甲以穿發之
 若潰後氣血虛者宜益氣養榮湯培補之他
 如潰久膿清不斂又須急服大劑參耆桂附
 矣

益氣養榮湯

方見前首卷彙方內

吹乳證治

栝萸散

外敷法

吹乳結核栝萸散乳沒歸甘用酒熬更加皂刺名

立效已成膿潰未成消外敷星夏蠶芷刺草烏為

末蜜葱調

註吹乳結核不散者當早消之久則成癰宜用

栝萸散即栝萸實乳香沒藥當歸甘草酒熬

服也若服後不散者加皂角刺名立效散膿

成者潰未成者消外用南星半夏僵蠶白芷
皂角刺草烏為末用葱汁合蜜調敷

乳巖證治

十六味流氣飲

青皮甘草散

乳巖鬱怒損肝脾流氣飲歸芍參耆芎防蘇芷枳
桔草檳榔烏樸桂通隨外熨木香生地餅青皮甘
草服無時潰後不愈須培補十全八珍或歸脾

註乳巖之證初起結核如圍棋子大不痛不癢

五七年或十餘年從內潰破嵌空玲瓏洞窟
深陷有如山巖故名乳巖皆緣抑鬱不舒或
性急多怒傷損肝脾所致宜速服十六味流
氣飲其方即當歸白芍人參黃耆川芎防風
蘇葉白芷枳殼桔梗甘草檳榔烏藥厚樸官
桂本通外以木香生地搗餅以熱器熨之且
不時以青皮甘草為末煎濃薑湯調服戒七
情遠葷味解開鬱怒方始能愈若潰後久不
愈惟宜培補其氣血或十全大補湯八珍湯

歸脾湯選用之

十全大補湯

八珍湯

歸脾湯

方俱見首卷

妬乳乳懸證治

鹿角散

連翹散

妬乳甘草鹿角散雞子黃調炙敷之連翹散防升

元芍欽射消黃甘杏宜淤血上攻乳懸證芎歸湯

飲更薰鼻不應草麻貼頂上乳收即去莫遲遲

計

乳頭生瘡謂之妬乳宜鹿角散敷之即鹿角

甘草為末雞子黃調銅器內炙敷之內服連

翹散即防風升麻元參白芍白欽射干芒消

散大黃甘草杏仁也若產後瘀血上攻兩乳細

長下垂過腹者謂之乳懸宜濃煎芎歸湯不

時飲之以其餘藥薰鼻則瘀散乳即上升如

不上者更以草麻仁搗貼頂心收即去之

芎歸飲

即佛手散方見首卷

乳證門彙方

消毒飲

青皮

白芷

當歸

柴胡

浙貝母

僵蠶

花粉

金銀花

甘草節

各等分

右剉水煎服

栝蒌散

栝蒌

乳香

沒藥

當歸

甘草

各等分

青史右為末酒煎服

加皂角刺各立効散

十六味流氣飲

當歸

白芍

人參

黃耆

各二錢

川芎

防風

蘇葉

白芷

枳殼

桔梗

各一錢

甘草

檳榔

各五分

烏藥

厚樸

官桂

木通

各八分

右剉每服五錢水煎服

青皮甘草散

青皮

甘草

各一錢

右為末煎濃葶湯調服

鹿角散

鹿角

甘草

各等分

右為末雞子黃調銅器內炙敷之

連翹散

防風

元參

各二錢

白欬

芒消

大黃

射干

各一錢

升麻

白芍

一錢

甘草

杏仁

二十粒

右剉薑水煎服

加味四物湯水煎服

當歸

白芍

熟地

川芎

花粉

王不留行

木通 各二錢

右豬散煎湯煎藥服

湧泉散

白丁香末 煨干 王不留行

花粉

各一錢

右豬蹄湯煎服

免懷散

紅花

赤芍

歸尾

牛膝 各二錢

右剉水煎服

麥芽煎

麥芽

三兩

右一味水煎作茶飲

前陰諸證門
 陰腫證治
 龍膽瀉肝湯
 薰洗法
 騰熨法
 婦人疝疔兩拘痛玉門腫脹墜而疼濕熱龍膽瀉
 肝治導赤車前澤瀉芩當歸梔子龍膽草氣虛下
 陷補中升艾防大戟熬湯洗枳實陳皮炒熱騰
 註 婦人子戶腫脹墜痛及兩拘疼痛者謂之疝

前陰諸證門
 陰腫證治
 龍膽瀉肝湯
 薰洗法
 騰熨法
 婦人疝疔兩拘痛玉門腫脹墜而疼濕熱龍膽瀉
 肝治導赤車前澤瀉芩當歸梔子龍膽草氣虛下
 陷補中升艾防大戟熬湯洗枳實陳皮炒熱騰
 註 婦人子戶腫脹墜痛及兩拘疼痛者謂之疝

疝乃肝心二經火盛濕熱下流以致宜服龍
 膽瀉肝湯其方即導赤散生地木通甘草再
 加車前子澤瀉黃芩當歸黑梔子龍膽草也
 若因中氣素虛下陷重墜者用補中益氣湯
 以升舉之外用蘄艾防風大戟熬湯薰洗更
 以枳實陳皮二味為末炒熱騰之其腫自消
 而痛自定也

陰痛證治

加味逍遙散

乳香四物敷法

陰中痛名小戶嫁痛極手足不能舒內服加味逍
 遙散四物乳香搗餅敷

註 婦人陰中作痛名小戶嫁痛痛極往往手足

不能伸舒由鬱熱傷損肝脾濕熱下注所致
 宜內服逍遙散加丹皮梔子外以四物湯料
 合乳香搗餅納陰中其痛即定

逍遙散

四物湯

俱見首卷

陰癢證治

桃仁雄黃膏

濕熱生蟲陰戶癢內服逍遙龍膽方桃仁膏合雄黃末雞肝切片納中央

註

婦人陰癢多因濕熱生蟲甚則肢體倦怠小便淋漓宜服逍遙散龍膽瀉肝湯外以桃仁

研膏合雄黃末雞肝切片蘸藥納戶中其蟲

愈中一聞肝腥皆鑽肝內吮食將肝提出其病即

愈

逍遙散

方見首卷

龍膽瀉肝湯

方見前陰腫條

陰挺證治

蛇床洗法

藜蘆敷法

陰挺下脫即癩疔突物如蛇或如菌濕熱腫痛溺赤數氣虛重墜便長清氣虛補中青梔入濕熱龍膽瀉肝尋外熬蛇床烏梅洗豬油藜蘆敷自升

註 婦人陰挺或因胞絡傷損或因分娩用力太

過或因氣虛下陷濕熱下注陰中突出一物
如蛇或如菌如雞冠者卽古之癩疝類也屬
熱者必腫痛小便赤數宜龍膽瀉肝湯屬虛
者必重墜小便清長宜補中益氣湯加青皮
梔子外用蛇床子烏梅熬水薰洗之更以豬
油調藜蘆末敷之無不愈者

逍遙散

方見首卷

龍膽瀉肝湯

方見前
陰腫條

陰瘡證治

加味四物湯

鼠蝕成瘡濃水淋時疼時癢若蟲行少腹脹悶溺
赤溇食少體倦晡熱蒸四物柴梔丹膽草瀆腐逍
遙墜補中

註

婦人陰瘡名曰匿由七情鬱火傷損肝脾氣
血凝滯濕熱下注久而蟲生蟲蝕成瘡濃水
淋漓時疼時癢有若蟲行少腹脹悶溺赤頻
數食少體倦內熱晡熱經候不調赤白帶下
種種證見宜分治之腫痛者用四物湯加柴

胡梔子龍膽草若潰爛出水而痛者用加味

逍遙散若重墜者用補中益氣湯

加味逍遙散 方見前
陰痛條

四物湯

補中益氣湯 方俱見首卷

陰痔證治

烏頭薰法

陰中突內名陰痔或名茄子疾俗稱黃水易治白
難治烏頭存性醋熬薰內服逍遙與龍膽補中歸

脾酌量行

註 婦人陰中有肉突出者名曰陰痔俗稱茄子

疾也流黃水者易治流白水者難治用烏頭

燒存性醋熬薰內服逍遙散補中益氣湯

歸脾湯量其虛實酌而行之

逍遙散

歸脾湯

補中益氣湯 方俱見首卷

陰冷證治

溫中坐藥

陰冷風寒客子臟桂附地黄丸最宜遠志乾薑蛇床子吳萸為末裏納之

註 婦人陰冷皆由風寒乘虛客於子臟久之血

凝氣滯多變他證且艱於受孕宜多服桂附

地黄丸外以遠志乾薑蛇床子吳萸萸研細

綿裹納陰中日二易

桂附地黄丸 方見首卷

陰吹證治

膏髮煎

胃氣下泄陰吹喧金匱方用膏髮煎豬膏亂髮同煎服導從溺去法通元氣虛下陷大補治升提下

陷升柴添

註 婦人陰吹者陰中時時氣出有聲如穀道轉

矢氣狀金匱謂由穀氣實胃氣下泄用膏髮

煎即豬膏煎亂髮服也導病從小便而出其

法甚奧若氣血大虛中氣下陷者宜十全大

補湯加升麻柴胡以升提之

十全大補湯 方見首卷

交接出血證治

加味歸脾湯

桂心金墨散

交接出血傷心脾伏龍肝末入歸脾千金桂心金底墨酒服方寸七相宜

註 婦人每交接輒出血者由傷損心脾二經也

宜用歸脾湯加伏龍肝煎服或用千金方中桂心金底墨二味為末酒沖服方寸七自愈

前陰諸證門彙方

龍膽瀉肝湯

生地 二錢

木通

車前子 各一錢五分

澤瀉

黃芩 各二錢

當歸 二錢

黑梔仁

龍膽草 各一錢

生甘草 五分

大石燈草一團水煎服

洗方

防風 三錢 蕪艾 一團

大戟 一錢

右熬湯薰洗

騰方

枳實 廣皮 各等分

右為末炒熱騰之

敷方

四物湯 一料 乳香 一錢

右搗餅納戶中其痛即定

桃仁雄黃膏

桃仁 五錢 研膏 雄黃 三錢 末

右二味研勻用雞肫肝切片蘸藥納戶中其

蟲即鑽入肝而癢自止

陰挺洗法

蛇床子 五錢 烏梅 九枚

右二味熬湯乘熱薰洗

敷方

藜蘆 為末

右用豬脂油調敷自收

陰痔薰法

烏頭

右用醞醋熬薰自消

溫中坐藥方

遠志

乾薑

吳茱萸

蛇床子

各等分

右為末綿裹納戶內一日二次換

膏髮煎

婦人亂髮

一團

右用豬膏熬化服之小便利則愈

桂心金墨散

柴胡湯

桂心 室經通斷邪 釜底墨

各等分

瘡狀 右三味為末酒服方寸匕

註

金匱云婦人中風七八日續來寒熱發作有

時經水適斷此為熱入血室其血必結故使

如瘡狀發作有時小柴胡湯主之此言邪結

未盡直經來脈虛人於血室之間而醫之

陰痔薰法

烏頭

右用鹽醋熬薰自消

溫中可二劫為末酌服寸寸

卦心

釜煎墨

各等分

卦心釜墨醋

本用蘇膏蒸外煎之小野匪限愈

散人崩漏

一團

雜證門

熱入血室

加味小柴胡湯

熱入血室經適斷邪熱乘虛血室潛寒熱有時如

瘧狀小柴胡加歸地丹

註

金匱云婦人中風七八日續來寒熱發作有

時經水適斷此為熱入血室其血必結故使

如瘧狀發作有時小柴胡湯主之此言邪熱

未盡值經來乘虛入於血室之間而潛藏之

故令血結而寒熱有時如瘧狀也血室肝主
之肝與膽為表裏膽因肝受邪而病寒熱故
用小柴胡湯主之也加當歸生地丹皮者所
以清血分之熱也

小柴胡湯

方見首卷柴胡
四物湯註中

熱入血室經適來晝日明了夜譫妄無犯胃氣上
二焦熱隨血去自無恙

註

金匱云婦人傷寒發熱經水適來晝日明了
夜則譫語如見鬼狀此為熱入血室治之無

犯胃氣及上二焦必自愈也此言熱雖入於
血室然經行不斷則熱不留結勿謂譫妄遂
以消黃犯其胃氣刺傷榮血小柴和解犯上
二焦但俟其熱隨血去病必自愈傷寒論曰
血自下下者愈此之謂也

刺期門法

清熱行血湯

熱入血室成結胸下血譫語頭汗出二者皆當刺
期門隨其實取泄而去清熱行血桃紅丹靈脂地

草穿山赤

註

金匱云婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身涼胸脇滿如結胸狀謔語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而取之又云陽明病下血謔語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實而瀉之濺然汗出者愈此二條一言適來即斷血結在裏為實證一言陽明病亦有熱入血室但下血頭汗出為不同故為熱入血室亦由肝實故均

謂當刺期門也不能刺者以清熱行血湯治之其方即桃仁紅花丹皮五靈脂生地甘草穿山甲赤芍也合四證觀之大抵有寒熱如瘧之證方可用小柴胡否則或不藥自愈或刺期門而清熱行血以隨其實而瀉之此仲景心法也不得概以小柴胡治之也

血分水分總括

經水先閉後病腫任衝寒濕血壅經先發水腫後經閉水溢皮膚泛濫行血分難醫水易治二者詳

參要辨明

註

婦人經水先閉後病腫者乃寒濕傷於衝任

血壅經隧也名曰血分若先病腫而後經閉

者乃土不制水水邪泛濫溢於皮膚也名曰

水分血分難治水分易治二者須當詳辨

血分證治

加味小調經散

血分血壅不能行四肢浮腫病非輕但使經通腫

自散紅丹膝入小調經

註

血分腫乃血壅不行流於四肢故令浮腫此

不必治腫但調其經經通其腫自消宜小調

經散加紅花丹皮牛膝治之

小調經散

方見三卷浮腫

水分證治

先腫後閉名水分停飲膀胱氣不行水消腫退經

自至茯苓導水效通神

註

水分腫乃水飲內停膀胱之氣化不行水溢

皮膚故令浮腫經閉也此但宜治水水消腫

退其經自通用茯苓導水丸治之

茯苓導水湯

方見胎前門子腫條

夢與鬼交證治

加味歸脾湯

獨笑獨悲畏見人神虛夜夢鬼邪侵歸脾湯調辰砂珀定志清心魂魄寧

註

婦人七情內傷虧損心脾神無所護鬼邪干

正魂魄不寧故夜夢鬼交獨笑獨悲如有對忤是其候也宜用歸脾湯調辰砂琥珀末服

之則志定心清魂魄安而無邪夢矣

歸脾湯

方見首卷

梅核氣證治

半夏厚樸湯

婦人咽中如炙轡或如梅核結咽間半夏厚樸湯最效半樸蘇茯苓引煎

註

千金方云咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞

之不下即所謂咽中如有炙轡也俗名梅核氣蓋因內傷七情外傷寒冷所致宜用金匱

半夏厚樸湯主之即半夏厚樸蘇葉茯苓生薑煎也

血風瘡證治

加味道遙散

遍身痞癩如丹毒癢痛無時搔作瘡血風風濕兼血燥加味道遙連地方愈後白屑肌膚強血虛不潤養榮湯

註婦人血風瘡證遍身起痞癩如丹毒狀或癢

或痛搔之則成瘡由風濕血燥所致宜用加

味道遙散加黃連生地如瘡結痂而愈復起

白屑肌膚強硬者乃血少不潤也宜服益氣

養榮湯

加味道遙散方見前陰痛條

益氣養榮湯方見首卷

賺瘡證治

桂附地黄丸

憂思鬱怒肝脾損濕熱生瘡長兩賺外屬三陽為易治內屬三陰治每難初起紅腫敗毒散濃水淋

補中煎 補熱陰虛宜六味食少畏寒桂附丸

註 婦人憂思鬱怒傷損肝脾或飲食不調損其

胃氣則濕熱下注更被寒濕外邪所客則必

兩膝生瘡外膝足三陽經尚屬易治若生於

內膝屬足三陰經每多難愈初起紅腫宜人

參敗毒散潰後濃水淋漓宜補中益氣湯若

更補熱是為陰虧宜兼服六味地黃丸若食

少體倦畏寒則為真陽不足宜服桂附地黃

丸即六味地黃丸加肉桂附子也

人參敗毒散

方見產後痢條

補中益氣湯

方見首卷血崩條

六味地黃丸

方見首卷

足跟痛證治

督脈發源腎經過三陰虛熱足跟疼六味地黃丸

真水腫潰流膿用八珍

註 足跟乃督脈發源之地足少陰腎經從此所

過若三陰虛熱則足跟疼痛宜用大劑六味

地黃丸料煎服以峻補其真水若痛久不愈

腫潰流膿者宜服八珍湯以大補其氣血

雜證門彙方

半夏厚樸湯

半夏

厚樸

蘇葉

茯苓

各二錢

右生薑煎服

清熱行血湯

桃仁

紅花

一錢

一錢

丹皮

五靈脂

生地

各二錢

甘草

五分

穿山甲

雜病心法

赤芍

各一錢

四診右水煎服

八珍湯

方見首卷

察色

聽聲

審病

切脈

虎口三關脈紋圖

腫潰流膿者宜用八珍湯以養其血

雜證門彙方

厚樸湯

半夏

厚樸

蘇葉

茯苓

八珍湯

大良首卷

水煎服

突山甲

赤芍

生肌

各二錢

甘草

五分

御纂醫宗金鑑卷五十

編輯幼科雜病心法要訣目錄

四診總括

面圖

察色

聽聲

審病

切脈

虎口三關脈紋圖

虎口三關部位脈紋形色

初生門 上

拭口

甘草法

黃連法

硃蜜法

豆豉法

斷臍

胡粉散

烙臍餅子

浴兒

藏胎衣法

剃頭

不啼

鞭背法

熏臍帶法

不乳

一捻金

勻氣散

理中湯

眼不開

生地黄湯

熊膽洗法

吐不止

蘇一捻金

香蘇飲

黃連二陳湯

理中湯

不小便

導赤散

八正散

豆豉膏

不大便

殊蜜法

一捻金

大小便不通

木通散

紫霜丸

肛門內合

黑白散

蘇合香丸

噤口

龍膽湯

紫霜丸

秘方擦牙散

辰砂全蠍散

勻氣散

撮口

辰砂疆蠶散

紫霜丸

龍膽湯

撮風散

臍濕臍瘡

滲臍散

金黃散

臍突

犀角消毒飲

二豆散

臍風

驅風散

黑白散

理中湯

辰砂靈犀散

龍膽湯

益脾散

撮風散

天鈞

九龍控涎散

牛黃散

鈞籐飲

蘇合香丸

內鈞

鈞藤飲

木香丸

養藏散

盤腸氣痛

白豆蔻散

熨臍法

御纂醫宗金鑑卷五十一

編輯幼科雜病心法要訣

四診總括

兒科自古最為難毫釐之差千里愆氣血未充難據脈神識未發不知言惟憑面色識因病再向三關診熱寒聽聲審病兼切脈表裏虛實隨證參

註

兒科一道自古為難蓋以小兒形質柔脆易虛易實調治少乖則毫釐之失遂致千里之謬氣血未充者氣血尚未充盈也難據脈者

脈無定準不可祇以脈為主也神識未發者
茫然無知識也不知言者不能言其疾苦也
診小兒之病惟憑察面部形色識其因何而
生也三關者手虎口處風氣命三關也當視
脈紋形色以診其屬熱屬寒也聽聲者聽其
五聲所主之病也審病者審其安煩苦欲飲
食二便也切脈者切脈之浮沉遲數滑澀大
小有力無力也醫者誠能以四診參合表裏
虛實寒熱之病則可保萬全也

面部諸部圖



面部五臟部位圖



察色

欲識小兒百病原先從面部色詳觀五部五色應
 五藏誠中形外理昭然額心頰腎鼻脾位右腮屬
 肺左屬肝青肝赤心黃脾色白爲肺色黑腎顏青
 主驚風赤火熱黃傷脾食白虛寒黑色主痛多惡
 候明顯濁晦輕重叅部色相生爲病順部色相尅
 病多難相生實者邪助病相尅虛者正難堪天庭
 青暗驚風至紅主內熱黑難痊太陽青驚入耳惡
 印堂青色驚瀉纏風氣青驚紫吐逆兩眉青吉紅

熱煩鼻赤脾熱黑則死唇赤脾熱白脾寒左腮赤
色肝經熱右腮發赤肺熱痰承漿青驚黃嘔吐黑
主抽搐病纏綿此是察色之大要還將衄證一同
參

註

小兒之病先從面部氣色觀之詳察五部之
色則五藏之病自昭然可見矣五部者額屬
心額屬腎鼻屬脾左腮屬肝右腮屬肺也五
色者青爲肝色赤爲心色黃爲脾色白爲肺
色黑爲腎色也如面青主是驚風之證面赤

主火熱面黃主傷脾傷食面白主虛寒面黑
主痛多是惡候總之五色明顯爲新病其證
輕濁晦爲久病其證重部色相生爲順者如
脾病色黃此正色也若見紅色乃火能生土
故爲順也若見青色乃木來尅土故爲逆也
餘病倣此若氣血充實又遇部色相生縱有
外邪助病亦易爲治療若久病氣血虛弱又
遇部色相尅則正氣不支每難治療如天庭
青暗主驚風紅主內熱黑則不治太陽青主

驚風青色入耳者死印堂青主驚瀉風池在
眉下氣池在眼下二處青主驚風紫多吐逆
兩眉青主吉紅色主多煩熱鼻赤主脾熱鼻
黑則死唇赤主脾熱白主脾寒左腮發赤主
肝經有熱右腮發赤主肺熱痰盛承漿青主
驚黃主吐黑主抽搐此皆察色之大要再以
脈證參之庶治得其要矣

聽聲

診兒之法聽五聲聆音察理始能明五聲相應五
藏病五聲不和五藏情心病聲急多言笑肺病聲
悲音不清肝病聲呼多狂叫脾病聲歌音顫輕腎
病聲呻長且細五音昭著證分明啼而不哭知腹
痛哭而不啼將作驚噉煎不安心煩熱嘔聲聲重
感寒風有餘聲雄多壯厲不足聲短怯而輕多言
體熱陽府證懶語身冷陰藏形狂言焦躁邪熱盛
譫語神昏病熱凶鴨聲在喉音不出直聲無淚命
將傾虛實寒熱從聲別聞而知之無遁情
註小兒之病既觀其色又當細聽其聲蓋笑呼

歌悲呻五聲內應心肝脾肺腎五藏也五聲不和則知五藏有病之情矣如心屬火病則聲急喜笑肺屬金病則聲悲音濁肝屬木病則聲狂叫多呼脾屬土病則聲顛輕如歌腎屬水病則其聲長細如呻吟有聲有淚聲長曰哭有聲無淚聲短曰啼如啼而不哭則氣不伸暢主腹痛哭而不啼則氣急心煩將成驚也啞煎不安者乃心經內熱故煩躁不寧也啞聲音啞也聲重聲濁也此爲外感風寒也有餘之證其氣實故聲雄大而壯厲不足之證其氣虛故聲怯弱而輕短多言與身熱皆陽也陽主府故曰陽府證也懶語與身涼皆陰也陰主藏故曰陰藏證也狂言焦躁者邪熱盛也神昏譫語者熱乘於心故曰病熱凶也鴨聲聲在喉中而啞氣將絕也直聲聲無回轉而急氣將散也二者俱爲不治之證醫者果能以此察之則知表裏藏府寒熱虛實諸病之情態無所遁矣

審病

審兒之病貴詳參要在安煩苦欲間能食不食渴不渴二便調和通秘勘發熱無汗爲表病內熱便鞭作裏看安煩晝夜陰陽證苦欲冷暖定熱寒能食不食胃壯弱渴與不渴胃濕乾便稠黏穢爲滯熱尿清不赤乃寒占耳尻肢涼知痘疹指梢發冷主驚癇肚腹熱悶乃內熱四肢厥冷是中寒眉皴曲啼腹作痛風熱來臨耳熱纏腹痛須按軟與鞭喜按不喜虛實參欲保赤子誠心辨對證施方治

不難

註

小兒有病貴乎詳審先問起居安煩苦欲何如次問飲食能食不食渴與不渴又次問二便或通或秘而後病源可識矣如發熱無汗此邪在表也內熱便鞭此邪在裏也安煩者謂晝若煩熱而夜安靜是陽旺於陽分其病在陽若夜煩熱而晝安靜是陽陷於陰分其病在陰苦欲者喜冷惡熱皆屬陽病故爲熱也喜熱惡冷皆屬陰病故爲寒也胃壯者能

食胃弱者不能食胃乾燥者口渴胃濕盛者口不渴至於大便稠黏穢氣難聞者是內有滯熱從熱化也小便清白不赤爲虛寒從寒化也若耳梢冷尻骨冷四肢發冷者此痘疹欲發之候如單指梢發冷者此驚癇將作之徵肚腹熱悶主內熱手足厥冷主中寒小兒無故皺眉曲腰啼叫者主內因腹痛也兩耳常常發熱者主外因風熱也然腹痛又當按其或軟與硬若喜按者爲虛不喜按者爲實保赤者須誠心勘問對證施治庶隨手奏效矣

切脈

小兒週歲當切脈位小一指定三關浮脈輕取皮膚得沉脈重取筋骨間一息六至平和脈過則爲數減遲傳滑脈如珠多流利瀉脈滯瀉往來艱三部無力爲虛脈三部有力作實言中取無力爲芤脈微脈微細有無間洪脈來盛去無力數緩時止促結占緊脈左右如轉索弦則端直張弓弦浮爲


在表外感病沉為在裏內傷端數為在府屬陽熱
遲為在藏乃陰寒滑痰洪火微怯弱弦飲結聚促
驚癇芤主失血瀉血少沉緊腹痛浮感寒虛主諸
虛不足病實主諸實有餘看痘疹欲發脈洪緊大
小不勻中惡勘一息三至虛寒極九至十至熱極
炎一二十一十二死浮散無根沉伏難表裏陰陽
虛實診惟在兒科隨證參

註 週歲者一歲也有疾則當切脈但部位甚小
不能以三指診之須用一指以定三關一關


者寸關尺也浮脈者輕取皮膚之上即得故
曰浮也沉脈者重按筋骨之間則見故曰沉
也一息者人之一呼一吸也至者脈之至數
也一息六至為和平之脈則曰無疾至數若
過者七至八至也謂之數脈至數若減者四
至五至也謂之遲脈滑脈如珠往來流利瀉
脈滯澁往來艱難三部者脈之浮中沉也浮
中沉三部無力為虛浮中沉三部有力為實
芤脈者中取無力微脈者按之微細若有若

無洪脈者來時雖盛去時無力促脈者數而時止結脈者緩而時止緊脈者左右如轉索之象弦脈者端直如張弓弦此皆言脈之形象至數也浮脈病在表外感風寒也沉脈病在裏內傷飲食也數脈病在六府屬陽也遲脈病在五藏屬陰也滑主痰盛洪主火熱微主怯弱之證弦主停飲結主積聚促主驚癇芤主失血瀦主血少沉緊主腹痛浮緊主感寒虛爲不足主諸虛實爲有餘主諸實洪緊者痘疹欲發也大小不勻者中惡之證也一息三至是虛寒之極九至十至乃火熱太甚此諸脈所主之病也若一息只一至二至或十一十二至者皆死脈也浮散無根及沉浮取之不應指者皆難治之脈也凡病之陰陽表裏虛實雖可以診脈而得惟臨證時合望聞問三者細爲參考焉

形左向斜紋




形右向斜紋




形裏反弓




形外反弓



形蟲如曲三



形字乙



形字水



形鈎如曲二



形指射關透




形針




形甲射關透



形鎗




環形




曲蟲形



魚骨形



亂蟲形



虎口三關部位脈紋形色

初生小兒診虎口男從左手女右看次指三節風
 氣命脈紋形色隱隱安形見色變知有病紫屬內
 熱紅傷寒黃主脾病黑中惡青主驚風白是疳風
 關病輕氣關重命關若見病多難大小曲紫傷滯
 熱曲青人驚走獸占赤色水火飛禽撲黃色雷驚
 黑陰癩長珠傷食流珠熱去蛇吐瀉來蛇疳弓裏
 感冒外痰熱左斜傷風右斜寒鍼形鎗形主痰熱
 射指射甲命難全紋見乙字為抽搐二曲如鈎傷

冷傳三曲如蟲傷硬物水紋咳嗽吐瀉環積滯曲
蟲驚魚骨形似亂蟲有蚶纏蚶紋形色相參合醫
者留神仔細觀

註

凡初生小兒有疾病者須視虎口叉手處蚶

紋之形色以決病之生死輕重男先看左手

次指內側女先看右手次指內側指之三節

初節曰風關次節曰氣關三節曰命關其紋

色紅黃相兼隱隱不見則爲平安無病若紋

色紫屬內熱紅屬傷寒黃爲傷脾黑爲中惡

青主驚風白主疳證紋在風關主病輕氣關

主病重若過命關主病危難治又當視其紋

形大小曲灣色紫者主傷食內熱色青者主

人驚及走獸驚色赤者主水火飛禽所驚黃

主雷驚黑主陰癘如指上紋形一點紅色名

曰流珠紋主內熱圓長者名曰長珠形主飲

食傷上尖長下微大者名曰去蛇形主傷食

吐瀉上大下尖長者名曰來蛇形主濕熱成

疳弓反裏者形灣向中指主感冒寒邪弓反

外者形灣向大指主內熱痰盛紋斜向左者
其紋斜向中指主傷風紋斜向右者其紋斜
向大指主感寒鍼形者直若懸鍼微短鎗形
者直射如鎗微長皆主痰熱透關射指射甲
者其紋直射指甲指端主脾氣大敗病危不
起二者俱屬不治乙字紋似乙字主驚風抽
搐二曲如鈎主傷生冷三曲如蟲主傷硬物
水紋形似水字主咳嗽環形聯絡如環主疳
病曲蟲紋如灣主積滯魚骨紋如魚刺主

初生門 上

拭口 附下胎毒法

拭口須用燕脂法穢淨方無口病生古云未啼先
取穢只緣未察此中情

註

嬰兒初生須用軟棉裹指拭淨口中不潔繼
以燕脂蘸茶清擦口舌齒頰之間則不使一
切口病生矣古云子未啼時先取穢血此古
人不詳體察蓋兒在胞衣之中以臍蒂資生
胞中皆是氤氳精氣生長蒸化並無血脈兒

口之血從何而來此說不經不可為訓也

甘草法

甘草之法自古稱能解諸毒性味平濃煎頻令兒吮服免使胎毒蘊腹中

註

甘草味甘平和五藏解百毒之藥也四時皆可用虛實皆可服取中指一節用水煎濃以棉纏指蘸水令兒吮之其毒自解

黃連法

素稟胎熱蘊於中惟有黃連法最靈水浸濃汁滴

內驚熱紋形如亂蟲者主蛔蟲纏擾習幼科者

必以此形色合參留神診察始不悞矣時看

兒有胎熱者恐熱蘊於中致生他病故宜用

之須取黃連數塊搥碎用湯浸出汁時時滴

兒口中以臍糞下為度其毒自解矣

硃蜜法

硃蜜鎮神利腸胃清熱防驚大有功胎熱便秘皆

堪用稟賦怯弱慎而行

註末少與之已昏來止余下筆管屏屏問易也

甘草法

甘草之法自古稱能解諸毒其性味甘平能解百毒之藥也四時皆
吮服免使胎毒蘊腹中

甘草味甘平和五臟解百毒之藥也四時皆

可用虛實皆可服取中指一節用水煎濃以

棉纏指蘸水令兒吮之其毒自解

黃必以乳沃之合藥留脈等藥故不別矣

桑葉煎水吹鼻主吐瀉蟲毒對腎心脾皆

口內臍糞胎毒自此清

詩

黃連清熱解毒之要藥也凡夏月及四時看

兒有胎熱者恐熱蘊於中致生他病故宜用

之須取黃連數塊搥碎用湯浸出汁時時滴

兒口中以臍糞下為度其毒自解矣

硃蜜法

硃蜜鎮神利腸胃清熱防驚大有功胎熱便秘皆

堪用稟賦怯弱慎而行

註

硃砂鎮心定驚兼能除邪蜂蜜解毒潤腸更

能清熱一鎮一潤功效殊常胎熱便閉者四時皆可用之取一大豆許研細水飛過煉蜜調勻乳汁化服最佳惟胎稟太弱者不宜用也

豆豉法

怯弱之兒豆豉法宜發胎毒功最良兒生冬月亦宜此煎取濃汁當乳嘗

註淡豆豉輕腐宣發之藥也凡怯弱之兒或值

冬月欲解胎毒者只將此藥煎為濃汁與兒

三五口其毒自開矣

斷臍

臍帶剪下即用烙男女六寸始合宜烙臍灸法防風襲胡粉封臍為避濕

註嬰兒初生先用剪刀向火烘熱剪斷臍帶次

用火器繞臍帶烙之當以六寸為度不可過為短長短則傷藏長則損肌斷訖又用烙臍餅子安灸臍上以防風邪外入隨用胡粉散敷臍帶間用軟絹新棉封裹之以避尿濕風

邪如藥不脩卽以細熟艾一塊照依前法封裹

胡粉散

胡粉

甌帶灰

乾薑

白石脂

棉灰

各等分

麝香

少許

右共為細末每用一錢敷臍上封之

烙臍餅子

豆豉

黃蠟

等分

麝香

少許

右以豆豉麝香研勻鎔蠟量臍大小捻為餅灸用

浴兒

浴兒之法五枝湯冬夏寒温適可當加豬膽汁去污穢且滋肌膚免生瘡

註

斷臍後三日浴兒此法其來舊矣為其草污穢也臨浴時須擇無風密處適可而止不可久在水中冬月恐其受寒夏日恐其傷熱其

爲湯之法須用桃槐桑梅柳枝熬成再加豬
膽汁以去其污穢且能滋潤肌膚令兒胎瘡
不生

藏胎衣法

藏衣新瓶用帛纏埋築天德月空邊向陽高燥宜
嚴密令兒無疾壽綿綿

註凡藏胎衣盛在新瓶內以青帛裹瓶口擇向

陽高燥之地天德月空處掘地三尺埋之兒
自長壽無疾若藏衣不謹於兒不利


天德月空

正月在丁二月坤三月居壬四月辛五乾六甲七
月癸八艮九丙十乙宮十一巽兮庚十二此是天
德牢記心弓空單月壬共丙雙月俱在甲與庚

註

天德如正月在丁二月在坤三月在壬四月
在辛五月在乾六月在甲七月在癸八月在
艮九月在丙十月在乙十一月在巽十二月
在庚是也月空如正月在丙壬二月在甲庚
三月在丙壬四月在甲庚五月在丙壬六月

在甲庚七月在丙壬八月在甲庚九月在丙
 壬十月在甲庚十一月在丙壬十二月在甲
 庚是也



此天德圖
 內如單月
 逢丙壬雙
 月逢甲庚
 又為月空
 之方位也

天德方向俱依此圖爲準其月空方向單月在丙壬方雙月在甲庚方四處如值天德方向不便卽按圖尋丙壬甲庚所在用之如值月空方向不便亦按圖尋天德用之

剃頭

小兒彌月剃胎頭密室溫和適可求杏麻薄膩揉頭上胎毒瘡癩一切休

注

兒滿月剃頭須向密室溫暖處剃之爲其氣血未盈寒風易入剃後須用杏仁三枚研細入薄荷三葉再同研將麻油滴三四點合膩粉拌勻擦頭上能避風邪免生瘡癩熱毒等證

小不啼

小兒生下不能啼俗語名之爲草迷多因臨產難
生育或值嚴寒氣所逼氣閉不通聲不出奄奄呼
吸命須臾氣閉不通葱鞭背寒逼急用火熏臍

註

兒生落地啼聲即發形生命立矣有不啼者

俗云草迷多因臨產時生育艱難以致兒生

氣閉不通所以不啼也急以葱鞭其背使氣

通則啼又有時值天寒之際兒氣爲寒所逼

小兒亦不能啼宜用熏臍帶法急爲挽回庶氣通

而啼聲出也若氣絕無聲面青甲黑是形難

存而命已不立安望其生哉寒溫中煎

鞭背法

小兒初生氣不通奄奄呼吸少啼聲用葱鞭背輕
輕擊須臾聲發可回生

註

葱辛通氣擊動醒神用葱鞭背者取開通擊

醒之義也如無葱以手輕擊之亦可

熏臍帶法

小兒生下或冒寒氣閉無聲啼則難油撚熏臍休
少帶煖氣入腹自通安

註 兒初生方離母腹若值天寒氣為寒閉使兒
聲不出須急用棉絮包裹抱於懷中且勿斷
臍用紙撚蘸油點火於臍帶下往來熏之令
火氣由臍入腹寒得溫散氣得煖通啼聲自
出矣

不乳

兒生能乳本天然若不吮兮必有緣腹中穢惡未
下淨或在胎中素稟寒穢惡不淨一捻效胎寒不
乳勻氣先若更面青肢冷厥此是寒虛理中煎

註

不乳謂初出胞胎不吮乳也其故有二不可
不辨兒生腹中臍糞未下能令小兒腹滿氣
短嘔吐不乳當用一捻金治之若兒母過食
寒涼胎受其氣兒必腹痛多啼面色青白宜
勻氣散主之若四肢厥逆者理中湯主之

一捻金

大黃

生

黑丑

白丑

人參

檳榔 各等分

右為細末每少許蜜水調服

勻氣散

陳皮

桔梗 各一錢

炮薑

砂仁

炙甘草 各五分

木香 三分

右共為細末每服五分紅棗煎湯調服

理中湯

人參 乾薑 白朮 甘草 各五分 紅棗 十枚 水煎服

乾薑

引用紅棗肉水煎服

方理中人參並乾薑白朮甘草共為湯胎寒諸

疾皆當服不乳肢冷更堪嘗亦甘當服

眼不開

兒生眼閉不能開皆因脾熱受於胎內用地黃湯

最妙熊膽洗目效靈哉

註小兒初生眼不開者因孕婦飲食不節恣情

厚味熱毒熏蒸以致熱蘊兒脾眼胞屬脾其

脈絡緊束故不能開也內服生地黃湯外用

熊膽湯洗之自愈

地黃湯

生地黃

赤芍藥

川芎

當歸

天花粉

甘草

水煎服

方目閉不開胎熱成生地黃湯赤芍芎當歸花

粉生地草水煎速服莫消停

煎洗法

熊膽

黃連

各少許

用滾湯淬洗其目自開

吐不止

見吐不止何因生穢惡停留胃內成或緣稟賦胎

寒熱或因生時感寒風穢惡一捻金散下外感香

蘇溫散能熱涎酸黏連陳治寒吐清沫用理中

註

兒自胞胎既脫以後有因便秘腹中穢惡不

淨令兒腹滿其吐不止者一捻金主之若生

育時觸冒寒邪入裏犯胃則曲腰而啼吐沫

不止者香蘇飲溫散之又有胎前受熱面黃
赤手足溫口吐黃涎酸黏者二陳湯加黃連
主之若胎前受寒面青白四肢冷口吐清稀
白沫者理中湯主之

一捻金 方見不乳

香蘇飲

藿香 蘇葉

厚樸 薑炒 陳皮

枳殼 麩炒 茯苓

木香 煨 炙甘草

引用生薑水煎服

方歌 香蘇飲用藿香蘇厚樸陳皮枳殼茯苓甘草木

香一併入生薑為引吐能除

黃連二陳湯

半夏 薑製 陳皮

茯苓 生甘草

黃連 薑炒

引用生薑水煎服

方歌 兒生胎熱吐頻頻醫治須當用二陳半夏陳

皮茯苓草薑連加入效如神

理中湯 方見不乳

不小便

小便不通胎熱壅導赤八正二方從外用豆豉貼

臍法須臾小便自能通

註 小兒初生不小便者乃胎熱流於下也宜導

赤散熱盛者八正散主之外用豆豉膏

木上則小便自通矣

赤散

生地黃

木通

甘草 生

引用燈心竹葉水煎服

加黃連滑石赤苓更妙

方歌 方名導赤妙難言生地木通甘草煎引用燈

心共竹葉清熱利水便如泉

八正散

扁蓄

瞿麥

滑石

飛

木通

赤苓

車前子

生大黃

梔子

引用燈心水煎服

方歌

八正散治小便秘扁蓄瞿麥車前利木通滑

石赤茯苓大黃梔子合成劑

豆豉膏

淡豆豉

一勺

田螺

十九個

葱

一大束

右搗爛用芭蕉汁調貼臍上

不大便

大便不通名鎖肚皆緣熱毒受胎中硃蜜捻金俱可用急嘔五心臍下通

註

小兒初生之日或次日即大便者俗云下臍

屎此腸胃通和幽門潤澤也若至二三日不

大便者名曰鎖肚乃胎中受辛熱之毒氣滯

不通也其兒必面赤腹脹不乳多啼宜先用

硃蜜法治之設若不應用一捻金量兒與之

繼令婦人以溫水漱口啞兒前後心手足心
並臍下共七處以皮見紅赤色為度須臾大
便自通矣

硃蜜法 方見拭口

一捻金 方見不乳

大便小便不通

夫便俱秘胎熱極木通散與紫霜丸行熱開結真
神妙口噤之法悉如前

註小兒初生大小便不通者最為急候乃胎中

熱毒太甚而成也急用前口啞五心臍下法
再以木通散行其熱紫霜丸開其結庶可望
生若延至七日謂之一臘肚腹硬脹常作啼
吟則難治矣

木通散

車前子 蘇子 散茶 扁蓄 大黃

瞿麥 木通

赤苓 山梔

滑石 飛 黃芩

生甘草

大黃

引用燈心水煎服或入薄荷同煎

方歌二便閉兮如何醫木通散用甚為奇車蓄瞿

通苓梔子滑苓甘草大黃宜

紫霜丸

代赭石

一兩 火煨醋浸三五次研

赤石脂

一兩 杏仁 六十粒 炒去皮尖

巴豆

三十粒 去油膜

右為末飯糊如麻子大日服三丸白水下

肛門內合

有因熱毒肛門結或是內合無隙通清毒宜服黑

白散脂瞞簪通導法精

註小兒初生肛門內合有二一者熱毒太甚壅

刺結肛門一者脂膜遮瞞無隙可通如肛門壅

大結者急服黑白散外用蘇合香丸作棗核狀

黑納入孔中取其香能開竅又能潤澤大便一

黑白下庶可望生如脂膜遮瞞無隙可通者先以

金玉簪透之刺破脂膜再以蘇合香丸照前

法導之庶可挽回於萬一耳

黑白散

黑牽牛 半生半炒 白牽牛 半生半炒

大黃

生

檳榔

陳皮

各五錢

生甘草

三錢

元明粉 一兩

白帶右除檳榔不過火餘五味或晒或焙仍合檳榔為末同元明粉入乳鉢內研細每服五分至六七分溫蜜湯調化

蘇合香丸

蘇合香油

五錢 入安息香內

安息香

一兩 另為末用無灰酒半觔熬膏

丁香

青木香

白檀香

沉香

萹菱

香附子

訶子

煨取肉

烏犀

鎊

硃砂

各一兩 水飛

薰陸香

片腦

各五錢 研

麝香

七錢半

右為細末入安息香膏煉蜜和劑圓如芡實
大空心用沸湯化下酒下亦可

噤口

噤口舌上如黍米吮乳不得啼漸難清肝龍膽湯
極妙腹硬便秘紫霜丸吐涎牙緊擦牙效次用辰
砂全蠍煎病勢稍安勿過劑調和脾胃勻氣先

註小兒噤口之證失治多至不救其候舌上生

瘡如黍米狀吮乳不得啼聲漸小因胎熱所
致也法當清熱疎利以龍膽湯主之若肚腹

脹硬二便不通者紫霜丸主之又有一種口
吐白沫牙關緊急者此胎熱內結復為風邪
外襲當以秘方擦牙散先擦其牙關次服辰
砂全蠍散中病即止不可過服證退當調和
脾胃以勻氣散主之

龍膽湯

柴胡

黃芩

生甘草

釣藤鈎

赤芍

大黃

紙裏煨

龍膽草

螻螂

去翅足

桔梗

赤茯苓

引用枣肉水煎服

方歌 噤口龍膽湯極靈柴胡黃芩草釣藤赤芍大

黃龍膽草螻螂桔梗赤茯苓

紫霜丸

方見二便不通

秘方擦牙散

生南星

二錢 去皮臍

龍腦

少許

右研為極細末用指蘸合生薑汁放大牙根

擦之立效如不開者將應用之藥調和稀糊含在不病人口內以筆管插入病人之鼻孔用氣將藥極力吹入其關立時即開此法有通仙之妙不可不知

辰砂全蠍散

辰砂

五分 水飛

全蠍

三枚 去毒

硼砂

龍腦

麝香

各一分

右為極細末用乳母唾調抹口唇裏及齒上

勻氣散 方見不乳

撮口

撮如囊口吮乳難舌強脣青吐沫痰面色赤黃胎熱極四肢厥冷命難全痰盛宜用殭蠶散便秘須進紫霜丸驚熱龍膽湯極妙抽搐撮風散自安

註撮口者口撮如囊口也吮乳不得舌強脣青

面色黃赤乃心脾之熱受自胎中而然也其證為危候急當隨證治之如氣高痰盛者辰砂殭蠶散主之二便秘結者紫霜丸主之身

熱多驚者龍膽湯主之手足抽搐者撮風散主之若更口吐白沫四肢厥冷雖有神丹終

屬無濟

辰砂殭蠶散

辰砂 五分 殭蠶 一分
水飛 直的去系嘴炒

蛇蛻皮 一錢 麝香 五分
炒

右為末用蜜調敷唇口

紫霜丸 方見二便不通

龍膽湯 方見噤口

撮風散

赤脚蜈蚣

半條

釣藤鈎

一錢五分

硃砂

水飛

直疆蠶

焙

全蠍尾

各一錢

麝香

一字

右為末每服一字竹瀝調下

臍濕臍瘡

浴兒不慎水浸臍或因襦袍濕漬之臍間淋漓多痛癢甚則焮腫作瘡癩臍濕必用滲臍散瘡腫金黃散最宜治療之法須如此臨證施之不可疑

註

兒生洗浴不可久在水中任意洗濯既包裹畢宜時常留意勿令尿濕浸臍如不知慎遂致肚臍浸漬不乾名曰臍濕須以滲臍散敷之甚則焮赤成瘡名曰臍瘡須以金黃散敷之庶不致寒濕之氣內攻也

滲臍散

枯礬

龍骨

各二錢

麝香

少許

右研細末乾撒臍中

金黃散

川黃連 二錢半 胡粉

龍骨 各一錢

右為末敷患處

臍突

嬰兒蘊熱在腹中伸引頻頻臥不寧努脹其氣冲臍本虛大光浮臍突成速服犀角消毒飲二豆能消腫赤攻最忌寒涼敷臍上冰凝毒熱反成凶

註 嬰兒熱在腹中無所發瀉故頻頻伸引囁臥

不寧努脹其氣衝入臍間所以臍忽腫赤虛大光浮名曰臍突此乃胎熱所致非斷臍不利之過也內服犀角消毒飲外敷二豆散其天腫自消最忌寒涼之藥敷於臍上恐寒凝毒

熱反為害也

犀角消毒飲

牛蒡子 炒研 生甘草

荊芥 防風

金銀花

水煎熟臨服入犀角細末調勻服

方歌犀角消毒牛蒡加甘草荆防金銀化細研犀

角調勻服臍突能消功最佳

二豆散

赤小豆

不去皮

豆豉

天南星

去皮臍

白欬 各一錢

右為細末用五分芭蕉汁調敷臍四旁日二

次

臍風

斷臍不慎起臍風感受風寒濕水成將作驅風散
最效已成兼證要分明腹脹便秘黑白散面白肢
寒用理中痰涎壅盛殭蠶散壯熱面赤龍膽清嘔
吐多啼益脾治昏青撮口撮風平臍青口噤為不
治一臘逢之命必傾

註

臍者小兒之根蒂也名曰神闕穴近三陰喜

溫惡涼喜乾惡濕如斷臍悉遵前法臍風何

自而起惟不知慎重以致水濕風冷之氣入

於臍中兒必腹脹臍腫日夜啼叫此臍風之

將作也須急用驅風散治之若寒邪深入已
 成臍風者又當視其所兼之形證治之如肚
 腹脹硬大便不通者風兼實也黑白散主之
 面青肢冷二便不實者風兼虛也理中湯主
 之痰涎壅盛氣高喘急者風兼痰也辰砂殭
 蠶散主之身體壯熱面赤口乾者風兼熱也
 龍膽湯主之面青嘔吐曲腰多啼者風兼寒
 也益脾散主之撮口唇青抽搐不止者風兼
 驚也撮風散主之若臍邊青黑口噤不開者

是為內抽不治臍風見於一臍者亦不治一
 臍者七日也兒生七日血脈未凝病已中藏
 醫之無益

驅風散

蘇葉

防風

陳皮

厚朴薑炒

枳殼

木香煨

殭蠶炒

釣藤鈞

生甘草

引用生薑水煎服

方歌 臍風將作用驅風蘇防陳樸枳香從殭蠶釣

藤與甘草生薑加入更通靈

黑白散 方見肛門內合

理中湯 方見不乳

辰砂殭蠶散 方見撮口

龍膽湯 方見噤口

益脾散

白茯苓

人參

草果 煨

木香 煨

炙甘草

陳皮

厚樸 薑炒

紫蘇子 各等分炒

右為末每服一錢薑棗湯調服

撮風散 方見撮口

天鈞

天鈞邪熱積心胸痰涎壅盛氣不通癩癧壯熱同驚證頭目仰視若鈞形九龍控涎醫搐掣牛黃散用善驅風癩癧減參鈞藤飲爪甲青色蘇合精

註

小兒天釣證由邪熱痰涎壅塞胸間不得宣通而成發時驚悸壯熱眼目上翻手足瘳癱爪甲青色證似驚風但目多仰視較驚風稍異痰盛兼搐者九龍控涎散主之驚盛兼風者牛黃散主之搐盛多熱者釣藤飲主之爪甲皆青者蘇合香丸主之

九龍控涎散

赤腳蜈蚣

一條酒塗炙乾

滴乳

天竺黃

各二錢研勻

臘茶

雄黃

炙甘草

各二錢

荆芥穗

炒

白礬

各一錢枯

萊豆

一百粒半生半熟

右為末每服五分人參薄荷湯調下

牛黃散

牛黃

一錢細研

硃砂

一錢水飛細研

麝香

五分

天竺黃

二錢

蠟梢

一錢

釣藤鈎

二錢

右研勻每服一字新汲水調下

釣藤飲

人參

全蠍

去毒

羚羊角

天麻

甘草

炙

釣藤鈎

水煎服

按天鈎乃內熱痰盛應減人參

方歌天鈎須用釣藤飲痰癱連連無止歇人參羚羊

羊與釣藤炙草天麻共全蠍

蘇合香丸

方見肛門內合

內鈎

內鈎肝藏病受寒糞青潮搐似驚癇偃偻腹痛吐涎沫紅絲血點目中纏痰癱甚者釣藤飲急啼腹痛木香丸肢冷甲青唇口黑養藏溫中或保全

註

內鈎者多因肝藏素病外受寒冷其候糞青潮搐者作止有時也偃偻腹痛者曲腰而痛也口吐涎沫證雖與驚癇相類但目有紅絲血點痰癱甚者釣藤飲主之急啼腹痛者木香丸主之若肢冷甲青唇口黑者養藏散主

之然內釣至此乃中寒陰盛不治之證用此
救治庶或保全

釣藤飲 方見天釣

木香丸

沒藥

木香煨

茴香炒

釣藤鈎

全蠍

乳香各等分

先將乳香沒藥研勻後入諸藥末和畢取大
蒜少許研細和丸如桐子大晒乾每次二九

釣藤湯下

養藏散

當歸

沉香

木香煨

肉桂

川芎各半兩

丁香二錢

右為末每服一錢淡薑湯調服

盤腸氣痛

盤腸寒搏腸中痛曲腰不乳蹙雙眉定痛温中豆
蔻散熨臍外治法堪垂

註 凡盤腸氣痛皆由寒邪所搏肝腎居下故痛
則曲腰宜白豆蔻散主之外用熨臍法其效
甚速

白豆蔻散

白豆蔻

砂仁

青皮

醋炒

陳皮

炙甘草

香附米

製

蓬莪朮

各等分

右為末每服一錢以紫蘇煎湯調下

熨臍法

淡豆豉

生薑

各二錢
切碎

葱白

五莖

食鹽

一兩

同炒熱置臍上熨之

...氣痛皆由寒邪所搏肝腎居下故痛
...宜白豆蔻散主之外用藥酒法其效
甚速

同以糖罨熱土熨之

藜白正莖

食鹽一兩

炒豆翅

土薑一兩
谷二錢

...

...

