

五十一


7武9
395
35





仙纂醫宗金鑑卷五十一

幼科雜病心法要訣目錄



目爛

生地黄湯

真金散

懸癰

如聖散

一字散



重齟

一字散

清胃散

鴛口

清熱瀉脾散

保命散

吐舌

瀉心導赤湯

弄舌

瀉黃散

瀉心導赤湯

重舌

清熱飲

涼心散

木舌

川消散

瀉心導赤湯

兜乳

金鑑 卷五十一

目錄

和中清熱飲

溫中止吐湯

平胃散

枳桔二陳湯

夜啼

釣藤飲

導赤散

蟬花散

胎黃

生地黃湯

犀角散

胎赤

清熱解毒湯

蔣氏化毒丹

赤遊風散

犀角解毒飲

藍葉散

砭血法

神功散

豬肉貼法

塗法

初生無皮

換肌消毒散

當歸飲

清涼膏

驚黃散

撲粉法

變蒸外隨聖法

驚風門

驚風總括

驚風八候

通關急救法

通關散

急驚風

清熱鎮驚湯

安神鎮驚丸

至寶丹

牛黃丸

涼膈散

羌活散

瀉青丸

清熱化痰湯

瀉心導赤湯

涼驚丸

急驚後調理法

琥珀抱龍丸

清心滌痰湯

慢驚風

醒脾湯

緩肝理脾湯

夾熱夾痰慢驚

青州白丸子

柴芍六君子湯

慢脾風

溫中補脾湯

固真湯

理中湯

痢證門

痢證總括

陰痢

醒脾湯

固真湯

定痢丹

陽痢

龍膽湯

瀉青丸

四製抱龍丸

驚風

大青膏

鎮驚丸

痰癇

一捻金

硃衣滾痰丸

食癩

妙聖丹

硃衣滾痰丸

清熱和胃丸

風癩

化風丹

羌活桂枝湯

牛黃丸

御製醫宗金鑑卷五十一

幼科雜病心法要訣



目爛

兒生兩目痛難睜胞邊赤爛胎熱攻內用地黃湯

清熱外點真金目即明

註目爛者胞邊赤爛痛癢難睜因胎中蘊熱生

真金後毒熱上攻於目故有是證內服地黃湯以

清熱外點真金散以點目其證自愈

生地黄湯 方見目不開

真金散

黃連

生

黃蘗

生

當歸

赤芍藥

各一錢

杏仁

五分炒去皮尖

右剉散乳汁浸一宿晒乾為極細末用生地

黃汁調一字頻頻點眼即愈

懸癰

腭上腫起號懸癰皆因胎毒熱上衝法當刺破鹽

拭如聖一字摻之靈

註

凡喉裏上腭腫起如蘆籜盛水狀者名曰懸

癰蘆籜者蘆笋也此胎毒上攻須以棉纏長

鍼留鋒刺之瀉去青黃赤汁未消者來日再

刺刺後以鹽湯拭口用如聖散或一字散摻

如聖散

鉛霜

一錢

真牛黃

一錢

太陰元精石

硃砂

各二錢五分水飛

龍腦 五分

右為極細末每用一字摻患處

一字散

硃砂 水飛

硼砂 各五分

龍腦 樸消 各一字

右為極細末用蜜調少許鷺翎蘸搽口內

重齟

重齟胎熱胃中蓄牙根腫脹痛難禁刺破一字散敷上繼進清胃效如神

重齟者因小兒在胎有熱蓄於胃中故牙根

腫如水泡名曰重齟治法用鍼刺破以鹽湯

拭淨外敷一字散內服清胃散其腫自消

一字散 方見懸癰

清胃散

生地 丹皮

黃連 當歸

升麻 石膏 煨

引用燈心水煎服

方歌 清胃散治胃熱熏生地黃連當歸身丹皮升
麻石膏煨臨煎須要入燈心

驚口

驚口白屑滿舌口心脾蘊熱本胎原清熱瀉脾搽
保命少遲糜爛治難痊

註

驚口者白屑生滿口舌如驚之口也由在胎
中受母飲食熱毒之氣蘊於心脾二經故生
後遂發於口舌之間治法以清熱瀉脾散主
之外用髮蘸井水拭口搽以保命散日敷
三次白退自安倘治之稍遲必口舌糜爛吮
乳不得則難痊矣

清熱瀉脾散

山梔

少

石膏

煨

黃連

薑炒

生地

黃芩

赤苓

引用燈心水煎服

方歌

清熱瀉脾治驚口石膏生地赤苓煎芩連梔
子合成劑加入燈心病即安

保命散

白礬

燒灰

硃砂

各二錢五分
水飛

馬牙消

五錢

右研末以白鷺糞水攪取汁塗舌與口角上

吐舌

吐長收緩名吐舌皆是心經有熱成面紅煩渴溺赤瀉瀉心導赤服即寧

註吐舌者伸長而收緩也因心經有熱所致故

面紅煩躁口渴尿赤宜瀉心導赤湯主之

心導赤湯

木通

生地

黃連

甘草

生

引用燈心水煎服

方瀉心導赤湯最良心熱吐舌即堪嗜木通生

地黃連草燈心加入服自強

弄舌

弄舌時時口內搖心脾熱發口唇焦煩熱舌乾大便穢瀉黃導赤並能療

註 兒舌口中搖動者因心脾有熱以致唇焦舌
乾煩熱便穢先用瀉黃散次服瀉心導赤湯
瀉黃散

藿香葉

山梔子 炒

石膏

防風

甘草

生

引加燈心水煎服

方歌 弄舌瀉黃散最神藿香葉配山梔仁甘草防
風石膏煨臨時煎服入燈心

瀉心導赤湯

方見吐舌

重舌

舌下腫突似舌形心脾積熱上攻衝內服宜以清
熱飲外敷涼心功最靈

註

重舌者因舌下近舌根處其腫形似舌故名
重舌此心脾之熱宜服清熱飲外吹涼心散

清熱飲

黃連

生

生地

木通

甘草

生

連翹

去心

蓮子

引用淡竹葉水煎時時灌入口中

方清熱飲內用黃連生地蓮子木通甘連翹更

加淡竹葉一同煎服自然安

涼心散

青黛

硼砂

黃蘗

黃連

人乳拌晒

人中白

各二錢
煨過

風化消

一錢

冰片

二分

右為極細末吹之甚效

木舌

木舌心脾積熱成腫脹木硬證多凶外用川消敷

舌上內服瀉心導赤靈

註木舌一證皆因心脾積熱而成蓋脾之脈絡

在舌下又舌為心苗遇火上衝令兒舌腫滿

木硬不能轉動故名木舌外用川消散敷舌

上內服瀉心導赤湯若不急治必至難救

川消散

樸消 五分

真紫雪 二分

鹽 一分

右為細末以竹瀝調敷舌上

瀉心導赤湯 方見吐舌

嘔乳

嘔乳之候非一端傷乳停痰胃熱寒熱宜和中清熱飲寒用溫中止吐煎傷乳平胃散最妙停痰二陳湯可痊若是滿而自溢者常須節乳自能安

註小兒嘔乳證非一端有宿乳停痰胃寒胃熱

半乳分不可一例而治如面色多赤二便微

手足指熱此為熱嘔也宜和中清熱飲主之

面色青白糞青多沫手足指冷此因寒而嘔

也宜溫中止吐湯主之口熱唇乾夜卧不寧

手足心熱此為傷乳而嘔也宜平胃散主之

胸膈膨滿嘔吐痰涎此因停痰而嘔也宜根

枯二陳湯主之若喫乳過多滿而自溢者不

須服藥惟節乳則嘔自止矣

和中清熱飲

黃連 薑炒 半夏 薑製

陳皮 茯苓

藿香 砂仁

引用薑水煎服

方歌和中清熱飲黃連半夏陳皮茯苓攢藿香砂

仁合成劑水煎徐服可安全

溫中止吐湯

白豆蔻 研 茯苓

半夏 薑製 生薑

水煎冲磨沉香汁服

方歌溫中止吐白豆蔻茯苓半夏共生薑臨服沉

香汁加入專治嘔乳自寒傷

平胃散

蒼朮 炒 陳皮

厚樸 薑炒 甘草 炙

麥芽 炒 砂仁 研

引用薑水煎服

方歌小兒傷乳多吐嘔平胃調和功可見蒼陳厚

樸甘草偕加入麥砂薑一片

枳桔二陳湯

枳殼

麩炒

桔梗

陳皮

半夏

薑製

茯苓

甘草

炙

引用薑水煎服

方歌 停痰覘乳不能安枳桔二陳湯最先枳桔陳

半苓甘草生薑加入即時痊

夜啼

使啼寒熱因胎受須將形色辨分明寒屬脾經

青白手腹俱冷曲腰疼面赤溺閉屬心熱熱用導

赤寒釣藤若無寒熱表裏證古法蟬花散最精

註 小兒初生夜啼其因有二一日脾寒一日心

熱皆受自胎中觀其形色便知病情矣如面

赤色青白手腹俱冷不欲吮乳曲腰不伸者脾

寒也釣藤飲主之面赤脣紅身腹俱熱小便

不利煩躁多啼者心熱也導赤散主之若無

證已上形證但多啼者用蟬花散最當

釣藤飲

川芎

白當歸

茯苓

白芍炒

茯苓

甘草炙

木香煨

釣藤鈎

引用紅棗水煎服

方歌夜啼之證因脾寒須服釣藤飲可痊芎歸神

芍苓甘草木香釣藤紅棗煎

導赤散

方見小便不通

蟬蛻散

蟬蛻不拘多少
下半截

右研細末每服少許薄荷煎湯調下

胎黃

兒生徧體色如金濕熱熏蒸胎受濕法當滲濕兼
清熱地黃犀角二方神

註胎黃者徧體面目皆黃其色如金乃孕婦濕
熱太盛小兒在胎受母熱毒故生則有是證
也法當滲濕清熱須分輕重治之色微黃者

生地黄湯深黃者犀角散

生地黄湯

生地黄

赤芍藥

川芎

當歸

天花粉

赤茯苓

澤瀉

豬苓

甘草

生

茵陳蒿

引用燈心水煎食前服

方胎黃須用地黃湯四物花粉赤苓良澤瀉豬

苓甘草等茵陳加入水煎嚼

犀角散

犀角

鎊

茵陳蒿

栝萸根

升麻

甘草

生

龍膽草

生地

寒水石

煨

水煎不拘時服

方胎黃又有犀角散甘草犀角與茵陳升麻膽

草生地共寒水石同栝萸根

胎赤

胎赤胎中受毒熱生後徧體若丹塗清熱解毒湯極妙蔣氏化毒功效殊

註

胎赤者因孕婦過食辛熱之物以致毒熱凝結蘊於胞中遂令小兒生下頭面肢體赤若丹塗故名曰胎赤當以清熱解毒湯主之熱盛便秘者蔣氏化毒丹主之

清熱解毒湯

生地

黃連

金銀花

薄荷葉

連翹

赤芍

木通

甘草

引用燈心水煎服

方歌清熱解毒湯堪誇生地黃連金銀花薄荷連翹赤芍藥木通甘草燈心加

蔣氏化毒丹

犀角

黃連

桔梗

元參

薄荷葉

甘草生

大黃各一兩

青黛五錢

右為細末煉白蜜為丸重六分每服一丸燈

心湯化服

赤遊風

赤遊胎中毒熱成皮膚赤腫徧身行頭面四肢猶可治若歸心腹命難生內服犀角藍葉散外用砭法敷神功百日之內忌砭血貼塗二法可安寧

註小兒赤遊風證多由胎中毒熱而成或生後

過於溫暖毒熱蒸發於外以致皮膚赤熱而腫色若丹塗遊走不定行於徧身故名曰赤遊風多發於頭面四肢之間若內歸心腹則死治法當服犀角解毒飲如不愈繼以藍葉散外用砭法刺出毒血毒甚者敷以神功散毒輕者不用敷藥在百日內者小兒忌砭血以其肌肉難任也須用豬肉貼法或以赤小豆末雞子清調塗之甚效

犀角解毒飲

牛蒡子炒

犀角

荆芥穗

防風

連翹去心

金銀花

赤芍藥

生甘草

川黃連

生地黃

引用燈心水煎服

方歌犀角解毒藥最良牛蒡犀角合荆防連翹銀

花赤芍藥甘草川連生地黃

藍葉散

藍葉五錢

茜草

犀角屑

川大黃剉微炒

柴胡

梔子各二錢

川升麻一錢

石膏一錢

生甘草一錢

右為粗末每服一錢水一小盞煎五分去渣

兌竹瀝一酒盃煎三兩沸放溫量兒大小用

之氣怯弱者可去大黃

砭血法

口吮毒血各聚一處用細磁器擊碎取鋒芒者
 將筋頭劈開夾住用線縛定兩指輕撮筋梢令
 磁芒對聚血處再用筋一根頻擊刺出毒血砭
 後毒甚者以神功散敷之毒輕者砭後不可用
 恐皮膚既破草烏能作痛也如患在頭者不用
 砭法祇宜臥鍼倒挑患處出毒血則愈

神功散

黃蘗

炒

草烏

生

右各為末等分用漱口水調敷頻以漱口水

潤之

豬肉貼法

用生豬肉切片貼於赤腫處數數更換

塗法

生赤小豆不拘多少研為細末用雞子清調塗

患處乾則再塗

初生無皮

兒生無皮有二端父母梅毒遺染傳或因未足月
 生早無皮赤爛痛難堪梅毒換肌消毒散胎怯當

歸飲能痊外敷清涼鷺黃粉毒解形完膚自堅

註 嬰兒生下無皮其證有二或因父母素有楊

梅結毒傳染胞胎故生下或上半身赤爛或

下半身赤爛甚至色帶紫黑又有因月分未

足生育太早徧體浸漬紅嫩而光二證俱屬

惡候遺毒者內服換肌消毒散外用清涼膏

或鷺黃散敷之胎元不足者內服當歸飲外

用稻米粉撲之毒解形完者謂解去毒氣其

皮自漸漸生完而堅實矣

換肌消毒散

當歸

生地黃

赤芍藥

川芎

皂刺

土茯苓

金銀花

連翹

甘草

白芷

苦參

白蘚皮

防風

引用燈心水煎服

方無皮換肌消毒治四物皂刺土茯苓銀花連翹草白芷苦參白蘚共防風

當歸飲

何首烏製

白蘚皮

白蒺藜

甘草

當歸

生地黃

白芍藥

人參

黃耆

川芎

水煎服

當歸飲治兒無皮面白肢冷服最宜首烏蒺藜皮白蒺藜甘草四物共參者

清涼膏

石灰

四兩未經水濕成塊者

用水泡之沒指半許露一宿面上有浮起如雲片者輕輕取之微帶清水視其多寡對小磨香油亦如之以順攪成膏為度用雞翎搽之自愈

鴛黃散

黃蘗生

石膏各等分

共研為細末撲之濕則乾撲乾則用豬苦膽調搽

撲粉法

早稻白米作粉時時撲之其皮漸生神效

變蒸

萬物春生夏熱長兒生同此變形神三十二日為一變六十四日日一蒸變長百骸生藏府蒸增智慧發聰明十八五百七十六變蒸既畢形神成變

蒸之狀身微熱耳尻骨冷無病情

註

天地生化萬物必以春溫夏熱兒之初生變生形神亦同此理自生之日至三十二日日一變至六十四日日一蒸變則長其百骸生其藏府蒸則增其智慧發其聰明也日十八五百七十六者謂十變五蒸之外又有三大蒸合計五百七十六日也變蒸既畢形神具足此後則不復變蒸矣然每變蒸之時其狀惟身微熱耳冷尻骨冷而無他病情狀蓋以

陰陽和變生化形神故無他病情狀也身微熱者以陰陽氤氳變蒸之氣而然也耳尻冷者耳尻屬陰以陽不傷陰而與陰和之象故不熱也

按變蒸既曰生五藏六府次序又曰包絡三焦二經俱無形狀故不變不蒸夫包絡乃周身脂膜聯絡百骸藏府者三焦乃軀殼內氣充滿百骸藏府者變蒸時豈獨不及之耶其說不經細閱靈素自知附辨以俟識者

風門別矣

驚風總括

心主驚兮肝主風心熱肝風作急驚素虛藥峻因成慢吐瀉後起慢脾風急驚陽證有實象慢脾陰證有虛形慢驚半陰半陽證虛實寒熱要詳明

註

心藏神心病故主驚也肝屬木肝病故主風也凡小兒心熱肝盛一觸驚受風則風火相搏必作急驚之證也若素稟不足或因急驚用藥過峻暴傷元氣每致變成慢驚之證更

有因吐瀉既久中氣大虛脾土衰弱肝木乘
虛而内生驚風者名曰慢脾風也三者致病
之因既不同故所現之證亦各異急驚屬陽
必有陽熱有餘等實象也慢脾屬陰必有陰
冷不足等虛象也至於慢驚初得之時陰陽
尚未過損或因急驚傳變而成其中常有夾
痰夾熱等證故屬半陰半陽不比慢脾純陰
之病也治者須詳分虛實寒熱以治之庶不
致悞矣

驚風八候

驚風八候搖擗掣顛反引竄視之名肘臂伸縮名
爲搖十指開合擗狀成勢若相撲謂之掣顛則頭
肢動搖鈴反張身仰頭向後引狀兩手若開弓竄
則目直常似怒視則視物不轉睛內外左右分順
逆須識急慢證皆同

註

八候謂搖擗掣顛反引竄視是也搖謂肘臂
伸縮擗謂十指開合掣謂肩頭相撲顛謂手
足動搖反者身仰向後引者手若開弓竄則

目直而似怒視則睛露而不活其搐以男左手女右手男大指在外女大指在內為順反是為逆此候急驚慢驚同皆見之虛實無所異焉治者宜切記之

通關急救法

驚風搐搦神昏憤痰壅氣塞在心胸急用通關吹入鼻無嚏則死有嚏生

註驚風搐搦必神氣昏憤皆由痰壅氣塞壅結

胸中而致急用通關散吹入鼻內無嚏者不

治有嚏者審其表裏虛實隨證治之

通關散

半夏生 皂角

細辛 薄荷 各等分

共為細末用筆管吹入鼻內少許亦吹喉內

急驚風宜吹而主昏者因寒盛時熱而內煩風

急驚觸異心驚熱或由風鬱火生風暴發痰盛或熱極壯熱煩急面唇紅痰壅氣促牙關緊三便秘瀉脈數洪驚用鎮驚風至寶牛黃攻痰涼膈清平

治羌活瀉青等化痰導赤共涼驚

註

急驚風一證有因目觸異物耳聞異聲神散

氣亂而生者有因心肝火盛外為風寒鬱閉

不得宣通而生者有因痰盛熱極而內動風

者然證多暴發壯熱煩急面紅唇赤痰壅氣

促牙關緊急二便秘瀉緊急者齒緊急不能

半開也二便秘瀉者大便秘結而小便澀難也

脈洪數者主陽熱也觸異致驚者清熱鎮驚

湯安神鎮驚丸主之火鬱生風者至寶丹主

之痰盛生驚者牛黃丸攻下之熱極生風者

涼膈散清解之病不甚者則用平治之法風

熱者羌活散主之肝熱者瀉青丸主之痰兼

熱者清熱化痰湯主之心經熱者導赤散涼

驚丸主之惟在臨證者審而用之

清熱鎮驚湯

柴胡

薄荷

麥冬

去心

梔子

川黃連

龍膽草

茯神

釣藤鈎

甘草

生

木通

引加燈心竹葉調硃砂末服

方清熱鎮驚治外驚柴胡薄荷麥門冬梔子黃

歌連龍膽草茯神鈎藤草木通

安神鎮驚丸

天竺黃

茯神

各五錢

膽星

棗仁

炒

麥冬

去心

赤芍

歸身

各三錢

薄荷葉

黃連

辰砂

牛黃

梔子

木通

龍骨

各三錢
煨

青黛

一錢

右為細末煉蜜丸如棗豆大赤金鉞為衣量
兒大小與之淡薑湯化下

至寶丹

麻黃

防風

荆芥

薄荷

當歸

赤芍

大黃

芒消

川芎

黃芩

桔梗

連翹

白朮

梔子

石膏

甘草

滑石

全蠍

細辛

天麻

白附子

羌活

殭蠶

川連

獨活

黃蘗

右共為細末煉蜜為丸每丸重五分量兒大
小與之薑湯化下

牛黃丸

黑牽牛

白牽牛

膽星

枳實

半夏

牙皂

各五錢
薑製
各等分
麩炒
二錢
去皮弦

大黃 一兩半

右研極細末煉白蜜為丸重五分量兒大小
與之薑湯化下

涼膈散

黃芩

大黃

連翹

去心

芒消

甘草

生

梔子

薄荷

引用竹葉生蜜煎服

汗者加防風羌活

方歌涼膈散治膈熱盛梔翹芩薄荷芒消黃便秘消

大黃加倍用無汗更加羌活防

羌活散

羌活

防風

川芎草黃蘗柴胡薄荷

天麻煎風兼煎殭蠶炒川芎藜蘆葉天麻

甘草生川黃連

柴胡

前胡

枳殼

麩炒

桔梗

引用生薑水煎服

方歌

羌活散風兼清熱羌防川芎薄荷葉天麻獨

蠶草黃連柴胡前胡枳殼桔

瀉青丸

龍膽草

焙

梔子

大黃

煨

用羌活羌活羌活

防風

各錢

用芎藭

錢半

即黃芩

右研末煉蜜爲丸如梧桐子大竹葉薄荷湯

調下

清熱化痰湯

橘紅

麥冬

去心

半夏

薑製

赤苓

黃芩

竹茹

甘草

生

川連

枳殼

麩炒

桔梗

膽星

引用生薑燈心水煎服

方歌 清熱化痰有橘紅麥冬半夏赤茯苓黃芩竹

茹生甘草川連枳桔膽南星

瀉心導赤湯 方見木舌

涼驚丸

龍膽草

防風

青黛 各三錢

釣藤鈎 二錢

黃連 五錢

牛黃 一錢

右研細末麩糊為丸如粟米大量兒大小與之金器煎湯化下

急驚後調理法

急驚之後尚未清痰熱琥珀抱龍靈神虛氣弱痰兼熱清心滌痰大有功

註急驚多用寒涼之藥亦急則治標之法但得

痰火稍退即當調補氣血若過用寒涼必致

轉成慢驚等證故驚邪一退餘熱尚在者當

用琥珀抱龍丸主之若脾虛多痰者宜清心

滌痰湯主之

琥珀抱龍丸

人參

琥珀

茯神 各五錢

山藥 一兩

甘草 四錢

檀香 三錢

天竺黃

枳殼 三錢

枳實 各五錢

辰砂 三錢

膽星 五錢

赤金鉞 二十片

右為細末煉蜜為丸每丸重一錢大兒一九
小兒半丸淡薑湯化下

清心滌痰湯

竹茹

橘紅

半夏

茯苓

枳實

甘草

麥冬

棗仁

人參

菖蒲

南星

川黃連

引用生薑水煎服

方歌 清心滌痰湯效靈補正除邪兩收功參苓橘

半連茹草枳實菖棗星麥冬

慢驚風

慢驚多緣稟賦弱或因藥峻損而成緩緩搐搦時作止面白青黃身則溫昏睡眼合睛或露衄遲神

註

慢驚一證或緣稟賦虛弱土虛木盛者有之

或由急驚過用峻利之藥以致轉成此證者有之發時緩緩搐搦時作時止面色淡黃或青白相兼身必溫和昏睡眼合或睡臥露睛衄來遲緩神氣慘慘大便青色此乃脾胃虛

弱治宜培補元氣為主虛而夾痰者醒脾湯主之脾虛肝旺者緩肝理脾湯主之

醒脾湯

人參

白朮

土炒

茯苓

天麻

半夏

橘紅

薑製

全蠍

去毒

殭蠶

炒

甘草

炙

木香

倉米

膽南星

引用生薑水煎服

方歌氣虛夾痰醒脾治參朮天麻白茯苓橘半全

蠍僵蠶草木香倉米膽南星

緩肝理脾湯

廣桂枝

人參

白茯苓

白芍藥炒

白朮

土炒

陳皮

山藥

炒扁豆

炒研

甘草

炙

引用煨薑大棗水煎服

方歌肝旺脾虛緩肝湯桂枝參苓朮良陳皮山

藥扁豆草煎服之時入棗薑日配交氣海早

夾熱夾痰慢驚

慢驚夾熱或夾痰身熱心煩口溢涎宜以清心滌

痰治白丸柴芍六君煎

註慢驚之證本無熱可言但脾虛虛熱內生故

謂心痰涎上泛咽喉氣粗身熱心煩所謂虛夾痰

熱是也痰熱相兼者清心滌痰湯主之脾虛

肝旺痰盛者青州白丸子柴芍六君湯主之

清心滌痰湯 方見急驚後調理法

青州白丸子

生川烏 五錢 去皮臍 生半夏 七兩

南星 三兩 生 白附子 二兩 生

右為末盛生絹袋內用井花水擺出粉未盡

再擺以粉盡為度置磁盆內日晒夜露每早

撤去舊水別用新水攪春五日夏三日秋七

日冬十日去水晒乾研為細末用糯米粉煎

粥清丸菜豆大每服三五丸薄荷湯送下

柴芍六君子湯

人參 土炒 白朮 土炒

茯苓 陳皮

半夏 薑製 甘草 炙

柴胡 白芍 炒

釣藤鈎

引用薑棗水煎服

方歌 脾虛木旺風痰盛四君人參米草苓痰盛陳

半因加入肝風更用柴芍藤

慢脾風

肝盛脾衰金氣弱金失承制木生風每因吐瀉傷脾胃閉目搖頭面唇青額汗昏睡身肢冷舌短聲啞嘔澄清溫中補脾為主劑固真理中隨證從

註慢脾風一證多緣吐瀉既久脾氣大傷以致

土虛不能生金金弱不能制木肝木強盛惟脾是尅故曰脾風閉目搖頭面唇青黯額汗昏睡四肢厥冷舌短聲啞頻嘔清水此乃純

陰無陽之證逐風則無風可逐治驚則無驚可治惟宜大補脾土生胃回陽為主吐瀉亡陽者溫中補脾湯主之大病後成者固真湯主之四肢厥冷者理中湯加附子主之

溫中補脾湯

人參

黃耆

蜜炙

白朮

土炒

乾薑

陳皮

半夏

薑製

附子

製

茯苓

砂仁

肉桂

去粗皮研

白芍

炒焦

甘草

炙

丁香

引用煨薑水煎服

方歌 慢脾溫中補脾湯參耆白朮共乾薑陳半附

苓縮砂桂白芍甘草共丁香

固真湯

人參

白朮

土炒

肉桂

去粗皮

白茯苓

癩證門

癩證總括

小兒癩證類瘧驚發時昏倒搐涎聲食頃即甦如無病陰陽驚熱痰食風

註

癩證類乎驚風瘧風者謂發時昏倒抽搐痰涎壅盛氣促作聲與驚瘧二證相似也但四體柔軟一食之頃即醒依然如無病之人非若瘧風一身強硬終日不醒也陰者陰癩也見藏陰證陽者陽癩也見府陽證驚癩因驚

熱痰癰因痰食癰因食風癰因風其證不一
治亦不同臨證宜詳辨之

陰癰

陰癰屬藏肢厥冷偃臥拘急面白青吐沫聲微脈
沉細醒脾固真定癰靈

註

陰癰屬陰藏寒之病也多因慢驚之後痰入
心包而得發時手足厥冷偃臥拘急面色青
白口吐涎沫聲音微小脈來沉細輕者醒脾
湯甚者固真湯病退調理用定癰丹主之

山藥 炒

黃耆 蜜炙

甘草

濕紙裏煨透

附子

去皮臍湯泡浸

引用薑棗水煎服

方歌

固真湯治慢脾風人參白朮桂茯苓山藥黃
耆煨甘草附子浸泡最宜精

理中湯

方見不乳

遠志

琥珀

二錢

天竺黃

四錢

白朮

五錢

橘紅

半夏

五錢

天麻

各三錢

治亦不同臨證方

除痼

中藥 式只不原

普煎甘草柳干或或最宜煎

固真湯 治風入冬白米卦芬芬山藥黃

臣用薑棗水煎服足厥冷偃臥拘急面色青

甘草 煎藥裏煎者 柳干 去支細瀉細者醒脾

山藥 越者固真湯黃香 用定痼丹主之

脾湯 方見慢驚風

固真湯 方見慢脾風

定痼丹

人參 三錢 當歸 三錢

白芍 三錢 茯神

棗仁 各五錢 遠志 三錢 去心

琥珀 三錢 天竺黃 四錢

白朮 五錢 橘紅

半夏 薑製 天麻 各三錢

釣藤鈎 四錢

甘草 二錢

右共為細末煉蜜丸如榛子大每服一丸淡薑湯化服

陽癘

陽癘屬府身熱汗仰臥面赤衄數洪噤急啼叫吐涎沫龍膽瀉青與抱龍

注陽癘屬陽府熱之病也多因急驚去風下痰

不淨久而致成此證發時身熱自汗仰臥面赤衄象洪數牙關噤急或啼叫不已口吐涎

沫如風兼熱者用龍膽湯肝經熱者用瀉

丸痰涎壅盛者用四製抱龍丸主之

龍膽湯 方見禁口

瀉青丸 方見急驚風

四製抱龍丸

天竺黃 五錢 辰砂 二錢

膽星 一兩 雄黃 二錢

麝香 一分半

右為極細末另用麻黃欬冬花甘草各五錢

煎湯去滓慢火熬成膏合藥末為丸如芡實
大每服一九薄荷湯化下

驚癇

驚癇觸異驚神氣吐舌急叫面白紅發作如人將
捕狀安神大青鎮驚靈

註

小兒心肝熱盛偶被驚邪所觸因而神氣潰
亂遂成癇證發時吐舌急叫面色乍紅乍白
悚惕不安如人將捕之狀先服大青膏次服
鎮驚丸則癇自定矣

青膏

天麻 三錢

白附子 二錢

青黛 一錢

蠍尾 一錢

硃砂 一錢

天竺黃 二錢

麝香 三分

烏梢蛇肉 一錢

右同研細煉蜜和膏每服大兒五分小兒三
分薄荷湯化服

鎮驚丸

茯神

麥冬 各五錢

辰砂

遠志

去心

石菖蒲

棗仁

炒各三錢

牛黃 一錢半

川黃連

生三錢

珍珠 二錢

膽星

五錢

釣藤鈎 五錢

天竺黃

五錢

犀角 三錢

甘草

生二錢

右共研細末煉蜜為丸每丸重五分量兒與
天之用淡薑湯下白

痰癰

平素自多痰發時痰壅在喉間氣促昏倒吐
沫一捻金與滾痰丸

註

痰癰者因小兒平素痰盛或偶因驚熱遂致
成癰發時痰涎壅塞喉間氣促昏倒口吐痰
沫宜先服一捻金以急下其痰次服硃衣滾
痰丸則氣順痰清而癰自止矣

一捻金 方見不乳

硃衣滾痰丸

礞石 一兩

沉香 五錢

黃芩 七錢

大黃 一兩

右為細末水泛為丸硃砂為衣多寡量兒大小白滾水化服

食癩

食癩食過積中脘一時痰熱使之然面黃腹滿吐利臭妙聖滾痰和胃安

註食癩者其病在脾因小兒乳食過度停結中脘乘一時痰熱壅盛遂致成癩其初面黃腹滿吐利酸臭後變時時發搐宜用妙聖丹主

之痰盛者硃衣滾痰丸至之後用清熱和胃丸調理則積滯清而驚癩定矣

妙聖丹

雄黃

蠟梢

硃砂

代赭石 各二錢
煨醋淬

巴豆 三個
去油

杏仁 二錢
炒去皮尖

右共為細末蒸棗肉丸如桐子大每服三五丸木香煎湯化服

硃衣滾痰丸 方見痰癩

清熱和胃丸

川連 五錢 生

竹茹 四錢

連翹 四錢 去心

神麴 一兩 炒

陳皮 四錢

大黃 五錢

梔子 五錢 生

麥冬 五錢 去心

山查 一兩

麥芽 一兩 炒

枳實 五錢 麩炒

甘草 三錢 生

右共為細末煉蜜為丸每丸重一錢量兒與之用滾白水化下

風癩

風癩汗出風襲經二目兩黯面淡紅十指屈伸如數物化風羌活牛黃寧

註 風癩因汗出脫衣騰理開張風邪乘隙而入

發時目青面紅手如數物治法先宜踈風解

表輕則化風丹主之重則羌活桂枝湯主之

風兼痰者牛黃丸主之

化風丹

膽星 二錢

羌活

獨活

天麻

防風

甘草
生

荆芥穗

人參

川芎

各一錢

右共為細末煉蜜丸皂子大每服一九薄荷

湯化開服

羌活桂枝湯

羌活

防風

麻黃

桂枝

天麻

大黃

甘草

生

引用生薑水煎服

方歌羌活桂枝治風痲疎風瀉熱妙難言羌防麻

桂天麻草大黃煎服自然安

牛黃丸

膽星

全蠍

去毒

蟬退

各二錢半

防風

牛黃

白附子

生

殭蠶

炒

天麻

各一錢五分

麝香

五分

右爲細末煮棗去核皮取內和丸如菉豆大
每服三五丸生薑湯化服

甘藷

天麻

大黃

