



和武
上
36

五十二



門中武
編 595
卷 36

御纂醫宗金鑑卷五十二

幼科雜病心法要訣目錄



疳證總括

脾疳

消疳理脾湯

肥兒丸

參苓白朮散

疳瀉

御纂醫宗金鑑

卷五十二

目錄



清熱和中湯

參苓白朮散

疳腫脹

御苑勻氣散

疳痢

香連導滯湯

肝疳

柴胡清肝散

蘆薈肥兒丸

加味逍遙散

抑肝扶脾湯

心疳

瀉心導赤湯

珍珠散

茯神湯

疳渴

清熱甘露飲

肺疳

生地清肺飲

甘露飲

補肺散

腎疳

金蟾丸

九味地黃丸

心調元散

疳熱

鼈甲青蒿飲

鼈甲散

腦疳

龍膽丸

龍腦丸

吹鼻龍腦散

眼疳

瀉肝散

清熱退翳湯

逍遙散

羊肝散

鼻疳

清金散

蔣氏化毒丹

化蟲丸

鼻疳散

吹鼻蟬殼散

牙疳

消疳蕪荑湯

人參丸

吐證門

吐證總括

辨嘔吐噦證

傷乳吐

消乳丸

保和丸

傷食吐

三棱丸

和胃湯

夾驚吐

全蠍觀音散

定吐丸

痰飲吐

二陳湯

香砂六君子湯

蟲吐

化蟲丸

蘆薈肥兒丸

牙疳散

脊疳

蘆薈丸

金蟾散

蛔疳

史君子散

下蟲丸

肥兒丸

無辜疳

柴胡飲

蘆薈肥兒丸

丁奚疳

五疳消積丸

人參啓脾丸

哺露疳

集聖丸

肥兒丸

加減理中湯

虛吐

丁沉四君子湯

實吐

三一承氣湯

寒吐

薑橘散

熱吐

理中湯

加味溫膽湯

瀉證門

瀉證總括

傷乳食瀉

保安丸

平胃散

中寒瀉

理中湯

訶子散

火瀉

玉露散

四苓散

驚瀉

益脾鎮驚散

養脾丸

臍寒瀉

和氣飲

調中湯

脾虛瀉

參苓白朮散

殮瀉

補中益氣湯

四神丸

水瀉

胃苓湯

升陽除濕湯

御醫宗金鑑卷五十一

編輯幼科雜病心法要訣

疳證門

疳證總括

大人為勞小兒疳乳食傷脾是病原甘肥失節生積熱氣血津液被熬煎初患尿泔午潮熱日久青筋肚大堅面色青黃肌肉瘦皮毛憔悴眼睛眵

註

大人者十五歲以上也病則為勞若十五歲以下者皆名為疳緣所稟之氣血虛弱藏府

嬌嫩易於受傷或因乳食過飽或因肥甘無節停滯中脘傳化遲滯腸胃漸傷則生積熱熱盛成疳則消耗氣血煎灼津液凡疳病初起尿如米泔午後潮熱日久失治致令青筋暴露肚大堅硬面色青黃肌肉消瘦皮毛憔悴眼睛發眵而疳證成矣然當分其所屬而治之庶不致有悞也

脾疳

脾疳面黃肌消瘦身熱困倦喜睡眠心下痞硬滿

脘脹卧冷食泥腹痛堅頭大頸細食懶進吐瀉煩渴便腥黏攻積消疳肥兒治補脾參苓白朮先

註

脾屬土色黃主肌肉故脾疳則見面黃肌肉消瘦身體發熱困倦喜睡心下痞硬乳食懶進睡卧喜冷好食泥土肚腹堅硬疼痛頭大頸細有時吐瀉口乾煩渴大便腥黏之證也宜先攻其積用消疳理脾湯肥兒丸主之積退然後調理其脾以參苓白朮散主之

消疳理脾湯

蕪荑

三棱

莪朮

青皮

陳皮

蘆薈

檳榔

史君子肉

甘草

川黃連

胡黃連

麥芽

神麴

炒

引用燈心水煎服

方歌 消痞理脾用蕪荑三棱莪朮青陳皮蘆薈檳

柳史君草川連胡連麥芽麴

肥兒丸

人參

二錢半

白朮

五錢

茯苓

三錢

黃連

二錢

胡黃連

五錢

史君子

肉 四錢

神麴

炒

麥芽

炒

山查肉

各三錢半

甘草

錢半

蘆薈

二錢半

右為末黃米糊丸如黍米大每服二三十丸

米湯化下

參苓白朮散

人參 二錢

茯苓

白朮

土炒

扁豆

炒

薏米

炒

山藥

炒

各五錢

陳皮

三錢

縮砂

桔梗

各二錢

甘草

炙 一錢

建蓮子

五錢
去心

右共為細末每服一錢老米湯調服

疳瀉

疳疾傷脾因作瀉先清後補為妙訣初宜清熱和中湯久瀉參苓白朮捷

註

疳瀉之證多緣積熱傷脾以致水穀不分頻頻作瀉法當清熱滲濕以清熱和中湯主之若瀉久不愈當漸為調理參苓白朮散主之

清熱和中湯

白朮

土炒

陳皮

厚樸

薑炒

赤苓

黃連

神麩炒

穀芽炒

史君子

生甘草

澤瀉

引用燈心水煎服

方疴久泄瀉名疴瀉清熱和中功甚捷白朮陳

厚赤苓連神穀史君草澤瀉

參苓白朮散方見脾疴

疴腫脹

疴疾腫脹面浮光傳化失宜脾肺傷氣逆喘咳胸

瀉御苑勻年服最良

註疴疾腫脹之證多因傳化失宜以致脾肺兩

傷現證氣逆喘咳胸膈痞悶肚腹腫脹面色

浮光宜用御苑勻氣散治之其腫脹自消矣

御苑勻氣散

桑皮

蜜炒

桔梗

赤苓

甘草生

藿香

陳皮

木通

引用薑皮燈心水煎服

方歌 疝久脾虛腫脹生御苑勻氣有奇功桑皮桔

梗赤苓草藿香陳皮合木通

疝痢

疝疾日久頻下痢多緣腸胃熱疑滯或赤或白腹

窘急香連導滯為妙劑

註 疝痢之由皆因熱結腸胃所致故痢時或赤

或白腹中窘痛急用香連導滯湯治之其痢

自愈

導滯湯 瓜鼠式主之昔亦其熱用柴四

青皮 炒 陳皮 炒

厚樸 薑炒 大川黃連 薑炒

生甘草 山查

神麩 炒 木香 煨

檳榔 大黃

引用燈心水煎服

方歌 疝久下痢名疝痢香連導滯功最良青陳厚

樸川連草查麩木香檳大黃

肝疳

肝疳面目爪甲青眼生眵淚澁難睜搖頭揉目合面卧耳流膿水濕瘡生腹大青筋身羸瘦燥渴煩急糞帶青清熱柴胡同蘆薈調養逍遙抑肝靈

註

肝屬木色青主筋故肝疳則見面目爪甲皆

青眼生眵淚隱澁難睜搖頭揉目合面睡卧耳瘡流膿腹大青筋身體羸瘦燥渴煩急糞青如苔之證也治宜先清其熱用柴胡清肝散蘆薈肥兒丸主之若病勢稍退當以逍遙

散抑肝扶脾湯調理

柴胡清肝散

銀柴胡

梔子微炒

連翹

去心

胡黃連

生地黃

赤芍

龍膽草

青皮炒

甘草

生

引用燈心竹葉水煎服

方歌 柴胡清肝治肝疳銀柴梔子翹胡連生地赤

芍龍膽草青皮甘草一同煎

蘆薈肥兒丸

五穀蟲二兩 炒

蘆薈生

胡黃連炒

川黃連各一兩 薑炒

銀柴胡一兩二錢 炒

扁豆炒

山藥各二兩 炒

南山楂二兩半

蝦蟇四個 煨

肉豆蔻七錢 煨

檳榔五錢

史君子二兩半 炒

神麩二兩 炒

麥芽一兩六錢 炒

鶴虱八錢 炒

蕪荑一兩 炒

硃砂二錢 飛

麝香二錢

共研細末醋糊為丸如黍米大每服一錢米

飲下

加味道遙散

茯苓炒 白朮炒

當歸炒 白芍炒

柴胡 薄荷

炙甘草 丹皮

梔子炒

引用薑棗水煎服

方歌加味逍遙散如神茯苓白朮當歸身白芍柴

胡薄荷草再加丹皮梔子仁

抑肝扶脾湯

人參 白朮土炒

黃連薑炒 柴胡酒炒

茯苓 青皮醋炒

陳皮 白芥子

龍膽草 山查

神麴炒 炙甘草

引用薑棗水煎服

方歌調理抑肝扶脾湯參朮黃連柴苓良青陳白

芥龍膽草山查神麴甘草嚼

心痞

心痞面赤脈絡赤壯熱有汗時煩驚咬牙弄舌口
燥渴口舌生瘡小便紅胸膈滿悶喜伏卧懶食乾
瘦吐利頻瀉心導赤珍珠治茯神調理可收功

註

心屬火色赤主血脈故心疳則見面紅目脈絡赤壯熱有汗時時驚煩咬牙弄舌口舌乾燥渴飲生瘡小便紅赤胸膈滿悶睡喜伏卧懶食乾瘦或吐或利也熱盛者瀉心導赤湯主之熱盛兼驚者珍珠散主之病久心虛者茯神湯調理之

瀉心導赤湯 方見木舌

珍珠散

珍珠 三錢

麥冬 五錢
去心

天竺黃 三錢

金鉞 二十五片

牛黃 一錢

胡黃連 三錢

生甘草 二錢

羚羊角

大黃

當歸 各三錢

硃砂 二錢

雄黃 一錢

茯神 五錢

犀角 三錢

右爲細末每服五分茵陳湯調服

茯神湯

茯神

當歸

炙甘草

人參

引用龍眼肉水煎服

煩熱者加麥冬

方歌 茯神湯內用茯神當歸甘草共人參若是煩

熱麥冬入清補兼施功最純

疳渴

肥甘積熱傷津液大渴引飲心煩熱速用清熱甘

露宜熱減津生渴自歇

註 疳渴者多因肥甘積熱煎耗脾胃以致津液

虧損故不時大渴引飲心神煩熱速用清熱

甘露飲其渴自愈

清熱甘露飲

生地黃

麥冬去心

石斛

知母生

枇杷葉

蜜炙

石膏

煨

甘草

生

茵陳蒿

黃芩

引用燈心水煎服

方歌耗液傷津成疳渴清熱甘露飲如神生地麥冬斛知母枇杷石膏草茵芩

肺疳

面白氣逆時咳嗽毛髮焦枯皮粟乾發熱憎寒流涕涕鼻頰生瘡號肺疳疎散生地清肺效清熱甘露飲為先肺虛補肺散最妙隨證加減莫遲延

註肺屬金色白主皮毛故肺疳則見面白氣逆

咳嗽毛髮枯焦皮上生粟肌膚乾燥憎寒發熱常流清涕鼻頰生瘡也先用生地清肺飲

以疎解之繼用甘露飲清之日久肺虛者當以補肺散主之

生地清肺飲

桑皮炒 生地黃

天冬 前胡

桔梗 蘇葉

防風 黃芩

生甘草 當歸

連翹去心 赤苓

引用生薑紅棗水煎服

方歌 生地清肺用桑皮生地天冬前桔齊蘇葉防

風黃芩草當歸連翹赤苓宜

甘露飲

生地黃

熟地黃

天冬

麥冬

去心

枳殼

麩炒

桔梗

黃芩

枇杷葉

蜜炙

茵陳蒿

石斛

引用紅棗肉水煎服

方歌 甘露飲治肺火壅生熟地黃二門冬枳桔黃

芩枇杷葉茵陳石斛共煎成

補肺散

白茯苓

阿膠

蛤粉炒

糯米

馬兜鈴

炙甘草

杏仁

炒去皮尖

水煎服

方歌 肺虛補肺散通仙茯苓阿膠糯米攢馬兜鈴

配炙甘草杏仁微炒去皮尖

腎疳

解顱鶴膝齒行遲骨瘦如柴面黑鰲齒齦出血口臭氣足冷腹痛瀉哭啼腎疳先用金蟾治九味地黃繼進宜若逢稟賦氣虛弱調元散進莫遲疑

註

腎屬水色黑主骨患此疳者初必而解顱鶴膝齒遲行遲腎氣不足等證更因甘肥失節久則漸成腎疳故見面色鰲黑齒齦出血口中氣臭足冷如冰腹痛泄瀉啼哭不巴之證

先用金蟾丸治其疳繼以九味地黃丸調補之若稟賦不足者調元散主之

金蟾丸

乾蝦蟇

五個

胡黃連

黃連

各三錢

鶴蝨

二錢

肉豆蔻

煨

苦楝根白皮

雷丸

蘆薈

生

蕪荑

各三錢

右為末麪糊為丸菜豆大雄黃為衣每服十

五丸米湯化下

九味地黄丸

熟地

茱萸肉 各五錢

赤茯苓

澤瀉

牡丹皮

山藥 炒

當歸

川棟子

史君子

各三錢
肉

右為細末煉白蜜為丸如芡實大用滾白水
研化食前服

元散

人參

茯苓

白朮

土炒

山藥 炒

川芎

當歸

熟地黄

茯神

黃耆

炙

甘草 炙

白芍

炒

引用薑棗水煎服

方調元散治稟賦弱參苓白朮乾山藥芎歸熟
歌

地共茯神黃耆甘草同白芍

疳熱

小兒疳疾身發熱輕重虛實當分別初用青蒿飲為宜日久鼈甲散最捷

註

疳疾之證身多發熱治者宜分別輕重虛實治之病初起多實者鼈甲青蒿飲主之日久多虛者鼈甲散主之

鼈甲青蒿飲

銀柴胡

鼈甲炙

青蒿

生甘草

生地黃

赤芍

胡黃連

知母炒

地骨皮

引用燈心水煎服

方歌

疳疾血虛身發熱鼈甲青蒿藥有靈銀柴鼈蒿草地芍胡連知母地骨同

鼈甲散

人參

黃耆炙

鼈甲

炙

生地

熟地

當歸

白芍

炒

地骨皮

水煎服

方歌

瘡疾日久骨熱蒸鼈甲散治效從容參耆鼈

甲生熟地當歸白芍地骨同

腦疔

腦疔多緣受風熱又兼乳哺失調節頭皮光急生
餅瘡頭熱髮焦如穗結鼻乾心煩腮頰腫困倦睛

身汗熱龍膽龍腦丸甚良吹鼻龍腦效甚捷

註

腦疔者因兒素受風熱又兼乳哺失調以致

變生此證頭皮光急腦生餅瘡頭熱毛焦髮

結如穗鼻乾心煩腮頰腫硬固倦睛暗自汗

身熱也腦熱生瘡者龍膽丸主之煩熱羸瘦

者龍腦丸主之外用吹鼻龍腦散吹之其證

自愈

龍膽丸

龍膽草

升麻

苦楝根皮 焙 赤茯苓

防風 蘆薈

油髮灰 各二錢 青黛

黃連 各三錢

右為細末豬膽汁浸糕糊丸如麻子大薄荷湯下量兒大小與之

龍腦丸

龍腦 麝香 各五分

雄黃 一錢 胡黃連 三錢

牛黃 一錢 硃砂 一錢五分

蘆薈 三錢 乾蝦蟇 四錢

右為細末熊膽合丸如麻子大每服三丸薄荷湯下

吹鼻龍腦散

龍腦 麝香 少許 各研細末

蝸牛殼 炒黃 蝦蟇灰

瓜蒂 黃連

細辛 桔梗 各等分

右為細末入磁盒內貯之每取少許吹入鼻
中日吹二次

眼疳

疳熱上攻眼疳成癢澁赤爛胞腫疼白睛生翳漸
遮滿流淚羞明目不睜疎解瀉肝散最妙雲翳清
熱退翳靈日久不瘥當補養逍遙瀉肝二方從

註

眼疳者疳熱上攻於眼故發時癢澁赤爛眼
胞腫疼白睛生翳漸漸遮滿不時流淚羞明
閉目也先用瀉肝散疎解之再用清熱退翳
湯消其翳若日久不瘥法當調補逍遙散或

羊肝散主之

瀉肝散

生地黃

當歸

赤芍

川芎

連翹

去心

梔子

生

龍膽草

大黃

羌活

甘草

生

防風

引用燈心水煎服

方歌瀉肝散治肝熱壅生地當歸赤芍芎連翹梔

子龍膽草大黃羌活草防風

清熱退翳湯

梔子

微炒

胡黃連

木賊草

赤芍

生地

羚羊角

龍膽草

銀柴胡

蟬蛻

甘草生

菊花

蒺藜

引用燈心水煎服

方歌清熱退翳消雲翳梔連木賊芍生地羚羊龍

膽銀柴胡蟬蛻甘草蒺藜

逍遙散

方見癩疔

羊肝散

青羊肝

一具去筋膜切韭葉厚片

人參

羌活

白朮

土炒

蛤粉

各等分

右為細末令勻聽用將藥置荷葉上如錢厚
一層鋪肝一層包固外以新足青布包裹蒸
熟任兒食之如不食者及夏月恐腐壞則晒
乾為末早晚白湯調服服完再合以好為度
若熱者減人參

鼻疳

疳熱攻肺成鼻疳鼻塞赤瘰疼痛難堪浸淫潰爛連
唇際咳嗽氣促髮毛乾熱成血清金化毒效疳蝕
鼻化蟲凡調敷須用鼻疳散吹鼻蟬殼效通仙

註鼻疳者因疳熱攻肺而成蓋鼻為肺竅故發

時自鼻塞赤癢疼痛浸淫潰爛下連唇際成瘡
咳嗽氣促毛髮焦枯也熱盛者宜清金散蔣
氏化毒丹主之蟲蝕者用化蟲丸主之外用
鼻疳散敷之或以吹鼻蟬殼散吹入鼻內

清金散

生梔子

黃芩

枇杷菜

蜜炙

生地黃

花粉

連翹

去心

麥冬 去心 薄荷

元參 生甘草

桔梗

引用燈心水煎服

方歌 清金散治肺壅熱 梔子黃芩枇杷葉生地花

粉翹麥冬薄荷元參甘草桔

蔣氏化毒丹 方見胎赤

化蟲丸

蕪荑 蘆薈 生

青黛 川芎

白芷梢 胡黃連

川黃連 蝦蟇 各等分 灰

右為細末豬膽汁浸糕為丸如麻子大每服二十九丸食後杏仁煎湯下

鼻疳散

青黛 一錢 麝香 少許

熊膽 五分

右為細末乾者用豬骨髓調貼濕者乾上

吹鼻蟬殼散

蟬殼

微炒

青黛

研

蛇蛻皮

灰

滑石

麝香

各等分
細研

右為細末每用菜豆大吹入鼻中日三用之

疔蟲盡出

牙疔

疔成毒熱內攻胃上發齦肉赤爛口鼻血出牙
枯落穿腮蝕唇命多傾攻毒消疔蕪蕒效繼以蘆

管肥兒靈外用牙疔散時上能食堪藥始能生

註

牙疔者因毒熱攻胃而成故熱毒上發齦肉

赤爛疼痛口臭血出牙枯脫落穿腮蝕唇病

勢危急急急用消疔蕪蕒湯瀉其毒熱繼以蘆

薈肥兒丸清其餘熱外用牙疔散時時敷之

自愈總之此證必胃強能食堪勝峻藥始有

生機否則難治也

消疔蕪蕒湯

大黃

芒消

蕪荑

蘆薈生

川連

胡黃連

黃芩

雄黃

水煎服服後便軟及不食者去大黃芒消加石膏羚羊

方歌

蕪荑消疔大黃消蘆薈蕪荑二連標黃芩雄黃一同入能清積熱牙疔消

蘆薈肥兒丸 方見疔疔

牙疔散

人中白

煨存性

綠礬

燒紅

五倍子

各等分炒黑

水片

少許

右為極細末先用水拭淨牙齒再以此散敷之有蟲者加檳榔

脊疔

積熱生蟲蝕脊脊手擊其背若鼓鳴羸瘦脊骨鋸齒狀身熱下利煩渴增十指皆瘡齧爪甲此名脊疔病熱凶蘆薈丸同金蟾散急急調治莫從容

註

脊疔者因積熱生蟲上蝕脊脊也以手擊其

背必空若鼓鳴脊骨羸瘦狀若鋸齒始為脊
疔外證亦身體發熱下利煩渴十指皆瘡頻
齧爪甲其證最為可畏須先以蘆薈丸殺其
蟲繼用金蟾散消其疔隨時調治或可愈也

蘆薈丸

生蘆薈

青黛

硃砂

熊膽

胡黃連

貫衆

地龍

微炒

川黃連

蟬蛻

去足

雷丸

各五錢

麝香

一錢

蝦蟇

一個
酥塗炙焦

右為細末用蝸角肉研和丸如麻子大每服
五丸粥飲下量兒大小與之

金蟾散

蟾

一枚
酥塗炙焦

夜明沙

炒

桃白皮

樗根白皮

地榆

黃蘗

訶黎勒

皮煨

百合

人參

大黃

白蕪荑

胡粉

檳榔

丁香

右為細末每服五分粥飲調下

蛔瘕

過食膩冷並肥甘濕熱生蛔腹內纏時煩多啼時腹痛口脣色變溢清涎腹脹青筋肛濕癢史君散治莫遲延不愈下蟲丸極效蛔退補脾肥兒丸

註 蛔瘕者因過食生冷油膩肥甘之物以致濕

熱生蛔腹中擾動故有時煩躁多啼有時肚

腹攪痛口脣或紅或白口溢清涎腹脹青筋

肛門濕癢也先用史君子散治之不愈下蟲

丸主之若蛔退又當調補其脾肥兒丸主之

史君子散

史君子

十個上炒為末

苦楝子

五個泡去核

白蕪荑

甘草

各一錢

膽汁浸一宿

右為末每服一錢水調服

下蟲丸

苦楝根皮 新白者佳酒浸焙

木香 桃仁 浸去皮尖

綠包貫衆 蕪荑 焙

雞心檳榔 各二錢 輕粉 五分

鶴蝨 炒一錢 乾蝦蟇 三錢 炒黑

史君子 三錢 取肉煨

右為末麩糊成丸如麻子大每服二十九滾

白水下

肥兒丸 方見脾疳

無辜疳

無辜疳傳有二因鳥羽汚衣着兒身或緣乳母病傳染頸項瘡核便利膿蟲蝕臟腑身羸瘦面黃發熱致疳生清熱宜用柴胡飲消疳肥兒效如神

註 無辜疳者其病原有二或因浣衣夜露被無

辜鳥落羽所汚兒着衣後致成此證或因乳

母有病傳染小兒以有此疾其證頸項生瘡

或項內有核如彈按之轉動軟而不疼其中

有蟲如米粉不速破之使蟲蝕臟腑便利膿

血身體羸瘦面黃發熱也治宜完清其熱柴胡飲主之再消其痞以蘆薈肥兒丸主之

柴胡飲

赤芍藥

柴胡

黃連

半夏

薑製

桔梗

夏枯草

龍膽草

浙貝母

黃芩

甘草生

引用燈心水煎服

歌柴胡飲治無辜痞赤芍柴胡川黃連半夏枯

梗夏枯草龍膽浙貝芩草煎

蘆薈肥兒丸 方見肝痞

丁奚疳

遍身骨露號丁奚肌肉乾澁晝夜啼手足枯細面鰲黑項細腹大突出臍尻削身軟精神倦骨蒸潮熱渴煩急化滯五疳消積治補養人參啓脾宜

註

丁奚者遍身骨露其狀似丁故名曰丁奚也其證肌肉乾澁啼哭不已手足枯細面色鰲

黑頭細腹大肚臍突出尻削身軟精神倦怠
骨蒸潮熱燥渴煩急也先用五疳消積丸化
其滯繼用人參啓脾丸理其脾病可漸愈矣

五疳消積丸

八疳良神

史君子肉 五錢 炒

麥芽 炒

陳皮

神麴 炒

山查 各一兩

白蕪荑

黃連

膽草 各三錢

右爲末陳米飯爲丸每服一錢米飲下

人參啓脾丸

人參 五錢

白朮 五錢 土炒

白茯苓 五錢

陳皮 四錢

扁豆 五錢 炒

山藥 五錢 炒

木香 二錢 煨

穀芽 三錢 炒

神麴 三錢 炒

炙甘草 二錢

右研細末煉蜜爲丸重一錢用建蓮湯化下

哺露疳

乳食不節傷脾胃羸瘦如柴哺露成吐食吐蟲多

煩渴頭骨開張哺熱蒸先用集聖消積滯繼用肥
兒甚有靈若還腹大青筋現人參丸服莫從容

註

哺露者因乳食不即大傷脾胃也其證羸瘦
如柴吐食吐蟲心煩口渴頭骨開張日哺蒸
熱先用集聖丸消其積滯再用肥兒丸調理
其脾若哺露日久肚大青筋者又宜攻補兼
施以人參丸主之

集聖丸

蘆薈

微炒

五靈脂

炒

夜明沙

淘洗焙乾

縮砂

木香

陳皮

莪朮

史君子肉

黃連

川芎

酒洗炒

乾蟾

各二錢
炙

當歸

一錢五分

青皮

二錢
製

右為細末用雄豬膽二箇取汁和麩糊為丸
每服一錢米飲送下

肥兒丸

方見脾疳

人參丸

人參

麥冬

去心

半夏

薑製

大黃

微炒

黃耆

炙

茯苓

柴胡

黃芩

炙甘草

川芎

訶黎勒

煨

鼈甲

炙

右為細末煉蜜為丸如麻子大以粥飲下量
兒大小用之

吐證門

吐證總括

諸逆上衝成嘔吐乳食傷胃或夾驚或因痰飲或
蟲擾虛實寒熱要分明

註 嘔吐一證皆諸逆上衝所致也夫諸逆之因

或以乳食過多停滯中脘致傷胃氣不能健
運而上逆也或於食時觸驚停積不化而上
逆也或痰飲壅盛阻隔氣道或虻蟲擾亂懊
懣不安而上逆也總之上逆之因雖不同而

皆能成嘔吐也但病有虛有實有寒有熱治者當於臨證時參合兼見之證審慎以別之庶不誤矣

辨嘔吐噦證

有物有聲謂之嘔有物無聲吐證名無物有聲為噦證分別醫治中病情

註

吐證有三曰嘔曰吐曰噦古人謂嘔屬陽明有聲有物氣血俱病也吐屬太陽有物無聲血病也噦屬少陽有聲無物氣病也獨李杲

謂嘔吐噦俱屬脾胃虛弱潔古老人又從三焦以分氣積寒之三因然皆不外諸逆上衝也治者能分虛實別寒熱以治之自無不曲中病情矣

傷乳吐

乳食過飽蓄胃中乳片不化吐頻頻身熱面黃腹膨脹消乳保和有神功

註

傷乳吐者因乳食過飽停蓄胃中以致運化不及吐多乳片猶如物盛滿而上溢也其證

身熱面黃肚腹膨脹治宜消乳丸保和丸化其宿乳安胃和中節其乳食自然止也

消乳丸

香附

二兩製

神麴

炒

麥芽

各一兩炒

陳皮

八錢

縮砂仁

炒

甘草

各五錢炙

右為細末滴水為丸如粟米大量兒大小服之薑湯化下

保和丸

南山查

三兩

神麴

一兩炒

茯苓

半夏

各一兩薑製

連翹

去心

陳皮

萊菔子

各五錢炒

右為細末麵糊為丸麥芽湯化服

傷食吐

過食傷胃腹脹熱惡食口臭吐酸黏眼胞虛浮身潮熱須服三棱和胃煎

註傷食吐者因小兒飲食無節過食油膩麵食

等物以致壅塞中脘而成也其證肚腹脹熱
惡食口臭煩吐酸黏眼胞虛浮身體潮熱治
宜清胃和中爲主先用三棱丸止其吐再用
和胃湯化其滯而病漸愈矣

三棱丸

三棱

煨

陳皮

半夏

薑製

神麩

各一兩

黃連

薑炒

枳實

麩炒

丁香

各五錢

右研細末麩和爲丸如黃米大每服二十九

食後薑湯下

和胃湯

陳皮

半夏

薑製

縮砂仁

研

蒼朮

炒

厚樸

薑炒

藿香葉

香附

炒

甘草

炙

山查

神麩

炒

引用生薑水煎服

方歌和胃湯治嘔吐頻陳皮半夏縮砂仁蒼木厚
樸藿香葉香附甘草山查神

夾驚吐

食時觸異吐青涎身熱心煩睡不安截風觀音散
極妙止吐定吐丸可痊

註

夾驚吐者多因飲食之時忽被驚邪所觸而
致吐也其證頻吐青涎身體發熱心神煩躁
睡臥不寧先用全蠍觀音散截其風次用定
吐丸止其嘔而病可痊矣

全蠍觀音散

人參 二錢

黃耆 蜜炙

扁豆 炒

茯苓 各五錢

蓮肉 三錢 去心

木香 一錢五分 煨

白芷 二錢

羌活

防風

天麻

全蠍 各三錢 去毒

炙甘草 一錢五分

右為細末薑棗煎湯調服量兒大小與之

定吐丸

丁香 二十一粒

蠟梢 四十九條
去毒

半夏 三個
薑製

右為細末令勻煮棗肉為丸如黍米大每服
七丸金哭煎湯化服

痰飲吐

痰飲壅盛在胸中痰因氣逆嘔吐成眩暈面青吐
涎飲香砂二陳六君寧

註 痰飲吐者由小兒飲水過多以致停留胸膈
變而為痰痰因氣逆遂成嘔吐之證其候頭

白眩暈面青嘔吐涎水痰沫也宜用香砂二

陳湯虛者香砂六君子湯治之

二陳湯 方見呢乳
本方加藿香砂仁

香砂六君子湯

藿香 縮砂仁

白朮 人參
土炒

茯苓 半夏
薑製

陳皮 甘草
炙

引用生薑水煎服

方歌 香砂六君虛痰吐藿香縮砂共白朮人參茯苓及陳皮半夏甘草同煎服

蟲吐

蟲吐胃熱或胃寒色變時疼嘔清涎寒熱當以陰陽辨化蟲加減理中痊

註 蟲吐之證有二有以胃經熱蒸者有以胃經

寒迫者皆能令蟲不安擾亂胃中而作吐也

其證脣色或紅或白胃口時痛時止頻嘔清

涎屬寒屬熱當從陰陽之證辨之熱者化蟲

丸主之寒者加減理中湯主之

化蟲丸

蕪荑 五錢

鶴蝮

苦楝根皮

胡粉

史君子

肉

檳榔

各一兩

枯礬 二錢五分

右為細末麵糊為丸量兒大小用之

加減理中湯

人參

乾薑

白朮 土炒 川椒

引用烏梅一箇水煎服

方歌加減理中寒吐蟲人參乾薑白朮從川椒烏梅伏蟲動煎成服下即安寧

虛吐

虛吐多因胃弱成神倦顛動睡露睛自利不渴頻嘔吐丁沉四君藥最靈

註虛吐之證多因胃氣虛弱不能消納乳食致成此證也其精神倦怠顛門煽動睡臥露睛

自利不渴頻頻嘔吐者以丁沉四君子湯治

三一之原

丁沉四君子湯

人參 白朮 土炒

茯苓 炙甘草

丁香 沉香

引用煨薑水煎服

方歌胃虛嘔吐不思食丁沉四君治最宜參朮苓草補其胃丁香沉香溫其脾

實吐

小兒實吐腹脹滿二便不利痞硬疼發渴思涼吐酸臭三一承氣可收功

註實吐者小兒平素壯實偶而停滯胸腹脹滿

二便秘澁痞硬疼痛口渴思飲寒涼吐多酸

臭也宜用三一承氣湯下之二便利而吐止

矣

三一承氣湯

芒消

生大黃

枳實

麩炒

甘草

生

厚樸

薑炒

引用生薑水煎服

方三一承氣治實吐滯滯通塞功最著芒消相

配生大黃枳實甘草同厚樸

寒吐

朝食暮吐為冷吐乳食不化不臭酸四肢厥冷面脣白薑橘丁萸理中煎

註寒吐者皆因小兒過食生冷或乳母當風取

涼使寒氣入乳小兒飲之則成冷吐之證其
候朝食暮吐乳食不化吐出之物不臭不酸
四肢逆冷面唇色白治當溫中定吐胃微寒
者薑橘散主之寒甚者丁香理中湯主之

薑橘散

白薑 二錢

陳皮 一兩

炙甘草 一錢

右為細末每服一錢溫棗湯調服

理中湯

方見不乳
本方加丁香吳茱萸

熱吐

食入即吐因胃熱口渴飲冷吐酸涎身熱唇紅小
便赤加味溫膽湯可痊

註

熱吐之證或因小兒過食煎燂之物或因乳
母過食厚味以致熱積胃中遂令食入即吐
口渴飲冷嘔吐酸涎身熱唇紅小便赤色治
宜清熱為主加味溫膽湯主之

加味溫膽湯

陳皮

半夏

薑製

茯苓

麥冬

去心

枳實

麩炒

生甘草

竹茹

黃連

薑炒

引用燈心水煎服

方歌熱吐須用溫膽湯陳皮半夏茯苓良麥冬枳

實生甘草竹茹黃連水煎嗜

瀉門

瀉證總括

小兒泄瀉認須清傷乳停食冷熱驚藏寒脾虛殄
水瀉分消溫補治宜精

註

瀉之一證多因脾被濕侵土不勝水而成然
致病之原各異或乳食停滯不化或感受寒
暑之氣或驚邪外觸或藏受寒冷或脾虛作
瀉更有殄瀉水瀉之證致疾之因不同而調
治之法亦異醫者詳細辨之或分消或溫補

因證施治庶不誤矣

傷乳食瀉

乳食過傷瀉酸膿噫臭腹熱脹滿疼口渴惡食溺赤澁保安平胃奏神功

註

傷乳食瀉者因乳食過飽損傷脾胃乳食不化故頻瀉酸膿也噫臭腹熱脹滿疼口渴惡食小便赤澁須用保安丸消其滯次用平胃散和其脾庶積消而瀉止矣

保安丸

香附

醋炒

縮砂仁

各一兩

白薑

炮

青皮

醋炒

陳皮

三棱

莪朮

炙甘草

各五錢

右為細末麵糊為丸量兒大小與之白湯化下

平胃散

方見兜乳

中寒瀉

過食生冷中寒瀉腸鳴脹痛泄澄清面白肢冷懶

飲食理中訶子散堪行

註

中寒瀉者因過食生冷以致寒邪凝結腸鳴
腹脹時復疼痛所瀉皆澄澈清冷面色淡白
四肢逆冷飲食懶進也溫中理中湯主之止
瀉訶子散主之

理中湯

方見不乳

訶子散

訶子

麩煨

肉豆蔻

麩煨

白朮

土炒

人參

茯苓

木香

各一兩

陳皮

炙甘草

各五錢

右為細末每服一錢薑湯調服

火瀉

火瀉內熱或傷暑暴注下迫腹痛疼煩渴瀉黃小
便赤玉露四苓可收功

註

火瀉者皆因藏府積熱或外傷暑氣故瀉時
暴注下迫肚腹疼痛心煩口渴瀉多黃水小
便赤色也先用玉露散清其熱再用四苓湯

利其水庶得其要矣

玉露散

寒水石

石膏 各一兩

甘草 三錢

右爲細末量兒大小溫湯無時調服

四苓湯

茯苓

白朮

土炒

豬苓

澤瀉

引用燈心水煎服

歌 火瀉小便不利通利水除濕用四苓茯苓白

朮豬苓澤瀉燈心爲引共煎成

驚瀉

驚瀉因驚成泄瀉夜卧不安晝惕驚糞稠若膠帶青色鎮驚養脾服通靈

註

驚瀉者因氣弱受驚致成此證其候夜卧不安薑則驚惕糞稠若膠色青如苔治宜鎮心抑肝先以益脾鎮驚散定其驚次以養脾丸理其脾庶可愈矣

益脾鎮驚散

人參 錢半

白朮 土炒

茯苓 各三錢

硃砂 八分

鈞藤 二錢

甘草 五分

右為細末每服一錢燈心湯調服

養脾丸

人參

白朮 土炒

當歸

川芎 各三錢

青皮 醋炒

木香 煨

黃連 薑炙

陳皮 各二錢

神麩 炒

山查

縮砂仁

麥芽 各一錢

右研細末神麩糊為丸如麻子大每服二十丸陳倉米飲下

臍寒瀉

臍寒瀉者多因斷臍失護受寒冷糞色青白腹痛鳴散寒和氣飲極效溫補調中湯最靈

註 臍寒瀉者多因斷臍失護風冷乘入傳於大

腸遂成寒瀉之證其候糞色青白腹痛腸鳴
先用和氣飲溫散之再以調中湯溫補之庶
治得其要矣

和氣飲

蒼朮

紫蘇

防風

赤苓

豆豉

藿香

陳皮

厚樸

薑炒

炙甘草

引用生薑燈心水煎服

方歌

和氣飲具溫散功蒼朮紫蘇共防風赤苓豆

豉藿香葉陳皮厚樸甘草同食則肉筋熱也

調中湯

人參

茯苓

藿香

白朮

土炒

炙甘草

木香

煨

香附

製

縮砂仁

引用煨薑水煎服

方歌 臍寒瀉用調中湯人參白朮煨木香藿香茯苓同香附縮砂炙草引煨薑

脾虛瀉

脾虛食後即作瀉腹滿不渴少精神面黃懶食肌消瘦參苓白朮奏奇勳

註 脾虛瀉者多因脾不健運故每逢食後作瀉

腹滿不渴精神短少面黃懶食肌肉消瘦也

宜用參苓白朮散以補脾其瀉自止

參苓白朮散 方見脾疴

飧瀉

清氣下陷失健運完穀不化飧瀉名補中益氣湯升補久瀉腸滑用四神

註 飧瀉者或因春傷風邪清氣下陷脾失健運

以致完穀不化也治者須補養脾土用補中

益氣湯升其中氣若泄瀉日久腸滑不禁者

用四神丸治之

補中益氣湯

人參

黃耆 蜜炙

當歸

土炒

白朮

土炒

炙甘草

陳皮

升麻

土炒

柴胡

醋炒

引用薑棗水煎服

方歌 殮瀉多因清陽陷補中益氣湯最驗參耆歸

木草陳皮升麻柴胡功無限

四神丸

補骨脂

四兩

五味子

肉豆蔻

各二兩
麩裏煨

吳茱萸

一兩
水浸炒

右為細末生薑棗肉為丸每服一錢米飲下

水瀉

脾胃濕盛成水瀉懶食溇瀉色多黃清濁不分溺

短瀉胃苓升陽陰濕湯

註

水瀉者皆因脾胃濕盛以致清濁不分變成

水瀉之證其候小便短瀉懶食溇瀉色黃宜

用胃苓湯以除濕若瀉久不止則用升陽除

濕湯治之其證自愈

胃苓湯

蒼朮炒

陳皮

厚樸薑炒

白朮土炒

茯苓

炙甘草

肉桂

澤瀉

豬苓

引用生薑紅棗水煎服

方歌濕瀉胃苓湯堪行蒼朮陳皮厚樸同白朮茯苓炙甘草肉桂澤瀉共豬苓

升陽除濕湯

蒼朮炒

陳皮

防風

神麴炒

麥芽炒

澤瀉

炙甘草

升麻

羌活

柴胡

豬苓

引用生薑水煎服

方歌升陽除濕瀉不停蒼朮陳皮共防風神麴麥

芽澤甘草升麻羌活柴豬苓

