



竹武  
595  
38

五十四

五十五





御纂醫宗金鑑卷五十四

幼科雜病心法要訣目錄



痰證總括

燥痰

清氣化痰丸

蘇葶滾痰丸

濕痰

枳桔二陳湯

御纂醫宗金鑑 卷五十四 目錄



桂苓甘朮湯

疝證門

疝證總括

寒疝

烏頭桂枝湯

金菜丸

濕熱感寒疝

烏頭梔子湯

胎疝

十味蒼蘘散

金鈴散

川棟丸

陰腫

疎風五苓散

加味五苓散

導赤散

加味守效丸

小腸氣

加味香蘇散

加味失笑散

胡盧巴丸

淋證門

淋證總括

寒淋

五苓散

熱淋

十味導赤湯

八正散

石淋

金葵子散

八正散

血淋

小蘆飲子

五淋散

頭痛門

頭痛總括

風寒頭痛

清空膏

內熱頭痛

加味茶調散

腹痛門

腹痛總括

食痛

小承氣湯

香砂平胃散

寒痛

木煎理中湯

蟲痛

錢氏安蟲散

加減理中湯

內食外寒腹痛

藿香和中湯

黃疸門

黃疸總括

陽黃

茵陳麻黃湯

茵陳蒿湯

茵陳五苓散

陰黃

茵陳理中湯

茵陳四逆湯

水腫門

水腫總括

風水腫

越婢湯

濕水腫

貼臍法

沉香琥珀丸

風濕腫

疏鑿飲

茯苓導水湯

蘇葶丸

舟車神祐丸

陽水

大聖瀆川散

舟車神祐丸

陰水

實脾散

金匱腎氣丸

腹脹門

腹脹總括

虛脹

香朴四君子湯

實脹

加味平胃散

小承氣湯

吐和平胃

御纂醫宗金鑑卷五十四

編輯幼科雜病心法要訣

痰證門

痰證總括

痰因津液不四布陰盛為飲陽盛痰稠黏黃色為燥熱清稀色白乃濕寒

註

痰者水穀所化之津液不能四布留於胸中而成者也多因飲食無節或乳食過食厚味脾胃不能運化而生若陰氣素盛則化而為



飲陽氣素盛則化而為痰稠黏黃色澁滯難出謂之燥痰清稀色白滑而易出謂之濕痰二者或宜清潤或宜通利治各不同也

燥痰

燥痰肺燥澁難出氣逆喘欬卧不舒向紅口乾小便赤清氣化痰滾痰字

註

燥痰者痰因火動也火盛則痰多燥黏氣逆喘咳夜卧不寧面赤口乾小便黃赤輕者用清氣化痰丸清之重者用蘇葶滾痰丸下之

清氣化痰丸

膽南星

九轉

半夏

各一兩五錢薑製

橘紅

枳實

麩炒

杏仁

炒去皮尖

栝蒌仁

去油

黃芩

酒炒

白茯苓

各一兩

右為細末薑汁為丸淡薑湯化服

蘇葶滾痰丸

方見食積欬嗽

濕痰

濕痰脾濕懶飲食倦怠嗜卧面色黃痰多枳桔二

陳劑飲多桂苓甘朮湯

註

濕痰者因小兒過食生冷油膩之物有傷脾胃遂致脾土虛濕不能運化而成濕痰滑而易出脾虛不運故懶食脾主四肢故倦怠嗜卧脾屬土故面色多黃痰多者宜用枳桔二陳湯加蒼朮白朮除濕化痰飲盛者須用桂苓甘朮湯扶陽散飲調治合宜而痰自化矣

枳桔二陳湯 方見規乳

桂苓甘朮湯

茯苓

桂枝

甘草

生

白朮

土炒

引用生薑水煎服

方歌 桂苓甘朮濕痰飲除濕利飲更扶陽茯苓桂

枝生甘草白朮土炒引生薑

疝證門

疝證總括

諸疝厥陰任脈病外因風寒邪聚凝內因濕熱為寒鬱證皆牽舉引腹疼胎疝多因稟賦病總審熱縱寒痛疼血左不移氣右動濕則墜重虛墜輕

註

厥陰環陰器入少腹任脈起於中極之下以上毛際循腹裏上關元故諸病疝莫不屬之也小兒病此多因先天不足本藏虛弱復因外感風邪內食生冷寒邪凝結而成者有之

或因病濕熱鬱於中復被寒邪束於外邪氣乘虛并於血隊流入厥陰厥陰屬肝其性急速故牽引舉丸小腹絞痛也又有胎疝一證多因孕婦啼泣過傷動於陰氣結聚不散令兒生下即成此證者大抵熱則多縱寒則多痛在血分者不移在氣分者多動濕腫墜則重虛腫墜則輕因證施治自切中病情矣

### 寒疝

寒濕內蓄日已深復被風冷水氣侵囊冷硬痛成

寒疝烏頭桂枝金茱神

註

寒疝者因兒平日過食生冷或卧濕地以致陰結於內氣滯不行爲日既久復爲風冷所束水濕所傷故發時囊冷結硬牽引少腹作痛初得之兼表者以烏頭桂枝湯主之寒甚者以金茱丸治之

烏頭桂枝湯

桂枝

赤芍藥

甘草

烏頭

炙

引用生薑水煎服

方歌烏頭桂枝治寒疝解表溫中法最良廣桂枝

同赤芍藥烏頭甘草引生薑

金茱丸

金鈴子肉 一兩 吳茱萸 五錢

右為細末酒煮麩糊為丸如麻子大每服數

丸鹽湯下

濕熱感寒疝

厚味過度生濕熱復觸風寒疝氣成囊縱紅腫常

刺痛烏頭梔子一服即寧

註小兒平素過食厚味致生濕熱濕熱之氣下

行流入囊中復為風寒所束而疝證成矣發

時囊縱紅腫常常刺痛當以烏頭梔子湯調

治之庶疝可愈矣

烏頭梔子湯

烏頭 梔子 炒

右用順流水入薑汁煎服

方歌濕熱感寒疝氣疼烏頭梔子湯最靈梔子烏

御製醫方全錄 卷五十四  
頭薑汁共順流水煎病即寧

胎疝

胎疝多因母過啼兒生胞硬痛無時輕用十味蒼  
藥治重用金鈴川棟宜

註

胎疝者因孕婦啼泣過傷氣結不散蘊於胞  
中令兒生下胞硬疼痛輕者十味蒼藥散主  
之重者以金鈴散或川棟丸主之

十味蒼藥散

青皮

醋炒

川附子

炮

黃蘗

南山查肉

酒炒

蒼朮

米泔水浸

香附

製

益智仁

元胡索

醋炒

桃仁

甘草

炙

引用小茴香水煎服

方歌 十味蒼藥治胎疝青皮川附藥查蒼香附益

智元胡索桃仁甘草引茴香

金鈴散

三稜

莪木

各三錢

陳皮

赤茯苓 各五錢

茴香 三錢

甘草 二錢

檳榔

枳殼 各三錢

釣藤鈎

青皮 各四錢

南木香 三錢

金鈴子肉 一兩

右除檳榔木香不過火餘焙共為細末每服半錢至一錢無灰酒調服

川棟丸

檳榔 查肉 各三錢

三棱

我朮 各三錢

青皮 醋炒

陳皮 各四錢

川棟肉 八錢

芫花 五分

辣桂 二錢

牽牛 二錢

巴豆 三粒

去油 右為極細末麪糊為丸如麻子大每服三四

丸薑湯送下

陰腫

陰囊腫大邪氣凝風癢濕墜熱多疼疏風五苓導

赤散偏墜守效丸最靈

註

陰器者乃諸筋之總會也因邪客於少陰厥陰之經濕熱之氣與風冷之氣相搏氣不得通故結聚而陰囊腫大總之風盛多癢濕盛多墜熱盛多疼如外腎膚囊腫大癢痛墜下此風濕襲於下也宜疏風五苓散主之如外腎膚囊腫痛光亮此因心火移熱於小腸故也宜加味五苓散或導赤散主之更有偏墜一證或左或右舉丸作腫者此因食積不消濕氣下行故也宜加味守效丸主之

疏風五苓散

防風

蒼朮

米泔水浸

肉桂

羌活

豬苓

澤瀉

赤茯苓

白朮

土炒

引用生薑水煎服

方陰腫疏風五苓散防風蒼朮肉桂羌豬苓澤瀉

瀉赤苓朮煎服之時入生薑



加味五苓散

金鈴子

白朮土炒

澤瀉

木通

茴香炒

赤茯苓

橘核仁

肉桂

檳榔

豬苓

引用生薑燈心水煎服

方歌五苓散內用金鈴白朮澤瀉與木通茴香赤

苓橘核配肉桂檳榔合豬苓

加味守效丸

方見不小便

南星

蒼朮各二兩

山查肉

酒炒

半夏薑製

白芷

神麩各一兩

橘核仁

昆布各五錢

海藻

青皮醋炒

吳茱萸

荔枝核各一兩

元胡索

醋炒

右共爲末神麩糊爲丸如梧桐子大每服三十丸空心酒下

小腸氣

痛引腰脊小腸氣加味香蘇溫散宜上衝心痛失笑散有形胡盧巴丸醫

註小腸氣一證其受病與疝氣等亦因濕氣在

內而寒氣又束於外也發時少腹脹控掣丸引腰脊上衝心痛而不腫是也治宜分別形狀如引腰而痛者加味香蘇散溫散之痛而衝心氣者加味失笑散主之如少腹中有形如卵上下往來痛不可忍者宜胡盧巴丸主之

加味香蘇散

蒼朮 陳皮  
米泔水浸

川棟肉 甘草

蘇葉 香附  
醋炒

引用連鬚葱白水酒兌煎服

方歌加味香蘇散蒼朮廣陳皮與川棟肉甘草蘇

葉香附同連鬚葱白共煎服

加味失笑散

五靈脂

蒲黃

隔紙炒

元胡索

各等分 醋炒

右為細末每服一二錢水酒調下

胡盧巴丸

胡盧巴

炒

川棟子

各四錢 蒸去皮核焙

川烏

去皮臍

巴戟肉

各一錢五分

茴香

三錢

吳茱萸

二錢五分 半酒半醋浸一宿焙

牽牛

二錢 炒

右共為細末酒麪糊為丸如梧桐子大每服

數丸空心溫酒下移膀胱洩無時水道澀滯常

作痛寒熱石血隨證醫

小兒淋證或因風寒襲入或因濕熱下移乘

入膀胱以致水道澀滯欲出不出淋漓不斷

甚至窒塞其間令兒作痛然必辨其為寒為

熱為石為血分別治之則水道宣通淋自愈

矣

葉香附同進

加味失笑散

五靈脂

元胡索

右爲細末每服一二錢

胡盧巴丸

胡盧巴空炒

各四錢

古共爲末酒釀爲丸吹餅餅十大每服

率中

證門

淋證總括

諸淋皆緣寒熱濕下移膀胱洩無時水道澁滯常作痛寒熱石血隨證醫

註

小兒淋證或因風寒襲入或因濕熱下移乘入膀胱以致水道澁滯欲出不出淋漓不斷甚至窒塞其間令兒作痛然必辨其爲寒爲熱爲石爲血分別治之則水道宣通淋自愈矣

寒淋

冷氣入胞成寒淋小便閉塞脹難禁淋漓不斷腹  
隱痛五苓倍桂小茴神

註

寒淋者皆因風寒乘入膀胱致下焦受冷遂  
成寒淋其候小便閉塞脹痛難禁不時淋漓  
少腹隱痛須以五苓散倍加肉桂小茴香治  
之其淋自愈

五苓散

白朮

土炒

澤瀉

豬苓

肉桂

小茴香

赤茯苓

水煎服

方歌五苓治寒淋白朮澤豬苓肉桂加倍用茴香

赤茯苓

熱淋

膀胱蓄熱淋證成十味導赤有奇功小腹脹滿大  
便結急服八正莫少停

註熱淋者膀胱蓄熱而成也小便不通淋漓澀

痛以十味導赤湯主之若少腹脹滿引臍作痛大便秘結者以八正散主之

十味導赤湯

生地

山梔子

木通

瞿麥

滑石

淡竹葉

茵陳蒿

黃芩

甘草

生

豬苓

水煎服

方歌十味導赤藥最靈生地山梔合木通瞿麥滑

石淡竹葉茵陳黃芩草豬苓

山梔子淡竹葉

八正散

方見不小便

石淋

濕熱蓄久石淋成洩如沙石莖中疼輕者須用葵子散重則八正可相從

註

石淋者逢溺則莖中作痛常帶沙石之狀因

膀胱蓄熱日久所致正如湯瓶久經火煉底結白礫也輕則葵子散主之重則八正散主

之

葵子散

桑皮炒

瞿麥

梔子

赤茯苓

木通

車前子

甘草生

葵子

水煎服

方歌葵子散治石淋證桑皮瞿麥山梔仁赤苓木

通車前子甘草葵子共和勻

方見不小便

血淋山梔仁甘草瞿麥黃合蘇煎

血淋心熱傷血分尿血同出莖中疼清利須用小

薊飲莖中痛甚五淋從

註血淋者蓋因心熱傷於血分熱氣傳入於胞

日久則尿血同出遂成血淋莖中不時作痛

須以小薊飲子治之若莖中痛甚者五淋散

主之

小薊飲子

通草

滑石

淡竹葉

當歸

小薊

梔子炒

甘草生

生地

蒲黃

藕節

水煎空心服

方歌

小薊飲子治淋血通草滑石淡竹葉當歸小  
蘗山梔甘生地蒲黃合藕節

五淋散

當歸

赤芍

苦葶藶

黃芩炒

木通

梔子

車前子

淡竹葉

滑石

葵子

甘草生

赤茯苓

引用葱白水煎服

方歌

五淋血淋莖中疼歸芍葶藶芩木通梔子車  
前淡竹葉滑石葵子草赤苓



頭痛門

頭痛總括

小兒頭痛分表裏裏屬內熱表寒風風寒外閉須  
疎散內熱薰蒸以清攻

註

小兒頭痛之證不一有在表在裏之分在表  
者外感風寒也法宜疎散之在裏者內熱薰  
蒸也法宜清解之苟能調治得宜則頭痛自  
除矣

風寒頭痛

風寒頭痛屬太陽上及巔頂額角傍惡寒無汗身發熱加味清空白堪嚙

註

風寒頭痛者乃太陽經受邪也其候惡寒發熱上及巔頂下連額角不時作痛法宜取汗悉以清空膏主之如痛甚者於本方中加細辛熱盛便秘者於本方中加川大黃

清空膏

羌活

防風

柴胡

川芎

黃芩

黃連

甘草

生

引用生薑水煎服

痛甚加細辛

便秘加川大黃

方歌

風熱上攻頭疼痛加味清空膏最良羌防柴芩連草痛甚加辛便秘黃

內熱頭痛

內熱頭痛屬陽明鼻乾目痛齒頰疼清熱加味茶

御纂醫宗金鑑 卷五十四  
調治便秘加入大黃攻

証 胃熱頭痛病在陽明因小兒肥甘無節胃火

上炎故發時鼻乾目痛上至頭下至齒頰痛

無定時宜加味茶調散清之

加味茶調散

荆芥穗

薄荷

黃芩

青茶葉

石膏

生

白芷

川芎

引用生薑水煎服

便秘者加川大黃

方 加味茶調治頭疼胃經積熱上攻冲荆穗薄

歌 兼薄荷茶葉石膏生用芷川芎

証 小兒腹痛其證有四如寒痛食痛蟲痛停食

感寒痛也須隨證施治寒則溫中食助消導

蟲則安蟲停食感寒則消散諸治合宜其痛

自除矣

食痛

治便秘加入大黃攻

熱頭痛病在陽明因小兒肥甘熱滯胃火

上炎故發時鼻乾目痛上至頭下至齒痛

無定時宜加味茶調散清之

加味茶調散

荆芥茶葉石膏主用荳蔻

疳疔和茶醋飲煎寒胃熱煎土文水煎蘇葉

更蘇香吹川大黃

代用主薑水煎

腹痛門

腹痛總括

小兒腹痛有四因食寒蟲動痛相侵停食感寒相

兼痛臨證醫治要詳分

註

小兒腹痛其證有四如寒痛食痛蟲痛停食

感寒痛也須隨證施治寒則溫中食則消導

蟲則安蟲停食感寒則消散調治合宜其痛

自除矣

食痛

印真醫案全錄

卷五十四

編幼科心法

三

食痛傷食心胃痛食入即痛喜飲涼惡食腹滿吐  
便秘承氣平胃酌量嗜

註

食痛者皆因飲食不節積滯不化所致故食  
入即痛也其候喜飲凉水惡食腹滿吐酸便  
秘宜先以小承氣湯下之若下後仍痛者以  
香砂平胃散消導可也

小承氣湯

大黃

枳實

麩炒

厚朴

薑炒

引用生薑水煎服

歌方小承氣湯治腹痛腹硬煩渴便不通枳實厚

朴大黃共煎服便利立時鬆

香砂平胃散

蒼朮

米泔水浸炒

陳皮

厚樸

薑炒

甘草

炙

縮砂

研

香附

醋炒

南山查

神麩

炒

麥芽

炒

枳殼

麩炒

白芍炒

引用生薑水煎服

方歌香砂平胃傷食痛下後仍痛用此和蒼陳朴

草縮香附山查麩麥枳殼芍

寒痛

寒痛中虛脾受寒尿爪俱白面青看喜熱腹滿或下利理中肢厥加附煎

註寒痛者多因小兒中氣虛弱復為風冷所乘

則脾經受寒故不時腹痛現證尿白爪甲白

面色多青喜飲熱或腹滿下利宜理中湯溫之

吐酸若四肢厥冷兼屬少陰則加附子

理中湯方見不乳

蟲痛

蟲痛不安腹中痛面色乍青乍赤白時痛時止吐

清涎安蟲理中湯最合

註蟲痛者因腹中蟲動不安故腹中作痛其候

面色乍赤乍青乍白其痛時作時止時吐清

水切不可妄用攻下當以安蟲為主其痛即

除新痛者錢氏安蟲散治之痛久不愈者加減理中湯治之

錢氏安蟲散

胡粉

炒黃

鶴蝮

炒黃

白礬

枯

川棟子

各二錢五分  
去皮核

右為細末每服一匙大者五分米飲調下痛

中時服

加減理中湯

方見蟲吐

內食外寒腹痛

乳食外感寒發熱惡寒腹痛兼惡食嘔吐多

啼叫藿香和中可急煎

註

小兒內傷乳食外感寒邪遂致食寒凝結腹

中作痛其候發熱惡寒而更兼腹痛惡食嘔

吐啼叫不已者以藿香和中湯治之

藿香和中湯

藿香

砂仁

研

羌活

蒼朮

米泔水浸

陳皮

厚朴

薑炒

甘草

生

山查

香附

炙

白芷

蘇葉

川芎

引用生薑水煎服

方歌藿香和中治腹疼內傷食滯外寒風藿砂羌

蒼陳朴草山查香附芷蘇芎

黃疸門

黃疸總括

黃疸濕熱鬱蒸成徧身皆黃及目睛陽黃色亮身  
多熱陰黃色暗冷如冰

註黃疸一證乃濕熱鬱久外發肌膚而然也其

候徧身面目皆黃甚則深黃面如烟薰之狀

其中又有陰陽之別如面紅口渴尿赤色亮

身熱者乃脾家濕熱此陽黃也口不渴而色

暗黃身冷如水者乃脾腎寒濕此陰黃也治



者宜分別施治

陽黃

陽黃無汗宜踈散茵陳麻黃能發汗腹滿便秘茵陳攻表裏無證茵苓善

註

陽黃一證原因濕熱而成治者當詳審之如

表實無汗宜外發其汗茵陳麻黃湯主之使黃從表解也裏實二便秘瀆腹滿者宜茵陳蒿湯下之使黃從裏解也若表有汗裏不便秘腹滿是表裏無證不可汗下惟利小便宜

用茵陳五苓散使黃從水道利之則愈

茵陳麻黃湯

茵陳蒿

麻黃

水煎加黃酒少許服之

方歌兒發陽黃身無汗茵陳麻黃湯極便麻黃茵

陳各等分量兒煎服有奇驗

茵陳蒿湯

茵陳蒿

川大黃

梔子

引用燈心水煎服

方歌裏實須用茵陳湯 梔子茵陳生大黃 燈心為

引水煎服便利黃消體泰康

茵陳五苓散

茵陳蒿

赤苓

豬苓

澤瀉

白朮

土炒

肉桂

引用燈心水煎服

方歌茵陳五苓治黃病 利水除濕有奇功 朮苓澤

瀉豬苓桂茵陳加入便自清

陰黃

陰黃多緣轉屬成脾濕腎寒兩虧生溫脾茵陳理  
中治溫腎茵陳四逆靈

註

陰黃者乃脾濕腎寒兩虛而成此最為危候  
溫脾去黃以理中湯加茵陳主之 溫腎去黃  
以茵陳四逆湯主之

茵陳理中湯

方見不乳

茵陳四逆湯

附子製

乾薑

茵陳蒿

甘草炙

水煎服

方歌

茵陳四逆湯附子共乾薑茵陳炙甘草黃消

病漸康

水腫門

水腫總括

水腫俱屬脾肺經肺喘脾脹要分明上腫屬風宜

汗散下腫屬濕利水靈通身腫者兼汗利喘則逐

飲脹則攻再辨陽水與陰水攻瀉溫補貴變通

註小兒水腫皆因水停於脾肺二經水停胸中

則喘水停膈下則脹其間所腫部位不可不

察如腫在腰以上者屬風法宜發汗腫在腰

以下者屬濕法宜利水有通身上下皆腫者

係風濕兩傷法宜汗利兼施腫而喘不得卧  
宜逐肺飲腫而脹滿便秘宜攻脾水腫從腹  
起至四肢者可治腫從四肢起至腹者不可  
治然又有陽水陰水之分宜詳別焉陽水屬  
實法宜攻泄陰水屬虛法宜溫補應證而施  
自無不效也

風水腫

腫在上者因風起急宜發汗莫從容越婢湯中加  
蒼朮汗後全消病即寧

上身腫者頭面四肢皆腫也病因外  
感風邪法宜發汗則愈經所謂開鬼門是也  
以越婢加蒼朮湯治之

越婢湯

麻黃

石膏

甘草

蒼朮

米泔水浸

水煎服

方越婢湯治風水腫麻黃甘草共石膏再加蒼  
朮水煎服能使兒童腫即消

濕水腫

腫在下者因濕起急宜利水可安然外法貼臍如神妙內服沉香琥珀丸

註 下身腫者腰臍至兩足皆腫也病因脾經濕

熱所成急用利水之法經所謂潔淨府是也

外用貼臍法內服沉香琥珀丸

貼臍法

巴豆

四錢 去油

水礬粉

二錢

硫黃

一錢

右研勻成餅先用新棉一片包藥布臍上外用帛縛時許自然瀉下惡水待下三五次去

藥以粥補住

沉香琥珀丸

苦葶藶子

一兩五錢

郁李仁

一兩五錢 去皮

防已

七錢五分

沉香

一兩五錢

陳皮

七錢五分 去白

琥珀

五錢

杏仁

五錢 去皮尖炒

蘇子

五錢

赤苓

五錢

澤瀉

五錢

御纂醫宗全錄 卷五十四  
共爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大以麝香爲衣每服一錢量兒大小與之用滾白水下

### 風濕腫

通身皆腫屬風濕外散內利最相宜峻攻則用疏鑿飲和劑茯苓導水醫水上攻肺喘不卧蘇葶定喘最相宜水停中州脹急滿舟車神祐量攻之

註通身腫者頭面手足皆腫也得病之由內停

濕飲外感風邪風濕相搏水道不利外攻肌表因而作腫也重者用疏鑿飲峻攻之輕者用茯苓導水湯和解之若水停上攻於肺喘急不得卧者以蘇葶丸瀉之水停中州脹滿者以舟車神祐丸攻之

### 疏鑿飲

商陸

秦艽

羌活

椒目

木通

赤小豆

茯苓皮

大腹皮

澤瀉

檳榔

引用薑皮水煎服

方歌疏鑿飲子風濕腫外發內利陸秦羌椒目木

通赤小豆荅皮大腹澤檳榔

荅荅導水湯

紫蘇

陳皮

白木

土炒

木香

桑白皮

炒

麥冬

去心

赤荅荅

澤瀉

木瓜

大腹皮

縮砂仁

檳榔

引用燈心水煎服

方歌和解荅荅導水湯紫蘇陳皮木木香桑皮麥

冬赤荅澤木瓜大腹縮檳榔

蘇葶丸

方見痰飲喘急

舟車神祐丸

甘遂

芫花

大戟

各一兩俱醋炒

大黃

二兩

黑牽牛

四兩頭末

青皮

炒

陳皮

木香

檳榔

各五錢

輕粉

一錢

右爲細末水丸如椒目大小兒二丸三丸大兒五丸七丸量服之滾白水送下

陽水

陽水身熱瓠沉數小便赤濇大便難熱盛煩渴濇川散濕盛脹滿神祐丸量兒大小斟酌用應變而施勿一偏

註

陽水者小兒濕熱內鬱水道阻塞外攻肌表

以致外腫內脹發熱口渴心煩小便短赤大便秘結法當泄水不可少緩熱盛煩渴者以大聖濇川散攻之濕盛脹滿者舟車神祐丸攻之須量兒大小視病輕重合宜而用勿執一偏過於峻攻徒傷正氣也

大聖濇川散

川大黃

煨

牽牛

取頭末

郁李仁

各一兩

木香

三錢

芒消

三錢

甘遂

五分



右爲細末薑湯調下量兒大小用之

舟車神祐丸 方見風濕腫

陰水

陰水便利不煩熱須服實脾腎氣丸若服溫補俱無驗攻補兼施病始痊

註

陰水者因脾腎虛弱也脾虛不能制水腎虛不能主水以致外泛作腫內停作脹若二便不實身不熱心不煩者宜用實脾散金匱腎氣丸若服溫補之藥而無效驗者則是虛中有實也欲投攻下之劑恐小兒難堪若不攻之又豈可坐以待斃須攻補兼施或一補一攻或三補一攻或九補一攻審其進退俟有可攻之機以意消息藥與元氣相當始能逐邪而不傷正也必須忌鹽醬百日方可收功

實脾散

草果仁 研

大腹皮

木瓜

木香 研

厚朴

薑炒

乾薑

附子

製

白朮

土炒

茯苓

甘草

炙

引用棗二枚水煎服

方歌實脾散治陰水腫草果大腹木瓜香厚朴薑

附朮苓草虛者仍兼腎氣方

金匱腎氣丸

熟地黃

一兩

山藥

八錢炒

山茱萸

八錢

牡丹皮

五錢

茯苓

一兩

澤瀉

五錢

肉桂

五錢

淡附子

五錢

車前子

五錢

牛膝

八錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服錢半

理氣白滾水送下自然寧

註腹脹之病脾胃二經主之有虛有實宜分晰

焉虛者因久病內傷其脾實者因飲食停滯

於胃虛則補脾實則消導調治合宜其脹自

漸除矣

虛脹

附子 製

白木

茯苓

甘草

引用棗二枚水煎服

白芍水送下

白芍水送下

白芍水送下

古為酥末熱蜜為丸咬碎酥干大再咀幾半

車前子

杜蘅皮

肉桂

澤瀉干

白芍

甘草

腹脹總括

白木

腹脹脾虛因久病胃實多由食滯停補虛健脾兼

理氣攻食消導自然寧

註 腹脹之病脾胃二經主之有虛有實宜分晰

焉虛者因久病內傷其脾實者因飲食停滯

於胃虛則補脾實則消導調治合宜其脹自

漸除矣

虛脹

久病脾虛失運健或因吐瀉暴傷脾食少即脹精神倦面黃肌瘦四君宜

註凡小兒久病脾虛或吐瀉暴傷脾氣健運失

常所以飲食不化食少腹即脹滿現證精神

倦怠面黃肌瘦此虛脹也宜用香朴四君子

湯治之

香朴四君子湯

人參

白朮

土炒

白茯苓

甘草

炙

香附

製

厚樸

薑炒

引用生薑水煎服

方歌香朴四君治虛脹參朮甘草共茯苓香附厚

朴宜加入引薑煎服脹即寧

實脹

飲食過度內傷胃停滯腹脹便不通潮熱煩渴形

氣壯平胃承氣施治靈

註小兒飲食過度則胃中停滯以致腹脹大便

不利身體潮熱心煩口渴形氣壯實此實脹

也輕者平胃散主之重者小承氣湯主之

加味平胃散

南蒼朮

炒

厚樸

薑炒

大腹皮

製

甘草

生

陳皮

萊菔子

焙

山查

麥芽

炒

神麴

炒

引用生薑水煎服

方歌加味平胃治實脹蒼朮厚朴大腹皮甘草陳

皮萊菔子山查麥芽炒神麴

小承氣湯

方見食痛

御製醫宗金鑑卷五十五

編輯幼科雜病心法要訣目錄

發熱門

諸熱總括

表熱

十神湯

雙解通聖湯

裏熱

調胃承氣湯

白虎湯

黃連解毒湯

虛熱

補中益氣湯

竹葉石膏湯

白通湯

實熱

涼膈散

大柴胡湯

滯門

積滯總括

乳滯

消乳丸

食滯

木香大安丸

小承氣湯

癖疾門

癖疾總括

癖疾

千金消癖丸

木香丸

紅花膏

汗證門

汗證總括

自汗

玉屏風散

桂枝加附子湯

白虎湯

調胃承氣湯

盜汗

酸棗仁湯

當歸六黃湯

失血門

失血總括

衄血

麻黃湯



桂枝湯

犀角地黄湯

四物三黃瀉心湯

髮灰散

吐血

犀角地黄湯

桃仁承氣湯

加味四物湯

鷄蘇散

加味救肺散

便血

皂刺大黃湯

槐花散

平胃地榆湯

升陽和血湯

人參養榮湯

瀉血

牛膝四物湯

雜證門

二便秘結

八正散

神芩丸

氣虛脫肛

補中益氣湯

真人養藏湯

溢腸散

肛腫翻肛

皂刺大黃湯

曾氏蟠龍散

龜胸

寬氣飲

百合丹

龜背

松蘿丹

五軟

補腎地黃丸

扶元散

五鞭

小續命湯

烏藥順氣散

加味六君子湯

五遲

加味六味地黃丸

補中益氣湯

芎勝丹

菖蒲丸

鶴膝風

大防風湯

補腎地黃丸

解顛

補腎地黃丸

扶元散

封顛散

顛陷

補中益氣湯

固真湯

烏附膏

頤填

瀉青丸

大連翹飲

防風升麻湯

理中湯

中惡

蘇合香丸

編輯幼科雜病心法要訣

入門

諸熱綱括

山香證切脈有妙訣表證須汗裏下之虛則宜  
則瀉平昔體認要精詳方得臨時無遺闕  
小兒發熱有表裏虛實之異治亦有汗下補  
瀉之殊須觀形察色審證切脈以別之權在

補中益氣湯

固真湯

烏附膏

烏附膏

烏附膏

烏附膏

烏附膏

烏附膏

蘇合香丸

醫宗金鑑卷五十五

編輯幼科雜病心法要訣

發熱門

諸熱總括

小兒有病多發熱表裏虛實宜分別觀形察色辨  
因由審證切脈有妙訣表證須汗裏下之虛則宜  
補實則瀉平昔體認要精詳方得臨時無遺闕

註 小兒發熱有表裏虛實之異治亦有汗下補

瀉之殊須觀形察色審證切脈以別之惟在

平昔講習精詳臨證庶不致悞

表熱

表熱之證因外感風浮發熱惡風寒頭痛身疼而無汗十神通聖表為先

註

小兒外感寒邪風浮發熱惡風寒頭疼身痛無汗此表熱也宜十神湯主之若兼內熱者雙解通聖湯兩解之

十神湯

升麻

葛根

麻黃

香附

醋炒

陳皮

蘇葉

赤芍藥

川芎

香白芷

甘草

生

引用生薑水煎服

方歌十神湯治表熱證升麻乾葛共麻黃香附陳

皮蘇葉芍芎芷甘草引生薑

雙解通聖湯

方見傷寒

裏熱

裏熱之證因內熱徧身蒸熱小便紅面赤唇焦舌燥渴調胃白虎解毒清

註小兒肥甘過度必生內熱以致發熱蒸蒸小便赤濇面赤唇焦舌燥而渴脈實有妨者先以調胃承氣湯下之不愈用白虎湯或黃連解毒湯清之

調胃承氣湯

大黃

芒消

甘草

引用生薑水煎服

方歌調胃承氣治裏熱大黃甘草共芒消引用生薑水煎服大便通利熱自消

白虎湯

石膏

煨

知母

生

甘草

生

粳米

水煎服

方歌胃熱白虎湯知母生用良石膏合甘草粳米共煎嗜

黃連解毒湯

黃芩

黃連

梔子

黃蘗

水煎服

方歌黃連解毒湯清熱效非常芩連梔子蘗煎服

保安康

虛熱

虛熱病後營衛弱神倦氣乏用補中嘔渴竹葉石膏

膏治面赤尿白厥白通

註虛熱者因小兒病後氣血虛弱營衛尙未調

勻之故其證神倦氣乏宜用補中益氣湯治

之若兼口渴引飲而嘔者宜用竹葉石膏湯

治之又有陰盛格陽外浮發熱者其面色雖

赤然小便必清白四肢必厥逆宜用白通湯

收斂陽氣熱退自愈

補中益氣湯

方見殭泄

竹葉石膏湯

竹葉

石膏  
煨



人參

麥冬

去心

甘草

生

半夏

薑製

粳米

引用生薑水煎服

方歌 病後虛熱煩渴嘔皆因氣弱胃津亡竹葉石

膏參麥草半夏粳米共生薑

白通湯

乾薑

附子

製

葱

水煎服

方歌 虛熱原於陰格陽真寒假熱白通湯散寒薑

附葱白莖厥回熱退自然康

實熱

實熱積熱午潮熱腹脹尿紅大便難煩渴口瘡腮  
頰赤涼膈大柴效通仙

註 小兒有餘積熱以致午後潮熱蒸蒸有汗肚

腹脹滿小便赤大便難煩渴啼叫口舌生瘡

腮頰紅赤脈洪數有力法宜清熱通利時時

熱者涼膈散主之  
年後潮熱者大柴胡湯主之

涼膈散

方見急驚風

大柴胡湯

方見傷寒

五瀉門

積滯總括

小兒養生食與乳搏節失宜積滯成停乳傷食宜分晰因證調治保安寧

註夫乳與食小兒資以養生者也胃主納受脾

主運化乳貴有時食貴有節可免積滯之患

若父母過愛乳食無度則宿滯不消而病成

矣醫者當別其停乳傷食之異臨證斟酌而

施治焉

乳滯

嬰兒乳滯睡不安多啼口熱吐驚煩肚脹腹熱便酸臭慎攻宜用消乳丸

註 乳滯之兒其候睡卧不寧不時啼叫口中氣

熱頻吐乳片肚脹腹熱大便酸臭也但臍臑

嬌嫩不可過攻惟宜調和脾胃為上以消乳

丸消導之

消乳丸 方見傷乳吐

食滯

凡食滯任意餐頭溫腹熱便膿酸嘔氣惡食煩

渴大安承氣審宜先

註 小兒恣意肥甘生冷不能運化則腸胃積滯

矣其證頭溫腹熱大便酸臭嘔氣惡食煩不

安眠口乾作渴滯輕者宜木香大安丸消導

之滯重便秘者宜小承氣湯攻下之

木香大安丸

木香

黃連

陳皮

白木

土炒

枳實

麸炒

山查肉

各三錢

連翹

二錢  
去心

神麩

炒

麥芽

各三錢  
炒

砂仁

萊菔子

各二錢  
焙

右為細末神麩糊為丸每服一錢陳倉米湯

下

小承氣湯

方見食滯

疝疾門

疝疾總括

疝疾過食腸胃滿濁液外溢被寒凝潮熱飲冷肌  
削瘦腹滿硬塊面黃青

註

疝疾一證皆因飲食過節腸胃填滿濁汁外  
溢復感寒氣凝結而成每生於左脇之下始  
如鷄卵堅硬成塊漸如覆盆之形越臍則難  
治矣其候身體潮熱喜飲凉水肌膚削瘦面  
色青黃也治者宜詳察之

癰疾證治

癰疾潮熱渴飲冷肚大青筋堅硬疼內服消癰木香效外貼紅花膏最靈

註 癰疾之始作也午後潮熱口渴飲冷肚大青

筋漸至而堅硬成塊不時作痛內以千金消癰

丸治之或以貼紅花膏內外兼治其癰自消若

無熱渴者先以木香丸治之外亦以紅花膏

貼之

千金消癰丸

蘆薈

阿魏

另為糊

青黛

木香

厚朴

薑炒

檳榔

陳皮

甘草

各一錢生

史君子

去殼

胡黃連

山查肉

香附

醋炒

三棱

醋炒

莪朮

各二錢醋炒

水紅花子

神麴

炒

麥芽

各四錢炒

人參

白木

土炒

茯苓

各三錢

右為細末將阿魏一錢白水和麩打糊為丸  
菜豆大米飲下量見大小服之

木香丸

木香

蓬莪朮

縮砂仁

青皮

硃砂

各二錢  
研細

右為細末和勻飛白麩糊和丸麻子大每服  
二三丸乳傷乳飲下食傷以所傷物熬湯下

紅花膏

沒藥

五錢

血竭

麝香

阿魏

各三錢

當歸

赤芍

各一錢

水紅花料

一捆煎汁去  
渣燉膏一碗

右為細末入膏內攪勻以青布攤貼患處

古為味末人膏內對以青衣對胡專氣

水珠芬林香嫩膏一兩  
一附施行主

當歸

赤芍 各一錢

藜香

阿膠 各二錢

芫花 正藥

血虛

珠芬膏

汗證門 汗證總括 白汗證總括 胃本虛寒

白汗證總括 胃本虛寒

自汗屬陽有虛實或因胃熱或表虛睡中盜汗為

陰弱心虛血熱隨證醫

註 汗乃人之津液存於陽者為津存於陰者為

液發洩於外者為汗若汗無故而出者乃因

陰陽偏勝也如小兒無因而汗自出者謂之

自汗自汗屬陽有虛實之別虛者汗出翕翕

發熱惡寒乃表虛也汗出蒸蒸發熱不惡寒

乃裏熱也表虛者法當固表裏實者法當攻  
熱又有睡則汗出覺則汗止謂之盜汗盜汗  
主陰虛然當分心虛不固心火傷陰也心虛  
當補心心熱當涼血治者宜詳辨之庶無差  
謬

自汗

表虛自汗玉屏風甚者桂枝加附從裏實自汗用  
白虎便秘調胃承氣攻

註 表虛濺濺自汗玉屏風散主之若亞寒冷陽

氣虛也桂枝湯加附子固之陽明裏實蒸蒸

自汗用白虎湯清之便秘者以調胃承氣湯

白虎攻之

玉屏風散

黃耆 蜜炙 防風

白朮 土炒

水煎服

方表氣虛弱時自汗玉屏風治頗相宜黃耆防

風炒白朮水煎溫服不拘時



桂枝加附子湯

白芍藥

桂枝

甘草

附子

引用薑棗水煎服

方歌表氣虛弱甚桂枝湯最良芍藥桂枝草加附

病漸康

白虎湯

方見裏熱

調胃承氣湯

方見裏熱

盜汗

黃藥盜汗睡多驚酸棗仁湯服即寧心火傷陰必

當歸六黃湯奏功

論

盜汗有二虛實兩分心虛者陰氣不斂也睡

則多驚以酸棗仁湯主之心熱者火傷於陰

也身多煩熱以當歸六黃湯主之

酸棗仁湯

當歸

白芍

生地

茯苓

酸棗仁

炒

知母

炒

黃蘗炒

五味子

人參

黃耆炙

水煎服

方酸棗仁湯治盜汗陽不能藏陰本虛歸芍生

地茯苓棗知藥五味共參耆

當歸六黃湯

當歸

熟地黃

黃蘗

黃耆炙

引用浮麥水煎服

方當歸六黃治盜汗陽盛傷陰液自流生熟一

地苓連蘗歸耆浮麥汗能收

此等數種諸病皆由血分不調所致  
 凡失血之證陽盛乘陰則血為熱迫不能安  
 於脈中犯於氣分妄行不能歸入經脈也若  
 血病傷及於腑者則血滲入腸胃之濁道上  
 行於咽出而為吐為衄下從二便而出為便  
 濁道傷於藏者溢出清熱犯陽絡上吐衄熱侵陰  
 絡下失紅又有勞勞成血病血止仍嗽勢多凶  
 凡失血之證陽盛乘陰則血為熱迫不能安  
 於脈中犯於氣分妄行不能歸入經脈也若  
 血病傷及於腑者則血滲入腸胃之濁道上  
 行於咽出而為吐為衄下從二便而出為便  
 濁道傷於藏者溢出清熱犯陽絡上吐衄熱侵陰  
 絡下失紅又有勞勞成血病血止仍嗽勢多凶

失血門

失血總括

陰乘陽熱血妄行血犯氣分不歸經血病及腑滲  
 濁道傷於藏者溢出清熱犯陽絡上吐衄熱侵陰  
 絡下失紅又有勞勞成血病血止仍嗽勢多凶  
 凡失血之證陽盛乘陰則血為熱迫不能安  
 於脈中犯於氣分妄行不能歸入經脈也若  
 血病傷及於腑者則血滲入腸胃之濁道上  
 行於咽出而為吐為衄下從二便而出為便

爲溺也若血病傷及於藏者則溢出於胸中  
之清道上從喉出而兼咳嗽下從精竅而出  
爲溺血也夫血藏於臟內行於脈中流於軀  
殼之內不可得而見也非損傷不能爲病而  
損之之因有三一曰熱傷陽絡腑病也熱傷  
陰絡藏病也宜以清熱爲主一曰勞傷宜以  
破逐爲主一曰勞傷宜以理損爲主若日久  
血止而咳嗽不休者主必死之證故勢多凶  
也

取血黃芩

衄血之候鼻乾燥身熱不渴苦頭疼失表分汗麻  
桂治內熱犀角瀉心清黃芩草

註

衄血者鼻中出血也其候鼻中乾燥身熱不  
渴苦頭痛是熱傷陽絡也有因傷寒失汗衄  
血者乃熱鬱於營其身無汗宜以麻黃湯汗  
之身有汗者宜以桂枝湯解之設無表病因  
內熱而衄者宜以犀角地黃湯清之熱盛者  
四物三黃瀉心湯瀉之外俱用髮灰散或黑

梔子末吹鼻其衄自止

麻黃湯

麻黃

杏仁

炒去皮尖

桂枝

甘草

生

引用生薑水煎服

方歌

傷寒失表營鬱熱身體無汗血妄行須用麻

黃湯調治桂枝麻黃杏草同

桂枝湯

方見自汗

犀角地黄湯

牡丹皮

芍藥

犀角

略末入煎 生地黃

煎水煎服

便硬者加川大黃

方歌

犀角地黄湯治衄效非常丹皮芍犀地便秘

加大黃

四物三黃瀉心湯

川芎

當歸

酒洗

生地黃

赤芍藥

黃芩

黃連

川大黃

酒洗

水煎服

方四物三黃瀉心湯熱盛吐衄功最良芩歸生

歌地赤芍藥黃芩黃連川大黃

髮灰散

取壯實人頭髮陰陽瓦煨成灰放在地上去火性研細末吹入鼻中血衄自止

吐血

勞傷承氣四物嗜勞傷有熱雞蘇散無熱須

用救肺良

註小兒吐血不咳嗽者多因內熱致血妄行上

逆也宜以犀角地黃湯主之若因勞勞吐血者則兼咳嗽先用桃仁承氣湯以破逐之次用加味四物湯和之又有勞傷吐血者亦兼咳嗽痰中帶血有熱者雞蘇散主之無熱者

救肺散主之

御纂醫宗金鑑 卷五十五

犀角地黄湯 方見本門衄血

桃仁承氣湯

桃仁 去皮尖研 大黃

芒消 甘草

桂枝

加當歸芍藥蘇木紅花

水煎服

方歌 努傷吐血先破逐桃仁承氣湯妙絕桃仁黃

消草桂枝加入歸芍蘇紅捷

四物湯

當歸 芍藥

川芎 生地黃

茅根 蒲黃

牡丹皮 梔子 炒黑

甘草 生

引用蘼節酒水煎服

方歌 努傷吐血須活血四物為主真妙訣再加茅

根與蒲黃丹皮梔草引藕節

御纂醫宗金鑑 卷五十五 經幼科心法要訣 七

雞蘇散

雞蘇薄荷葉

川貝母

去心

麥門冬

去心

桔梗

阿膠

蛤粉炒

生地黃

甘草

生

黃耆

炙

白茅根

蒲黃

炒

水煎服

方歌 勞傷有熱嗽痰血雞蘇貝母麥門冬桔梗阿

膠生地草黃耆茅根蒲黃同

小味救肺散

麥冬

去心

人參

黃耆

炙

鬱金

五味子

當歸

酒洗

白芍藥

酒炒

川貝母

去心研

甘草

炙

馬兜鈴

水煎服

方歌 勞傷無熱嗽痰血加味救肺麥門冬參耆鬱

金五味子歸芍貝母草兜鈴



便血

熱傷陰絡病便血藏毒血黯腸風紅須辨腹痛肛  
腫痛熱盛濕盛要分明藏毒初起腫痛甚大黃皂  
刺莫消停熱盛俱宜槐花散濕盛平胃地榆靈日  
久脈微氣血弱升陽和血共養榮

註

大便下血皆因小兒恣食肥甘致生內熱傷  
陰絡也若血色黯而濁肛門腫痛先血後糞  
此為近血名曰藏毒若血鮮而清腹中不痛  
先糞後血此為遠血名曰腸風藏毒肛門每

多腫痛初起宜用皂刺大黃湯消之大下血  
後熱盛微痛者以槐花散和之濕盛不痛者  
以平胃地榆湯和之腸風亦宜以槐花散主  
之便血日久脈微氣血弱者升陽和血湯和  
之繼以人參養榮湯補之

皂刺大黃湯

皂刺

生川大黃

各等分

量小兒年歲大小虛實酌其多少水酒煎服

槐花散

槐花 炒

側柏葉

枳殼 麩炒

川黃連

荊芥穗 炒

水煎服

臟毒加蒼朮苦楝

腸風加秦艽防風

方歌臟毒腸風槐花散黃連枳殼槐栢荊臟毒蒼

朮苦楝入腸風須加艽防風

平胃地榆湯

蒼朮 炒

陳皮

厚朴 薑炒

甘草

地榆

引用生薑水煎服

方歌便血濕盛腹不痛須用平胃地榆湯蒼朮陳

皮厚樸草地榆同煎引生薑

升陽和血湯

黃耆 炙

當歸 酒洗

白芍 炒

牡丹皮



濁血多緣精竅病尿血分出莖或疼牛膝四物湯  
調治急宜煎服效從容

許 濁血為精竅之病乃尿與血先後分出者也  
宜用牛膝四物湯治之其證自愈

牛膝四物湯

牛膝

木通

鬱金

甘草梢

瞿麥

當歸

川芎

生地黃

赤芍藥

水煎服

方歌

小兒濁血精竅病宜用牛膝四物湯牛膝鬱

金通瞿草歸芎赤芍生地黃

金匱要略

小兒熱結二便秘口渴舌乾唇面紅八正散主之

水煎服

御製醫宗金鑑

小兒熱結二便秘口渴舌乾唇面紅八正散主之

腹滿神芴便秘腹脹疼

註此證多因乳食停滯生熱結於腸胃以致二

黃便秘結其候舌乾口渴面赤唇焦也熱積則

黃小便秘瀉少腹滿急宜八正散主之若食積

六便秘腹脹痛者宜神芴丸主之

八正散 方見不小便

神芎丸

大黃

滑石

各一兩  
水飛

薄荷

川芎

各四錢

黃芩

黃連

各五錢  
生

牽牛

四錢

共為細末滴水為丸每服五丸蜜湯化下

氣虛脫肛

瀉痢日久中氣陷肛鬆腸薄滑而脫面色青黃指

梢冷脈來沉細唇淡白補中益氣湯升舉真人養

胃湯脫肛外用瀉腸散調敷氣升肛泄腸自合

註脫肛一證因瀉痢日久中氣下陷腸胃薄瘦

遂令肛門滑脫不收現證面色青黃指梢冷

脈沉細唇色淡白宜溫補為主先以補中益

氣湯升提其氣再以真人養藏湯溫補用滑

外以瀉腸散摻之則氣升肛泄而腸自收矣

補中益氣湯

方見發瀉

真人養藏湯

方見寒痢

瀉腸散

訶子

赤石脂

龍骨 各等分 煨

白為細末用臘茶調敷和藥摻腸頭上綿帛  
揉入

肛腫翻肛

積熱肛腫大便難努力肛出翻不還外用蟠龍散  
消腫內宜皂刺大黃煎

許小兒積熱太盛以致肛門作腫大便艱難努  
力翻出肛脫不還外用蟠龍散消其腫內服

杏皂刺大黃湯其腫一消肛自收矣

皂刺大黃湯 方見便血

曾氏蟠龍散

乾地蟠龍 一兩畧 去土焙 風化朴消 二錢

右判研為細末仍和勻朴消每以二錢至三  
錢肛門濕潤者乾塗乾燥者用清油調塗先  
用荆芥生葱煎水候溫洗浴輕與拭乾然後

敷藥

龜胸

肺積痰熱病龜胸胸骨高聳若龜形氣急喘咳體羸瘦寬氣百合酌量行

註龜胸一證多因小兒飲食不節痰熱熾盛復為風邪所傷風熱相搏以致肺經脹滿攻於胸膈高如覆杯現證咳嗽喘急身體羸瘦治宜清肺化痰為主先以寬氣飲開其氣道再以百合丹除其壅滯肺熱清而脹滿自除矣

寬氣飲

杏仁

去皮尖炒

桑白皮

炒

紅

蘇子

炒

枳殼

麩炒

枇杷葉

蜜炙

麥門冬

去心

生甘草

苦葶藶

水煎服

方歌

寬氣飲治見龜胸杏仁桑皮合橘紅蘇子枳

殼枇杷葉甘草葶藶麥門冬

百合丹

百合

天門冬



杏仁 炒去皮尖 木通

桑白皮 炒 甜葶藶

石膏 各五錢 大黃 三錢

共為細末煉蜜丸如菉豆大量兒大小服之  
臨臥滾白水送下

龜背

龜背坐早被風吹偃僂背高狀如龜內服松蓋丹  
緩治外用灸法點龜尿

註 龜背者因嬰兒坐早被客風吹入脊脊遂致

偃僂曲折背高如龜往往為終身痼疾內以  
松蓋丹調治之外用聖惠灸穴法灸肺俞心  
俞膈俞三穴三五壯或以龜尿點骨節上亦  
可得效

松蓋丹

松花 枳殼 炒

防風 獨活 各一兩

麻黃 前胡

川大黃 生 桂心 各五錢

右爲細末煉蜜丸如黍米大每服十九丸粥飲送下

五軟

五軟稟賦不足證頭項手足口肉肌地黃丸與扶元散全在後天調養宜

註

五軟者謂頭項軟手軟足軟口軟肌肉軟是也頭軟者項軟無力也手足軟者四肢無力也肉軟者皮寬不長肌肉也口軟者唇薄無力也此五者皆因稟受不足氣血不充故骨

脈不强筋肉痿弱治宜補氣爲主先以補腎地黃丸補其先天精氣再以扶元散補其後天羸弱漸次調理而五軟自強矣

補腎地黃丸

熟地黃 一兩五錢 山萸肉 一兩

懷山藥 炒 茯苓 各八錢

牡丹皮 澤瀉 各五錢

牛膝 八錢 鹿茸 五錢 酥炙

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服二錢用

鹽湯下

扶元散

人參

白朮

土炒

茯苓

熟地黃

茯神

黃耆

蜜炙

山藥

炒

炙甘草

當歸

白芍藥

川芎

石菖蒲

引用薑棗水煎服

歌 五軟扶元散堪嗜參朮茯苓熟地黃茯神黃

耆山藥草歸芍川芎及石菖

五鞭

陽氣不營成五鞭仰頭取氣難搖動手足強直冷  
如水氣壅胸膈牽連痛小續命湯最為良烏藥順  
氣散極應若遇肝木乘脾經加味六君妙無竟

註

五鞭者仰頭取氣難以動搖氣壅疼痛連胸  
膈間手心足心冰涼而鞭皆由陽氣不營於  
四末最為難治重者以小續命湯疎其風輕

者以烏藥順氣散調其氣若肝木乘脾食少  
氣弱者加味六君子湯治之內外交治而證  
自日瘥矣

小續命湯

人參

麻黃

川芎

黃芩

芍藥

甘草  
炙

防風

官桂  
去皮

附子

炮去皮臍

杏仁

炒去皮尖

漢防已

引用薑棗水煎服

方歌小續命湯治五鞭人參麻黃川芎共黃芩芍

藥草防風官桂附子防已杏

烏藥順氣散

麻黃

白芷

川芎

桔梗

枳殼

炒

僵蠶

炒

烏藥

炮薑

甘草 生 橘紅

引用葱白水煎服

方歌 烏藥順氣五鞭輕麻黃白芷合川芎桔梗枳

殼殭蠶炒烏藥炮薑草橘紅

加味六君子湯

人參 白朮

炮薑 陳皮 枳實 黃芩 茯苓

半夏 製 茯苓

炙甘草 升麻 蜜炙

柴胡 醋炒 肉桂

水煎服

方歌 加味六君虛五鞭人參白朮共炮薑陳半茯苓

苓炙甘草升麻柴胡肉桂良 不論言替草煎

五遲

小兒稟來氣血虛筋骨軟弱步難移牙齒不生髮

疎薄身坐不穩語言遲加味地黃為主治補中益

氣繼相醫邪乘心氣菖蒲好血虛髮遲苴勝宜

註 小兒五遲之證多因父母氣血虛弱先天有

虧致兒生下筋骨軟弱行步艱難齒不速長  
 坐不能穩要皆腎氣不足之故先用加味地  
 黃丸滋養其血再以補中益氣湯調養其氣  
 又足少陰為腎之經其華在髮若少陰之血  
 氣不足即不能上榮於髮芎勝丹主之又有  
 驚邪乘入心氣至四五歲尚不能言者芎蒲  
 丸主之

熟地黃 一兩

山萸肉 一兩

加味六味地黃丸

懷山藥 炒

茯苓 各八錢

澤瀉

牡丹皮 各五錢

鹿茸 三錢

五加皮 五錢

麝香 五分

共為細末煉蜜丸如梧桐子大大兒每服二  
 錢小兒一錢五分鹽湯送下

補中益氣湯 方見殮瀉

芎勝丹

當歸 洗焙

生地黃

白芍藥 各一兩 炒 苮勝子 二兩 碾

胡粉 三錢 碾

右同研勻煉蜜為丸如黍米大每服十粒煎

黑豆湯下

菖蒲丸

人參 石菖蒲

麥門冬 去心 遠志 去心

川芎 當歸 酒洗

乳香 硃砂 各一錢 水飛

右為細末煉白蜜為丸如黍米大食遠用米

湯送下

鶴膝風

小兒稟賦不充盈肌肉削瘦少崢嶸膝骨外露如

鶴膝多緣腎弱髓難生血脈不榮筋攣縮膝貯風

涎時作疼大防風湯宜先服地黃繼進莫從容

註 小兒鶴膝風多因稟賦不足血氣不榮肌肉

削瘦遂致骨節外露筋脈攣縮股漸細小而

膝蓋愈大要皆腎虛不能生精髓之故也須

先服大防風湯繼以補腎地黄丸治之庶氣血充而證自愈矣

大防風湯

人參

白朮

土炒

茯苓

甘草

炙

熟地黄

當歸身

白芍藥

炒

川芎

黃耆

蜜炙

羌活

防風

附子

製

杜仲

牛膝

引用薑棗水煎服

方歌 大防風湯八珍耆羌防附子杜仲移柴筋更

有川牛膝虛風鶴膝最相宜

補腎地黄丸

方見五軟

解顛

小兒解顛最堪憐先天有損腦髓乾面色眊白形瘦弱二目多白若愁煩補腎地黄丸堪服補陽扶元散為先更有封顛散極效臨時攤貼保安然



註

解顛者乃顛大骨縫不合也蓋腎生髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足亦如花木無根現證面色眊白形體瘦弱目多白睛悲愁少笑治宜補養腎氣為主先以補腎地黄丸滋補其陰再以扶元散補養其氣外用封顛散攤貼之則精血稍充或可轉危為安也

補腎地黄丸

扶元散

俱見五軟

封顛散

栝子仁

防風

天南星

各四兩

右為細末每用一錢以豬膽汁調勻攤在緋絹帛上看顛大小剪貼一日一換不得令乾時時以湯潤動

顛陷

小兒緣何顛下陷瀉久脾虧虛弱見面目青黃四肢涼六脈沉緩神慘淡補中益氣湯最宜固真湯進有奇驗外用烏附膏攤貼溫中理脾功無限

註

小兒藏府有熱渴飲水漿致成瀉痢久則脾氣虛寒不能上充腦髓故顛陷成坑名曰顛陷現證面目青黃四肢逆冷六脈沉緩神氣慘淡先以補中益氣湯升提其氣再以固真湯溫補其脾外用烏附膏攤貼於陷處極效

補中益氣湯 方見殭瀉

固真湯 方見慢脾風

烏附膏

雄黃 二錢

川烏

附子 各五錢

右為細末用生葱和根葉細切杵爛入酒末未同煎作成膏每早空心貼陷處

顛填

顛門腫起氣上衝其間虛實要分明毛髮憔悴頻頻汗胸高氣促口唇紅肝盛瀉青丸最效裏熱連翹飲堪行因表防風升麻劑鞭冷屬陰用理中

註 顛填者謂顛門腫起也蓋因乳哺無度或寒成熱乘於脾經致使藏府不調其氣上衝為

之填脹腫突現證毛髮憔悴頻頻出汗胸高  
氣促口脣色紅須分虛實治之肝氣盛者瀉  
青丸主之裏熱盛者大連翹飲主之因表者  
防風升麻湯主之堅鞭不熱者屬陰理中湯  
主之

瀉青丸 方見急驚風

大連翹飲 治心火上升

柴胡 柴胡

連翹 去心

木通

滑石 水飛

梔子 梔子

蟬退 去足翅

當歸 酒洗

瞿麥

黃芩 甘草

防風 生

水煎服

方連翹飲治熱上衝柴胡荆芥翹木通滑石梔  
子蟬瞿麥歸芍黃芩草防風

防風升麻湯

麥冬 去心 木通

甘草節 山梔

升麻 防風

引用淡竹葉水煎服

方歌 防風升麻湯 頤填效非常 麥冬木通草 山梔

升麻防

理中湯 方見不乳

中惡

小兒神氣未充實 觸惡何能自主 持目閉面青

亂 蘇合皂角功效奇

註

小兒神氣未充一為邪惡所觸何能主持自

然神魂離舍目閉面青悶亂不省人事內以

蘇合香丸除其邪外以皂角末開通其閉嚏

出則氣通而甦矣

蘇合香丸 方見肌門內△口

