



武 0
595
Ka

痘疹

五十九

六十



門
號
卷

纂醫宗金鑑卷五十九

痘疹心法要訣目錄

痘疹心法要訣目錄

證下

痘後癰毒

解毒內托湯

紅玉膏

目黃

洗肝散

龍膽湯

目錄

藏書

藏書

唇

加味升麻葛根湯

黃連解毒湯

痘後牙疳

清毒涼血飲

人中白散

舌

加味犀角湯

咽喉

加味甘桔湯

利咽解毒湯

牛黃散

夾疹

升麻葛根湯

夾癍

荆防敗毒散

黃連解毒湯

夾痧

荆防敗毒散

水痘

荆防敗毒散

加味導赤散

男婦年長出痘門

男子年長出痘

參麥清補湯

參歸鹿茸湯

鷄冠血酒

婦女出痘行經

涼血解毒湯

四物解毒湯

十全大補湯

孕婦出痘

如聖散

痘出遇產

十全大補湯

黑神散

產後出痘

十全大補湯

疹門

疹原

麻疹輕重

麻疹主治大法

麻疹未出證治

宣毒發表湯

麻疹見形證治

升麻葛根湯

三黃石膏湯

人參敗毒散

麻疹收沒證治

荆防解毒湯

胡荽酒

柴胡四物湯

身熱不退

化毒清表湯

柴胡清熱飲

煩渴

升麻葛根湯

白虎湯

竹葉石膏湯

譫妄

三黃石膏湯

黃連解毒湯

喘急

麻杏石甘湯

清氣化毒飲

欬嗽

升麻葛根湯

清金寧嗽湯

喉痛

元參升麻湯

涼膈消毒飲

失音

元參升麻湯

加減涼膈散

兒茶散

嘔吐

竹茹石膏湯

瀉泄

升麻葛根湯

黃連解毒湯

痢疾

清熱導滯湯

腹痛

加味平胃散

衄血

髮灰散

犀角地黄湯

瘡疹

蓋痘疹

加味消毒飲

癰疹

加減羌活散

加味消毒飲

仙傳醫宗金鑑卷五十九

編輯痘疹心法要訣

痘中雜證 下

痘後癰毒

餘毒未盡痘毒生輕則瘡癩重為癰內用解毒湯俱可外敷紅玉膏有功

註凡痘後餘毒皆因灌漿之時毒氣太盛未得

盡化留藏於經絡聚而不散輕則發為瘡癩

重即成癰或在肌肉之虛處或發於關節搖

動之際皆不論已潰未潰均以解毒內托湯
主之外用紅玉膏攤貼患處

解毒內托湯

生黃耆

荆芥

防風

連翹 去心

當歸

赤芍藥

金銀花

甘草節

木通

水煎服

歌 解毒內托湯最靈黃耆荆芥共防風連翹當
歸赤芍藥銀花甘草與木通

紅玉膏

紫草 一兩

紅花 一兩

當歸 二兩

黃蠟 三兩

用香油半筋先將藥煉焦去渣後下黃蠟令
勻以冷為度攤貼患處

目

目病之由風熱成痘毒火鬱上攻睛赤腫澁痛洗

肝散翳膜遮睛龍膽從

註

目病固多由風熱而起也夫痘蘊非常之熱自裏達外氣血弱則不能逐毒外出火鬱上攻目斯病矣如赤腫疼痛癢澁流淚不能開者以洗肝散主之翳膜遮睛隱澁羞明者加味龍膽湯主之

洗肝散

羌活

歸尾

防風

山梔仁

穀精草

薄荷

生甘草

川芎

水煎食後服

方歌

洗肝散治目痛疼羌活歸尾及防風山梔仁同穀精草薄荷甘草配川芎

龍膽湯

防風

木賊草

密蒙花

蟬蛻

蔓荊子

龍膽草

菊花

黃連

白芷

蒺藜

水煎服

方翳遮龍膽湯堪誇防風木賊密蒙花蟬蛻蔓

荆龍膽菊黃連白芷蒺藜佳

唇

脾經脈絡繞唇口出痘始終貴潤紅紫裂焦黑急

宜治葛根解毒二方從

註脾經之脈絡繞於唇口以經曰六府之華在

唇必津液充足氣血和暢唇口方能紅潤故

出痘之始終以此為貴不然一為毒火所制

則毒乘於中熱熾於外不惟不能紅潤且或

赤或紫或焦裂者治皆不可緩也初宜加味

升麻葛根湯起脹後則以黃連解毒湯治之

加味升麻葛根湯

赤芍

梔子

藿香

升麻

葛根

生甘草

防風

石膏

水煎服

方歌加味升麻葛根湯赤芍梔子與藿香升麻葛

根生甘草防風石膏共煎嘗

黃連解毒湯

方見結痂落痂證治

痘後牙疳

痘後牙疳毒熱攻口臭齦腫多痛疼內服清毒涼

血飲外敷中白散極靈

註痘後生牙疳者乃餘毒未解上攻牙齒而然

也初起口臭齦腫牙縫出血尚覺疼痛甚則

色黑腐爛牙齒脫落穿腮破頰蝕透鼻唇多

至不救見之須急急調治內服清毒涼血飲

外敷人中白散

清毒涼血飲

知母

石膏

生地

黃連

當歸

赤芍

大黃

山梔子

丹皮

荆芥穗

連翹

去心

水煎服

方歌清毒涼血治牙疳知母石膏生地連歸芍大

黃山梔子丹皮荆穗連翹煎

人中白散

人中白

二錢

雄黃

八分

冰片

四分

硼砂

青黛

兒茶

各一錢

共為細末搽敷患處

舌

舌乃心苗五內通毒火一犯先見形赤紫黑腫並舒弄總以清熱犀角平

註

舌為心苗內通五藏毒熱舉發舌先受之或赤或紫或黑或腫舒舌弄舌種種不一要皆熱留於心而使然也治宜清熱為主以加味

犀角湯治之

加味犀角湯

荊芥 防風

牛蒡子 生甘草

桔梗 升麻

犀角 麥冬 去心

梔子 黃連

石膏 煨

水煎服

方歌 加味犀角能散熱 荊防牛蒡同 甘桔升麻犀

角麥門冬梔子黃連石膏捷

咽喉之地司出入 毒火冲熾痛難堪 內用甘桔利

咽劑外吹牛黃散即安

註 咽者飲食之道 喉者呼吸之門 乃最緊要之

處 若痘毒不能發越於外 火熱壅塞膈間 上

冲咽喉 則或腫痛或啞澀 甚而不能呼吸 飲

食難入 速用加味甘桔湯治之 或用加減利

咽解毒湯 外用牛黃散吹入腫處

加味甘桔湯 方見失音

利咽解毒湯

防風

山豆根

麥冬

去心

牛蒡子

炒

黑參

苦桔梗

生甘草

菉豆

水煎服

方歌利咽解毒用防風山豆根與麥門冬牛蒡黑參苦桔梗甘草菉豆共煎濃

牛黃散

川黃連

生

黃蘗

生

薄荷

各八分

雄黃

火消

青黛

各二分半

牛黃

冰片

硼砂

硃砂

各一分

夾疹

共為細末每用少許吹患處

痘中夾疹因時氣毒火觸動發其機臨期休將痘瘡治速將升葛透疹宜

註
痘已見形其中又有顆粒細密如麻子者此
夾疹也因出痘時恰遇天行時疫感受其氣
一時並發不須治痘當先治疹以升麻葛根
湯加荆芥防風蟬蛻牛蒡犀角疹散而痘自
起矣

升麻葛根湯

方見發熱證治

夾癍

片片結就如雲頭毒傷陰血浮火遊表散荆防敗
毒劑清熱黃連解毒投

癍乃血之餘也因毒火鬱遏傷於陰血血熱
相搏故浮遊之火散布皮膚之間與痘相夾
而出片片如雲頭突起謂之夾癍以荆防敗
毒散主之七日後見此謂之發癍乃血熱不
解故也以黃連解毒湯主之

荆防敗毒散

羌活

獨活

柴胡

前胡

荆芥

防風

生甘草

川芎

枳殼

麩炒

桔梗

赤茯苓

引用生薑水煎服

方歌

夾癩宜用疎解劑荆防敗毒進莫遲羌獨柴

前荆防草川芎枳桔赤苓宜

黃連解毒湯

方見結痂落痂證治

夾痧

痧形發時粟一般顆鞭形圓頂又尖粒中含水清

漿樣敗毒調治自然安

註

痧亦疹類但形如粟米尖圓白鞭內含清水

為異此亦熱毒所發往往夾痘而出宜於疎

散以荆防敗毒散主之

荆防敗毒散

方見夾痧

水痘

水痘皆因濕熱成外證多與大痘同形圓頂尖含

清水易脹易靨不漿膿初起荆防敗毒散加味導

赤繼相從

註

水痘發於脾肺二經由濕熱而成也初起與
大痘相似而赤唇紅眼光如水坎嗽噴嚏唾
涕稠黏身熱二三日而始出其形尖圓而大
內含清水易脹易磨不作膿漿初起荆防敗
毒散主之繼以加味導赤散治之

荆防敗毒散

方見夾痲

加味導赤散

生地

木通

生甘草

連翹

黃連

滑石

赤苓

麥冬

去心

長引用燈心水煎服

方加味導赤除濕熱生地木通甘草協翹連消

石苓麥冬引加燈心稱妙訣

男子自十六歲後皆謂之年長者然情開元
情志復又過度壽之火中熾則有陰虧損水
虛不流制火故每至行漿之際口渴心煩鼻
眼閉痛不能成膿結痂者有之治法不可妄

不答麥冬何味滋心蘇效精

大補和藥衣斜歸燥主此木能甘草為膠鹿茸

何用滋心水煎服

赤苓

麥冬 去心

黃芩

附子

婦年長出痘門

男子年長出痘

年長出痘總不宜真陰虧損元氣虛一逢出痘毒
冲熾水不勝火豈能支夾熱參麥清補劑攻漿參
歸鹿茸宜

註 男子自十六歲後皆謂之年長嗜慾情開元

精走洩又遇痘毒之火冲熾則真陰虧損水
虛不能制火故每至行漿之際口渴心煩鼻
衄咽痛不能成膿結痂者有之治者不可妄

用寒涼五六日前只宜參麥清補湯調治至七八日如膿壞不行急宜攻壞以參歸鹿茸湯內調雞冠血酒治之但得壞行庶可無虞

參麥清補湯

當歸

川芎

花粉

白芍

酒炒

生地

人參

生黃耆

前胡

桔梗

牛蒡子

炒研

生甘草

紅花

南山楂

麥冬

去心

引用生薑水煎服

方歌參麥清補用歸芎花粉白芍生地同參耆前

桔牛蒡草紅花山查麥門冬

參歸鹿茸湯

方見灌漿證治

雞冠血酒

方見灰陷白陷

婦女出痘行經

婦女發痘遇經行當期毒解不須驚非期涼血解

毒治過期四物解毒從去血過多氣血弱十全大補服通靈

註 女子出痘或遇經行須問其是期非期如期而出者則毒熱隨血解去不須施治其證自愈若非期而至者此毒火內擾於胞中致血妄行以涼血解毒湯治之若過期不止乃毒熱乘入血室以四物解毒湯加元參甘草主之若行漿時去血過多此氣血虛弱不能統攝也急用十全大補湯治若稍經行痘漿不行則無救矣

涼血解毒湯

方見結痂落痂證治

四物解毒湯

當歸

白芍

酒炒

生地

元參

梔子炒

川芎

生甘草

黃連

酒炒

黃蘗

酒炒

黃芩

酒炒

水煎服

方四物解毒湯如神歸芍生地共元參梔子川

芎生甘草黃連黃蘗共黃芩

十全大補湯

方見結痂落痂證治

孕婦出痘

妊娠出痘勢最難母子相連掌握間審其所因隨

證治如聖安胎效通仙

計孕婦最忌出痘蓋熱能動胎胎落則氣血因

之而傷又安望其起脹灌漿結痂耶故遇孕

婦出痘始終以安胎為上用如聖散隨證加

減治之不可輕用犯胎之藥致有觸動

如聖散

當歸身

陳皮

白朮

土炒

大腹皮

黃芩

縮砂仁

連殼炒

甘草

生

黑豆

酒洗

桑上羊兒筋

水煎服

初發熱加升麻葛根連翹

出而稠密者加酒炒黃連牛蒡子連翹南山查

不起發者加牛蒡子赤芍藥

渴加麥門冬知母花粉

血動者四物湯加芩連

脾虛食少毒發不出者千金內托湯去肉桂

倍加參耆

身熱有外邪者參蘇飲加木香

方歌安胎如聖散最宜歸陳白朮大腹皮黃芩砂

仁共甘草黑豆羊籐服莫疑

痘出遇產

痘出正盛逢臨產束手無策勢最險無恙十全大

補治惡露未盡黑神散

註孕婦當痘正出之際忽然欲產俟產育後無

他恙者只官大補氣血十全大補湯主之若

腹中微痛此惡露未盡也黑神散主之

十全大補湯

方見結痂落痂證治

黑神散

當歸

川芎

熟地黃

青皮

醋炙

香附

蒲黃

醋炙

桂心

乾薑

水煎溫服

方惡露未淨黑神良當歸川芎熟地黃青皮香

附俱醋炙蒲黃桂心合乾薑

產後出痘

產後如逢出痘瘡惟憑補益莫驚慌十全大補全

效勿用寒涼致損傷

註

婦人產後氣血已傷又遇出痘則氣血之供

用難給不能領載其毒惟宜大補氣血以十

全大補湯治之切不可妄用寒涼之劑致傷

生發之機也

十全大補湯

方見結痲落痲證治

疹原

麻為正疹亦胎毒毒伏六府感而出初發之狀有類痘形尖漸密不漿殊始終調護須留意較痘雖輕變化速

註

疹非一類有瘙疹癩疹溫疹蓋痘疹皆非正疹也惟麻疹則為正疹亦胎元之毒伏於六府感天地邪陽火旺之氣自肺脾而出故多欬嗽噴嚏鼻流清涕眼淚汪汪兩胞浮腫身

熱二三日或四五日始見點於皮膚之上形如麻粒色若桃花間有類於痘大者此麻交初發之狀也形尖疎稀漸次稠密有顆粒六無根暈微起泛而不生漿此麻疹見形之後大異於痘也須留神調治始終不可一毫疎忽較之於痘雖稍輕而變化之速則在頃刻也

麻疹輕重

麻疹出時非一端其中^{輕重}重要詳參氣血和平^輕

而易表裏交雜重則難

註

麻疹出時有輕重之分臨時須要詳察若氣血和平素無他病者雖感時氣而正能制邪故發熱和緩微微汗出神氣清爽二便調勻見點則透徹散沒不疾不徐為輕而易治者也若素有風寒食滯表裏交雜一觸邪陽火旺之氣內外合發而正不能制邪必大熱無汗煩躁口渴神氣不清便閉尿澀見點不能透徹收散或太緊速則為重而難治者也

麻疹主治大法

疹宜發表透爲先最忌寒涼毒內含已出清利無餘熱沒後傷陰養血痊

註

凡麻疹出貴透徹宜先用表發使毒盡達於肌表若過用寒涼冰伏毒熱則必不能出透多致毒氣內攻喘悶而斃至若已出透者又當用清利之品使內無餘熱以免疹後諸證且麻疹屬陽熱甚則陰分受傷血爲所耗故沒後須以養血爲主可保萬全此首尾治疹之大法至於臨時權變惟神而明之而已

麻疹未出證治

欲出麻疹身微熱表裏無邪毒氣鬆若兼風寒食滯熱隱伏不出變叢生宜毒發表爲主劑隨證加味莫亂從

註

麻疹一證非熱不出故欲出時身先熱也表裏無邪者熱必和緩毒氣鬆動則易出而易透若兼風寒食熱諸證其熱必壯盛毒氣鬱閉則難出而難透治以宣毒發表湯其關或

有交雜之證亦照本方隨證加減治之

宣毒發表湯

升麻

葛根

前胡

桔梗

枳殼

荆芥

麩炒

防風

薄荷葉

木通

連翹

去心

牛蒡子

炒研

淡竹葉

生甘草

引加芫荽水煎服

感寒邪者加麻黃夏月勿用

食滯加南山楂

內熱加黃芩

方歌疹伏宣毒發表湯升葛前桔枳荆防薄通翹

蒡淡竹草引加芫荽水煎嘗

麻疹見形證治

麻疹已出貴透徹細密紅潤始為良若不透徹須

分晰風寒毒熱氣虛詳風寒升葛湯加味毒熱三

黃石膏湯氣虛人參敗毒散托裏透疹效非常

註 麻疹見形貴乎透徹出後細密紅潤則為佳

美有不透徹者須察所因如風寒閉塞必有身熱無汗頭疼嘔惡疹色淡紅而黯之證宜用升麻葛根湯加蘇葉川芎牛蒡子因毒熱壅滯者必面赤身熱譫語煩渴疹色赤紫滯黯宜用三黃石膏湯又有正氣虛弱不能送毒外出者必面色眊白身微熱精神倦怠疹色白而不紅以人參敗毒散主之

升麻葛根湯

方見痘門發熱證治

三黃石膏湯

麻黃

石膏

淡豆豉

黃蘗

黃連

梔子

黃芩

水煎服

方 疹出不透因毒熱三黃石膏湯急尋麻黃石

歌 膏淡豆豉黃蘗黃連梔子芩

人參敗毒散

人參

川芎

羌活

獨活

前胡

枳殼

麩炒

桔梗

柴胡

生甘草

赤苓

引用生薑水煎服

方歌 疹因氣虛出難透人參敗毒有奇功參芎羌

獨前枳桔柴胡甘草赤茯苓

麻疹收沒證治

疹出三日當收沒不疾不徐始無虞收沒太速毒攻內當散不散虛熱醫毒盛荆防解毒治外用胡荽酒法宜虛熱柴胡四物劑應證而施病漸離

註 麻疹見形三日之後當漸次沒落不疾不徐

始為無病若一二日疹即收沒此為太速因調攝不謹或為風寒所襲或為邪穢所觸以致毒反內攻輕則煩渴譫狂重則神昏悶亂急宜內服荆防解毒湯外用胡荽酒薰其衣

被使疹透出方保無虞當散不散者內有虛熱留滯於肌表也其證潮熱煩渴口燥咽乾切不可純用寒涼之劑以柴胡四物湯治之使血分和暢餘熱悉除疹即沒矣

荆防解毒湯

薄荷葉

連翹
去心

荆芥穗

防風

黃芩

黃連

牛蒡子

炒研

大青葉

犀角

人中黃

引用燈心蘆根水煎服

方歌收沒太速毒內攻荆防解毒治最靈薄翹荆

防芩連蒡大青犀角共人中

胡荽酒

方見痘門水泡證治

柴胡四物湯

白芍

炒

當歸

川芎

生地

人參

柴胡

淡竹葉

地骨皮

知母

炒

黃芩

麥冬

去心

引加生薑紅棗水煎服

方歌當散不散因虛熱柴胡四物芍歸芎生地人

參柴竹葉地骨知母芩麥冬

身熱不退

麻疹已發身猶熱毒熱壅遏使之然出用化毒清表劑沒後柴胡清熱煎

麻疹非熱不出若既出透其熱當減倘仍大熱者此毒盛壅遏也宜用化毒清表湯治之疹已沒落而身熱者此餘熱留於肌表也宜柴胡清熱飲治之

化毒清表湯

葛根

薄荷葉

地骨皮

牛蒡子

炒研

連翹

去心

防風

黃芩

黃連

元參 生知母

木通 生甘草

桔梗

引用生薑燈心水煎服

方歌疹已出透身壯熱化毒清表為妙訣葛薄地

骨勞翹防芩連元知通甘桔

柴胡清熱飲

柴胡 黃芩

赤芍 生地

麥冬 地骨皮

生知母 生甘草

引用生薑燈心水煎服

方歌疹已沒落熱不減柴胡清熱效通仙柴胡黃

芩芍生地麥冬地骨知母甘

煩渴

毒熱內盛火上炎心胃擾亂煩渴添未出升葛湯
加味已出白虎湯為先沒落竹葉石膏用因時醫

治莫遲延

註 凡出麻疹煩渴者乃毒熱壅盛也蓋心為熱

擾則煩胃為熱鬱則渴當未出時宜升麻葛

根湯加麥冬天花粉已出者宜白虎湯沒後

煩渴者用竹葉石膏湯

升麻葛根湯

方見痘門發熱證治

白虎湯

石膏

煨

生知母

生甘草

引用粳米水煎服

方歌 麻疹已發多煩渴白虎清熱自能安石膏知

母生甘草引加粳米用水煎

竹葉石膏湯

人參

麥冬 去心

石膏

煨

生知母

竹葉

生甘草

水煎服

方歌 疹已沒落當安靜若加煩渴熱未清竹葉石

膏湯參麥石膏知母竹甘從

譫妄

疹發最怕毒火盛熱昏心神譫妄生未出三黃石膏治已出黃連解毒靈

註 譫妄一證乃毒火太盛熱昏心神而然也疹

未出而譫妄者三黃石膏湯主之疹已出而

譫妄者黃連解毒湯主之

三黃石膏湯

方見麻疹見形證治

黃連解毒湯

方見痘門結痂落痂證治

喘急

初無汗作喘急宜發麻杏石甘宜毒熱內攻

受尅保肺清氣化毒醫

註 喘為惡候麻疹尤忌之如初出未透無汗喘

急者此表實拂鬱其毒也宜用麻杏石甘湯

發之疹已出胸滿喘急此毒氣內攻肺金受

尅宜用清氣化毒飲清之若遲延失治以致

肺葉焦舉則難救矣

麻杏石甘湯

石膏

煨

麻黃

蜜炒

杏仁

去皮尖炒

生甘草

引用生薑水煎服

方歌喘用麻杏石甘湯石膏火煨合麻黃杏仁去

尖須微炒甘草相配引生薑

清氣化毒飲

前胡

桔梗

栝蒌仁

連翹

去心

桑皮

炙

杏仁

炒去皮尖

黃芩

黃連

元參

生甘草

麥冬

去心

引用蘆根水煎服

方歌毒熱內攻肺喘滿清氣化毒飲最靈前栝栝

蔓翹桑杏芩連元參草麥冬

欬嗽

疹初欬嗽風邪鬱加味升麻葛根良毒熱薰蒸金
受制清金寧嗽自堪嘗

註麻疹發自脾肺故多欬嗽若欬嗽太甚者當

分初沒治之初起欬嗽此為風邪所鬱以升
麻葛根湯加前胡桔梗蘇葉杏仁治之已出
欬嗽乃肺為火灼以清金寧嗽湯主之

升麻葛根湯 方見痘門發熱證治

清金寧嗽湯

橘紅 前胡

生甘草 杏仁 去皮尖炒

桑皮 蜜炙 川連

桔藁仁 桔梗

貝母 去心

引用生薑紅棗水煎服

方歌嗽用清金寧嗽湯橘紅前草杏仁桑川連桔

藁桔貝母引用紅棗共生薑

喉痛

疹毒熱甚上攻喉腫痛難堪實可憂表邪元參升
麻用裏熱涼膈消毒求

註疹毒熱盛上攻咽喉輕則腫痛甚則湯水難
下最為可慮表邪鬱遏疹毒不能發舒於外

致咽喉作痛者元參升麻湯主之裏熱壅盛
或疹已發於外而咽喉作痛以涼膈消毒飲

元參升麻湯

荆芥

防風

升麻

牛蒡子炒研

元參

生甘草

水煎服

方表鬱疹毒喉腫痛急服元參升麻湯荆芥防

風升麻芩元參甘草水煎嘗

涼膈消毒飲

荆芥穗

防風

連翹

去心

薄荷葉

黃芩

生梔子

生甘草

牛蒡子炒研

芒消

大黃生

引用燈心水煎服

方裏熱喉痛苦難當涼膈消毒飲最良荆防翹

薄芩梔草牛蒡芒消生大黃

失音

疹毒聲亞肺熱壅元參升麻大有功已發加減涼
膈散沒後兒茶音即清

註

失音者乃熱毒閉塞肺竅而然也疹初失音
者元參升麻湯主之疹已發而失音者加減
涼膈散主之疹沒後聲瘖者兒茶散主之

元參升麻湯

方見喉痛

加減涼膈散

薄荷葉

生梔子

元參

連翹

去心

生甘草

苦桔梗

麥冬

去心

牛蒡子

炒研

黃芩

水煎服

方加減涼膈治失音薄荷梔子共元參連翹甘
歌

草苦桔梗麥冬牛蒡與黃芩

兒茶散

硼砂 二錢

孩兒茶 五錢

共為細末凉水一盞調藥一匙服之

嘔吐

疹發緣何嘔吐逆火邪擾胃使之然竹茹石膏為
主治和中清熱吐能安

註 麻疹嘔吐者由於火邪內迫胃氣冲逆也須
以竹茹石膏湯和中清熱其吐自止

竹茹石膏湯

半夏

薑製

赤苓

厚皮

竹茹

生甘草

石膏

煨

引用生薑水煎服

方歌 竹茹石膏湯治吐半夏薑製配茯苓陳皮竹
茹生甘草石膏火煨共合成

瀉泄

毒熱移入大腸經傳化失常瀉泄成初起升葛湯
加味已發黃連解毒清

註 麻疹瀉泄乃毒熱移入腸胃使傳化失常也

治者切不可用溫熱諸劑疹初作瀉者以升麻葛根湯加赤苓猪苓澤瀉主之疹已出作瀉者以黃連解毒湯加赤苓木通主之

升麻葛根湯

方見痘門發熱證治

黃連解毒湯

方見痘門結痂落痂證治

痢疾

夾疹之痢最難當毒熱凝結移大腸腹痛下痢赤白色悉用清熱導滯良

註

麻疹作痢謂之夾疹痢因毒熱未解移於大

腸所致也有腹痛欲解或赤或白與赤白兼者悉用清熱導滯湯主之不可輕投瀉劑

清熱導滯湯

山楂

厚樸

薑炒

生甘草

枳殼

麩炒

檳榔

當歸

白芍

酒炒

條芩

酒炒

連翹

去心

牛蒡子

炒研

青皮

炙

黃連

吳茱萸炒

引用生薑水煎服

方痢用清熱導滯湯山查朴草殼檳榔歸芍條

苓翹牛蒡青皮黃連引生薑

腹痛

小兒發疹腹中疼毒鬱腸胃食滯凝曲腰啼叫眉
頻蹙加味平胃散堪行

註 麻疹腹痛者由食滯凝結毒氣不得宣發於
外故不時曲腰啼叫兩眉頻蹙須以加味平
胃散治之滯消毒解而痛自除矣

加味平胃散

防風 升麻

枳殼 葛根

蒼朮 陳皮

厚朴 南山查

麥芽 生甘草

引用生薑燈心水煎服

方加味平胃散如神防風升麻枳葛根蒼陳厚

朴查芽草生薑燈心水煎勻

衄血

疹家衄血莫倉惶毒從衄解妙非常衄甚吹鼻髮灰散內服犀角地黃湯

註肺開竅於鼻毒熱上冲肺氣載血妄行則衄作矣然衄中有發散之義以毒從衄解不須止之但不可太過過則血脫而陰亡也如衄甚者宜外用髮灰散吹入鼻中內服犀角地黃湯其血可止

髮灰散

地黃湯方俱見痘門衄血便血

瘙疹

兒在母腹血熱蒸生後不免遇涼風徧體發出如粟米此名瘙疹何須評

註瘙疹者兒在胎中受母血熱之氣所蒸已久及生後外遇涼風以致徧身紅點如粟米之狀滿月內見者名為爛衣瘡百日內見者又名百日瘡未出痘瘡之先見者即名為瘙疹調攝謹慎不治自愈

蓋痘疹

痘後出疹蓋痘傳餘毒未盡夾食寒徧身作癢如雲片加味消毒服即安

註蓋痘疹者謂痘方愈而疹隨發也因痘後餘

毒未盡更兼恣意飲食外感風寒以致徧身

出疹色赤作癢始如粟米漸成雲片宜加味

消毒飲疎風清熱疹即愈矣

加味消毒飲

荆芥穗

防風

升麻

升麻

生甘草

赤芍

南山查

連翹

去心

引用生薑水煎服

方歌蓋痘疹因風熱成加味消毒飲最靈荆防牛

蒡升麻草赤芍山查連翹從

癩疹

心火灼肺風濕毒隱隱疹點發皮膚疎風散濕羌活散繼用消毒熱盡除

註 癩疹者乃心火灼於肺金又兼外受風濕而成也發必多癢色則紅赤隱隱於皮膚之中故名曰癩疹先用加減羌活散疎風散濕繼以加味消毒飲清熱解毒表裏清而疹愈矣

加味羌活散

羌活

前胡

薄荷葉

防風

川芎

枳殼

麩炒

桔梗

煨蛻

遠翹去心 金盤卷六生甘草

赤苓幼科種痘心法要旨目錄

引用生薑水煎服

方歌 癩疹羌活散相當羌活前胡薄荷防川芎枳

桔爭蟬蛻連翹甘草赤苓薑

加味消毒飲 方見蓋痘疹

擇吉

調攝

本志

癩疹心法要旨

成也發必多紫色則紅赤

故名曰癩疹先用加減

味和而毒增大貝

加味 林平 甘草赤芍

補 蘇合美 甜餅當 羌活

用主薑水煎如風

赤芍

枳殼

蘇合美

坐位草

醫宗金鑑卷六十

編輯幼科種痘心法要旨目錄

種痘要旨

選苗

蓄苗

天時

擇吉

調攝

禁忌

可種

不可種

水苗種法

五藏傳送之理

早苗種法

痘衣種法

痘漿種法

信苗

補種

自出

治法

命也

自由

御纂醫宗金鑑卷六十一

編輯幼科種痘心法要旨

夫痘胎毒也伏於有形之始因感而發為生人所不能免然其發也或染時氣或感風寒或因飲食或由驚恐以病引病為患多端變更莫測且其間順吉者少險逆者多有千方百計而不能冀其愈於萬一者此其所以為難也古有種痘一法起自江右達於京畿究其所源云自宋真宗時峨眉山人有神人出為

丞相王旦之子種痘而愈遂傳於世其說雖似渺茫然以理揆之實有參贊化育之功因時制宜之妙蓋正痘感於得病之後而種痘則施於未病之先正痘治於成病之時而種痘則調於無病之日自表傳裏由裏達表既無諸證夾雜於其中復有善方引導於其外薰蒸漸染胎毒盡出又何慮乎爲患多端變更莫測以致良工束手於無可如何之地耶此誠去險履平避危就安之良法也然種痘一科多口傳心授方書未載恐後人視爲虛誕之辭相沿日久無所考稽使至理良法竟置無用之地神功湮沒豈不大可惜哉今將種痘一法細加研究審度精詳纂輯成書永垂千古庶爲種痘之津梁咸登赤子於壽域也

種痘要旨

嘗考種痘之法有謂取痘粒之漿而種之者有謂服痘兒之衣而種之者有謂以痘痂屑乾吹入鼻

中種之謂之旱苗者有謂以痘痂屑濕納入鼻孔種之謂之水苗者然卽四者而較之水苗爲上旱苗次之痘衣多不應驗痘漿太涉殘忍故古法獨用水苗蓋取其和平穩當也近世始用旱苗法雖捷徑微覺迅烈若痘衣痘漿之說則斷不可從夫水苗之所以善者以其勢甚和平不疾不徐漸次而入旣種之後小兒無受傷之處胎毒有漸發之機百發百中捷於影響盡善盡美可法可傳爲種痘之最優者其次則旱苗雖烈猶與水苗之法相近兒體壯盛猶或可施至若痘痂之何以爲順選苗之何以善藏天時之何以得正種期之何以爲吉調攝之何以合宜禁忌之何以如法形氣之何以可種與痘衣痘漿之弊一一條分縷晰細列於後學者必細心體閱則中有灼見不致有他岐之惑庶種法旣善而成功可必矣

選苗

苗者痘之痂也種痘者全資乎此以爲胎毒之引導關係匪輕選苗時宜留神細察不可輕忽其中

有可用者有不可用者惟在痘之順與不順別之
痘之不順者出不尖圓色不紅潤漿不充滿所落
之痂黑暗而薄此天人合病內外合邪所致卽辛
而得愈亦不過良工之善爲調治非天然之美此
等痘痂斷不可用痘之順者始終無夾雜之證出
則尖圓色則紅潤漿則充滿所落之痂蒼蠟光澤
肥大厚實此得天地陰陽之正氣極順之苗也收
而用之效如響應但此痂甚少所遇無多或不能
親其事而假手他人亦必令彼身親目覩方可否
置而不用切勿濫用種者審之

蓄苗

種痘必資於苗而苗之所可恃者在氣之相通耳
若遇熱則氣洩日久則氣薄觸污穢則氣不清藏
不潔則氣不正此蓄苗之法所以不可不慎也如
過好苗須貯新磁瓶內上以物密覆之置於潔淨
之所清涼之處其所貯之苗在春天者一月之痂
可種冬令嚴寒四五十日之痂尚可種蓋寒則氣
收藏熱則氣易洩故時日有不同也然於未收苗

時卽當先與出痘之家明言其故使彼樂從無所
疑忌彼方肯用心收貯不致稍有貽悞也

天時
種痘貴得天時得其時則種不得其時則不種天
天時之正莫過於春春爲萬物發生之際天氣融
和不寒不熱種之則痘自隨其氣而發生此正二
三月之時所以可種也若交夏之後六陽盡出地
上人之陽氣亦皆外浮暑熱燦金受病者衆斯時
種痘兒何以堪此四五月之時所以必不可種

日
無引毒之具此七八九月之時勢有不能種也
至於十月名曰小春雖亦可種然斯時寒氣固結
純陰用事不若俟冬至後一陽鼓動借其生生之
氣種之甚吉此十月之所以可種猶不若十一十
二月之尤可種也然當可種之時亦有不可種者
如春應溫而反寒夏應熱而反涼秋應涼而反熱
冬應寒而反溫當其時而非其氣是天地不正之
氣也常人感染則成時疫小兒調理未遑况敢言

種痘乎倘或遇此只宜稍避俟時氣平定再為議
 種方保萬全亦有未種之時天時甚正既種之後
 忽爾寒暄不時此又人事所遇不齊偶爾變氣出
 乎意外者也則宜屋中適其寒溫順會天時常燒
 辟穢香飲食起居更加謹慎可保無恙種痘者宜
 詳審而體察之并令至好一則痘毒其土土之
 擇吉民家曰小春臘衣日然其寒涼固
 下苗之日必擇成日開日栽種日及合天月二德
 日則吉倘三者不能兼備即成開之日亦可若值

人神所在之日忌不可種

種痘吉日

成日

朔日

栽種日

天月二德日

正五九月在丙

二六十月在甲

三七十一月在壬

四八十二月在庚

人神所在之日

十一日在鼻柱

十五日在偏身

調攝

種痘之在調攝最爲緊要自始至終不可稍忽如避寒熱慎飲食是也天氣嚴寒蓋覆宜溫煖勿使受寒恐被寒氣所觸則痘不得出亦不可過於重棉疊褥使熱氣壅滯致痘不宣發天氣溫煖蓋覆宜適中恐容熱與毒相併致增煩熱亦不可輕易著單露體使寒邪外侵阻遏生發之氣此寒熱所以貴得其平也人之氣血必藉飲食生化痘之始終全賴乎此若飲食虧少氣血何所資助乎但不

過甚若過飲則飲停不化津液過食則食滯必生痰熱所以吮乳之兒不多乳不闕乳能食之兒勿餐辛熱炙博勿啖黏硬生冷勿恣意茶水勿使飲涼漿食不過飽亦不過饑此飲食所以貴得其平也至於寒熱飲食之外凡舉止動作既不可任意驕縱亦不可過於拂逆惟在調攝之人耐其性情兢兢業業善爲保護不但慎於旣種之後且當慎於未種之先不但慎之見苗之初尤當慎之落痂之後種痘者宜諄諄告誡務期詳細使彼知關

係匪輕心存謹慎如法調攝始保萬全倘稍有不謹以致小兒或為寒熱所侵或為飲食所傷咎將誰諉乎此不知調攝者所以斷不可與種也

禁忌

種痘之家房中最要潔淨切忌冲犯最喜明亮不可幽暗擇老成耐事之人經過小兒出痘者令其調護不離左右一切禁忌俱當謹遵勿詈罵呼怒勿言語驚慌勿對梳頭勿對搔癢勿嗜酒勿歌樂此房中淫液氣婦人經候氣腋下孤臭氣行遠勞

汗氣誤燒頭髮氣誤燒魚骨氣吹滅燈燭氣硫磺柴烟氣葱蒜醉酒氣溝渠污濁氣悉宜避之更當預囑其左右之人倘值迅雷烈風暴雨之變大宜安定勿使兒驚其幃帳宜謹蓋覆宜密切勿暴動坐風常燒辟穢香以避偶爾不正之氣再令人謹伺其門不許生人往來不許僧道師巫孝服之人入室以上禁忌一一遵守則吉稍有疎忽每至敗事種痘者切宜諄諄告誡之

辟穢香

南蒼木

半觔

川大黃

四兩

右剉細片爐中燒之不可間斷

可種

小兒面部紅潤精采明亮透達印堂山根年壽眼下口角無青暗之色

兩目黑白分明視瞻平正愈看愈有神氣精光

頭不解顛

鼻孔不小

氣清不獨

聲音清亮

天柱骨正頸不歪斜

骨肉相稱又宜緊束肥不見肉瘦不露骨

小便遠而長腎囊緊小微帶紫黑色如荔枝殼

身無癩癬瘡疥

項無結核

腹無積聚

形氣充實

精神強健

臟腑調順

脈息和平

以上皆可種

不可種

小兒面色青白或黧黑痿黃無喜色無精采

兩目黑多白少白睛帶青色視瞻歪斜暗昧無神

頤陷頤填

解頤

瘵瘵倦怠

頤不和平六腑不和

以上皆不可種

凡小兒父母行事疎忽不知調攝不聽禁忌不信

醫藥過於溺愛驕縱者亦斷不可與種

水苗種法

種痘之時要細閱小兒氣血冲和臟腑均平內無

痰熱食積所傷外無六淫之氣相侵方可用上好

痘痂種之一歲者用二十餘粒三四歲者用三十

餘粒置於淨磁鍾內以柳木作杵碾爲細末以淨水滴三五點入鍾內春溫用冬熱用乾則再加水幾點總以調勻爲度不燥不濕用新棉些須攤極薄片裹所調痘屑在內捏成棗核樣以紅線拴定仍留寸許長則剪去將苗納入鼻孔分男左女右不可離人時時看守倘小兒用手拈弄急禁止之或被嚏出急將苗塞鼻內不可稍緩恐洩苗氣下苗後必以六個時辰爲度然後取出如遇天氣嚴寒多留數刻若遇時令和暖早取數刻亦可要在時斟酌痘苗取出之後其苗氣漸次而入傳遍五藏至七日始發熱發熱三日而苗見見苗三日而出齊出齊三日而灌漿漿足三日而回水結痂大功成矣

五藏傳送之理

鼻者肺之外竅也水苗種法以苗塞鼻中其氣先傳於肺肺主皮毛肺傳於心心主血脈心傳於脾脾主肌肉脾傳於肝肝主筋肝傳於腎腎主骨痘毒藏骨髓之內感苗氣而發其毒自骨髓盡達於

筋腎藏之毒解矣自筋盡達於肌肉肝藏之毒解矣自肌肉盡達於血脈脾藏之毒解矣自血脈盡達於皮毛心藏之毒解矣自皮毛盡達於顆粒肺藏之毒解矣五藏之毒層遞而解然後毒化漿成收靨落痂此種痘傳送之次序也不可不知

旱苗種法

旱苗種法用銀管約長五六寸曲其頸碾痘痂極細納於管端按男左女右對準鼻孔吹入之至七日而亦發熱今時多用此法蓋取其簡便捷入不

致脫落而有透洩苗氣之患也第恐後人用之不善輕吹之則不驟入重吹之則迅烈難當且恐流涕過多苗隨涕去往往不驗今欲垂法後世當取其法之和平穩當萬全者而則效之此所以獨取於水苗也

痘衣種法

小兒出痘者當長漿漿足之時則彼痘氣充盛取其貼身裏衣與未出痘之兒女服之服二三日夜間亦不脫下至九日十一日始發熱此乃衣傳然

恐氣薄不透多有不熱不出其法不靈故不可用
痘漿種法

擇小兒出痘之順者取其痘漿以棉拭之分男左
女右塞入鼻中亦能發痘但取痘漿之時不令本
家知覺捏破痘漿盜以作種使彼真氣宣洩毒不
能解此忍心害理不仁之事也同志者切宜深惡
而痛絕之又豈可尤而效之也哉

信苗之類不類人重火之類
種痘發熱以前小兒面部上忽出顆粒似痘名曰

春苗此痘之將發毒氣之標也色紅而軟聽之自

消若紅紫堅硬有如魚目者急以銀針挑破上以

二聖散則無虞

二聖散

明雄黃

紫草

各等分

天麻味煎再為

共碾為細末用油臘脂調上

補種

下苗後宜令親切之人左右看守恐他人用心之
不慎也若視為泛常看守疎忽恐小兒惡其苗塞

鼻中不時捏出使苗氣一洩種多不驗所以種而不發者亦有之也然或小兒五內壯實不受苗氣艱於傳進不發者亦有之更有胎毒深邃潛藏內蓄雖苗氣傳至不能引出不發者亦有之俱當俟踰十一日爲度過此不發然後察天時和順再爲補種之亦可

自出

種痘以七日爲期五藏傳遍始發熱者常也或有至九日十一日而發者此傳送遲慢之故亦無足何由而發必因種後適逢天行時氣小兒感染而成是乃自出之痘非關苗氣引出者種痘者不可不知要當於未種之時預爲申明其說焉

治法

種痘乃引毒達表乘兒安寧無病之時事屬順吉又何言治然恐痘家過於溺愛起居不謹飲食不節此病所由生也故治法亦所不免當悉照治正痘之法治之可也

