

武
195
84

七十四
七十四



明
醫
卷
七
九
五
六
四

醫宗金鑑卷七十三

輯外科心法要訣目錄

發無定處 中

大麻風

楊梅瘡

楊梅結毒

赤白遊風

紫白癩風

白駁風

御製醫宗金鑑 卷七十三 目錄

藏書

藏書

癰瘍風

丹毒

粟瘡作癢

枯筋箭

御醫宗金鑑卷七十三

編輯外科心法要訣

大

大麻風發在偏身麻次生白屑皮兼起紅斑鬚眉脫落

麻風圖



大麻風

麻風總屬毒癘成其因有三五損風五死證見真惡候初病能守或可生

註

此證古名癘風癘風者有毒之風也經云皴風成爲癘又云癘者有營氣熱腐其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰毒風客於皴而不去名曰癘風今人呼爲大麻風一因風土所生中國少有此證惟烟瘴地面多有之一因傳染或遇生麻風之人或父母夫妻

家人遞相傳染或在外不謹或糞坑房室床鋪衣被不潔一因自不調攝洗浴乘涼希圖快意或露臥當風睡眠濕地毒風襲入血脈其因名雖有三總屬天地癘氣感受不覺未經發泄積久而發徧身麻木次起白屑紅斑蔓延如癩形若蛇皮脫落成片始發之時自上而下者順自下而上者逆漸來可治頓發難醫風毒入裏化生爲蟲蟲蝕五臟則形有五損肺受病先落眉毛肝受病面起紫皴腎

受病脚底先穿脾受病徧身如癱心受病先
 損其目此為險證又有五死證如麻木不仁
 者為皮死割切不痛者為肉死潰爛無膿者
 為血死手足脫落者為筋死鼻梁崩塌眼弦
 斷裂脣翻聲啞者為骨死若五死見一即為
 敗惡不治之候也此證初覺即服萬靈丹汗
 之次宜神應消風散追風散磨風丸次第服
 之牙齦出血用黃連貫眾等分煎湯漱之外
 搽類聚祛風散兼用地骨皮荆芥苦參細辛
 各一二兩河水煎湯浸浴熏洗若遇損敗之
 在上部則服醉仙散在下部則服通天再造
 散若鼻梁塌壞用換肌散服之患者稍露虛
 象即以補氣瀉榮湯服之兼用何首烏酒飲
 之若能清心寡慾戒口早治或有可生若口
 味不能清淡色慾不能斷絕即愈後仍不免
 再發終於不救

神應消風散

全蝎

白芷

人參 各一兩

右研細末每用二錢勿食晚飯次日空心温酒調服覺身微躁為效

方歌神應消風散癘風身麻白屑起斑紅蠟芷人參各一兩空心酒服麻木平

追風散

錦紋大黃 六兩 川鬱金 一兩八錢炒

皂角刺 一兩五錢

共研細末每用五錢加大風子油一錢五分

補消一錢五更空心温酒調服直待辰時又

美如前調藥加熟蜜少許服之以蜜解口切不天可臥良久痛瀉數次不妨以稀粥補之如第

車一日服消風散第二日即服此藥第三日服

磨風丸周而復始又如此服之瘦弱者十日

當內追風散只用一服老弱者勿服

方歌追風散用川鬱金皂刺大黃研末勻初服消

風次用此風油消酒調服神

磨風丸

豨薟草

牛蒡子

炒

麻黃

蒼耳草

細辛

川芎

當歸

荆芥

蔓荊子

防風

車前子

威靈仙

天麻

何首烏

羌活

獨活

各一兩

共為細末酒打麵糊為丸如梧桐子大每服

六七十丸溫酒送下日用二服

方歌 磨風丸豨薟麻黃蒼細芎歸荆蔓防車威天

麻何羌獨追風服後用此方

類聚祛風散

硫黃

寒水石

枯白礬

貫衆

各二兩

蛇床子

一兩

朴消

五錢

共研細末臘月豬脂搗爛調敷

方歌 類聚祛風散硫黃寒水枯礬消蛇床貫衆細

研豬脂搗崙捺徧體癩風瘡

醉仙散

牛蒡子炒

胡麻

枸杞子

蔓荊子 各一兩

苦參

白蒺藜

防風

花粉 各五錢

共研細末每服一錢加輕粉一分二釐研勻

茶清調服晨午晚各一服五七日後先於牙

縫內出臭黃涎渾身疼悶如醉然後利下膿

血惡物臭氣病根乃去矣

方歌醉仙上部癩風重牛蒡胡麻枸杞蔓荊苦參蒺

藜防花粉服加輕粉用茶清

通天再造散

大黃煨 一兩

皂角刺 一兩五錢

鬱金 五錢

白牽牛 六錢
頭末半生半炒

共研細末每服二錢或三錢早晨面東醇酒

調下當日利下惡物或膿或蟲為效

方歌通天再造治癩風敗證先從下部攻鬱金大

黃牽牛刺晨服酒調面向東

換肌散

烏梢蛇

白花蛇

蚯蚓 各一兩
去土

細辛

木鱉子

白芷

天麻 連莖者

赤芍

蔓荊子

當歸

威靈仙

荆芥穗

甘菊花

不灰木

苦參

苦參

沙參

何首烏

石菖蒲

木賊

天門冬 去心

川芎

白蒺藜

甘草 炙

胡麻仁

蒼朮 米泔水浸炒

草烏

各三錢五分
湯泡去皮

共研細末每服五錢温酒調下酒多更妙紫參不灰木雖無亦可

方換肌散治大風瘡毒攻眉脫壞鼻梁烏稍白
 歌花蛇蝎細鱉芷天麻芍蔓當威靈荆菊不灰
 木紫苦沙參何首菖木賊天冬芎蒨草胡麻
 蒼术草烏強

補氣瀉榮湯

連翹 去心

升麻 各六分

桔梗 五分

黃芩

生地 各四分

黃連

蚯蚓 酒炒去土

當歸

蘇木

全蠍 各三分

人參

白豆蔻 各三分

甘草 一分

水二鍾酒一鍾煎至一鍾去渣又用胡桐淚
 一分水蛭炒蠶蟲各三箇炒麝香五釐桃仁
 三箇研泥共為細末入藥湯內煎至七分飯
 後服之

方補氣瀉榮癘虛宜芩連參桔蚓歸耆蘇地升
 歌蠍翹慈草桐淚蛭蠶麝桃泥

何首烏酒

何首烏 四兩

當歸身

當歸尾

穿山甲 炙

生地黃

熟地黃

蝦蟆 各一兩

側柏葉

松鍼

五加皮

川烏 湯泡去皮

草烏 各四錢 湯泡去皮

將藥入夏布袋內紫口用黃酒二十觔同藥

袋入罈內封固重湯煮三炷香埋罈七日開

罈口取酒時時飲之令醺醺然作汗避風

方何首烏酒大風疾歸甲松鍼生熟地側蟆五

歌加川草烏酒煮滋榮毒自息


百靈丹 見腫 湯門

楊

梅

瘡

圖



楊梅瘡

楊梅瘡生有二般精化氣化是其源精化淫慾氣
傳染氣宜發汗精下痊

註

此證一名廣瘡因其毒出自嶺南一名時瘡
以時氣乖變邪氣湊襲之故一名棉花瘡因
其纏綿不已也一名翻花楊梅因窠粒破爛
肉反突於外如黃蠟色一名天泡瘡因其夾
濕而生白胞也有形如赤豆嵌於肉內堅硬
如鐵名楊梅痘有形如風疹作癢名楊梅疹

御纂醫宗金鑑 卷七十三
先起紅暈後發斑點者名楊梅斑色紅作癢其圈大小不一二三相套因食穢毒之物入大腸而發名楊梅圈其名形雖異總不出氣化精化二因但氣化傳染者輕精化慾染者重氣化者或遇生此瘡之人鼻聞其氣或悞食不潔之物或登園受梅毒不潔之氣脾肺受毒故先從上部見之皮膚作癢筋骨微疼其形小而且乾也精化者由交媾不潔精泄時毒氣乘肝腎之虛而入於裏此爲慾染先從下部見之筋骨多痛或小水澀淋瘡形大而且堅氣化者毒在表未經入裏稍有萌動宜急服透骨搜風散元氣實者楊梅一劑散汗之精化者毒在裏深伏骨髓未透肌膚宜服九龍丹通利大小二便以瀉骨中之毒甚者二服降下毒物以土深壓之行瀉之後體實者升麻解毒湯體虛者歸靈內托散服至筋骨不疼瘡色淡白內毒已解再用金蟾脫殼酒一料掃餘毒以絕其源如梅毒初發服

表藥時恐上攻頭面宜豫服護面散或瘡勢已發於面愈後斑痕不退宜翠雲散點之以滅痕跡若梅瘡潰爛時膿穢浸淫成片而痛者以鵝黃散撒之又翻花楊梅亦以本方加雄黃末香油調敷之外有護從丸於發瘡時令侍從人服之可免傳染梅瘡初起頭不痛筋骨不疼小水通利瘡形碎小色鮮頭面稀少口角無瘡胸背稠密穀道清楚者為順若先發下疳次生便毒魚口便覺筋骨疼痛而

梅瘡隨發色紫堅硬手足多生形如湯潑起皰者為險總之始終調治得法輕者半年重者一載始得全愈若患者不遵正法醫治欲求速效強服輕粉水銀白粉霜劫藥等類妄用熏擦哈吸等法以致餘毒含藏骨髓復為倒發結毒輕則累及妻子甚則腐爛損形不可不慎

透骨搜風散

透骨草

白花者陰乾

生脂麻

羌活 獨活

小黑豆 紫葡萄

槐子 白糖

六安茶 核桃肉 各一錢五分

生薑三片紅棗肉三枚水三鍾煎一鍾露一宿空心熱服被蓋出汗避風

方歌 透骨搜風散梅毒筋骨微疼癢皮膚脂麻羌

獨豆葡萄槐子糖茶核桃肉

楊梅一劑散

麻黃 一兩 威靈仙 八錢

大黃 七錢 羌活

白芷 皂刺

金銀花 穿山甲 炙研

蟬蛻 各五錢 防風 三錢

土山羊肉一筋河水煮熟取清湯二盃用黃酒

代一盃將藥煎至一盃令患者空心將羊肉淡

代食令飽隨後服藥蓋被出汗避風

方歌 楊梅一劑元氣壯上部生毒氣化瘡麻黃羌

芷威靈刺銀花風甲蟬大黃

升麻解毒湯

升麻

皂刺

各四錢

土茯苓

一觔

水八盃煎四盃作四次一日服盡每次炖熱
加香油三茶匙和勻量病上下食前後服之
如瘡生項上加白芷

咽內加桔梗

胸腹加白芍

肩背加羌活

下部加牛膝

方歌

升麻解毒筋骨疼梅毒纏綿壯服靈土苓皂

刺香油服按部須加藥引經

歸靈內托散

人參

木瓜

白朮

土炒

金銀花

防已

天花粉

白鮮皮

薏苡仁

各一錢

當歸

熟地

白芍

酒炒

川芎

各一錢

土茯苓

二兩

威靈仙

六分

甘草

五分

水三鍾煎二鍾作二次隨病上下服之渣再

煎服

下部加牛膝五分

元氣虛者倍加參歸

毒氣盛者倍加銀花加蒲公英

外以麥冬五錢去心薏苡仁五錢土茯苓一

兩煎湯常服以代茶

方歌

歸苓內托參木瓜銀四物已天花土苓鮮

薏威靈草梅瘡體弱服堪誇

金蟬脫殼酒

醇酒五觔大蝦蟆一箇土茯苓五兩浸酒內瓶

口封嚴重湯煮二炷香時取出待次日飲之以

醉為度無論冬夏蓋煖出汗為效餘存之酒次

日隨量飲之酒盡瘡愈又治結毒筋骨疼痛諸

藥不效者更妙服酒七日後禁見風為效忌口及房慾

護面散

女人頭髮

煨存性

明雄黃

各三分

共研細香油半酒鍾調勻滾黃酒冲服一日

三服

方歌護面散醫梅瘡現豫服毒不攻頭面香油調

藥黃酒冲只用雄黃頭髮煨

翠雲散

輕粉

一兩

石膏

煨一兩

膽礬

銅綠

各五錢

共研極細末濕瘡乾撒乾瘡以公豬膽汁調

濃點之每日三次斑痕自退

方歌

翠雲散去瘡後斑輕粉石膏共膽礬銅綠共

研濕乾撒豬膽汁調能潤乾

鵝黃散

輕粉

石膏

煨

黃蘗

各等分炒

共為末乾撒患處即可生痂再爛再撒毒盡即愈

方歌 鵝黃散治梅瘡爛膿穢多疼浸成片輕粉石

膏黃蘗研乾撒止疼解毒驗

護從丸

雄黃

川椒 各五錢

杏仁

一百粒炒去皮尖

共研末燒酒打飛羅麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸白滾水送下


方歌 護從丸避梅瘡患雄黃川椒各五錢杏仁百

粒酒糊入從人服之毒不傳

九龍丹

見下部懸癰

楊梅結毒圖



楊梅結毒形狀破頭爛眼蝕鼻或肩肘腿脛腐爛

楊梅結毒

結毒楊梅毒結生原於誤服劫藥成日久逢虛始
 倒發腦鼻喉目任蝕攻

註

此證因生楊梅方熾誤服水銀升煉悍燥劫
 藥希圖速效瘡痂盡落一時僥倖而愈不知
 遺害久遠引毒潛藏骨髓關竅之中其毒積
 久因經虛外攻故名結毒倒發其始先從筋
 骨疼痛隨處結腫皮色如常將爛時色方紫
 紅腐臭不堪以致腦頂塌陷腮唇鼻梁損壞

穿喉蝕目手足拘攣等患終成痼疾初起結
腫筋骨疼痛時宜服搜風解毒湯若徧身破
爛臭穢而兼筋骨疼痛氣貫毒盛者宜服化
毒散氣衰者豬脰子湯主之若結毒腫塊經
年難愈諸法罔效者宜西聖復煎丸主之若
結毒攻於口鼻者宜五寶散主之年久臭爛
鼻破損壞者宜服結毒紫金丹若入巔頂頭
痛如破者內服天麻餅子鼻吸碧雲散若鼻
塞不通宜吹通鼻散甚效毒攻咽喉腐爛臭
蝕者宜服硫黃不二散兼吹結毒靈藥兌人
中白若結毒筋骨疼痛朝輕夜重喜熱手按
揉者係犯寒涼宜鉛回散主之結毒臭爛不
斂宜貼解毒紫金膏兼撒結毒靈藥壯實者
以解毒爲主虛弱者以兼補爲法以上之證
各隨次第如法調治重者一年輕者半年自
然可痊永無後患慎勿妄求速效以自貽誤

金也

搜風解毒湯

土茯苓 一兩

白鮮皮

金銀花

薏苡仁

防風

木通

木瓜 各五分

皂角子 四分

水二鍾煎一鍾服之一日三服

氣虛加人參七分

血虛加當歸七分

忌清茶牛羊雞鵝魚肉燒酒房慾等件

方 搜風解毒湯 倒發初腫拘急骨痛加土苓白

鮮銀花 薏皂角 防風 通木瓜

化毒散

生天黃 一兩

穿山甲 炙

當歸尾 各五錢

白殭蠶 三錢 炒

蜈蚣 一條 炙黃

共研末每服二錢溫酒調下一日二服

方 化毒散 醫結毒盛破穢氣實筋骨疼大黃山

歌 甲殭歸尾蜈蚣研末酒調成

豬脰子湯

豬脬子

一兩 切碎

黃耆

鹽水炒

金銀花

各三錢

當歸

白芍

各一錢五分 酒炒

天花粉

貝母

去心研

穿山甲

炙研

白鮮皮

青風藤

白芷

木瓜

皂刺

甘草節

各一錢

黃栝蘘

一箇 連仁研爛

防已

七分

鼈虱胡麻

二錢 炒研

白色土 茯苓四兩 河水四大盞 煎湯三盞

滓將羣藥入湯內煎一大盞 通口服 胃弱者

分爲二服 日三服

方歌 豬脬湯 治結毒 虛歸芍 天花蘘 貝耆 胡麻 銀

甲 鮮藤 芷木 瓜已刺 草苓 宜

西聖復煎丸

乳香

沒藥

孩兒茶

丁香

各一兩

血竭

阿魏

白花蛇 各四錢

飛羅麵 一觔 炒焦黃色

共研細煉蜜六兩煎滾香油四兩大棗肉二十枚搗膏共和為丸如彈子大每服一丸土茯苓二兩水二鍾煎至一鍾將藥丸入內再煎至半鍾澄去渣溫服

方歌西聖復煎丸結毒腫塊經年服自無乳沒兒

茶丁血竭阿魏白蛇麵炒胡

結毒紫金丹

龜板 放炭火上炙焦用白酒漿塗之 再炙以焦黃為度研末二兩

硃砂 六錢

石決明 六錢 煨紅童便淬一次

各研極細末共和勻爛米飯為丸麻子大每服一錢量病上下食前後服之筋骨疼痛酒下腐爛者土茯苓湯下

方歌結毒紫金丹龜板石決硃砂米飯丸年久毒

攻鼻損破土苓湯服臭爛痊

天麻餅子

天麻

薄荷

甘松

白附子 去皮

白芷 蒼朮 米泔水浸炒

川芎 川烏 湯泡去皮

草烏 湯泡去皮 防風

細辛 甘草 各一錢 生

雄黃 全蠍 各三錢

右為細末寒食麵打糊為丸如豌豆大捻作餅子每服二三十餅蔥白煎湯送下

方歌天麻餅子薄甘松雄黃白附芷蒼芎川草烏

蠍防細草結毒攻巖頭痛平

走鼻散

壺盧殼 燒灰 石鍾乳

膽礬 冰片 各等分

共為末吹入鼻內出黃水日吹二三次三二日即通

方歌通鼻散吹結毒證毒塞鼻中息不通石鍾乳

與胡盧殼膽礬冰片等分同

硫黃不二散

硫黃 一錢 旋花 一分

共研細用凉水一酒鍾調服

方歌 硫黃不二毒攻喉腐臭爛蝕痛不休凉水調服疼立止靛花少兌不須憂

結毒靈藥

水銀 一兩

硃砂

硫黃

雄黃 各三錢

共研細入陽城礮內泥固鐵蓋梁兜固緊封口其火候俱按紅升丹之煉法火畢次日取出盞底靈藥約有一兩五六錢治尋常腐爛

之證靈藥五錢輕粉五錢同研細小礮盛收以紗封之臨用時甘草湯洗淨患處將礮倒懸紗眼內篩藥患上油紙蓋之男婦咽喉爛者靈藥一錢加人中白二分研細吹之日用三次

方歌 結毒靈藥化腐方水銀硃砂硫雄黃共研入罐用泥固兜繫火昇三炷香

鉛回散

方歌 以鉛化盡為度澄去水將灰傾在三重

半觔銅杓化開傾入水中

取起再化再傾

編輯外科心法要訣

卷七十一

行金醫宗全錄 卷之二十三
 紙上下用灰收乾水
 氣鉛灰日中曬乾

硫黃

各等分共研細每服一錢温酒調服至重者
 不過三次即效

方鉛回散療筋骨痛寒觸結毒夜間重鉛化成

灰兌硫黃每服五錢酒調送

五寶散 方見下部
 疔瘡

碧雲散 方見頭部頭風
 傷目

結毒紫金膏 方見脛部
 疔瘡

赤 白 遊 風 圖

赤白遊風形如雲片中起粟粒



赤白遊風

赤白遊風如粟形浮腫焮熱癢兼疼表虛風襲怫鬱久血赤氣白熱化成

註

此證發於肌膚遊走無定起如雲片浮腫焮熱痛癢相兼高累如粟由脾肺燥熱而兼表虛腠理不密風邪襲入怫鬱日久與熱相搏則化熱益盛而成滯於血分者則發赤色滯在氣分者則發白色故名赤白遊風也初俱宜荆防敗毒散疎解之赤者次服四物消風

飲白者次服_註補中益氣湯加防風蟬蛻鱘

生何首烏治之初俱用牛肉片貼之豬羊俱

可遊走太速者斫之定停者以真君妙貼散

鷄子清調敷其看順逆之法與丹毒門叅考

忌魚腥鷄鵝動風燥血之物犯則難愈

四物消風飲

生地 三錢

當歸 二錢

荆芥 各一錢

防風 各一錢五分

赤芍

川芎

白鮮皮

蟬蛻

薄荷 各一錢

獨活

柴胡 各七分

紅棗肉二枚水二鍾煎八分去渣服

方歌 四物消風飲調榮血滋風減赤色平荆防鮮

蟬兼獨活柴薄紅棗水煎濃

荆防敗毒散 見項部腦疽

補中益氣湯 見潰瘍門

真君妙貼散 見腫瘍門

紫癩風發在遍身色紫暗癩



白癩風發在遍身粉紅癩中有白點

紫 白 癩 風 圖

紫白癜風

紫白癜風無癢痛白因氣滯紫血凝熱體風侵濕相搏毛竅閉塞發斑形

註

此證俗名汗斑有紫白二種紫因血滯白因氣滯總由熱體風邪濕氣侵入毛孔與氣血凝滯毛竅閉塞而成多生面項癩點遊走延蔓成片初無痛癢久之微癢初起宜萬靈丹汗之次以胡麻丸常服外用蜜陀僧散擦患處令汗出風濕自解古今治法雖多取效甚少得此證者當忌魚腥煎炒火酒動風發物

胡麻丸

大胡麻 四兩

苦參

防風

石菖蒲

威靈仙 各二兩

白附子

獨活 各一兩

甘草 五錢

右為細末白酒漿和丸如棗豆大每服二錢形瘦者一錢五分食後臨臥白滾水送下

方歌 胡麻丸治紫白癜除去風濕不致延苦參白

附防風草菖蒲獨活威靈仙

蜜陀僧散

雄黃

硫黃

蛇床子

各二錢

蜜陀僧

石黃

各一錢

輕粉

五分

共研末醋調搽患上

方歌

蜜陀僧散風濕患入腠成癥紫白斑雄硫輕

粉蛇床子石黃共末醋搽痊

萬靈丹


見腫瘍門

白

白駁風初生面項由白癩點甚則延及遍身

駁

風



白

風

白駁風

白駁風生面頸間風邪相搏白點癩甚延徧身無痛癢治宜消風塗脂痊

註

此證白面及頸項肉色忽然變白狀類癩點並不癢痛由風邪相搏於皮膚致令氣血失和施治宜早若因循日久甚者延及徧身初服浮萍丸次服蒼耳膏外以穿山甲片先刮患處至燥痛取鰻鱧魚脂日三塗之一方取樹孔中水溫洗之洗後搗桂心牡蠣等分爲末面油調塗日三夜一俱效

浮萍丸

紫背浮萍

取大者洗淨曬乾

研細末煉蜜爲丸如彈子大每服一九豆淋酒送下

豆淋酒法

黑豆半升炒烟起冲入醇酒三觔浸一日夜去豆用酒送藥

方歌浮萍丸治白駁應曬乾紫背大浮萍蜜丸彈

狀豆酒服專能發表散邪風

蒼耳膏

蒼耳

鮮者連根帶葉取
五七十劬洗淨

切碎入大鍋內煮爛取汁絹濾過再熬成膏

磁罐盛之用時以桑木匙挑一匙噙口內用

黃酒送下服後有風處必出小瘡如豆粒大

此風毒出也刺破出汁盡即愈忌豬肉

方歌

蒼耳風邪侵皮膚氣血失和白駁生連根帶


葉鮮蒼耳洗淨熬膏酒服靈

癩

瘍

風

圖



癩瘍風生在頸項胸腋起紫白點點相連

癰瘍風

癰瘍風從皮膚生頸項胸腋無癢疼紫白點點不開大皮膚風邪熱結成

註

此證發於皮膚多生頸項胸腋其色紫白點點相連亦無癢疼較白駁形圓不延蔓開大由風邪鬱熱皮膚居久不散而成斯疾宜服烏蛇散外用羊蹄草根共硫黃蘸醋於綉鐵片上研濃汁日塗二三次效

烏蛇散

烏蛇 三兩 酒浸 羌活

防風 黃芩

苦參 各二兩 人參

沙參 丹參

元參 梔子仁 生

桂心 秦艽

木通 犀角屑

白蒺藜 升麻

枳殼 麩炒 白鮮皮

川芎 各一兩

共研細末每服二錢食遠溫酒調服忌雞豬


魚蒜麵食熱物之類
方歌 烏蛇瘰癧風熱淫羌活防風芎五參梔桂秦
芫通犀角蒺藜升枳白鮮芩

丹

毒

圖

丹毒發在徧身形如雲片色如燕脂



御製醫宗金鑑 卷之十三 編輯外科心法要訣 三

丹毒

丹毒名多雲片形風火濕寒肉分凝胸腹四肢分順逆清火消風砭敷靈

註

孫真人云丹毒一名天火肉中忽有赤色如丹塗之狀其大如掌甚者徧身有癢有痛而無定處丹名雖多其理則一也形如鷄冠名鷄冠丹若皮澀起如麻豆粒者名茱萸丹亦有水丹徧身起炮遇水濕搏之透露黃色恍如有水在皮中此雖小疾能令人死須當速

治不可忽也色赤者諸書謂之赤遊丹色白者爲水丹小兒多生之但有乾濕癢痛之殊有夾濕夾風夾寒之別諸丹總屬心火三焦風邪而成如色赤而乾發熱作癢形如雲片者卽名赤遊丹屬血分有火而受風也毒盛者服藍葉散毒輕者宜導赤湯加薄荷葉獨活服之如初起白癩漸透黃色光亮張墜破流黃水濕爛多痛者名水丹又名風丹多生腿膝屬脾肺有熱而夾濕也宜防已散主之

亦有起白癩無熱無痛遊走不定者由火毒未發肌膚外受寒鬱名爲冷癩宜服烏藥順氣散外用薑擦凡丹形初見即用牛羊精肉片貼之甚則用砭法令出紫血色重不散者以柏葉散敷之又方芸薑葉研末靛青調敷甚效諸丹本於火邪其勢暴速自胸腹走於四肢者順從四肢攻於胸腹者逆

藍葉散

藍葉

曬乾

川芎

赤芍

知母

生地

白芷

川升麻

柴胡

葛根

杏仁

炒去皮尖

甘草

各一錢

石膏

煨

梔子仁

各五分

共搗粗末每用八錢新汲水二鍾煎八分去渣服

熱甚加黃芩元參

方歌 藍葉散却赤遊丹皆因血熱風邪纏芎芍知
膏生地芷升麻柴葛杏梔甘

防已散

防已 三兩

朴消 一兩

犀角 鎊

川芎

黃芩

黃耆

川升麻 各一錢

共搗粗末每用五錢加竹葉三十片新汲水
二鍾煎八分服

方歌 防已丹毒始白癩漸黃亮痛濕熱原朴消尾

角芎芩共耆與升麻竹葉煎

烏藥順氣散

烏藥

橘紅 各二錢

枳殼 麩炒

白芷

桔梗

防風

僵蠶 炒

獨活

川芎 各一錢

甘草 五分

水二鍾生薑三片煎八分服

方歌烏藥順氣枳橘紅芷桔風殭獨草芎冷瘕遊
行無熱痛因毒未發受寒風

導赤湯

見口部
口糜

柏葉散

見腰部
纏
腰火丹

粟

瘡

圖



粟瘡生在偏身形如紅粟作瘡

粟瘡作癢

粟瘡癢證屬火生風邪乘皮起粟形風為火化能作癢通聖苦參及消風

註

凡諸瘡作癢皆屬心火火邪內鬱表虛之人

感受風邪襲入皮膚風遇火化作癢致起瘡

瘍形如粟粒其色紅搔之愈癢久而不瘥亦

能消耗血液膚如蛇皮初服防風通聖散加

枳殼蟬蛻血燥遇晚癢甚夜不寐者宜服消

風散外敷二味拔毒散若年深日久膚如蛇

皮者宜常服皂角苦參丸外用豬脂油二兩

苦杏仁一兩搗泥抹之自效

皂角苦參丸

苦參 一筋

荆芥 十二兩

白芷

大風子肉

防風 各六兩

大皂角

川芎

當歸

何首烏 生

大胡麻

枸杞子

牛蒡子 炒

威靈仙

全蠍

白附子

蒺藜

炒去刺

獨活

川牛膝

各五兩

草烏

湯泡去皮

蒼朮

米泔水浸炒

連翹

去心

天麻

蔓荊子

羌活

青風藤

甘草

杜仲

各三兩
酥炙

白花蛇

切片酥油炙黃

縮砂仁

各二兩

人參

一兩

共研細末醋打老米糊為丸如梧桐子大每服三四十九丸溫酒食前後任下避風忌口為

要

方歌

皂角苦參粟瘡癢久似蛇皮膚難當芎歸何

首胡麻芷大風枸杞草烏蒼翹芎威靈蠍白

附蒺藜天麻獨蔓羌白蛇風藤甘杜仲人參

牛膝縮荊防

防風通聖散

見頭部
禿瘡

消風散

見項部
鈕扣風

一味拔毒散
見腫瘍門

枯筋箭圖



枯筋箭又名胛子初如赤豆

枯筋箭

枯筋箭由肝失榮筋氣外發赤豆形破突筋頭如花
花甚或繫或炎便成功

註

此證一名臍子由肝失血養以致筋氣外發
初起如赤豆枯則微槁日久破裂鑽出筋頭
鬆鬆枯槁如花之甚多生於手足胸乳之間
根蒂細小者宜用藥線齊根繫緊七日後其
患自落以月白珍珠散摻之其疤收斂根大
頂小者用銅錢一文套臍子上以草紙穰代

艾連灸三壯其患枯落臍形若大用草紙
濕套在臍上灸之

藥線

見腎部痔瘡

月白珍珠散

見潰瘍門

癰

黃水瘡

暑合癆毒小瘡

瘡疽

產後癰疽

枯筋筋

枯筋筋由肝失榮筋氣外散亦且形破或燥或乾
花甚或繁或炎便成功

此證一名腕子由肝失血養以致筋氣外散

初起如赤豆枯則微痛日久成瘡由筋枯

以白芨麩醋

麩門貝散

花之甚多生於手足掌背

藥絲

貝散

小者宜用藥線齊根繫繫七日

黑套套粗土瘰之珠散摻之其疤收斂根大

艾乾灸三塊其患林蒜根涎甚大因草藥

御纂醫宗金鑑卷七十四

編輯外科心法要訣目錄

發無定處 下

疥瘡

癬

黃水瘡

暑令瘍毒小癩

瘡疽

產後癰疽

翻花瘡

無圖

血風瘡

瘡癩

浸淫瘡

火赤瘡

貓眼瘡

魚脊瘡

骨痠瘡

風疔

無圖

血疔

白疔

漆瘡

血箭

血痣

股痛

無圖

瘡口誤入毒水

無圖

諸瘡生蠅蛆

無圖


御纂醫宗金鑑卷七十四

編輯外科心法要訣

疥

瘡

圖



疥瘡五種

疥瘡

疥瘡乾濕蟲砂膿各經蘊毒風化成治論上下分
肥瘦清風利濕兼殺蟲

詳

此證有乾濕蟲砂膿之分其形雖有五種總
由各經蘊毒日久生火兼受風濕化生斯疾
或傳染而生凡疥先從手了生起遶徧週身
瘙癢無度如肺經燥盛則生乾疥瘙癢皮枯
而起白屑如脾經濕盛則生濕疥聾腫作痛
破津黃水甚流黑汁如肝經風盛則生蟲疥

瘙癢徹骨撓不知疼如心血凝滯則生砂疥
形如細砂熈赤瘙痛抓之有水如腎經濕熱
則生膿窠疥形如豆粒便利作癢膿清淡白
或脾經濕盛亦生膿窠疥但頂含稠膿癢疼
相兼爲異疥雖有餘之證而體虛之人亦生
以便秘爲實便利爲虛亦有虛而便燥者如
風秘則便燥血分枯燥則便澁又在瘡形色
重色淡及岷息之有力無力辨之初起有餘
之人俱宜防風通聖散服之虛者服荊防敗

毒散透發之及形勢已定則無論虛實乾疥
 服消風散濕疥服蒼朮膏蟲疥服蘆薈丸砂
 疥服犀角飲子膿窠疥服秦艽丸經久不愈
 血燥者服當歸飲子外治乾疥者擦繡毬丸
 濕者擦臭靈丹潤燥殺蟲俱效疥生上體多
 者偏風熱盛下體多者偏風濕盛肥人多風
 濕瘦人多血熱詳辨治之

蒼朮膏

南蒼朮

十筋切片入砂鍋內水煮減半取汁再加水煮如前以朮無味為度併汁一處用
小砂鍋再煎如乾一寸加汁一寸煎成膏加蜂蜜四兩和勻

每服二羹匙空心白滾水調服

方歌蒼朮膏醫濕疥瘡切片入鍋煮取湯熬膏加

蜜空心服濕除熱散勝羣方

犀角飲子

犀角

赤芍

甘菊花

元參

木通

赤小豆

石菖蒲

各一錢五分

甘草

生一錢

生薑三片水二鍾煎八分服

方歌犀角飲子砂疥生癢疼色赤出心經芍菊元

參通赤豆菖蒲薑草水煎成

秦朮丸

秦朮 苦參

大黃 酒蒸 黃耆 各二兩

防風 漏蘆

黃連 各一兩五錢 烏蛇肉 五錢 酒浸焙乾

共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十

丸食後溫酒送下

方歌秦朮丸服膿疥愈清熱癢除瘡自去苦參大

黃風漏蘆烏蛇黃連者蜜聚

當歸飲子

當歸 生地

白芍 酒炒 川芎

何首烏 荆芥

防風 白蒺藜 各一錢

黃耆 甘草 各五分 生

水二鍾煎八分食遠服

方當歸飲子膿疥久癢添血燥不能除四物黃

歌者何首草荆防蒺入風自疎

繡毬丸

川椒

輕粉

樟腦

雄黃

枯白礬

水銀 各二錢

大風子肉

一百枚
另研

共研細末同大風子肉再碾勻加相油一兩

化開和藥攪勻作丸以二掌合搓如圓眼大

先以鼻聞次擦患處

方繡毬丸用椒輕粉樟腦雄黃礬水銀大風子

歌研柏油兌乾疥搓擦效如神

臭靈丹

硫黃末

油核桃

生豬脂油

各一兩 水銀一錢

搗膏用擦患處

方臭靈丹擦膿濕疥硫黃末共油核桃生豬脂

歌

油各一兩水銀一錢同搗膏

防風通聖散

見頭部
禿瘡

荆防敗毒散

見項部
腦疽

消風散

見項部
鈕扣風

蘆薈丸

見牙齒部
牙齦

大凡以真開文為患

大凡以真開文為患

癰

癰瘡六種

瘡

圖



癬

癬證情形有六般風熱濕蟲是根原乾濕風牛松
刀癬春生桃花面上旋

註 此證總由風熱濕邪侵襲皮膚鬱久風盛則
化為蟲是以搔癢之無休也其名有六一曰
乾癬搔癢則起白屑索然彫枯二曰濕癬搔
癢則出黏汁侵淫如蟲行三曰風癬即年久
不愈之頑癬也搔則痺頑不知痛癢四曰牛
皮癬狀如牛領之皮厚而且堅五曰松皮癬

狀如蒼松之皮紅白斑點相連時時作癢
六曰刀癬輪郭全無縱橫不定總以殺蟲滲濕
消毒之藥敷之輕者羊蹄根散久頑者必效
散搽之亦有脾肺風濕過盛而腫痛者宜服
散風苦參丸解散風濕其腫痛即消又有面
上風癬初如痞疔或漸成細瘡時作痛癢發
於春月又名吹花癬即俗所謂桃花癬也婦
女多有之此由肺胃風熱隨陽氣上升而成
宜服疎風清熱飲外用消風玉容散每日洗

之自效

羊蹄根散

羊蹄根 八錢

枯白礬 二錢

共研勻米醋調擦麻處

方歌 羊蹄根散敷諸癬羊蹄根共枯白礬二味研

末加米醋搽患滲濕癢可痊

必效散

川槿皮 四兩

海桐皮

大黃 各二兩

百藥煎 一兩四錢

巴豆 一錢五分

蟬螿 一箇

雄黃

輕粉 各四錢

共研極細末用陰陽水調藥將癬抓損薄敷

藥乾必待自落

方歌 必效大黃百藥煎川槿海桐巴豆蟬螿雄黃輕

粉陰陽水調搽諸癬久年頑

散風苦參丸

苦參 四兩

大黃 炒香

獨活

防風

枳殼 麩炒 元參

黃連 各二兩 黃芩

梔子 生 菊花 各一兩

共研細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後白滾水送下日用三服茶酒任下

方歌 散風苦參風濕盛癬瘡多癢腫痛兼大黃芩

獨防風枳元參梔子菊黃連

疎風清熱飲

苦參 二錢酒浸蒸曬九次炒黃 全蠍 土炒

皂刺 豬牙皂角

防風 荆芥穗

金銀花 蟬蛻 各一錢

酒水各一鍾加葱白三寸煎一鍾去渣熱服

忌發物

方歌 疎風清熱風癬患時作痛癢極纏綿苦參蠍

刺豬牙皂防風荆芥銀花蟬

消風玉容散

綠豆麩 三兩 白菊花

白附子 白芷 各一兩

熬白食鹽 五錢

共研細末加冰片五分再研勻收貯每日洗面以代肥皂

方消風玉容綠豆麩菊花白附子正食鹽研加冰片代肥皂風除癬去最為先

黃

水

瘡

圖

黃水瘡



黃水瘡

黃水瘡如粟米形起時作癢破時疼外因風邪內濕熱黃水浸淫更復生

註

此證初如粟米而癢兼痛破流黃水浸淫成片隨處可生由脾胃濕熱外受風邪相搏而水成宜服升麻消毒飲熱甚外用青蛤散敷之濕盛碧玉散敷之即效痂厚用香油潤之忌見水洗

升麻消毒飲

當歸尾

赤芍

金銀花

連翹

去心

牛蒡子

炒

梔子

生

羌活

白芷

紅花

防風

甘草

生

升麻

桔梗

每味用二錢為大劑一錢五分為中劑二錢為小劑水二鍾煎八分食遠熱服

加瘡生頭面滅去歸尾紅花

方歌升麻消毒却風濕歸芍銀花翹芎梔羌芷紅

花防草桔黃水浸淫服漸失

青蛤散 見鼻部

碧玉散 見面部


金匙

半

金匙

半

暑令傷毒小癰圖



暑傷小癰

暑令瘍毒小癰

暑令瘍癰焮腫疼頭暈口苦背肌紅較之癰疽發熱異不分日夜似火攻

註

此證係暑令所生瘍毒小癰初發背心肌膚紅暈次生腫痛發熱無時日夜不止兼頭目暈眩口苦舌乾心煩背熱肢體倦怠初宜荆防敗毒散加霍香黃連石膏服之外治按癰疽腫瘍潰瘍門

荆防敗毒散

見項部腦疽

瘰

疽

圖



瘰疽生在筋骨先黑變青色如拳打之狀

瘡疽

瘡疽因受山瘴毒伏藏久痛附筋骨初黑次青如拳打急硬惡血後膿熟

註

此證因受山嵐瘴氣伏藏筋骨之間年月久遠令人痛附筋骨始發黑色頑痺如木石其毒附着於筋骨重按方知微痛五七日後毒勢湧出浮腫次變青色如拳打之狀寒戰似瘡頭顫口偏手足厥逆黑睛緊小始見黑色時急用砭法令出惡血隨服不換金正氣散

加羚羊角以泔邪毒次按癰疽腫瘍潰瘍治法膿熟潰黃白膿為順出黑汁者險

不換金正氣散

蒼朮 米泔水浸炒 厚朴 薑製

陳皮 藿香

半夏麴 各二錢 炒 甘草 一錢 炙

水二鍾生薑五片紅棗肉二枚煎一鍾去渣稍熱服忌生冷油膩

方歌 正氣散因山瘴感伏久生疽身戰寒平胃散

加半夏麴蘘香薑棗服平安

...

...

...

...

...

不銚金五麻婿

去鄰燕微黃白蠟為劑由黑竹杏劍

...

產後癰疽圖



產後癰疽

產後癰疽最屬險七情之傷六淫感瘀血稽留成癰疽勢潰托裏不宜緩

註

此證因產後氣血經絡俱虛或因七情所傷或因六淫所感與瘀血相稽而成最屬險候法宜大補扶助根本兼活瘀生新為要其客病以末治之初服生化湯隨證加減以消毒有表邪服清魂散有裏熱服回生丹勢欲潰膿時急宜托裏遲則恐毒內陷藥味宜和平純善最忌汗下峻劑其餘腫潰治法俱按

疽腫瘍潰瘍門

生化湯

當歸 八錢

川芎 四錢

薑炭

甘草 各四分

桃仁

十粒 去皮尖研泥

水一鍾半煎六分加無灰酒一小杯和服

方歌 生化湯宜產後疽通滯和榮又補虛歸芎薑炭炙甘草桃仁酒服善消瘀

清魂散

荆芥 一錢

川芎 五分

人參

甘草 炙

澤蘭葉 各三分

為末黃酒調服

清魂產後風邪侵荆芥川芎與人參炙甘草

蘭同作劑能疎表證效通神

回生丹

黑豆 三升

煮熟取汁三盃去豆

紅花

三兩炒黃色入醇酒大盃

生大黃

一觔 研末

蘇木

二兩剉用河水五盃煎汁三盃去渣

先將大黃末以好米醋三四盃攪勻文武火

木熬成膏如此二遍次下紅花酒蘇木湯黑豆

刺汁共熬成膏離火再入後藥

當歸

熟地

川芎

白茯苓

延胡索

烏藥

香附

蒲黃

牛膝

桃仁 另研

蒼朮

各二兩
米泔水浸炒

白芍

酒炒

甘草

炙

羌活

山萸肉

酒浸

三棱

陳皮

地榆

木香

五靈脂

各五錢

人參

白朮

土炒

青皮

木瓜

各三錢

良薑

四錢

乳香

沒藥

各一錢

共研細末用大黃膏為丸如彈子大每服

凡黃酒炖化通口服

生後存惡露致發癰疽服可逐除熱活

榮衛和紅花大黃豆蘇木八珍羌莢稜延

胡烏藥青陳榆香附乳沒蒲黃良膝瓜木香

靈脂桃蒼朮

翻花瘡

無圖

翻花瘡因潰後生頭大蒂小努菌形雖無痛癢觸流血血燥肝虛怒氣成

註

此證因生瘡潰後努肉自瘡口突出其狀如菌頭大蒂小愈努愈翻雖不大痛大癢誤有觸損流血不住久則虧虛總由肝虛怒氣血燥而成宜服逍遙散外用烏梅煨灰輕粉各等分研末撒之或馬齒莧煨灰豬脂調敷俱

效

逍遙散

見背部上搭手

血

風

瘡

圖



血風瘡發在遍身起如粟米下視淡紅暈

血風瘡米粟瘡米疔瘡

血風瘡證生徧身粟形搔癢脂水淫肝肺脾經風濕熱久鬱燥癢抓血津燥

註此證由肝脾二經濕熱外受風邪襲於皮膚

鬱於肺經致徧身生瘡形如粟米搔癢無度

抓破時津脂水浸淫成片令人煩躁口渴搔

癢日輕夜甚宜服消風散外敷雄黃解毒散

若日久風邪鬱在肌膚則耗血生火搔癢倍

增夜不得寐撓破津血心煩大便燥秘咽乾

不渴此屬火燥血短宜服地黃飲外擦黃連膏潤肌膏合而用之悉效兼忌椒酒鷄鵝動風等物

雄黃解毒散

雄黃

寒水石

各一兩

白礬

四兩

共研細末滾水調敷

方歌雄黃解毒寒水石白礬四兩共研之血風瘡

生粟米糝滾水調敷滲毒濕

地黃飲

生地

熟地

何首烏

各三錢

當歸

二錢

丹皮

黑參

白茯苓

炒去刺

僵蠶

各一錢五分

紅花

甘草

各五分

水煎早晚服

方歌地黃飲治血風瘡癢盛不眠血燥傷首烏丹

皮生熟地黑參歸蔞草紅僵

消風散

見項部
鈕扣風


黃連膏

見鼻部
鼻瘡

潤肌膏

見頭部
白屑風

瘡 疔 圖



瘡疔形如豆瓣扁丸瘡紅暈宜腫

痞瘡

痞瘡汗出中邪風狀類豆瓣扁瘡形日癢秦艽
宜服夜重當歸飲服寧

註

此證俗名鬼飯疥瘡由汗出受風或露臥乘
涼風邪多中表虛之人初起皮膚作癢次發
扁疔瘡形如豆瓣堆纍成片日癢甚者宜服
秦艽牛蒡湯夜癢重者宜當歸飲子服之外
用燒酒浸百部以藍布蘸酒擦之謹避風涼
自效

秦艽牛蒡湯

秦艽

一錢五分

牛蒡子

炒研

枳殼

麩炒

麻黃

蜜炙

犀角

鎊

黃芩

防風

甘草

生

黑參

升麻

各一錢

水二鍾煎八分服

方歌

秦艽牛蒡風留膚痞瘡生如麻豆形枳殼麻
黃犀角鎊黃芩風草黑參升

當歸飲子

見疥瘡

黃芩風草黑參代

水二盞煎入長服

代

甘草

黃芩

麻黃

半

秦

一

浸

醋炒青油研碎食後服不食黃水不出

浸厚瘡初起如細疥抓破津黃水蔓延成片

向四翅者即四翅者入口

滌

水

瘡



圖

浸淫瘡

浸淫瘡發火濕風黃水浸淫似疥形蔓延成片癢不止治宜清熱並消風

註

此證初生如疥搔癢無時蔓延不止抓津黃水浸淫成片由心火脾濕受風而成經云歲火太過甚則身熱肌膚浸淫仲景云從口流向四肢者順四肢流入口者逆初服升麻消毒飲加蒼朮川黃連抓破津血者宜服消風散外搽青蛤散即愈若遲不食黃水不止

此屬脾敗不治之證也

升麻消毒飲

見黃水瘡


消風散

見項部鈕扣風

青蛤散

見鼻部鼻蠶瘡

火赤瘡



火赤瘡起燎漿紫炮

天炮瘡頂白根赤燎漿水炮

火赤瘡

火赤瘡由時氣生燎漿水炮徧身成治分上下風熱瀉心清脾自可寧

註此證由心火妄動或感酷暑時臨火邪入肺

伏結而成初起小如芡實大如棋子燎漿水

炮色赤者為火赤瘡若頂白根赤名天炮瘡

俱延及徧身焮熱疼痛未破不堅炮破毒水

津爛不臭上體多生者屬風熱盛宜服解毒

瀉心湯下體多生者屬濕熱盛宜服清脾除

濕飲未破者俱宜蝌蚪拔毒散敷之已破者俱宜石珍散撒之清其濕熱破爛自乾甚效

解毒瀉心湯

黃芩

黃連

牛蒡子

炒研

知母

石膏

煨

梔子

生

防風

元參

荆芥

滑石

各一錢

木通

甘草

各五分

水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

方歌解毒瀉心湯火赤芩連牛蒡木通知石膏梔子防風草元參荆芥與滑石

清脾除濕飲

赤茯苓

白朮

土炒

蒼朮

米泔浸炒

黃芩

生地黄

麥冬

去心

梔子

生研

澤瀉

甘草

生

連翹

去心

茵陳蒿

枳殼

麩炒

元明粉 各一錢

水二鍾竹葉二十片燈心二十根煎八分食

前服

方歌清脾除濕天炮疾赤苓二朮苓生地麥冬梔

瀉草連翹茵陳元明同作劑

石珍散

輕粉

石膏

各一兩

黃蘗末

青黛

各二錢

共研勻先以甘草湯洗淨瘡處再用此藥

方歌石珍散去火邪害天炮破撒自康秦一兩輕


粉煨石膏三錢黃蘗加青黛

辨蚪拔毒散

見腫

貓眼瘡

貓眼瘡形如 哭彩閃爍



貓眼瘡

貓眼瘡名取象形痛癢不常無血膿光芒閃爍如
貓眼脾經濕熱外寒凝

註 此證一名寒瘡每生於面及徧身由脾經久

鬱濕熱復被外寒凝結而成初起形如貓眼
光彩閃爍無膿無血但痛癢不常久則近脛
宜服清肌滲濕湯外敷真君妙貼散兼多食
雞魚蒜韭忌食鮎魚鱗鰕而愈

清肌滲濕湯

蒼朮

米泔水浸炒

厚朴

薑汁炒

陳皮

煎蘇葉湯洗食甘草

生

柴胡

木通

澤瀉

白芷

升麻

白朮

土炒

梔子

生

黃連

各一錢

水二鍾生薑三片燈心二十根煎至八分溫

服

方清肌滲濕瘡貓眼脾濕熱鬱外寒纏平胃柴

胡通瀉芷升麻白朮梔子黃連

真君妙貼散

見腫瘍門

魚脊瘡



魚脊瘡初起白炮漸長如魚脊狀

魚脊瘡

魚脊瘡由虛人成感受濕熱皮間凝虛寒發緩炮
津水炎變稠膿陽氣生

此證形如魚脊由陽氣虛寒之人復感濕熱
結滯而成多生筋骨之間以陽氣虛寒故發
長緩慢只在皮膚堅凝脊痛初起白炮漸長
狀如魚脊破津黃水正膿生遲初治無論已
破未破宜蒜片艾灸以通陽氣外用真君妙
貼散香油調敷宜服內補十宣散得稠膿色

鮮者為順若炎之不應色暗腐爛出臭水者
逆其次內外治法俱按癰疽潰瘍門

真君妙貼散 見腫瘍門

內補十宣散 見胸部癰癧

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

骨 痿 瘡 圖



骨痿瘡色紅大如梅李

骨痠瘡

骨痠瘡形粟豆紅漸如梅李火毒成膿血不出痛不止治同疔法即成功

註此證初生形如粟豆色紅漸大如梅如李由火毒而成血不出膿不生痛亦不止久則延及遍身內外治法與疔門參考

風疔

無圖

風疔證如風癰形破流黃水癢微疼由於風濕客谷道如聖膏搽功即成

註此證由風濕客於谷道而成形如風癰作癢破流黃水浸淫徧體微疼宜用如聖膏搽之即愈

如聖膏

當歸 五錢

巴豆 三錢
去殼

香油八兩將二藥煤枯去渣入黃臘三兩化


盡離火絹濾淨將凝入輕粉二錢攪勻搽之
 方如聖膏用歸巴豆二味一同入香油燻枯加
 蠟漆輕粉凝搽風疔功即收

如前黃水對出... 宜用... 聖膏... 疔... 功... 收

血

疔

圖



血疔發在偏身形如紫疔其色紅紫搔癢

血疔

血疔形如紫疥瘡痛癢時作血多傷證因風熱閉
腠理消風散服功最强

註

此證由風熱閉塞腠理而成形如紫疥痛癢
時作血燥多熱宜服消風散

消風散

見頭部
鈕扣風

白

白疔生在偏身色白搔癢起白皮

疔

瘡

圖



白疔

白疔之形如疹疥色白而癢多不快固由風邪客皮膚亦由血燥難榮外

註

此證俗名蛇虱生於皮膚形如疹疥色白而癢搔起白皮由風邪客於皮膚血燥不能榮養所致初服防風通聖散次服搜風順氣丸以豬脂苦杏仁等分共搗絹包擦之俱效

搜風順氣丸

大黃 五兩 酒浸蒸曬九次 車前子 酒炒

山萸肉

山藥 炒

牛膝

酒浸

菟絲子

酒煮

獨活

火麻仁

微火焙去殼

檳榔

枳殼

麩炒

郁李仁

各二兩 滾水浸去皮

羌活

一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子每服三十丸茶酒任下早晚各一服

方歌

搜風順氣車前子 萸藥大黃膝菟絲 羌獨火麻榔枳郁服去風邪 血燥滋

防風通聖散

見頭部
禿瘡

風濕地熱

此散治風濕地熱... 凡患此症者... 宜服此散...

此散治風濕地熱... 凡患此症者... 宜服此散...

此散治風濕地熱... 凡患此症者... 宜服此散...

此散治風濕地熱... 凡患此症者... 宜服此散...

此散治風濕地熱... 凡患此症者... 宜服此散...

此散治風濕地熱... 凡患此症者... 宜服此散...

此散治風濕地熱... 凡患此症者... 宜服此散...

漆

瘡

圖

漆瘡隨處可生紅腫如疹



此藥治漆瘡... 凡患此症者... 宜服此藥...

此藥治漆瘡... 凡患此症者... 宜服此藥...

此藥治漆瘡... 凡患此症者... 宜服此藥...

此藥治漆瘡... 凡患此症者... 宜服此藥...

此藥治漆瘡... 凡患此症者... 宜服此藥...

此藥治漆瘡... 凡患此症者... 宜服此藥...

漆瘡

漆瘡感受漆毒生腠理不密腫焮紅初發覺癢後加疹皮破流水更兼疼

註此證由人之腠理不密感漆辛熱之毒而生

初發面癢而腫抓之漸似癩疹色紅徧傳肢體焮痛皮破爛斑流水甚者寒熱交作宜韭萊汁調三白散塗之內服化斑解毒湯忌浴熱水戒油膩厚味發物或用神麩研為末生蠟黃調塗患處尤效

三白散

鉛粉 一兩

輕粉 五錢

石膏 三錢

煨 共研勻韭萊汁調敷紙蓋如無韭萊汁涼水調亦可

方歌三白散敷漆瘡消輕粉鉛粉煨石膏去熱解

毒功效速研勻須用韭汁調

化斑解毒湯 見肋部內發丹毒

血

箭

圖



此證一名肌衄由心肺火盛逼血從毛孔中

血箭

血箭毛孔射出血心火熾迫血亂行桃花散用涼
水敷再塗金墨即能停

註

此證一名肌衄由心肺火盛逼血從毛孔中
射出如箭宜服涼血地黄湯外用桃花散以
涼水調敷或用金墨研末醋調涼塗其血即
止

涼血地黄湯

生地 三錢

黃連

當歸 各一錢五分 甘草

梔子 生研 元參 各一錢

黃芩 二錢

水二鍾煎八分量病上下服之

方歌涼血地黃心火盛毛孔血溢不歸經黃連歸

草芩梔子元參煎服效通靈

桃花散

白石灰半升用水潑成末與大黃片一兩五錢同炒以灰變紅色為度去大黃將石灰篩細用

涼水調敷

方歌桃花止血最為良一兩五錢生大黃半升石

灰相併炒去軍研篩水調強

血

痣

圖



血痣色紅如蠶

血痣

血痣初起似痣形漸大如豆其色紅揩破外皮流鮮血肝經怒火鬱血成

註

此證由肝經怒火鬱血而成初起如痣色紅漸大如豆觸破時流鮮血用花蓋石散撒之血已止宜冰蠶散枯去本痣以月白珍珠散搽太乙膏蓋貼生皮即愈血出甚者服涼血地黃湯兼戒厚味發物

花蓋石散

花蓋石 五錢火煨入童便淬之七次

草烏 南星

白芷 厚朴

紫蘇 羌活

沒藥 輕粉

龍骨 煨 細辛

檀香 蘇木

乳香 蛇含石 火煨童便淬三次

當歸 降真香 各二錢

麝香 三分

共為細末罐收臨用時撒於患處

方歌 花蓋石散止血強草烏星芷厚蘇羌沒輕龍

骨細檀麝蘇木乳歸含降香

水蛭散 即水蛭搗研末見乳部乳岩

月白珍珠散 見潰瘍門

涼血地黃湯 見血箭

太乙膏 見潰瘍門

腹痛 無圖

腹痛本於寒氣侵鬱在肌膚痛連心衣觸手捺無皮狀法宜椒酒綿濕溫

註 此證係暴寒侵襲肌膚之中寒鬱不行偶犯衣觸或以手捺疼痛連心似乎如無皮之狀法宜胡椒四錢燒酒四兩共入磁盃內重湯炖煮以軟綿蘸酒溫濕熨痛處即效

瘡口誤入毒水 無圖

瘡潰誤入污水毒或傷諸刺痛至骨金蟬散煨敷瘡內毒水流盡刺亦出

註 瘡潰誤入皂角驢馬尿糞一切污穢毒水入瘡或木刺傷着於瘡內焮腫疼痛至骨者先以溫水洗瘡拭乾再用金蟬散煨煉妥協撒於瘡內外以加味太乙膏蓋之良久毒水流盡有刺亦自出矣

金蟬散

大乾蝦蟆

一箇

胡椒

十五粒

皂角子

七粒

右用乾鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火煨至烟

盡取出存性研為細末取用

方歌

金蟬潰瘡受毒水腫痛或因木刺傷蝦蟆胡

椒皂角子火煨烟盡研撒良

加味太乙膏

見潰瘍門

諸瘡生蠅蛆

無圖

夏月諸瘡臭腐爛蠅衆生蛆治勿慢蟬花散服可除之蛆化為水蠅畏散

註

夏月諸瘡潰爛腐臭或孤單及懶惰之人失

於洗浴積膿污穢蒼蠅聞穢叢聚以致生蛆

宜急服蟬花散蛆盡化水而出蠅亦不敢近

瘡嬰兒痘爛生疽者亦服前藥外用寒水石

細末摻之又治瘡膿忽臭有冬月潰瘡生蛆

者係陰濕之所化也宜海參為末撒之或皂

蟬飛過為末撒之其蛆亦化為水

蟬花散

蛇蛻

一兩

火燒存性研末

蟬蛻

青黛

各五錢

細辛

二錢五分

右為末每服用三錢黃酒調服日用二服

方歌蟬花散療諸瘡穢夏月生蛆蠅近圍蛇蛻細

辛蟬蛻黛酒調蛆化蠅畏飛

