



七十五

中武
595
55



明
醫
卷

醫宗金鑑卷七十五

輯外科心法要訣目錄

雜證部

跌撲

金瘡

箭頭入肉

鐵鍼入肉

鐵鍼誤入咽喉

誤吞銅錢

藏書

藏書

御纂醫宗金鑑
卷七十五
目錄

骨髀咽喉

杖瘡

夾傷

竹木刺入肉

破傷風

發瘰

湯火傷

凍瘡

人咬傷

熊虎狼傷人

馬咬傷

瘋犬咬傷

馬汗驢涎入瘡

蛇咬傷

蜈蚣咬傷

蠍螫

蠶咬

射工傷

蚯蚓傷

天蛇瘡

蠅蝮傷

百蟲入耳

御纂醫宗金鑑卷七十五

編輯外科心法要訣

雜證部

大 跌 撲

跌撲之證屬尋常復元活血湯最良已破亡血八
珍服未破血瘀大成湯

註 此證有已破未破之分亡血瘀血之別如尋

常跌撲微傷皮肉疼痛未破者以復元活血
湯散瘀活血若損傷筋骨血流過多不止者

即為亡血急用花蓋石散乾撒止血內服八
珍湯加酒炙骨碎補續斷紅花若從高跌墜
未曾損破皮肉者必有瘀血流注臟腑人必
昏沉不醒二便秘結當以大成湯通利二便
其人自醒若便利不醒者灌獨參湯救之

大成湯

大黃 三錢

朴消

枳殼

各二錢
麩炒

厚朴

薑炒

當歸

紅花

木通

蘇木

陳皮

甘草

各一錢
生

水二鍾煎八分不拘時服服後二時不行渣

再煎加蜜三匙冲服

方歌大成活瘀便立通消黃枳殼厚歸紅木通蘇

木陳皮草煎服不行加蜜冲

復元活血湯

當歸尾 二錢

柴胡 一錢五分

穿山甲

炙研

紅花

有身醫局金鑑
卷之二十五
二

栝藋仁

各七分

甘草

五分

桃仁

十七個

大黃

三錢

水二鍾酒二鍾煎一鍾食遠服以利爲度

方復元活血跌撲證惡血流瘀積滯疼山甲柴

紅栝藋草桃仁歸尾大黃行

花蓋石散

見發無定處血瘰

八珍湯

獨參湯

俱見潰瘍門

木散

蘇木

金瘡

人室氣血凝滯者如針刺者內其針

金瘡須宜驗傷痕輕傷皮肉重傷筋外撒如聖桃

花散血多八珍湯獨參

人根香二寸水煎下

註

此證有金刃傷筋鏃傷磁鋒傷須看傷痕深

淺輕者皮肉破損血流不住以桃花散撒之

重者筋斷血飛係大脈已傷用如聖金刀散

撒上以絹帛紮在止而復流再撒若藥痴過

厚拘痛者以生肌玉紅膏塗傷處外貼陀僧

膏長筋止痛生肌治之無論輕重傷破出血

初服三黃寶蠟丸傷破微出血者服黎洞丸
若出血過多其人面黃眼黑不可專攻瘀血
宜用八珍湯甚者獨參湯先固根本二方俱
加蘇木紅花兼調瘀血此證雖係好肉暴傷
然驗脈法形證亦可以定生死如傷血過多
脈見虛細沉小和緩者生若脈見浮洪數大
實虛促者死被傷入肺者二七死左脇下傷
內者腸全斷者少腹下傷內者傷處繁多者
之人左股壓碎者傷破陰子者肩內耳後傷
透於內者死凡傷天臑穴與肩角腦後臂裏
跳脈脾內陰股兩乳上下心下鳩尾及五臟
六腑之輸者皆死腦後出髓而不能語目睛
直視喉中沸聲口急唾出兩手妄舉者亦死
又有腹皮損破腸出者看腸若僅傷一半者
可治先以大麥煮粥取濃汁溫洗其腸以桑
皮尖茸爲線蘸花蓋石散縫腸傷口急於縫
處塗活鷄冠血隨以清油塗腸令潤將腸輕
輕納入腹內外用生人長髮密縫腹傷口之

裏肉留外皮撒月白珍珠散以待生肌斂口
 若傷口大者不能外縫以陀僧膏護貼候自
 潰膿卽按潰瘍門治法縫後勿驚笑以米飲
 少少飲之漸增待二十日後再喫濃粥調理
 而愈

三黃寶蠟丸

藤黃

四兩製法見
黎洞丸內

天竹黃

無真者九轉
南星代之

紅芽大戟

劉寄奴

血竭

各三兩

孩兒茶

雄黃

各三兩

朴消

一兩

當歸尾

一兩五錢

鉛粉

汞

卽水銀

乳香

麝香

各三錢

琥珀

二錢

各研極細末稱準和一處將水銀同鉛粉在
 鐵鍋內火上熱研成末入前藥內共研勻用
 煉淨黃蠟二十四兩放磁器內坐滾水中化
 開將藥入內攪勻病重者每丸一錢病輕者
 每丸五分熱黃酒調服倘受傷坐重連服數

次服藥後飲酒出汗更妙又治一切惡瘡以香油化開敷之甚效

方歌

三黃寶蠟琥天竹大戟兒茶消寄奴雄竭藤黃鉛粉汞乳歸麝碾去其粗蠟丸黃酒熱調服外治惡瘡油化敷能療金瘡傷損證續筋瘀散痛全無

黎洞丸

三七

生大黃

河魏

孩兒茶

天竹黃

血竭

乳香

沒藥

各二兩

雄黃

一兩

山羊血

五錢無真者以小子羊鮮心血代之

冰片

麝香

牛黃

各二錢五分以上各研細末

藤黃

二兩以秋荷葉露泡之隔湯煮十餘次去浮沉

取中將山羊血拌入曬乾

取秋露水化藤黃拌藥搗干餘下如乾加煉蜜少許為丸重一錢黃蠟封固每用一丸黃

酒化服外敷亦用黃酒磨塗此藥如在夏天
修和取天落水拌之為丸

方歌

黎洞金瘡跌撲傷發背癰疽諸惡瘡瘰癧刑
傷瘋犬齧蜂蛇蠍毒服敷良三七大黃冰麝
魏兒茶天竹竭藤黃羊血牛雄黃乳沒秋露
和丸酒化強

桃花散 見發無定處血箭

如聖金刀散 見足部脫疽

生肌玉紅膏

陀僧膏 人肉 附毒箭

八珍湯 肉鉗不出解骨丸 納羊脂敷 焦銅毒箭金

獨參湯 商中人藍汁塗

月白珍珠散 俱見潰瘍門 鉗不出者宜解骨丸 納傷口

花蕊石散 見發無定處血痣 細嚼貼之覺癢忍之極痛

頭漸冒 撼動拔出即以人尿洗之 貼陀僧膏
日換傷口自斂又有毒箭二種交廣蠻夷用
焦銅作箭鏃甚毒人若中之纔傷皮肉便悶
膿沸爛而死急飲金汁外亦用金汁抹之若

蘇蘇百蜡

與血訣
貝發無家

月白冬耗蜡

寒門
財見貴

臘參匙

見發無定

八冬匙

刀散
見足部

劉曾膏

箭頭入肉

附毒箭

箭頭入肉鉗不出解骨丸納羊脂敷焦銅毒箭金
汁解射箇中人藍汁塗

註

箭頭嵌入肉內鉗不出者宜解骨丸納傷口
內外用羊腎脂細嚼貼之覺癢忍之極癢箭
頭漸冒撼動拔出卽以人尿洗之貼陀僧膏
日換傷口自斂又有毒箭二種交廣蠻夷用
焦銅作箭鏃甚毒人若中之纔傷皮肉便悶
膿沸爛而死急飲金汁外亦用金汁抹之若

金汁一時不得卽灌人糞汁並外敷之非此不能解毒也又一種以毒藥喂箭名爲射蒿人若中之甚毒急用葛氏方用藍錠汁一盃灌之外亦用塗抹傷處一法用大豆豬羊血內服外敷解毒亦效又箭鏃不出者搗鼠肝塗之或鼠腦搗塗卽出

解骨丸

蜣螂

研

雄黃

研

象牙末

各等分

共和勻煉蜜爲丸如黍米大納傷口處

方歌解骨丸能拔箭鏃蜣螂雄黃功效速象牙末

加蜜煉丸大如黍米納傷處

陀僧膏

見潰瘍門

鐵鍼入肉

鐵鍼入肉隨氣遊走向心胸險可愁烏鴉翎灰酒
調服膏貼鍼出始免憂

註

凡鐵鍼誤入肉中無眼者不動有眼者隨氣
遊走若走向心窩胸膈者險急用烏鴉翎數
根炙焦黃色研細末酒調服一錢或二錢俱
可外用神聖膏貼三五次其鍼自出前法用
在一二日間效

神聖膏

用車脂輦油不拘多少研如膏調慈石末攤紙
上如錢許貼之每日二換

鐵鍼誤入咽喉

誤吞鐵鍼入咽喉急飲蝦蟆血數頭鍼不卽吐者
籬散或食飴糖出不留

註

鐵鍼誤入咽喉無藥可施宜用癩蝦蟆數個
將頭剝去倒垂流血以盥接之得一盃許灌
入喉中移時連鍼吐出鍼自輒曲一方用舊
箸籬煨存性研末每服三錢黃酒調服亦能
化鍼或用飴糖一觔食盡便出

誤吞銅錢

誤吞銅錢雖無疼久留腹中病必成葶薺能化堅為軟多食無傷可化銅

註

誤吞銅錢多食葶薺即能化堅為軟若誤吞鐵骨等物腸中不能轉送覺墜者多食青菜豬脂自然送入大腸與糞同出甚效以磁盤接下令患人仰臥頻灌其骨盡化誤吞獸骨者用狗一隻倒掛接涎如前法頻灌其骨盡化俱效若失治咽喉腫痛潰膿宜用水礪散

吹之不可妄服涼藥若骨勢大者與飲食難
下餓創胃氣者俱屬難救

水礪散

見口部
鵞口瘡

杖瘡

杖瘡須宜看其形已破未破要分明清涼拈痛膏
破用敷之消腫並止疼未破瘀血須當砭湯劑急
宜用大成玉紅膏貼瘀腐痛搽之新肉自然生

註

此瘡有已破未破之分已破者隨杖後用清
涼拈痛膏敷之疼腫即消未破瘀血內攻者
急宜砭去瘀血內服大成湯便通自愈如傷
處瘀腐作疼者生肌玉紅膏搽之自然腐化
新生其效甚捷

清涼拈痛膏

如意金黃散一兩加樟腦末三錢和勻又用生
 白石灰塊三四筋許以水泡開水高石灰二三
 指露一宿將石灰面上浮起油水結如雲片者
 輕輕帶水起入盃內有水一鍾對香油一鍾竹
 筋攪百轉自成稠膏調前藥稀稠得所不用湯
 洗徧敷傷處紙蓋布紮夏月一日冬月二日方
 用葱湯淋洗乾淨仍再敷之以腫消痛止為度
 方清涼拈痛金黃散加入樟腦末三錢杖瘡破
 後多疼痛石灰水油調敷痊

大成湯

見跌撲

藥貼敷硃砂燒酒可調塗瓊液散服隨

生肌玉紅膏

見潰瘍門

自除復受重刑潰破者代杖湯

如意金黃散

見腫瘍門

者當大補六真膏貼痛即無

夾傷即擠傷也禁用敷藥膏藥及泥塗等法
 恐後必作腫成膿受刑初宜服代杖丹以護
 心隨用銀硃或硃砂末燒酒調敷傷處再著
 一人以手十指尖輕啄患者腳心先覺癢次
 覺疼為止次著一二人以筆管於患者腳面

清涼拈痛膏

如意金黃散一兩加樟腦末三錢和勻又用生
白石灰塊三四觔許以水泡開水高石灰二三
指露一宿將石灰面上浮起油水結如雲片者
輕輕帶水起入盃內有水一鍾對香油一鍾竹
吸意金黃熱門 糊膏熱門 前菜稀糊熱門 不用湯
坐臥王孫膏熱門 蓋布蒸夏月一日冬月二日方
大丸熱門 洗乾淨仍再敷之以腫消痛止為度
對寒熱瘡疔水出時濕毒不三錢杖瘡破

夾傷

夾傷禁用藥貼敷硃砂燒酒可調塗瓊液散服隨
飲醉腫勢必消痛自除復受重刑潰破者代杖湯
藥速宜圖氣血弱者當大補六真膏貼痛即無

註

夾傷即擠傷也禁用敷藥膏藥及泥塗等法
恐後必作腫成膿受刑初宜服代杖丹以護
心隨用銀硃或硃砂末燒酒調敷傷處再著
一人以手十指尖輕啄患者脚心先覺癢次
覺疼為止次著一二人以筆管於患者脚面

上輕輕趕之助通血脈候傷處凹者突起四圍腫大為度即服瓊液散隨飲至醉次日揩去所敷銀硃只用洗杖傷湯日燙二三次次日再服瓊液散其腫自消痛即止矣如復受重刑以致破潰者外貼瓊液膏內服代杖湯繼宜大補氣血易於收功生肌時換貼六真膏其效甚捷

代杖丹

丁香

蘇木

蚯蚓

去土

無名異

丹皮

肉桂

木鱉子

乳香

沒藥

自然銅

各一兩
火煨醋淬七次

右為末煉蜜和丸二錢重用一丸黃酒化下
方歌代杖護心血不攻丁香蘇木蚓無名丹皮肉

桂木鱉子乳香沒藥自然銅

瓊液散

鬧羊花

擇去梗蒂蕊葉洗去
灰沙曬乾砂鍋微焙

為末每服五分壯者七分先飲醇酒至半醕
次用調藥服下再飲至大醉為度靜卧勿語
語則發麻至次日其麻方解消腫止疼其功
甚捷連服三五次弱者間一日再服

方歌 瓊液散消瘀血滯豫酌酒至半醕時開羊花
末調服下瓊漿復飲醉如癡

洗杖湯

陳皮

透骨草

南星

天門冬

地骨皮

天靈蓋 各五錢

象皮 一兩 切碎

水煎浸洗日三二次

方歌 洗杖湯陳透骨星天冬地骨共天靈象皮水
煎日勤洗夾傷消腫又除疼

瓊液膏

當歸尾

鬧羊花

紅花

白芷

蒲黃 各二兩

香油一觔浸藥七日燥枯去渣入白蠟黃蠟
各一兩溶化盡絹濾淨稍溫再入冰片六分
沒藥乳香末各六錢攪勻攤貼

方歌 瓊液膏貼夾傷破歸開紅花芷蒲黃油燥又
下白黃蠟再加冰片沒乳香

代杖湯

乳香 沒藥

蘇木 各二錢 蒲黃

木通 枳殼

甘草 生 當歸尾

丹皮 木耳

穿山甲 各一錢 土木鱉 五個

酒水煎服

方歌 代杖湯醫夾傷驗乳沒蒲黃通枳甘歸尾丹
皮鱉木耳酒煎蘇木炙穿山

六真膏

樟腦 三兩 孩兒茶

滴乳香 血竭

沒藥

三七 各三錢

共為末用豬脂油十二兩盆盛水煮化將藥入油內和勻攤貼

方歌六真膏貼夾杖傷樟腦兒茶滴乳香竭沒三七脂油化和敷諸瘡也相當

竹木刺入肉

諸刺入肉係外傷螻蛄搗塗最為良如刺已出仍作痛再塗螻蛄即無妨

註諸刺入肉外傷之證也輒淺者以鍼撥出硬深者搗螻蛄塗之少時即出如刺已出而仍作痛者再以螻蛄塗之即愈

者宜防風當歸散服之後表熱不止者宜小芎黃湯服之攻裏之後裏熱不止宜栝石湯服之若傷時血出過多不可再汗宜

殺藥

三七 各三錢

其為末用豬脂油十二兩煎成水

人油內和勻攤貼

針灸醫再以此藥塗之即愈

采香針麩地塗之少許即出收陳日

蒜 蒜陳人肉收針之蒜也麩香以給熱出

針灸再塗麩地即無效

黃連人肉針灸身熱針塗是為見收陳日出

針木陳人肉

汗之次以蜈蚣星風散頻服追盡臭汗如邪

在裏者則驚而抽搐臟腑秘澀宜江鰾丸下

之如邪在半表半裏無汗者宜羌麻湯主之

若頭汗多出而身無汗者不可發汗宜榆丁

散和之若自汗不止二便秘赤者宜大芎黃

湯主之又有發表太過臟腑雖和自汗不止

者宜防風當歸散服之發表之後表熱不止

者宜小芎黃湯服之攻裏之後裏熱不止宜

栝石湯服之若傷時血出過多不可再汗宜

當歸地黃湯主之至於生瘡潰後受風者因
生瘡潰而未合失於調護風邪乘虛侵入瘡
口先從瘡圍起粟作癢重則牙緊項輒下視
不宜發汗誤汗令人成瘕當以參歸養榮湯
加殭蠶主之先固根本風邪自定若手足戰
掉不已者宜硃砂指甲散主之若痰盛抽搐
身涼者宜黑花蛇散主之外治之法遇初破
之時一二日間當用灸法令汗出其風邪方
解若日數已多卽禁用灸法宜羊尾油煮微
熟絹包乘熱熨破處數換拔盡風邪未盡者
次日再熨兼用漱口水洗之日敷玉真散至
破口不銹生膿時換貼生肌玉紅膏緩緩收
斂按劉完素只論三陽汗下和三法而不論
三陰者蓋風邪傳入陰經其證已危如腹滿
自利口燥咽乾舌捲囊縮等類皆無可生之
證故置而不論也

千里奔散

用行遠路驟蹄心陰陽瓦煨存性研細每服三

錢熱黃酒冲服

方歌千里奔散破傷風口噤拘急寒熱攻驟蹄火

煨存性研每服三錢黃酒冲

雄鼠散

活雄鼠一枚用鐵線縛繞陰陽瓦煨存性研為

細末作一服熱黃酒調下

方歌雄鼠破傷風居表活鼠一枚鐵線繞陰陽瓦

煨存性研酒調盡服風邪了

蜈蚣星風散

蜈蚣 二條

江鱧 三錢

南星

防風 各二錢五分

共研細末每用二錢黃酒調服一日二服

方歌蜈蚣星風邪末散搜風發汗去風源南星江

鱧防風末酒服經絡自通宣

江鱧丸

天麻

雄黃 各一錢

蜈蚣 二條

江鱧

殭蠶

野鴿糞 各五分

共研細末作兩分一分飯丸如梧桐子硃砂
為衣一分加巴豆霜二分五釐飯丸如梧桐
子大每用硃砂藥二十九加巴豆藥一九二
服加二丸白滾水送下至便利為度再服硃
砂藥病愈即止

方歌江鱧破傷風入裏驚兼抽搐下之宜天麻蜈
蚣殭鴿糞雄黃巴霜丸硃衣

羌活湯

羌活 麻黃

川芎 防風

枳殼 麩炒 白茯苓

石膏 煨 黃芩

細辛 甘菊花

蔓荊子 前胡

甘草 生 白芷

薄荷 各五分

生薑三片水二鍾煎八分服

方歌羌麻湯芎風枳殼苓芷石膏芩薄荷細辛菊

蔓前甘草發汗破傷風卽瘥

榆丁散

防風

地榆

紫花地丁

馬齒莧

各五錢

共研細末每服三錢溫米湯調下

方歌 榆丁破傷風爲患頭汗身無不宜散此藥米

湯服解和防榆地丁馬齒莧

入芎黃湯

黃芩

羌活

大黃

各二錢

川芎

一錢

水煎服以微利爲度

方歌 大芎黃治破傷風汗多便秘小水紅水煎黃

芩與羌活大黃切片共川芎

防風當歸散

防風

當歸

川芎

生地

各二錢五分

水煎服

方歌 防風當歸表太過臟腑雖調汗出多只將四

味水煎服川芎生地共相和

小芎黃湯

川芎 三錢

黃芩 一錢

甘草 五分

水煎溫服

方歌 小芎黃湯發散後表熱猶存用此醫芎芩甘

草煎溫服退熱除根神效奇

栝石湯

栝蒌仁 九錢

滑石 一錢五分

蒼朮 米泔水浸炒 南星

赤芍 陳皮 各一錢

白芷 黃蘗

黃芩 黃連 各五分

甘草 二分

生薑三片水三鍾煎一鍾服之

方歌 栝石芍芷蘗芩連蒼朮南星陳草煎醫治破

傷風下後熱猶不解服之痊

當歸地黃湯

當歸 熟地

川芎 藁本

白芍 酒炒 防風

白芷 各一錢 細辛 五分

水煎服

方歌 當歸地黃芍藁本白芍防風芷細辛破傷之時血出甚服此滋榮風不侵

參歸養榮湯

人參 當歸

川芎 白芍 酒炒

熟地 白朮 土炒

白茯苓 陳皮 各一錢

甘草 五分 炙

生薑三片紅棗肉二枚水煎服

方歌 參歸養榮衛虛潰瘡失護風邪居生薑三

片一枚棗八珍湯內入陳皮

硃砂指甲散

人手足指甲 燒存性 用六錢

硃砂 南星

獨活 各二錢

共研細末每用四錢熱黃酒調下

方歌 硃砂指甲散神效破傷風侵手足搖每用四

錢熱酒服南星獨活指甲燒

黑花蛇散

麻黃 一兩

黑花蛇 六錢 卽烏蛇酒浸

天麻 白附子

乾薑 川芎

附子 製 草烏 各五錢 泡去皮

蠍稍 二錢五分

共研細末每服一錢熱黃酒調下日二服

方歌 黑花蛇散蠍麻黃天麻白附子乾薑川芎附

子草烏泡善却風痰醫破傷

玉真散

白芷 南星

白附子 天麻

羌活 防風 各一兩

共研細末唾津調濃敷傷處如破傷風初起
角弓反張牙關緊急每用三錢熱童便調服
亦妙

方歌 玉真散芷共南星白附天麻羌活風破傷風
襲傳經絡熱酒調服立奏功

生肌玉紅膏

見潰瘍門

發瘰

潰瘍發瘰類破傷有汗為柔無汗剛膿血出多成
此證補正驅邪要審詳

註

此證勢類破傷風牙緊體強肢搖背反有汗
曰柔瘰無汗曰剛瘰由潰瘍亡血過多所致
治宜大補氣血以十全大補湯加釣藤鈎梔
子天麻服之不應者服獨參湯手足逆冷加
桂附誤作風瘰汗之則危

十全大補湯

獨參湯

俱見潰瘍門

干

吹

生

批

批

批

批

湯火傷

湯燙火燒皮爛疼炮起挑破使毒輕煩躁作嘔防
毒陷便秘神昏氣喘凶

註

此證係好肉暴傷湯燙火燒皮膚疼痛外起
燎炮即將炮挑破放出毒水使毒輕也其證
雖屬外因然形勢必分輕重輕者施治應手
而愈重者防火毒熱氣攻裏令人煩躁作嘔
便秘甚則神昏悶絕初傷用冷燒酒一鍾於
無意中望患者胸前一潑被吃一驚其氣必

一吸一呵則內之熱毒隨呵而出矣仍作煩悶者以新童便灌之外初用清涼膏塗之解毒止痛不致臭爛次以鴛粟膏塗之痛止生膿時換黃連膏貼之收斂火毒攻裏者宜四順清涼飲服之務令二便通利則毒熱必解初終禁用冷水并泥浸湯傷處恐熱毒伏於內寒滯束於外致令皮肉臭爛神昏便秘端肩氣喘多致不救外花砲火藥烘燎者治法同前

鴛粟膏

鴛粟花

十五朵無花以殼代之

香油四兩將鴛粟煤枯濾淨入白蠟三錢溶化盡傾入盃內待將凝之時下輕粉二錢攪勻炖水中令冷取出臨用時搥脚挑膏手心搽化搽於傷處綿紙蓋之日換二次其痛自止次日用輭帛挹淨腐皮再搽之

方歌

鴛粟膏醫湯火燒香油鴛粟共煎熬白蠟更兼真輕粉患上搽塗痛即消

清涼膏

水潑開石灰末一升加水四盃攪渾澄清取清
汁一盃加香油一盃以筯順攪數百轉其稠黏
如糊用鷄翎蘸掃傷處

黃連膏

見鼻部
鼻瘡

四順清涼飲

見面部
疔腮

人參養榮湯

見費
易門

凍瘡觸犯嚴寒傷氣血肌肉硬腫瀰涼水揉濕將
熱散大忌烘火立成瘡

此證由觸犯嚴寒之氣傷及皮肉着凍以致
氣血凝結肌肉硬腫瀰木不知痛癢即在着
凍之處墊衣揉搓令氣血活動次用涼水頻
洗覺熱瀰木處通活如故則已若日久凍瀰
疔瘡不散用米一塊絹包濕之以瀰疔瘡化
盡為度此從治之法也若暴凍即着熱或進

清涼膏

水撥開石灰末一升加水四升

計一盃加香油一盃

如糊用鷄翎蘸掃傷處

見真部

清涼飲

人參養榮湯

真部
良貴

凍瘡

凍瘡觸犯嚴寒傷氣血肌肉硬腫殭涼水揉渴覺熱散大忌烘火立成瘡

註

此證由觸犯嚴寒之氣傷及皮肉着凍以致

氣血凝結肌肉硬腫殭木不知痛癢即在着

凍之處墊衣揉搓令氣血活動次用涼水頻

洗覺熱殭木處通活如故則已若日久凍殭

疔瘡不散用米一塊絹包濕之以殭疔瘡化

盡為度此從治之法也若暴凍即着熱或進

煖屋或用火烘湯泡必致肉死損形輕則潰爛重則骨脫筋連急剪去筋否則浸淫好肉初治宜人參養榮湯加醇酒服之潰爛者外按癰疽潰瘍治法亦有經年不愈者用獨勝膏敷之甚效

獨勝膏

於六月初六十六二十六日用獨頭蒜杵爛日中曬熱塗於凍發之處卽於日中曬乾忌患處著水

人齧傷

人齧係受牙毒傷腫痛臭爛異尋常始終惟宜童便洗蟾酥條餅功最良

註

此傷由人牙齒食用炙燂之物漸漬有毒故一受其傷則腫痛臭爛異於尋常初齧時用熱童便浸傷處洗去牙黃汚血貼蟾酥餅以萬應膏蓋之出微膿卽愈若失治則爛痛發腫仍用童便浸洗次用油紙撚點火於患處薰之良久插蟾酥條如傷口大作餅罨上萬

應膏蓋之俟腫消時用葱白二兩甘草五錢
 水煎日洗一次換生肌玉紅膏蓋貼萬應膏
 收口一法隨於齧後即用童便洗之大糞塗
 之腫潰時人中黃熬湯時洗較諸治法尤覺
 神效

蟾酥餅

蟾酥條 俱見疔瘡門

萬應膏

生肌玉紅膏 俱見潰瘍門

馬齧傷

馬齧傷時損肌肉栗子嚼爛敷患處若逢毒氣入
 裏者馬齒莧湯速宜服

註此傷用栗子嚼爛敷之毒氣入裏心煩嘔悶
 者馬齒莧煎湯飲之即效外用馬鞭子挽手
 及鞭穗煨灰存性研末豬脂搗合貼之俱效
注瘡口薰之出毒水次宜獨窠栗子生嚼塗
 傷口效

應膏蓋之俟腫消時用葱白二兩甘草五錢
水煎日洗一次換生肌玉紅膏貼貼萬應膏
收口一法隨於咬後即用童便洗之去毒塗
艾餅蘇猷列等對癰未凝亂澁合煎法甚靈
昔黑齒煎黑髮之明效快用黑蟬干並干
搗曲用栗子煎服煉之毒入裏心即開
裏昔黑齒煎黑髮救宜煎

黑蟬干煎黑髮救宜煎

黑蟬干

熊虎狼傷人

熊虎狼傷致成瘡內外服洗葛根湯青布燃薰鐵
湯洗獨窠栗子嚼塗傷

註

熊虎狼牙爪傷人皮肉成瘡者初宜葛根濃
煎內服一二鍾外洗日十度或者煮生鐵有味
者洗之又用青布急捲為繩燃着納竹筒中
注瘡口薰之出毒水次宜獨窠栗子生嚼塗
傷口效

瘋犬齧傷

瘋犬齧傷毒最深刺吮糞灸尿洗淋頂心紅髮當拔去三年禁忌保終身

註

犬因五臟受毒而成瘋犬故經其齧必致傷人九死一生之證也初被齧時急就齧處刺令出毒血以口含漿水吮洗傷處或以拔法拔之或以人尿淋洗拭乾即用核桃殼半邊以人糞填滿罨在齧處上着艾灸之殼焦糞乾再易灸至百壯以玉真散唾津調敷次日

再灸漸灸至三五百壯為度於初灸時即服
 扶危散逐惡物血片從小水中出若毒物血
 片堵塞莖中致小水澀滯若淋者即服琥珀
 碧玉散以通利之被蔽之人頂心有紅髮一
 根速當拔去一法用豆豉研末香油調稠丸
 如彈子大常揩拭所蔽處搯開看豉丸內若
 有狗毛茸茸然此係毒氣已出易丸再揩至
 無茸毛方止甚效始終禁忌必當慎重終身
 忌食狗肉及蠶蛹赤豆百日內忌見麻物忌
 飲酒三年內忌食一切毒物及房事可常食
 杏仁以防其毒若治遲犬毒入心煩亂腹脹
 口吐白沫者用虎頭骨虎牙虎脛骨為末酒
 調二錢服之若發狂叫喚人聲似犬聲眼神
 露白者逆終始犯禁忌者不救

扶危散

蟹螯

按日數用之如大鼈已竟七日用七個
 十日用十個去翅足加糯米同炒去米

滑石

水飛兩

雄黃

一錢

麝香

二分

共研細末每服一錢温酒調下不飲酒者米湯調下

方歌扶危散治瘋犬齧蟹螯糯米一同炒滑石雄黃與麝香研加酒服毒即掃

琥珀碧玉散

滑石 六兩 甘草 一兩

琥珀 五錢 青黛 八分

共研細末每服三錢燈心煎湯調下

方歌琥珀碧玉用六一黛珀同加研極細燈心湯

調服三錢滑澁能醫小水利

瘋犬齧傷拔法

用砂燒酒壺兩個盛多半壺燒酒先以一壺上火令滾無聲傾去酒即按在破傷瘡口拔出汚黑血水滿則自落再以次壺仍按瘡口輪流提拔以盡為度其證立愈

玉真散 見破傷風

蛇咬傷

蛇咬傷時即飲醋仍宜用繩紮患處再服五靈共雄黃腫消口合自如故

凡被蛇咬傷者即時飲好醋一盞使氣不隨血走以繩紮傷處兩頭若昏困宜用五靈脂五錢雄黃二錢五分共為末酒調二錢灌之少時咬處出黃水水盡則腫消以雄黃末摻之口合而愈

對之口合而愈

之少却端出黃水水盡限觀前以華黃水
觀正發端黃二發正合共氣不濕暗二發
觀血去以鮮紫則出兩更甚且因宜且正靈
只姪抽端身香暗却端發觀一二發對原不
然黃觀前口合自收姑

其端身却暗端必宜用鮮紫思慮再如正靈共

馬汗驢涎入瘡

潰瘡誤犯馬汗傷焮痛紫腫瘡四旁急疔腫處出
紫血烏梅嚼爛塗敷良患者煩熱毒攻腹強弱量
服馬莧湯更有驢涎入瘡者冬瓜青皮末敷瘡

註

此證係潰瘡未合誤入馬汗之毒以致瘡口
四旁忽復焮痛紫腫宜急疔腫處令出紫血
烏梅嚼爛塗於瘡上若患者煩悶發熱恐毒
入腹以致不救急用醇酒濃煎馬齒莧飲之
盡醉為效但馬齒莧其性寒滑凡瘡潰未合

氣血未復而又受此汗毒必量人壯弱用一兩或五錢更有驢涎入瘡者形證與馬汗毒同宜用冬瓜片下青皮晒乾研末敷之熬湯洗之亦可毒甚者亦用馬齒莧酒飲之立效

蜈蚣齧傷

蜈蚣齧傷用雄鷄倒控鷄涎手蘸之抹搽傷處痛立止甚飲鷄血最相宜

註此傷取雄鷄倒控少時以手蘸鷄口內涎抹搽傷處其痛立止甚者生鷄血乘熱飲之立效

蠍螫 蠶齧

蠍螫急取大蝸牛搗爛塗之痛立休蠶齧須將芋根搗取汁搽塗患即瘳

詩 凡蠍螫取大蝸牛一個搗爛塗之其痛立止
一時不得蝸牛即將螫處擠去毒水急用膏藥烤熱貼之亦能止痛蠶齧者用芋根搗汁塗之即愈

射工傷

射工傷人必癢痛甚則骨肉爛成瘍豆豉搗敷白芷洗已爛海螵蛸末良

註射工卽樹鬣雜毛蟲也又名瓦刺蟲人觸着

則能放毛射人初癢次痛勢如火燎久則外癢內痛骨肉皆爛諸藥罔效用豆豉清油搗敷痛癢之處少時則毛出可見去豆豉用白芷煎湯洗之如肉已爛用海螵蛸末摻之卽愈

此證生於肌膚似癩非癩是其形證因草內蜘蛛
 毒復被露水侵始生
 此證生於肌膚似癩非癩是草中花蜘蛛螫
 傷復被露水所侵而致法宜秦芫一味煎湯
 徐徐飲之外敷二味拔毒散甚效
 二味拔毒散
見腫瘍門

天蛇瘡

天蛇瘡發肌膚中似癩非癩是其形證因草內蜘蛛毒復被露水侵始生

註

此證生於肌膚似癩非癩是草中花蜘蛛螫傷復被露水所侵而致法宜秦芫一味煎湯徐徐飲之外敷二味拔毒散甚效

二味拔毒散

見腫瘍門

蠱毒既成其毒自去

咬大痲風臥交阻融即飲蠱中為異且宜用

前融融蠱即受融融之毒令人冒津皆毒也

融融入限其毒自然去

融融蠱受毒廉冒津則毒全無融去用融蠱融

融蠱

蠲蝮傷

蠲蝮隱壁尿射人誤着皮膚水炮淫痛如火烙如
豆大鹽湯二味拔毒侵

註此蟲一名多脚蠲藏於壁間以尿射人若誤

中其毒令人皮膚起燎漿水炮痛如火烙初
如飯糝次如豆大宜鹽湯綿濕瘡上數換即
消甚則毒延徧身搔癢不休宜二味拔毒散
敷之甚效

二味拔毒散

見腫瘍門

