




藥一服即退二三再服頭退四服而平旬日而痊以重禮求

之方必效散因修合濟人無有不效丹溪亦云必效散與

神效散兼服之自有神效而以二劑兼補劑用之甚

效故錄之但此藥雖云峻利然癰毒之深者非此不能解故

宜用之惟血氣虛者不可用恐其有誤也○又一道人治此

證用鷄子七個每個入斑貓一枚飲上蒸熟每日空心食一

箇求者甚多考之各書瘰癧門及本草亦有之然氣血虛者

恐不能治也

射干連翹散 一七三 治寒熱瘰癧

射干

連翹

玄參

赤芍藥

木香

升麻

前胡

梔子仁

當歸

甘草 各錢

大黃 二錢

水煎食後服

如神散

一七四

治癰瘰已潰瘡肉不去瘡口不合

粉香末

一兩

白礬三錢

為末麻油調搽乾淨亦可

遇仙無比丸

一七五

治癰瘰未潰膿其人氣體如常宜服

丸形氣覺虛者宜先服益氣養血湯待血氣少充方服此丸核消後仍服前湯如潰後有瘻者宜用針頭散更不斂亦宜服此丸斂後再服前湯

白朮

橫櫚

防風

黑芷

半生半炒

蜜陀僧

郁李仁

同炒去米不用

甘草

各五

為細末水糊丸梧子大每服二九早晚煎甘草橫櫚湯下服至月計覺腹中微痛自小便下瘻瘻如魚自出已破者自合未膿者自消

肘後治癰方

一七六

凡頂下卒結囊欲成癰者用海藻一斤洗去鹹浸酒飲之不

可間斷須要時時飲不三盃有酒氣芳妙

神效開結散

一七七

消癰塊甚效

橘紅

四兩

沉香

木香

各二

珍珠

四十九粒入

先封固煨赤取

猪腰肉

子

四十九枚用猪腰肉以鹽

右為末每服一錢臨臥酒調徐徐嚥下患小者三五服大者

一劑可愈切忌酸鹹油膩滯氣之物須用除日於靜室修合

生地黄丸

一七八

治師尼寒婦室七年寒乍熱而患瘡瘍及

頸間結核肝脉弦長而出魚際外無寒邪內多鬱火者宜此

治之

生地

一兩酒

秦艽

黃

硬柴胡

各半

赤芍藥

一兩

右為未入地黃膏加煉蜜為丸桐子大每服三五十九烏梅湯日進二服

外昆布丸 七九 治項下結囊瘰癧者

昆布 酒洗各等分

右為末煉蜜丸彈子大含化嚥之

生玉散 百八十 治三鞭瘰癧

海藻 昆布

廣茂 青鹽 各半 雷丸 各一

右為細末老米飲為丸桐子大不拘時嚥化四五丸

神效瓜蒌散 一八 治乳癰 切癰疽初起腫痛即消膿

成即消膿出即愈治癰之方甚多獨此方神效瘰癧瘡毒丸

效凡一切癰疽餘毒皆宜用之

瓜蒌 爛 當歸 酒炒 生甘草 各半 乳香

沒藥 各一

右用酒煎服良久再服如不能飲以酒水各半煎之如數劑

不效宜以補氣血之藥兼服之○若肝經血虛結核不消佐

以四物柴胡升麻白朮茯苓○若肝脾氣血虛弱佐以四君

芎歸柴胡升麻○若憂鬱傷脾氣血虧損佐以歸脾湯

海藻散堅丸 一八二 消肝經 癰瘡

海藻 昆布 龍膽草 酒拌炒焦 小麥 醋煮炒

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十九臨臥白湯送下或嚥

化嚥之尤好凡患瘰癧服調治之藥未應宜佐以此上三方

○一方有柴胡二兩

連翹飲子 一八三 治乳內結核服數劑如不消宜兼服八珍

湯初起有表證者宜先解散

連翹 川芎 瓜蒌仁 研 皂刺 炒

橘葉

青皮

桃仁

各一錢半

右水煎食遠服

清肝解鬱湯

一八四

治肝經

血虛風熱或鬱火傷血乳內結

核或為腫潰不愈凡肝膽經

血氣不和之病皆宜用此藥

人參

熟地黃

芍藥

茯苓

山梔

炒

貝母

各一錢

柴胡

牡丹皮

川芎

陳皮

各五

當歸

白朮

各一錢半

甘草

五分

右水煎服

卷活白芷散

一八五

治風熱

血燥手掌皸裂或頭面生瘡或

遍身腫塊或膿水淋漓

羌活

白芷

荆芥

軟柴胡

蔓荆子

防風

甘草

牙皂

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

各一錢

右水煎服

胡麻散

一八六

治風熱癰疹

搔痒

胡麻子

一兩

苦參

荆芥穗

何首烏

各八錢

威靈仙

防風

石菖蒲

牛蒡子

炒

甘菊花

蔓荆子

白茯苓

炒

炙甘草

各六錢

右為末每服二錢

食後薄荷湯調服茶清亦可

四生散

一八七

治脾腿瘡

不愈或眼目昏花各腎臟風並

治風癰疥癩血風瘡證

黃芪

獨活

白附子

真者

白茯苓

等分

右為末每服二錢用猪腰子

一枚批開入藥濕紙包裹煨熟

空心連腰子細嚼鹽湯送下

檀蘇散

一八八

治風濕流注

脚脛酸痛或嘔吐不食

檳榔 木匠 陳皮 炙甘草 各一錢

香附 紫蘇 各五分

水一鐘半生薑三片葱白三莖煎一鍾空心服

升麻和氣飲 一八九 治風濕瘡疥熱結大便不通

當歸 陳皮 各一錢半 枳殼 麸炒 芍藥 酒炒

半夏 製 桔梗 炒 白芷 蒼朮 米泔炒

乾葛 白茯苓 甘草 各一錢 乾薑 炒

大黃 各五分 升麻 三分

右水煎服

當歸飲 百九十 治風濕血熱癰疹痒痛膿水淋漓瘡疥發熱

等證

當歸 川芎 生地黃 白芍藥

白蒺藜 炒 黃芪 何首烏 不見鐵 防風

荆芥 甘草 各一錢

右水煎服

羌活當歸散 一九一 治風毒血熱頭面生瘡或赤腫或成塊

或癰疹搔痒膿水淋漓

羌活 當歸 川芎 升麻

防風 白芷 荆芥 鼠粘子 蒸

黃連 酒炒 黃芩 酒炒 連翹 甘草

右用酒拌晒乾酒煎服

一掃散 一九二 治癰疥

防風 荆芥 苦參 地骨皮

薄荷 等分 甘草 減半

右為末蜜水調服三錢不過三五服可淨○或煉蜜丸桐子

大每服五七十丸食遠茶清送下

烏金散 一九三

敷腎囊破爛下疳等證

麩炭

紫蘇葉

右等分爲末香油調搽用紫蘇葉包裹之

蛇床子散 一九四

治一切風癰疥癩搔痒膿水淋漓

蛇床子

獨活

苦參

防風

荆芥 各三錢

枯礬

銅綠 各一兩二錢 味易爲末

右爲末麻油調搽

金黃散 一九五

敷天泡濕熱等瘡

滑石

粉甘草 此當半用爲是

右等分爲末搽敷○此方或加綠豆末以治濕熱肥瘡更妙
○嘗以此方加枯礬少半用治肥瘡大效

白粉散 一九六

治諸疔瘡

海螵蛸 三分

白芨 一分

輕粉 一分

右爲末先用漿水洗拭乾傳

滑石散 一九七

治小兒天泡瘡

好滑石

黃柏

右共爲末傳之○仍內服荆防敗毒散或金銀花散熱甚者
宜服大連翹飲○一方名碧玉散以青黛調前三味如泥用
皂刺挑破泡次付藥神效

秘方仙遺糧湯 一九八

治一切楊梅瘡不拘始終虛實皆可

取效

土茯苓

卽名仙遺糧用鮮者二兩洗淨以木石拍搥碎

用水三碗煎二碗去粗入後藥煎服

當歸

生地

防風

木通

薏苡 各八分

金銀花

黃連

連翹 各一錢

白朮

白蘚皮 各七分

皂刺 六分

甘草 四分

加參心二十根用遺糧湯三碗煎一碗食遠服

土草靈湯 一九九

治楊梅瘡及瘰癧咽喉惡瘡癰漏潰爛筋

骨始變疼痛皆妙○

用土草解即上茯苓二三兩以水三鍾煎二鍾不拘時徐
徐服之○若患久或服攻擊之劑致傷脾胃氣血等證以
此一味為主外加對證之藥無不神效

五加皮飲 二百

治楊梅綿花瘡百發百中亦可煮酒以治結

毒

當歸

木瓜

生地黃

熟地黃

羌活

薏仁 各一錢

防風

荆芥

赤芍

苦參

大楓藤 各七錢

五加皮

甘草

僵蚕 各五錢

右每服入土茯苓四兩猪肉四兩用水二大碗煎一碗食前

溫服渣再煎連肉食之忌生冷魚腥沙氣牛肉茶酒醋所用
土茯苓忌鐵器○若治瘋毒口服此藥外以此藥煎膏或丹
收或粉收貼之

換肌消毒散 二百一

一名革薺湯○治時瘡不拘初起潰爛

土茯苓

五錢或一二兩

當歸

白芷

皂刺

薏仁 各一錢半

木瓜

不犯鐵器

白鮮皮

木通

金銀花 各錢

甘草

五分

右水煎服○甚者土茯苓增至四五兩更妙

蠲痺消毒散 二百二

治時瘡肢節筋攣

姜黃

土茯苓

獨活 各五錢

白朮

當歸 各一錢半

芍藥 二錢

白芷

五分

右水煎服

七貼方 二百三

治楊梅綿花瘡

景岳全書

卷之六十四

七

防風

忍冬

皂刺

蟬退去足

連翹

白蘚安

五加皮

荆芥

穿山甲

炒各一錢

生地

木瓜

去心

僵蚕

炒各一錢半

皂子

七周

薏仁

三錢

土茯苓

四兩

右用水四碗煎二碗食遠分二次服之○忌牛羊茶酒醋房事

茯苓膏 二百四

治楊梅瘡並治瘋毒

當歸

白蒺藜

羌活

生地

熟地

甘草去皮

連翹

木通各三錢

土茯苓半斤

右為粗末用水五六碗熬將半用絹濾去滓再熬成膏涼冷每服一大酒鍾日三服輕者五六料重者十料全愈熬藥須用砂鍋○忌房事雞魚牛肉椒醋等發物

五寶丹 二百五

治九種楊梅結毒並及兒女者

琥珀

透明血色者用甘草水煮過三分半

珍珠

炒過三分半 一方用豆腐包蒸

硃砂

透明者三分半

鍾乳石

用木香甘草各一錢同煮乾用三分半

飛羅麵

炒過三分半

冰片

半分臨時加

右俱為極細末磁罐收貯聽用○服法每日用土茯苓成塊者一斤洗淨用石敲碎先入水二升煮取汁四碗收磁器內將前粗再入水四五碗煮汁二碗並入前汁內為一日之用○若病在上者加水香二錢病在下者加牛膝一兩與土茯苓同煎病者不得另飲茶湯但將土茯苓湯時飲之若飲湯半鐘加五寶丹二釐飲一鐘加四釐體厚者加六七釐一

日內服盡此湯為度在上飽服在下饑服忌茶酒並一切發風動氣之物其毒貼清涼膏或加參藥收口若痘眉輕粉等毒服藥後當盡發出無則不發也人忌房事輕者早服重者二七服全愈

醫 楊梅癰漏方 二百六 不問年深者並效

土茯苓 五兩 金銀花 一兩 皂刺

半旁 鬱金 當歸 各五分

花椒

黑鉛 三兩 鎔化入水銀五錢乘熱搗為粉分五分聽臨後另入煎藥用

右咀分作五貼用水二鍾入葱一根煎至一鍾去粗再入鉛粉一分煎至八分食遠服

右鉛粉煎後仍可取起蓋楊梅癰漏多因服輕粉積毒而成此以水銀花椒黑鉛仍收引輕粉之毒從類而出也○此藥

每以五貼為一料初服一貼要取微汗取汗法先以金銀花一兩或忍冬藤葉尤妙防風荆芥花椒各半兩煎湯二斗於不透風處先薰後洗自然汗出即患二三十年者只用此四料四汗之無不全愈忌牛肉燒酒真妙方也世人珍秘不傳徐春甫得之用以治人一獲效故詳載之以濟人也

會膿散 二百七 治惡毒便毒 初起之妙方也

白芷 殭蚕 炒 川山甲 各二錢 大黃 四錢

乳香 沒藥 各一錢

右為末以當歸四錢用酒水各一鍾煎一鍾去粗量人強弱或全用或一半調服之○此藥若嫌太多則咬咀為飲大黃生加煎服之尤妙

牡蠣散 二百八 治便毒亦名血疔

當歸 酒拌 甘草節 滑石 各一錢半 牡蠣 二錢

大黃 三錢

木鱉子

五個 梓非有大熱者此味不可用當去之亦不必用

水二鍾煎一鍾露一宿五更頓服冬月火溫服無論已未潰膿血俱從大便出○此方乃鹹寒導滯之劑若久曠房室大小便秘發熱欣痛或交感時強固精氣以致交錯壅滯而結為腫痛便秘者最宜用之若勞倦虛弱之人不甚熾痛大小便無熱秘者不宜輕用

牛黃雙解散 二百九

治便癰

內蘊熱毒外挾風邪或交感強忍精氣以致淫精交錯壅結瘡痛或大小便秘先用此藥通解更用調補之劑

肉桂

大黃 炒

芍藥

牽牛 杵炒

澤瀉

桃仁 去皮尖

炙甘草 各二錢半

乾薑 各一錢

右分二劑水煎空心食前服

內托羗活湯 二百一

治將癰

腫痛兩尺脈緊按之無力者

羌活

黃柏 各二錢

黃芪 鹽水炒

防風

當歸尾

蘇木

肉桂

連翹 各一錢

炙甘草

蒼朮

陳皮 各半錢

右水酒煎服

加味瀉肝湯 二二一

治肝經濕熱不利陰囊腫痛或潰爛皮

脫羣丸懸掛或便毒及下疳腫痛或潰爛皆治之

龍膽草

當歸梢

車前子 炒

生地黄

芍藥 炒

澤瀉

黃連 炒

黃柏 酒炒

知母 酒炒

防風 各錢

甘草梢 五分

水二鍾煎八分食前服外煎為金散

加味托裏散 二二二

治懸癰不消不潰

人參

黃芪 鹽水炒

當歸

川芎

麥門冬

芍藥 炒

黃柏 酒炒

知母 酒炒

金銀花

製甘草

柴胡各一錢

水二鍾煎八分食前服

加味十全大補湯二二三

治惡癰潰而不斂或發熱飲食少

思

人參

黃芪鹽水炒

白朮炒

熟地黃

當歸

川芎

芍藥炒

茯苓各一錢

甘草炙

肉桂

五味子炒

麥門冬各五分

水二鍾煎一鍾食前服○茲腫加青皮○小便赤加酒炒黃

栢知母○小便澀加車前子山梔子俱炒用

五味當歸散二一四 治婦人陰中突出一物長五六寸各陰

挺

當歸

黃芩各二兩

牡蠣煨兩半

蛻皮炙一兩

赤芍藥五錢

右爲末每服二錢食前溫酒調下滾湯亦可如不應須以補

中益氣湯倍加柴胡升麻兼服之○又方用當歸川山甲炒

蒲黃炒各半兩辰砂一錢麝香小許俱爲末每服三錢酒調

下尤效

婦人陰瘡二一五 治婦人陰戶生瘡作痒

杏仁炒

雄黃

白礬各五錢

麝香二分

右爲末敷入患處

婦人陰瘡二一六 治婦人陰戶生瘡或痒痛或膿水淋漓

甘草

乾漆各三錢

生地黄

當歸

黃芩

川芎各二錢

鱉甲炙五錢

右用水數碗煎數沸去粗當洗患處

白芷升麻湯二一七 治婦人陰內膿水淋漓或痒或痛

白芷

升麻

黃連

木通

當歸

川芎

白朮

茯苓

右水煎服○更用場腫湯浴洗之

痔漏腸紅方二一八 其效無比

黃連 去蘆毛淨 一兩好酒浸一宿撈起陰乾爲末

百草霜 用草芽燒者松柴者不用 一兩研細

烏梅肉 一兩蒸軟卽用前浸黃連酒蒸爛

右以三味同搗一處爲丸桐子大如太乾仍如前酒搗丸之
每空心用酒送下四五十九三日見效十日全愈

地榆散二一九 治血痔

右用地榆爲細末每服二錢七食前米飲調下日三服

臭椿皮散一百二十 治痔漏下血及膿不止

臭椿皮微炒 酸石榴皮 黃連去鬚 地榆

阿膠炒珠各一兩 艾葉三錢

右爲細末每服二錢食前粥飲調下

秦艽防風湯二二一 治痔漏結燥大便作痛

秦艽 防風 當歸酒拌 白朮

黃柏 陳皮 柴胡 大黃煨

澤瀉各一錢 桃仁去皮尖 紅花 升麻

甘草各五分

右水煎空心服

猪臟丸二二二 治大便秘下血

猪大臟一條 以槐花炒爲末填入臟內兩頭札定瓦器內

米醋煮爛

右搗和再加糕糊爲丸桐子大每服五七十丸食前米飲或
當歸酒下○此方用黃連猪臟二味亦各猪臟丸尤效○一
方先用海螵蛸灸黃去殼爲末以木賊草煎湯調下三日卽

效或後服黃連豬膽丸

痔瘡方二二三

雄黃五分

五靈脂

燒斷

五倍子

炒

過各

沒藥

三錢半

明者

錢半

白礬

半生半熟三錢

右為極細末用紙托貼瘡口上

二品錠子

上品 去十八種痔

白明礬

二兩

白砒

一兩零五分

乳香

沒藥

各三錢半

牛黃

中品 去五漏及翻花瘤氣

白明礬

二兩

白砒

一兩三錢

沒藥

各三錢半

牛黃

下品

治瘰癧氣核疔瘡發背腦疽諸症

日明礬

二兩

白砒

一兩一

乳香

沒藥

各二錢半

牛黃

右將砒末入紫泥罐內次用礬末蓋之以炭火煨令烟盡取出並各藥俱研極細末用糯米糊和為挺子狀如線香陰乾

經瘡內三四次年深者五六次其根自腐如瘡露在外更用蜜水調擦乾上亦可○嘗有一老嫗用此治瘰癧索重價始肯為治其方法乃是中品錠子經瘡內以膏藥貼之其根自腐未盡再用去盡更搽生肌藥數日即愈人多異之凡見其

治氣血不虛有果驗惟氣血虛者雖潰去亦不能愈蓋此與必效散相為表裏皆攻毒去邪之藥也

羊膽膏

臘月取羊膽一枚入片腦末一分置風處掛乾用時以涼水

化開頻敷患處內服槐子酒或加味瀉肝湯若得熊膽更佳

治痔漏下疳瘡

如眼痛者點之尤效

水銀棗子膏二二六

治重痔瘡不止

水銀一兩

棗肉二兩

右和研水銀不見星捻如棗核狀薄綿裹內肛門中明目重

出若痛加韶粉三分丸內之

熊膽膏二二七

治痔痛極效

熊膽五分

冰片一分

右研細用井花水調鷄翎掃痔上

蝸牛膏二二八

傳痔痛極效

蝸牛

一枚負殼

冰片

射香

各少許

右同研爛以磁器盛次早取汁敷痔上

芫花線二二九

繫痔漏瘤核

用芫花一握洗淨入木柏搗爛加少水絞汁於石器中燉火

煎成膏將絲線於膏內度過晾乾以線繫痔當微痛候痔乾

落以紙撚蘸膏納竅內去根當永除根也○一方只搗汁浸

線一夜用不得使水

枯痔水澄膏二百三十

治痔護肉

鬱金

白芨

各一兩

一方加黃連

右二味為細末如患內痔候登廁時翻出在外用溫湯洗淨

側臥於床其痔即出用蜜水調藥得中以篋篋塗殺道四邊

好肉上留痔在外以紙蓋藥上良久然後用後枯藥擦痔上

仍用筆蘸溫水於紙上潤之勿令藥乾及四散

好白礬

四兩

生信石

半

硃砂

一錢

研

右各研為細末先將礬入紫泥罐底次將礬末蓋之用火煨令烟盡其礬盡從烟去止借礬氣於礬內耳將礬為極細末看痔頭大小置礬末於掌中乃入硃砂少許以唾調稀用篋

篋塗痔上周遍一日三上看痔頭顏色焦黑爲效至夜有黃水出切勿他疑水盡爲妙至中夜上藥一遍來夜依然上藥三次有小痛不妨換藥時以碗盛溫湯用筆輕洗去舊藥更上新藥仍用護肉藥間用荆芥湯洗之三兩日之後黃水出將盡可於藥中增硃砂減白礬則藥力卽緩三兩日卽可增減漸漸取之庶不驚人全在看色增減傳藥厚薄方是活法此藥只是借硃信之氣又有硃砂能以解之一方士將此二方在京治人多效致富一富商以百金求得之錄於予予雖未用傳人無不言效但枯藥則趙宜真煉師已刊於青囊雜纂如神千金方則未見刊傳大抵今人言能取痔者皆此方也其有氣血虛或挾內邪者還當兼治其內虛不有失如神千金方二三一治痔無有不效

好信石

黃明者三錢打如豆粒

明白礬

一兩爲末好黃丹飛砂五錢

鵝稍

七個洗淨

草烏

光實者去皮生研五錢

右用紫泥礬先將炭火煨紅放冷拭淨先下明礬燒令沸次下信入礬內拌勻文武火煨候沸再攪勻次看礬通紅烟起爲度將礬撥下待冷取研爲末方入黃丹草烏鵝稍三味再同研極細以磁礬收貯如欲敷藥先煎甘草湯或葱椒湯洗淨患處然後用生麻油調前藥以鷺毛掃藥痔上每日敷藥三次必去黃水如膠汁則痔頭漸消其年遠者不出十日可取盡日近者俱化爲黃水連根去淨更擦生肌之藥凡五痔皆可去之此乃臨安曹五方爲高宗取痔得效後封曹官至察使

秘傳正骨丹

二二三

治跌打損傷骨折血瘀而傷之重者用

此可續筋骨

降真香

乳香

沒藥

蘇木

松節

自然銅

醋煨

川烏

炮

真血竭

各一

地龍

去土酒

生龍骨

各一

土狗

十個浸油

右十二味共重八兩八錢同為末每服五錢隨病上下酒調

服覺藥自頂門而至遍身搜至病所則颯颯有聲而筋骨漸

愈病人自知之○服藥後仍服人參白朮黃芪當歸川芎肉

桂甘草白芷厚朴以調補元氣

本事接骨方

二二三

治打折損傷

接骨木

牛兩

乳香

半兩

當歸

赤芍藥

川芎

自然銅

炒醋煨

各一兩

右為末用黃蠟四兩溶化入前藥攪勻衆手九龍眼大如打傷筋骨及閃痛不堪忍者用一丸熱酒浸開乘熱飲之痛即止

受藥降聖丹

二三四 治跌打損傷接續筋骨

當歸

酒炒

蘇木

白芍藥

川芎

骨碎補

炙

生地黃

乳香

另研

沒藥

另研

自然銅

火煨

醋淬

十次

右為末生薑汁其蜜和丸每一兩作四丸每服一丸用米酒各半盞煎至八分空心熱服○立齋曰脾主肉肝主筋若肝脾氣血虧損或血虛有熱而不愈者當求其本而治之

十味沒藥丸

二三五

治打撲損傷筋骨疼痛或氣道血暈或

瘀血內停肚腹作痛或胸脹悶

沒藥

乳香

川芎

川椒

當歸

芍藥

紅花

桃仁

血竭

各一

自然銅

四錢

火煨

石為末同黃蠟四兩溶化入前末速攪勻衆手九彈子大每服一丸酒化下○立齋曰按接骨散沒藥丸惟元氣無虧者

景岳全書 卷之六
宜用若腎氣素怯或高年虛弱者必用地黃丸或補中益氣湯以固根本為善

花蕊石散

二二六

治打撲損傷腹中瘀血脹痛欲死服之血

化為水其功不能盡述

硫黃

明者四兩

花蕊石

一兩

右為末和勻先用紙筋和鹽泥固劑瓦罐一箇候乾入藥再用泥封口安在磚上虛書八卦方位用炭三十斤煨之候罐冷取出每服一錢童便調下○立齋日前方若被傷已甚元氣虧損內有瘀血不勝疎導者用前藥一服其血內化又不動臟腑甚妙甚妙

黑丸子

二二七

一名和血定痛散○治跌打損傷筋骨疼痛

或瘀血壅腫或外感風寒肢體作痛或手足緩弱行步不前若流注膝風初結服之白消若潰後氣虛發熱與補藥兼服

自欽

百草霜

白芍藥

各一兩

川烏

南星

各三錢

赤小豆

兩半

白欽

一兩

白芨

骨碎補

當歸

各一錢

牛膝

六錢

右各另為末酒糊丸桐子大每服三四十丸鹽湯溫酒任下孕婦忌服

封口藥

二三八

凡損傷皮肉破裂者以此封之

牡蠣

煨

赤石脂

生研

紅丹

上好者等分

右為細末香油調塗瘡口○若飲消腫散血合口加血竭乾摻之

當歸導滯散

二二九

治跌撲瘀血在內胸腹脹滿或大便不通或喘咳吐血

大黃

當歸

等分

景岳全書

卷之六

七

右為末每服三錢溫酒下陽氣虛者須加肉桂

復元活血湯二百四十 治跌打損傷瘀血流於脇下作痛或

小腹作痛或痞悶及便毒初起腫痛

柴胡一錢 天花粉 川山甲炒各一錢 當歸 酒拌

大黃酒炒各一錢 紅花 甘草各七分 桃仁二十去皮尖研

右水一鐘半加酒半鐘煎八分食前服之以利為度

金瘡方 二四

凡金瘡出血不止用牛膽石灰搽之即止其方以臘月牛膽入風化石灰懸當風候乾用一方單用三七搗爛敷之神效又方金瘡出血不止以五倍子生為末乾貼之如不止而血熱者宜用犀角地黃湯之類○大凡金瘡出血不止若素本怯弱者當補其氣若陰虛或有熱者當補其血若因怒者當平肝若煩熱作渴昏憤者當補脾氣若筋攣搐搦者當養用

血不應用地黃丸以滋腎水

金瘡降真散 二四二

降真香用節 文蛤

三味等分為末無論諸傷血出斷折搽破處夾縛定神效

金瘡灰蛋散 二四三 治金瘡出血不止及久年惡瘡

石灰細研 雞蛋清以和灰成餅為度

右將灰蛋餅子煨過候冷研細遇金瘡搽之若多年惡瘡以

薑汁調敷○一方單以石灰搽傷處暴定亦血止而愈

龍骨散 二四四 治金瘡

龍骨 赤石脂 五倍子 黃丹

海螵蛸各等分

右各研入麝香少許共研勻搽上如乾先以鹽水洗拭乾搽

之

桃花散 二四五

治金瘡並一切惡瘡

黃丹

軟石膏

煨過等分

和研勻如桃花色搽傷處甚妙

刀傷跌打經驗方

二四六

凡刀傷磕損跌撲腫痛或出血用葱白細切杵爛炒熱敷患處葱冷再易神效○一方以三七搗爛罨之神效

立齋曰醫學綱目稱前方有神效余嘗以治前證青腫不散死肉不潰佐以健脾胃之藥其功尤捷此內外所以合一也損傷敷夾法 二四七

凡損傷骨折者先須整骨使正隨用川烏草烏等分為末以生薑汁調貼之夾定然後服藥無有不效

毆跌閃腫痛 二四八

用生薑葱白同搗爛和麵炒熱罨之○如熱服而痛者用硃

子加麵炒熱罨之

洗損傷方 二四九

凡傷重者用此淋洗然後傳藥

荊芥

土常歸

生葱

切斷一方用生薑里

右同煎湯溫洗或止用葱一味煎洗亦可

箭鏃竹木刺方 二百五十

百一方治竹刺在肉以蟬蟬重研敷立效

衍義方治竹木刺入肉嚼牛膝根罨之即出

肘後方治箭鏃入骨以巴豆肉微炒同蘇蘇研勻塗傷處俟痒極拔出之

孫真人治箭鏃針刺杵蟻貼塗患處自出

毆跌打夾棍傷 二五一

生薑

陳酒糟 各一

同搗爛炒熱罨傷處

治梭傷二五二

凡梭傷手指者用皂礬二兩水四五碗砂鍋內熬滾將手薰洗良久卽血活疼止不致潰爛熬米忌銅鐵器其洗手水過夜卽臭惡不可聞

杖瘡四方

用川大黃一兩加上好冰片二分另研俱爲末和勻涼水調如糊攤杖處卽時止痛一日後換膏藥貼之

又方加甘草一兩

又方攤藥

大黃

白芷

生半夏各七錢

右爲末以鮮薑汁調敷乾卽再敷以黑虎血紅爲度卽換貼膏藥神效

又方

生半夏

松香兩

右研一處蜜水調成膏貼之勿令見風如乾再換一個卽愈

諸骨諸物鯁二五四

一治諸骨鯁用苧麻根杵爛丸彈子大將所鯁物煎湯化下

一治魚骨鯁用細茶五梧子等分爲末吹入咽喉立愈

一治稻芒糠穀鯁喉將鵝弔一足取涎徐徐嚥之卽消

一治吞釘鐵金銀銅錢等物但多食肥羊脂及諸般肥肉等

味必隨大便而下

一治吞鐵或針用錫糖半斤濃煎艾汁調和服之

一治吞髮繞喉不出者取自己亂髮燒灰白湯調服一錢

破傷風敷藥二五三

治打撲損傷傷風腫痛者

南星

半夏

地龍等分

右爲末用生薑薄荷汁調搽患處

薺發酒 二五六

治破傷風外邪初入或風入於臟者神效

凡頭面身體因破損傷風者頃刻發脹遲而不救速用薺發草一二兩酒水各半煎服彼蓋緩臥少頃即可消散能飲者純用酒煎尤妙

防風湯 二五七

治破傷風表證未傳入裏急服此

防風

羌活

獨活

川芎 等分

右每服五錢水煎調蜈蚣散服方在後二八四

白朮防風湯 一五八

治破傷風服表藥過多自汗者

白朮

黃芪

防風 二兩

右每服五七錢水煎服臟腑已和而自汗出者可服此藥若臟腑秘小便赤而自汗者急以後大芎黃湯下之

羌活湯 二五九

治破傷風在半裏半表間宜和解之急服此湯稍緩則邪入於裏不可用矣

羌活

麻黃

菊花

川芎

防風

細辛

前胡

蔓荊子

黃芩

石膏

白茯苓

枳殼

甘草

薄荷

白芷 各五錢

右每服五錢薑水煎日二三服

羌活防風湯 二百六十

治破傷風初傳在表脈浮緊

羌活

防風

藁本

當歸

芍藥

甘草 各四錢

地榆

細辛 各二錢

右咬咀每服五七錢水一鐘半煎八分熱服量緊慢加減用之○熱盛加黃連黃芩各二錢○大便秘加大黃二錢○白汗加防風白朮各五分

大芎黃湯 一六一

治破傷風邪傳於裏舌強口噤項背反張筋惕搐搦痰涎壅盛宜疎導者急服之

川芎

羌活

黃芩

大黃

各一兩

右每服五七錢水煎服

本玉真散 二六二 一名定心散 ○亦名奪命丹 ○治打撲金

刃破傷風重者牙關緊急 腎反張並蛇犬所傷

天南星

湯泡七次如急

防風 等分

右為末每服二錢溫酒調服若牙關緊急腰背反張者每服三錢用童便調服雖內有瘀血亦愈至於昏死心腹尚溫者速進二服亦可保全若破傷瘡口及風犬咬傷須用漱口水或熱童便洗淨隨用生南星為末搽之或以水調塗之出水為妙

養血當歸地黃湯

二六三

治破傷風氣血俱虛發熱頭痛服

此以養氣血祛風邪不拘新舊並可治之

當歸 酒拌

熟地 各二錢

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷

北細辛 各一錢

水二鐘煎一鐘食遠服甚者加酒助之

蜈蚣散 二六四

蜈蚣 一對

鰾膠 三錢

右為末用防風白朮煎湯調下

破傷風灸法 二六五

治跌打損傷或重獸傷破皮膚以致風邪入內牙關緊急腰背反張或遍體麻木甚者不知人事急用蒜搗爛塗傷處將艾壯於蒜上灸之多灸為善仍用膏藥護貼內服玉真散如毒蛇風犬咬傷先刺患處去毒血如前法治之

海愈風丹 二六六

治癰病手足麻木眉毛脫落遍身生瘡及

癩風癰疹皮膚瘙癢破成瘡並皆治之

皂角

一斤剉寸許無灰酒浸一宿以水一碗

苦參 一斤取末四兩

景岳全書

卷之六十四

生

烏稍蛇

白花蛇

土花蛇名一條去腸陰乾酒浸取淨肉晒乾為末

右為末入前二味和九桐子大每服六七十丸空心煎通聖散送下乾物壓之日三服間日浴之汗出為度

二聖散二六

疎風和血去癰毒

皂角刺煨有酒

大黃半兩

右用大黃半兩煎湯調下皂刺末二錢早服樺皮散午以升麻湯下瀉青丸晚服二聖散

局樺皮散二六

治肺壅風毒遍身癢疹瘙痒

樺皮

枳殼去穢各四兩

荊芥穗一兩

炙甘草半兩

杏仁二兩

去穢各四兩令減半取出煎乾為餅

右共為末磁器收貯每服二錢食後溫酒調服

升麻湯二六

治諸風熱癰肌肉極熱身如蟲行或唇反綻

升麻三分

人參

茯神

防風

羌活

犀角鎊

羚羊角鎊各

肉桂五分

水二鐘薑三片入竹瀝少許煎八分不拘時服○或用下瀉

青丸

寶醉仙丹二百七十

治癰風遍身麻木

胡麻子炒

牛旁子炒

枸杞子

蔓荆子炒各

白蒺藜

苦參

天花粉

防風各半

右為細末每一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一錢茶清調晨午各一服至五七日於牙縫中出臭涎令人如醉或下膿血病根乃去仍量人輕重虛實以用之病重者須先以再造散下之候元氣將復方用此藥忌一切鹽醋炙煨厚味止可食淡粥時菜及諸蛇肉以淡酒蒸熟食之亦可以助藥力

和子浮萍散二七一

治風癰疥癩

浮萍 四錢

荆芥

川芎

麻黃 去節

當歸

赤芍藥

甘草 各二錢

水二鐘葱二莖豆豉一撮煎服汗出為度

寶鑑 換肌散 二七二

治癰風久不愈或看毛脫落鼻梁崩壞其效如神

白花蛇

黑花蛇 各三兩

地龍 去土

當歸

川芎

赤芍藥

天門冬 去心

甘草

何首烏 不犯

沙參

胡麻子 炒

天麻

紫參

苦參

白茯苓

紐辛

白芷

蔓荊子

威靈仙

荊芥穗

菊花

木賊草

不灰木

石菖蒲

定風草 即草烏皮去 蒼朮 本鱉名一

通天再造散 二七三

治大風實熱內壅宜此攻之

鬱金 半兩

大黃 炮

皂刺 炒各一兩

白丑 頭末半生半炒六錢

右為細末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下晚利下黑頭小蟲病輕者只利臭穢之物○忌葷醒厚味半年犯則再作不可救此藥服三五次即愈

白花蛇丸 二七四

治癰風○丹陽荆上舍得癰疾一僧治而愈以數百金求方秘不肯傳謁客袁生寬知藏衲衣領中因醉之而竊錄焉

白花蛇 一條去頭尾連骨生用

烏梢蛇 一條去頭尾生用

陳皮 去土

防風 去苗

金銀花 去葉

枸杞子

槐花

苦參

生地 名二兩

全蝎 醋浸一日去鹽味

黃芩

黃連

梔子

黃柏

烏藥

牛膝

川芎

牛蒡子

何首烏 不犯鐵

連翹

天花粉

白蒺藜

威靈仙

荊芥穗

細辛

蔓荊子

金毛狗春

胡麻子

炒各一兩 漏蘆半斤洗淨去苗取四兩

右為末米糊丸桐子大每服五六十丸茶清送下空心午前

臨臥各一服

白花蛇膏 二七五

治諸風癱疾遍身生瘡

白花蛇

肉四兩 酒浸

天麻 七錢

荊芥

薄荷葉

各三錢

右為細末用好酒二升蜜四兩以銀磁器熬成膏每溫服一酒杯三三次煎餅壓下於暖處發汗效

防風天麻丸 二七六

治厲風癱病此方應是仙傳一年中常

療數人初服藥有嘔吐者不可疑服而得愈其效如神

防風 去蘆

天麻

升麻

白附子 炮

定風草

細辛 去苗

川芎

人參 去蘆

丹參

去蘆

苦參

玄參

去蘆

紫參 去蘆

蔓荊子

威靈仙

川山甲

炒

何首烏

另搗各二兩

蜈蚣 二條

右為細末同何首烏末拌勻外用胡麻一斤淘淨曬乾炒香熟另研為細末乃入前藥末二兩又拌勻煉蜜和為丸十九每服一丸細嚼溫漿水送下不拘時候日三服宜食淡白粥一百二十日大忌房勞並將息慎口

行藥方 二七七

治癰毒

大黃

白牽牛

檳榔 各一兩

甘草

三兩

輕粉 五錢

右共為細末每服二錢用白蜜三匙薑汁二匙五更時調服病勢重者七日行一次稍輕者半月一次輕者一月一次或二十日一次以三五遍為度

皂角散 二七八

治大風

皂角刺

燒存性一錢

大黃

一錢

輕粉 五分

右爲末空心酒調服取下惡物○服藥數口齒縫出血甚臭

雷丸散 二七九

取大風虫

雷丸

貫仲 二味先另研

阿魏 各二錢

麝香 一分

水銀

硫黃

雄黃 各二錢半用乳鉢入醋少許研令水銀盡爲度

右爲細末每服一錢天明溫酒送下

黑虎丹 二百八十

治大風諸癩惡瘡毒蟲內蝕形骸變壞

天靈蓋

三兩

人中白

桃仁

炮去皮尖各二兩

老皂刺

燒存性

穿山甲

炒各半兩

輕粉 二錢

麝香 五分

乾蝦蟇

二個去頭足燒存性

右爲末煉蜜丸桐子大每服三十九月首五更米飲連口服取虫盡卽愈○殺勞蟲通用

苦參酒 二八一

治癩風及瘡疹疥癬最多者

苦參

五斤切片

右以好酒三斗浸三十日量飲一合日服不絕覺痺卽瘥

硫黃酒 二八二

殺癩風諸蟲

明硫黃

研極細

右用酒浸空心飲清汁明日添硫黃再研入酒如前飲之

七珍湯 二八三

治洗大風

青蒿

艾葉

忍冬藤

蒼耳子

桑條

槐條

柳條

三條俱槌碎用

右煎水一桶入炒鹽半斤間日一洗浴蜜室中以簾席圍之洗出汗爲妙不過十次愈

烏頭湯 二八四

治大風瘡癩

草烏

麻黃根

艾葉

地骨皮

朴硝

各一兩

右為粗末用水一桶椒一合葱三十根同煎湯入醋一鍾於
密室中自用手巾圍搭四肢候湯可浴令汗透務使而上如
珠徐起或坐或臥片時汗乾着衣避風五日再浴如此三五
次每浴後更服換肌丹等藥
敷瘍方 二八五

雄黃

硫黃

白礬

草烏

蛇床子

燒存性
等分

右為末用香油或濃蜜水調敷患處

直指洗瘍方 二八六

浴洗人風瘡

苦參

荆芥

防風

白芷

羌活

獨活

藁本

各一兩

洛陽花

四兩火酒
噴過一痛

右作三次煎水洗冷出汗

梅花白願 二八七

用香油二碗入鷄蛋黃三枚熬將焦去粗熬油至一碗許
外用雄黃一錢 白礬三分 花椒五分 上共為細末入
油內再熬熟收貯候用○每用猪毛湯執洗瘡垢搽油三五
次即愈○愚按此方於蛋焦去粗之後入水銀五錢微火漸
熟之然後再加硃砂細末一錢並雄黃白礬等末攪熬勻熟
收用必妙

臘梨瘡 二八八

用杏仁百枚炒為炭入葱白蜂蜜共搗爛先用花椒煎湯洗
淨然後用此藥搽之新舊瘡皆可用但勿見風方好

瘡瘡二方 二八九

大楓子仁

木別仁

蛇床子

各半兩

水銀

三錢研
散於內

右先以刀刮去瘡痂花椒湯洗淨外用麻油熬成珠調藥敷
之八日即愈

又方 用猪骨髓和輕粉搗爛罨之過夜即愈

頭面黃水肥瘡 二百九十一 治小兒頭面患瘡濃汁作痒痂厚

者各日粘瘡當用此方或止用礬丹二味亦可○若作痒出水水到即潰者各日黃水瘡當用後一方

松香 枯礬 官粉 飛丹

右等分爲末麻油調傳或加香烟垢更效於香爐蓋上刮取用之○一方用菜豆松香等分爲末麻油調傳極效或內服荆防敗毒散等藥○又方用益元散加枯礬少半以麻油調敷大妙大妙

諸癬疥頑瘡 二九一

油核桃 大楓子 樟腦 水銀

右四色研勻擦之此治有蟲者大效○一丸無蟲而忽爾生瘡腫痛或濕爛者但以柏油擦之即可愈

白虎丹 二九二 發則頭面四肢眼目俱腫而惟額上指尖兩

耳不腫及不見赤色者方是其證

先將馬桶洗淨用沸湯傾入蓋少傾頭出盆內浴之數次即退○再用車前草九里香馬蹄香枸杞苗即雁稜菜同搗爛和麻油遍身自上而下擦之○大忌鷄魚生冷炙博日色火光燈烟湯氣極須謹慎

又方 用生香附末冷茶調服一二錢即愈

又方 綠豈水去渣飲三碗妙

紫白癜風歌 二九三

紫痘白癩一般風 附子硫黃最有功

薑汁調勻茄蒂擦 若經三度永無踪

又歌

紫癩白癩兩服風 水銀輕粉最成功

搗取生薑白然汁

只須一擦便無踪

又方 治紫白癰汗斑等風

雄黃

硫黃

黃丹

密陀僧

南星

右爲末先用葱擦患處次用薑蘸藥末擦之擦後漸黑次日再擦黑散則愈矣

又四神散

雄黃

雌黃

硫黃

明凡

各等分先浴令通身微汗以薑蘸擦之再以熱湯淋洗當日色淡五日除根

汗斑四方 二九四

大黃二錢

枯礬

椒紅各五

右用豬脂沙糖同搗爛俟浴起以細麻布包擦至痛而止數

日卽愈○或止用硫黃少入麻油研如糊浴用麻布蘸擦數次卽愈

又方

蜜陀僧

硫黃

各三錢

輕粉二錢

雄黃一錢

人言 五分

右爲末薑汁調用茄蒂蘸擦三日內不沐妙

又方

雌黃

雄黃

各一錢

硫黃五分

麝半

浴後薑蘸擦二三日勿洗

又方

硫黃一兩用醋煮半日海螵蛸三個共爲末浴後以生薑蘸擦患處須避風少時數度卽愈

漆瘡方 二九五

用香油調鐵銹塗之○胃氣實者內服黃連解毒湯○胃氣弱者以漆毒侵犯中氣致虛多有作嘔不能飲食者宜用六君加砂仁藿香兩炒為藥之類○又解漆毒法見因陣二三

手足甲疽二九六

凡手足間或因修甲傷肉或因損足成瘡潰爛上脚用綠礬置鐵板上煨沸色赤如熔金色者為真沸定取起研末以鹽湯洗搽

坐板瘡二九七 腫痛多膿者

蜜陀僧 生礬 大黃

等分為極細末敷之

神效膏二九八 治腫瘡脚瘡

先着磨形大小用綿紙裁成四方塊十二張四角用小熟釘

住聽用○外以好香油二兩用銅杓以文武火熬之先下花椒四十九粒煎黑取起○次下槐枝長一寸者四十九節煎黑又取起○再次下黃占二兩輕粉二分枯礬一分溶清却入前紙浸油內令透不可令焦取起聽用凡貼瘡時先將槐枝葱椒煎湯洗瘡令透拭乾乃此膏紙貼上外面再以油單紙蓋護乃用軟帛縛定一日取下揭去一層復用湯藥洗淨又貼之盡十二張無有不愈者

隔紙膏二九九 治腫瘡神效

黃芪末錢五 輕粉 乳香 沒藥錢各一

銀硃錢一 血鷄五分 銅綠二分

右為細末真香油調成膏攤油紙上再用油單紙一層以五刺孔數十掩膏藥上貼之一日一易其膏

一味隔紙膏三百 治腫瘡濕毒瘡

石膏 煨

杜礬 等分

右為末用桐油調成膏作隔紙膏貼之更服荆防敗毒散如數劑不愈再服黃芪人參湯

爛腿瘡久不愈方 三百一

用米糠即膠即也以碗盛於飯鍋內蒸化先用花椒荆芥防風等藥煎湯洗瘡淨乃將膠胎薄攤瘡上外以軟竹箬蓋定用絹縛之數日即愈神效

凍瘡方 三百二

瀝青末

黃蠟 各一兩

麻油 一兩

右三味溶化搽患處

湯火六方 三百三

凡初被湯火所傷速用冷甕柴草灰一二升入鹽少許以凉水調如稀糊嘗味微鹹為度用以厚攤傷處覺熱則易之連易數次則火毒皆拔於灰中必腫痛隨散結而愈誠神妙方也

方也

又方一治潰爛腫痛者 用生桐油調人中白敷之即愈亦妙方也

妙方也

又方 用皂礬研細和以冷水澆傷處其疼立止其腫即消

又方 用大黃芒硝等分為末之子清調貼之神效

又方 用石膏末香油調敷即愈

又赤石脂散 治湯火傷肉爛赤痛

赤石脂

寒水石

大黃 等分

右為末新汲水調塗

湯火至聖膏 三百四

治湯火傷瘡用雞子黃置銀石器內熬油調胡粉傅之○錦衣楊永興厨下夜間回祿几睡此房已死將死者灌以生蘿

葛汁良久悉愈凡遇此患者以此治之其應如響

湯火上痛散三百五 止痛生肌

大黃末微 當歸末等分

右用麻油調搽或乾摻亦可

小兒丹毒三百六

此毒多生頭面四肢色赤或腫遊走不定甚者宜用前磁鋒砭法使毒血遇刺皆出更以神功散傳之內服荆防敗毒散或五福化毒丹若使毒氣入腹則不治或愈而復發皆因母食辛辣炙博以致內熱宜於母藥中加漏蘆煎服或令自服亦愈

小兒鵝口三百七

凡小兒口內白屑滿口者為鵝口瘡則不能飲乳用髮或軟絹纏指蘸井水拭舌上使淨如屑不能脫濃煮粟米湯以綿

纏筋頭拭洗却用飛過黃丹搽之

加味太乙膏三百八 一切瘡瘍並宜貼之先用隔蒜炙更服

活命飲以收全功

當歸 生地黃 芍藥 玄參

大黃各二兩 加甘草四兩

用麻油二斤煎丹收

景岳會通膏三百九 凡諸癰毒疔塊風氣骨節疼痛無所不

治

人黃 木別仁 當歸 川芎

芍藥 生地 麻黃 細辛

白芷 防風 荊芥 蒼朮

羌活 川烏 甘草 烏藥

南星 半夏 香附 官桂

蒼耳 骨碎補 草烏 艾葉

皂角 枳殼 三稜 蓬朮

蘿蔔子 水紅花子 巴豆 五倍

獨活 桃仁 蘇木 紅花

續斷 連翹 梔子 苦參

槐花 皂刺 乾薑 草麻子

透骨草 穿山甲 全蝎 僵蚕

蜂房 蛇退 蜈蚣 蝦蟆

血餘 獨蒜 四頭 蜈蚣 三隻

右五十四味用麻油五斤浸三日先煎血餘草麻水別桃仁

巴豆蝦蟆獨蒜待半枯然後入餘藥煎黑去滓丹收後下細

藥十味

阿魏 二兩 乳香 沒藥 木香

丁香 雄黃 硃砂 血竭

兒茶 麝香 不拘一錢

右麝香丁香木香三味宜最後下之以上收油法凡熬成熟

油一斤下飛淨好紅丹入兩若欲微嫩則止下七兩五錢

神異膏三百十 治癰疽瘡毒及收口甚效此瘡瘍中第一方

也

麻油 二斤 黃丹 黃芪 杏仁

玄參 蛇脫 男髮 蜂房 子多者

右先以黃芪杏仁玄參入油煎至將黑乃入蛇脫蜂房亂髮

再煎至黑去粗徐徐下丹慢火煎收黃丹不必拘數但以得

中為度凡膏藥用久必至老硬煎時預留嫩膏少許如硬量

和之

清涼膏三一一 治一切瘡瘍潰後宜用之

當歸二兩

白芷

白芨

木別子

黃柏

白欬

乳香

白膠香各五錢

黃丹五兩

麻油十二兩

右用油煎前六味以槐柳枝順攪油熟丹收然後下乳香等二味

阿魏膏三二

治一切瘡塊更服胡連丸

羌活

獨活

玄參

官桂

赤芍藥

川山甲

生地黄

兩頭尖

大黃

白芷

天麻

紅花各半兩

木鱉十枚

亂髮一團

槐柳桃枝各半兩

右用麻油二斤四兩煎藥黑去粗入髮再煎髮化乃去粗入上好真正黃丹煎收軟硬得中入後細藥即成膏矣

阿魏

芒硝

蘇合油

乳香

沒藥各五錢

麝香三錢

右凡貼膏藥須先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨之

硃砂膏三三三

治一切惡瘡破瘡杖瘡癰疽發背破傷者最

妙最佳

麻油一斤

飛母六兩

水銀一兩

硃砂佳者一兩半飛

好黃蠟四兩

先下油熬數沸下雞子二枚敲開連殼搗之熬焦撈去子退火俟油定下水銀五錢再加微火攪熬飯頃即入丹漸收成膏後下黃占再攪候大溫下極細好硃砂一二兩五錢攪勻磁罐收貯

神效當歸膏三二四

治一切發背瘡瘍湯火疼痛等證去腐

肉生新肉其效如神凡洗拭換膏必須預備卽貼之新肉畏風故也如用白蠟尤好此藥生肌止痛補血續筋故與新肉相宜

當歸

生地黄

黃蠟

各二兩白麻油六兩

右先將當歸地黃各一兩入油煎黑去粗又將二味各入一兩煎至微焦復去滓乃入蠟溶化候冷攪勻卽成膏矣用塗患處以紙蓋之如有死肉須用利刀剪去則生肌尤速
攻堅敗毒膏 三一五 亦名乾坤一炁膏○專攻痞塊諸瘡毒痔漏

當歸

熟地

生地

白芍藥

赤芍藥

南星

半夏

三稜

蓬朮

木別

兩頭尖

川山甲

巴豆仁

肉桂

五靈脂

桃仁

續斷

玄參

玄胡索

草麻子仁

白芷

羌活

獨活

大黃

紅花

川烏

草烏

蘓木

川芎

防風

杏仁 各一兩

右用麻油四十兩浸諸藥三日桑柴火煎成丹收後細藥乳香製沒藥製各一兩真阿魏半兩麝香三錢
右方於細藥中加蘆薈木香各一兩蟬酥三錢卽各消瘡大

成膏

消瘡膏 三一六

三稜

蓬朮

川山甲

木別仁

杏仁

水紅化子

蘿蔔子

透骨草 晒乾

大黃 各一兩

獨頭蒜 四兩

右用香油一斤入前藥十味煎油成以飛丹收之後下細藥

真阿魏

乳香

沒藥各一

麝香三錢

右先下乳沒阿魏三味後下麝香攪勻待冷傾水中浸數日用磁瓶收貯勿使洩氣用時以白布或堅白紙攤貼八九日一換或見大便去膿血勿以為異亦有不去膿血而自愈者若清渴痢可貼臍腹忌房事生冷○凡貼癰積痞塊先用蕎麥麴和作一團圍住患處四邊其塊上放皮硝二三兩蓋厚紙以熨斗熨令熱氣內透然後去硝用膏藥貼之○右原方用白花菜同透骨草另煎膏二兩攪入膏內收用但白花菜惟西北方間有之求覓不易故余用獨蒜蘿蔔子代之其功亦不減也

琥珀膏 三一七

治頸項瘰癧及喉下初結小核漸加速珠不消不潰或潰而膿水不絕經久不差或成漏瘡

琥珀

白芷

防風

當歸

木別子

木通各一

丁香

杜心

硃砂

木香

松香各半

麻油二斤

右先將琥珀等六味為末其餘藥入油煎黑瀘去粗徐入黃丹再煎軟硬得中入前藥膏貼之

貼痞琥珀膏 三一八

貼癰瘡痞塊

大黃朴硝各一兩為末以大蒜同搗膏貼之

水紅花膏 三一九

貼痞塊

用水紅花或子每一碗以水三碗用桑柴文武火熬成膏量痞大小用紙攤貼以無形為度仍將膏用酒調服忌量腥油膩不飲酒者白湯下

大龍膏 三百二十

治風寒濕毒所襲筋骨攣痛及濕痰流注

經絡壅滯不能行步並治風襲風鶴膝風其效如神

生薑 八兩

乳香 為末

沒藥 為末各

麝香 一錢

真牛皮廣膠二兩

右先將薑汁並膠溶化方下乳香沒藥調勻待少溫下麝香即成膏矣攤貼患處更服五積散如鶴膝風須服大防風湯

趙府膏三二

專貼疼痛腫毒

乾蝦蟆三個

全蝎

蠅蚕各一

蜈蚣四條

斑蝥四

商陸根

一錢

花椒一錢

童子髮六分

雞內金

個

槐枝

三十寸長者四十根

細藥

兒茶

乳香

沒藥

血竭

龍骨

黃占

白占各五錢

麝香一錢

右用麻油二斤煎飛丹收

密陀膏三二二

此膏治癰濕諸瘡瘋疔等證神效凡治疲痛

先以葱薑擦患處上後貼之

先用密陀僧一二斤打碎將童便煮之覺其濁性去而童便氣清乃可止矣用便煮過則貼瘡不痛涼乾研極細如麴候用

用桐油不拘幾斤熬至將黑為度每熟油一斤用陀僧六兩收之於將成膏之頃取起離火候稍涼即膏多少入冷水數碗徐攪之恐其泛出俟少定即逼去其水再上火熬化復入水數碗攪逼如前或三次更妙然後熬淨其水每油一斤再入官粉二兩熬收其色方黑凡熬此者銅鍋須大方可用

八仙紅玉膏三二二

治諸瘡

龍骨

赤石脂

兒茶

血竭

沒藥

乳香各一錢

輕粉五分或一錢

冰片二分

右用麻油二兩入當歸五錢煎枯去滓入龍石茶竭四味再煎一二沸次入乳沒畧煎勻後入黃占五錢溶化冷定入輕

水攤貼

碧油膏 三二四

止痛掛膿灸後宜用之

桃枝

柳枝

桑枝

槐枝 各二兩

乳香

另研

血竭

各五錢

黃丹

四兩

右用麻油十兩前膏成後下乳香血竭

長肉膏 三二五

人參

黃芪

當歸

夜合樹皮

玄參

各一兩

血餘

三兩

老鼠

一個

細藥

血竭

龍骨

赤石脂

白臘 各五錢

右用麻油一斤前飛丹收

保養元氣膏 三二六

此膏助元陽補精髓通血脈鎮玉池養龜存精百戰百勝待婦人經淨之時去膏而泄則可成孕並

治腰膝疼痛五勞七傷諸虛百損半身不遂膀胱疝氣帶濁淫淋陰痿不舉無不效者此御真入進

御方也

麻油一斤四兩入甘草二兩先熬六七滾然後下諸藥

生地黃

熟地黃

俱酒洗

麥門冬

肉蓯蓉

酒洗

遠志肉

蛇床子

酒浸

兎絲子

酒浸

牛膝

酒洗

鹿茸

川續斷

虎骨

紫稍花

木別仁

谷精草

大附子

肉桂

各三錢

右熬成以煮過松香四兩飛丹半斤收之次下細藥

次下龍骨

倭硫黃

赤石脂

各二錢

又次下乳香

沉香

丁香

木香

各一錢

又次下陽起石

三錢

麝香

五分

蟬酥

鴉片

各一錢

又次下黃占五兩 右煎成八井中浸三四日每用膏七八

錢紅絹攤貼臍上或腰眼間每貼五六十日再換

煮松香法 三二七

凡用松香收膏藥者必用水多煮一二遍

去其澁燥之性方可貼瘡不痛○若用貼癰疽血塊則當加藥如後法煮過用之方妙

大都松香三斤 用皮硝一碗 水紅花四兩

大黃

當歸

生地 各二兩

三稜

蓬朮 各一兩

右藥七味用水一桶先熬汁去滓淨用者煮松香徐徐添入以汁完爲度收用之極佳○一收油之法凡煮過松香一斤入熬熟藥油五兩卽成膏矣

以下通用方

四君子湯 三二八

方在補陣一

治瘡瘍脾胃虛弱或因尅伐腫痛不散潰斂不能宜用此以補脾胃諸證自愈若誤用攻毒則七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不實若脾胃氣虛瘡口出血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之症宜於此湯但加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生若用沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂起

六君子湯 二二九

方在補陣五

治脾胃虛弱或寒涼尅伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以壯營氣則諸證自愈

加味四君子湯 三三三

方在補陣二

治痔漏下血面色痿黃凡諸氣虛脾虛不能攝血等證

四物湯 三三一

方在補陣八

治瘡瘍血虛發熱或因失血或因尅伐或因潰後致暗熱內

熱煩燥不安皆宜服之蓋血生於脾脾虛不能生血者宜用四君子加當歸酒炒白朮以補脾

八珍湯三三二 方在補陣十九

治瘡瘍脾胃損傷惡寒發熱煩躁作渴或瘡瘍潰後氣血虧損膿水清稀久不能愈

十全大補湯三三三 方在補陣二十

治瘡瘍氣血虛弱腫痛不愈或潰瘍膿清寒熱自汗盜汗食少體倦發熱作渴頭痛眩暈似中風狀者

補中益氣湯三三四 方在補陣三一

治瘡瘍元氣虧損惡寒發熱或因尅伐肢體倦怠飲食少思或不能起發消散生肌收斂或兼飲食勞倦頭痛身熱煩躁作渴脉洪大弦虛或微細軟弱

歸脾湯三三五 方在補陣三十三

治瘡瘍憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不調晡熱內熱或唇瘡流注及不能消散潰斂等症

獨參湯二三六 方在補陣三十六

治瘡瘍一切失血或膿水出多氣血俱虛惡寒發熱作渴煩躁蓋血生於氣故血脫者宜補氣陽生陰長之理也用人參一兩棗十枚薑十片水煎徐徐服

人參養營湯三三七 方在補陣三十一

治瘡瘍脾胃虧損發熱惡寒血氣俱虛四體倦怠肌肉消瘦面色萎黃汲汲短氣食少作渴凡大病後最宜用此

五味異功散三三八 方在補陣四

治脾胃虛弱飲食少思即四君子湯加陳皮

生脉散 三三九

方在補陣五七

治瘡瘍胃氣虧損陰火上衝口乾喘促或肢體倦怠肌肉消瘦面色痿黃汲汲短氣汗出不止食少作渴或膿水出多氣血俱虛煩躁不安睡臥不寧或濕熱大行火土合病脾胃虛弱身重氣短或金爲火制絕寒水生化之源肢體痿軟脚軟眼黑等症

當歸補血湯 三百四十

方在補陣四五

治瘡瘍脾胃虛損或服峻劑致血氣俱虛肌熱大渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無此病多得於飢飽勞役者若誤服白虎湯必死

黃芪六一湯 三四一

方在補陣五十

治瘡瘍陰陽俱虛盜汗不止

參朮膏 三四二

方在補陣四十

治瘡瘍中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

東垣聖愈湯 三四三

方在補陣九一

治脾胃虧損膿水不止或金瘡出血心煩不安眠睡不寧五心煩熱飲食少思

錢氏七味白朮湯 三四四

方在小兒七

治瘡瘍胃氣虛弱或因尅伐或因吐瀉口乾作渴飲食少思

陳氏五味子湯 三四五

方在補陣五九

治瘡瘍腎水枯涸口燥咽乾喘促虛煩作渴

參附湯 三四六

方在補陣三十八

治瘡瘍失血過多或膿瘀大泄或寒涼汗下真陽脫陷上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等證急服此湯以救元氣緩則不治

人參理中湯 三四七

方在熱陣一

治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹作脹或痛或胸膈虛痞飲食不入

六味丸

三四八

方在補陣百二

此壯水之劑夫人之生以腎為主凡病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可用者若腎虛發熱作渴小便淋秘痰氣壅盛欬嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽候燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟五臟齊損肝經不足等症尤多用之水能生水故也若腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失瘡此水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑也

八味丸

三四九

方在補陣百二

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩

湯

陳氏加減八味丸

三百五十

方在古補百二三

治腎水不足虛火土炎發熱作渴咽候疼痛口舌生瘡寢汗憔悴等證

還少丹

三五一

方在補陣一三七

治足三陰經虛損致患鶴膝風等證又補脾胃進飲食之良劑也

大防風湯

三五二

方在補陣九九

治足三陰虧損外邪乘虛內患鶴膝風或附骨疽腫痛或腫而不痛不問已潰未潰用三五劑後更全用調補之劑

十宣散

三五三

方在痘疹十四

治瘡瘍脈緩澁體倦惡寒或脈浮緊細用之以散風助陽也

薛氏四神丸

三五四

方在執障一五二

景岳全書

卷之六

全

治瘡瘍脾腎虛弱大便不實飲食少思或小腹作痛或產後泄瀉肚腹作痛不思飲食

五積散 三五五

方在散陣三九

治風寒濕毒客於經絡致筋攣骨痛或腰脚痠疼或拘急或身重並皆治之

二陳湯 三五六

方在和陣一

治癆癰中脘停痰嘔吐惡心或頭目不清飲食少思等症

小柴胡湯 三五七

方在散陣十九

治肝膽經風熱燥癰結核或腫痛色赤或寒熱往來或日晡發熱或潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾欬嗽皆用此藥

小青龍湯 三五八

方在散陣八

治肝肺受寒欬嗽喘急宜服此發散表邪

人參敗毒散 三五九

方在散陣三六

治瘡瘍外有表邪熾痛寒熱或拘急頭痛脉緊有力

不換金正氣散 三百六十

方在和陣二二

治瘡瘍脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱服此以正脾氣則痰氣自消寒熱不作

加味逍遙散 三六一

方在補陣九四

治瘡瘍肝脾血虛內熱發熱或遍身搔痒寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡煩赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胸乳腹脹小便不利

防風通聖散 三六二

方在攻陣十六

治時毒熱毒便秘熱燥邪實等症若非大滿大實者不可輕用此藥

消風散 三六三

方在散陣四七四九

治風熱癰疹瘰癧及婦人血風癢痒或頭皮腫痒或諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻出清水噴嚏聲重耳作蟬鳴

犀角散 三六四

方在痘疹六三

治時毒癰瘍熱盛煩躁多渴赤班等症

黃蓮解毒湯 三六五

方在寒陣一

治瘡瘍癰痛煩躁飲冷脉洪數或發狂言

普濟消毒飲 三六六

方在寒陣十三

治天行時毒頭面腫痛或咽喉不利若饑饉之後患此者最宜用之仍當兼固胃氣

梔子清肝散 三六七

方在寒陣六十

治三焦足少陽風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱往來

柴胡清肝散 三六八

方在寒陣五九

治鬚疽及肝膽三焦風熱怒火之症或項胸作痛或瘡毒發熱

加味龍膽瀉肝湯 三六九

方在寒陣六四

治肝經濕熱或囊癰便毒下疳懸癰欣腫作痛或潰爛不愈或舉丸懸掛小便澀滯或婦人陰虛痒痛或男子陰癰痔漏腫痛或出膿水

清心蓮子飲 三百七十

方在寒陣三二

治膀胱陰虛濕熱玉莖腫痛或莖熱澀滯口苦咽乾小便色赤或白濁夜安靜而晝發熱

黃芩清肺飲 三七一

方在寒陣三八

治瘡瘍肺經陰虛火燥而小便不通

東 清胃散 三七二

方在寒陣五四

治膏梁積熱唇口腫痛齒齲潰爛喉痛上連頭面或惡寒發

熱

竹葉石膏湯 三七三

方在寒陣五

治癰疽胃火盛腫痛作渴

竹葉黃芪湯 三七四

方在寒陣七

治癰疽氣血虛胃火盛而作渴

滋腎丸 三七五

方在寒陣一六三

治瘡瘍腎經陰虛發熱作渴便赤足熱腿軟等證凡不渴而
小便秘熱在下焦血分也最宜此藥經云無陰則陽無以化
若脾肺燥熱所移此當清其化源

瀉青丸 三七六

方在寒陣百五一

治肝經實熱癰癰腫痛寒熱或嘔乳作痛大便秘結

大蘆薈丸 三七七

方在小兒百十五

治肝火下疳潰爛或癰腫作痛或治小兒疳膨食積口鼻生

瘡牙齦腫爛等瘡並重腫肝門痒痛

五苓散 三七八

方在和陣一八二

治瘡毒下部濕熱小便短少

五淋散 三七九

方在寒陣百十七

治膀胱有熱水道不通或尿如豆汁或如砂石或如膏油或
熱沸便血

八正散 三百八十

方在寒陣百十五

治下疳便毒小便淋漓脉證俱實者

清肺飲 三八一

方在和陣三五五

治瘡瘍渴而小便不利乃肺經有熱是絕寒水生化之源宜
用此藥以清化源其水自生而便自利

益元散 三八二

方在寒陣百十二

治瘡瘍小水不利內生煩熱作渴

四順清涼飲 三八三 方在攻陣二五

治瘡瘍煩躁飲冷熾痛脉實大便秘結小便赤澀

土蜀散 三八四

治便癰初起腫痛發熱大小便秘宜用此行散之若邪實毒甚者宜桃仁承氣湯

人參平肺散 三八五 方在寒陣三七

治火剋肺金傳為疽痿欬嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽噎不利

葶藶大棗瀉肝湯 三八六 方在和陣百四十

治肺證胸膈脹痛上氣喘急或身面浮腫鼻塞聲重

枳殼散 三八七 方在寒陣百一

治煩熱便血

失笑散 三八八 方在婦人百四

治跌撲產後心腹結痛或不知人事或經行瘀血作痛成癰

槐角丸 三八九 方在寒陣一七五

治痔漏腫痛便血脫肛

紫金錠 三百九十 方在因陣二百二

治癰疽諸毒

長通關散 三九一 方在古因九八

搖鼻開牙關

