疫説

ヤ武9
604
ヨ4

武門 604 3

雜疫小序

疫病繁多而瘟疫爲害寔巨以其似於傷寒而世有以類傷古名注者然受病之由与傷之迥異故纂集治法較他疫頗詳庶雜疫一門庶有不可溺者是以除骸隔風勞蟲鬼疫病他外癰病脇嘔歌洩口齒咽喉等作瘡心瞤腹痛諸雜症往之有疫氣以行乎其間而人自不覺故有用平

素治雜疫之方而不效者是其中必疫氣
以為之梗也然無一定治法非隨運參以
消息安通焉不可也茲持擇其有一定治
法者七十二種羅列於後我謂之雜疫以
備臨症者採擇焉松峯誌

松峯說疫卷之三

諸城劉奎松峯著輯　男秉錦濯西述較
福山劉嗣宗南璞參閱　表姪李逢虔謹identifier錄

雜疫

蔔萄疫

小兒多患此症以受四時不正之氣鬱於皮膚結成大小
青紫斑點色若蔔萄發在遍體頭面乃為腑症邪毒傳胃
牙根出血久則必至虧損初起宜服羚羊角散清熱凉血
久則胃脾湯滋益其內又有牙根腐爛者入中曰散

加減羚羊角散 此方銀花蒺活殭蚕生地等皆可酌入

羚羊角末　防風　麥冬去心元參　知母酒炒
黃芩　牛旁子炒研　甘草節　金銀花　淡竹葉十餘片煎服
胃脾湯　此湯必實有不足之症方可用初起切勿輕投
白朮土炒茯神　陳皮　遠志去心　麥冬去心
沙參　五味子研　甘草節　盧弱自汗者去沙參加參蒐
人中白散　治小兒走馬牙疳牙齦腐爛黑臭
人中白尿壺中白堿煅一兩　兒茶五錢　黃柏　薄荷
青黛各三錢　氷片二分五厘　共爲細末先用温湯漱淨吹

藥于疳上日六七次吹藥涎從外流者吉內收者凶

捻頸瘟

其症喉痺失音頸大腹脹如蝦蟇者是也宜荆防敗毒散

荆防敗毒散

荆芥　防風　羌活　獨活　柴胡
前胡　桔梗　枳殼麩炒　川芎酒洗　茯苓
人參　甘草　姜葱煎食遠服發冷倍用葱

蝦蟇瘟

其症咽喉腫痛湯藥稠粘甚則往來寒熱身痛拘急大便

秘結有類傷寒亦與捻頸瘟相似但以不腹脹爲異治法
京散和解攻下敗毒隨症施治無不獲愈方俱散見各醫
善本門不多贅其治療捷法於初起時用手在病人兩管
自肩項極力將其中凝滯癘氣惡血赶至手腕數次用帶
子將手腕札住不令惡血走散用針刺少商穴并十指近
甲盖薄肉正中處捻出惡血則愈少商穴在大指外邊尺面靠
又法將脖項患處口卿塩水用力吮咂俟其皮色紅紫成
泡則愈或用針將項下一挑手捻針孔出血客七挑捻愈

大頭瘟　外科門亦名時毒

此症有陰陽有可汗不可汗者

其症發於頭上并腦後項腮頰與目赤腫而痛發熱症似
傷寒治療散見各醫書本門茲不多贅用前刺法亦妙

大力子丸　兼治啞瘴

元參　連翹去隔　甘草　桔梗　川大黃生熱酌用
石膏煅研　川連酒炒　黃芩酒炒　荊芥　防風
羌活　大力子炒研　爲末作丸或姜煎服亦可

又方　殭蠶二兩　大黃一兩　姜汁丸彈子大蜜水和服一丸
漫

又方　普濟消毒飲見醫方集解專治大頭瘟初起

又方　大頭瘟生疙瘩及喉閉並將疙瘩刺出血即愈

瓜瓤瘟

其症胃高脇起嘔汁如血宜生犀飲

生犀飲

黃土五錢 犀角 二錢 蒼术 泔浸油炒 川連 泔山茶一撮

流水煎入金汁和服日三夜二處加人參 鹽水炒

大便結加大黃 渴加花粉 表熱去蒼术黃土加柱枝 性熱似不宜當酌加別解表藥便膿血去蒼术倍黃土加黃栢使便潛入中黃代金汁

楊梅瘟 形似楊梅

其症遍身紫碗忽發出黴瘡者是也用清熱解毒湯下人中黃丸并刺碗出血 黴音枚 物着濕變色

清熱解毒湯

川連 酒洗 黃芩 酒洗 生地 白芍 酒炒 石羔 煅研

知母 鹽酒炒 人參

羌活 日三服夜二服羹煎 甘草 升麻 葛根

人中黃丸

大黃 三兩 蒼术 油炒 桔梗 滑石 各二兩 人參

川連 酒洗 防風 各五錢 香附 兩半 姜汁浸生用 人中黃 二兩如無坑垢代之

神麴糊爲丸清熱解毒湯送　如氣虛用四君子湯送
如血虛四物湯送　痰甚二陳湯送　熱甚童便送

錫按二方用參非取其補取其鼓舞之以祛邪也

疙瘩瘟

其症發磈如瘤遍身流走且發冬死三稜針刺入委中三分出血並服人中黃散委中穴在兩腿屈盤當中前對膝蓋人中黃散

人中黃一兩明雄　硃砂各一兩共爲末薄荷桔梗湯下二錢日三夜二

消毒丸　治時疫疙瘩惡症

大黃　牡蠣煅　殭蠶泡去淨炒各一兩

共爲末煉蜜丸彈子大新汲水化下一丸無時

軟腳瘟

其症便清泄白足痿難移即濕瘟　宜蒼术白虎湯即白虎湯加蒼术

絞腸瘟一名痧

其症腸鳴乾嘔或水瀉氣不通則探吐之宜双解散有陰陽二症

陰痧　腹痛手足冷身上有紅點用燈草蘸油點着將鹽

痧之　陽痧　腹痛手足暖以針刺少商穴並十指尖近

痧音殺澆也

硝凡冬而雜硃太少甘五不能作五分耶

甲處刺法見前此刺法治諸中霍亂咽喉等病俱效

陰陽水方　滾水一盞冷水一盞盎對服立愈或加炒塩少許妙

觀音救苦丹　磨煞眼角二三次兼治咽喉諸症哈麥大一粒化嚥一切腫毒惡瘡蛇蝎傷津研察患處

火硝一兩　白礬四兩　黃丹二兩　硃砂明雄各五錢　以上二方兼治陰陽二病

共細研勻化開候稍冷搓成小錠磁器收貯听用　每出氣

地漿　于南墻背陰處掘一坑入涼水一碓緻之再候澄清取飲

又方　生明凡末二錢　冷水滾水各半盞調服

又方　菜豆一二升　水二三桶熬湯以甕貯之令病人澆洗

硝冷全身入甕中泡透或稍愈宜毋遽出效

雙解散　卽防風通聖散　渡瀉去硝黃自汗去麻黃加桂枝涎嗽加姜製半夏

防風　荊芥　薄荷　麻黃　白朮　土炒泔浸

川芎　酒洗當歸　酒洗白芍　酒炒連翹　去隔山梔　炒

黃芩　石膏　煆　桔梗　甘草　滑石　末

芒硝　大黃　生熟酌用　醫方集解之雙解散減去硝黃

引用生姜葱煎　以上四方專治陽疫。

鸕鷀瘟

其症雨腮腫脹憎寒惡熱　外用赤小豆柏葉共搗爛水

醋調敷內服薄荷濃煎湯服之

龍鬚瘟

其症喉硬吞强並牽耳中急以針刺喉上橫七針豎七針
硃砂不拘多少研蜜一匙大燒酒和勻灌之

芋頭瘟

其症昏沉不食用芋頭燒灰存性研黃酒送下

蝌子瘟

其症喉痛發熱惡心痛連腮頰頭亦痛喉旁有疙瘩四散
紅絲如蝌爪壓吞針挑之要挑爪不可挑頂每爪上挑一
針令血出旋以硃砂末搽之再哈咽醋少許即愈如刺當
中頂即爲傷蝌蚪必出膿不食而危

腹腸瘟　刮出紫疙瘩六个即難治

其症初發如傷寒熱病三四日小腹脹滿不治數日即死用麻一
纔如指粗先自兩肩頭刮至手腕刮出紫疙瘩針刺破擠去
惡血又自兩大腿跟刮至兩足跟有紫疙瘩刺破去惡血
俱男先左女先右又自咽窩刮至臍下刺法如前即時汗愈

脇痛瘟　一名結肋瘟甚惡不治數日即斃

其症但脇肋痛蘿白切片蘸燒酒刮痛處出瘀即愈未愈

用豆油一大盞銅杓熬三分之一服之愈又法青布包黑
凡醋燒酒刮疙又法烙香油厚餅碗口大乘熱熨痛處冷
即易可用三四餅葉勿食忌生冷

蠶瘟瘄 猫

刺蠶瘟瘄

其症壯熱煩悶遍身痛如蠶刺所傷俗名蠶刺瘟以瘄治
之林月溪患時疫壯熱口渴胸腹迷悶手摩之如蘸刺傷
痛遍體皆然因放腿灣瘄廿餘針毒血成流用山甲天虫
角刺加活血順氣藥稍飲之而痊

地萄瘟瘄

瘄法見下瘟瘄

暑熱時疫惡毒之氣攻於裡則爲痰喘爲血痰昏迷沉重
不省人事若元氣壯實內不受邪不入于裡即散其毒于
凡膚血肉之表爲腫爲脹爲瘄爲癤飲熱湯熱酒刺腿灣瘄筋並
十指尖出毒血內服寶花散治瘄仙劑麝金一細辛三錢降香三錢
荊芥四錢共爲細末清茶調三錢冷服○桃仁紅花湯治血凝結
桃仁去皮尖紅花蘇木各一錢青皮八分烏藥四分獨活六分白芷蒼
朮去蘆搗末一錢二分水煎服○紫朴湯治瘄有食氣壅盛者厚朴姜汁炒山查葡
萄炒連翹去隔青皮陳皮細辛各等分水煎冷
服

手足麻瘟

其症先少腹痛作羊毛疔挑之無血隨作紫疙手足麻
麻至不知人而死急令人以足蹈病者手之三閉脉上 男蹈
左手女用力蹈勿放直待四支不麻病人自覺心頭發火
蹈右手方放之自愈若放之早雖愈後亦纏綿三閉脉即兩手寸
口診脉處

扣頭瘟 此症任宦漠友不可不知倘遇患此死者而
顧執言為人所逼勒可乎可補洗冤錄一則
聞之老醫臧枚吉云余髫時聞先祖言凡人無故自縊者
為扣頭瘟併時未解詳閱及後遍閱方書並無此說幸已

年一人來言其鄉有一婦人平日家道充裕子女成立夫
婦和偕忽一日無故自縊幾死救之始免詢之毫無所為
惟日鬱鬱不樂藏繩袖中無人處即自縊羅守月餘飲食
言動如常述此求治余因憶少時所聞細繹其或是血弱
氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏不結于胸下而結于
手足厥陰及手太陰之三藏合病者內經曰膻中者臣使
之官喜樂出焉今病則憂戚可知刺瘧論曰厥陰之瘧意
恐懼腹中悒悒又肝瘧者善太息其狀若死又肺瘧者善
驚如有所見瘧如此疫可類推因處一方用香附鬱金雄

黃爲九氣湯開膻中之鬱再加二陳以開膈中之痰更加羌活細辛温肝逐風鬼箭羽丹參赤小豆以通心包兼泄火邪生姜煎服服後竟頭痛發熱身痛瘟疫症忽具自出其袖中之繩云誰納我乎告以自縊莊不記憶寢疾七日又服發汗藥而解始知此症亦係疫癘或百合病之類乎

按既云疫癘之疾何不投火赴水刎頸而必欲自縊乎意或太陰邪氣傳厥陰而風木太過者故不思金火水而獨喜木也緣肺金藏魄肝木藏魂脾土藏意智而心君藏神爲一身之主包絡實爲臣使代心君行令而主喜樂今手厥陰包絡先病臣使失其喜樂之職以憂心君之神明君火不生土傳足太陰脾而意智不清土不生金因傳手太陰肺而悲憂金不平木因傳足厥陰肝而欝怒肺金承所不勝而木寡于畏故風木太過且肝之魂挾肺之魄不安其舍出而爲祟故喜木而自縊也非有祟憑之乃魂魄意智作厲也或蘇合丸牛黃清心丸當亦可用惜未診其脉色何如也此症原名扣頸傷寒然與寒疾太無涉故改名瘟疫而名實俱當也

狼掐翻有二種

其初喉痛旋氣不通殺人甚速對直虎耳尖照耳輪遍用

磁鋒刺出血即愈徐徐樂然傳

又一種心中不安旋不能言牙關緊閉不醒人事身冷出

涼汗以手試其兩頰下有斜出一硬物碍手便是竹著搖

開口入指探喉兩旁有物如麥大有單有雙並掐破出血

初病血鮮久病血紫立愈掐項先用塩擦

蚰蜒翻小兒多患此

兩目紅腫鼻流涕日夜啼號以針容刺太陽穴兩眉尖後加指

甲大一磁立愈刺後以芋頭搗爛敷印堂至山根

椅子翻

不語不食形如呆癡用椅子圈手拿處削下木片煎服愈

扁担翻

發即兩肋撐脹難忍用扁担肩挑處削下木片煎服愈

王瓜翻

兩脇形如王瓜脹痛用針自咽喉挑起從上而下客挑至

臍上橫挑兩肌挑至腰脊骨而止隨挑隨愈初挑無血漸

挑即有血挑至腰脊對頭即愈不然再發不救馬道人傳

白眼翻

其症唯翻白眼頂門炙三艾如不愈再炙三艾即愈

遶臍翻　一名泄宮炙岳廷臣傳

其症先遶臍痛漸痛至滿腹旋氣塞胃脇兩肋脹滿中喉氣不通不省人事不急治即死先以針挑兩耳尖次挑結喉下咽窩兩骨尖次挑背後肩胛骨下兩骨尖並令出血立愈

疙瘩翻

其症先寒後熱渾身發疙瘩赤紫黑色漸至大惡寒發熱不治即死宜參連散

參連散

人參　黃連 共為細末等分　藿香　冰片 各少許　四味再共研黃酒調服外以透骨草黃龍尾 俗名黃連一莖煎水洗之

松峯曰一名紫疙瘩氣虛症治迥異

麻雀掙

其症胃背腫痛小腹脹滿見食即嘔心中跳躍挑兩大腿腋見血即愈

鴉子掙

其症眼腫渾身青紫兩脅攻心(句似有落字) 大小便不通男挑龜頭女挑雞冠(陰戶之心)出血即愈

烏沙挣

其症兩脇脹胃口痛甚隨將病者手腕赶捻視有紫疙瘩者即此症也治用大針將手腕重刺一針起針時若見紫血噴出沙脹隨消忌冷白飯菉豆

黃鷹挣

其症肚腹攪痛翻上翻下治法從肱膊上赶下肉中氣血用帶子將兩手腕扎住各指稍抱甲肉上當中刺一針捻出惡血即愈

羊毛挣 一法用青布薰燒酒遍身擦黃蒿水薰洗亦可汗又法用手推背上二筋撮起捎緊時許

其症發熱無汗心內發燒口乾嘔吐前後心毛孔周圍高阜(句疑有錯誤字)紫色三四處即此症也治用針挑前後心挑患處將羊毛剔淨蒙被出汗即愈如不應再用沙糖少許生薑三片武夷茶一撮同煎服忌腥冷月餘無不效

鵪鴣挣

其症渾身發燒解裡衣體熱不可當心口一塊滾上滾下挑肚臍並兩乳即愈

此治法

烏鴉掙 猪掙同此

其症頭痛頭沉頭揚惡心眼黑發搐指甲先青然後遍體皆青上吐下瀉不能言小腹痛甚至無脈身涼如不急治頃刻殞矣牙閉如閉速用箸搖開口令病人捲舌視之根下如有青紅紫泡急用針刺泡見血用雄黃末點之滾水和雄黃末飲之或炮藥點之亦妙被蓋頭出汗即愈忌風三日

兎兒掙

其症直走橫走趨跳不寧急用涼水和炮藥灌之只許走

治不許坐治或有用濕土埋其頭使聞土氣即愈者

長蛇掙

其症腹痛打滾先挑肚腹三針次頭頂一針腳心三針即愈

纏絲掙

其症腹脹痛頭痛心翻一作煩前後心或有紫黃眼子針破以醋擦之如遍體麻木無此痕者亦是此症將臍膊腕眼腕青筋針出紫血用炒鹽調滾水灌之即愈水入姜三片亦可

啞叭掙

其症不能言用鞋底蘸涼水打頭頂門如孕婦患此將頂

門髮分開以手蘸凉水輕輕拍之即愈

丹猪掙

其症以頭拱地打滾先針舌根次將兩手除大指不針其餘八指將包甲薄肉每刺一針捻出惡血再用猪槽水洗手腕即愈

老鼠掙

其症唇黑紫腫悶喉腫痛或胃脘膨脹挑眉鬚角（鬚疑作髭見心句疑有錯誤）

蝦蟆掙

其症腹脹滿或疼痛將肚臍周圍挑之又挑小腹三四針即愈

海青掙

其症頭痛掤頭打滾用帶子札住頭然後將眉際眼根咽喉頂心各處挑之即愈忌風三日（眼根即大眼角）

眠羊掙

其症似睡眉眼不開轉身疼痛發脹喝氣疼痛治法挑尾把骨根出血即愈

野雀掙

其症渾身發紅或前後心有紅黑紫眼頭痛脇脹挑腋下六缺髮一針而愈髮字上下疑有落字 用莧菜種煮水洗浴甚良

狐狸挣

其症頭痛或乾嘔發幅不思飲食頭仰渾身出汗張口氣呼譫語用針挑咽窩並前後心則愈

猿猴挣

其症坐臥不寧心窩脹滿口吞痰言指用舌小腹疼挑陰囊線即愈

莽牛挣

其症肚脇脹痛心痛翻起唇來挑裡邊挑唇上牙花即愈

鷹嘴挣

其症肚脹疼頭暈眼黑心內脹用白凡水灌之再挑後心及耳稍即愈 又方胡椒七粒生姜七片陳麥煉一撮同研爛酒煎去渣調四錢服

松峯按諸挣挑刺隨即將惡血捻出為妙有病深重者挑刺無血必用手極力捻之見血即愈 諸挣過有口噤不開者用烏梅揩擦牙龈涎出即開益酸先入筋木能甦土使牙關酸軟則開矣若用鉄器苛攪

之恐傷其齒

右諸證症治余得之俗宗石壁間錄而藏篋笥遇患是疾者如法施治歷有奇效後余遊秦晉於太行道中亦見粘一紙於壁前所見者大同小異俱變換爲齲蓋因其方言各異耳而症治則無殊也因取而對較增訂之以廣爲流布至其命名亦各有義意甚明以其涉俗而忽之松峯再誌

赤腸類傷寒 松峯曰是皆疫症實非傷寒也

凡胸膈赤種疼痛頭痛身痛發熱惡寒名赤膈傷寒宜荊防敗毒散見捻頭瘟加萎仁去油黃連黃芩紫金皮元參赤芍升麻白芷如症有表復有裡而胸膈赤腫疼痛者雙解散見絞腸瘟加瓜蔞仁黃連紫金皮如表症已退大便燥實胸膈腫痛者涼膈解毒加瓜蔞仁枳殼桔梗紫金皮赤芍又宜棱針刺腫處出血如半表半裡胸膈腫痛者小柴胡湯加桔梗瓜蔞仁紫金皮赤芍

涼膈散

連翹去隔大黃酒浸甘草梔子炒黑黃芩酒炒

薄荷加竹葉生蜜煎

黃耳類傷寒

凡耳中策策痛者是風入腎經也久則變惡寒發熱脊强
背直如痙之狀曰黃耳傷寒宜小續命湯加殭蚕泡焙天麻
酒炒羌獨次用荊防敗毒散加細辛白芷蟬腿去足翅黃芩赤
芍紫金皮

小續命湯

防風　桂枝　麻黃　杏仁泡去皮尖研　川芎酒洗
白芍酒炒　人參　甘草　黃芩酒炒　防己
附子製　防己附子少用

解体類傷寒按素問尺脉緩澁謂解体音亦與此處所講不同

解者肌肉解散体者筋不束骨其症似寒非寒似熱非熱四體骨節解散懈惰倦怠煩痛飲食不美食不知味俗呼爲砂病內經名爲解体原其因或傷酒中濕感冒風寒房事過多婦人或經水不調氣血不和皆能爲此似砂病實非砂病也治宜先薰熱水打其臂膊裡面或以麻蘸水刮之刮打必皆令其皮紅紫爲度更宜針刺十宣委中二穴出血當服蘇合香丸

蘇合香丸

麝香　沉香　丁香　檀香　白者香附
藿撥　白朮　訶子煨去皮　硃砂　青木香
烏犀角各二錢　薰陸香　龍腦各一錢　安息香二錢為末用無灰酒蒸入息香膏蘇合油內二錢　共為細末用安息膏並煉蜜丸如彈子蠟包用時溫水化服一丸九用蠟包不出氣為妙

砂病類傷寒

嶺南閩廣間溪毒砂虱木弩射工蜮短狐鰕鬚之類俱能含砂射人被其毒則憎寒壯熱百體分解似傷寒初發土人治法以手摩痛處用角筒入肉以口吸出其砂毒外用大蒜煨搗膏封貼瘡口即愈諸虫唯鰕鬚最毒其毒深入於骨若鰕鬚之狀其瘡類疔腫不治必死彼地有鵟鶚鵰鶡等鳥專食以上諸虫故以此鳥毛羹服之及籠此鳥于身畔吸之其砂聞氣自出而愈

喉管傷寒

其症喉中作痒難過　吃茶酒湯水便不可救
薄荷二分　麝香一分　為細末吹喉待氣通吐涎碗許然後吃陳米湯半碗即愈

松峯按此雖名傷寒實疫厲之類夫曰喉癢似病之

輕者曰難過則痒不可當矣雖然何至吃茶水便不可救乎觀其待氣通三字則痒時其氣已有大不通者在矣味其言叶涎碗詠則氣之所以不通涎爲之也此症甚惡亦世之所不輕見者

油痧瘴

其症兩脇脹滿築心疼痛或腹內攪腸作痛頭暈眼黑或大小便閉塞氣不通暢命在旦夕將綿花子油與吃試之食之香甜不油氣者即是此症速將綿子油令病人吃足或用至四五兩半斤一斤立愈仍將油吐出來妙奇方也

烏痧瘴

其症初中頭疼惡心兩脇脹痛攻心不能坐臥得此症吃氣者便是用車頭油十二兩黃豆不拘兩黃連三錢乳香三錢二味爲末用車頭油共搗勻丸梧子大百草霜爲衣用無根水送七丸立效愈後一日無食忌腥冷氣惱數日車頭油即車轂中所積油垢或用六兩三兩兩半皆可

啞瘴 乃山嵐瘴溪瞽蒸之毒

其症血乘上焦令人昏迷甚則發躁狂妄亦有啞而不能言者皆由敗血瘀心毒涎聚胃所致用柴胡二錢黃芩錢半夏一錢製人參一錢枳殼一錢炒大黃二錢黃連六分甘草七分薑三片

棗一枚煎服效

鎖喉黃

其症面黑目黃舌白語澁牙関緊閉胸痛緩不過二三日即死人皆錯以烏疫瘴治之多致候命如遇此症將牙関攪開用藍布蔡去舌白次以錢薤塩水刮兩太陽穴（穴在眉稍眼角之際試有坑窠便是）出紫黑泡針刺出血見黃水為度脖項兩側亦如此治後用生大黃三錢硫黃一錢共搗粗末水二盅煎一盅温服立愈

犀脖子猴（犀恕平聲即用手犀物犀字）

其症咽喉暴腫而痛痰涎壅盛水漿難入甚則脖項亦腫寒熱交作頭面烘熱或四肢厥逆氣息不順用真阿膠三分麝香三分巴豆一个去油杏仁一个去皮尖紅棗一枚去核共搗爛先梧子大銀朱為衣綿帛包一層用時將紙撕去按男左女右塞鼻孔汗出即愈避風忌口二三日所忌不言何物止食粥飯小菜便無不是

松峯按此係熱毒而用巴豆者亦熱因熱用以毒攻毒之意此與前症雖俱係咽喉之病而症治各有不同

谷眼（谷亦作骨）

其病初覺時頭暈心亂煩躁不寧漸而心腹疼痛即是此症有緊慢之分緊者立刻殞命急以銀針針大眼角內白皮（如無銀針想及兩耳稍鼻尖應門太陽穴見前見血即愈鉄針亦可）皆針挑破皮撿血非直刺凡有心腹痛兼吐瀉俱是此症俱宜挑初起先挑鼻尖後挑別處挑後用陳醋半碗無陳用糸入銀子少許共入砂鍋煖三四滾臨服時再思銀子入醋內研攪温服立刻回生若治遲危急看舌根下有紫泡挑破搽擦即愈

天行瘴瘧（建武中有陽擊瘴所得故名）

其症發班疹頭面及身須臾周匝狀如火瘡或戴白漿隨

央隨上下（此句費解）此毒惡之極須急治取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻數七拭之

疫厥（亦名瘟疫暴亡）

凡人感瘟疫視其症脈尚不至殞命不救而突然無氣身直甚至無脈且不可驚謊視為告終此疫厥也急用臘月雄狐胆温水研灌即活若牙閉已緊即攪開灌之雄狐胆必臘月頭為攝收為妙松峯曰如得此症不論有無狐胆總宜先針少商穴並十指甲上薄肉（穴道針法見前）攝出惡血並用好猪牙皂末吹鼻或用京中靈寶如意丹十餘粒吹鼻

可活

羊毛疔　與前瘟疫兼疫並羊毛挽大同小異三症治各不同故並存之

萬歷間金臺有婦人以羊毛遍體於市忽不見繼而都人身生泡瘤漸大痛死者甚衆瘤內惟有羊毛有道人傳一方以黑豆菔麥末塗之毛落而愈菔音喬疑即北方之喬麥

纏喉風

其症咽塞水谷不下牙關緊急不省人事楊氏一字散

雄黃水洗　蝎稍　焙　黎蘆　牙皂炙焦　各等分

右共爲細末用一豆大納鼻中搐之立效

赤瞎

其症兩目突然紅腫疼痛此亦時疫也救苦湯治之

桂枝　連翹去隔　紅花　細辛　歸尾　甘草各一錢五　蒼术泔浸焙　胆草各七分　羌活　黃芩　麻黃　柴胡　防風　藁本　黃栢各一錢　黃連五分　生地　知母炒各一錢　白芍二錢　食遠服

神鬼箭打

其症身痛有青筋以亂髮擦痛處髮捲成團而硬者方是此症用金銀花濃煎湯飲之不愈再加甘草髮不捲不硬

者非此症不必服另察脉與兼症治之

霧氣

其症心煩少氣頭痛項急起則目眩欲倒身微熱戰掉不自安時復憎寒心中欲吐吐時無物　新猪糞不拘多少入上好黃酒中攪開用細白絹濾出青汁頓熱服之盡劑鋪厚上蓋暖覆卧取汗天寒房內生炭常令煖毋寒寒則不汗如汗出候乾乃起愼風冷兼治瘧及風勞蠱毒

化金疫

其症初覺即昏不知人不治即死急以生豆令嚼甘美不

腥即是以幕上有河字錢一文放入喉中即化有化至三四枚而愈者

抱心疔

其症肚痛連心兩脇脹滿脊背痛上連頭痛痛極渾身腥直昏暈欲死視其臍上必有紅絲一條照心口蔽骨下二指挑斷其絲又於兩肋骨端亦挑兩處如前法又於脊上對臍腎俞穴上下各指半再挑二處如前法皆將盤絲挑盡斷皆以皂角末納挑眼內令滿以手揉之即愈忌腥冷豆腐諸豆并一切蔓生之物三日後食發物發所挑瘡口

一云敲骨端用針挑開皮肉內有紅絲用針斜挑斷

飛人忌食稍米

瘟瘧

其症惡寒發熱或腹痛似瘧非瘧氣急喘逆頭面腫脹胸腹飽悶脹滿或泄瀉下痢膿血輕者幸連弥月重者危急一時治宜放瘧消食積爲主俟瘧毒已滅然後和解清理除其寒熱健脾養血補其中虛

宜識瘧筋

凡瘧有青筋紫筋或現於數處或現于一處必用針去其毒血然後擾症用藥按輕者針卽見效不用服藥

放瘧十則

一在頂頂心百會穴　一在兩眉中間印堂　一在兩眉稍窪陷處太陽穴　一在結喉兩旁　一在舌底下筋之兩旁　一在雙乳以上俱斜挑　一在兩手背十指尖當中近甲薄肉　一在兩臂灣以上俱薄肉　一在兩臂灣以上但直刺　一在兩足背十指尖當中近甲薄肉　一在兩臂灣以上但直刺

放瘧法 原作刺瘧今改作放字兼挑與刺二字言之

腿灣上下有細筋深青色或紫色或深紅色者便是皮白嫩者方顯紫紅色　刺之則有紫黑毒血腿上大筋不可刺刺亦無毒血反令人心煩兩腿遍硬筋上筋不可刺硬筋腿之大粗筋其上筋乃指

靠皮之小筋言刺之恐令人筋弛縮也手臂筋色亦如此辨之至于宜針挑者唯取挑破皮見血如無血手擠之至于指尖刺之太近指甲令人頭眩凡刺不可太深銀針方俚鉄性有毒

錦按前腿湾兩臂湾止此二處宜尋瘀筋刺之餘處亦不言瘀筋是無瘀筋也只按穴放之可耳法有直刺斜挑之異故以放字該之至于挑法亦當有隨症施治者如頭痛則挑印堂及太陽穴胃痛則挑心窩腹痛則遶臍挑之脇痛則密挑兩肋以及挑肩井穴挑背挑項挑耳尖耳輪挑脊挑軟肋（敷處皆諸瘀俱必挑之穴）

用針斜挑皮擠血至于少商穴及兩手足指尖乃係直刺如無血亦須擠之

刮瘀法

背脊頸骨上下及胸脇兩肩背臂之瘀用錢蘸香油刮之頭額腿上瘀用綿紗線或蒜麻蘸香油刮之大小腹軟肉內瘀用食塩以手擦之

新定刮瘀法

額項後當中窪處刮一道　額項後兩旁左右大筋上各刮一道　前身兩肩下脇上軟肉縫中各斜刮一道　兩

脇肋軟縫中左右各刮三道　左右肩靠着肩并軟肉處
各刮一道　背脊骨兩旁竪刮自項下至腰各刮一道
背後脅肋軟縫中左右各刮三道以上皆用錢蘸鹽水刮
之　兩臂內用蒜麻一縷搓鬆繩蘸水刮之但要出痧紅
紫爲度諸穴並治一切疫症唯蒜麻刮臂灣專治胸滿惡
心疫若非病症刮之亦不紅紫

松峯曰前刮痧法出痧脹玉衡書新定刮痧法乃屢
用而屢效者并錄之以備擇用

治痧三法

肌膚痧用油鹽水刮之則毒不內攻血肉痧看青紫筋刺之則毒有所洩內形痧須辨經絡臟腑在氣在血則可消散而絕其根（此段言當用藥）

治痧分經絡症候

足太陽膀胱痧　腰背巔頂連風府脹痛難忍。
足陽明胃經痧　兩目紅赤如桃唇乾鼻燥腹中絞痛
足少陽胆經痧　脇肋腫脹痛連兩耳
足太陰脾經痧　腹脹、版痛、且不能屈伸、四支無力瀉不止
足厥陰肝經痧　心胃弔痛、身重難移作腫、身上作脹（腹內

足少陰腎經痧痛連腰腎小腹脹硬

手太陽小腸經痧半身疼痛麻木不仁左足不能屈伸

手陽明大腸經痧半身脹痛俯仰俱廢右足不能屈伸

手少陽三焦經痧胸腹熱脹揭去衣被乾燥無極

手太陰肺經痧咳嗽聲啞氣逆發喘

手厥陰心包絡痧或醒或寐或獨語一二句

手少陰心經痧病重沉沉昏迷不醒或狂言亂語

昏迷不醒乃痧之熱毒攻心故必不能

用藥大法

痧症藥宜冷服益昏迷必有食積血痰阻塞再

自主而昏迷冷藥入口從厠間順流而下則熱毒在胸膈

者隨藥而消故旋清醒即尚昏迷必有食積血痰阻塞再

按脈症用藥開導攻下未有不醒者茲特舉用藥之一隅

以俟神而明之者用荆防之類從表而散用青陳二皮從

中而消用枳實大黃之類從大便而下用木通澤瀉之類

從小便而行用查芽萄子之類所以滌食之阻用銀花紅

花之類所以治其血之壅銀花治血未解用槟榔蓮木之類所以

治其積之滯

痧前禁忌

忌熱湯熱酒粥湯米食諸物犯之輕者必重重者立斃

瘧後禁忌

瘧後畧鬆覺餓驟進飲食即復忍耐一二日乃可萬全

瘧脹玉衡書言治瘧甚精詳第其中儘有過拘泥之處即如風勞臟腑等雜症皆以瘧論則所見無非瘧者有是理乎茲特撰其中大綱緊要數條詮次而註釋之而治瘧之大法亦盡于此矣錦再誌

撲鵝瘧

其症痰涎壅盛氣急發喘喉聲如鋸痛似喉鵝但喉鵝喉內腫脹此則無之又形似急喉風但喉風痛而不移此則痛無定處且喉鵝無瘧筋解見前此有瘧筋依前刺法刺之服吹方開後擇用之

永硼散　治瘧症咽喉腔痛

天竺黃　硼砂各二錢　硃砂　氷片各二分　元明粉入左

共爲細末磁瓶貯蠟封口出氣難用患者吹喉中

救苦丹　治瘧氣暫閉之劑

松實　蘿蔔子各一兩　烏藥　連翹各八錢　麝金二錢

共末清茶稍冷下

荆芥銀花湯　此治血滯之劑

荆芥　銀花　紅花　茜草　丹皮　赤芍各一錢　白蒺藜去刺研末八分　烏藥五分　香附三分　水二盞煎七分微温服

附治諸痙痛方　井水河水各半和服　泥漿水澄清白礬和服　海水服　晩蚕砂未自然汁候冷和服　以上治痙症無食積壅滯者吐法治新食胆住痰壽　明凡四分白湯一碗候冷化服　又方　食鹽一撮白湯一碗候冷和服　二方必多飲方吐少則不效按白凡稍多些亦可

青筋

此症因氣逆而血不行併惡血上攻于心也多由怒氣相沖或憂鬱氣結不散或惱怒復傷生冷或房勞後受寒濕以致精神恍惚心慌氣喘噎塞上壅嘔噦惡心頭目昏眩胸膈痞滿心腹刺痛脇肋腰背痛頭痛腦痛口苦吞乾面青唇黑四肢沉困百節酸痛或惡寒壯熱遍身麻痺手足厥冷顫掉默默不語不思飲食等症皆惡血攻心所致右無治法惟刺兩手曲池上青筋出瘀血可愈或屢患屢刺莫之能除夫人以氣血爲主故丹溪曰氣血和百疾不生

此病先傷于外而復損其血茲製一方名白虎加白虎湯方肺金之謂青筋乃東方肝木之象以白虎而治青筋金能平木有至理存焉能代針砭之苦且免後之復發兼治男子久痢便血婦人崩漏帶下并一切打撲內損血不能散心腹痛欲死者服之神效

白虎丸　千年石灰（不拘多少刮外雜色泥土研細水飛）　糊丸如梧子大每用燒酒送五十丸看輕重加減初覺一劑取效過三五日病已老宜多服

松峯按原方下注云此藥能順氣散血化痰消滯則凡霍亂瘀痛皆可以通融治之唯燒酒送獨于青筋

原文先傷于風第前言病因生令寒濕而此又言因風非唯自相矛盾且又說向一偏陰一陽字似屬該括

為宜益青筋多生冷寒濕所致至熱症或用冷水冷茶送氣滯用陳皮食積用麥芽水送隨症變通可耳。

疫疫

秉錦補

患此病者初得之亦並不顯尋常瘟疫應有等症不過頭微痛身微覺拘急寒熱心腹微覺疼痛脹滿三兩日內抖然妄見鬼神狂言直視口吐涎沫鼻中流濁手足躁擾奔走狂叫脈沉緊而數身體不熱亦有熱者都與邪入陽明胃腑發狂迥異此感疫癘之氣風火痰三者合而成病不急治三二日即幾宜先針少商穴并十指（刺法見前）急服竹瀝

解疫煎一二劑神效此亦世所罕有之症曾有患此者余
深覺叱異因思暴病皆屬於火怪病皆屬于痰以意爲之
先用刺法後用藥餌輒效一時患者數人方知其爲疫也
治之應手而愈遂定其名曰痰疫筆之以備採擇焉
竹瀝解疫煎自定新方

黃連　黃芩　梔子　胆草　殭蚕泡焙
胆星　貝母去心研　川貝去心研　橘紅　半夏製
流水煎熟用竹瀝薑汁兌服總以竹瀝爲君多則一盞少亦半盞

右七十二疫症或謂命名多不雅馴言之不文似未
足以行遠也余應之曰此直所謂少所見則多所怪
也余周行海內越歷已深其症大概北省恒多而南
國恒少飢饉之歲常多而豐樂之年頗少且其命名
也皆出自經史子集名山石室并艮醫口授試之而
歷有奇效方敢筆之于書洵非無稽之談索隱鉤倍
者之可同日而語也試觀古今來醫書中字句之欠
通歌辭之鄙俚平仄乖違而讀不上口者未可更僕
以視余之說疫中而敢有是乎以上不過數症命名

仍其方言土語耳而說者輒目之爲涉俗獨不聞古
聖人於邇言猶必察焉耶吾願世之大方家閱是書
者不鄙薄焉而以爲芻蕘之尚堪詢也則厚幸矣松
峯再誌