




中武 9
606
3





中武  
606  
3

平易方卷三 外科

折傷跌撲門

金瘡出血○不可以藥速合速合則內潰傷肉只以黃丹  
 滑石等分○為末傅之○刮花乳石末傅之○即止○神效○三撮酒調服之  
 膿○破傷血出甚多若血冷則殺○人宜炒鹽○三撮酒調服之  
 石○破傷血出甚多若血冷則殺○人宜炒鹽○三撮酒調服之  
 血○出疼痛不止者用葱白砂糖等分研封之○痛立止○折傷  
 無痕癢也○葱葉亦可○用葱白砂糖等分研封之○痛立止○折傷  
 金瘡腫痛○生牛膝搗傅立止○風化灰滑石裹之○痛立止○折傷  
 燥破末水服方寸匕○仍傅之○損骨○折骨○碎柴○細灰○皮熬  
 折傷筋骨○神效○散治跌撲傷損骨○折骨○碎柴○細灰○皮熬  
 忍此藥極能理傷○續斷○累用○累切○用路○上醋○滓○五○次○黃  
 人便溺處○久碎瓦片○一塊洗淨火煨○米醋○滓○五○次○黃  
 為度刀刮細末○每服三錢好酒調○下○時珍曰○食前○在下○食  
 後不可輕易而賤之○誠神方也○下○時珍曰○食前○在下○食

平易方卷三



及胎孕有傷服過百粒即為全人此方後人易名紫萍  
 一粒丹其法以紫色浮萍曬乾為末接骨方黃麻燒灰  
 大每服一粒以豆淋酒化下○每服三錢溫酒下立效  
 頭髮灰各一兩乳香五錢為末每服三錢和勻于跌傷  
 ○又只用藏瓜姜糟一物入赤小豆末和勻于跌傷  
 處以杉片或白桐片夾之不過三日即痊好  
 破傷中風○用蜜和葱白搗勻厚封立効  
 作餅放患處三五換如神○雄黃白芷等分為末酒煎  
 灌之即愈○牙關緊急天南星防風等分也○草烏火白  
 芷並生研末每服半錢冷酒一盞入葱白一○根同煎服  
 少頃以葱白熱粥投之汗出即愈○奪命散治打撲金  
 刃傷及破傷風傷濕發病強直如癱狀者天南星防風  
 等分為末水調敷瘡出水為妙仍○段內傷墜壓者酒和  
 死心尚溫者熱童便調灌二錢關○角弓反張取蒜一升  
 童便連灌三服即甦亦可煎服○之須臾得汗即瘥○升  
 去心無灰酒四升煮極爛并滓服○

用蟬蛻為末葱涎調塗破處即瘳取出惡水立効○作  
 白痴無血者殺人最急以黃雀糞直者研末熱酒服五  
 破傷風濕○秋露春雨着草人素○有瘡及破傷者觸犯之  
 瘡頓不痒痛乃中風及毒水身○必反張似角弓之狀急  
 以鹽豉和葱作餅于瘡上炙○至知痛痒出惡水數升  
 乃瘥○潰爛不生肌寒水石煨一兩黃丹二錢為末洗  
 敷甚者加龍骨一錢孩兒茶一錢○口噤強直用牡蠣  
 粉酒服二錢仍外傳之取効○毒腫痛不可忍麝香末  
 一字納瘡中出盡膿水便効○  
 刀箭瘡傷○香白芷嚼爛塗之  
 刀斧損傷○白芨石膏煨等分為末搽之收口○破傷出  
 血燈草嚼爛傳之立止○生薑嚼傳勿動次日即生肉  
 金瘡接指○凡指斷及刀斧傷用真蘇木末敷之外以蚕  
 繭包縛完固數日如故  
 金瘡腸出○用小麥五升水九升煮取四升綿濾取汁待  
 極冷令病人卧席上舍汁嚔之腸漸入嚔其背並勿令  
 病人知及多人見傍人多語即賜不人池乃拾席四角  
 折傷跌撲



輕搖使腸自入十日中但畧食蒸物慎勿驚動勿則殺  
 人○以皮作線縫金瘡腸出更以熱雞血塗之唐安金  
 曰桑白皮用此法而愈○乾入尿末粉之即入  
 藏剖腹用此法而愈○乾入尿末粉之即入  
 傷損內痛○兵杖所加木石所造血在胸背脅下刺痛用  
 青竹茹亂髮各一團炭火煎為末酒一升煮三沸服  
 傷損三服愈  
 傷損瘀血○在腹內者劉寄奴骨碎補延胡索各一兩水  
 二升煎七合入酒及童便各一合頓溫服之○從高墜  
 下木石壓傷及一切傷損瘀凝積痛不可忍並以藥推  
 陳致新大黃酒蒸一兩杏仁去皮三粒細研酒一盃  
 煎六分雞鳴時服至曉取下水瘀即愈○在腹者大蔥  
 白二十枚蘇子三升杵碎水九升煮一升半頓服當吐  
 出膿血而愈未盡再服○傷損筋骨疼痛鼠屎燒末猪  
 脂和傅急裹不過半日痛止○打傷瘀血攻心者人屎  
 煎服一升日一服  
 跌撲損傷○自然銅世以為接骨之藥然大抵室補氣補  
 血補胃為要若箇速效以合病人之意而銅非煅不可

用新出火者其火毒金毒相扇拔香藥熱毒雖有接骨  
 之功燥散之禍甚于刀劍制也  
 傷損接骨○雲苔子一兩小黃米炒二合龍骨少許為末  
 醋調成膏攤紙上貼之○五靈脂一兩茴香一錢為末  
 先以乳香末于極痛處傳上以五靈脂一兩茴香一錢為末  
 末干粥上帛裹木牌子夾定三五日効  
 骨節脫離○生蟹搗爛以熱酒傾入速飲數碗其滓塗之  
 半日內骨內谷谷有聲即好乾蟹燒灰酒服亦可  
 刀瘡神藥○古石灰新石灰絲瓜根葉初種放兩葉者韭  
 菜根各等分搗一千下作餅陰乾為末擦之止血定痛  
 生肌如神  
 一切金瘡○霜後桑葉微炙和桑衣煎服治金瘡諸損傷  
 止血○刀斧傷白僵蚕炒黃研末傅之立愈  
 金瘡闊絕○不識人琥珀研粉童便調一錢服三服瘥  
 刺傷手足○犯露水腫痛多殺人○以桑枝三條燒火炮熱  
 斷之以頭熨瘡上令熱冷即易之盡二條則瘡自爛仍  
 取韭白或薤白傅上急以帛裹之有腫更作  
 刺傷金瘡○百治不効葱煎濃汁漬之甚良  
 折傷跌撲



一切損傷○止血生肌令無痕痕用益藏楊梅和核搗如  
 泥倣成挺子以竹筒收之遇破傷研末傅之神聖絕妙  
 擦落耳鼻○頭髮瓶盛泥固煨過研末以擦落耳鼻乘熱  
 止血生肌○垂蛾散治刀奔傷割血出血如箭用晚蚕蛾炒  
 滅諸癩痕○春夏用大麥麩秋冬小麥麩篩粉和酥傅之  
 癩撲欲死○一切傷損高墜及木石使逆落馬扑車瘀血  
 凝滯氣絕欲死者亦活用淨土五升蒸熱以故布重裹  
 作二包更互熨之勿大熱恐破肉取痛止則已神効  
 墜損嘔血○墜跌積血心胃嘔血不止用乾荷花為末每  
 打傷出血○以陳紫蘇葉煎所出血接爛傅之血不作膿  
 且愈後無癢甚妙  
 墜馬瘀血○稻稗燒灰以新熟酒運糟入盐和淋取汁淋  
 痛處立瘥也○積在胸腹唾血無數者乾藕根為末酒  
 服方寸七日二次  
 墜打瘀血○從高落下瘀血搶心面青氣短欲死胡粉一

錢和水服即安○在腸內久不消時發動者桔槔為末  
 米飲下一刀圭○薑葉一升當歸三兩為末温酒服方  
 寸七日三○在骨節及脇外不去生鐵一斤酒煎服  
 傷損不食○凡打撲傷損三五日水食不入口用生猪肉  
 二大錢打爛温水洗去血水打雷爛以陰湯打和以  
 半錢用雞毛送入喉內却以陰湯灌下之其食頃聞  
 香實開瘀血而上胸中自然開解此乃損血凝滯胸間  
 重食血飽他物更不來探故也謂之驅通之法  
 磕撲青腫○老黃茄極大者切片一長消盡無痕迹也○次猪  
 肉貼之○用新羊肉貼之  
 打頭青腫○豆黃末傅之  
 傷眼青腫○羊肉煮熟熨之  
 閃眼脫臼○赤黑腫痛用黍米粉鐵漿粉各半斤葱一斤  
 同炒存性研末以醋調三次後水調入少醋貼之  
 墜馬物損○桑根白皮五斤為末一升煎膏傅之便止已  
 後亦無宿血終不發動  
 閃物手足○土當歸同荆芥葱白煎湯淋洗之○生薑葱  
 折傷跌撲



白搗爛和麩炒熱食之  
腹中滿悶或一升水三升煮三沸分服不瘥

多年損傷及損傷入骨年久發痛或一切陰疽腫毒並宜

草烏頭南星等分少加肉桂為末薑汁熱酒調塗未破

者能內消久潰者能去黑爛二藥性味辛烈能破惡塊

逐寒熱遇冷即消遇熱即潰

墜落車馬○疼痛不止延胡索末豆淋酒服二錢日二服

金瘡杖瘡○古松樹皮煨存性研末搽之最止痛

接骨不知痛○茉莉根以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒

被斫斷筋○續斷絕筋骨用蟹去殼同黃搗爛微炒納入

從高墜下○有瘀血在內刮真琥珀屑酒服方寸匕或入

金瘡傷損○生肌破血用紫葛二兩順流水三盞煎一盞

半分三服酒煎亦妙○折傷金瘡乾梅燒存性傅之一

折傷惡心○白檳榔四兩橘皮一兩為末每空心生蜜湯

服二錢○血出不止取所交婦人中衣帶三寸燒末水

金瘡內漏○雄黃半豆大納之仍以小便服五錢血皆化

為水○牡丹皮為末水服○指撮立尿出血也

刺傷中水○腫痛煮韭蒸搗之○服烏牛尿二升三服止

折腕損傷○大附子四枚生切以豬脂一斤三年苦醋同

漬三宿取脂煎三上玉下日摩傅之

鐵瘡出血○用人屎燒研傅之

傷筋出血○葛根搗汁飲乾者煎服仍熬屑傅之

淤血內漏○蒲黃末二兩每服方寸匕水調下服盡止

銅末錐骨○赤銅屑能錐人骨及六畜有損者細研酒服

直入骨損處六畜死後取骨視之猶有錐痕可驗打熟



跌破出血○烏賊魚骨末傳之  
 墜損腸出○新汲水冷噴其身面則腸自大也  
 血積成塊○用壁虎一枚白麪和一雞子大包裏研爛作  
 餅烙熟食之當下血塊不過三五次即愈甚驗  
 金瘡撲損○用青蒿搗封之血止則愈○夏枯草口嚼  
 打傷腫痛○無名異為末酒服腫破處乾則又上一夜血散即  
 愈○鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上一夜血散即  
 閃挫腰痛○蔣蘿作末酒服三錢匕  
 跌破傷○筋骨用豉末酒服三錢匕  
 打撲傷痕○水調半夏末酒服方寸匕宿即沒也  
 杖瘡出血○猪血一升石灰七升和劑燒灰再以水和丸  
 又燒凡三次為末敷之効  
 杖瘡潰爛○乳香煎油搽瘡口○雞子黃熬油搽之甚効  
 折傷跌撲○新得良方不見水未煎過元眼核炒研磨為  
 極細末搽之無不立愈即折斷者亦能接續屢試屢驗

湯火傷門

油傷火灼○痛不可忍石膏末傳之良○生蘿蔔搗塗  
 熟油燒痛○以白蜜塗之  
 湯火傷瘡○醋調黃土塗之○炭末香油調塗○年久石  
 灰傅之或加油調○銀珠研細菜油調傳二次愈  
 炙瘡出血○一人炙火至五壯血出不止如尿手冷欲絕  
 以酒炒黃芩二錢為末酒服立止  
 炙瘡燒斂○瓦松陰乾為末免以槐枝蒸白湯洗後糝之  
 立効○芙蓉花研末傅之○痒痛不瘳嫩葉皮末傅之  
 炙瘡飛蝶○因艾炙火瘡麻退落瘡內鮮肉片子飛如蝶  
 狀騰空飛去痛不可言是血肉俱熱怪病也用朴硝大  
 黃各半兩為末水調下微利即愈  
 炙瘡腫痛○灶中黃土末煮汁淋之○薤白一升猪脂一  
 斤切用苦酒浸一宿微火煮三上三下去滓塗之  
 火瘡未起○卮子仁燒研麻油和封之已波瘡燒白糖灰  
 糝之  
 火瘡敗壞○雲母粉和生羊髓塗之



火毒生瘡○如炙火毒氣入內兩股生瘡汁水淋漓者用薄荷煎汁頻塗立愈

火燒悶絕○不省人事新尿頓服二三升良  
烟熏欲死○烟熏垂死用蘿蔔菜一束嚼汁嚥下即甦此

湯泡火燒○線香一兩為末入青黛末三錢燥者香用調  
搽已爛乾○熱氣蒸面即浮腫眼閉用炊布為末隨傳隨

熱氣蒸腫○熱氣蒸面即浮腫眼閉用炊布為末隨傳隨  
消蓋此物受湯上之氣多故用此引出湯毒亦須搗水

取味鹹以類相感也  
蒸熨諸病○時疾熱瘡湯火瘡爛損傷折瘀血醋炒麥

血熨手足○風溼痺痛寒溼脚氣互易至汗出並良  
花火傷肌○生蘿葡搗塗子亦可

火燎成瘡○炒麩入卮子仁和油傳之○白糖燒灰粉之  
即燥易瘥○胡桃仁燒黑研傳○榆白皮嚼塗之

火瘡滅癩○赤地利末油調塗之  
火湯傷爛○生蘿葡搗塗子亦可○油調芙蓉末傳之

蟲獸傷門

犬咬傷毒○先以水洗至血止取屋簷滴下土傳上綿裹

之甚效○或用蚯蚓泥以盞研傳瘡去熱毒○或以苦  
酒和冬灰傳之○或以雄黃五錢麝香二錢為末酒下

作二服○虎犬傷人礬末納入裏之止痛尤妙  
狗犬咬傷○七日當一發三七日不發乃脫也急于無風

處以冷水洗淨即服韭汁一盞隔七日又一盞四十九  
日共服七盞須一百日忌食酸鹹一年忌食魚腥終身

忌食狗肉方得保全否則十有九死○狗犬咬人乾姜  
末水服二匙生薑汁服亦良并以姜炙熱熨之○本身

嚼爛杏仁塗之○並可嚼燕解其毒○凡狗咬成瘡白果  
仁嚼細塗之○以瓦松雄黃研貼即不發

蛇咬毒瘡○蛇虫諸毒毒蛇射工沙虱等傷人口噤目黑  
手足直毒氣入腹白蟻甘草等分為末冷水服二錢○

蛇咬蠍螫燒刀矛頭令赤置白礬于上汁出熱滴之立  
瘥此神驗之方也○虫蛇獸毒及蠱毒生明礬明雄黃  
等分于端午日研末黃蠟和丸梧子大每服七丸唵藥

虫獸傷

百七十三



王菩薩七通熱水送下○又經山寺僧為蛇傷一腳潰爛百藥不愈一遊僧以新汲水敷洗淨腐敗見白筋把乾以白芷末入磨麝麝香少許搽之惡水涌出日日如此一月平復○蛇牙入肉中痛不可堪者勿令人知私以芥葉覆其上以物包之一時折牙自出也○時珍曰治毒蛇咬歸整傷滿身洪腫發泡用黃荆嫩頭搗汁塗泡上洋盒咳處即消○宗爽曰有人被毒蛇所傷良久昏憤一客商以五靈子脂一兩雄黃五錢為末每服二錢酒調灌之立甦仍以淳傳咬處少頃復灌二錢痛止即愈是後有中蛇毒者用之咸効○凡蜈蚣蛇蠍毒重所傷急以小便洗出血以五靈脂末用口中唾頻頻塗之立愈○昏憤五靈脂雄黃各一錢酒灌之遂甦

蛇繞不解○熱湯淋之即脫

蛇纏入足○就合尿之便解

蛇沿入口○因熱取涼臥地上有蛇入口不得出者用力破蛇尾納生椒二三粒裹定須臾即自退出也

蛇入七孔○割母猪尾血滴入即出也

蛇骨刺人○毒痛鐵精粉豆許吹入瘡內

蛇傷手腫○新剖羊肚一個帶糞剖一口將手入浸即愈

重蛇咬傷○艾炙數壯甚良○紫菀搗汁飲以滓塗之

蛇咬傷○葵菜搗汁服之○小蒜搗汁服以滓專之

百虫咬傷○以燈火熏之出水妙○紫艸煎油塗之

草蜢傷○南方水痴似鼻涕聞人氣閃閃而動就人體成瘡惟以麝香珠砂塗之即愈此即草蜢也

蜂蠍螫○蠍有雌雄者痛在一處以并底泥封之乾則易雌者痛牽諸處以瓦溝下泥封之若無雨以新汲水從屋上林下取泥○縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩至醉良久酒化為水自瘡口出水盡仍塞瘡口甚妙○薄荷葉接貼之○半夏末水調塗之

毒蜂螫人○嚼青蒿封之即安○清油搽之妙○毒殺傷螫清醋急飲一二盃令毒氣不散後用藥○人尿洗之

蜘蛛傷人○雄黃末傅之○縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩至醉良久酒化為水自瘡口出水盡仍塞瘡口甚妙○仙經言蔓菁子九蒸九晒搗末長服可斷

穀長生蜘蛛咬者恐毒入內搗末酒服亦以油和傅之

出獸傷



蔓菁園中無蜘蛛是其相畏也

蝮蛇咬人○醋和石灰塗之  
蝮牛咬人○毒行徧身者蓼子煎水浸之立愈不可近陰

蜈蚣入腹○猪血灌之或飽食少頃飲桐油當吐出  
重刺螫人○或心嚼傳見鼓中有毛即產不見再敷見毛

為度  
蚯蚓咬人○毒如大風眉鬚皆落以石灰小浸之良○濃

煎鹽湯浸身數遍即愈  
九里蜂毒○皂莢鑽孔貼叮處艾炙孔上三五壯即安

蜂蟻叮螫○沙蜂叮殊砂水調塗之蜂蟻叮嚼鹽塗之  
虫蟻螫人○頭垢封之

蚕咬成瘡○咬毒入肉取芎汁飲之蜜調麝傳之  
壁鏡毒人○時珍曰壁鏡大如蜘蛛而形扁斑色入足而

長亦時蛻殼其膜色光白如繭咬人至死惟以桑柴灰  
煎取汁調白礬末傳之妙○必死白礬塗之

蜈蚣螫傷○蚯蚓泥敷之効○嚼鹽塗之或鹽湯浸之妙  
熊虎毒傷○虎犬傷人礬末納入裹之止痛尤妙○地榆

煮汁飲亦可為末傳之惟忌酒

虎狼傷人○水化沙糖一碗服並調乾姜末傳之  
虎爪傷人○先吃清油一碗仍以油淋洗瘡口嚼栗傳之

馬咬踏傷○鼠屎二七枚故馬鞍五寸燒研末猪脂調傳  
驢馬汗毒○白礬飛過黃丹炒紫等分貼瘡痛處

馬咬成瘡○馬齒煎煮食之○獨頭栗子研爛傳之  
猪咬成瘡○松脂鍊作餅貼之

猪咬成瘡○雄鼠屎燒灰油和傳之  
鼠咬成瘡○麝香末封之妙○備毛燒灰麝香少許封之

鼠咬成瘡○龜板骨髓壯骨各一斤燒研油調搽之  
人咬成瘡○久欲脫者瓶盛熱尿浸一夜○鼈甲灰傳之

人咬指爛○山中草木申稜上有石蛭着人足則穿凡入  
出行辟蛭○山中草木申稜上有石蛭着人足則穿凡入

肉中害人○但以臘猪膏和鹽塗足脛趾即不着人也  
蟻子咬瘡○蜀中小蚊名蚋子又小而黑者為蟻子微不

見與塵相浮上下者為浮塵子皆巢于蛇鱗中能透衣  
入人肌膚咬成瘡毒人極苦之惟搗楸葉傳之則瘡又

雲南烏蒙峽中多毒蛇鱗中有一黃蠅有毒咬人成  
瘡但勿搔以冷水沃擦鹽少許即愈此亦蟻之類

五獸傷 附治五獸 一百七十五



狐尿刺人○用熱蠟着瘡并烟熏之令汗出自愈

附治蟲獸

馬患諸病○白鳳仙花連根葉熬膏遇馬有病抹其眼四

馬出黑汗○水花乾酪灌之

馬反花瘡○將勾籐入數寸于小麥中蒸熟喂馬易肥

牛張欲死○巴豆二粒研生麻油三兩漿水半和灌之

六畜瘡蛆○桃竹筭搗碎納之蛆盡出

洗六畜瘡○蕎麥猪燒灰淋汁洗六畜瘡并驢馬躁蹄

與諸物食自然不飢長三四倍也○恭白桐葉梓葉飼

辟除壁虱○天茄葉鋪于席下次日盡死○以木瓜切片

鋪席下○時珍曰樟腦烟硝辛熱香竄去溼殺虫此其

所長故燒烟熏衣產席能辟壁虱與蛀虫○時珍曰

葛蒲末或葫藿末或揀花末或蓼末或燒木瓜烟黃蘗

烟馬蹄烟蟹殼烟皆可辟之

燒烟去蚊○五月取浮萍陰乾熏之○夜明砂鼈甲為末

燒烟亦碎蚊○駱駝屎燒烟殺蚊魚熏蚊化為水

渾身虱出○頭虱照首身而白身虱白着頭而黑又有虱

敗篋敗梳各以一半燒灰一半煎湯調末服瘡即從下

部出也○有人類生癩疥不可忍惟以火炙一醫剖之出

陰虱○陰毛中多生陰虱痒不可當肉中挑出皆入足而

扁或用好燒酒浸百部包擦之或銀硃熏之皆愈予眼見有

布簾辟蟲○護生草花布席下辟虫又辟蚊

宜○置饅饅骨于衣箱斷諸虫

附治虫獸



辟食尸○廣西南界有啖臘正食死人尸不可驅逐惟

挑燈辟蛾○釋家取薺莖作挑燈杖可辟蚊蠅以護衆生

林擒樹重○樹生毛重埋壘蛾于下以洗魚水澆之即止

禁鴉長寒○逐月且日取泥屋之四角及塞鼠穴一年鼠皆

絕迹○又清明日戊上土同狗毛作泥塗房戶內孔穴

犀解鳩毒○鳩似鷹而大壯如鴉紫黑色赤喙黑目頸長

七尺寸雄鳴則晴雌鳴則雨食蛇及椽實知木石有蛇

即為禹步以禁之須庚木倒石崩而蛇出也蛇入口即

爛其屎着石皆黃爛飲水處百虫吸之皆死惟得犀角

即解其毒○蕎麥糶作薦并燒烟熏之

中諸毒門

砒霜毒○以生菜豆五合搗粉入新汲水攪和絞汁飲之

磨水煩燥如狂心腹疼痛四肢厥冷命在須臾黑鈔四兩

分以藍根汁調服三五錢○桐油二升灌之吐即解毒

解砒毒○大皮煎湯二三盃服之即安○地漿鈔粉立解

金石藥毒○黑鈔一斤鎔化酒一升如此十餘次待酒

解金銀毒○葱白煮汁飲之○食金中毒已死取雞屎半

升水淋取汁一升服之○三服食金中毒已死取雞屎半

解丹石毒○丹石毒法于背及一切癰腫以鳳尾草根葉

二錢半酒一大盞煎服取下焦汁不惟下所服石藥兼

毒去瘡愈也如不飲酒則為末以新汲水服以知為度

油一匙含燕戒怒三七日○乾噉食後服葱薤汁一盞

解五石毒○胡豆半升搗研以水入合絞汁飲之即愈○

中諸毒

百七子七



中藥毒○生搗汁多服之立瘥  
 心間溫暖者乃熱物犯之  
 之○及煬毒煩懣不止用甘草  
 去滓○入黍米粉一兩白蜜三  
 日按古方稱大豆解百毒予  
 用甚驗乃奇如此事不可不知  
 定驗如反掌再加大豆汁其功  
 烏頭毒○不拘川烏草烏湯多  
 水亦可○雪下利不止食肉則愈  
 鍾乳石毒○煩熱渴滑石粉兩  
 石發動○頭痛口中乾大便赤  
 石末○從小便中煎汁服之○  
 雄黃毒○防已煎汁服之○凡  
 丹毒腫○痒○水○和蠅泥已  
 雞子白時時塗之不已遂手即  
 消○萱草根研汁服

解輕粉毒○口破者三年陳醬  
 臭腫貫眾黃連各五錢煎水入  
 角弓反張者扁豆浸胖搗取汁  
 解礪砂毒○伏胸毒壯蠟海螵蛸  
 蘿藦獨帶○卷栢羊蹄商陸將  
 解杏仁毒○食杏仁多致迷亂  
 湯服即解○黑錫煎湯服即解○  
 解射罔毒○在諸肉中有毒並用  
 毒及射罔○在諸肉中有毒並用  
 解○猪血飲之即解○大麻子汁  
 解藜蘆毒○鹽汁飲之○大錢  
 解狼毒○吐白沫身冷欲死者  
 閉口椒毒○吐白沫身冷欲死者  
 者煮蒜服之○京棗食之即解  
 解釣吻毒○釣吻葉與芹葉相似  
 八兩水六升煮三升每服五合  
 死以葱涕啖之即解

中諸毒

百北身八



解 荳蔻毒 ○ 菜中有水荳蔻葉圓而光誤食令人狂亂狀

仙 若中風或作吐煎甘艸湯服即解而光誤食令人狂亂狀

服 隨合發至百張出口漸大與肩齊如以小刀務之隨破

解 防花毒 ○ 防風煎汁飲之 此皆火盛性淫入過服之害也

解 巴豆毒 ○ 以萊菔湯冷服即愈 或芭蕉葉搗汁飲之利

中 鼠莽毒 ○ 缸豆煮汁飲即解 ○ 烏白根五錢搗水服之

解 楓菌毒 ○ 煮桂汁服 飲地漿即解

解 野芋毒 ○ 野芋與芋相似芋種三年不采成栝芋並能

解 野菌毒 ○ 因蛇頭毒氣熏蒸所 致用芫花研新汲水服

過一錢以利為度 ○ 欲死者飲糞汁一升即活 大豆汁飲之

無影者上有毛下無紋者仰卷赤色者並有毒殺人中

其毒者地漿及糞汁解之 ○ 凡煮菌投以薑屑飯粒若

解 野葛毒 ○ 已死者挾開口灌生雞子三枚須臾吐出野

葛乃甦 ○ 欲死者飲糞汁一升即安 白鴨血惟急取鳳凰

胎即雞卵抱末成雞者已成者不用研爛和麻油灌之

中 諸毒 ○ 伏龍肝末一雞子大永服即吐 ○ 薺芫根搗

末飲服方寸匕立瘥 ○ 治蠱毒存上用升麻吐之在

腹用鬱金丹下之或合二物服之不吐則下此方活人甚

多也 ○ 下血如雞肝晝夜不絕臍腑敗壞待死者以糞

荷葉蜜置病人席下勿令知之必自呼蠱主姓名也 ○

密取山豆根和水研服少許未定再服已禁聲者亦愈 ○

○ 吐下血如猪肝者茵草根糞荷葉各三分永四升煮

二升服即愈當自呼蠱主姓名也 ○ 時珍曰人頭面上

有光他人手近之如火熾者此中蠱也 用蒜汁半兩和

酒服之當吐如蛇狀觀三書所載則蒜乃吐蠱要藥

中 諸毒 ○ 蛇狀觀三書所載則蒜乃吐蠱要藥

百七十九



而後人鮮有知者○外台秘要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如姆指大水一升酒三升煮二升服之當下蠱虫即愈○小兒中蠱煎甘草服當吐出蛇蠱毒○飲食中得之咽中如有物嚥不下吐不出心下熱悶堯鈴一兩煎水服即吐出○大豆為末酒漬絞汁服半升○蛇蝎蠱毒大力子煮汁服○草蠱毒○此術在西良之西及嶺南人中此毒入咽欲死者用堯鈴苗一兩為末温水調服一錢即消化蠱出神効

挑生蠱毒○嶺南有挑生之害于飲食中行厭勝法魚肉能反生于人腹中而人以死則陰役其家初得覺胸腹或膽礮吐之若膈下痛即以此湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐則下李巽巖侍郎為雷州推官鞠獄得此方活人甚多也

中 飲食毒○未審何物卒急無藥只煎甘草薔薇湯入口便活○魚肉菜等毒苦參三兩苦酒一升半煎服取吐即愈○雄黃青黛等分為末每服二錢新汲水下

牛馬肉毒○甘草煎濃汁飲一二升或煎酒服取吐或下如渴不可飲水飲之即死○殺入者省頭草連根葉煎水服即消○馬肝及鞍下肉殺入古云食馬肝則其毒可知矣○東壁土末水服一錢即安○人乳飲之良六畜肉毒○東壁土末水服一錢即安○人乳飲之良

中 服半升日一夜血不止萎黃者胡萎子一升煮令發裂取汁冷服半升日一夜血不止痿黃者胡萎子一升煮令發裂

剝馬中毒○被骨刺破欲死以馬腸中粟屎搗傅以尿洗之○猪膏頓服亦可

中 猪肝毒○猪膏頓服亦可

解 肉脯毒○凡肉密器蓋過夜者為鬱肉屋漏沾着者為漏脯皆有毒搗韭汁飲之○藥毒脯毒凡野菜諸脯肉馬肝馬肉毒以頭垢棗核大含之嚥汁能起死人或自湯下亦可○漏肉脯毒人屎燒灰酒方寸匕

中諸毒

一百八十一



狗肉毒○食狗不消心下堅脹口乾痰熱妄語杏仁一升

自死肉毒○自死六畜有毒以黃蘗末水服方寸匕

諸鳥肉毒○生扁豆末冷水服之

嗽蛇牛毒○牛嗽蛇者毛髮向後其肉殺人但飲人乳汁

食鴉鴉毒○鴉鴉毒○甘草湯解之切水一斗煮一升服汗即瘥

食竹雞毒○竹雞多食半夏苗搗薑汁挾齒灌之遂甦也

食雞子毒○飲醋少許即消○消○取蒜一升煮食當吐出

食雉中毒○吐下不止用生犀角末方寸匕新汲水調服

小蝦蟆毒○小蝦蟆有毒食之令人小便秘澀臍下悶痛

解中鳩毒○氣欲絕者葛粉三合水三盞調服口噤者灌

食羊肉毒○時珍曰中羊肉毒者飲甘草湯則解

中魚蟹毒○橘皮去白煎湯飲之甚良

中鮮魚毒○食蟹即解

中諸魚毒○香蘇煮濃汁飲之良○大豆煮汁飲之○冬

黃鱔魚毒○食此魚犯荆芥能害人服地漿解之○時珍

曰凡食一切無鱗魚忌荆芥食黃鱔魚後食之令人吐

血惟地漿水可解○荆芥常用之藥相反如此特錄警戒

見一人立致于死荆芥常用之藥相反如此特錄警戒

解河豚毒即鯪魚○一時倉卒無藥急以清麻油多灌之

至死惟橄欖木煮汁能解之其木作舟楫撥着魚皆浮

出故知物有相畏如能解之今人煮河豚團魚皆用橄

欖乃知橄欖能治一切魚鼈之毒也○凡蟹未被

食蟹中知毒○乾蒜煮汁飲之○生藕汁飲之○凡蟹未被

霜甚有毒云食水葢所發人中不療多死也獨鰲獨

目兩目相向六足四足腹下有毛腹中有骨頭背有星

點足斑目赤者並不食有毒害人冬瓜汁紫蘇汁蒜

汁鼓汁蘆根汁皆可解之○振婦食之令子橫生

亂動風木香汁可解○中諸毒



誤吞水蛭。藍水染布。水皆取藍及石灰能殺。水蛭入腹。必生。平明視之。水不。有。人飲。醉。飲。田。中。水。誤。吞。水。蛭。胸。腹。脹。痛。而。黃。遍。鑿。不。効。因。宿。店。中。渴。甚。誤。飲。染。布。水。大。瀉。數。行。平。明。視。之。水。血。飽。則。散。處。苟。知。殺。也。○水。蛭。入。腹。必。生。飢。則。聚。唾。精。腹。以。飽。則。散。處。苟。知。殺。也。○水。蛭。入。腹。必。生。飢。則。聚。唾。精。洗。可。盡。也。如。酒。誘。之。取。一。盆。枕。耳。邊。聞。氣。可。自。出。諸。毒。重。傷。○青。黛。雄。黃。等。分。研。末。水。調。服。二。錢。當。利。出。水。中。毒。病。一。名。中。溪。一。名。中。涇。一。名。水。病。似。射。工。而。無。物。春。月。多。病。之。頭。痛。惡。寒。狀。如。傷。寒。二。三。日。則。腹。中。生。更。嚼。食。人。下。部。若。有。瘡。正。赤。如。截。肉。為。陽。毒。最。急。若。瘡。如。臍。注。下。不。禁。以。小。蒜。三。升。煮。微。熱。大。熱。即。無。力。以。浴。身。一。若。身。發。赤。斑。文。者。毋。以。他。病。治。之。也。搗。常。思。草。絞。汁。服。良。以。浮。萍。日。乾。為。末。飲。服。二。錢。亦。以。梅。葉。搗。汁。三。升。飲。之。取。知。母。根。搗。作。散。服。夏。月。出。行。多。取。其。屑。自。隨。欲。大。水。先。取。知。母。根。搗。作。散。服。夏。月。出。行。多。取。其。屑。自。隨。欲。大。水。先。

湯浴之。甚佳。○毒。蛇。溪。毒。沙。虱。射。工。等。所。傷。口。禁。眼。黑。手。足。強。直。毒。攻。腹。內。成。塊。遂。巡。不。救。蒼。耳。嫩。苗。一。握。取。汁。和。酒。溫。灌。之。以。厚。厚。傳。傷。處。○獨。頭。蒜。切。三。分。厚。貼。上。炙。之。蒜。氣。射。入。即。瘥。者。以。雞。腸。草。搗。塗。之。和。酒。厚。塗。之。半。日。痛。即。止。○成。瘡。者。以。雞。腸。草。搗。塗。之。和。酒。厚。塗。之。東。川。多。溪。毒。養。鷺。以。辟。之。毛。羽。亦。佳。并。飲。其。血。鷺。未。必。食。射。工。蓋。以。威。相。射。工。蟻。一。物。也。飛。則。域。沉。蟻。即。射。工。也。又。云。水。弩。短。孤。射。工。蟻。一。物。也。馬。汗。毒。氣。○入。腹。葶。藶。子。一。兩。炒。研。水。一。升。浸。湯。服。取。下。蝮。牛。咬。毒。○毒。行。徧。身。者。蓼。子。煎。水。浸。之。立。愈。不。可。近。陰。花。蜘蛛。毒。○咬。人。與。毒。蛇。無。異。用。野。繖。絲。即。道。人。頭。搗。汁。一。盞。服。仍。以。渣。傳。之。○或。飲。以。靛。青。汁。即。解。因。蜘蛛。投。中。蜈。蚣。毒。○舌。脹。出。口。是。也。雄。雞。冠。血。浸。舌。并。咽。之。中。沙。虱。毒。○帶。雄。黃。入。山。即。不。畏。蛇。若。蛇。中。入。以。少。許。敷。之。登。時。愈。吳。楚。之。地。暑。溼。鬱。蒸。多。毒。虫。及。射。工。沙。虱。之。中。諸。毒。



類但以雄黃大蒜等分合搗一丸佩之或已中者塗之亦良○沙虱在水中人澡浴則着人身鑽入皮裏初得毒者入骨殺人嶺南多此即以茅葉刮去以後寒熱發瘡之佳○萬莖菜搗汁塗之良沙虱水陸皆有之雨後人晨暮踐沙必着人如毛髮刺人便入皮裏可以針挑取之不挑入肉能殺人凡遇有此虫處行還以火灸身則虫隨火而去也

中諸毒○口乾狂言渾身壯熱寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合四面溼土搗起經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米糕丸彈子大蜜水磨下○一切食毒縮砂仁末水服一合服之須臾吐利自出○熱悶欲死新糞汁水和服或乾者燒末漬汁飲名破棺湯

解諸菜毒○發狂吐下欲死用雞屎燒末水服方寸匕○凡野菜諸脯肉馬肝馬肉毒以頭垢棗核大舍之煎汁能起死人或白湯下亦可○小兒尿和乳汁服二升

中黃蠅毒○烏蒙山峽多小黃蠅生毒蛇鱗中蠱人勿無

所覺漸痒為磨勿搔但以冷水沃之擦鹽少許即不為

瘵

中葛莖毒○飲生姜汁即解○久食昏人目患冷人不宜食時珍曰蒿苣有毒百虫不敢近蛇虺觸之則目瞋不見物人中其毒以姜汁解之

中蒙汗毒○飲冷水即安

中藥良毒○一時暈倒不救殺人急以清水灌之

中藥箭毒○雉黃末敷之沸汁出愈○蘆根煮汁服煎生地黃汁作丸服至百日箭出○藍青搗飲并傅之無藍以青布漬汁飲○毒箭有三種交廣夷人用焦銅作箭鏃嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃此二種纔傷皮肉便洪膿沸爛而死若中之便飲糞汁并塗之惟此最妙又一種用射罔煎塗箭鏃亦宜此方

中斑蝥毒○玉簪根插水服之即解

解桐油毒○乾柿餅食之○嘔吐不止急飲熱酒可解

食中有虫○腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常用

十日即愈

中諸毒



金蠶蠱毒○吮白礬味甘嚼黑豆不醒者即是中蠶也石  
 榴根皮煎濃汁服即吐出活蠶無不愈者○金蠶能入  
 人腹殘齒腸胃完然而出如尸也如令兩刺蠶入其  
 家捕之必獲擒出金蠶甚毒若有鬼神惟蠶能制之  
 誤吞諸物○金銀銅錢等物不化者濃煎縮砂湯飲即下  
 誤吞鈎線○螻蛄去身吞其頭數枚勿令本人知之  
 誤吞金銀○羊脛骨每服五錢米飲下過夜其器即  
 隨大便取此巧哲格物之妙法也○胡粉一兩猪脂  
 調分再服令消洋出也○時珍曰羊脛骨灰可以磨錢  
 羊頭骨可以銷鐵故誤吞銅鐵者用之取其相制也漢  
 張忠女入歲吞金鑽一隻胸痛不可忍憂惶無措一名  
 監命服羊脛灰三錢次早大便取下  
 誤吞竹木○秤錘燒紅淬酒飲之○飴糖一斤漸食便出  
 誤吞針鐵○煮蚕豆同韭菜食之針自大便同出  
 誤吞鐵石○骨刺不下危急者王不留行黃蘗等分爲末  
 以三錢加青黛少許冷水調灌之○燒透檀炭帶紅研細  
 誤食銀銷○漸爛腸胃延日垂死以飴糖四兩蒸作丸不

時以麻油送下服完再合須服至百日外無患  
 誤吞銅物○多食胡堯萼葶自化出也胡堯與銅錢共食  
 即成粉可證矣○煉蜜服二升可出矣○羊脛骨燒灰以  
 誤吞鐵釘○多食猪脂令飽自然裹出○羊脛骨燒灰以  
 誤吞珠釵○雄白曝萎煮熟切食一大束釵即隨出○喫  
 在咽者銅弩牙燒赤納水中飲汁立愈  
 竹木入肉○白茅根燒末搗和塗之風入成腫者亦良  
 生地黃嚼爛罨之○竹木鍼刺在肉中不出疼痛以王  
 不雷行爲末熟服方寸匕兼以根傳即出○牛膝搗爛  
 罨之瘡口已合刺自出○不出頭垢塗之即出  
 箭鏃入肉○括萎根搗傳之○日三易自出○痛因俟死但  
 以寒食錫點之即滅痛楚○半日瘡痒用力一鉗而出○  
 不可拔出者用新巴豆仁○畧熬與蟻蜋同研塗之斯須  
 痛定微痒忍之待極痒不可忍便據振動之取出速以  
 生肌膏傅之○乾羊屎燒灰猪脂和塗不覺自出○真  
 象牙刮末水煎之即出也  
 箭鏃入骨○巴豆微炒同燒  
 中諸毒 蝦搗塗斯須痛定微痒忍之  
 一百八十四



待極痒不可忍乃撼動拔處之立出出後以生肌膏傅之

刀箭在肉咽喉胸膈諸隱處不出酒服瞿麥末方寸匕

箭鏑在咽或刀刃在咽膈諸隱處不出酒服方寸

針刺入肉三服至二十日自出

針刺入肉卽拔去藥恐藥緊急弩出好肉如加白梅

針刺在咽以錢粘人指甲末用酸棗搗爛塗之次可定也

惡刺傷人不出者咀菜黃封之骨當腐出諸鉄及雜

水銀入肉令人筋攣惟以金物熨之冰銀當出館金候

葦刺入肉生嚼粟子敷之以金色不自爲康

誤吞相芒白錫頻食

狼烟入口以醋湯飲之

皮膚中一切惡毒名癩症用醋和燕窠土傅之

除一切惡毒濃煎菜服湯飲之暑月恐有人汗尤宜慎之

解木耳毒搗冬瓜藤汁服

食柿蟹毒一人食蟹又多食紅柿至夜大吐繼之以血

中諸毒

過食白果多成風醉以陳白養頭煎湯服一二二次立愈

中麥毒或飲生薑薑汁或服用生蒜搗爛和酸食亦解

中鈎吻毒此物生池旁與芹菜相似惟莖有毛以此別

服之誤食殺人急灌米泔水幾碗飲生黃豆漿亦可勢危

灌下可解多有得生者







疹癩斑癬門

風疹癩癬 ○ 鋪鐵磨水塗之 ○ 赤小豆荆芥穗等分為末  
 雞子清調塗之 ○ 不能忍者赤土末空心酒服一錢  
 赤癩如瘡 ○ 癩癬甚則殺人於羊角磨水摩之數百遍外  
 癩癬入腹 ○ 體重舌強車前子好酒調下有效  
 遊風癩癬 ○ 以楮葉抄動用塊泥二兩百合五錢黃丹二  
 火丹癩癬 ○ 以略和煖煮熱摩之即消  
 一切風癩 ○ 葫蘆煮湯和少酒塗之無不瘥  
 赤遊風癩 ○ 芭蕉煎酒搗爛塗之良  
 赤癩 ○ 山冷溼傳子肌中甚則為熱乃成赤癩天熱則據  
 冷則減是也用蛇銜草搗極爛傳之即瘥  
 風氣癩癬 ○ 遍身風癩生瘡疥用茵陳煎濃汁洗之立愈  
 即止 ○ 乾壁土末傅之隨手愈 ○ 菜豆粉二兩滑  
 癩子癩癬 ○ 乾壁土末傅之隨手愈 ○ 菜豆粉二兩滑

石一兩和勻撲之 ○ 臘雪水抹癩亦良  
 皮膚風癩 ○ 蟬蛻薄荷等分為末酒服一錢日三服  
 身上虛癩 ○ 浮萍一錢以黃芩一錢同因物湯煎湯服  
 赤癩丹毒 ○ 無名異末葱汁調塗立消  
 癩癬風病 ○ 白色成片以布拭醋摩硫黃附子塗之或硫  
 黃白礬擦之 ○ 先以皂莢湯洗次以茵陳蒿湯洗之  
 身體白駁 ○ 蛇脫灰醋調塗 ○ 生頭面上漸長似癩者刮  
 令燥痛炙熱脂油擦之酒日飲三度即瘥  
 白癩風癩 ○ 醋磨知母擦之酒日飲三度  
 紫癩風癩 ○ 醋磨知母擦之酒日飲三度  
 白癩風癩 ○ 醋磨知母擦之酒日飲三度  
 合一月三服至五斗癩忌生冷猪雞魚蒜等百日 ○ 秋  
 白癩癩癬 ○ 遍身者小拘橘細切麥麸炒黃為末每服二  
 錢酒浸少時飲酒初以拘橘煎湯洗患處  
 平易方卷三 一百八十七



汗斑癩風○端午日收紫背浮萍晒乾每以四兩煎水浴  
 并以其藥擦之或入酒內防已二錢亦可  
 野毒斑點○蜜陀僧二兩細研入乳調夜塗旦洗  
 赤白癩風○貝母南星等分爲末生薑帶汁擦之○桑枝  
 十斤益母草三斤水五斗漫熬至五升去滓煎成膏每  
 臥時溫酒調服半合以愈爲度○猪胆一具酒浸一時  
 飯上蒸熟食不過十具愈  
 夏月汗斑○如疹用蜜陀僧八錢雄黃四錢先以姜片擦  
 熱仍以姜片蘸末擦之次日卽焦○夏枯草湯目洗之  
 身面癩瘡○搗桃葉取汁擦之○生白果仁頭擦取効  
 眉鍊癩瘡○小麥燒存性爲末油調傳○小兒面癩瘡乃  
 母受胎時食酸辣邪物所致用百藥煎五錢生白礬二  
 錢爲末油調塗之  
 牛皮頑癩○烟膠三錢寒水石三錢白礬二錢花板一錢  
 半爲末臘猪脂調搽○樸硝醃生鹽皮燒灰油調搽之  
 更癩瘡痒○藜蘆末生油和塗○清晨露水絲瓜葉七  
 片逐片擦七下如神忌雞魚發物○川槿皮煎入肥皂  
 浸水頻擦之或以槿皮浸汗磨雄黃九妙

楊梅瘡癩○水萍煎汁浸洗半日數日一作  
 荷葉瘡癩○巴豆仁三箇連油許包擦日二次二日愈  
 梅花禿癩○清油一碗以二小竹子燒火入內煎沸猪胆汁  
 一箇和勻刺頭後擦之○二三日卽愈勿令日晒  
 一切癩○五倍子去虫白器燒過等分爲末搽之乾油調  
 瘡癩淨傳之立乾便瘰  
 乾淫癩瘡○生痴搔之黃水出逢陰雨卽痒很毒末塗之  
 漏癩淫癩○浸淫日願痒不可忍愈後復發出黃水羊蹄  
 根搗和醋洗淨塗上一時以冷水洗之日一次  
 血熱生癩○地黃汁頻服之湯用肥皂去核及內膜浸湯時  
 癩瘡年久○以川槿皮煎醋浸露一宿搽之  
 時癩瘡○用斑蝥七個醋浸露一宿搽之  
 下體癩瘡○船船灰牛糞燒烟熏之一日一次卽安  
 風癩疔瘡○梓葉木棉子羯羊屎鼠屎等分入瓶中合定  
 燒取其汁塗之  
 風癩入腹○身體強舌乾硬用蔓菁子三兩爲末每溫酒  
 服一錢

疹癩 斑癩 癩癩 一百八十八



瘰癧門 瘰癧贅疣附

項下氣瘰。○自然銅貯水。○中逐日飲食皆用此水。其瘰  
 自消。○針砂入水缸中。○浸之。飲食皆用此水。十日一換。  
 砂半年自消散。○瘰癧氣。○初起海藻。一兩黃連。二兩為末。  
 時時甜燕。先斷一切厚。○味。○其囊漸大。欲成瘰者。昆布。  
 海藻等分。為末。蜜丸。核。○桃。○大時。時含之。○燕汁。  
 瘰癧結核。○鉛。○三兩。鐵器。○炒。○取。○黑。○灰。○醋。○和。○塗。○上。○故。○帛。○貼。○之。  
 頻換。去。惡。汁。如。此。半。月。○不。痛。不。破。內。消。為。水。而。愈。○年。  
 久。瘰。癧。生。元。參。搗。傅。之。○日。○工。易。之。○野。菊。花。根。搗。爛。煎。  
 酒。服。以。滓。傅。之。自。消。不。消。亦。自。破。也。○連。翹。脂。麻。等。分。  
 為。末。時。時。食。之。○訛。花。○馬。齒。莧。同。搗。日。日。塗。傅。取。效。○  
 白。僵。蚕。為。末。水。服。五。分。○日。三。服。十。日。瘰。  
 瘰癧潰爛。○如瘡爛破者。用荊芥根下一段。剪碎煎沸湯。  
 溫洗。良久。看爛破處。紫。黑。以。鐵。刺。去。血。再。洗。三。四。次。  
 愈。用。樟。腦。雄。黃。等。分。為。末。麻。油。調。掃。上。出。水。次。日。再。洗。  
 再。掃。以。愈。為。度。○冷。飯。團。切。片。或。為。末。水。煎。服。或。入。粥。  
 內。食。之。須。多。食。為。妙。江。西。所。出。白。色。者。良。忌。鉄。器。發。物。

○牛皮油鞋底。○堯天蘇。○用調傅之。○土牆上。○白螺螄殼。

為末。○日。○傅。之。

鼠瘻瘰癧。○用猪膏。○淹。○生。○地。○黃。○煮。○六。○七。○沸。○塗。○之。○五。○白。○散。

白牛屎。○白馬屎。○白羊屎。○白猪屎。○白雞屎。○各一升。○於石上。

燒。○灰。○扇。○蘆。○末。○二。○而。○以。○猪。○膏。○一。○斤。○煎。○亂。○髮。○一。○兩。○同。○熬。○五。○六。

沸。○塗。○之。○神。○驗。○治。○鼠。○瘻。○有。○核。○濃。○而。○用。○熱。○牛。○屎。○封。○之。○日。○三。

○新。○鼠。○屎。○一。○百。○粒。○收。○窰。○器。○中。○五。○六。○日。○杵。○碎。○即。○傅。○之。○効。

瘰癧不斂。○乾。○姜。○為。○末。○姜。○汁。○打。○糊。○和。○作。○劑。○以。○黃。○丹。○為。○衣。○每。

日。○隨。○瘡。○大。○小。○入。○藥。○在。○內。○追。○膿。○盡。○生。○肉。○口。○合。○為。○度。○如。○不。○合。

以。○葱。○白。○汁。○調。○大。○黃。○末。○搽。○之。○即。○愈。

風。○毒。○瘰。○癧。○赤。○腫。○地。○菴。○搗。○傅。○乾。○即。○易。○之。

熱。○毒。○瘰。○癧。○小。○芥。○子。○末。○醋。○和。○貼。○之。○看。○消。○即。○止。○恐。○損。○肉。

瘰癧瘰癧。○小。○芥。○子。○末。○醋。○和。○貼。○之。○看。○消。○即。○止。○恐。○損。○肉。

和。○傅。○之。

瘰癧疔瘡。○發。○背。○諸。○腫。○紫。○花。○地。○可。○根。○去。○粗。○皮。○同。○白。○炭。○藜。○為。

末。○油。○和。○塗。○神。○効。

瘰癧惡瘡。○及。○軟。○癩。○用。○白。○膠。○香。○一。○兩。○瓦。○器。○溶。○化。○去。○滓。○以。○莖。

麻。○子。○六。○十。○四。○個。○去。○壳。○研。○膏。○溶。○膠。○投。○之。○攪。○勻。○入。○油。○半。○匙。○投。

瘰癧。

瘰癧。

瘰癧。

瘰癧。

瘰癧。



至點水中試軟硬添減膠油得所以辨帛量瘡大小攤  
 貼一膏可治三五疔也  
 瘰癧喉癰○攻痛生肉陸浪為作餅置瘰癧上以艾炷于上  
 灸三四壯良  
 男婦瘰癧○瘰癧不拘已破未破用牡蠣四兩甘草一兩  
 為末每食後用臘茶湯服一錢其効如神  
 蛇盤瘰癧○頭項交接者海藻菜以蕎麥炒過白僵蚕炒  
 等分為末以白梅泡湯和丸梧子大每服六十九丸米飲  
 下必泄出毒氣  
 內消瘰癧○不拘大人小兒經久不瘥用斑蝥一個去翅  
 足微炙以漿水一盞空腹吞之用水亦可重者不過  
 七枚瘥也  
 贅瘡焦法○甘草煎膏筆粧瘡之四圍上三次乃用芫花  
 大戟甘遂等分為末醋調別以筆粧其中勿近甘草次  
 日縮小又以甘草膏粧小瘡三次如前仍上此藥自然  
 焦縮  
 項下結核○或赤腫硬痛以生山藥一挺去皮苧麻子一  
 個同研貼之如神

痰癆結核○南星膏治人皮肌頭面上生瘡及結核大者  
 如拳小者如粟或軟或硬不疼不痒宜用此藥不可輒  
 用針灸生天南星大者一枚研爛滴好醋五七點如無  
 主者以乾者為末醋調先用針刺令氣透乃貼之覺痒  
 則頻貼取効  
 身頂粉癩○舊皮鞋底洗淨煮爛成凍子常食之瘡自破  
 如豆腐極臭  
 消癰○用麝肉或鹿肉剖如厚脯炙熱搗之可四灸四易  
 出膿便愈不除再以新肉用之  
 瘰癧洗瘻○石灰一兩熬系灰淋汁熬成膏刺破點  
 鼻外瘰癧○膿水血出蝨房灸研酒服方寸匕日三服  
 腋下癭癧○用長柄茶壺盧燒存性研末搽之以消為度  
 一府校老姬右腋生一癭漸長至尺許其狀如長瓠子  
 久而漸爛一方土煮以此法用之遂出水消盡而愈  
 身面疣目○礞砂礞砂鐵鏽麝香等分研搽三次自落○  
 杏仁燒黑研膏擦破日塗之○以猪脂搽之命血出  
 少許神驗不可加  
 耳癩疣目○黑雌雞膽汁塗之日三  
 癭癧



成體疔目○地膚子白礬等分煎湯頻洗

血痣潰血○一人舊有一痣偶抓破血出一線七日不止

手足疣目○鹽傳上以百舐之不過三五度瘥○蕪荳子採

黑子疣贅○續隨子熟時塗之自落

項下卒腫○其囊漸大欲成癭者昆布海藻等分為末蜜

項邊馬刀○屬少陽經用連翹二斤瞿麥一斤大黃三兩

甘草半兩每用一兩以水一盃半煎七分食後熱服十

餘日後灸臨泣穴二七壯六十日決効

海藻酒○治癭氣用海藻一斤絹袋盛之以清酒二升浸

之春夏二日秋冬三日每服二合日三酒盡再作其滓

曝乾為末每服方寸匕日三服不過二劑即瘥

瘰癧馬刀○不問已潰未潰或日久成漏用夏枯草六兩

水二鐘煎七分食遠溫服虛甚者則煎汁熬膏服并塗

患處兼以十全大補湯加香附貝母遠志尤善夏枯草

生血治瘰癧之聖藥也其草易得其功甚多

癰疽瘡瘍門

癰疽發背○一切初起腫毒疼痛臥眠不得人不能別者

取獨頭蒜兩顆搗爛麻油和厚傅瘡上乾則易之屢効

○凡是癰疽惡瘡腫核初起莫如艾炙之法勝于用藥

緣毒中隔上下不通必得毒氣發洩然後解散是以初

發未成以溼紙揭上先乾處是頭便用大獨頭蒜切如

錢厚時毒頂中以艾圓灸之三壯一易蒜片不計壯數

總以痛者灸至不痛不壞者灸至極痛為率此法一使

瘡不開大二使內肉不壞三使瘡口易合一舉而三得

之其効如神乃知方書無空言者即疣贅之類灸之亦

便成痂自脫但艾務須陳年并揉熟者若新艾與不揉

極熟有傷氣血不可以用至毒生于頭及項以上者切

癰疽瘡瘍



或乾研末以密調塗于腫處四圍中間留頭乾則頻換  
初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿  
者即膿出易斂妙不可言或加生赤小豆末尤妙但陽  
毒則可用若陰毒與貼骨癰等萬不可圍清涼膏只圖  
一時定痛莫如以艾火灸再服托補之劑以收全功

癰疽

初起不可忍野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以滓傳之  
○痛或根一握生薑一塊搗爛入好酒一盞絞汁熱服取

癰疽

汗以滓傳之即散一用大蘇代姜亦可  
○腫無頭赤小豆末野苧麻根酒和塗之毒即消散○

癰疽

用白芷紫金皮等分末酒調服外紫金皮木蠟赤  
芍藥等分酒調作籬藥○已成未成陳年水膠一片水  
漬軟當頭開孔貼之未有膿者自消已潰者膿自出  
癰疽腫毒○凡癰疽瘡瘍皆因氣滯血凝而致宜服香藥  
引氣通血常器云凡氣血聞香即行聞臭即逆瘡瘍皆  
由氣滯而血聚最忌臭穢與不潔等觸之毒必引蔓又  
凡疽疾多因怒氣而得但服香附子樂進食竟氣大有

効也獨勝散用香附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾  
為細末無時以白湯服二錢如瘡初作以此代茶瘡潰  
後亦宜服之愈後服至半年尤妙

石癰

癰疽堅硬○石癰如石堅硬不作膿者生商陸根搗擦之燥  
則易以軟為度亦治溼漏諸瘡○赤小豆五合納入酒

癰疽

中五宿炒研以苦酒調塗即消○蛇脫皮貼瘡宿即愈  
癰疽不破○苦酒和雀屎如小豆大傅塗頭上即穿

癰疽

癰疽已潰○芫花根皮搓作然插入則不生合令膿易竭  
陰疽不發○陰疽腫毒並宜草烏頭南星等分少加肉桂

癰疽

為末姜汁熱酒調塗未破者能內消久潰者能去黑爛  
二藥性味辛烈能破惡塊逐寒熱澀冷即消遇熱即潰  
腸癰○小腹痛腫痛小便似淋或大便難澀下膿用甜瓜子

癰疽

半煎一盞食前一兩蛇退皮一條吹服○大棗連核存性百  
藥煎等分為末每服一錢溫酒調服○日去一取効  
異疽似癰○血少者異膿如小豆汁今製之不過二三度

癰疽

平易方卷三  
癰疽瘡瘍



癰疽寒顛○乳香五錢熟水研服顛發守其乳香能入脾

脇疽見藏○用小便豆莖根為末永調塗之天芋根末尤佳

潰疽便閉○以鹽摩其四圍即止

癰疽瘡癢○紫草枯萎實等分新汲水煎服

身面石疽○藜蘆二分附子八分為末密水調傅之

癰疽惡疽○狀如瘰癧而皮厚殺子搗帶青由是緩頭各

或肩一舌毒深穿孔男則多發于腹女則多發于乳或項

發背初起小便不通其毒更服童尿落滌餘邪乃可得安

瘡瘡有虫○窺見腸胃百方不瘥者以豉炒日太陽未升

○雞肫黃皮同綿絮焙末擦之即愈

○陳蘆葉為末以葱湯洗淨傅之

癰疽發背○用小豆莖根為末永調塗之

瘡瘡○紫草枯萎實等分新汲水煎服

癰疽惡疽○狀如瘰癧而皮厚殺子搗帶青由是緩頭各

或肩一舌毒深穿孔男則多發于腹女則多發于乳或項

發背初起小便不通其毒更服童尿落滌餘邪乃可得安

瘡瘡有虫○窺見腸胃百方不瘥者以豉炒日太陽未升

○雞肫黃皮同綿絮焙末擦之即愈

○陳蘆葉為末以葱湯洗淨傅之

癰疽發背○用小豆莖根為末永調塗之

瘡瘡○紫草枯萎實等分新汲水煎服

癰疽惡疽○狀如瘰癧而皮厚殺子搗帶青由是緩頭各

或肩一舌毒深穿孔男則多發于腹女則多發于乳或項

發背初起小便不通其毒更服童尿落滌餘邪乃可得安

瘡瘡有虫○窺見腸胃百方不瘥者以豉炒日太陽未升

○雞肫黃皮同綿絮焙末擦之即愈

癰疽發背○用小豆莖根為末永調塗之

瘡瘡○紫草枯萎實等分新汲水煎服

癰疽惡疽○狀如瘰癧而皮厚殺子搗帶青由是緩頭各

或肩一舌毒深穿孔男則多發于腹女則多發于乳或項

發背初起小便不通其毒更服童尿落滌餘邪乃可得安

平易方卷三

癰疽瘡瘍

一百九十三



背初生一切癰疽皆治單用紫荆皮為末酒調縮住自然撮小不大內服柞木飲子乃救急良劑也柞木飲方

癰

腫毒氣○紫石英火燒醋淬為末生薑米醋煎傳之摩

癰

亦得○已潰未潰皆可調塗○外國神方療惡毒癰腫

癰

或連陰卵間疼痛急牽入小腹不可忍一宿即殺

癰

冬月用根用之起死回生神驗貼之則易之無生者研末水和

癰

腫瘰血○蛇銜膏云治癰腫瘰血產後積血耳目諸病

癰

牛嶺馬鞍瘡用蛇銜大黃附子芍藥大戟細辛獨活黃

癰

者不知即此膏否藤一兩則名龍銜膏也所謂連斷指

發背欲死○冬瓜截去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜末

乾即易平為止○人尿燒灰蠟和傳之乾即易

一破切之消石十二兩搗碎以紙數層密封安置淨處

乃下以磚承覆勿犯地氣至正月後取出紙兩重日

中曝之逐日如此至三四月成膏乃用每以酒調

半匙空腹飲之更以膏塗瘡口四圍覺冷如水瘡乾便

便癰膿血○白膠香一兩為末入麝香輕粉少許摻之

蝕爛癰腫○水煮秫根汁洗之木灰四斗桑柴灰四斗石

斗合飯灰五升及疥癩湯調濯甌中蒸一日取釜中沸湯七

消盡又剪五色絲投入消盡餅盛密收每以少許挑破

癰疽瘡癩瘡癩餅盛密收每以少許挑破

平易方卷三







背無名腫毒初發焮熱未破者取効如神用隔年小粉  
 愈久者愈佳以鎮江真陳米醋調成糊熬如黑漆瓷罐收  
 冷定研末以銀江真陳米醋調成糊熬如黑漆瓷罐收  
 之用時難能上剪孔貼之即如冰冷疼痛即止少頃覺  
 痒乾亦不能動久則腫毒自消藥力亦盡而脫落甚妙  
 此方蘇州杜水菴所傳屢用有驗藥易而功大濟生者  
 宜收藏之

癰疽疔毒  
 狀類傷寒不問老幼虛實服之未成者內消已成者即  
 潰忍冬葉黃芪各五兩當歸一兩甘草入錢為細末每  
 服二錢酒一盞牛煎一盞隨病上下服日再服以滓傳

骨  
 之  
 成癰連年累月至子終身成癰疾者土萆薢一兩有熱  
 加芩連氣虛加四君子湯血虛加四物湯永煎代茶月  
 餘可安

疔毒  
 木此極毒之瘡也急用針刺破擠出惡血候血盡口噙

涼水吮之水温再換吮之痛痒皆住此外法也○刺四  
 邊及中心以雄黃末傅之神効  
 癰疽惡毒○內中忽生一黯子大如豆粟或如梅李或赤  
 或黑或白或青其脈有核其核深硬應心能爛筋骨毒  
 入臟腑即殺人但飲葵根汁可折其熱毒○生手足肩  
 背膿繫如赤豆剝淨以猪膽塗之○喜着十指狀如代  
 指根深至肌能壞筋骨毒氣入臟殺入宜燒鉄烙之或  
 炙百壯日飲犀角汁取瘡近見老人年七十餘患發背村  
 老  
 人發背○薛荔治背瘡近見老人年七十餘患發背村  
 中無藥急取薛荔葉爛搗絞汁和蜜飲數升以滓傳  
 之後用他藥急取薛荔葉爛搗絞汁和蜜飲數升以滓傳  
 疔  
 腫初起○二仙散用生礬黃丹臨時等分以三稜針刺  
 加待盡傅之不過三上决愈○疔腫垂死菊花一握搗  
 汁一升入口即活此神驗方也冬月採根○一切無名  
 腫毒用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以滓傳之○  
 生薺芫根搗汁服之合以滓傳之○  
 腫惡瘡及黃胆慈菇連根同蒼耳草等分搗爛以好酒  
 一鐘濾汁温服或為末每酒服二錢○危困者用蒼耳

下易方卷三



根葉搗和小兒尿絞汁合服一升其效亦效○末問已潰未潰或

初起發熱用金銀花連莖葉自然汁半盞煎入分服之

以澤傳上敗毒托裏散氣和血其功獨勝○已薦者三

片瘡惡腫○赤根疔腫白粉蒸黑和蜜傅之○已薦者三

服即愈輕者一服立効用蜂房一個蛇蛻一條黃泥固

濟煨存性為末每服一錢○空心好酒下少頃腹中大痛

痛止其瘡已化為黃水矣○牡豬屎尿水絞汁服三合瘡

魚臍疔瘡○四面赤中央黑瞿麥燒灰和油傅之甚佳○

而然用臘猪頭燒灰雞卵白調傅五日數易即愈

疔腫傷風○作腫以馬屎炒熨瘡上五十遍極効

疔瘡黑凹○用髮繩扎住將尖葉薜荔搗汁和蜜一盞服

之外以葱蜜搗傅四圍

疔瘡發汗○千年石灰炒十分舊黑傘紙燒灰二分每用

一小匙先以蠶水些少次頃香油些少入水攪勻沸湯

一盞調下厚被蓋之一時大出汗出也

暗疔昏狂○瘡頭凸紅栢樹皮根經行路者取二尺許去

皮搗爛并華水調一盞服待為過以一角銀杏仁浸油

十三種疔○用緋繪一片裹葯牛黃一錢子大及鈞棘針

乃鋪牛黃等末捲作團以髮束定熨斗中炒令沸定刮

馬疔腫毒○穿山甲燒存性貝母等分為末酒調服三四

水疔暗疔○水疔色黃麻木不痛暗疔瘡凸色紅使人昏

狂疔先刺四畔後用銀杏去壳浸油中年久者搗會之

雌雄疔瘡○鐵粉一兩蔓菁根三兩搗如泥封之日二換

發久則肢體拘攣變為癰漏延綿歲月竟至廢薦惟復

土草薛三兩或加皂莢牽牛各一錢水大盃煎三盃分

三服不數劑多瘡○惟忌飲茶及牛羊肉燒酒

法麩房勞○藍葉搗傳之良○生百谷搗塗一二日即安

癰疽瘡瘍



○蓮蓬壳燒存性研末并泥調塗神効○無名異末服  
 黃水肥瘡○官粉煅過桐油調之○雞子黃熬油搽之甚妙  
 為木香油二兩熬膏傳之○調作隔紙貼之○蛙脚廉瘡乾  
 廉瘡○用胡粉煅過桐油調之○宿其更自出神効○陳艾五  
 馬齒○用研末蜜調傳上○一宿其更自出神効○陳艾五  
 錢青布捲作一大炷○點火熏之熱水流數次愈  
 廉瘡熱瘡○黃藥末一炷○兩輕粉三錢猪胆汁調搽之或只  
 用蜜炙黃藥末猪胆淨拭乾以馬昆勃末傳之即愈○  
 廉瘡不飲○葱鹽湯洗艾葉燒烟熏之○血竭末傳乾為度  
 廉瘡以紙隔貼之○水妙亦治楊梅瘡及虫咬  
 諸般瘡○以紙隔貼之○塵二條差地蚯蚓泥少許生蜜和  
 搥餅如錢大陰乾○用蜜水調頻敷之○拔重止痛荷  
 葉中蒂如錢者不拘○多煎湯沸洗拭乾以飛過寒水  
 石同臘猪脂塗之○治癰痛炸木飲方中亦用之○清  
 公英鴉爛貼○廉瘡又○金瘡湯火等瘡用黃蠟一兩香油  
 二兩黃丹半兩同化開頓冷瓶收攤貼

惡瘡似癩○十年不瘥者全蠅一條者以白艾蒿十束煮汁搽之日三度○  
 惡瘡見血○青布和蠟燒烟筒中熏之○糯米粉和鹽嚼塗之  
 惡瘡防○雄黃末醋調傅之○糯米粉和鹽嚼塗之  
 蛇纏惡瘡○人不識者取桃皮作屑納之○牛夕根搗傅之  
 卒得惡瘡○皮煎汁入少盞頻洗之○牛夕根搗傅之  
 柳葉或皮○水煎汁入少盞頻洗之○牛夕根搗傅之  
 惡瘡近死○取赤小豆七粒在東官時患炸腮命道士贊  
 寧治之○取赤小豆七粒在東官時患炸腮命道士贊  
 亮后患惡瘡○近死尚書七粒為末傳之而愈○中貴人任承  
 小豆也○予苦脇疽既至五臟醫以葯治之甚願勿復言有  
 得此赤小豆也○脇疽既至五臟醫以葯治之甚願勿復言有  
 僧發背如爛瓜○鄰家乳某用此治之如神○此葯治一切  
 癰疽疔瘡○乾則難揭入○芋根末即不粘○此法尤佳  
 惡瘡痲痺○烏癩風瘡○烏癩疔瘡○直瘡癩瘡○黃粉醋和雞子黃調塗之○亦妙  
 烏癩風瘡○烏癩疔瘡○直瘡癩瘡○黃粉醋和雞子黃調塗之○亦妙



癩淫瘡五倍子末津調塗之○大復皮生者或乾者連全皮勿傷動以酒浸之慢火熬乾為末臘猪脂和傳

風癩○十年陳石灰研搽痛即止瘡即愈神驗○風瘡疥癩生括蕒二個打碎酒浸一日夜熱飲○陳菜子油同穿山甲末熬成膏塗之即愈

骨疽○一名多骨瘡不時出細骨以蜜陀僧末桐油調勻攤貼之即愈○愈而復發骨從孔中出者燕菁子搗傳之用帛裏定一日易之○榭皮燒研米飲方寸匕○骨從孔中出掘地作坑口小裏大以乾雞屎同艾及荆葉搗碎入坑燒烟出以疽口熱薰以衣擁之勿令洩氣熏

惡瘡不愈○因服隱藥致成結毒終身不愈紅棗三斤杉木作薪煮棗其火逐次鉗出悶炭棗爛去皮核以杉木炭磨末和棗搗丸彈子大每日任意食上茯苓湯過下

燻瘡殺癢○乳妬癰并黃爛熱瘡疥癬陰腫並用天麻草濃煎洗之可殺痒○地丁蒼耳葉搗爛酒攪汁服發背散血○槐花菜豆粉同炒象牙色研末用細茶煎露

諸般瘡毒門

疔瘡麻毒○時珍曰外台言生疔腫人忌見麻勃見之即死者用胡麻針砂燭燼為末醋和傅之不知麻勃與疔

何故相忌亦如人有見漆生瘡者此理皆不可曉

拔疔秘方○鱈魚鱗用一手括下不可見水陰乾收貯用

以銀針撥開疔頭將一片貼上以清涼膏蓋之俟一宿

揭開其疔毒連根拔出一後用丹收口○常年收取為妙

疔瘡走黃○患疔食肉走黃急搗芭蕉根汁服之立炭研

紅絲疔○急用針挑斷其絲將多年糞坑上碎木煨炭研末錫糖拌塗疔上雷出疔頭疔即按出無害若不急治

隔一日外恐難救治矣

翻疔毒○此少年唇口生疔並連七個頭腫如斗心悶

神昏鑿云此名七星疔如無玉以五穀一錢煨口流出黃水次日全愈并云如無玉以五穀一錢煨口

諸般瘡毒○不問已潰未潰或初起發熱用金銀花采花



連莖葉自然汁半盤煎入分服之以津傳上敗毒托裏  
 散氣和血其功獨勝○腫毒及傷寒遺毒發于耳之前  
 後及項下腫硬用見腫消草生白芨生白欵士大黃生  
 大薊根野苧根搗成餅入芒硝錢和貼雷頭乾即易  
 之若加金線重樓及山慈姑尤妙錢和貼雷頭乾即易  
 腫毒已破○青大麥去鬚炒暴花為末傅之成醫揭去又  
 腫毒入腹○雞舌香青木香薰陸香麝香各一兩水四升  
 煮二升分二服  
 諸腫有膿○棘針燒灰水服○錢一夜頭出  
 敷毒板毒○金銀藤大者燒存性葉焙乾為末各三錢大  
 黃煨為末四錢凡腫毒初發水酒調塗四隔雷心洩氣  
 瘡痛不穿○野百合同鹽搗泥傅之良  
 癰疽毒○潰爛疼痛用舊穢皮更炙熨之○家芥子末  
 同栝葉搗塗無不愈者大驗得山芥更妙○猪胆汁和  
 芥子末貼之日三上猪脂亦可  
 軟癰○癰毒已破益母草搗傅甚妙○癰子初起葛蔓燒  
 灰水調傅之即消○爛船底油石灰研末油調傅之

燕窩生瘡○非地蠅蟻屎米泔水和燉過入百艸霜等分  
 研末香油調塗之  
 白禿頭瘡○百草霜和猪脂傅之○雄黃猪膽汁和傅之  
 赤禿頭瘡○出膿盡開夜合馬蹄燒灰生油調塗  
 頭瘡熱瘡○風溼諸毒用五倍子白芷等分研末搽之膿  
 水即乾如已乾者以青油調塗  
 頭瘡生瘡○楸葉搗汁頭塗○白鴿屎五合醋煮三沸杵  
 傅之日三上  
 頭瘡之蛆出盡絕根  
 頭上肥瘡○一百五日寒日節取桃花為末食後以水半  
 盃調服方寸匕日三甚良  
 頭上癰癩○石灰入飯內搗爛合之  
 玉枕生瘡○生枕骨上如癰瘻後如筋頭用原蚕蛾炒石  
 韋等分為末乾貼取瘻  
 瘡疥○忌食熱物與火榆白皮末油和塗之重當出  
 身面瘡疥○發熱者不得食熱物不用火為使但着厚衣  
 煖卧取油一匙含燕屎怒二七日也○榆白皮末油和  
 諸般瘡毒



塗之虫當出

人疥馬疥○馬鞭草不犯鍊器搗自然汁半盞飲盡十日

疥瘡○石灰淋汁洗之數次○荆芥末以地黃自然汁熬

坐板芥瘡○梧子大每服得五丸○茶酒任下○藜蘆末油塗

疥不除根○滑石生脂麻嚼傅之○白蜜陀僧研末拍患處

碗豆毒瘡○未成膿者猪胆汁和芒硝末塗之○馬齒莧

燒研傅之須與根逐藥出不出更傅○豌豆如芥赤黑

蛇纏○起紅點者名紅蛇纏用机頭絲寸段煨存性麻油

馬調擦只三次即愈○馬毛入瘡腫入腹則殺人多飲醇酒至醉

頭末傳瘡口良久有黃水出即愈○馬氣入瘡或馬汗

馬毛入瘡皆致腫痛煩○燕窩中土和猪脂苦酒傅之○

蠅尿瘡○連身汁出以燕窩中土和猪脂苦酒傅之○

之無葉者敗醬汁塗之良○燕窩中土和猪脂苦酒傅之○

疼痛至甚者速以草茶煎蠟色青俱可以生油調傅藥至

痛乃止○蠅蝮而大若諸腰匝不可撩山中者溺毒更

人發瘡如熱癩而大若諸腰匝不可撩山中者溺毒更

翻花惡瘡○豆葉傅之即瘥○諸方大有治法○生反出用蒼耳

葉搗汁服三合并塗之○飯粒破○血出隨生反出用蒼耳

汁拂之或為末猪脂調搽極効○肉出如飯粒根深膿

浸淫瘡○發于腋下者不早治或殺人用胡燕窩中土研

末水和傅○凡毒得氣不攻身或赤痒以上下周匝

煩毒欲死此浸淫毒瘡也○早治或殺人用胡燕窩中土研

熱毒瘡○宗爽日○新羊屎絞汁塗之乾者燒烟熏之

諸般瘡毒○遍身生瘡痛而不痒手足尤甚







酒服取下重物並不損人食白粥兩三日服補氣葯數劑名神効散如血肢腫用針刺出水再服忌一切魚肉發風之物取下重油大小長短其色不一約一二升其病乃愈也○大風子油一兩苦參末三兩入少酒和丸梧子大每服五十九空心溫酒下仍以苦參湯洗之○取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鑑斤兩下姜汁于蜜中消之○又秤之令知斤兩即下蜜于鑑中緩火煎令蜜汁盡秤蜜一斤兩即藥已成矣患三十年癩者平旦服蜜許大丸一服溫酒下忌生冷醋滑臭物功用甚多不能一一具之○大風子燒麻油搽殼煎湯洗癩瘍風瘡○白色成片以布拭醋摩硫黃附子塗之或硫黃白礬擦之○茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以皂筴湯洗次以此湯洗之冷更作隔一日洗不然癩中生蛆○綠礬末摻貼即化為水○柳葉或皮水煎汁入少鹽頻洗卒得惡瘡○不可名識者○

惡瘡有重○久不愈者以柏枝節燒煙取油傳之二三五次愈亦治牛馬疥○一握以熱醋投入以封瘡上取効○桃手足癩瘡○生蘼一握醋和傳之○桃葉搗和苦酒傳之○燥溼癩瘡○荆木燒取汁一鐘入姜汁一匙和酒服以滓對口惡瘡○野苦蕒搗汁一鐘入姜汁一匙和酒服以滓瘡似蜂窩○愈而復發胡粉硃砂等分為末蜜和塗之○日久頑瘡○反花瘡漏瘡○不見搗爛封之取汁煎稠傳亦日封之○積年者馬齒不見搗爛封之取汁煎稠傳亦風毒熱瘡○遍身出黃水桂府滑石末敷之次日愈先以虎狀豌豆甘草等分煎湯洗後乃搽○蕓苔苗葉根蔓菁根各三兩為末以雞子清和貼之即消無蔓菁即以前商陸根代之甚効也○瘡子去龜二分合于瘡上即消肺風熱瘡○遍身皆是用苦參末粟米飲丸梧子大每服五十丸空心米飲下遍身瘡疥如癩及癩疹癢面上風刺婦人粉刺並用樽皮散主之瘡皮燒灰四兩枳殼二百○三



去穢燒四兩荆芥穗二兩炙甘草半兩各為末杏仁水

煮過去皮尖者日三服研泥爛研勻每服二錢食後溫酒調

下瘡疥甚者初起似癩瀼如水泡似火燒瘡赤色急速能

天火熱瘡。初起似癩瀼如水泡似火燒瘡赤色急速能

殺人。多向火。氣入內。黃芩。生瘡。其汁。淋滴。用黃蘗末

人。多。向。火。氣。入。內。黃。芩。生。瘡。其。汁。淋。滴。用。黃。蘗。末

時。氣。生。瘡。一。婦。人。病。此。人。無。議。者。用。此。而。愈。

天。蛇。頭。毒。金。絲。草。熱。鐵。漿。飲。之。無。議。者。用。此。而。愈。

碎。用。絕。好。醋。濃。煎。先。重。後。淡。五。葉。紫。葛。天。蕎。麥。等。分。切

入。蜜。內。籠。之。似。癩。非。癩。天。蛇。乃。草。間。花。蜘蛛。也。人。被

其。螫。為。露。水。所。濡。乃。成。此。疾。以。秦。皮。煮。汁。一。斗。飲。之。即

瘰。癧。末。猪。胆。汁。調。塗。上。用。蠟。一。條。燒。烟。熏。一。二。次。即。愈。或

多。年。惡。瘡。用。三。家。洗。碗。水。煎。沸。入。鹽。洗。之。不。過。三。五。度

停。上。不。過。三。兩。遍。便。瘡。不。瘥。痛。熨。不。已。者。並。搗。爛。馬。齒

遍。身。生。瘡。陰。囊。兩。脚。九。甚。者。草。烏。一。兩。鹽。一。兩。化。水。浸

一。夜。炒。赤。為。末。猪。腰。子。一。具。去。膜。煨。熟。竹。刀。切。搗。醋。梅

瘡。口。不。合。生。肌。肉。止。疼。痛。去。惡。水。寒。水。石。燒。赤。研。二。兩

黃。丹。半。兩。為。末。搽。之。名。紅。玉。散。一。切。皆。治。秦。芫。為。末

効。功。亂。髮。露。蜂。房。蛇。蛻。皮。各。燒。存。性。一。錢。用。溫。酒。食。前

調。服。神。妙。如。棠。梨。狀。每。個。出。水。有。石。一。片。如。指。甲。大。其

冷瘡。成。漏。明。礬。半。生。半。飛。飛。者。生。肉。生。者。追。膿。五。靈。脂

水。飛。各。半。錢。為。末。以。皮。紙。裁。條。唾。和。未。作。小。燃。子。香。油

瘡。後。有。些。小。血。出。煎。得。乾。水。住。藥。自。然。生。肉。全。好。

筋。骨。毒。瘡。因。患。楊。梅。瘡。服。輕。粉。毒。藥。成。者。野。薔。薇。根。白



皮洗三斤水酒十斤煮一炷香每酒任飲以愈為度。因患楊梅瘡服輕粉毒藥年久不愈者威靈仙三斤水酒十瓶封煎一炷香出火毒逐日飲之以愈為度。惡刺瘡痛。黑大豆煮汁飲之即瘥。李葉棗葉搗汁點

之効。瘡癰痛痒。初起者嚼塩頭擦之妙。姜黃末搽之妙。諸瘡弩肉。如蛇出教寸。硫黃末一兩肉上敷之即縮。其蝕惡瘡弩肉。用烏梅肉燒存性研傳惡肉上一夜去。

狐尿刺瘡。麴麥和獨頭蒜。如麥粒納瘡孔中虫出愈。杏仁研爛煮兩沸及熱浸之冷即易。腫痛熱膿着瘡并烟熏之令汁出即愈。棘人腫痛欲死破烏雞塌

之良。痛甚者熬白馬溺漬之。天柱毒瘡。生者大推上。大如錢赤色出水。驢蹄二片胡

粉熬一分麝香少許為末。醋和塗之乾即瘥之。服石發瘡。石燕子十個打碎。水三升煮一升。頻頻洗

以瘥為度。疼不可忍。用紙圈圍之中心填硝石令滿。以匙抄水淋之。覺不熱痛即止。

鬼頭瘡。貓兒毛燒灰膏和傳之。貓兒尿燒灰臘猪

脂和傳之。取小兒糞和臘猪脂傳之。瘡久成漏。忍冬草浸酒日日常飲之。五般瘡癰。非根炒存性搗末以猪脂和塗之。數度愈。

瘡氣嘔吐。菜豆粉三錢乾胭脂半錢研勻新汲水調下。諸般痔漏。久不結痂。用生姜連皮切大片塗白礬末炙

焦研細貼之。勿動。良。諸瘡久潰。絲瓜老根熬水掃之。大涼即愈。不愈者棗

傷寒。生下部者烏梅肉三兩炒為末。煉蜜丸梧子

大以石榴根皮煎湯食前下三十九。為末煉蜜丸梧子

錢半為末。槐花煎水調作餅貼于瘡口。上即愈。勝眼膏瘡。山藥沙糖同搗塗上。即消。先以麪塗四圍。乃

天口瘡瘡。比歲有病。天行斑瘡。頭皮及身。須與周匝狀

如火瘡。皆戴白漿。隨決隨生。不即瘥。數日必死。後瘡

諸般瘡毒。二百。五



斑點黑色一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽  
擊膏所得仍乎為膚瘡諸醫參詳療之取好蜜通摩瘡  
上以蜜煎升麻散匕拭之  
背上一腫如盤。水中曰石治背上忽腫如盤不識名者取  
一。二。三。起。或。芭蕉葉。中。顯。洗。之。立。瘡。  
波毒初起。或。消。或。破。皆。無。痕。也。  
貓眼晴瘡。身。面。上。破。瘡。似。貓。眼。有。光。采。無。膿。血。但。痛。痒。不  
常。飲。食。減。少。名。曰。寒。瘡。多。吃。雞。魚。葱。韭。自。愈。  
未。經。毒。瘡。南。方。多。雨。有。物。曰。木。蛭。大。類。鼻。涕。生。于。古。木  
瘡。之。上。則。通。氣。則。閃。閃。而。動。人。過。其。下。墮。人。體。間。即。立。成  
瘡。腫。無。頭。一。錢。研。勻。以。乳。砂。調。和。入。罐。中。待。乾。每。用。少。許。津  
調。傳。之。外。以。膏。護。住。毒。氣。不。出。不。能。為。害。也。  
諸。瘡。寒。熱。之。毒。瘡。及。六。畜。虫。瘡。鼠。李。生。搗。傅。之。  
腹。內。生。瘡。在。腸。膜。及。小。可。藥。治。者。取。皂。角。刺。不。拘。多。少。好  
酒。一。碗。煎。至。七。分。溫。服。其。膿。血。即。從。小。便。中。出。極。効。不

些。飲。酒。者。水。煎。亦。可。  
小。癰。疔。發。熱。時。節。用。粉。草。節。晒。乾。為。末。熟。酒。服。一。二  
錢。連。進。數。服。痛。熱。皆。止。  
火。疔。瘡。疾。此。患。急。防。毒。氣。入。心。腹。枸。杞。葉。搗。汁。服。立。瘥。  
潰。腫。排。膿。夜。明。砂。一。兩。桂。半。兩。乳。香。一。分。為。末。入。乾。沙  
糖。半。兩。井。水。調。傅。  
瘡。內。朽。骨。合。用。黃。整。置。石。膽。黃。丹。雄。黃。礬。石。慈。石。其。中  
燒。之。三。日。三。夜。其。烟。上。着。雞。羽。掃。取。以。注。瘡。惡。肉。破。骨  
則。盡。出。也。有。人。瘍。生。于。頰。連。齒。輔。車。外。腫。若。覆。瓶。肉。潰  
出。膿。血。痛。楚。難。忍。彌。年。不。差。人。令。依。法。燒。葯。注。之。少。頃  
朽。骨。連。牙。潰。出。遂。愈。信。古。方。攻。病。之。速。也。整。音。武。即。今  
有。益。瓦。合。也。  
消。蝕。惡。肉。臘。月。積。猪。糞。燒。存。性。一。兩。雄。黃。槓。榔。各。一。錢。  
為。末。敷。洗。  
人。面。惡。瘡。有。瘡。似。人。面。亦。無。他。苦。若。以。酒。滴。口。中。其。面  
赤。色。以。物。食。之。亦。能。食。多。則。膊。內。肉。脹。起。或。不。食。則。一  
臂。痺。焉。悉。無。所。苦。取。貝。母。末。用。竹。筒。灌。瘡。口。內。數。日。成  
痂。而。愈。載。在。類。篇。今。不。全。錄。諸。般。瘡。毒。  
二百。六



腫毒不化○胆攀磨雀屎各少許點之○疼痛不止山漆  
 磨米醋調塗即散已破者研末乾塗○不問硬軟取秋  
 葉十兩傅腫上舊帛裹之日三易之當重有毒氣為  
 水流存葉上若冬月取乾葉鹽水浸軟或取根皮搗爛  
 敷之皆效止痛消腫食膿血勝于眾藥○已成未成用  
 水膠一片水漬爽當頭開孔貼之未膿自消已潰膿出  
 趕毒散○一名神和散凡人環跳等穴處及兩膝附骨等  
 處感受風寒淫氣面上不熱漫腫無頭皮色不變惟覺  
 酸痛掣拘若不印治變生貼骨等難難以收功急用此  
 藥調搽兩用大蒜片艾火炙至知痛為妙用紫荆皮五  
 兩炒赤芍一兩炒香白芷一兩不可見火須曬燥石菖  
 蒲一兩亦須曬燥獨活一兩五錢炒共磨細末以好酒  
 和葱五莖煎滾調搽不必留頂一日一換雁消為度  
 天行斑疹○頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白頭不  
 急療治數日必死後瘡癩黑周年方退以蜜水通  
 搽瘡上再以蜜煎升麻拭之以蘆根湯煮粥食之  
 黃靈丹○癰疽大毒發背對口腐肉黑黯死肌堅硬臭穢  
 用此搽之膏藥蓋過夜即周迴裂縫與好肉分界膿流

肌活肉色轉紅疼痛稍緩腐肉化脫不用刀鉗剪割神  
 効無比生白礬六錢研枯白礬三錢研腰面雄黃水飛  
 淨一錢共研極細篩過再張于餘愈碾愈妙裝磁瓶內  
 勿使染塵凡去腐肉儘可用之若新肉上搽之要痛片  
 刻一見膿水溼氣即不痛矣凡生盤根牙癰毒串沿  
 滿口腐爛其牙床骨竟有通身一扇脫落者用桑皮紙  
 搽此藥在上捲作紙燃式塞于牙根邊久塞可保不腫  
 如遇飲食時可去藥條再換即日換數次亦無妨礙  
 燒烟注瘡○治緩疽惡瘡蝕肉其法取瓦盆一個安  
 黃于中丹砂居南慈石居北會膏居東白石英居西礬  
 石居上石膏次之鐘乳居下雄黃覆之雲母布于下各  
 二兩末以一盆蓋之羊毛泥固濟作三隅灶以陳葦燒  
 一日取其飛黃用之夫雄黃乃治瘡殺毒要藥也  
 下焦風毒熱瘡○青黛乃藍為之者有一婦人嗜酒食  
 魚蟹發風等物患臍下腹上下連二陰遍生溼瘡狀如  
 馬爪瘡痒而痛大小便溼出黃汁身面微腫以馬齒莧  
 四兩杵爛入青黛一兩再研勻塗之即熱減痛痒皆  
 去仍以八正散日三服之分敗客熱藥乾即上如此二  
 諸般瘡毒



日減五分之一五日減三分之二十日愈此蓋中下

焦蓄風熱毒氣也若不出當作腸癰內痔仍須禁酒色

發風物然不能禁後果患內痔

三十六風○結瘡馬齒一碩水一碩煮取汁入蜜蠟三

凍瘡裂○熱湯洗之○桐油一死髮一握熬化瓶收每

以溫水洗合軟傅之即安

瘡痕不滅○時珍曰一切瘡痕不滅用燕草燒灰鴈屎

白等分八乳和塗日三五次

知瘡所在○時珍曰雷氏炮炙論序云知瘡所在口點陰

膠注云取瓶口氣垢少許于口即知臟腑所起直徹

至患處知痛所在可鑿也

蠟磬丸○凡人病癰疽發背不問老少皆宜服黃磬丸服

至一兩以上無不作效最止痛不動臟腑活人不可

勝數用明亮白磬一兩生研以好黃蠟七錢溶化和丸

梧子大每服十九漸加至二十九熱水送下如未破則

內消以破即便合如服金石發瘡者引以白磬末一二

匙溫酒調下亦三五服見效有人遍生瘡狀如蛇頭服

此亦効諸方皆稱奇効但一日中服近百粒則有力此

藥不惟止痛生肌能毒氣內攻護膜止瀉托裏化膿

其功甚大服至半斤尤佳不可欺其淺近要知白磬大

能解毒也今名為蠟磬丸用之委有効驗

頸生痰核○全虫一個冷茶一盞以核桃一枚去肉置全

虫于核桃壳內黃泥裹好入灰火內煨好取出全虫研

末酒服不拘幾服痰核消盡為度

長肉生肌○瘡毒膿腐已盡用此丹搽上即能生肌長肉

平口收功○瘡毒膿腐已盡用此丹搽上即能生肌長肉

取露天大蚌壳左顧者半并括去背後黑衣火煨研細

末一兩血竭三錢蘆甘石三兩而煨赤石脂三兩煨陳年

研細末兒茶一兩煨石膏一兩共為細末磁瓶收貯臨用

時凡瘡不可過性淨末一兩共為細末磁瓶收貯臨用

忍冬酒○治癰疽發背不問發在何處或發眉或頭或頤

或項或背或腰或脇或乳或手或足皆有奇効鄉落之

破仍以神異膏貼之其効甚妙用忍冬藤生取一把以

諸般瘡毒

二百〇八



葉入沙盆研爛入生餅子酒少許稀稠所塗于四圍  
 中留一口洩氣其藤只用五兩木槌搥不可犯鉄大  
 甘草煎生用一兩同入沙瓶內以水二盞文火慢煎  
 至一盞入無灰好酒一大盞再煎十數沸去滓分爲三  
 服一日一服到夜喫盡病勢重者一日二劑服至大小腸通  
 利則藥力到沈內翰云如無生者只用乾者然力終不  
 及生者効速  
 忍冬膏○治諸般腫痛金忍傷瘡惡瘡用金銀藤四兩吸  
 鉄石三錢香油一斤熬枯去滓入黃丹八兩待熬至滴  
 水不散如常攤用  
 護心散○又名托裏散散乳香萬全散凡有疽疾一日至三  
 日之內宜連進十餘服方免變証使毒氣出外服之稍  
 遲毒氣內攻漸出嘔吐或鼻生瘡齒不食卽危矣四五  
 日後亦宜間服之用眞菜豆粉一兩乳香半兩灯心同  
 研和勻以生甘草濃煎湯調下一錢時時呷之若毒氣  
 冲心有嘔逆之證大宜服此蓋象豆壓熱下氣消腫解  
 毒乳香消諸癰腫毒服至一兩則香徹瘡孔中眞聖藥  
 也

萬應膏○治一切癰疽發背無頭惡瘡腫毒打癩一切風  
 痒腫瘡杖瘡一切癰疽發背無頭惡瘡腫毒打癩一切風  
 淨晒萎細到以火鍋口入水煎爛以篩濾去粗滓布  
 絹再濾復入淨鍋武火煎滾文武火熬稠攪成膏以新  
 罐貯封每以敷貼卽愈牙疼卽傳牙上喉痹傳舌上或  
 噲化二三以敷卽愈牙疼卽傳牙上喉痹傳舌上或  
 搜風解毒湯○時珍曰治楊梅瘡不犯極有効  
 淺者半湯卽愈時珍曰治楊梅瘡不犯極有効  
 服之亦効其方川土茯苓一兩薏苡仁金銀花防風木  
 瓜木通白蘚皮各五分皂莢子四分氣虛加人參七分  
 血虛加當歸七分水二大盞煎飲一日三服惟忌飲茶  
 及牛羊肉雞鰓魚肉燒酒法麪房勞益秘方也  
 枳木飲○治諸般癰腫發背用乾枳木葉乾荷葉中心蒂  
 乾萱草根甘草節地榆各四兩細切每用半兩水二盞  
 煎一盞早晚各一服已成者其膿血自漸乾涸未成者  
 其毒自消散也忌一切飲食毒物  
 木占斯散○治發背腸癰疽痔婦人乳癰諸產癩瘕無有  
 不療服之腫去痛止膿消已潰者便得愈也木占斯散  
 百○九



草灸厚朴炙細辛括萎防風乾姜人參結梗敗醬各一  
兩為散酒服方寸匕晝七夜四以多為善此藥入咽當  
覺流入瘡中令化為水也癰疽灸不發敗壞者尤可服  
之內瘰癧在上者當吐膿血在下者當下膿血其瘡未壞  
及常服者去敗醬一方加桂心  
車 瘰癧者去敗醬一方加桂心  
免傳變用車螯即昌莪紫背不問淺深大小利去病根則  
出火毒一兩生甘草末一錢半輕粉五分為末每服四  
錢用括萎一兩生甘草末一錢半輕粉五分為末每服四  
度未下再服甚者不過二服愈  
六 味車螯散○治瘰癧同上用車螯四個黃泥固濟煨赤出  
毒研末燈心○治瘰癧同上用車螯四個黃泥固濟煨赤出  
錢通作一服將三十莖括萎一兩煎取仁炒香甘草節炒二  
匙調車螯末服○一名太乙紫金丹一名玉樞丹解諸毒瘰  
萬 諸瘰癧丸○一名太乙紫金丹一名玉樞丹解諸毒瘰  
諸瘰癧丸○一名太乙紫金丹一名玉樞丹解諸毒瘰  
行兵動眾不可無此山慈茹生皮洗極淨焙二兩川五  
倍子洗刮焙二兩千金子仁白者研紙壓去油一兩紅

芽大戟去蘆洗焙一兩半香三錢以端午七夕重陽  
或天月德黃道上吉日預生齋戒盛服清心治毒為未  
陳設拜禱乃重羅令勻用糯米濃飲和之木相杵千下  
作一錢一錠病甚者連服取利一二行用溫粥補之凡  
一 涼一切飲服一錠或吐或利愈癰疽發背疔腫楊梅等  
一 水磨服一錠或吐或利愈癰疽發背疔腫楊梅等  
一 切惡瘡風癩赤遊疔房疔用涼水或酒磨塗日數次  
立 消陰陽二毒傷寒狂亂疔瘡用淡酒化下泄瀉利  
薄 荷汁數匙化下心氣痛並諸瘡瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧  
下 霍亂絞腸痧用薄荷湯下中風中氣口緊眼歪五癩  
五 癩鬼邪鬼胎筋攣骨痛並瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧  
頭 溫者冷水磨灌之傳疔瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧  
積 為妙久近瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧  
經 閉紅花酒化服小兒驚風五疳五疳五疳五疳五疳  
頭 痛酒研貼亦吞少許打撲傷損松節煎酒下湯火傷  
腫 酒磨塗之亦吞少許打撲傷損松節煎酒下湯火傷  
毒 蛇惡犬一疽腫毒如乳等多用之韋宙獨行方主丁  
柳 枝膏○治癰疽腫毒如乳等多用之韋宙獨行方主丁  
平 易方卷三

柳枝膏○治癰疽腫毒如乳等多用之韋宙獨行方主丁  
平 易方卷三



瘡及反花瘡並煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥  
止齒其嫩枝削其枝為最要之藥時珍曰柳枝去風消腫

寸金散以上均係網目內古方後附新集良方  
等症用此末藥敷患處以細紙包裹毒消肉生甚效草

紅內消三錢荊芥五錢黃柏一兩槐米二錢紫草五錢紅  
五錢沒藥一兩五錢黃柏一兩槐米二錢紫草五錢紅

花三錢白芷一兩三七錢加冰麝各一錢研細磁瓶收  
貯勿使泄氣屢試屢驗

頭惡毒腐一切頑惡毒腐甚有如菌如芝去而復生綿  
纏不絕丹所不能提拔者必用此丹搽之遂漸可以

起根按盡予用之故特刻以傳人大巴豆一名江  
子淘去泥一斤薺麻子五錢不必去壳以上二味連壳

安于石臼內搥碎候天晴之日將風爐放在天井內無  
日色之處上放鐵鍋以炭火用長柄剷刀將二味炒二

日為度磨粗末照前式將二味于鐵鍋內再炒三日去  
淨油氣方可研為細末磁瓶收貯聽用剷刀須用長柄

者恐柄短則炒藥者近鍋口巴豆之氣薰冲面腫  
惡瘡毒力太過以致弩肉突出如梅如栗翻花紅赤久不

縮入此乃損傷氣脈使然若輒以降蝕腐化但腐去其  
小者復又突出大者屢餵突經年累月終不能愈用

此方藥立可奏捷大熟地切片烘乾炒枯大烏梅肉炒  
炭以枯熱地末一兩配烏梅炭三錢共研勻碾極細末

愈凡陰虛腎氣不足之五或其弩肉收進藥不効用此丹  
以防風升麻各一錢煎湯調搽立即收入再服補腎煎

消管丸。一切腸臟痔毒成管成漏服追管丸後再服此  
丸自然管消不用刀針掛線誠起痼疾之良法也胡黃

連二兩炒取淨末穿山甲一兩蘇油炒黃色取淨末和  
決明一兩煅取淨末淨槐米一兩蘇油炒黃色取淨末和

勻煉蜜為丸麻子大每早晚服錢清米湯下至重者  
諸般瘡毒

下易方卷三

百十一



四十日可愈再服後完善丸如瘡口四邊有硬肉突出  
 者可加蚕繭二十炒研和入○追管丸麻子大黃連生薑汁  
 炒刺蝟皮各一兩麝香二分飯丸而愈後不守禁忌  
 完善丸。凡患痔漏服前退追消管丸而愈後不守禁忌  
 或食豬肝蕃茹酒色每瘡復萌急服此丸可斷根夏枯  
 草花十兩連翹五兩去淨心甘草節五兩金銀花四兩  
 右共炒為細末以山東淨銀花一斤熬濃汁法丸如菜  
 豆大每早空心淡鹽湯送下三錢若起漏二二年者服  
 一料全愈三五五年者服兩料全愈此方乃康熙間浙江  
 提督陳山凱患痔漏用之病愈刻板傳人果屢用屢効  
 石花膏。治辛苦勞碌之人嗜酒多慾忽生外痔作痛難  
 一行服此得瀉可止痛行走再用搽藥自能斷根鱗菜  
 驅毒散。一名移毒散。凡毒發骨節間不便出毒之處  
 此藥能移之或上或下使無殘疾之患白芨一兩六錢  
 紫花蒂丁八錢烏雞骨一錢煨黃砂一錢大雄黃一錢  
 輕粉一錢五倍子二錢煨黃砂一錢大雄黃一錢  
 為末以醋調敷毒之上截即移至下午截矣屢試屢驗

再仍照病人之虛實內服藥餌  
 皮取膿法。凡患毒深遠如膿不從毛竅出者若用此  
 者俟膿熟時用此法甚善如膿從腳底出者用此  
 藥塗之其不擦藥之處旁邊綻出一洞自會出膿予試  
 數人屢効不虛驢蹄皮兩即脚底剔下者是用砂炒  
 蕎麥麩一兩草烏四錢刮去皮右研為末和勻加食鹽  
 五錢以水糊作餅瓦上炙微黃色再研細以草紙滲溼  
 攤白紙上貼患處其膿水從毛孔而出蓋以草紙滲溼  
 再換水盡紙燥腫即消  
 立効散。治跌打內傷并閃挫風氣一切疼痛立効當  
 歸二錢通草一錢五分挑仁二錢川山甲二錢  
 分川桂枝一錢五分自然銅三錢醋煨准牛膝一錢  
 分製大黃二錢沒藥二錢分中皮一錢五分蘇子一錢  
 乳香二錢沒藥二錢降香一錢甘草一錢蘇子一錢  
 錢五分杜仲二錢香米一錢內多石南枝頭三錢  
 煎湯加童便一錢酒鐘老酒一酒鐘溫服極重者二服  
 愈今改為末子藥如般瘡毒不重者只須每服吃末子  
 三



錢外加童便一盃老酒一盃送下輕者三服重者仍照

內傷久發。凡跌撲損傷胸脇腰肋等處并肩挑負重失

足躓筋初時不覺延至經年累月忽然疼痛浮而按之

不痛擎重方覺或咳嗽吸氣牽掣兩可烘勿火炒以老

血滯日久恐患癰毒生大黃一兩只可烘調大黃末如

姜二兩春爛串滾水一杯絞汁隔湯頓溫調之黃末如

膏塗于痛處不必雷頭蓋以粗紙外用綿繫之一日一

換三日即愈如傷三五者亦効此方比閃胸膏功勝

十倍廣瘡解毒湯。專治楊梅瘡凡生楊梅瘡千萬不可吃升

丹隱藥以圖速効仍恐引毒入臟後發莫救鮮生地生

米仁各五錢淨銀花三錢花粉連翹白蘚皮威靈仙皂

角刺蝉退各二錢白芷一錢生甘草四兩水六碗煎湯至

三四碗代水煎前藥如毒甚者加川牛膝三錢日服一劑以愈

為度

珠黃十寶丹。能治一切廣瘡楊梅結毒下疳潰爛并小

兒胎毒功効異常滴乳石人乳并真琥珀乳香去油沒

藥去油山茨菇各三錢敗龜板珍珠一錢研為極細末

犀黃一錢辰砂水飛淨一錢土取淨細末秤準以山藥

打糊為丸如小棗豆大辰砂為衣分作一月服完即愈

甚者再服一料必然全愈

魚口便毒。開羊花強壯者用七分虛者用四分芫花一

錢五分銀花三錢淮牛膝獨活各一錢水煎服吃酒者

加紹酒入內更妙初起三日內者不過三服即消凡服

此藥者忌服甘草又方遠志肉

小金丹。新得良方治癰毒并一切疔瘡廣瘡用開水

調服。一丸酒服更妙能止痛消腫未成則散已成即潰

出大小便須向空地勿用便桶恐毒氣染人如遇虛損

陰毒不大腫痛者此等應用補錢腰面雄黃水飛爭一

此丹為要用大芴砂水飛淨一錢腰面雄黃水飛爭一

諸般瘡毒







兩服即止名二神左○時珍曰婦人嗜雜皆血液淚汗  
 變而為痰或言是血嘈多以猪血炒食而愈蓋以血導  
 血歸原之意耳此固一說然亦有就蟲作嗜雜者蟲得  
 血腥則飽而伏也○五靈脂生研三錢酒煎熱服  
 月經不調○久而無子乃衝任狀熱也熟地黃半斤當歸  
 二兩黃連一兩並酒浸一夜焙研為末煉蜜為丸梧子  
 大每服七十丸米飲溫酒任下○血臟冷痛此方平易  
 捷徑熟附子去皮當歸等分每胎法川芎生為末空心  
 經閉胎服一匙腹內微動是有胎不動者非也末空心  
 煎艾湯服一匙腹內微動是黃胎不動者非也末空心  
 月經久閉○蠶沙四兩砂鍋炒半黃色入無灰酒一壺煮  
 佛澄去沙每溫服一盞即通  
 月信滯○蕪荳根細切水煎取二升空心入酒和服  
 血脈不調○苦蕒菜晒乾為末每核燒存性五錢為末每  
 血氣刺痛○香附子炒一兩荔子核燒存性五錢為末每  
 積血不散○歸尾調下  
 乾血氣痛○錦紋大黃酒浸晒乾四兩為末好醋一升熬

成膏丸茨子大臥時酒化一丸服大便利一二行紅漏  
 自下乃調經仙藥也或加香附○婦人血氣不行上衝  
 心隔變為乾血珍曰為刺骨厥陰一枝燒存性空心溫酒服  
 女人心枯○時珍曰為刺骨厥陰一枝燒存性空心溫酒服  
 血也故血枯血瘦經閉崩帶下病疝疾厥陰本病也寒  
 熱瘧疾○厥陰屬肝肝主血故諸血病皆治之  
 或微知人○眩暈移時方寤忽如死人身不動搖目閉口噤  
 多血少陽氣獨上寤時方寤忽如死人身不動搖目閉口噤  
 復通故移時方寤人寤多行此故身如死氣退血還陰陽  
 當歸各一兩人參半兩甘艸一錢半每服五錢水煎服  
 婦人血癖○小腹痛大黃一兩甘艸二錢升麻十不渴此為水與  
 血俱結在血室大黃二兩甘艸二錢升麻十不渴此為水與  
 煮牛升頓服其血當下  
 婦人血暈○婦人血風一錢酒服頭暈止  
 婦人血風○婦人血風一錢酒服頭暈止  
 婦人血風○婦人血風一錢酒服頭暈止

調經



事者用蒼耳草嫩心陰乾為末以酒服一大錢其功甚

五旬行經○婦人五十後經水不止者作敗血論用茜根

一兩阿膠○側柏葉炙黃芩各五錢生地黄一兩胎髮一

枚燒灰分作六帖每帖水一盞煎入分溫服其經即通○魚

尾紅花各三錢水一鐘半煎入分溫服其經即通○魚

膠切炒新綿燒灰每服二錢米飲調下即愈

男女血虛○麥門冬一斤取汁熬成膏三斤取汁

熬成膏等分一處濾過入蜜四之一再熬成瓶收每日

白湯點服忌鐵器

月經異疾○女人月事退出皆作禽獸之形欲來傷人先

將綿塞陰戶乃頓服沒藥末一兩白湯調下即愈

婦人氣盛○血衰變生諸症頭暈滿香附子四兩炒灰

女血病○治嘔吐諸血及便血婦人崩中神効積雪草

五錢當歸酒洗梔子仁酒炒蒲黃炒黃連炒條芩炒生

地黃酒洗陳槐花炒各一錢上部加藕節一錢五分下

婦人發熱○欲成勞病肌瘦食減經候不調地髓煎用乾

地黃一斤為末煉蜜為丸梧子大每酒服五十九

婦人夜熱○痰嗽一月經不調○瘦者用瓜蒌仁一兩青黛

香附童便浸晒一月兩錢為末蜜調化之

五心煩熱○用乾荷葉赤芍藥等分為末每服二錢退熱

婦人百病○諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸

鬼胎瘕瘦○經前米飲下十五丸

錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈

丹參散○治婦人經脈不調或前或後或多或少產前胎

下易方卷三

調經

二百十六







大黃一斤分作四分一分用童便一日切晒再以巴豆仁三  
 日切晒一分用醇酒一盞浸一日切晒再以巴豆仁三  
 十五粒同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一  
 盞浸一日切晒一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一  
 日去歸切晒為末煉蜜丸梧子大每服五十九空溫  
 酒下取惡物為驗未下再服  
 女子小腹中痛經初來便覺腰中  
 切痛連脊間如刀刺小腹不可忍者眾鑿不別謂是鬼  
 疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相常即  
 此藥其藥夏五月連錢草正放花時即采曝乾搗篩為  
 粉每服二方寸七分和好醋二小合攪勻平旦空腹頓服  
 之每服二方寸七分和好醋二小合攪勻平旦空腹頓服  
 加桃仁二百枚以酒下三十九日再服以愈為疾忌麻  
 子蕎麥  
 婦人勞熱○生乾地黃熟乾地黃等分為末生薑自然汁  
 入水相和打糊丸梧子大每服三十九丸用地黃湯下或  
 酒醋茶湯下亦可日二服覺臍臍虛冷則晨服八味丸

地黃性冷環臍陰虛則發熱地黃補陰血故也  
 婦人久冷○血氣攻心痛不止以葉子醋湯下  
 一升煮濃和丸小豆大每服十五丸醋湯下  
 婦人瓜瘕○因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被溼致  
 成狐瘕精神恍惚令人月水不通胸脇腰背痛引陰中  
 小便難嗜食欲嘔如有人孕狀其瘦手足成形者殺人未  
 成者可治用新鼠一枚以新絮裹之黃泥固住入地坑  
 中桑薪燒其上一日夜取出絮加桂心末六銖為末每  
 酒服方寸匕不過一日服當自下也  
 婦人無子○三月不月取杏花桃花陰乾為末戊子日  
 和井華水服方寸匕日三服  
 補血破氣○追風丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可常  
 服補血虛破氣塊其効用芸苔子微炒桂心各一兩高  
 良姜半斤為末醋糊丸梧子大每淡醋湯下五丸  
 女上逆心○煩悶刺痛水牛角燒灰為末酒服方寸匕  
 女黃疸○經水不調房事觸犯所致白礬黃蠟各半兩  
 陳橘皮三錢為末化蠟丸梧子大每服五十九以滋血  
 湯或調經湯下

調經



女勞黑疸○仲景曰黃家日晡發熱及惡寒此為女勞得

心勝膀胱急小腹滿身黃額上黑尺下熱因作黑疸腹

脹如水大便黑時非水也腹滿者難治消石礬石燒

等分爲末以大便麥煎汁和服方寸匕日三服病隨大小

便去小便黃大便黑是候也

蓄脂丸○閨女行經無疼嫁後痛經乃不知禁忌或經將

來或行經未淨交媾震動血海損及衝任致成逆經痛

難皮取淨麪畫邊脂送下兩煎濃汁搗麥爲丸桐子大

每服五錢早開水送下忌食豬肝羊血糟醋

膠紅飲○婦人老年驢然大崩不止名曰倒經速投一劑

其崩立止若身發熱以六安茶葉三錢煎服身熱即退

後再用六君子湯加當歸白芍煎藥三錢煎服可保無虞陳

阿膠五錢白米粉炒全當歸五錢西紅花三錢冬瓜

子三錢右水煎服其滓再煎服

崩漏門

血崩○荆芥穗麻油燈上燒焦爲末每服二錢童便服○

治腸風大小便血淋瀝疼痛用蜜黃蠶紙並燒存性

晚蚕沙白僵蚕並炒等分爲末入麝香少許每服二錢

用米飲送下日三服○代赭煨醋淬七次湯調服二錢

水崩帶下○赤芍藥香附子等分爲末每服二錢鹽一

崩中漏下○青黃赤白使人無子禹餘糧煨研赤石脂煨

研牡蠣煨研烏鰂骨伏龍肝炒桂心等分爲末溫酒服

方寸七日服忌葱蒜○獨聖散防風去蘆頭炙赤爲末

每服一錢以麪糊酒調下更以麪糊酒投之此藥屢經

平易方宗三

崩漏

二百十九

血崩不止○老絲瓜燒研存性研每服二錢食前溫酒

血漏不止○髮洗淨燒研存性研每服二錢食前溫酒

每服三錢空服此酒立止用甜杏仁上黃皮燒存性爲末



煎三碗去滓登清再煎為膏入神效末二兩和九梧子  
 大每服二十九空或溫酒下便止極效  
 下血崩如崩山崩或五色漏帶並宜常服滋血調氣  
 乃婦人之仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二  
 錢立愈昏迷甚者三錢米飲下亦可加棕灰  
 經水過多○經水不止及血崩用黑驢屎燒存性麩糊丸  
 赤崩○崩中○舊葫蘆瓢炒存性蓮房煨存性等分研末每  
 服二錢熱水調服三服有汗為度即止甚者五服止最  
 妙○房事發物生冷  
 產後血崩○蓮蓬殼五個香附子二兩各燒存性為末每  
 服二錢米飲下日二服  
 月經不止○烏龍尾炒烟盡荆芥穗各半兩為末每服二  
 錢茶下○或過多不止用條芩心二兩米醋浸七日炙乾  
 又浸如此七次為末醋糊丸梧子大每服七十九空  
 溫酒下日二次○室女用側柏葉木賊炒微焦分  
 末每服二錢米飲下○陳蓮房燒存性每服二錢酒下

婦人漏下○赤白不止令人黃瘦地榆三兩米醋一升煮  
 十餘沸去滓食前稍熱服一合○乾姜龍甲訶梨勒皮  
 等分為末糊丸空心中及下痢日夜數十起欲死者以  
 崩中入腹即活懸鉤根薔薇根柿根菝葜各一斛取汁煎  
 此入丸○梧子大每溫酒服十丸日三服  
 傷中崩赤○醒醐梓汁酒煎沸空服一盞  
 血崩血崩○楮樹皮荊芥等分為末冷醋調服一錢血崩  
 崩中腹滿○毛蟹殼燒存性米飲服一錢  
 崩中垂死○羊肉三斤生地黃一斤乾姜當歸三兩煮服  
 婦人白崩○扶楊皮半斤牡丹皮四兩升麻牡蠣煨各一  
 兩每用一兩酒二鐘煎一鐘食前服  
 女子血崩○血崩及產後血不止月信來多并赤帶下取  
 粟引細椿根一大握洗淨水一大升煮汁分服便斷  
 陀迦陀丸○治婦人血崩子大每服二十九阿膠湯下  
 皮等分為末水丸梧子大每服二十九







或十五丸俟膿盡乃以他藥補之

婦人白濁一經水不利子藏堅癖中有乾血下白物礬石

婦人白濁○滑數虛冷者鹿角屑炒黃為末酒服二錢

五色帶下○古磚數治婦人五色帶下以麩作餅七個安

于燒赤黃磚上以黃瓜樓傳麩上安布兩重令患者坐

之合藥氣入腹熏之當有虫出如蚕子不過三五度產

血帶下○地錦腹味甘溫無毒主破老血產後血結婦人

瘦損不能飲食浸酒生淮南林下葉如鴨掌藤蔓着地

節處有根亦緣下冬月不死山人產後用之一名地

藥

止帶丸○婦人白帶過多服之即愈陳石灰五年外者方

可川如愈陳愈妙二兩白茯苓一兩蓮鬚炒黑一兩以

山藥一兩打糊為丸桐子大每日早晚以米飲服一錢

益母丸○益母草胎前產後臍腹乍痛米湯下或秦九當

歸煎湯下臨產并產後童便酒下能安魂定魄并催生

妊娠門

種玉丸○服之百日可保有益母草勿犯鐵器摘碎風

乾取淨末入兩煉蜜為丸桐子大每日清晨常服五十

一兩各為細末有孕其效如神酒吞更妙內熱者童便

九淡鹽湯下不傷胎動胎氣雖見紅者亦可保定或常易

串散○凡孕婦傷胎胎氣雖見紅者亦可保定或常易

保胎散○凡孕婦傷胎胎氣雖見紅者亦可保定或常易

小產服之可保足月分娩各三錢白朮炒補骨脂酒

水炒白芍酒炒黃芪酒炙各三錢白朮炒補骨脂酒

炒川斷各二錢過性為細末每服三錢桂圓湯下每月

陰陽瓦煨不可墮胎之患每服三錢桂圓湯下每月

飲一服可保無墮胎之患每服三錢桂圓湯下每月

胎熱不安○用白藥子一兩白芷半兩為末每服二錢紫

蘇湯下○心煩熱入砂糖少許為末米飲丸梧子大每服

安胎清熱○白朮黃芩或加神效凡妊娠調理以四物去地

黃加白朮黃芩為末常服甚良

二百二十二



妊娠咳嗽。貝母去心，麩炒，黃沙糖丸，彈子大，每含嚥一。

妊娠心痛。不可忍，鹽炒，赤酒服。撮。煩悶，麻子仁一。

妊娠合研水。二盞煎，去滓，服。如中風，用熟艾三兩，米醋。

妊娠風寒。卒中，不省人事，狀如中風，用熟艾三兩，米醋。

炒極熱。以絹包，熨臍下，良久即避。鹿角，截五寸，長燒赤。

妊娠極痛。用破故紙二兩，炒香，為末，先嚼胡桃肉半個。

空一升，溫酒調下。又錢此藥神效。鹿角，截五寸，長燒赤。

胎損腹痛。冬麻子一升，將碎，熬香水一升，煮汁，分服。效。

一孕入九月，或產傷牛馬驚，傷心痛，用青竹茹五兩，酒。

妊娠患淋。冬葵子一升，水三升，煮二升，分服。熱痛酸。

楚手足煩。口乾，地膚子一升，水三升，煮二升，分服。

蒸黃連。九亦妙。不度，師方茯苓二兩，竹瀝一升，水四升。

煎二升，分三服。因夫所動，因絕，以竹瀝飲一升，立愈。

孕婦胎動。因夫所動，因絕，以竹瀝飲一升，立愈。

妊娠五兩。為末，熟水服。方寸匕，日三夜二，以通為度。

食惡阻。二香散，用香附子二兩，薑香葉，甘草，各二錢，為。

末，每服二錢，沸湯入，鹽調下。二兩，薑香葉，甘草，各二錢，為。

妊娠行經。赤小豆末，酒服。方寸匕，日二服。

妊娠下血。者，宜膠艾湯。主之，阿膠二兩，艾葉三兩，芍藥。

甘草各二兩，當歸地黃各二兩，芍藥二兩，艾葉三兩，芍藥。

五升，煮取三升，乃納膠，令消盡，每溫酒一升，日三服。

疼，痛雞卵。一調，開孔，去白，雷黃入，松丹五錢，攪勻，泥裹。

煨乾，研末，每服一調，開孔，去白，雷黃入，松丹五錢，攪勻，泥裹。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

墮胎。下血，不止，煩滿，用錢三錢，米飲下。一服，愈。是男，二錢。

兩為末，每服二錢，醋湯下。代賴一錢，生地汁調服。

兩為末，每服二錢，醋湯下。代賴一錢，生地汁調服。

兩為末，每服二錢，醋湯下。代賴一錢，生地汁調服。

兩為末，每服二錢，醋湯下。代賴一錢，生地汁調服。

兩為末，每服二錢，醋湯下。代賴一錢，生地汁調服。

兩為末，每服二錢，醋湯下。代賴一錢，生地汁調服。

兩為末，每服二錢，醋湯下。代賴一錢，生地汁調服。



婦人斷產。○零陵香為末。酒服。二錢。每服。至一兩。即一年。

絕孕。蓋血。開香。即散也。○白麩。一升。酒。一升。煮。沸。去。渣。

分三服。經水。至時。前日。夜。○平氣。溫。能。溫。能。散。其。用。長。于。

白芸薹。菜。子。葉。同。功。其。味。○痔。諸。藥。咸。用。之。經。水。行。後。加。

行血。滯。破。結。氣。故。古。方。消。○散。治。產。後。一。切。心。腹。氣。

血痛。諸。遊。風。丹。毒。熱。腫。瘡。○子。故。紙。一。尺。燒。為。末。酒。

入四。物。湯。服。之。云。能。斷。產。○黃。為。末。酒。服。方。寸。七。日。一。夜。

服。終。身。不。產。崔。氏。方。用。生。地。黃。為。末。酒。服。方。寸。七。日。一。夜。

一。○保。合。集。二。黃。九。用。生。地。黃。為。末。酒。服。方。寸。七。日。一。夜。

妊。娠。吐。兩。白。朮。枳。殼。煎。湯。空。心。調。下。日。二。服。

妊。娠。下。水。煎。三。升。分。三。服。○小。豆。汁。梳。米。黃。芪。各。一。兩。水。

子。癩。昏。冒。○縮。砂。和。皮。炒。黑。熱。酒。調。下。二。錢。不。飲。者。米。飲。

妊。娠。水。腫。各。三。兩。為。糝。飲。服。方。寸。七。日。三。服。小。便。利。則。愈。若。

轉。胞。者。加。髮。灰。神。效。○始。自。兩。足。漸。至。喘。悶。似。水。足。趾。

出。水。謂。之。子。氣。乃。婦。人。素。有。風。氣。或。衝。任。有。血。風。不。可。

作。水。妄。投。湯。藥。宜。天。仙。藤。散。主。之。天。仙。藤。洗。微。炒。香。附。

子。炒。陳。皮。甘。草。烏。藥。等。分。煎。為。末。每。服。三。錢。水。一。大。盞。薑。

三。片。木。瓜。三。片。紫。蘇。三。葉。煎。至。七。分。空。心。服。一。日。三。服。

小。便。利。氣。脈。通。腫。漸。消。不。須。多。服。○引。飲。猪。苓。五。兩。為。

妊。娠。末。熟。水。服。方。寸。七。日。三。服。乾。生。地。黃。二。兩。為。末。每。服。二。

妊。娠。錢。米。飲。下。○豆。醬。一。大。盞。熬。灰。酒。服。黃。二。兩。為。末。每。服。二。

妊。娠。尿。難。飲。下。○取。夫。指。甲。燒。灰。酒。服。參。當。歸。四。兩。為。末。蜜。

腹。中。鬼。哭。○大。每。飲。服。三。丸。至。十。九。參。當。歸。四。兩。為。末。蜜。

妊。娠。好。酒。二。升。煮。如。錫。服。之。未。瘥。再。作。以。雞。子。黃。十。四。枚。以。

孕。婦。束。胎。○白。朮。枳。殼。炒。等。分。再。為。末。燒。飯。丸。梧。子。大。二。

轉。女。為。男。○每。食。前。溫。水。下。三。十。九。胎。瘦。則。易。產。也。○養。胎。轉。

二百二十四



女成男取陽精之全于地產也。千金方云：婦人始覺有孕，凡覺有娠，取弓弩弦一枚，縫袋盛帶左臂上，則轉女為男。室經云：凡覺有娠，取弓弩弦縛婦人腰下，滿百日解却。胎前產後，烏金散治胎前產後虛損，月經不調，崩漏及橫生逆產，用白芷、百草霜等分，為末，以沸湯入童子小便同醋調服，二錢。胎下血，凡孕婦多慾，以致衝任損傷，別無病狀，用生鹿角屑當歸各三錢，水煎服，吃二三日，服其血自止。損胎下血，當歸各三錢，水煎服，吃二三日，服其血自止。如有所憑，用乾棗去核，以火逼燥，為末，多少入生薑末，少許，白湯服。紅棗燒存性，酒服。三錢。安胎，催生，婦人懷孕三五個月，或胎動不安，服之即安。如足月當產，無論強弱，老小服之，產後安，用當歸一錢，貝母八分，黃芪八分，紫蘇六分，枳殼六分，黃芩五分，芍藥一分，甘草二分，厚朴五分，藿香三分，艾三分，兔絲子一錢，四分藥料，秤準，不可輕重。未產以前，熱服一二劑，或三四劑，自然快生。母子兩全。○產後，切不可服至囑至要。

漏胎傷胎，○妊娠數月，經水時來，名曰漏胎，或因房室名曰傷胎，用赤小豆芽為末，溫酒服，方寸匕，日三服，得効乃止。胎氣不安，○氣不升降，嘔吐酸水，香附、薑、香、甘草二錢為末，每服一錢，順氣。○鐵器散，以香附、炒為末，煎紫蘇湯服。一、二錢，浮腫。○羌活、薤白、子同炒，香只取羌活為末，每服一錢，溫酒調下。一日一服。二、二錢，為末，分二服，米飲下。妊婦遺尿，○不禁，桑螵蛸、研末，二錢，麝香少許，和湯服。不孕婦過一、二劑，立効。○薤白、煎汁，頻頻飲之。○烏藥、軟白、香、辣者，孕中有一、二劑，立効。○薤白、煎汁，頻頻飲之。○烏藥、軟白、香、辣者，妊一錢，毒痛。○獐牛屎、燒灰，水服，方寸匕，日三服，并以酢和封之。良。胎墮腹痛，○血出不止，羚羊角、燒灰、三錢，豆淋酒下。濟陰返魂丹，○治婦人胎前產後諸疾，危證，用茺蔚子、葉二百二十五。







妊娠嘔吐○半夏二兩八錢乾姜各一兩為末姜汁麩糊

毒藥墮胎○女服草藥墮胎腹痛者生白扁豆去皮為

末米飲服方寸匕濃煎汁飲亦可丸服若胎氣已傷未

墮者或口噤手強自汗頭低似乎中風九死一生鑿多

不識作風治必死無疑

半產漏下○虛寒相搏其

兩蔥十四莖新絳少諸

妊者用太山赤皮甘遂二兩搗篩白蜜和丸梧子大每服

五者用太山赤皮甘遂二兩搗篩白蜜和丸梧子大每服

妊者用太山赤皮甘遂二兩搗篩白蜜和丸梧子大每服

末大蒜煨熟去皮搗爛

五去白雷黃入黃丹一

孔去白雷黃入黃丹一

末每服三錢米飲下一

胎氣不長○用鯉魚肉同

鹽棗煎汁飲之

妊者感寒○用鯉魚一頭燒灰酒服方寸匕無汗腹中緩痛

胎孕有傷○時珍曰別錄言澤瀉能逐下焦濕熱邪氣既去

似有子而既云強陰何以令人無子既能催生何以去

人強海淨謂之有子可也若久服則腎氣大洩血海反

陰謂之無子可也所以讀書不妄執一

保胎丸○治頻致胎墮悉後胎產

磐石散○治婦人氣血有熱者倍黃芩

養脾胃氣血覺有熱者倍黃芩

砂仁少用黃芩可保弗墮黨參

酒炒一錢川芎五分白芍酒炒

炒二錢炙甘草五分黃芩一錢

錢煎湯煎藥覺有孕隔三五日

保無虞墮胎因血熱者多若多

胎產

附砂仁是速墮也

二百二十七



胎產門

保胎丸。○受孕二三月，即服此丸。八兩，糯米，酒浸炒，山藥六兩，打糊丸，桐子大，每日米飲。月可保，十月滿，是杜仲八兩，糯米，酒浸炒，山藥六兩，打糊丸，桐子大，每日米飲。斷二兩，紹酒浸炒，山藥六兩，打糊丸，桐子大，每日米飲。胎熱，亦可入糯米作粥食。白三寸，河膠炒，半兩，水一盞煎。胎亦可入糯米作粥食。白三寸，河膠炒，半兩，水一盞煎。溫養胎氣。○胎至九月，消息用猪肚一枚，如常着五味煮。婦人胎動。○十月未足，欲產，梁上塵，炷突，墨等分，酒服。方寸匕，○痛不可忍，銀五兩，芋根二兩，清酒一盞，水一大盞煎。一盞，溫服。○未死，即安。○母欲死，子尚在，以此下之。以水銀，硃砂各半兩，研膏，以牛膝半兩，水五大盞煎。汁入蜜調服。半匙。○因跌扑，舉重損胎，不安，或子死腹中者，芎藭為末，酒服。方寸匕，須臾一服，立出。○偶因所觸，或跌墜，傷損致胎不安，痛不可忍，者縮砂熨斗內炒熟。

揀仁搗碎，每服二錢，熱酒調下。須臾覺腹中胎動，極熱。即胎已安矣。神效。○或腰痛，或搶心，或下血不止，或倒產。人將產。○井華水服半升，不作運。胎前下疾。○夜明砂末三錢，空心溫酒服。一匙甚者，不過五服。臨產下疾。○屬子熱，山厄子一合，炒研，每服二錢，米飲下。婦人胎腫。○冬葵子炒黃為末，酒服。二升，煮半升，頓服。少時。生口噤。○冬葵子炒黃為末，酒服。二升，煮半升，頓服。少時。便產。○有午時服此，未時登廁，立見子。○中附子。臨產。○兩縮砂炒，九月十月服此，永無驚恐。福胎飲，用香附子。四兩，縮砂炒，三兩，甘草炙，一兩，為末，每服二錢，米飲下。滑胎。○采采茶，前子為末，酒服。方寸匕。不飲酒者，水調服。詩云：采采茶，前子為末，酒服。方寸匕。不飲酒者，水調服。難產。○經口不產，雲母粉五錢，溫酒調服。入口即產。不順者，即顧萬不失一。橫生倒產，當歸三兩，芎藭一兩。為末，先以大黑豆炒焦，入流水。蓋童便一盞煎一盞。胎產。二百二十八







胎前產後○逆生橫生瘦胎產前產後虛損月候不調崩

中百草霜白芷等分爲末每服二錢童便醋各少許調

勻熱湯化服不過二服

益母膏○近効方治產婦諸疾及折傷內損有瘀血每天

陰則痛神方也三月采益母草連根葉莖花洗擇令淨

于箔上攤暴水乾以竹刀切長五寸勿用鉄刀置于大

鍋中以水浸過二三寸煎煮候草爛水減三之二漉去

草取汁約五六斗入盆中澄今日以綿濾去濁滓以清

汁入釜中慢火煎取一斗如稀餈狀資瓶封收每取梨

大煖酒和服日再服或和羹粥亦可如遠行即更煉至

可丸收之服至七日則疼漸平復也產婦惡露不盡及

血運酸漿實丸○治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難產悉風熱門

濟陰返魂丹○能治婦人胎前產後諸疾危症悉妊娠門

產婦房中○宜以火炭沃醋氣爲佳因有散瘀血之功○

琥珀散○治產後血運絕兒枕痛方悉後眼目門內

產後門

產後宜服○當歸五錢川芎山查各二錢紅花一錢凡生

腹疼并除一切雜症○孕婦臨月須預備此藥一劑以

便生下即可煎服

胎衣不下○紅花酒煮汁飲二三盞○荷葉炒香爲末每

服方寸匕沸湯或童便調下或燒灰或煎汁皆可

子死腹中○母氣欲絕伏龍肝末三錢水調下○硃砂一

兩水煮數沸爲末酒服立出○益母草搗熟以煖水少

許和絞取汁頓服之○或產經數日不下以瞿麥煮濃

拘多服少黃色者去毛爲細末不用篩羅只然之如粉爲

度每服一錢無灰酒一盞同煎八分通口服立生○月

數未足母欲悶絕者用大豆三升以醋煮濃汁頓服○

產後血暈○藥小童便一酒蒸調勻熱服立効口噤者挑齒

產後

二百三十



立閉者灌鼻中皆効用之無不如神也。心氣欲絕益  
 母草研汁服一盞絕妙。時珍曰徐氏婦病產運已死  
 但胸膈微熱有名醫陸氏以紅花數十斤大鍋煮湯盛  
 三桶于窻格之下昇婦寢其上熏之湯冷再加有頃指  
 動半日乃蘇。藏器曰孕性破血將孕麻與產婦枕之  
 止血運產後腹痛以芎安腹上即止。惡物冲心四肢  
 冰冷唇青腹脹昏迷紅藥子一兩頭紅花一錢冰二盞  
 婦人油釵二隻同煎一盞服大小便俱利血自下也。  
 產後血閉。安瓶中沃以熱醋令氣入鼻中即省。合温服。  
 產後血滯。二十枚去皮尖藕一抽水煎服。  
 產後血衝。冲心不下。生薑二兩水入升煮服。  
 產後血便。和酒調服。不止。心面青身冷欲絕者新羊血  
 一盞飲之。或下血。妙。以渴及新產乘虛風寒內搏  
 惡露不快。臍腹堅脹。用當歸炒鬼箭去中心木紅藍花

各一兩每服三錢酒一大盞煎七分食前温服。  
 產後血不下。惡血不下。芫花當歸等分炒為末服一錢。  
 產後血分。二服。入大小錫草煎汁一升入蜜一合和煎一  
 產後血塊。大黃末一兩頭醋半升熬膏丸梧子大每服  
 五丸温醋下。良久當下。  
 產後汗血。汚衣赤色。葶草搗生汁三升酢二合合和頓  
 服當尿下。白汁。  
 產後血痛。有塊用姜黃桂心等分為末酒服方寸匕血  
 下盡即愈。欲死者槐雞半兩為末酒濃煎服立愈。  
 產後惡血。沒藥血竭末各一錢童便温酒各半盞煎沸  
 服良久再服惡血自下。更不痛。  
 產後血多。不止。烏雞子三枚醋半升酒二升和攪煮取  
 汁一升分四服。  
 產後血脹。腹痛引脇。當歸二錢乾姜炮五分為末每服  
 三錢水一盞煎入分入盞酢少許熱服。  
 產後血氣。攻心痛。惡物不用灶中心生研末酒服二  
 錢瀉山惡物立効。  
 產後  
 二百三十一



產後血渴○飲水不止黃芩麥門冬各一錢溫服無時

產後血閉○好酒一升和地黃汁三錢煎服

血露不絕○蘇桑根取屑二錢以好酒服之日三服

血上逆心○煩悶刺痛水牛角燒末酒服方寸匕

產後下血○羸瘦迨死蒲黃三錢煎頓服○炙桑白皮三

錢煎湯飲之○羚羊角中骨燒末飲服方寸匕

血氣逆煩○荆芥焙研末童便服二錢海上方也

產後瀉血○不上乾艾葉半兩炙熱老生姜半兩濃煎湯

一服立効○麻子仁五升酒一升漬一夜明旦去溫服一

升不瘥再服一升不吐不下不得與男子通一月將養

如初○赤小豆生研服方寸匕不瘥再服

產後口乾○搗葶麻仁貼其丹田一夜而上即速去藥不

子腸脫下○刻○葶麻子仁枯礬等分爲末安紙上脫入

產後舌出○不收丹砂傅之

產後日閉○舌縮用雞子一枚打破水一盞攪服

去藥切勿遲延○陰道不閉或陰脫出石灰一斗熬黃以

子宮不收○名瘰疾痛不可忍慈石丸用慈石酒浸煨研

末米糊丸梧子大每臥時滑石湯下四十九次早用慈

石散米湯服○慈石酒浸半兩鉄粉二錢半當

歸五錢爲末○不開用銅錢磨利剖開以陳石灰傅之即愈

產門生合○產後陰戶燥熱遂成翻花溫蘭四兩煎湯熏

產後陰翻○三次再入枯礬煎洗之即安

產後陰腫○鉄爐中紫堊羊脂二味和勻布裏熨熱攤上

產後陰損○產時傷脬終日不小便只淋瀝不斷用生絲

黃絹一尺白牡丹根皮末白葦末各一錢冰二盃煮至

絹爛如餛○乃血水積也乾漆犬麥麩等分爲末新瓦中

鋪漆一層藥一層重鋪滿塗泥固濟煨赤研末熱酒

鋪漆一層藥一層重鋪滿塗泥固濟煨赤研末熱酒

二百三十二



產後嘔逆二錢產後諸疾並宜  
白豆蔻丁香各五錢研細桃仁湯服一錢少

產後氣逆

青橘皮為末葱白童便煎服一錢

產後咳逆嘔吐心衝目運石蓮子五錢白茯苓一兩丁

香五錢為末每米飲服二錢

產後心痛血氣上冲欲死鬱金燒存性為末二錢米醋

一呷調灌即愈惡血不盡也荷葉炒香為末每服方

一匙沸湯或童便調下或燒灰或煎汁皆可

產後腹痛如絞當歸末五錢白蜜一合水二盞煎一盞

焙乾搗鋪臍上以絹覆住熨斗熨之待口中艾氣出則

痛自止矣

產後復脹不通氣急坐卧不安黍藥一合為末和酒服

良久通轉神驗

產後腰痛乃血氣流入腰腿痛不可轉者取醬當歸各

八分芎藭芍藥桂心各六分水二升煮八合分二服忌

葱

產後發喘乃血入肺竅危症也人參末一兩蘇木二兩

水二盞煮汁一盞調參末服神效

產後脹衝氣噎逆石代諸石等分為末醋糊丸梧子

大每服三五丸醋湯下

產後閉塞產後汗多則大便秘難于用藥惟麻子粥最

穩不惟產後可服凡老人諸虛風秘皆得力也用大麻

子仁紫蘇子各二合洗淨研細再以水研濾取汁一盞

分二次煮粥服之五七日不通不宜妄服藥丸宜用

大麥芽炒黃為末每服三錢以沸湯調下與粥間服

產後遺尿雞窠草燒末酒服二錢七○猪胞猪肚各一

個糯米半升入膠內更以膠入肚內同五味煮熟食

產後淋瀝紫劑皮五錢半酒煮水煎溫服

產後崩中蓮蓬壳五個香附兩各燒存性為末每服

二錢米飲下日二服

產後帶下產後中風絕孕帶赤白羊肉二斤香豉大

蒜三兩水一斗煮五升納酥一升更煮二升服

產後肉線一婦產後用力垂出肉線長三四尺觸之痛

引心腹欲絕方載前奇要門內



死胎難下。○莫如前例子死腹中，并婦人胎動諸方內酌

用效方以下死胎為受不可驚惶，使產婦心慌氣亂，并

不可任聽穩婆擅用才鈎等物，因此產婦少在穩婆非

常用之器，倘一失手有傷內臟，產婦立斃，莫救矣。

產後入當歸五兩，黃芪八兩，生薑六兩，煮取二升，分四服。

產後入麝香少許，以沸湯些須調下。此藥雖微，能愈大病，不

可忽之。○赤白者，紫莧菜一握，切煮汁入粳米三合煮

粥食之立瘥也。○小龍牙根一握，濃煎服之甚効。即蛇含是也。

產後瀉痢。○小便不通，臍腹痛，生馬齒莧菜，榨汁三合煎

沸入蜜一合和服。○津液枯渴，四肢浮腫，口舌乾燥，用冬瓜

一枚，黃土泥厚五寸煨熟，絞汁飲亦治傷寒痢渴。

產後虛羸。○令人肥白，健壯。羊脂二斤，生地黃汁一斗，姜

汁五升，白蜜三升，煎如飴，溫酒服一盃，日三。

產後痔瘡。○寒熱用猪腎一對，切細片以鹽酒拌之，先用

粳米一合，葱椒煮粥，益醃調和，將腰子鋪于盆底，以熱

粥傾于上，蓋之。○如作禽生粥食之。○將腰子鋪于盆底，以熱

炭火一斤，燬之。○溼土一撮，一宿打破，去外面石取裏面細

者研水淘五七度，日晷再研，萬遍用甘草湯服二錢。

產後煩渴。○用煉過蜜不計多少，熱水調服即止。

產後煩悶。○汗出不識人，用羚羊角燒末服方寸匕，未愈

再服。○方加芍藥、枳實等分炒研末湯服。

產後煩熱。○逆氣用甘草根切一斗五升，煎取七升，去滓

入小麥二升，大棗二十枚，煮三斗，入甘草一兩，麥門

冬一升，再煎至二升，每服五合。

產後寒熱。○心悶極脹，百病給羊角燒末酒服方寸匕，

後寒熱。○因怒氣發熱，迷悶者，獨行散用荆芥穗以新

瓦半炒，半生為末，童便服極妙。○錢若角弓反張，以豆淋

酒下，或劉散童尿煎服極妙。○蓋荆芥乃產後要藥，而角

弓反張乃婦人急候，得此證者，寸存一二而已。○血氣

上冲口乾，腹痛用生薑煎飲之，或加童便煎服。

二百三十四



產後顛狂○敗血及邪氣入心○見祟物顛狂用大辰砂一二錢研細飛過用飲兒乳汁三四茶匙調淫以紫項地龍一條入藥滾三滾刮淨去地龍不用入無灰酒一

產後不語○用生白礬末一錢熱水調下日三

產後發狂○四物湯加青黛水煎服

產後搐搦○強直者不可便作中風乃風入子臟與破傷風同用經膠一兩以螺粉炒焦去粉為末分三服煎蟬

產後運絕○半夏末冷水和丸大豆大細入鼻中即愈○

產後傷寒○血運欲死用荷葉紅花姜黃等分炒研末童便調服二錢

產後中寒○遍身冷直口噤不識人白朮一兩澤瀉一兩生薑五錢水煎分作二服

產後風虛○獨活白蘇皮各三兩煎分五服加酒煎更妙

產後諸虛○發熱自汗人參當歸等分為末用猪腰子一個去膜切小片以水三升糯米半合葱白二莖煮米熟

取汁一盞入藥煎至八分食煎溫服

產後面黧○面如雀卵色以羊胆猪胰細辛等分煎三沸

產後赤目○以漿水洗之

產後腸痒○婦人產後腸中痒將箭筒及鐵密安所卧席

產後中風○人虛不可服他藥者一物白鮮皮湯用新汲

水三升煮取一升溫服○魚弓反張不語用大蒜三十

瓣以水煮汁灌之即甦○黑豆二升半雞矢白一升炒

熟清酒一升半浸取一升入竹瀝服取汗○治婦人產

後中風口噤手足攣癱如角弓或產後血運不省人事

四肢強直或心眼倒築吐瀉欲死用當歸荆芥穗子等

分焙為末每服三錢豆淋酒調服或童便服之日噤則

挑齒灌之斷噤則灌之鼻中其効如神太抵產後大眩

則汗出而腠理疎故易于中風也

產陰受風○皆因下體受風形如生毒紅赤腫疼以葱白

研膏入乳香末敷貼患處勿洗去○又方以羌活防風



各一兩煎湯熏洗下體即消

產後虛汗○黃芪當歸各一兩麻黃根二兩每服一兩煎

湯下○馬齒莧研汁三合服如無以乾煮汁

產後盜汗○牡蠣粉麥麩炒黃等分每服一錢用猪肉汁

調下

產後自汗○壯熱氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪白

芍藥酒炒各二錢生薑五片水一盞半煎七分溫服

產後諸病○凡產後汚穢不盡腹滿及產後血運心頭硬

或寒熱不禁或心悶手足煩熱氣力欲絕諸病並用延

胡索炒研酒服二錢甚効○血運心悶煩熱厭厭氣欲

絕心頭硬乍寒乍熱續斷皮一握水三升煎二升分二

服如人行一里再服無所忌此藥救產後垂死

產後嘔水○因怒哭傷肝嘔吐青綠水用韭葉一斤取汁

入姜少許和飲遂愈

產婦風痞○因出風早也用猪胆一枚拍子油一兩和傳

產婦水腫○血虛浮腫澤蘭防已等分爲末每服二錢醋

酒下

產婦有塊○作痛繫縷草滿兩手水煮常帶飲之

產婦痲痛○桂末酒服方寸匕取効

育腸氣痛○婦人少腹痛禹餘糧爲末每米飲服二錢日

二服極効

產後煩嘔○婦人產中虛煩嘔逆安中益氣竹皮丸方中

用白薇同桂心一分竹皮石膏三分甘草七分棗肉爲

大丸每以飲化一丸服云有熱者倍白薇則白薇性寒

乃陽明經藥也徐之才藥對言白薇惡大棗而此方又

以棗肉爲丸蓋恐諸藥寒涼傷脾胃

兒枕作痛○刺痛黑白散用烏金石燒酒淬七次寒水石

煨爲末等分每用粥飲服一錢半即止未止再服○治

婦人產後見枕痛惡露不盡取山查實去核煎汁入沙

糖服之立効○五靈脂慢炒研末酒服二錢

炒大豆湯○古方有紫豆湯破血去風除氣助熱產後兩

日宜服之悉諸風門

豆淋酒法○治產後百病等症悉諸風門

芸苔散○產後惡露不下血結衝心刺痛將來纔遇胃寒

踏冷其血必往來心腹間刺痛不可忍謂之血母并治

產後心腹諸疾產後三日不可無此用芸苔子炒當歸

產後

二百三十六



桂心赤芍藥等分每酒服二錢趕下惡物

虎珀散○止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血暈悶

千金神造湯○治子死腹中并雙胎一死一生服之令死

者出生者安神妙方也用蟹爪一升甘草二尺煎流水

服或分二服若人困不能服者灌入即活

失笑散○治男婦老少心腹痛小腹痛小腸疝氣諸藥不

效者能行能止婦人妊娠心痛及產後心痛小腹痛血

氣痛尤妙用五靈脂蒲黃等分研末先以醋二盃調末

熬成膏入水一盞煎至七分連藥熱服未止再服一方

以酒代醋一方以醋糊和丸童便酒服

紫金丸○治產後惡露不快腰痛小腹痛如刺時作寒熱頭

痛不思飲食又治久有瘀血月水不調黃瘦不食亦療

心痛功與失笑散同以五靈脂水淘淨炒末一兩以好

米醋調稀慢火熬膏入真蒲黃末和凡龍眼大每服一

匙以水與童便各半盞煎至七分溫服少頃再服惡露

即下血塊經閉者酒磨服之

乳病門

婦人吹乳○用韭菜地中蚯蚓屎研細篩過米醋調厚傅

乾則換三次即愈涼水調亦可○貝母末吹鼻中大効

○五月五日樓箬燒灰酒服二錢即散累効○半夏一

個煨研酒服立愈一方以末隨左右嚙鼻効

婦人妬乳○醋和椽上塵塗之○初起重紫衆療不瘥柳

根皮熟搗火溫帛裹髮之冷更易一宿消○乳癰汁不

出內結成腫名妬乳用蜂房燒灰研每服二錢水一小

盞煎六分去滓溫服

乳汁不下○氣少血衰脈瀉不行故乳小也鍊成鐘乳粉

二錢濃煎漏蘆湯調下或與通草等分爲末飲服方寸

匕日三次○二母散貝母知母牡蠣粉等分爲細末每



下乳方。治強壯婦人乳汁不下。用王不留行二錢，通草二錢，歸尾二錢，五分穿山甲酒炙，二錢，豬前蹄七星者。

發乳。○母豬蹄一隻，通草六分，綿裹煎羹食之。○癰疽發背，鹿角磨濃汁塗之，并令人吸去黃水，隨手即散。

婦人乳癰。○初起用石膏煨紅，出火毒，研末，服三錢，溫酒下，添酒儘量飲，睡起再進一服。○乳出極大如盆，腫痛，白姜石末和雞子清，傅之，乾即愈。

甘草二錢煎服，令人嘔之，或用貝母、杏仁、酒服二錢，令人一鐘食前服，睡覺病去矣。○未成者，即散已成者，即潰。

痛不可忍，者即不疼，神効不可云。喻也。用真陳橘皮湯，浸去白晒，麩炒微黃，為末，每服二錢，麝香調酒下，初發者，一服見効，名橘香散。○有人治乳癰，持藥一根生插貼瘡，其熱如火，再貼遂平，求其方，乃水楊柳根也。葛洪

乳汁不通。○穿山甲炮研末，酒服三錢，外以油梳梳乳，即

大通。○體虛者只服一錢，體弱者忌服。○此方亦可治

婦人無乳。○廣濟用母豬蹄四枚，水二斗，煮一斗，入土瓜

根通草，漏蘆各三兩，再煎六升，去滓，納葱豉，作粥或羹

食之，或身體微熱，有少汗出，佳。未通再服。

乳供多兒。○野豬脂臘月鍊淨，和酒，日三服，令婦人多乳。

乳汁清少。○因氣鬱者，涌泉散，王不留行，穿山甲炮，龍骨

瞿麥，穗麥門冬，等分，為末，每服一錢，熱酒調下，後食，猪

蹄羹，仍以木梳梳乳，一日三次。

斷乳奇方。○山后一個，辰砂雄黃，雌黃，麝香各二分，輕粉

一分，共研末，待兒熟睡時，用麻油調搽，小兒兩眉上，即

不思乳食矣。此乃斷乳之奇方法也。

婦人乳癰。○酒下梳垢五丸，即退消。

乳癰腫痛。○用脂麻炒焦，研末，以燈窩油調塗，即安。

乳結硬痛。○百藥煎末，每服三錢，酒一盞，煎數沸，服

乳病

二百三十八







婦人過二十斤瘦○作痒羊肝納入引虫出

婦人陰冷○十年無子者用吳茱萸川椒各一升為末煉

也○母丁香末紗袋盛如指大納入陰中病即愈

婦人陰癩○硬如卵狀隨病之左右取穿山甲之左右邊

五錢以沙炒焦黃為末每服二錢酒下

婦人痲痛○名小腸氣馬鞭草一兩酒煎滾服以湯浴身

子宮寒冷○白善土療婦人子宮冷○温中坐藥蛇牀子

散取蛇牀子仁為末入白粉少許和勻如棗大綿裹納

之自然温也

交接違禮○女人血出不止青布同髮燒灰納之○因交

交接傷動者五倍于末摻之良

交接陰毒○腹痛欲死假猪血乘熱和酒飲之

女人陰吹○胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也宜猪

膏髮煎導才用猪膏半斤亂髮雞子大三枚和煎髮消

藥成矣分兩服病從小便中出也

產門虫蛆○痛痒不可忍用杏仁去皮燒存性杵爛綿裹

納入陰中取効

婦人小便澀○李不可出者紫苑為末并華水服三撮即

婦人尿血○船茹一斤洗淨河水四升半煮二升半分二

婦人遺尿○不拘胎前產後白薇芍藥各一兩為末酒服

方寸匕日三服○桑螵蛸酒炒為末姜湯服二錢

陰陽易位○治暴崩下血琥珀散用漆紗帽灰取陽氣冲

上之義又婦人因生陰陽易位前陰出糞名曰交腸

病取舊幘頭燒灰酒服仍間服五苓散分利之如無幘

頭凡舊漆紗帽皆可代之此取漆能行敗血之義耳

女人紫足○脫骨湯用杏仁一錢桑白皮四錢水五盞新

菝煎三盞入朴硝五錢乳香一錢封口煎化置足于上

先熏後洗三日一作十餘次后軟若綿也

纏脚生瘡○荆芥燒灰葱汁調傅先以甘草湯洗之外

女人趾瘡○甲內惡肉突出不愈蜈蚣一條焙研傅之外

女人足瘡○經年不愈名裙邊瘡用男子頭垢桐油調作



隔紙膏貼之

夫婦不和○夫婦不和者私與鴛鴦肉食之即相憐愛

令婦不妒○取麝即赤黍也同薏苡等分為丸常服之

實女穿窬○時珍曰鉛秉北方癸水之氣陰極之精其體

重實其性濡滑其色黑內通于腎實女無窬者以鉛作

命婦孝順○張華物類志云以狗肝和土泥灶勿令人知

陰腫如斗○生諸葛菜根先去泥春爛封之即消或無鮮

小腸疝氣○蕎麥麩四兩酒浸曬燥勿炒小茴香一兩炒

服至兩月大便內必有溼熱之物如曠者泄出方効

平易方卷三 小兒科

小兒諸病門

初生宜用○小兒初生浴湯中入鹽少許猪胆一個拭乾

以膩粉少許摩其身既不畏風又散諸氣并生瘡疥

○預解胎毒小兒初生以黃連煎湯浴之不生瘡及丹

毒○小兒開口吐津和藥絹一個燒存性砂一分和勻

嚼生芝蔴一口用橄欖核一個燒存性砂一分和勻

又方一時項取出絹包方與乳吃令兒少疾出痘亦稀

水二合煮取一合小兒初生與口草一指節長炙碎以

出胸中惡汁此後待兒飢渴更與口中可為一規亮當吐

痘稀少○又方解下胎毒小兒初生三日應開腸胃助穀神

兒嘔之其毒自下○小兒初生三日應開腸胃助穀神

可與碎米濃作汁飲○小兒初生三日應開腸胃助穀神

神以導達腸胃○小兒初生三日應開腸胃助穀神



曰小兒體屬純陽其驚癇亦生于風熱猪乳氣寒以寒治熱謂之正治故錢乙云初生小兒至滿月以猪乳頻滴之最宜張煥云小兒初生無乳以猪乳代之出月可免驚癇痘疹之患

初生不啼取冷水灌之外以葱白莖細鞭之即啼

初生貼額取熱水灌者天南星炮為末水調貼足心

初生不乳咽中有物如麻豆許用水銀米粒大與之

初生不愈用雀屎四枝抹之即吮○百日內小兒無

故口青不飲乳用凌霄花大藍葉芒硝大黃等分為末

以羊髓和丸如桐子大每研一丸以乳送下便可吃乳

熱者可服寒者勿服

小兒口噤不開○猪乳飲之甚良

初生大便不通○真香油一兩皮硝少許同煎滾冷定

徐徐灌入口中○燕下即通

小兒熱丹○白善士一分寒水石半兩為末新水調塗

毒生麻油塗之○丹腫豕豆五錢大黃二錢為末用生

薄荷汁入蜜調塗○丹毒作瘡出水鼓炒烟蓋為末油

調傳之○火丹熱如火繞頸能損人馬齒竟搗塗○火

丹從臍起○白皮煮汁浴之或為末羊膏和塗之

小兒赤遊○上下遊行至心即死○薤葉搗傅之

上至心即死○薤葉搗傅之

泥搗爛絞汁以汁搽患處燥則再搽屢効○冬月無葉用

根亦可○或以大小白菜搗爛傳患處○小兒頭頂腿

肋縫中潰爛以馬齒頭汁調六一散搽之即愈

小兒丹癰○莧麻五個去皮研入麪一匙水調塗之甚妙

飲乳不快○似喉痺者取羊角燒灰塗乳上嚙下即瘥

初生無皮○無膚色赤因受胎赤但得土氣也取車輦土碾

傅之三日後生膚○無皮色赤但有紅筋者乃受胎未

足也○用早白米粉撲之肌膚自生○周身無皮以母居

樓不受地氣之故將兒卧泥地上卧一宿即能長皮矣

初生胃寒○小兒初生因胃寒氣欲絕者勿斷臍急烘絮

包之將胎衣烘熟用灯炷于臍下往來熨之暖氣入腹

丙氣回自甦又燒銅匙柄熨烙眼眩內去風退赤甚妙

小兒諸病

二百四十二



小兒驚啼○初落臍帶臍眼溼爛用生毛織之瑇瑁子燒灰

小兒吃土○用乾黃土一分沙糖和丸研末濃煎黃連湯調下○及

小兒夜啼○小兒邪熱在心夜啼不止用燈花二三顆燈

心湯調抹乳叱之○伏龍肝末二錢硃砂一錢麝香少

許為末蜜丸菜豆大每服五丸桃符湯下○明鏡掛床

夜啼腹痛○時珍曰樹孔中草主小兒腹痛夜啼暗着戶

乾乳香五分搗丸如芥子大每服七丸乳汁下

小兒驚啼○小兒五疳如芥子大每服七丸乳汁下

而驚此痛候也猪腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮

七合每以杏仁大與噉之日三夜○面青腹強是忤

客氣新馬糞一團絞汁灌之

小兒驚啼○白五二錢半寒水石半而為末水調塗心下

啼而不哭煩也哭而不啼躁也用蟬蛻二七枚去翅足

為末入硃砂末一字蜜調與兒吸之○小兒驚啼發散

小兒吐乳○取田中地龍糞一兩研末空心以米湯服半

錢不過二三服○取田中地龍糞一兩研末空心以米湯服半

破七粒去皮研勻丸如麻子大每服三九藿香湯下○

胃寒者白豆蔻仁十四個縮砂仁十四個生甘草三錢

炙甘草二錢為末常摻入兒口中○小兒百日咳陳皮

乳或糞青色用少年婦人乳汁一盞入丁香十枚陳皮

去白一錢石礬煎一二沸細細與服

小兒乳癖○小兒疳積○小兒疳積○小兒疳積○小兒疳積

脾化積丸○小兒疳積○小兒疳積○小兒疳積○小兒疳積

上硫磺一錢丁香二錢一錢為末每服一錢蜜陀僧一兩

半錢用乳汁或麩湯調下並不轉瀉一復時取下青黑

物後服補藥以醋石榴皮炙黑手兩蚶殼五分木香五

小兒諸病



初生腫胞○小兒初生遍身如魚脰又如水晶破則成水

流疹又生者蜜陀僧生研搗之仍服蘇合香丸○六日

解胎毒濕腸胃壯血氣砂砂豆火細研蜜一棗大調與

吹之○一日令盡

小兒吐逆○不止用黃丹為末小棗肉和丸芫子大每以

一分九針簽○于燈土燒過研細乳汁調下一加硃砂枯礬

等分○不定虛風喘急白附子藿香等分為細末每米

飲下○半錢○壯熱食癩葛粉二錢水二合調勻傾入錫

一熟甘芩一握淨紙煨過同研為末每服半錢米泔調

下立瘥

小兒吐瀉○芹菜切細煮汁飲之不拘多少○丁香橘紅

等分煉蜜○九黃豆大米飲化下○尿溇末乳上服之良

月內胎驚○豬乳同砂砂乳少許抹口甚妙

急慢驚風○大蝦蟆胆五個取汁硃砂一錢犀黃一分麝

走油丹毒○生大黃黃芩黃柏等分為末芭蕉根汁調搽

初生胎熱○黑白甘遂為末每服半錢冷水下

胎毒眼○蚰蟥泥搗塗額門乾則再換不過三次即愈

胎毒胎毒○淡豉煎濃汁與三五口其毒自下又能助脾

氣消乳食○胎毒胎毒○以真麻油三兩煎鮮嫩槐枝六

兩熬枝枯去滓以錦粉一兩輕粉一錢煨石膏三錢研

勻入油內蒸熟調搽○初生時以非許少許灌之即吐

出惡水惡血永無諸疾

小兒胎寒○驅疳發癩白礬煨半日棗肉丸黍米大每乳

下○一丸愈○乃止最良○好疳晝夜不止因此成癩當歸

末○一丸愈○乃止最良○好疳晝夜不止因此成癩當歸

小兒癰瘡○用雞臍黃皮燒存性乳服男用雌女用雄

鹿角生研為末先發時以乳調一字服○烏猫屎一錢

小兒瘰癧○寒熱如泔用冬瓜薑蓄各四兩水二升煎湯

小兒熱瀉○黃蘗削皮焙為末用米湯和丸粟米大每服

二百四十四







小兒盜汗○身熱龍胆草防風各等分爲末每服一錢米

飲調下亦可○盜汗潮熱往來胡黃連柴胡等分爲末蜜丸

小兒自汗○每用一二九水化開入酒少許重湯煮一二十

沸溫服○胡黃連川黃連名一兩爲末用黃瓜一個去

瓤雷蓋入藥在內合定葱裏煨熟去葱搗丸菜豆大每

量大小溫水下○青瓜萎焙研每服一錢瀉下黃物

小兒風痰○熱毒壅滯涼心壓驚抱龍丸用牛胆南星一

兩入金錢薄荷十片丹砂一錢半龍腦麝香各一字研

末煉蜜丸○芡子大每服一丸竹葉湯化下

小兒二錢爲末沙糖丸芡子大每米飲化下

小兒熱嗽○甘草二兩猪胆汁浸五宿炙研末蜜丸菜豆

大食後薄荷湯下十九

小兒風寒○煩熱有痰不省人事荆芥穗五錢焙麝香片

腦各一字爲末每茶調服五分○蘿荀子生研末一錢

冲酒服之取微汗大效

小兒哮喘○鼠屎燒研水酒空燒存性山火毒研末以淡豆腐

蘸食○鼠屎燒研水酒空燒存性山火毒研末以淡豆腐

寒食効和作餅子炙黃一粒研末每服一錢溫水下

三服効乃止○巴豆一粒研末綿裹塞鼻男左女右痰

卽自下○多年海螵蛸末木飲服一錢

小兒羸瘦○甘草三兩炙焦爲末蜜丸菜豆大每溫水下

小兒中蠱○欲死者甘草半兩水一盞煎五分服當吐出

小兒下血○欲死者甘草半兩水一盞煎五分服當吐出

小兒疳疾○砂鍋煮熟搗作丸服

小兒氣癆○砂鍋煮熟搗作丸服

小兒秘妙○不可言大効

小兒虛腫○頭面陰囊皆浮用使君子一兩去壳蜜五錢

二百四十六







小兒腦熱○好閉目或太陽痛或目赤腫○常欲閉目○大黃一分水

各二錢為末以少許吹鼻中○常欲閉目○大黃一分水

三合浸一夜一歲兒服半合餘者塗頂上乾即再生○

小兒髮不生○即腫者黃蘗末水調貼足心

小兒顛陷○綿鳥頭心搗汁頻塗

小兒未慈根搗和作餅貼陷處○乃冷也水調半夏末塗足

小兒心未慈根搗和作餅貼陷處○乃冷也水調半夏末塗足

小兒醋調絳帛上貼額門炙手頻熨之立効

面瘡○洗之○月蝕○面瘡○赤腫地榆入兩水一斗煎五升温

燕窩生瘡○鼠屎研末香油調搽

小兒風等分為末洗淨以油調塗之○小兒眉瘡小麥麩炒

小兒黑研末酒調傅之○或往漸大侵睛雪白塩少許灯心蘸點

小兒日三五次不痛不碍屢用効驗○嫩樹葉三兩搗爛紙

包泥裹燒乾去泥入水少許絞汁銅器慢熬如稀餈

合收之每旦點之

小兒風甘草一截以猪胆汁多為末每用米泔調少許灌之

小兒錢半為末用羊子肝一枚切開搽藥二錢紫定以黑豆

見一合米泔一盞煮熱分二次食以汁送之○至晚忽不

撮瓦罐煮熱日食之屢効忌水洗竹刀剖開入穀精草一

丸菜豆大每服三十丸茶下○夜明砂炒研猪胆汁和

丸菜豆大每服三十丸茶下○夜明砂炒研猪胆汁和

煮猪肝取汁調服半錢

小兒塗手足心即愈○在蓐內者人乳浸黃蘗汁點之○淡

小兒竹瀝點之或入人乳

小兒入輕則外包赤腫上難血瘀眦腫遂濺其睛不見瞳

汁三五匙入膩粉少許蒸熟絹包頻點重者加黃連朴

小兒諸病

二百四十八



初生閉目。由胎中受熱也。以熊胆少許蒸水洗之一日。

小兒鼻塞。如三日不開。服四物加甘草天花粉。膏去滓。日摩膏三四次。不通不能食。乳劉氏用醍醐。

小兒鼻露。鼻下兩道赤色。有疳。以米泔洗淨。用黃連末。

小兒鼻乾。三四次。用黃米粉生馨末各一兩。每以。

一錢水調。顯上日二次。耳瘡。月蝕。胡粉和土塗之。○生耳後黃連末。傅。

之○薔薇根。四兩。地榆二錢。為末。先以鹽湯洗過。傅之。

小兒疳。耳○硫黃末和蠟作挺。插之。日三易。○挑仁炒研。

小兒通睛。○小兒。跌或打着頭。腦受驚。肝系受風。致瞳。

人。不正。觀東。則見西。觀西。則見東。宜石南散吹鼻。通頂。

石南一兩。藜蘆三分。瓜丁五七個。為末。每吹少許入鼻。

小兒通病門

小兒唇腫。○桑木汁塗之。即愈。

天柱骨倒。○小兒疳疾。及諸病。後天柱骨倒。乃體虛所致。

宜生筋散。貼之。木鼈子六個。去壳。蓖麻子六十粒。去壳。

小兒唇緊。○葵根燒灰。酥調塗之。○赤菟搗汁。洗之。良。○

不能開。合飲。食不語。即死。蛇蛻燒灰。拭淨。傅之。○雞矢。

白研末。傅之。有涎。易去。○松脂灸灰。拭淨。傅之。○雞矢。

撮。口噤。風。○面黃赤氣。喘啼。聲不出。胎氣挾熱。流毒心。

脾故。令舌強。唇青。聚口。發噤。用直僵蚕二枚。去嘴。略炒。

為末。蜜調。傅唇中。甚効。○百日內。風噤。口中。有物。如蝸。

小兒。或黃頭。白。者。薄猪肪。擦之。即消。○煨熟紙。裹斜包。剪一。

小兒。孔透。氣。于口中。牙。不開。天南星。一枚。煨熟。紙裹。斜包。剪一。

之。自開。○病。在咽中。如麻豆。許。令小兒吐。沫。不能乳。食。

葛蔓。燒灰。一字。和乳汁。點之。即瘥。○粟米。大。是也。以蜈。

煖飲。分三四服。○但看舌上。有瘡。如粟米。大。是也。以蜈。



蛇汁刮破指甲研傳兩頭肉即愈如無生者乾者亦可  
 ○中風用雀屎水丸麻子大飲下二丸即愈○小兒口  
 噤不開猪乳飲之甚良月內胎驚用硃砂牛乳少許抹  
 口中甚妙○燕口白僵蚕二枚炙黃研末蜜和塗唇內愈  
 口瘡燕口○燕口吻瘡胡粉炒一分黃連半兩為末薄之  
 ○口瘡釜底墨時時擦之○糜爛生硫黃水調塗手心足心効  
 塗足心瘡愈洗去○細卒末醋調貼臍上○白屑如鷺口不須服  
 即洗去○天南星去皮臍研末醋調塗足心男左女右○  
 藥以生天南星去皮臍研末醋調塗足心男左女右○  
 大栗煮熟日與食之甚効○用葶薺燒存性研末搽  
 之○通白者白僵蚕炒黃拭去黃肉毛研末蜜和傳之  
 立效并治小兒口瘡及百日內口瘡入麝香少許搽之  
 小兒驚口○馬牙硝擦舌上日五度○重舌鷺下清糞濾汁入  
 焰硝點之○重舌驚口赤小豆末醋和塗之○自內生  
 出可治自外入不可治用食草白鷺下清糞濾汁入  
 沙糖少許搽之或用雄鷺糞眠倒者燒灰入麝香少許  
 搽之並効○雞腫黃皮為末乳服五分  
 重舌木舌○重舌釜下土和苦酒塗之○伏龍肝末牛蒡

汁調塗之○涎出水漿不入太陰元精石二兩牛黃硃  
 砂龍腦一分先以鉄針舌上去血盪湯漱口搽未燕津  
 神効○未舌黃蜀葵花為末一錢黃丹五分傳之○桑  
 根白皮煮汁塗乳上飲之○竹瀝黃藥時時點之○欲  
 死者以亂髮灰半錢調傳舌下不住用之  
 舌膜牙斑○小兒初生有白膜皮裹舌以指甲刮破令出  
 血燒礬末○小兒初生有白膜皮裹舌以指甲刮破令出  
 點名牙斑以針刺破青布蘸銀花湯擦見必唾○牙根白  
 小兒白礬和雞子置醋中塗兒足底二七次愈○飲乳不得  
 小兒重齶○蛇蛻灰醋調傳之  
 小兒撮口○鹽頭鳩貼臍上炙之○發噤用生甘草二錢  
 半水一盞煎六分溫服令吐痰涎後以乳汁點兒口中  
 ○臍風撮口艾葉燒灰填臍中以帛縛定効或隔蒜灸  
 之候口中艾氣立愈○撮口初生豆芽研爛絞汁和  
 乳灌少許良○臍風獨頭蒜切片安臍上以艾炙之口  
 中有蒜氣即止○胎風先炙兩乳中三壯後用此方大  
 驗用烏驢乳一合以東引槐枝三寸長汁根火煨一頭  
 平身方卷三  
 小兒通病



出津拭淨浸乳中取乳滴口中甚妙  
小兒齒遲○或入麝香少許尤妙  
小兒流涕○是風寒也白芷末葱白搗丸小豆大每茶下

小兒流涎○仍以白芷末姜汁調塗太陽穴食熱葱粥取汗  
一錢二分○為末姜汁丸麻子大每溫水服五九○脾熱

也○胸膈有痰新桑根白皮搗白汁塗之甚效乾者煎水  
小兒○白羊屎頻納口中○脾熱也鹿角稍末米飲服一字

小兒○項軟○乃肝腎虛風邪襲入用附子去皮臍天南星  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸  
小兒○龜背○為末姜汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

肚○皮青色○然○不速治須臾死胡粉搗熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○  
小兒○腹脹○胡粉鹽熬色變以摩腹上○

小兒

小兒

小兒



平易方卷三

初生鎖肚○由胎熱結于肛門兒生之後腸而不通三

日者急令婦人嘔兒前後心手足心並臍七處四五次

以應初半錢少許溫水化開時時與少許以通為度

小兒亦傳之○即用清水和髮灰傳之不可傷水臍溼不乾

小兒腸氣痛○地龍糞以薄荷汁和塗之

盤腸氣痛○延胡索茴香等分炒研空心米飲量兒大小

與服○用葱湯洗兒腹仍以炒葱搗貼臍上良久尿出

痛止○用蘿蔔子炒黃研末乳香湯服半錢○沒藥乳

小兒疝氣○為末以木香磨水煎湯調一錢服立効

香等分○并內釣腎氣以葛袋盛盛于戶口懸之父母

用手撚料盡即愈○腹痛大出汗出用梨葉濃煎七合分

作數服飲之大良○冷疝氣痛膚囊浮腫金鈴子去核

五錢吳茱萸二錢半為末酒糊丸黍米大每鹽湯下二

小兒卵癰○作痒用桃仁炒香為末酒服方寸七日二仍

小兒蝨痛○棟木皮削去蒼皮水煮汁量大小飲之○用

棟根皮同雞卵煮熟空心食之次日或下○口流涎沫

使君子仁為末米飲五更調服一錢○虻痛五分溫服末

二錢靈礬火飛牛錢每服一錢水一碗煎五分溫服當

吐虫愈○疳癰小兒大便秘不通并驚熱痰實欲得瀉

小兒閉結○酒浸炒郁李仁去皮研各一錢滑石末一兩

動者大黃酒浸炒二歲小兒仁去皮研各一錢減白湯下○葱

搗和丸黍米大二歲小兒仁去皮研各一錢減白湯下○葱

白三根煎湯調生蜜阿膠末服仍以葱頭染蜜挿入肛

門少頃即通○積壳煨去穰甘草各一錢調服以水調煎服

小兒脫肛○荆芥皂角等分煎湯洗之以鉄漿塗上亦治

子宮脫出○唇白齒焦久則兩頰光眉赤唇焦啼哭黃

瓜萎一個入白礬五錢在內固濟煨存性為末糊丸梧

子大每米飲下二錢五分○五倍子為末先以艾紙捲倍

子末成筒放便桶內以瓦盛之令病者坐于桶上以火

點着使藥烟熏入肛門其肛自復脫

小兒下血○尿血甘草一兩二錢水六合煎二合一歲兒

小兒通病

二百五十二

平易方卷三



小兒尿血。蜀升麻五分，水五合煎一合服之。一歲兒一  
小兒陰潰。腫大不消，礪砂一分，水研。更硫黃各半兩同  
小兒腎縮。乃初生受寒所致，用吳茱萸汁入輕粉末和六  
小兒陰腫。陰囊忽虛熱腫痛，生甘草汁入輕粉末和六  
一兒陰腫。陰囊忽虛熱腫痛，生甘草汁入輕粉末和六  
熱者雞子清調，或加牡蠣少許。陰被蚯蚓呵腫，令婦  
人以吹火筒吹其腫處，立消。多因坐地風襲及虫蟻  
所吹用蟬蛻半兩煎水，洗仍服五苓散，即腫消痛止。  
小兒陰瘡。入尿灰傳之，日夜啼叫愈而復作，老杉木燒灰  
小兒囊腫。赤痛退皮，日夜啼叫愈而復作，老杉木燒灰  
小兒諸瘡。惡瘡禿瘡，蠅蝮瘡，浸淫瘡，並宜棟樹皮或枝  
小兒燒灰。傳之乾者，猪脂調。惡瘡浸淫瘡，並宜棟樹皮或枝  
小兒疔瘡。凡小兒每年六月六日照命，髓出熱塗之。  
預免瘡癩。凡小兒每年六月六日照命，髓出熱塗之。

小兒尿血。蜀升麻五分，水五合煎一合服之。一歲兒一  
小兒陰潰。腫大不消，礪砂一分，水研。更硫黃各半兩同  
小兒腎縮。乃初生受寒所致，用吳茱萸汁入輕粉末和六  
小兒陰腫。陰囊忽虛熱腫痛，生甘草汁入輕粉末和六  
一兒陰腫。陰囊忽虛熱腫痛，生甘草汁入輕粉末和六  
熱者雞子清調，或加牡蠣少許。陰被蚯蚓呵腫，令婦  
人以吹火筒吹其腫處，立消。多因坐地風襲及虫蟻  
所吹用蟬蛻半兩煎水，洗仍服五苓散，即腫消痛止。  
小兒陰瘡。入尿灰傳之，日夜啼叫愈而復作，老杉木燒灰  
小兒囊腫。赤痛退皮，日夜啼叫愈而復作，老杉木燒灰  
小兒諸瘡。惡瘡禿瘡，蠅蝮瘡，浸淫瘡，並宜棟樹皮或枝  
小兒燒灰。傳之乾者，猪脂調。惡瘡浸淫瘡，並宜棟樹皮或枝  
小兒疔瘡。凡小兒每年六月六日照命，髓出熱塗之。  
預免瘡癩。凡小兒每年六月六日照命，髓出熱塗之。

二百五十三



小兒生瘡○滿身面如火燒以黃梁米研粉和蜜水調之

小兒瘡○葵根燒末傅之○蟾蜍炙研末傅之即瘡

小兒風瘡○艾葉燒灰傅之良○初起腫漿似火瘡桃仁

爛瘡浸淫○頭面耳邊連引流水極痒久久不愈者蛇床

子兒甜瘡○頭面三錢為細末油調擦之○生于面耳令母

小兒膿瘡○遍身不乾用黃蘗末入枯礬少許搽之即愈

小兒熱瘡○身面皆有用楓香為膏攤貼之

一團如梨子大雞子黃十個煮熟同于銚內熬至甚乾

始有液出旋置盞中液盡為度用傅瘡上即出立瘡○

小兒取舊絹作衣化烏相油塗之與兒穿着次日至皆出油上

取下熅之有聲是也別以油衣與穿以至盡為度

小兒服月餘自愈○瘡起于口內延及遍身以土萼藤末乳汁調

小兒風癬○白礬燒投熱酒中馬尾拭酒塗之

小兒疥癬○藁本煎湯浴之并以浣衣○白膠香黃蘗輕

粉兒生癬○猪脂和輕粉傅之○蛇床子杵末和猪脂塗

之○小兒頭生瘡于手爬處即延生謂之胎癬以葱塩

湯洗淨用桑木蛙屑燒存性入輕粉等分油和傅之○

小兒燥瘡○一名爛瘡燒鉄淬水中二七遍浴之二三起

小兒淫瘡○地榆煮濃汁日洗二次○小兒天泡淫瘡將

小兒百合花暴乾研末菜子油塗良○刺薊葉水調傅乾易

小兒軟瘡○油麻炒焦乘熱嚼爛傅之○大枳壳一個去

白磨口平以麪糊抹邊合瘡上自出膿血盡更無痕也

○桑螵蛸燒存性研末油調傅之○用鬼眼睛即瘡上

平易方卷三











驚風不醒○白烏骨雄雞冠血抹唇上即醒

小兒驚邪○安息香一豆許燒之自除

小兒驚竄○兩眼看地不上者皂莢燒灰以童便浸刮屎

柴竹用火烘乾為末貼其顛門即醒

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四

小兒驚○以蕉芭汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顛門塗四



















小兒久疳○虛證不食諸病後天柱骨倒鑿者不識謂之

氣委疳瘡○多年不愈者應効散又名拔裏散用地骨皮

冬月者為末每用紙捲入瘡內頻用自然生肉更以

米飲服二錢一日三服

疳瘡成漏○膿水不止用羊羔兒骨鹽泥固濟煨過研末

疳五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必合

疳疳食上○及生物研綠礬末猪胆汁丸菜豆大每米飲

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

疳疳積生虫○雷丸檳榔各一錢黑丑頭末五分使君肉五

痘疹門

痘疹即醋在蘇松曰沙子江右湖廣曰麻山陝

不出天花○錢真麝香五釐先將砂磨香研為極細末後

飛淨一錢真麝香五釐先將砂磨香研為極細末後

入天麻子共研為膏于五月五日午時擦小兒頭項心

前心背處左右手心左右脚底心兩臂灣兩脚灣兩脇

共十三處俱要擦到不可失落一處本年擦過一次則

出痘不過數粒如次年再擦一次永遠不出天花未過

週歲小兒于七月七日九日依法擦之更妙凡男

女治法皆同眼見傳方之家不出天花三代矣

預解痘毒○時行暄暖恐發痘瘡同生麻油三代小盞水一

盞旋旋傾入油內柳枝攪稠如蜜每服二三次小盞水一

二合服此末發內消已發稀少用生球犀角各磨汁一

時服此末發內消已發稀少用生球犀角各磨汁一

合和勻溫服半合日三服最良○李氏用雞卵一枚童

便浸七日水煮食之永不復發○初生小兒三日以

許○白水仙帶燒灰以乳調服可免痘患或入砂少

許○白水仙帶燒灰以乳調服可免痘患或入砂少







為安宜用保元湯加減主之此方原出東垣治慢驚土  
助陰陽作爲膿水其證雖異其理則同去白芍藥加生  
姜改名保元湯灸黃芪三錢人參二錢炙甘草一錢生  
光澤頂陷不起也既出雖起慘色不明也漿行色灰不  
榮也漿定光潤不消也漿老溼潤不凝也結痂而胃弱  
內虛也痂落而口渴不食也痂後生癰腫也癰潰而  
飲遲也凡有諸證並宜此湯或加芎藭加官桂加糯米  
以助之也○痲痘倒陷毒氣壅遏于裏則爲便血昏睡  
不醒其證甚危用抱山雞子壳去膜新瓦焙研每服半  
錢熱湯調下嬰兒以酒調抹唇舌上并塗風池胸背神  
效  
痘瘡狂躁○心煩氣喘妄語或見神鬼捨色赤未透者用  
龍腦一錢細研旋以猪心丸焚子大每服一丸紫草  
湯下少時神定得睡瘡發○用獐猪第番血清半盞  
酒半盃和勻入龍腦一分溫服良久利下痰血一二行  
痘即紅活此治痘瘡黑靨惡症發所不治者百發百中

痘瘡狂亂○循衣摸床大熱引飲用益元散加硃砂三錢  
冰片三分麝香一分每粒草湯下二三服  
小兒痘疔○雄黃一錢紫草二錢爲末胭脂汁調先以銀  
簪挑破搽之極妙兼治痘毒潰爛以真麻油調柏根末以  
青油調搽○四五日用肥猪膽一塊水煮熟切如豆大與  
痘瘡自然膿腐滋潤痂疔易落無損于兒  
痘瘡疥蝕○膿水不絕用出子蠶蛾齒以生白礬末填滿  
痘瘡作痒○末擦之甚効  
痘瘡不落○房中宜燒茶烟恒熏之○難忍抓成瘡及痘  
欲落不落○百花膏用上等石蜜不拘多少湯和時時以  
翎刷之其瘡易落自無痕痕○蟬蛻三七散對準灸各  
痘瘡生蛆○嫩柳葉鋪席上卧之蛆盡出而愈也  
痘瘡嘔氣○半夏泡七次一升生薑半升水煮分服  
痘瘡乾黑○凡困者山檀爲末紫草煎酒調服一錢  
痘瘡變黑○歸腎用竹園蔓草煎酒燻其身即發起○痘  
瘡周密盛則變黑者用生豬猪血一盞身龍腦半份温  
痘疹  
二百六十四







痘後毒○赤小豆末雞子白調塗傅之○初起以三豆

膏治之神效○赤小豆末雞子白調塗傅之○初起以三豆

小兒痘毒○白丁為末入麝香少許米飲服一錢

痘服之○大劫○黑陷者用桃膠煎湯飲之或水熬成膏酒化

痘不粉一錢○痘瘡痂死不落滅癩方用羊髓骨髓煉一兩

痘瘡瘰癧○雞子一個酒醋浸七日白僵蚕二枚和勻

○羊脂二錢○甚効○蜜陀僧二兩細研人乳調夜塗旦洗

○豬蹄湯洗去○黃明膠炒研末酒服一錢已出服之無

痘毒入心○斑豆始有白泡忽搐入腹漸紫黑色無膿口

夜叫亂者○鬱金一枚甘草二錢半水半碗煮乾去甘草

五片焙研為末入真腦子炒半錢每用一錢以生豬血

如癰狀乃瘥此乃五死一生之候也

防痘入目○胭脂嚼汁點之○白芥子末水調塗足心引

斑疹不快○鈎藤鈎子紫草茸等分為末每服一字或半

頂解痘疹○時行瘡疹正發服此則可無患茜根煎汁入

嬰童疹○三四日隱隱將出未出色赤便閉者紫草二

兩到以煎湯一盞泡其勿泄氣待溫時服半台其瘡

雖出亦輕大便利者勿用煎服亦可○時出不快壯熱

狂躁服牛蒡子炒一錢二分荆芥穗二分甘草節四分

者勿服同煎至七分溫服已出亦可服名必勝散○猪

水一盞同煎至七分溫服已出亦可服名必勝散○猪

斑痘煎汁洗之○斑痘服涼藥多手足厥冷脈微用乾姜炮二

錢半粉甘草炙一錢半水二鐘煎一鐘服

小兒斑疹○髮灰飲服三錢

鹽二大兩同研絞汁以熱手摩塗日再上之

痘疹

二百六十六



痘疹入目

○仙靈皮威靈仙等分爲末每服五分米湯下

○生翳障用白菊花穀精草菘菜豆皮等分爲末每用一

錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮候泔盡食柿日食

三枚淺者五七日遠者半月見効○白柿日日食之良

○雞子壳燒研入片腦少許點之○猪蹄爪日食之良

湯濾淨洗之甚効○生醫用鬼尿日乾爲末每服一錢

茶下即安

咽喉痘疹○牛蒡子二錢桔梗一錢半粉甘草節七分水

煎服

痘疹生醫○黃丹輕粉等分爲末吹少許入耳內左患吹

右患吹○臙渣淚出久而不退用穀精草爲末以

柿或猪肝片蘸食一方加蛤粉等分同人猪肝內煮熟

日食之○蟬蛻爲末每服一錢羊肝煎湯下日二○半

年以上者一月取効一年者不治用猪懸蹄三兩瓦煎

固濟煨蟬蛻一月兩冷羊角一分爲末每服一字三歲以

上三錢溫水調服日三○蛇蛻一條洗焙天花粉五分

爲末以羊肝夾藥縛定米泔水煮食

痘瘡虛證○凡百病在目者以雞舌香黃連乳汁煎注之

通神散○此得辛散苦降養陰之妙

末每用一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮乾食柿

扁鵲三豆飲○治天行痘瘡預服此飲疎解熱毒縱出亦

少用菜豆赤小豆黑豆各一升甘草節二兩以水入

升煮極熟任意食豆飲汁七日乃止

四聖丹○治小兒痘中有疔或紫黑而大或黑壞而臭或

中有黑線此症十死八九粒燒存性頭髮灰三分真珠十

之粒炒研爲末以油蒸脂用杵成膏先以簪挑疔破啞

去惡血以少許點之即時變紅活色

陰陽二血丸○治小兒痘瘡未出者稀已出者減用鹿血

黃連各五錢砂麝香一錢爲末煉蜜丸茶豆大每服

十丸空心酒下見小者減之

希痘法○冬至屋內掘坑埋雞蛋十五個立春取起菜豆

湯每日煮食一個依法服三年終身不出惟此甚應

二百六十七



疹

疹大畧論○疹熱六日而透發三日而漸退及既出諸證

悉解此極輕者淡紅潤而淨而多者亦輕若頭

而不出者紅紫燥者咽腫痛不食者冒風沒早者

移熱大腸變痢者俱重黑黯乾枯一出即沒者鼻翳口

張目無神者鼻清糞黑者氣喘心前吸者皆不治紅影

出切戒風寒生治既出熱甚此毒盛也疹毒嗽多而散

疹後旬日之內不可治嗽不出疹有五六日不飲食只宜

治疹自起至收皆喜飲涼不必禁但宜少宜頻白汗鼻

賦魚炒須止惟五辛太多咽痛勿妄針刺出後忌雞魚油

醋癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

痘錢醋成毒○麻油調敷初起可消已成即潰潰後疹六一散

一炷香飯後隨飲外以蓋酒浸桃葉擦之屢試驗

二錢生地香附各三錢白芍黃芩各錢半紹酒兩壺蒸

醋癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也

癩藥酒○上乾白者水煎服之即透發矣俱回生妙法也



