


紙 〇
606
4止



門 武 9
606
4 止

平易方卷四

頭病門

上部

頭上生虱○水銀和蠟燭油揩之○一夜皆死○銀硃浸醋
 之日梳頭○又包銀硃紙以盥覆燒之○茶清洗下烟子搽
 之○包頭○元夜至旦虱盡死○胆中陰乾水調一字吹鼻中
 頭風熱痛○元精石末入羊胆中○頭痛欲裂當歸二兩酒
 立止○煮取六合飲之○日再服○荆芥穗石膏等分爲末
 一升○煮取六合飲之○頭風久痛○煎艾揉爲丸時時嗅之
 每服二錢茶調下○頭風掣痛不可忍○者磨膏主之○取牛
 以黃水出爲度○頭風無灰酒一升○極力令熱乃効
 莠莖葉搗取濃汁○二升無毒自散○時須極力令熱乃効
 煎桐成膏○以摩痛處○風毒自散○時須極力令熱乃効
 冬月用根○以○决明子炒研茶調塗兩太陽穴○乾則易之
 一冬月用根○以○决明子炒研茶調塗兩太陽穴○乾則易之
 偏頭風病○愈○用雄山豆根○辛末油調塗兩太陽穴○乾則易之
 吹右右痛○吹左○京芎細劉浸酒日飲之
 一字吹鼻左痛

二百六十八

偏正頭風 ○防風白芷等分為末煉蜜丸彈子大每嚼一

丸茶清下 ○不可忍者元胡索七枚青黛二錢牙皂二

個去皮子為末水和丸如杏仁大每以水化一丸灌入

病入鼻內隨左右口咬錘錢一個當有涎出成盆而愈

○百藥不治一服便可天下第一方也香白芷炒二兩

五錢川芎炒甘草炒烏頭半生半熟各一兩為末每

服一錢納茶薄荷湯調下 ○生薑薑汁一蜆壳仰臥隨

左右注鼻中神效 ○天陰風雨即發柱心末一兩酒調

于額上及頂上 ○并夾頭風連兩太陽穴痛用白僵蚕

為末葱茶調服方寸匕 ○久不除者晴明時將髮分兩

用麝香五分皂角末一錢薄紙裹置患處以布包炒鹽

于上熨之冷則易如此數次永不復發

頭痛欲死 ○消石末吹鼻內即愈

少陽頭痛 ○亦治太陽頭痛不拘偏正小清空膏用片黃

風寒頭痛 ○傷風傷寒頭痛發熱初覺者馬蹄香為末每

服一錢熱酒調下少頃飲熱茶一盃催之出汗即愈

氣虛頭痛 ○真川芎藭為末臘茶調服二錢甚捷曾有婦

人產後頭痛一服即愈 ○氣虛頭痛用大附子一枚

去心入去頭尾足全蠶三個在內以餘附末同鍾乳粉

二錢半麪和包煨熟葱汁丸梧子大椒鹽湯下五十九丸

氣厥頭痛 ○婦人氣盛頭痛及產後頭痛川芎藭天台烏

藥等分為末每服二錢葱茶調下 ○不拘老少產後鈇錘

藥川芎藭等分為末每服二錢蠶茶清調下產後鈇錘

燒紅淬酒調下

風氣頭痛 ○不可忍者乳香蓖麻仁等分搗餅隨左右貼

太陽穴解髮出氣甚驗 ○蓖麻油紙剪花貼太陽亦效

○又方蓖麻仁半兩棗肉十五枚搗塗紙捲筒插入

鼻中下清涕即止

風毒頭痛 ○二三十年頭風不愈者用大川烏頭生去皮

四兩天南星泡一兩為末每服二錢細茶三錢薄荷七

葉鹽梅一個水一盞煎七分臨卧温服 ○治頭痛連睛

者生鳥頭一錢白芷四錢為末茶服一字仍以末嚙鼻

有人用之得効

濕熱頭痛 ○甜瓜蒂末嚙入鼻中口含冷水取出黃水愈

氣鬱頭痛 ○用香附子炒四兩川芎藭二兩為末每服二

平易方卷四 頭痛

錢臘茶清調下常服除根明目
痰厥頭痛○牛蒡子炒旋覆花等分爲末臘茶清服一錢

四錢冷服○如破厥氣上衝吐即愈忌豬肉冷水

頭痛發汗○高良姜生研頻噓
頭痛發汗○莢薛旋覆花虎頭骨酥炙等分爲末欲發時

以溫酒服二錢暖卧取汗立瘥
風痰頭痛○不可忍天南星一兩荆芥葉一兩爲散姜汁

糊丸梧子大每食後姜湯下二錢丸○不可忍卮子末

和蜜濃傅舌上吐卽止
時氣頭痛○發熱者以連根葱白二錢炒和米煮粥入醋

少許熱食取汗卽解
一切頭痛○香白芷洗晒爲末煉蜜丸彈子大每嚼一九

以荆芥湯下凡女人胎前產後傷風頭痛皆効

卒病頭痛○皂角末吹鼻卽愈○礬蚕末每服一錢煖
諸病頭痛○藜蘆一莖日乾柳末入麝香少許吹鼻○又

方通頂散藜蘆半兩黃連三分噉鼻
頭風頭痛○附子一枚生去皮臍豉豆一合同入銚子內

煮豆熟爲度去附子食棗豆立瘥每個可煮五次後爲末服之○用豆淋酒蜜封七日溫服○頭風痛柚葉同

葱白搗貼太陽穴○蔓荊子爲末酒浸七日飲三次

女人頭痛○香附子末茶服二錢日三五服

頭眩痛○片腦一錢紙捲作燃燒烟熏鼻吐痰涎愈

眉眶骨痛○屬風熱有痰白芷黃芩酒炒等分爲末每服

二錢茶下○熱毒攻眼頭痛眉痛壯熱不止解毒子木

香川大黃各三分爲末漿水調膏攤貼乾卽易之

八種頭風○三次見効半夏末入百草霜少許作紙燃燒

烟就鼻內喘之口中含水有涎吐出再含

頭面諸風○香白芷切以薑酒汁浸透日乾爲末每服二

錢白湯下或以噉鼻○眼瞶鼻塞眼出冷淚用杏仁三

升研細水煮四五沸洗頭持冷汗盡三度愈

頭風眼○蕎麥作錢大餅貼眼四角以米艾炷灸之

頭卽効如神
頭風長冷○一人頭風首裹重綿三十年不愈以蕎麥粉

年二升水調作二餅更互合頭上微汗卽愈

年久頭風○川烏頭天南星等分爲末葱汁調塗太陽穴

二百七十

頭忽眩暈○菜蔬子生薑等分搗汁入麝香少許嗜入鼻中立止
白太三斤○經夕不瘥四體漸羸飲食無味好食黃土用
日三服忌食桃李青魚○頭眩暈甚則屋轉眼黑或
如物飛或見一為二用鹿茸半兩無灰酒三盞煎一盞
入麝香少許溫服亦効蓋茸生于頭類之相從也
諸風頭暈○蒼耳藥晒乾為末每服一錢酒調下日三服
若吐則以密丸梧子大每服二十丸十日全好矣
風痰頭暈○目眩吐逆煩滿飲食不下生南星生半夏各
一兩天麻半兩白麩三兩為末水丸梧子大每服三十
丸以水先煎沸入藥煮五七沸漉出放溫以姜湯吞之
血風腦暈○婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人
事者用蒼耳草嫩心陰乾為末以酒服一錢甚効
頭項風強○八月後荆芥穗作枕及鋪床下立春日去之
雷頭風腫○雷頭風證頭面疙塔腫痛憎寒發熱狀如傷
寒病在三陽不可通用寒藥厚湯無過一人病此
諸藥不効用荷葉一枚升麻五錢蒼木五錢煎服立愈
頭核腦痺○頭枕後生痰核正者為腦側者為痺用輕灰

白浮石燒存性為末入輕粉少許麻油調搽塗之勿用
腦風流涕○邪風入腦鼻內結硬遂流髓涕白南星切片
泡二次焙乾每用二錢棗七個甘草五分同煎服三四
服其硬物自出腦氣流轉涕自收以大蒜葦莖末作
餅隔紙貼額前熨斗熨之或以香附葦莖末頻吹鼻內
頭風流涕○頭風鼻流清涕此把葉同辛夷等分研水酒
服二錢日三服
頭面忽腫○熱毒風氣內攻或連手足赤腫觸着痛者牛
蒡子根名蝙蝠刺洗淨研爛酒煎成膏絹攤貼腫處仍
以熱酒服一二匙腫消痛減
頭暈吐逆○胃冷生痰也用川乾姜炮二錢半甘草炒一
錢二分水一鐘半煎減半服用有效
頭腦鳴響○狀如虫蛙名大白蟻以茶子為末吹入鼻中
取効
大頭風○用大蒜十個先燒紅地以蒜逐個於地上磨成
膏却以僵蚕一兩去頭足安蒜上碗覆一夜勿令洩氣
只取蚕研末每用嗜鼻口內含水有效

頭面耳瘡○脂麻生嚼傳之○眉癬燕窩瘡並用肥皂燻
 頭存性一錢枯礬一分研勻香油調塗之
 頭腫如斗○有人服附子酒多頭腫如斗唇裂血流急求
 髮毛毒瘡○生頭中初生如蒲桃痛甚黃蘗一兩乳香二
 錢半為末槐花煎水調作餅貼于瘡口
 頭目悶痛○凡人頭目悶痛用荻葉插入鼻內二三寸并
 耳內氣通即便清爽也
 一品丸○治熱氣上攻頭目昏眩及治偏正頭痛大香附
 子去皮水煮一盞煎入分服女人醋湯煎之
 頭風摩散○沐頭中履多汗惡風當先風一日則痛甚大
 附子一個炮食鹽等分為末以方寸匕摩顛上令藥力
 行或以油調稀亦可一日三上
 白菊酒○天寶單方治丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮
 乾落胸中痰壅每發即頭旋眼昏不覺欬倒者是其候
 也先灸兩風池各二七壯并服此酒及散永瘥其法春
 末夏初收白菊軟苗陰乾搗末空腹取一方寸匕和無

灰酒服之日再服漸加方寸匕若不飲酒者但和羹
 粥汁服亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹
 袋盛貯三大斗酒中經七日服之日三次常令酒氣相
 續為佳
 頭痛不止○楊梅為末以少許噴鼻取嚏妙
 風虛頭痛○欲破者杏仁去皮尖曬乾研末水九升研濾
 汁煎如麻腐和粥食七日後大汗出諸風漸滅須慎風
 冷忌猪雞魚蒜醋等
 鼻衄頭痛○石膏牡蠣為末每新汲水服二錢并滴鼻內
 頭痛連睛○鼠粘子石膏等分為末茶清調服
 頭風化痰○川芎晒乾為末蜜丸小彈大常嚼一丸茶下
 女頭運○天地轉動名曰心眩非血氣也膽子礬一兩
 細研用胡餅劑子一個按平一指厚以葶子勒成散子
 大塊勿界斷于瓦上焙乾每服一散子為末灯心竹茹
 湯調下
 女人頭風○攻目作痛用天南星一個掘地坑燒赤安藥
 于中以酒醋一盞沃之蓋定勿令透氣候冷研末每服一
 字以酒調下重者半錢
 頭病

頭風掣痛○用蠟二斤鹽半斤相和于鏹羅中溶令相入
 捏作一塊蓋勢可合腦大一小空頭至額其痛立止也
 頭風腦痛○百靈藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三斗
 作飯候冷拌神麴炒末九兩同入甕中如常釀酒經三
 五日更炊糯米冷投之待熟澄清每温飲一小盞服後
 渾身汗出為効
 洗頭風痛○新通草五錢煨存性研末二錢熱酒下牙關
 緊者幹口灌之
 洗頭去風○明目用槐子皮皂角胡餅菖蒲同搥碎漿水
 調作彈子大每用泡湯洗頭良
 痰熱頭風○懸括萎一個赤雹兒七個焙牛蒡子焙四兩
 為末每食後茶或酒服一個赤雹兒七個焙牛蒡子焙四兩
 頭風溼痺○筋擊膝痛胃中積熱大便結澀用大豆黃卷
 炒一升酥半兩為末食前温水服一匙日二服
 頭目風熱○上攻用龍腦末半兩南蓬砂末一兩頻噴兩
 鼻
 頭風旋腫○及偏正頭痛多汗惡風胸膈痰飲川芎二斤
 天麻四兩為末煉蜜丸如彈子大每嚼一九茶清下○

痰逆惡心懶食真零陵香薷香葉莎草根炒等分為末
 每服二錢茶下日三服○蟬殼一兩微炒為末不時酒
 下錢白湯亦可
 淫熱眩暈○不可當者酒炒大黃為末茶清服二錢急則
 治其標也
 風痰眩暈○頭痛氣鬱胸膈不利白附子泡去皮臍半斤
 石膏煨紅半斤珠砂二兩二錢半龍腦一錢為末粟米
 飯丸小豆大每服三十丸食後茶酒任下
 頭風白屑○藥本白芷等分為末夜擦且梳垢自去也○
 雞蘇煮汁或燒灰淋汁沐之○山豆根末浸油日塗之
 頭風癩木○用臘月烏雞矢一升炒黃為末絹袋盛漬三
 升酒中頻頻温服令醉
 頭皮虛腫○薄如蒸餅狀如裹水以口嚼麩傅之良
 腦泄鼻穢○草烏去皮半兩蒼朮一兩川芎二兩並生研
 末麩糊丸菜豆大每服十丸茶下豆一切熱物○破瓢
 白雞冠花白螺蛳殼各燒存性等分入罇麝香各五分
 為末以好酒酒溼熟艾連藥搗成餅貼在頂門上以熨
 火熨之以愈為度

頭痛

頭旋腦腫○三月收松花並薑五六寸如鼠尾者蒸切一

升以生絹囊貯浸三升酒中五日定心煖飲五合

目赤頭眩○眼花面腫風熱上沙用懸魚子甘草炙菊

花焙各一兩為末每服二錢時時溫水下

風熱衝頂○熱悶詞黎二枚為末芒硝一錢同入醋中攪

令消磨塗熱處

風熱頭痛○山豆根末油調塗兩太陽

丹石毒發○頭眩耳鳴恐懼不安淡竹瀝頻服二三升

頭瘡面癩○使君子仁以香油少許浸三五個臨卧時細

嚼杏仁油送下久久自愈

頭風斧劈○難忍川烏頭末煖酒蒸礬白濕茶炮服之

灌頂油法○治腦中熱毒風除目中翳障鎮心明目生油

二斤故鐵鏢五兩打碎硝石半兩寒水石一兩馬牙硝

半兩曾青一兩綿裹入油中浸七日每以一錢頂上摩

之及滴少許入鼻內甚妙

老少頭眩○新得良方上炒當歸二錢焦白朮一錢五分

酒炒川黃連五分廣皮四分舊芭蕉扇燒灰一錢煎服

面病門

面上黑子斑○每夜以煖漿水洗面以布揩赤用白檀香

磨汁塗之○蒼耳葉焙為末食後米飲調服一錢一月

愈○原荻煎湯日日洗之

黑子疣贅○續隨子熟時塗之自落

粉滓面黥○雲母粉杏仁等分為末黃牛乳拌晷蒸夜塗

旦洗○白石脂六兩白斂十二兩為末雞子白和夜塗

旦洗○兔絲子苗絞汁塗之不過三上

面黥風瘡○香附子甘松各四兩黑牽牛半斤為末日用

洗面

面黥好胞○枸杞子十斤生地黃三斤為末每服方寸匕

溫酒下日三服久則童顏○鹿角尖磨濃汁厚塗之

面上雀斑○三奈子鷹糞蜜陀僧蓖麻子等分研勻以乳

汁調之夜塗旦洗去

面上癩癬○取鉄掃帚地上自落葉并子煎湯頻洗數次

白消○蒺藜子山巵各一合為末醋和夜塗旦洗

少年面皯○用紫背浮萍四兩防已一兩煎濃汁洗之仍

二百七十四

以萍于斑點上熱擦日三五次物雖微未其功甚大

面飽鼻鼓○馬齒煎湯日洗之佳

鼻上疥癩○鷹屎白二分胡粉一錢蜜和傅之

鼻赤酒皴○白鹽常擦之妙

面上惡瘡○五色者鹽湯浸綿湯瘡上五六次即瘥○柳

或膩粉等分以灯蓋油調塗○惡瘡不可名識者柳葉

頭風面瘡○痒出黃水艾三兩醋一升砂鍋煎取汁每薄

紙上貼之○一日二三上

面上風瘡○枇杷葉厄子各等分爲末每服二錢溫酒調

下日三服○鹿角尖磨酒塗之

肺風面瘡○起白屑或微有赤瘡蓖麻子仁四十九粒白

藥膠棗各三枚瓦松三錢肥皂一錢并燒灰等分油調搽

肺熱面瘡○苦絲瓜牙皂並燒灰等分油調搽

婦人頰瘡○每年頻發水銀一兩半以猪脂揉擦令消盡

人黃礬石末二兩胡粉一兩再以猪脂令和如泥洗瘡

淨塗之別以胡粉塗膏上此甘家秘方也

面三婦面點○產婦面如雀卵色以羊胆者煎細辛等分煎

百頰赤痒○其狀如沸以杏仁研末等分蜜調傅之○白茯苓

末蜜和夜○桃花冬瓜仁研末等分蜜調傅之○白茯苓

腮熱腮腫○絲瓜燒存性研末不調搽

腮癰○多食荔枝可愈

面身癩痕○眞玉日日磨之久則自滅○黃礬石燒令汁

生布措令痛乃塗藥五分細末以臘月猪脂和研如泥以

消滅癩痕○雞子五七枚煮熟取黃炒黑搽塗日三久久

自滅○鷹矢白○面病

二百七十五

面身先日○苦酒浸石灰六日取汁頻滴之自落○艾
火灸三壯即愈○醋調南草末塗之
婦人面瘡○名粉花瘡以定粉五錢菜子油調泥碗內用
艾一二團燒烟熏之候烟盡覆地上一夜取出調搽永
無痕癢亦易生肉
身面瘡子○白礬地膚子等分煎水頻洗之
面上瘡癩○土瓜根搗末漿水和勻入夜別以漿水洗面
塗藥旦復洗之百日光彩射人會用有效
面皸癩瘡○水調礬灰一盞好糯米全者半搗灰中半在
灰外經宿米色變如水晶生以針微撥動點少許于上
疣瘡○石灰一兩用灰淋汁熬成膏刺破點之
面皸癩瘡○蔓菁研末入面脂中夜夜塗之亦去面皸
身面黑痣○藜蘆灰五兩水一大盞淋汁銅器重湯煮成
黑膏以針微刺破點之不過三次效
時行腮腫○柏葉汁調蚯蚓泥塗之
疔腮腫痛○醋調石灰傳之○取小豆七七粒為末傳之
身面赤疵○常以銀指令熱久久自消

金臘瘡蝕○初生如米豆久則穿蝕用雞內金焙鬱金等
分為末盥漿漱了貼之忌米食
鼻面紫風○乃風熱上攻陽明經絡亦治風刺癢疹船上
疏黃枯白礬等分為末每以黃丹少許以津液和塗之
一月見功○紫堯或錢大面上俱有野大黃四兩取汁
穿山甲十片燒存性川椒末五錢生薑四兩取汁和研
生絹包擦如乾入醋潤溼數次如初屢效
身面丹腫○如蛇狀以兩滴階上苔痕水塗蛇頭上即愈
虛胞面腫○積年氣上如水病但脚不腫用穀楮葉入兩
以水一斗煮取六升去滓納米煮粥常食忽絕
走馬疳蝕○透骨穿腮生南星一個當心剉空入雄黃一
塊麩裏燒候雄黃作汁以蓋子合定出火毒去麩為末
入麝香少許拂瘡數日甚効
香瓣瘡○生面上耳瘡浸淫水出久不愈用殺羊鬚荆芥
乾棗肉各二錢燒存性入輕粉每洗試清油調搽
二三必愈
走皮趨瘡○滿頰滿頂浸淫溼瀉延及兩耳痒而水發
歇不定田野名悲羊瘡用靈霄花并葉煎湯日日洗之
二百七十六
面病

解頤脫臼○不能收上南星末姜汁調塗兩頰一夜即上
 女人面黚○用李核仁去皮細研以雞子白和如稀餈塗
 之至旦以漿水洗去後塗胡粉不過五六日効忌見風
 面粗醜黑○皮厚黚黚者猪胰五錢蕪菁子二兩杏仁一
 兩土瓜根一兩淨酒浸之夜塗旦洗老者少者白神
 効○治人面體黚黑皮厚狀醜用殺羊脛骨為末雞子
 白和傅旦以白漿米泔洗之三日常素神効
 女人面脂○滑石輕粉杏仁去皮等分為末蒸過入腦麝
 少許以雞子清調勻洗面畢傅之旬日後色如紅玉○
 命面光華○服三桃花七月七日收雞血和塗面上三二日
 後脫下則光華顏色
 身面癩瘡○紫背草入生礬研傅之二三次斷根
 面黑皴瘡○羚羊牛胆各一枚醋二升同煮三沸頻塗之
 面黚○羚羊牛胆各一枚醋二升同煮三沸頻塗之
 身面白丹○白養瓦末和猪脂塗之
 遠年頭風○摩頭酸疼處筆記之斑毛一個夫頭足翅研
 末以蜆殼蓋紫好起泡針刺出水痛止惟血虛者忌用

眼目門

眼睛突出○一二寸者以新汲井泉水灌漬睛中數易之
 自入
 睛痛連眉○夏枯草治日珠疼至夜則甚者神効以夏枯
 草二兩香附二兩甘草四錢為末每服一錢半清茶調
 服下咽則疼減半至四五服愈矣
 目中翳膜○生辰砂一魂日擦之自退○東壁土細末
 入蜜少許水煎服大人小兒皆宜屢驗○枸杞葉車前
 葉二兩搗汁以桑葉裹懸陰地一夜取汁點之不過三
 五度○有淚肝經有熱也用青羊子肝一具竹刀切和
 黃連四兩為丸梧子大食遠茶清下七十九日三服忌
 鐵器猪肉冷水○慈石法水色黑而入腎故治腎家諸
 病而通耳明目一士頻病目漸覺昏暗生翳時珍用東
 垣菴活勝風湯加減法與服而以磁硃丸佐之兩月遂
 如故蓋磁石入腎鎮養真精使神水不外移硃砂入心
 鎮養心血使邪火不上侵而佐以神翹消
 眼目
 三百七十七

並用溫養脾胃發生之氣乃道家黃婆媒合嬰姪之理
 ○不拘大人小兒黃芩一兩淡豉三兩為末每服三錢
 以熟豬肝裹喫溫湯送下日二服忌酒麪○褚白皮暴
 乾作繩子如釵股大燒灰細研每點少許日三五次瘥
 乃止○遮睛白鹽生研少許頻點屢効小兒亦宜○馬
 牙硝光淨者厚紙裏實安在懷中着肉養膜遠視不明
 研粉入少許龍腦不計年歲深遠眼生翳膜障翳或三
 但童人不破散者並宜日點之○男女內外障翳或三
 五月不見効者一點復明好焰硝一兩銅器鎔化入飛
 過黃丹二分片腦二分銅匙急抄入灌內收之每點少
 許其効如神○穀精草防風等分為末米飲服之甚驗
 ○但童子不破者用杏仁三升去皮麩裹作三包塘火
 煨熟去麩研爛壓去油每用一錢入銅綠一錢研勻點
 之○治傷寒熱毒攻眼生赤白翳用烏鰂魚骨一兩去
 皮為末入龍腦少許點之日三○凡氣虛血虛肝虛眼
 白俱赤夜如雞啄生浮翳者用海蜂殼燒過成灰木賊
 焙各分為末每服三錢用姜棗同水煎和澤通口服每
 日服二次○治目熱生赤白膜以雄雀屎和人乳點之

赤

自爛○五靈脂海螵蛸各等分為細末熱豬肝日蘸食
 ○刀刮爪甲細末和乳點之
 赤眼腫痛○黃丹蜂蜜調貼太陽穴立効○男婦赤眼十
 分重者以山漆根磨汁塗四圍甚妙○用黃連冬青葉
 煎湯洗之○四物湯加大黃酒煎服之○宗奭曰用古
 銅錢刮姜取汁于錢唇點之淚出今日點明日愈勿疑
 ○自己小便乘熱抹洗即閉目少頃此以真氣退去邪
 熱也○檀甘石火煨尿滓風化硝等分為末新汲水化
 一粟點之○萎蕤赤芍葯當歸黃連等分煎湯熏洗○
 决明子炒研茶調傅兩太陽穴乾則易之○煎湯熏洗○
 礬睛雲翳石菖蒲播自然汁文武火熬作膏日點之効
 ○礬濕疼痛甘蔗汁二合黃連半兩入銅器內慢火養
 濃去滓點之○蓮實去皮研末一盞粳米半升以水煮
 粥常食○桑灰一兩黃連半兩為末每以錢泡湯澄
 清洗之○猪胆汁一枚和鹽礬五分點之○目赤熱痛
 看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝一真切洗和五味
 食之

赤目生瘡○作痛道人頭垢二兩乳香一錢每服一錢燒
 平易方卷四 眼目 二百七十八

烟嗜鼻○秦皮一兩清水一升白盤中浸春夏一食頃
以上看碧色出即以筋頭纏綿仰臥點令滿眼微痛勿
畏良久瀝取熱汁日點十度以上不過兩日瘥也

赤目及翳○鉛丹烏賊骨等分合研白蜜蒸點之
赤目失明○內外障翳太陰元精石陰陽火煨石決明各
一兩麩仁黃連各二兩羊子肝七個竹刀切晒為末粟
米飯丸梧子大每臥時茶服二十九服至七日烙頂心
以助藥力一月見効○熱痛乾藍葉切二斤車前草半
兩淡竹葉切三握水四升煎二升去滓溫洗冷即再煖
以瘥為度○女人多之用烏賊魚骨二錢銅綠一錢為
末每用一錢熱湯泡洗

赤目痛○多淚瑣綠一錢麩仁去皮一錢研熟入好酥
一錢研勻每夜點一麻子○三月三日或五月五日採
青蒿花或子陰乾為末每井華水空心服二錢久服明
目可夜看書○白姜末水調點足心甚効○不可忍小
圓瓜瓢離上大如彈子紅色皮上有刺者九月十月采
日乾槐花炒赤芍藥等分為末每瓶二錢臨臥溫酒下
赤目弩肉○日夜痛者取好梨一顆搗絞汁以綿裏黃連

片一錢浸汁仰點之
目生赤脈○貫瞳元參為末以米泔煮豬肝日蘸食之○
元精石一兩甘草半兩為末每服一錢小兒半錢竹葉
煎湯調下

目赤目膜○治目中熱膜明目石蜜和棗肉巨勝末為丸
噲之潤肺氣助五臟生津○龍腦雄雀屎各八分為末
以人乳汁一合調成膏日日點之無有不驗

肝虛目赤○青羊肝薄切水浸吞之極効
肝熱目赤○疼痛用豬肝一具薄切水洗淨以五味食之
○用大田螺七枚洗淨新汲水養去泥穢換水一升浸
洗取起于淨器中着少鹽花子甲內承取自然汁點目
逐個用了放去之

赤目生翳○用蘭香子洗晒每納一粒入皆內閉目少頃
連膜而出也一方為末點之目中不可着塵而此子
可納三五粒亦不妨碍蓋一異也○秦皮一兩水一升
半煮七合澄清日日溫洗一方加滑石黃連等分○枸
杞子搗汁日點三五次神驗○內障五年用洗淨夜明
砂當歸蟬蛻木賊去節各一兩為末黑羊肝四兩水煮

平易方卷四
眼目

爛和丸梧子大食後熟水下五十九丸如法服之遂復明

赤目皆痛○不得開者肝經實熱所致或生障翳用苦竹

瀝五合黃連二分綿裹浸一宿頻點之令熱淚出

睡起目赤○睡起良久如常者血熱也卧則歸于肝故熱

則目赤腫良久血散故如常也用地黃汁浸極米半

升晒乾三浸三晒每夜以米煮粥食一盞數日即愈

赤目腸秘○山巖子七箇鑽孔煨熟水一升煎半升去滓

入大黃末三錢溫服

病後目赤○用青布炙熱以時熨之仍蒸大豆作枕

胎赤爛眼○槐樹枝如馬鞭水長二尺作三段齊頭麻油

一匙置銅鉢中晨使童子一人以其木研之至瞑乃止

令仰臥以塗目日三度瘥○昏暗用蟹虎殼枚以罐盛

黃土按實入蠍虎在內令勿損傷以紙封口穿數孔出

氣候有糞數粒去糞上一點黑者只取一頭白者唾津

研成膏塗眼睫周回不得措拭來早以溫漿水洗三次

甚効

時行火眼○患人每日于井上視井旋匝三遍能洩火氣

○黃藥去粗皮為末溼紙包裹黃泥固煨乾每用一彈

子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸熟乘熱熏洗極効此

方有金木水火土故各五行湯一丸可用二三次○暴

腫地骨皮三斤水三斗煮三升去滓入鹽一兩取二升

頻頻洗點

赤翳攀睛○雄雀屎和首生男子乳點目中弩肉赤脉貫

童子者即消神効○白羊髓傅之○照水丹治眼翳惟

厚者尤効及赤翳攀睛買童人用海螵蛸一錢辰砂半

錢乳細水飛澄取以黃蠟少許化和成劑收之臨卧時

火上旋丸黍米大揉入管中睡至天明溫水洗下未退

再用一次即効

風眼爛眩○倒睫拳毛華陀方用白土一兩銅青一錢為

末每以半錢泡湯洗○用蘆甘石二兩以黃連一兩煎

水入童尿半盞再熬下朴硝一兩又熬成以火煨蘆甘

石淬七次洗淨為末入蜜陀僧末一兩研勻收點之○

明淨皮硝一盞水二盞煎化露一兩濾淨澄清朝夕洗

目三日其紅即消雖半世者亦愈也○青黛黃連泡湯

日洗○時珍曰陳氏經驗方一抹膏治爛眩風眼以真

麻油浸蚕砂二三宿研細以篋子塗患處不問新舊隔

眼目

二百八十

宿即愈。治風眼流淚。燻法。白蘆甘石四兩。火煨。童便
 淬七次。地上出毒三日。細研。每用椒湯洗目。後臨卧點
 三四次。次早以茶湯洗去。甚効。○蘆甘石石膏各一錢
 海螵蛸三分。為末。入片腦麝香各少許。收點。○薄荷以
 生薑汁浸一宿。晒乾。為末。每用一錢。沸湯泡洗。○五味
 子蔓荊子煎湯。頻洗之。○趙太尉母病。爛眩。眼二十
 年。有老嫗云。此中有虫。吾當除之。入山取草蔓荊。嚼
 留汁入筒中。還以皂紗蒙眼。滴汁。漬下。弦轉。盼間。虫從
 紗上出。數日。下弦。乾復。如法。滴上。弦又得。虫數十。而愈。
 後以治人多。驗。乃覆盆子。葉也。蓋治眼妙品。○用麩仁
 四十九個。去皮。胡粉。煨。如金色。一雞子。大研。勻。入酥。一
 杏仁。許。龍腦。三豆。許。研。勻。油。紙。裹。收。每。以。麻。子。許。塗。大
 小。昔。上。頰。用。取。効。○用。五。倍。子。煨。存。性。為。末。入。飛。過。黃
 丹。少。許。傳。之。日。三。上。甚。良。
 風熱目赤。○治一切風熱毒氣。上攻目赤。或爛怕。日。蓋。明
 隱。瀉。膠。淚。或。痒。或。痛。會。青。四。兩。蔓。荊。子。二。兩。白。姜。炮。防
 焙。一。升。生。地。黃。半。斤。取。汁。和。作。餅。晒。乾。研。末。每。服。三。錢。

空。心。酒。服。○人。乳。半。合。古。銅。錢。十。文。銅。器。中。磨。令。變。色。
 稀。稠。成。煎。瓶。收。日。點。數。次。或。以。乳。浸。黃。連。蒸。熱。洗。之。○
 淚。出。不。止。蒜。葉。子。搗。篩。為。末。臥。時。銅。簪。點。少。許。入。目。當
 有。熱。淚。及。惡。物。出。甚。佳。○冬。青。子。不。拘。多。少。搗。汁。熬。膏。
 淨。瓶。收。固。埋。地。中。七。日。每。用。點。眼。○黃。連。二。兩。冬。青。葉
 四。兩。水。浸。三。日。夜。熬。成。膏。收。點。眼。
 風熱目暗。○瀉。痛。車。前。子。宣。州。黃。連。各。一。兩。為。末。食。後。溫
 酒。服。一。錢。日。二。服。
 眼目赤爛。○緊。閉。目。以。熱。湯。洗。之。湯。冷。即。止。頻。沃。取。安。妙
 在。閉。目。或。加。薄。荷。防。風。荆。芥。煎。湯。洗。之。亦。妙。○五。月。取
 老。黃。瓜。一。條。上。開。一。小。孔。去。瓤。入。芒。硝。令。滿。懸。陰。處。待
 硝。透。出。刮。下。雷。點。眼。甚。効。○以。艾。葉。燒。起。用。盥。覆。之。候
 烟。盡。盥。上。刮。下。煤。以。溫。水。調。化。洗。眼。即。瘥。更。入。黃。連。九
 任。○穿。山。甲。一。片。為。末。鋪。白。紙。上。卷。作。繩。燒。烟。熏。之。○
 猪。胆。一。個。銅。錢。三。文。同。置。盞。內。蒸。乾。取。胆。丸。粟。米。大。安
 眼。中。○眼。皮。赤。爛。紋。銀。青。果。二。味。水。磨。濃。汁。和。勻。搽。之。
 拳。毛。倒。睫。○因。風。入。脾。經。致。使。風。痒。不。住。手。擦。日。久。赤。爛。
 拳。毛。入。內。將。木。別。子。仁。髓。爛。以。絲。帛。包。作。條。左。患。塞。右
 眼。目。

鼻右患塞左鼻其毛自發上下次
石斛川芎藜等分為末口內含水
○石燕子一雌一雄磨水點睛
乃點藥後以黃連水洗之
腎脂味甲土炙黃如鼠七次為末
飛絲入口中噙水日用三次二月取
鼻右目塞左鼻百發百中○天絲入目直香油浸舌尖
自然銷化○白菜揉爛帕包滴汁三二點入目即出
頭上白屑少許指之即出○刮爪甲末同津液點之
塵物入目○取出也○磨濃墨點之即出也
根取心搗絞取出汁滴目中○將濃墨點瞳子上○
取汁洗之即出○大藕洗搗綿裹滴汁入目中即出也
○用大珍珠拭之自明也○用鼓三七枚浸水洗自視
少頃當溼脹與物俱出又主風赤眵淚○川東檣上馬
齒莧燒灰研細點少許于背項即出也○新桑根皮洗

淨槌爛入眼撥之自出○猪脂煮取水面如油者仰臥
去枕點鼻中不過數度與物俱出○左手爪甲刀刮屑
未燈草蘸點翳土○石灰入口山梔煎濃汁頻洗愈
砂芒○以貂鼠毛皮裘袖救之即去
麥芒○大麥煮汁洗之即出
竹木入眼○蠟蠟搗塗之立出
目痛○凡日痛及眯目中傷有熱瞋者取地膚子白
汁頻注目中
眯目○生膚醫者瞿麥乾姜炮為末并華水調服二
錢日二服
目昏浮翳○蘭香子每用七個睡時水煎服之久久有效
也
眼生珠管○牛膝并葉搗汁日點三四次○以生蜜塗目
仰臥半日乃可洗之日一次○及膚醫銅錢青一兩細
墨半兩為末醋丸白豆大每以一九乳汁新汲水各少
許浸化點之○手爪甲貝齒各燒灰龍骨各半兩為末
日點三四次○鈆丹五錢鯉魚胆和如膏日點三五次
二百八十二

風邪眼寒。乃風入頭系敗血凝滯不能上下流通故風

寒客之而眼寒也石膏煨二兩川芎二兩甘草炙半兩

為末每服一錢葱白茶湯下日二服。雞子白皮枸杞

白皮等分。為末吹鼻中。日三次。

風毒攻眼。視物不明。肝氣虛者用。蔓菁子四兩入養瓶

燒黑無聲。取出入蛇蛻二兩。又燒成灰。為末。每服半錢。

食後酒下。日三服。○腫痒至痛。不可忍。者。或上下臉赤

爛。或浮翳。肉侵睛。神効。驅風散。用五倍子一兩。蔓荊

子一兩。半為末。服二錢。水二盞。銅石器內煎汁。去滓。乘

熱。洗。兩。半。再煎。用大能明目。去。疏。

雀目。夜昏。百治。百効。石膏。末。每服。一錢。猪肝。一片。薄批

搽。藥。在。上。縛。定。砂。瓶。煮。熟。切。食。之。一。錢。猪。肝。一。片。薄。批

西。兩。消。浸。一。夜。切。焙。研。末。每。服。三。錢。猪。肝。三。兩。批。開。搽

藥。在。內。扎。定。安。入。粟。米。一。合。水。一。碗。砂。鍋。煎。熟。熏。眼。臨

臥。食。肝。飲。汁。不。拘。大。人。小。兒。皆。治。○。決。明。一。升。地。膚。子

五。兩。為。末。米。飲。丸。梧。子。大。每。米。飲。下。二。三。升。烏。賊

骨。半。斤。為。末。化。黃。蠟。三。兩。和。捏。作。錢。大。餅。子。每。服。一。餅

以。猪。肝。二。兩。竹。刀。批。開。搽。藥。扎。定。米。泔。水。半。碗。煮。熟。食。

之。以。汁。送。下。○。七。月。七。日。九。月。九。日。取。地。衣。草。陰。乾。為

末。酒。服。方。寸。匕。日。三。服。一。月。愈。○。真。紫。芥。菜。子。炒。黑。為

末。用。羊。肝。一。具。分。作。八。服。每。用。芥。末。三。錢。捻。肝。上。筭。釋

裏。定。煮。熟。冷。食。以。汁。送。下。○。真。蛤。粉。炒。黃。為。末。以。油。蠟

化。和。丸。皂。子。太。子。猪。腰。子。甲。麻。扎。定。蒸。食。之。一。日。一。服

肝。虛。雀。目。○。黃。蠟。不。拘。多。少。溶。汁。取。出。入。蛤。粉。相。和。得。所

每。用。刀。子。切。下。二。錢。以。猪。肝。二。兩。批。開。搽。藥。在。內。麻。繩

扎。定。水。一。盞。同。入。銚。子。內。煮。熟。取。出。乘。熱。蒸。眼。至。溫。并

肝。食。之。日。二。以。平。安。為。度。其。効。如。神。

遊。瀋。入。目。○。生。翳。障。用。白。菊。花。穀。精。草。菜。豆。皮。等。分。為。末

每。用。一。錢。以。乾。柿。餅。一。枚。粟。米。泔。一。盞。同。煮。候。泔。盡。食

柿。日。食。三。枚。淺。者。五。七。日。遠。者。半。月。見。効。○。浮。萍。陰。乾

為。末。以。生。羊。子。肝。半。個。同。水。半。盞。煮。熟。搗。爛。絞。汁。調。末

服。盛。者。不。過。一。服。已。傷。者。十。服。見。効。○。馬。屁。勃。蛇。皮。各

五。錢。皂。角。子。十。四。個。為。末。入。灌。肉。塩。泥。固。濟。燒。存。性。研

每。溫。酒。服。一。錢。○。白。柿。日。食。之。良。○。苦。實。把。豆。兒。即

馬。錢。子。半。個。輕。粉。水。花。銀。硃。各。五。分。片。腦。麝。香。枯。礬。少

許。為。末。左。目。吹。右。耳。右。目。吹。左。耳。日。二。次。○。羞。明。生。翳

眼。目。二百八十三

平易方卷四

畢澄茄末吹少許入鼻中三五次効
痘後翳障○隱澁淚出久而不退用穀精草為末以柿或

之○天花粉蛇蛻洗焙等分為末羊子肝批開入藥在
內米泔汁煮熟切食服之旬日愈○疹後生翳鯽魚血

目忽不見○黃土攪水中澄清洗之○有人病目不覩思
食苦豆即胡蘆巴頻頻不缺不周歲而目中微痛如虫

行入背漸明而愈按此亦因其益命門之功所謂益火
之原以消陰翳是也○錢子石上磨汁注背脊中

眼目昏花○爐甘石火煨童尿淬七次代豬石火煨醋淬
七次黃丹水飛各四兩為末白沙蜜半斤以銅罐煉去

白沫更添清水五六碗熬沸下藥文武火熬至一兩滴
水不散以夾紙瀘入瓷器收之類照日用○蒼木半斤

任下○用甘菊一斤紅椒去目六兩為末每服一錢茶酒
汁和九梧子大每服五十九丸臨臥茶清下○兔絲子三

兩酒浸三日暴乾為末雞子白和丸梧子大空○温酒

下二十九丸○治日暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天
行目暗等疾覆盆子日暴乾搗極細以薄綿裹之用飲

男嬰乳汁浸如人行入丸里久用點目中即仰臥不過
三四日視物如少年禁酒避油物○柴胡六銖决明子十

吐津洗之終身行之永無目疾○柴胡六銖决明子十
入銖治歸生晒六兩附子火泡一兩為末煉蜜丸梧子

血用當歸生晒六兩附子火泡一兩為末煉蜜丸梧子
大每服三十九丸温酒下名六一丸○葇耳實一升為末

白米半升作粥日食之○眼熱昏暗營實枸杞子地膚
子各二兩為末每服三錢温酒下○補肝明目燕青子

淘過一斤黃精二斤同和九蒸九晒為末每空心服米
飲服二錢日再服○老人并虛目暗烏雞肝一具切

目以豉和米作羹成粥食之
中淚出○鹽點目中冷水洗數次即瘥○黃連浸濃汁

漬拭之○木耳一兩燒存性木賊一兩為末每服二錢
以清米泔煎服○臘月不落桑葉煎湯日温洗或入

芒硝○五倍子蔓荆子煎湯洗後用雄雞胆點之○木賊去節
冷淚目昏○貝母一枚胡椒七粒為末點之○木賊去節

二百八十四

蒼木汁浸各一兩為末每服二錢茶調下或蜜丸亦可

肝虛目淚○拘杞子二升絹袋盛浸一斗酒中蜜封三七

迎風下源○乃心腎虛熱也用生瑤瑁羚羊角各一兩石

眼昏內障○慈朱丸治神水寬大漸散昏如霧中行漸靚

者真慈石火煨醱滓七次不收及內障神水淡綠淡白色

兩為末更以神翹末兩煮糊加蜜丸梧子大每服二

十九空亦治心火乘金水衰反制之病久病累發者服之

効也木更作○車前子乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如

內障翳○麻黃根兩當歸身一錢同炒黑色入麝香

目生胬肉○雄雀屎和首生男子乳點目中胬肉赤脈貫

瞳子者即愈○南鵬砂黃色者一錢片腦少許研末燈

草蕪點之○用生杏仁七枚去皮細嚼吐于掌中乘熱

以綿裹頭點點肉上不過四五度愈○用杏仁研膏

入乳化開日點三次○白礬石納黍米大入目令淚出

末日點○薪箕子搗篩為末臥時銅簪點少許入目當

有熱淚及惡物出甚佳夜點之神効○或痒或痛漸

覆瞳人用杏仁去皮二錢半搗紛半錢研勻綿裹筋頭

內障青盲○用石決明一兩燒過存性用蒼木三兩去皮

為末每服三錢以豬肝披開入藥末在內扎定砂罐煮

熟以氣熏目待冷食肝飲汁○但瞳子在內扎定砂罐煮

愈用蔓菁子六升蒸之氣遍合煎取下以釜中熱湯淋

之乃暴乾還淋如此三遍即收杵為末食上清酒服方

同搗丸梧子大食遠茶服七十九日三服○風赤生醫

及墜眼日久瞶損失明地黃花晒黑豆花晒槐花晒各

一兩為末猪肝一具同以水二斗煮至上有凝脂掠盡

收每點少許三四次○初春取黃荊嫩頭九蒸九晒

二百八十五

半斤用烏雞一隻以米飼五日安淨板上飼以大棘子
二三日收糞乾入瓶內熬黃和荆頭為末蜜煉丸梧子
大每服十五丸至二十九陳米飲下日二

青盲洗法○正月八月二十九月二月六月四月五月五月
二月七月八月九月十月十一月十二月
六十二月三月十日每遇上件神日用桑柴灰一合煎湯
沃之于瓷器中澄取極清稍熱洗之如冷即重湯頓溫
不任手洗久久視物如鷹鵝也一法以桑灰童子小便
和作丸每用一丸泡湯澄清

病後青盲○日近者可治仙靈牌一兩淡豆豉一百粒水
一碗半煎一碗頓服即瘳

青盲不見○夜明砂糯米炒黃十兩柏葉炙一兩為末牛
胆汁和丸梧子大每夜臥時竹葉湯下二十九至五更
米飲下二十九瘳乃止
酒毒目盲○一人形實好飲熱酒忽患目盲而脈滿此熱
酒所傷胃氣汚濁血死其中而然以蘇木煎湯調人參
末一錢服次日鼻及兩掌皆紫黑此滯血行矣再以四
物湯加蘇木桃仁紅花陳皮調人參末服數日愈

潤眼明目○以水浸杏仁五枚五更端坐逐粒細嚼至盡
和津吞下久則能潤五臟去塵滓驅風明目治肝腎風
虛瞳人帶青眼翳風痒之病

目中息肉○丹砂一兩五月五日研勻銅器中以水漿一
盞臘水一盞浸七日暴乾銅刀刮下再研瓶收每點少
許皆上○淫膚赤白膜馬齒莧一大握洗淨和芒硝末

少許綿裹安上頓易之
目卒痛痒○乳汁浸黃連頻點皆中抱朴子云治目中百
病○燒刺木取黃汁點之

肝虛睛痛○肝虛目睛痛冷淚不止血脈痛羞明怕日夏
枯草半兩香附子一兩為末每服一錢臘茶湯調下○
冷淚羞明補肝散用香附子一兩夏枯草一兩為末茶
清下每服一錢○方加甘草二錢治目珠晝夜痛

頭風睛痛○二香散用香附子二兩藿香葉甘草各二錢
為末每服二錢沸湯入鹽調下
目睛暴痛○防己酒浸三次為末每服二錢溫酒下
目花翳痛○貝子一兩燒研如麩入龍腦少許點之若有
瘰肉加真珠末等分
眼目

物傷睛突○輕者臉胞腫痛重者目睛突出但目系未斷者即納入急搗生地黃綿裹傅之仍以避風膏藥護其

物傷睛陷○弩肉突出地膚洗去土二兩搗絞汁每點少

傷眼青腫○紫荆皮小便浸七日晒研用生地黄汁姜汁

眼生偷針○獨生萹蒲根同鹽研傅○肝脾積熱劉秦皮

損目破睛○牛口涎日點二次遊風黑睛破者亦瘥

目為物傷○羊胆二枚雞胆三枚鯉魚胆二枚和勻日日

損目生癆○赤肉弩出不退杏仁百個蒸熟去皮尖研瀉

取淨汁入硃砂末一錢水煮化日點一二次日自落

睛垂至鼻○人睛忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或時時

丹石衝眼○服丹石人壽發衝眼腫痛扁竹根一握洗搗

汁服之

疳眼流淚○治目暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天行

目暗等疾取覆盆子日暴乾搗極細以薄綿裹之用飲

男乳汁浸如人行八九里久用點目中即仰卧不過三

兩甘草半兩為末猪肝一具批開搽末五錢煮熟食之

○烏賊魚骨牡蠣等分為末糊丸皂子大每用一九同

猪肝一具米泔煮熟食

眼目眩暈○以銅器煮青羊肝用麪餅覆器上鑽兩孔如

人眼大以目向上熏之不過三度

肝風眼黑○目睛痛肝風盛也枳梗丸主之枳梗一斤黑

牽牛頭末三兩為末蜜丸梧子大每服四十九丸溫水下

腎虛目黑○煖水臚用沉香一兩蜀椒去目炒出汁四兩

為末酒糊丸梧子大每服三十九丸空心鹽湯下

眼見黑花○赤痛昏暗甘露湯用萎蕤焙四兩每服二錢

水一盞入薄荷二葉生薑一片蜜少許同煎七分卧時

溫服日一服○年久不可治者椒目炒一兩蒼朮炒一

兩為末醋糊丸梧子大每服二十丸醋湯下

眼見諸物○禽五飛走乃肝胆之疾青桐子花酸棗仁元

羞明怕日○用于里先黃菊花甘草各一錢水煎冷服

眼生花翳○澁痛難開景天搗汁日點三五次

病後失明○青羊肝切薄片水浸吞之極妙

目病失明○青殺羊肝一斤去膜切片入新瓦內燒乾同

決明子半升蓼子一合炒為末以白蜜漿服方寸七日

三不過三劑目明至一年能夜見文字

嗜鼻去翳○治目赤腫脹羞明昏暗隱澁疼痛眵淚風痒

鼻塞頭痛腦酸外腎板睛諸病驚不食草晒乾二錢青

黛川芎各一錢為細末喻水一口每以米許嗜鼻內淚

出為度

暑月自昏○多眵淚生龍腦薄荷葉搗爛生絹絞汁點之

熱毒攻眼○赤痛臉浮用黑豆一升分作十袋沸湯中蒸

過更互熨之三四遍則愈

目難遠視○肝虛也猪肝一具去皮膜細切葱白一握用

鼓汁作羹待熟下雞子三個食之○羊肝一具去膜細

切以葱子一勺炒為末以水煮熟去滓入米煮粥食之

目昏目盲○猪胆文武火煎稠丸黍米大每納一粒目中

三十年失明○補肝散用葶藶子七月七日收陰乾搗散

食後水服方寸七日

積年失明○決明子二升為末每食後兩飲服方寸七

目痛砂瀉○不得眠青布炙熱以肘熨之仍蒸大豆作枕

一切目疾○時珍曰爐甘石陽明經藥也受金銀之氣故

治目病為要藥時珍常用爐甘石煅淬海螵蛸礱砂各

一兩為細末以醋諸自病甚効入朱砂五錢則性不粘

也○又方用爐甘石煅一錢礱砂一錢為末熱湯泡洗

○羊肝丸治男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明

真爐甘石半斤用黃連四兩到豆大銀石器內水二盞
煮二伏時去黃連為末入片腦二錢半研勻鐵收每點
少許頻用取效○凡百病在目者以雞舌香黃連乳汁
煎注之皆愈此得辛散苦降養陰之妙

補肝明目○黃精二斤蔓菁一斤淘同和九蒸九晒為末
每空心米飲下二錢日二服延年益壽

明目擊齒○去翳大利老眼海鹽以百沸湯泡散清汁于
銀石器中熬取雪白鹽花新瓦器盛每早揩牙漱水以
大指甲點水洗目閉坐良久乃洗面名洞視千里法極
神効

補虛明目○健骨和血蒼朮泔浸四兩熟地黃焙二兩為
末酒糊丸梧子大每溫酒下三五十九日服

辟瘴明目○七物升麻丸升麻犀角黃芩朴硝梔子大黃
各二兩豉二升微熬同搗末蜜丸梧子大覺四肢大熱
大便難即服三十九取微利為度若四肢小熱只食後
服二十九非但辟瘴甚能明目

明目補肝○肝虛目睛痛冷淚不止血脈痛羞明怕日夏
枯草半兩香附子一兩為末每服一錢臘茶湯調下

明目補腎○决明子一升為末蔓菁子二升以酒五升煮
暴乾為末每飲服之錢溫水可日二服

黑花障翳○治肝腎俱虛眼昏黑花或生障翳迎風有淚
久服補肝腎增目力車前子熟地黃酒蒸焙三兩克絲
子酒浸五兩為末煉蜜丸梧子大每溫酒下三十九日
三服

明目益氣○燕菁子一升水九升煮汁盡日乾如此三度
研細水服方寸匕日三亦可研水和米煮粥食

常服明目○使人洞視微細用燕菁子三升以苦酒三升
煮熟日乾研篩末以井華水服方寸匕日三服無所忌

活血明目○漂搖豆為末甘草湯服二錢日二服
補肝明目○治男子五勞七傷明目取冬瓜仁七升以絹
袋盛投三沸湯中須臾曝乾如此三度又與清苦酒漬

二宿暴乾為末日服方寸匕令人肥悅明目延年不老
補益心腎○仙方椒茶丸補益心腎明目駐顏順氣祛風
延年真川椒一斤炒去汗白茯苓汁兩去皮為末煉蜜
丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下忌鐵器

利氣明目○枳壳炒一兩為末點湯代茶
平易方卷四 眼目 二百八十九

百點膏。治一切眼疾。麩仁去油三錢。甘草防己各六錢。

黃連五錢。以三味熬取濃汁。次下麩仁膏。白點。

錢共搗二千下。如泥。罐收。點之。又方。麩仁一分。猪鬃子五

錢。入白蓬砂一錢。麩仁香二分。研勻。收之。去醫妙。不可言。

雲膏。臘月取羯羊胆。寸餘。枚以蜜裝滿。紙套籠住。懸

琥珀散。明目鎖心。止血生肌。破癥瘕。氣魄。產後血運。開

兩延胡索五錢。沒藥五錢。大黃六錢。熬搗為散。空心酒

飲之。服三錢。過七日再服。神驗。莫及如治產後。須減去大黃

眼堂成漏。諸藥不効。以柿餅去皮搗爛。塗十日可愈。

疳盲眼。瞎小兒最多。酒炒川連神效。各五錢。胡黃連阿

雞肝十個。蒸熟。九梧子大。每服三分。白木三錢。用雄

眼內起星。胡椒非菜。廣皮。橘葉。菊葉。皆可。馬爛。絲綿。裏

鼻病門

鼻流澀水。孩兒茶末吹之。良。

鼻流涕。蒼耳子炒研末。每日湯煎服。二錢。

鼻塞不通。水服。釜底墨一錢。取効止。

去皮一枚。搗研。綿裹。塞之一日。一易。三十日。開香臭也。

下葱。鼓調和。再煎飲。食。以水五升。煮槐葉。取三升。

肺竇鼻塞。不知香臭。白麩。貝母。款冬。花一兩。百部二兩。

為末。每服一錢。米飲下。

鼻塞。水出。多年不聞。香臭。痰。藜。二握。當道車。碾過。以水

一大盞。煮取半盞。仰臥。先滿口。含飯。以汁一合。灌鼻中。

鼻不通。再灌。嚏出一兩。個息。肉似赤。蠅。虫。即愈。

鼻中息肉。細辛。白芷。等分。為末。以生地。胆。汁。和。成膏。每

用少許。點之。取消。為度。細辛。末。時時吹之。百九十一

鼻病

之即落。用麝香末猪脂和綿裹塞之。數日息肉隨藥
 出。明礬一兩。蓖麻仁七個。鹽梅肉五個。麝香一字。和
 丸。綿裹塞之。化水自下也。用陳瓜蒂末吹之。日三次。
 屢乃已。凡猪羊血久食。則鼻中毛出。晝夜長五寸。漸
 如繩。痛不可忍。摘去。復生。惟用乳石。礬砂等。分爲丸。臨
 臥服。十丸。自落也。
 鼻癢。膿臭。白草霜末。冷水服。二錢。○蚤陀僧香。白芷等
 分。爲末。鹽漬。油調。擦之。○有重者。苦參。枯礬。一兩。生地
 咀。塞鼻。瘰。○及乾。嘔。頭。痛。食。不。下。用。雞。子。一。枚。開。一。竅。去
 黃。雷。白。著。米。酢。燂。火。頓。沸。取。下。更。頓。如。此。三。次。乘。熱。飲
 之。不。過。一。二。度。即。愈。
 酒。製。赤。鼻。○。白。益。常。擦。之。妙。○。凌。香。花。山。梔。子。等。分。爲。末。
 每。茶。服。二。錢。白。二。服。數。日。除。根。○。白。歛。杏。仁。自。不。脂。各
 半。兩。爲。末。雞。子。清。調。塗。旦。洗。○。枇。杷。葉。炮。子。各。等。分。爲
 末。每。服。二。錢。溫。酒。調。下。日。三。服。○。銀。杏。酒。醉。糟。同。嚼。爛。
 夜。塗。旦。洗。○。白。丁香。十二粒。蜜。半。兩。早。夜。點。久。久。自。去。

面。如。鼻。皸。○。馬。蘭。子。花。粹。傅。之。佳。○。出。膿。血。者。以。泔。水。煮
 檳。葉。取。汁。洗。之。○。武。乾。納。檳。葉。灰。少。許。于。中。良。
 鼻。准。赤。色。○。雄。黃。硫。黃。各。五。錢。水。粉。二。錢。用。頭。生。乳。汁。調
 傳。不。過。三。五。次。愈。
 鼻。外。癢。爛。○。膿。水。血。出。蜂。房。炙。研。酒。服。方。寸。七。日。三。服。
 鼻。疳。赤。爛。○。杏。仁。燒。壓。取。油。傅。之。
 鼻。熱。鼻。皸。○。桐。油。入。黃。連。末。用。天。仙。條。燒。熱。油。敷。之。
 鼻。中。生。瘡。○。生。大。黃。杏。仁。搗。勻。猪。脂。和。塗。○。生。大。黃。黃。連。
 各。一。錢。麝。香。少。許。爲。末。生。油。調。搽。○。元。參。末。塗。之。或。以
 水。浸。軟。塞。之。○。桃。葉。嫩。心。搗。爛。塞。之。無。葉。用。枝。
 鼻。中。疳。瘡。○。烏。賊。魚。骨。白。芩。各。一。錢。輕。粉。二。字。爲。末。擦。之。
 赤。鼻。作。痛。○。紫。色。石。亭。脂。紅。色。玄。之。黃。色。勿。用。研。末。冷。水
 調。搽。半。月。絕。根。
 鼻。刺。赤。鼻。○。大。風。子。仁。木。鼈。子。七。輕。粉。硫。黃。爲。末。夜。夜。睡
 調。塗。之。
 鼻。面。紫。風。○。乃。風。熱。止。攻。陽。明。經。絡。亦。治。風。刺。癰。疹。胎。上
 硫。黃。白。枯。礬。等。分。爲。末。每。以。黃。丹。少。許。以。津。液。和。塗。之。
 一。月。見。効。

鼻病

鼻流清涕○葦藜末吹之有效○葦藜苗二握黃連二兩

水二升煎一升少少灌鼻中取嚏不過再服

腦風流涕○邪風入腦鼻內結硬遂流膿涕大自南星切

三四服其硬物自出腦氣流轉膿涕自收以大蒜葦藜

末作餅隔紙貼額前熨斗熨之或以香附葦藜末頻吹

腦漏流膿○破野白雞冠花白蠟蠟殼各燒存性等分血

在頂門上以熨斗熨之以愈為度

腦崩流血○貝子燒研每生酒服二錢日三服

腦中也用絲瓜藤近根三五尺燒存性每服一錢溫酒

下以愈為度○鼻淵腦漏方同有用荔枝殼末吹之

鼻淵腦瀉○藕節芎藭焙研為末每服一錢米飲下

肺癰○絲橘葉洗搗絞汁一盞服之吐膿血即愈

鼻中涕血○用醋和土塗陰囊乾即易之

鼻風鼻塌○手指攣曲節間痛不可忍漸至斷落用蓖麻

子一兩去皮黃連一兩剉豆大以小瓶子入水一升同

浸春夏二日秋冬五日後取蓖麻子一枚劈破面東以

兩月後吃大蒜豬肉試之如不發自効也若發動再服

直候不發乃止

鼻擦破傷○貓兒頸上毛剪碎唾粘傅之

食物入鼻○介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻中吸入

脂消財物隨出也

疳疔蝕鼻○雄黃葶藶等分研末臘猪胆和用槐枝點之

鼻淵腦泄○生附子末葱涎和泥盒漏泉穴

鼻上作痛○上品硫黃末冷水調搽

腦漏方○絞珠漆綿兜一日燒研末吹入鼻中數日可愈

耳病門

耳中卒痛○瘡刀錢漿滴入即愈○鹽五并蒸熱以耳枕
 之冷復易之○牛蒡根切絞汁二并銀錫內熬膏塗之
 ○或紅腫內脹將經霜青管露在外將朽者燒存性為
 末傳入耳中其疼即止○如有重者在內奔走或血水流
 出或乾痛不可忍者蛇退皮燒存性研鷲翎吹之立愈
 耳痛布膿○柳根細切熟搗封之燥即易之○因水入耳
 內者箭筈內蛀末一錢膩粉一錢麝香半錢為末以綿
 杖絨盡送藥入耳以綿塞定有惡物放合流出甚者三
 度必愈
 底耳腫痛○桑螵蛸一個燒存性麝香一字研末每用半
 字搽入神効有膿先微搽
 耳腫風毒○腫起出血取細蠶糞化水取清汁調白礬末
 少許滴之
 耳瘡月蝕○燒蚯蚓糞猪脂并傳○棗子去核包青礬煨
 研香油調傅之○用蒿灰糝之良○旋覆花燒研羊脂
 和塗之○寒食泔酸傅之良

耳瘡唇瘡○東壁土和胡椒傅之
 傷耳成瘡○出汁者用胡桃杵取油納入
 耳內惡瘡○曾青五錢雄黃七錢半黃芩二錢半為末傅
 之○雞屎白炒研傅之
 停耳出水○成瘡蚯蚓糞為末傅之并吹入○綿裹伏龍
 肝末塞之日三易○青皮洗研末綿裹塞之○故綿燒
 一灰綿畏塞之
 停耳膿血○月下灰即錫底墨吹滿耳深入無苦即自出
 ○海浮石一兩沒藥一錢麝香一字為末敷盡吹之○
 蒲黃炒黑研末搽之○蟬蛻半兩燒存性麝香半錢炒
 右為末綿裹塞之追出惡物効○穿山甲燒存性入麝
 香少許吹之三日水乾即愈○海標蛸五分麝香一字
 為末以綿杖繳淨吹入耳中
 漏耳諸瘡○治耳內外惡瘡及頭瘡肥瘡癩瘡黃馬散用
 黃蘗半兩葶藶為齒竟一兩為末傅之
 五般停耳○出膿血水人牙燒存性麝香少許為末吹之
 耳出臭膿○青蒿末綿裹納耳中○杏仁炒黑搗膏綿裹
 納入日三四易之妙
 耳病

疝耳膿汁○青黛黃藥末乾擦○雞子黃炒油塗之甚妙

耳牽烘烘○括樓根削尖臘猪脂煎三沸塞耳三日即愈

耳中出血○蒲黃炒黑研末摻入○龍骨末吹入之

耳內常鳴○生地黃蘘塞耳中○數日或煨熟丸妙○

治耳鳴○耳痒如流水及風聲不治成聾○用生烏頭掘得

乘濕削如棗核大塞之日易二次不三日愈○無畫夜

者烏頭燒作灰○菖蒲等分○研末綿裹塞之日再用取効

耳卒聾閉○硫黃雄黃等分○研末綿裹塞之日再用取効

語也○香附子瓦炒研末○羅蔔子煎湯早夜吞服二錢

然汁滴之○芥子末入氣○表塞之○凌雷葉搗即取自

耳鳴耳閉○骨碎補劑作細條○火炮乘熱塞之

耳鳴耳聾○時珍曰○柘根酒用○柘根二斤煨赤以水五斗浸取

水一石煮取汁五斗故鐵三十斤煨赤以水五斗浸取

清合水一石五斗用米二石麩二斗如常釀酒成用真

磁石二斤爲末浸酒中三宿日夜飲之取小醉而眠聞

人聲乃止○卒聾及腎虛耳內如風聲鐘鼓聲用穿山

甲一大片以蛤粉炒赤蠟稍七個麝香少許爲末以麻

油化蠟和作挺子○綿裹塞之○枕之冷復易之

風病耳鳴○鹽五升蒸熱以耳枕之○冷復易之

腎虛耳聾○真磁石一塊○大穿山甲燒存性研一字新綿

塞耳內口含生鐵一塊○覺耳內如風雨聲即通○權曰

椒氣下達故椒目能治腎虛耳鳴用巴豆菖蒲同碾末

以松脂黃蠟溶和爲挺○納耳中抽之治腎氣虛耳中如

風水鳴或如打鼓聲○聲卒暴聾者一日一易神驗

耳聾甚久○栝樓根三十斤細切以水煮汁如常釀酒久

服甚良○生菖蒲汁滴之○水服二錢日二服

病後耳聾○乾百合爲末○湯水服二錢日二服

耳聾耳痛○乾百合爲末○湯水服二錢日二服

耳聾鼻塞○不聞聲音○香臭者取末塞耳日一服

麻子三百粒去皮和搗○綿裹塞耳鼻日一服

聞聲及香臭也○先治耳後治鼻不可並塞○度三十餘日

細切以粳米三合豆豉少許煮粥日空○心食之

諸般耳聾○細辛末溶煎蠟丸親灸大丸塞之一二次

即愈須戒怒氣以綿裹塞○勞聾已久○童子小便乘熱少少頻滴之

久聾不聽○鍊松脂三兩巴豆一兩和鴉成丸薄綿裹塞

升乘熱投入服取汁耳如鼓聲勿訝○一升以無灰酒二

老具細切以水五升煮石取二升入腎下鹽豉作羹食之

米煮粥食亦可○猪腎一對去膜切以粳米二合葱白

二根薤白七根人參二分防風一分为末同煮粥食

耳聾灸法○溼土瓜根削半寸塞耳內以艾火灸七壯每

旬一灸愈乃止○三寸年耳聾酒三升漬牡荆子一升

七日去滓任性飲之○生油日滴三五次候耳中塞出即愈○龜溺

滴耳治聾○斑蝥炒二枚生巴豆去皮心二枚杵丸棗核

塞耳治聾○斑蝥炒二枚生巴豆去皮心二枚杵丸棗核

大綿裹塞之○芫青巴豆仁蓖麻子各一枚研丸棗核

大綿裹塞之○芫青巴豆仁蓖麻子各一枚研丸棗核

大綿裹塞之○芫青巴豆仁蓖麻子各一枚研丸棗核

大綿裹塞之○芫青巴豆仁蓖麻子各一枚研丸棗核

大綿裹塞之○芫青巴豆仁蓖麻子各一枚研丸棗核

大綿裹塞之○芫青巴豆仁蓖麻子各一枚研丸棗核

大綿裹塞之○芫青巴豆仁蓖麻子各一枚研丸棗核

大綿裹塞之○芫青巴豆仁蓖麻子各一枚研丸棗核

熏鼻治聾○蠶蛻紙作然入麝香二錢入筆筒燒烟熏之

三次即開○不出弓弩絃長三寸打散一頭塗好膠挂耳

耳中有物○不出弓弩絃長三寸打散一頭塗好膠挂耳

百更入耳○生油調銅絲剪之○雄黃燒擦熏之○自出○

生半夏末麻油調塗耳門外○非汁灌之即出○蒿苣

搗汁滴入自出也○杏仁滴之或作枕枕一夕自出○椒

末一錢醋半盞浸良久少滴入自出○川椒碾細浸

醋灌之自出○人乳滴之即出○熬膏綿裹包塞之聞香

即出○黃丹酥蜜杏仁等分熬膏綿裹包塞之聞香

煎餅枕臥須臾自出○胡麻炒研作袋枕之○胡麻油作

足無數好脂油香故入人耳及諸竅中以驢乳灌之即

化爲水時珍曰處處有之寤屋爛草中尤多狀如小蜈

香物引之○生油調製○心二升即化為水○牛乳少少滴

蠟入耳內○綾經甲燒研水調灌之即愈

蝮入耳中○綠礬搽之即化為水

蚤虱入耳○菖蒲末炒熱袋盛枕之即愈

蜈蚣入耳○炙猪肪掩耳自出

蟻入耳○害人皂發蠹虫研爛同鱗魚血點之

水銀入耳○能蝕人腦以金枕耳邊自出也

水入耳中○薄荷汁滴入立効

耳中有核○如棗核大痛不可動者以火酒滴入仰之半

凍耳成瘡○白歛黃蘗等分為末生油調塗○生姜自然

汁熬膏塗

耳足凍瘡○嫩攪核燒研油調塗之

次耳散○新得良方治耳內一切大廣皮一個重二錢外

者炒黑不可過性生龍骨一錢冰片麝香各二分

共為細末溼爛者燥吹入耳乾痛燥痒者香油調搽

耳膿常流○大人小兒耳內生疔出毒之後膿水亦流出者

久不乾或傷水溼坐底停耳成膿臭穢之水時流出者

用耳上小麥粉以醋煎滾打如漿糊晚搽于耳之前後畱

出耳血○凡入耳後髮際搔痒小竅出血此名髮泉用

耳後出血○及喉下諸腫用蝸牛同葱葉中化為水滴耳

耳中取膿○乾結不出用白蚯蚓入葱葉中化為水滴耳

令滿不過數度即易挑出

耳內虫痛○如虫在內走或血水流或乾痛以蛇退煖

存性研末吹入立愈○滴猫尿或香油蓋滴入耳俱効

舌口門

口氣臭惡○明礬入麝香
棄廁下數度即瘥也

食非口臭○沙糖解之
香口去臭○豆蔻細辛

為丸每旦漱口後含
時時噙漱○曝乾梅

口中瘰癧○東行棟根
鼻疳蝕○口鼻急疳

每以吹之○銅青枯
綠三分研傅之○穿

末貼之○五倍子燒
疳齩爛○臭氣出血

錢白礬○豆豉為末掃
中乾燥○煩渴無津

兩研勻丸○菜萸末醋
磨口疳○菜萸末醋

雄猪胆五枚酒煮皮爛入定粉
含化一丸噉汁

調塗足心一夕愈○黃礬五錢銅

緜二錢為末摻之漱
不夫一山李子根一

五升水五大斗煎半
煎至一二升待稠瓷

油膩熱麪及肉如發
五年齒盡落斷不可

輕粉破口○凡水腫及
汁頻頻含漱能殺粉

齒敗口臭○水煮芎藭
了含一丸仍塗齒斷

口吻生瘡○燕窠泥傅
口爛瘡○蘿蔔自然

頻漱吐亦可為末搽
之漱涎甚効○腫痛

桔礬等分為末擦之
星一個生美一大塊

口舌為末睡時以醋調塗
手心足心或

平易方卷四

三百九十八

以草烏頭吳茱萸等分爲末蜜調塗足心○朴硝舍之

太陰口瘡○生甘草二寸白礬二兩大舍之○燕津

唇裂生瘡○新瓦爲末生油調塗○連年不瘥以八月藍

搗塗一斤搗汁洗之不過三度瘥○瓦花生姜入鹽少許

耳瘡唇瘡○橄欖炒研豬脂和塗之○青皮燒研豬脂調塗

冬月唇裂○香油頻和胡粉傳之○煉過猪脂日日塗之

唇乾裂痛○桃仁搗和猪脂傳○煉過猪脂日日塗之

唇瘡痛痒○黃蘗末以膏蒸根汁調塗立効

緊唇裂痛○用醋漱口以蒜母燒灰飛蓋等分米醋調稀

口中生輩○用醋漱口以蒜母燒灰飛蓋等分米醋調稀

天行時時擦之○五倍子末搽之吐瀉即愈

唇腫黑痛○痒不可忍四文錢于石上磨猪脂汁塗之

惡水入口○及皂莢水入口熱痛不止以皂莢子燒存性

白一分沙糖半兩和膏含之

口惡瘡○狀似木耳不拘大人小兒並用五倍子青黛

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

唇緊作痛○末以筒吹之

舌卒腫大○如猪脛狀滿口不消○人釜墨和酒塗之
舌腫咽痛○以酢和釜底墨厚塗之○正脫則更得須

舌與卽消○以生艾搗傳之○艾亦可用
唇舌生瘡○雞舌香末綿裹含之
舌上出血○煎水漱之即止○犀角子油紙捲燒烟熏鼻

中自止血○如針孔者○豉二升水三升煮湯服一升日三
服○槐花末傳之即止○舌上無故出血以巴豆油作

細末每用塗之○酒漬裏荷根半日含漱其汁瘡乃止
喉舌瘡爛○酒清裏外科云有人偶含刀在口割舌已垂

割舌將斷○按仙傳外科云有人偶含刀在口割舌已垂
未斷一人用雞子皮白袋之○上三日接住乃去皮只用

蜜蠟勤敷七日全安若無速効以金鎗藥參治之此用

雞子白皮無他但取其柔軟而薄護舌而透藥也

黃藥三兩為末○蜜丸梧子每冬湯下十九枚
水煎過再泡片時乘熱以酒一升浸之密封良久熱漱

冷吐之○僵蚕為末吹之○痰甚妙○僵蚕一錢黃連
蜜炒二錢為末搽之○凝出○妙
重舌脹滿○鐵鏽燒紅打○次○五靈脂一兩淘淨為

末煎米醋飲○酒和傳之日三四次○五靈脂一兩淘淨為

重舌生瘡○蒲黃末傅之不濕○乳各二升煎一升半服
重舌出涎○研砂末生薑片○人紅芍藥甘草煎水熱漱

等分○糖醋時時含漱○塞口○不治人紅芍藥甘草煎水熱漱
木舌腫滿○不治殺入蘇合時時含吐涎瘡乃止

木舌胎○諸病舌胎布漿水抹姜片擦之自去則病淺

木舌胎○諸病舌胎布漿水抹姜片擦之自去則病淺

木舌胎○諸病舌胎布漿水抹姜片擦之自去則病淺

木舌胎○諸病舌胎布漿水抹姜片擦之自去則病淺

木舌胎○諸病舌胎布漿水抹姜片擦之自去則病淺

木舌胎○諸病舌胎布漿水抹姜片擦之自去則病淺

木舌胎○諸病舌胎布漿水抹姜片擦之自去則病淺

牙齒疼痛。治風熱牙痛。槐枝煎湯。二盤入鹽一斤。煮乾。炒研。日用。搽齒。以水洗目。胃火牙疼。好歌石膏。一兩。火煨。淡酒。碎過。為末。入防風。荆芥。細辛。白芷。五分。為末。日用。搽齒。甚効。齒痛。及落。研細。石胆。以人乳。和膏。擦之日。三四次。止痛。復生。齒。日。後。復。故。乃。止。每。以。新。汲。水。漱。淨。日。久。腎。虛。也。補。骨。脂。二。兩。青。鹽。兩。半。炒。研。擦。之。諸。般。牙。痛。香。附。艾。葉。煎。湯。漱。之。仍。以。香。附。末。擦。之。去。涎。白。僵。垂。直。者。生。姜。同。炒。赤。黃。色。去。姜。為。末。以。皂。角。水。調。搽。之。即。止。虛。痛。仙。靈。膠。為。祖。末。煎。湯。頻。漱。大。効。入。熱。毒。風。攻。頭。面。齒。腫。痛。不。可。忍。牛。勞。根。一。斤。搗。汁。入。鹽。花。一。錢。銀。器。中。熬。成。膏。每。用。塗。齒。齦。上。重。者。不。過。三。度。搽。一。蒼。耳。子。五。升。水。一。斗。煮。取。五。升。熱。含。之。冷。即。吐。去。吐。後。復。含。不。過。一。劑。葉。亦。可。或。入。鹽。少。許。獨。頭。蒜。煨。熟。切。煨。痛。處。轉。易。之。亦。主。虫。痛。羅。蘭。子。十。四。粒。生。研。以。人。乳。和。之。左。痛。點。右。鼻。右。痛。點。左。鼻。老。生。姜。五。焙。入。枯。礬。末。同。擦。之。有。人。日。夜。呻。吟。用。即。愈。牙。痛。嗜。鼻。壁。上。掃。土。用。搽。炒。過。為。末。左。右。嗜。之。亦。可。按。塞。食。草。綿。裹。懷。乾。為。末。含。水。一。日。隨。左。右。嗜。之。亦。可。按。塞。

牙痛點眼。用覆盆子新葉搗汁點目。皆三四次。有虫隨。牙痛。出。成。塊。也。無。新。葉。乾。者。煎。濃。汁。亦。可。即。大。麥。薄。也。牙痛。頰。腫。桃。白。皮。柳。白。皮。槐。白。皮。等。分。煎。酒。熱。漱。冷。吐。牙。疼。出。血。胡。桐。淚。半。兩。研。末。夜。夜。貼。之。或。入。麝。香。少。許。溼。熱。牙。疼。用。羊。脛。骨。燒。灰。二。錢。白。芷。當。歸。牙。皂。青。鹽。各。錢。為。末。擦。之。喜。收。風。胡。桐。淚。入。麝。香。搽。之。牙痛。不。止。用。川。姜。炮。川。椒。等。分。為。末。搽。之。每。旦。搽。擦。年。久。牙。疼。楓。香。脂。為。末。以。香。爐。內。灰。和。勻。每。旦。搽。擦。西。牙。作。痛。雄。黃。為。末。和。棗。肉。丸。塞。孔。中。礦。灰。沙。糖。和。塞。孔。中。桔。梗。薤。苳。仁。等。分。為。末。服。使。君。子。煎。湯。頻。漱。燕。黃。仁。安。桂。孔。中。及。縫。中。甚。妙。香。油。抹。筋。頭。甚。妙。麝。香。末。綿。裹。炙。熱。咬。之。換。二。三。次。其。正。即。死。斷。根。甚。妙。牙。疼。引。頭。川。百。藥。煎。半。兩。元。胡。索。三。錢。雄。黃。三。錢。為。末。先。以。姜。擦。去。涎。用。此。搽。牙。以。津。洗。目。日。用。之。甚。佳。牙。宣。疳。疔。赤。土。荆。芥。葉。同。研。搽。之。日。三。次。土。朱。即。代。諸。石。荆。芥。同。研。搽。之。日。三。次。羊。脂。若。子。燒。烟。熏。之。牙。齒。齩。痛。薤。苳。仁。桔。梗。生。研。末。服。服。不。拘。大。人。小。兒。皆。非。根。十。個。川。椒。二。十。粒。香。油。少。許。以。水。補。上。泥。固。搽。傳。三。百。二。

病牙頰上良久不出數次即愈也。茄根燒灰治口齒

瘡。用龍腦珠砂等分擦之神效。如九皂子大線裹

骨槽風痛。牙根腫痛。桔梗為末。搗丸。皂子大線裹

咬之。仍以荆芥湯漱之。齒齦宜露。蛇蛻泥水和成團。煨去。研末。臘猪脂調傅之。

日三。每旦含鹽煎水。含百遍。五日。後齒即牢。多是

疔也。角蒿燒灰。夜塗上。切忌油膩。沙糖乾棗。膿血口

氣生地黃一斤。鹽二合。末自搗。加。用。以。麩。包。煨。令。烟。斷。

去。麩。入。麝。香。一。分。研。勻。日。夜。貼。之。其。痛。立。住。如。神。

椒。一。撮。灯。心。一。把。水。煎。濃。洗。漱。吐。其。痛。立。住。如。神。

牙齦痒痛。杏仁一百枚。去皮。以鹽方寸匕。水一升。煮令

汁出。含漱。吐之。三度。愈。齒縫出血。百草霜末。搽之。立止。每夜。鹽末。厚。封。斷。上

有汁。瀝。盡。乃。固。其。汁。出。時。叩。齒。勿。住。不。過。十。夜。疼。血。皆

止。忌。猪。魚。油。菜。等。極。驗。不。止。鑿。石。一。兩。燒。木。三。升。煮

一升。含漱。苦參一兩。枯礬一錢。為末。白三指。之。立。驗。

牙齦動搖。生地黄。綿裹。唾之。令汁。潰。根。并。燻。之。日。五。六

次。大。戟。絞。于。痛。處。良。疼。痛。及。打。動。者。土。荻。藜。去。角

生。研。五。錢。淡。漿。水。半。碗。煎。水。入。鹽。溫。漱。甚。効。或。以。根。燒

灰。貼。牙。即。牢。固。也。傷。動。倍。子。乾。地。龍。末。姜。搗。後。傅。之。

齒腐齩爛。不拘大人小兒。用上好鹽。熱湯。淋。取。汁。石

器。熬。乾。刮。下。入。麝。香。少。許。研。搽。之。山。豆。根。一。片。含。于。痛

牙齦腫痛。山慈姑。根。煎。湯。漱。之。立。効。山。豆。根。一。片。含。于。痛

所。瓦。花。白。礬。等。分。水。煎。漱。之。立。効。山。豆。根。一。片。含。于。痛

科。燒。存。性。研。末。頻。傅。之。即。愈。礬。石。含。嚼。吐。去。汁。

患齒碎壞。欲盡者。常以綿。礬。石。含。嚼。吐。去。汁。走。馬。牙。疳。用

急疔蝕齒。孩兒茶。雄。黃。貝。母。等。分。為。末。米。泔。漱。淨。搽。之。桔。梗。齒

香。等。分。燒。研。傅。之。膿。血。臭。氣。者。胡。桐。淚。一。兩。拘。杞。根

走馬牙疳。小兒牙疳。雄。黃。一。錢。銅。絲。二。錢。為。末。貼。之。五。倍。子。青。黛。枯。礬。黃。蘗。等。分。為。末。先。以。鹽。湯。漱。淨。搽。之。立。効。小。兒。口。疳。白。礬。裝。入。五。倍。子。兩。燒。過。同。研。搽。之。臭。爛。出。血。雄。黃。豆。大。七。粒。每。粒。以。淮。棗。去。核。包。之。鐵。線。串。于。燈。上。燒。為。末。每。以。少。許。搽。之。去。涎。以。愈。為。度。三。百。三。

龋齒黑臭○炙左手陽明脈以苦參湯日漱三寸出入其

風五六日愈此亦取其去風氣溼熱殺虫之義○龋齒

有孔松脂縮寒須與玉從脂出也○或燒瀝日塗之後

傅雄黃末即愈

牙齒蠹黑○胡桐淚一兩丹砂半兩射香一分為末摻之

牙宣牙癰○及口瘡症用蠶肥皂莢兩挺酥炙取肉為末

牙痛喘息○喉中水雞鳴用利為度不利更服一日一服

蜜丸大豆大每服一丸取微利為度不利更服一日一服

牙齒不生○年久者黑豆三十粒牛糞火內燒令烟盡研

入麝香少許先以針挑破血出少許搽之不得見風忌

酸塩○及方雌雄雞矢十五顆焙研入麝香少許先以

針挑破出血傳之年高者不遇二十日少者十日必生

惡血齒痛○五靈脂末米醋煎行含鹽

腎虛齒痛○甘松硫黃等分為末泡湯漱之神効

虛氣攻牙○齒痛血出或疼痛骨碎補三兩銅刀細到瓦

鍋慢火炒黑為末如常搽齒良久吐之齒下亦可劉松

石云此法不獨治牙疼極能堅骨固牙益精髓去骨中

毒氣疼痛牙動將落者按擦立住再不復動經用有効

牙關緊急○不開者白礬鹽花等分擦之涎出自開

風寒牙痛○紅豆蔻為末鹽在右以少許齋鼻中並摻牙

取涎或加麝香

風牙疳牙○零陵香洗炙真蘇炒等分為末摻之○膿血

有虫用檄燒研入麝香少許搽之

牙齒日長○漸至難食者鹽湯漱服取効即

愈也○出下分者常作生肌黃甚妙

打動牙疼○蒺藜子或根為末日日搽之

齒疎陷物○盧甘石燉寒水石等分為末每用少許擦牙

忌用刷牙久自密○石燕子玉對火數米醋淬七次

為末青蘄麝香各少許研勻日用搽牙後以温酒漱之

刮骨取牙○茄科以馬尿浸三日曬乾為末每用點牙即

落真妙或煎巴豆點牙亦落勿近好牙○又方用礪砂

大鯽魚內煨過瓶收待有霜刮魚如土法用

食梅牙變○詔粉搽之○細嚼胡麻即解

食蜜銀腫○朴硝傳之即消○肉弩出者生地黃汁一疏

食糖損齒○石欄黑皮炭黃研末搽之

牙齦

梧子大日空
三百〇四

齒黃擦白○燒取糯米灰二服

早衰齒落○生硫黃入猪膽中煮熟搗丸或入蒸餅丸梧

烟熏重牙○用瓦片煨紅安非子敷散油數點待烟起

牢牙去風○益氣烏雞治牙疼牙宜乃敷藥先生外方也

牙痛塞耳○用積雪草加水洗淨牙宜乃敷藥先生外方也

搯牙法○牢牙明目青鹽二兩白鹽四兩川椒四兩煎汁

拌薑炒乾日用擦齒洗目永無齒自疾○固牙烏鬚止

痛生痰地黃五斤柳木馱內以土蓋上蒸熟晒乾如此

三次搗為小餅每含嚥一枚永無齒自疾○擦牙固齒

布同厚連草牙分瓶內泥固煨研日用擦齒固牙烏鬚

牙骨脫落○牙珠骨一扇脫落○附三百七張黃雲丹內

頭髮鬚眉門

亦鬚禿落○油磨銅錢末塗之即生○香油水等分以銀

髮落不止○乃肺有勞熱癢痒用石灰三升水拌炒焦酒

長髮不落○蓬蘽子榨油日塗之○雙子三個胡桃二個

側栢葉一兩搗浸雪水梳頭髮永○落且潤也

髮落不生○生胡麻油塗之○側栢葉煮五六月去滓日

塗之○桐葉一把麻子仁三升米煮五六月去滓日

日洗之則長○合歡木灰二合糖衣五合錢精一合水

髮髮墮落○桑白皮剉二升以水淹髮者五六沸去滓頻

變白如漆○烏麻九蒸九晒研末麥○服之○榴花陰

靛為末和鐵丹服一年變白髮如漆○磨糖香和胡桃

青皮搗塗髮令黑如漆○久服補血○五臟雞桑嫩

頭髮鬚眉 三五〇五

枝陰乾為末蜜和作丸每用酒送下

兒髮不生○椒葉中心搗汁頭塗

大風髮禿○毗梨勒燒灰頭擦有效

白禿無髮○麻子炒焦研末諸脂和塗髮生為度○臘月

猪屎燒灰傳

婦人禿髮○漢椒四兩浸酒蜜室內日擦之自然長也

髮白不生○黑熟桑椹水浸日晒擦

頭髮不長○桑葉麻葉煮油沐之

頭髮黃色○以熊脂塗髮梳散又味

便盡黑不過用脂一斤効

病後落髮○胡孫姜野薔薇燒研煎

少年髮白○土馬駢石馬駢五倍子

兩胡桃十個胆礬半兩為末搗作

婦人蒜髮○乾棟五枚以茅香煮熟

等分搗丸梧子大每服五十九丸

塗染白髮○蕎麥針砂二錢醋和先

葉包至一更洗去再以無食子調

和塗之荷葉包至天明洗去即黑

煎稠染之○經霜桐葉及子多收

絞汁沐頭○亂髮如雞子大無油器

沐髮中風○入何首烏末二錢灌之

髮不澤○木瓜浸油梳頭○桑根

沐髮除脂○婦人髮腫山茶子研末

沐髮令香○雞蘇煮汁或燒灰淋汁

梳髮令黑○時珍曰髮乃血餘故能

令頭不白○血劉君安以已髮合頭

去心敷之血劉君安以已髮合頭

食治烏髮○繁縷為葷久食之能

令髮長黑○芭蕉油取法以竹筒插

用梳頭止女人髮落令長而黑○

○生麻油桑葉煎過去滓洗髮令

髮長數尺

頭髮髮眉

三百〇六

烏髮變白。○小雌雞二隻，只與烏油。麻一作同水飼之，放

卵時收，取出先放者，打窠以朱砂末。填入窠，定同眾卵抱。

出雞，取出其藥，自然結實，研粉蒸餅，和丸，菜豆大，每酒

下五七丸，不惟變白，亦且愈疾。

髮黃赤。○生地黃一斤，生薑半斤，冬洗研自然汁，留滓

用不蛀皂角十條，去皮，煎汁，炙至汁盡，為度，同滓入

鑊內，泥固煨，存性，為末，用鐵器盛，末三錢，湯調，得二日

臨臥，刷染髮上，即黑。○生柏葉末，一升，猪膏一升，和

丸，彈子大，每以布裹一丸，納泔汁中，此開沐之一，月，色

黑而潤矣。

染白髮。○胡粉、石灰等分，水和塗之，以油紙包，煨合，溫

暖候，未燥，間洗去，以油潤之，黑如漆也。○黃草一斤，生

地黃三斤，取汁，以水五大碗，煎黃，絞汁，將滓再煎三度

以汁同地黃汁，微火煎，如膏，瓶盛之，每日空心溫酒服

半匙，一月，髮如漆也。○蘿蔔五斤，○檣皮一片，包側

柏一枝，燒烟，熏香油碗內，盛烟，以手抹在鬚髻上，即黑

拔白生黑。○七月七日，取百合熟搗，用新瓦瓶盛之，密封

掛門上，陰乾，百日，每拔去白者，搽之，即生黑者也。○治

年少髮白，拔去白髮，以白蜜塗之，毛孔中即生黑髮，不生

取梧桐子，搗汁，塗上，必生黑髮。○猪胆塗孔，必生黑者

烏髮明目。○黑鉛半兩，鑊內溶化，旋入桑條灰，柳木攪成

砂，篩末，每早搽牙，以水漱口，洗日能固牙，明目，黑髮

燃鬚令黑。○酸石榴結成時，就東南枝上，揀大者一個，頂

上開一孔，納入水銀半兩，于中原皮封之，麻扎定，牛屎

封護，待經霜，搗下，便出殼內，水以魚鱗籠指蘸水，燃鬚

久久自黑也。

烏髮固齒。○七月取旱蓮草，連根一斤，用無灰酒洗，汁青

連津，鹽之。○又法，旱蓮草取汁，同鹽煉乾，研末，搽牙。

旱蓮草一兩，半麻姑餅三兩，升麻青，鹽各三兩，半訶子

連核二十個，皂角三挺，晚蚕砂二兩，為末，薄醋麪糊丸

彈子大，曬乾，入泥瓶中，火煨令烟出，存性，取出，研末，日

用搽牙。

揩牙烏髮。○麻枯八兩，鹽花三兩，用生地黃十斤，取汁，同

入鑊中，熬乾，以鐵蓋覆之，鹽沉之，煨赤，取研末，日用

三次，搽畢，飲姜茶，先從眉起，一月皆黑也。○川百藥煎

頭髮鬚眉。

三百○七

半兩元胡索三錢雄黃三錢為末先以姜擦去涎用此

白髮返黑○烏麻九蒸九晒研末棗膏丸服之
金陵煎○益髭髮變白為黑悉煉服門
七寶美髯丹○烏髭髮壯筋骨固精氣續嗣延年悉煉服

眉毛脫落○雄黃末一兩醋和塗之○白礬十兩燒研蒸

餅丸梧子大每日空心溫水下七丸日加一丸至四十
九日減一丸用而後始以愈為度○蔓菁子四兩炒研

醋和塗之○垂柳葉陰乾為末每姜汁于鉄器中調夜
夜摩之

癩風眉落○生半夏羊屎燒焦等分為末姜汁日調塗之
眉落不生○烏麻花陰乾為末以烏麻油浸之日塗○芥

眉毛動搖○目不能交睫喚之不應但能飲食用蒜三兩
芥汁調酒飲即愈

香澤○時珍曰蘭葉草浸油塗髮去風垢令香潤○木樨
花同麻油蒸熟潤髮及作面脂

咽喉門

卒然咽噎○炭末蜜丸含嚥
咽中結塊○不通水食危困欲死百草霜蜜和丸艾子大

咽中息肉○綿裝筋頭往搯指之日五六度○鹽豉和搗
塗之先刺破出血乃用神效

咽傷聲破○酒一合酥一匕乾姜末二匕和服日二次
狗喉氣塞○喘息不通須臾絕用獨頭蒜二枚削去兩

頭塞鼻中左患右塞右患左塞喉口中膿血出立効
少陰咽痛○少陰証二三日咽痛者可與甘草湯不瘥與

桔梗湯主之桔梗一兩甘草二兩水三升煮一升分服
尸咽痛痒○語聲不出麻黃以青布裹燒烟筒中熏之○

麻子燒脂服之○語言不出榲實半兩杏仁桂各半兩
燕萬一兩為末蜜丸彈子大含嚥

發斑咽痛○用元參升麻甘草各半兩水煎溫服
犀毒咽腫○蠟水不下及瘰癧咽腫水服黃若子末二錢

針刺在咽○以蠟蝮汁滴上三五度自出
三百〇八

天絲入咽○凡露地飲食有飛絲在上食之令人咽喉生
喉急以白礬巴豆燒灰吹入即愈
喉乳蛾○上蜂窠一個為末先用楮葉擦破病人舌令
血出以醋和末用羽點之令痰涎出為效後用竹根插
水服數口取利○烏龍尾即梁上塵枯礬猪牙皂莢以
鹽炒黃等分為末或吹或點皆效○用白礬末盛入猪
胆中風乾研末每吹一錢入喉取痰涎出妙○男婦乳
蛾喉腫腫痛及小兒急慢驚風牙關緊急不省人事者
仍以杜牛膝取根洗淨搗爛入好酒絞汁灌之良久即甦
仍以洋傳項下或醋調搽亦妙○新解牛膝根一握艾
葉七片搗和人乳取汁灌入鼻內須臾痰涎從口鼻出
即愈無艾亦可○雞肫黃皮勿洗陰乾燒末用竹管吹
之即破愈○白丁香二十個以沙糖和作三丸每以一
丸綿裹含嚥即時遂愈甚者不過二九極有奇效○已
死者復活用牆上壁錢七個兩要活蛛二枚熬作一處
以白礬七分一塊化開以壁錢或葱礬燒存性出火毒為
末竹管吹入立時就好忌熱肉硬物○青魚胆含燕○
又方用汁灌鼻中取吐萬氏用胆礬盛青魚胆中陰乾

喉痺腫痛○喉痺腫塞喘息○又方用朴硝代服礬
石草一兩水一升煎一大盞細細呷之少頃即通○鉉
白霜甘草半兩青黛一兩為末醋糊丸芡子大每含咽
一丸立効○菖蒲根嚼汁燒秤鍾一盃飲之○用真
鴨嘴胆礬末醋調灌之太吐膠痰數升即瘥○喘息欲
死者用蘭根葉二兩水一升半煮一盞細飲之立瘥○
治喉痺用絲礬入好米醋同研含之嘔汁立瘥○牛蒡
子六分馬蘭子六分為散每空心溫水服方寸匕日再
服仍以牛蒡子三兩鹽二兩研勻炒熱包熨喉外○生
油一合灌之立愈○蘿藦汁和皂莢漿服取吐
喉腫爛○及喉風險症用明白礬五錢滾水冲服服下
咽
吐出臭痰即愈
喉風痺○雄黃磨新汲水一盞服取吐與下愈○鴨嘴
胆礬二錢半白僵蚕炒五錢研每以少許吹之吐涎○
蒼耳根一把老姜一塊研汁入酒服○氣閉者用蛇蛻
炙當歸等分為末溫酒服一錢即吐○一方用蛇皮揉
碎燒烟竹筒吸入即破○不拘大人小兒
元參鼠粘子
三百○九

每用少許點喉取吐○又方用朴硝代服礬
喉痺腫痛○喉痺腫塞喘息○又方用朴硝代服礬
石草一兩水一升煎一大盞細細呷之少頃即通○鉉
白霜甘草半兩青黛一兩為末醋糊丸芡子大每含咽
一丸立効○菖蒲根嚼汁燒秤鍾一盃飲之○用真
鴨嘴胆礬末醋調灌之太吐膠痰數升即瘥○喘息欲
死者用蘭根葉二兩水一升半煮一盞細飲之立瘥○
治喉痺用絲礬入好米醋同研含之嘔汁立瘥○牛蒡
子六分馬蘭子六分為散每空心溫水服方寸匕日再
服仍以牛蒡子三兩鹽二兩研勻炒熱包熨喉外○生
油一合灌之立愈○蘿藦汁和皂莢漿服取吐
喉腫爛○及喉風險症用明白礬五錢滾水冲服服下
咽
吐出臭痰即愈
喉風痺○雄黃磨新汲水一盞服取吐與下愈○鴨嘴
胆礬二錢半白僵蚕炒五錢研每以少許吹之吐涎○
蒼耳根一把老姜一塊研汁入酒服○氣閉者用蛇蛻
炙當歸等分為末溫酒服一錢即吐○一方用蛇皮揉
碎燒烟竹筒吸入即破○不拘大人小兒
元參鼠粘子
三百○九

牛生半炒各一兩為末新汲水服一錢立瘥○不通欲死者用紫苑根一莖洗淨納入喉中待取惡涎出自瘥

喉痺垂死○止有餘色者巴豆去皮緣穿紙入喉中牽出

喉痺將死者點入少許即瘥病深者水調灌之○鯉魚胆喉

痺口糜○馬蘭花二兩蔓荆子一兩為末溫水服一錢

不開欲死草烏頭皂莢等分為末入麝少許擦牙并啗

鼻內牙關自開也○草烏尖石胆等分為末每用一錢

醋煮皂莢汁調稀掃入腫上流涎數次其毒即破也○

大豆煮汁煎稠如飴含之并飲汁○開散用白僵蚕

炒白礬半生半燒等分為末每以一錢用自然姜汁調

灌得吐頑痰立効小兒加薄荷生薑少許同調○用白

僵蚕炒半兩生甘草一錢為末姜汁調服涎出即愈○

天南星一個剉心入白僵蚕七枚紙包煨熱研末姜汁

調服一錢甚者灌之吐涎愈名如聖散○

急喉風痺○木賊以牛糞火燒存性每冷水服一錢血出

即安也○牙關緊急不通用此即破以蓖麻子仁研爛

紙捲作筒燒烟熏及即通或只取油作擦尤妙名聖炬

筒○如聖散用白僵蚕天南星等分生研為末每服一

字姜汁調灌涎出即愈後以生薑炙過含之

馬喉風痺○躁腫連頰吐血數者馬鞭草一握勿見風截

去兩頭搗汁飲之良

喉卒攻痛○商陸切根炙熱隔布熨之冷即易立愈○黃

走馬喉痺○馬昆勃即灰菰焰硝一兩為末每吹一字吐

涎血即愈○喉痺一切急病咽喉不通牙關緊閉以研

爛巴豆綿紙包壓取油作擦點燈吹滅熏鼻中或用熱

烟刺入喉內即時出涎或惡血便甦

喉痺吐肥○用糯米三升于端午前四十九日以冷水浸

之一日兩換水輕淘勿令攪碎至端午日取出陰乾絹

袋盛挂通風處每用旋取炒黑為末冷水調如膏藥貼

項下及腫處一衣便消乾即換之當令溼為妙

冬月喉痺○腫痛不可藥者蛇床子燒烟于瓶中口含瓶

嘴吸咽其痰自出

喉癰毒氣○桔槩二兩水三升煎一升頓服○生薑二斤

喉

喉

喉

喉

云易方卷四

風熱喉痹。五合煎勻。每服一合。日五服。錢黃蘗五分。並燒存性。白礬七分。煨過水。片礬三分。為末。每以一二分吹患處。此陸一孝家。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

喉痹。塞寒。冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。為度。如冬月無生花。以乾者浸。絞取汁。一小升。服之以瘥。

三易方卷四

咽喉

二百十一

搗汁。鷺翎掃入。去痰最妙。用杜牛膝。鼓。同搗汁。灌之。不得下者。灌鼻得吐。為妙。又方。土牛膝。春。夏。用。莖。秋。冬。用。根。一把。青礬。半兩。同研。點患處。令吐膿血痰。

喉風腫痛。用灯心一握。陰陽瓦燒存性。又炒鹽一匙。每次一捻。數次即愈。一方。用灯心灰二錢。研末。瓜根吹之。用灯心草紅花燒灰。酒服一錢。即消。絲瓜根以瓦瓶盛水。浸飲之。臘月朔日。取猪胆不拘大小。五六枚。用黃連青黛薄荷姜。各五錢。裝入胆內。青紙包了。將地掘一孔。方深各一尺。以竹橫懸此胆。在內。以物蓋定。俟至立春。日取出。代風吹去。胆皮青紙研末。密收。每吹少許。神驗。乃萬全。不傳之方。皂礬一斤。末醋三斤。拌曬乾。末吹之。痰涎出。盡用。良姜末少許。入茶內。漱。口。即愈。筆竹油。頻飲之。菴落。三兩。牛蒡子。二兩。水煎。一鐘。入白礬少許。灌之。取効。用地白根。即馬蘭根。或葉。搗汁。入米醋少許。滴鼻孔。中。或灌喉中。取痰自開。

喉風腫痛。用灯心一握。陰陽瓦燒存性。又炒鹽一匙。每次一捻。數次即愈。一方。用灯心灰二錢。研末。瓜根吹之。用灯心草紅花燒灰。酒服一錢。即消。絲瓜根以瓦瓶盛水。浸飲之。臘月朔日。取猪胆不拘大小。五六枚。用黃連青黛薄荷姜。各五錢。裝入胆內。青紙包了。將地掘一孔。方深各一尺。以竹橫懸此胆。在內。以物蓋定。俟至立春。日取出。代風吹去。胆皮青紙研末。密收。每吹少許。神驗。乃萬全。不傳之方。皂礬一斤。末醋三斤。拌曬乾。末吹之。痰涎出。盡用。良姜末少許。入茶內。漱。口。即愈。筆竹油。頻飲之。菴落。三兩。牛蒡子。二兩。水煎。一鐘。入白礬少許。灌之。取効。用地白根。即馬蘭根。或葉。搗汁。入米醋少許。滴鼻孔。中。或灌喉中。取痰自開。

喉風腫痛。用灯心一握。陰陽瓦燒存性。又炒鹽一匙。每次一捻。數次即愈。一方。用灯心灰二錢。研末。瓜根吹之。用灯心草紅花燒灰。酒服一錢。即消。絲瓜根以瓦瓶盛水。浸飲之。臘月朔日。取猪胆不拘大小。五六枚。用黃連青黛薄荷姜。各五錢。裝入胆內。青紙包了。將地掘一孔。方深各一尺。以竹橫懸此胆。在內。以物蓋定。俟至立春。日取出。代風吹去。胆皮青紙研末。密收。每吹少許。神驗。乃萬全。不傳之方。皂礬一斤。末醋三斤。拌曬乾。末吹之。痰涎出。盡用。良姜末少許。入茶內。漱。口。即愈。筆竹油。頻飲之。菴落。三兩。牛蒡子。二兩。水煎。一鐘。入白礬少許。灌之。取効。用地白根。即馬蘭根。或葉。搗汁。入米醋少許。滴鼻孔。中。或灌喉中。取痰自開。

喉風腫痛。用灯心一握。陰陽瓦燒存性。又炒鹽一匙。每次一捻。數次即愈。一方。用灯心灰二錢。研末。瓜根吹之。用灯心草紅花燒灰。酒服一錢。即消。絲瓜根以瓦瓶盛水。浸飲之。臘月朔日。取猪胆不拘大小。五六枚。用黃連青黛薄荷姜。各五錢。裝入胆內。青紙包了。將地掘一孔。方深各一尺。以竹橫懸此胆。在內。以物蓋定。俟至立春。日取出。代風吹去。胆皮青紙研末。密收。每吹少許。神驗。乃萬全。不傳之方。皂礬一斤。末醋三斤。拌曬乾。末吹之。痰涎出。盡用。良姜末少許。入茶內。漱。口。即愈。筆竹油。頻飲之。菴落。三兩。牛蒡子。二兩。水煎。一鐘。入白礬少許。灌之。取効。用地白根。即馬蘭根。或葉。搗汁。入米醋少許。滴鼻孔。中。或灌喉中。取痰自開。

喉風腫痛。用灯心一握。陰陽瓦燒存性。又炒鹽一匙。每次一捻。數次即愈。一方。用灯心灰二錢。研末。瓜根吹之。用灯心草紅花燒灰。酒服一錢。即消。絲瓜根以瓦瓶盛水。浸飲之。臘月朔日。取猪胆不拘大小。五六枚。用黃連青黛薄荷姜。各五錢。裝入胆內。青紙包了。將地掘一孔。方深各一尺。以竹橫懸此胆。在內。以物蓋定。俟至立春。日取出。代風吹去。胆皮青紙研末。密收。每吹少許。神驗。乃萬全。不傳之方。皂礬一斤。末醋三斤。拌曬乾。末吹之。痰涎出。盡用。良姜末少許。入茶內。漱。口。即愈。筆竹油。頻飲之。菴落。三兩。牛蒡子。二兩。水煎。一鐘。入白礬少許。灌之。取効。用地白根。即馬蘭根。或葉。搗汁。入米醋少許。滴鼻孔。中。或灌喉中。取痰自開。

喉風腫痛。用灯心一握。陰陽瓦燒存性。又炒鹽一匙。每次一捻。數次即愈。一方。用灯心灰二錢。研末。瓜根吹之。用灯心草紅花燒灰。酒服一錢。即消。絲瓜根以瓦瓶盛水。浸飲之。臘月朔日。取猪胆不拘大小。五六枚。用黃連青黛薄荷姜。各五錢。裝入胆內。青紙包了。將地掘一孔。方深各一尺。以竹橫懸此胆。在內。以物蓋定。俟至立春。日取出。代風吹去。胆皮青紙研末。密收。每吹少許。神驗。乃萬全。不傳之方。皂礬一斤。末醋三斤。拌曬乾。末吹之。痰涎出。盡用。良姜末少許。入茶內。漱。口。即愈。筆竹油。頻飲之。菴落。三兩。牛蒡子。二兩。水煎。一鐘。入白礬少許。灌之。取効。用地白根。即馬蘭根。或葉。搗汁。入米醋少許。滴鼻孔。中。或灌喉中。取痰自開。

療癰喉痺。攻痛生商陸根搗作餅置癰上以艾炷于上

懸癰喉風。硝砂半兩綿裹含之。噤津即安。風熱吐搏

懸癰垂長。咽中煩悶。白礬燒灰。鹽花等分。為末。筋頭頻

懸癰舌腫。咽生息肉。羊蹄草煮汁。熱含。冷即吐之。

咽中懸癰。舌腫塞痛。五倍子末。白僵蚕末。甘草末。等分。

喉中熱寒。腫痛散血。消痰白藥。朴硝等分。為末。吹之。日

喉中發癰。山豆根磨醋。噲之。追涎。即愈。勢重不能言者。

咽以雞翎掃入喉中。引涎出。就能言語。

喉腫難食。非一把搗熟。傅之。冷即易。氣不通者。葱鬚

陰乾為末。每用二錢。入蒲州照響末一錢。和勻。每用一

字吹之。鄉間真百草霜。蜜丸。茨子大水化之。九甚驗。

熱病咽痛。童便三合。含之。即止。

肺熱喉痛。有痰熱者。甘草炒二兩。桔梗米泔浸一夜。

飛尸遊蠱。着咽中。氣欲絕者。鳶尾根。削去皮。納喉中。淨

喉中似物。吞吐不止。腹脹羸瘦。取白藜荷根。搥汁。服蠱

咽自立出也。

喉疾疼痛。噤物不得下。葶葉。灯心。草燒灰。等分。吹之。甚

妙。射干。花根。山豆根。陰乾。為末。吹之。如神。噤物不

得。馬勃。一分。蛇退皮。一條。燒末。綿裹。一錢。含。立瘥。

老黃瓜。一枚。去子。入硝磺。滿陰乾。為末。每以少許吹之。

少許。牙皂。一挺。去皮。米醋浸。炙七次。勿令大焦。為末。每吹

頰。白今。醫家用。硼砂。治咽。喉。最為要。切。宗。頭。日。含。化。噤

津。治喉中。腫痛。膈上。痰熱。初覺。便治。不能。成。喉。痺。亦。緩

別。効。可。也。熱。癰。咽。痛。縮。他。殼。為。末。水。服。一。錢。語。聲

不出。經。進。方。用。括。棧。皮。白。僵。蚕。炒。甘。草。炒。各。二。錢。半。為

末。每。服。三。錢。半。姜。湯。下。或。以。綿。裹。半。錢。含。燕。一。日。二。服

咽。喉。三百十二

名發聲散。白藥末一兩，龍腦一分，蜜和丸。芫子大每

咽喉痘疹。牛蒡子二錢，桔梗一錢，半抄甘草節七分，水

煎服。喉喉塞。雄雀屎末，溫水灌半合。

咽喉穀賊。腫痛，蓬砂、牙硝等分，為末，蜜和半錢，含。喉中痛

腫痛，生礬、石末、少少，點腫處，吐涎，以痒為度。喉屬喉不

可不分，因誤吞穀芒、檜刺、痒痛也。穀賊屬咽尸，咽屬喉，不

苦着咽，喉中不能出者，名曰穀賊。惟驚涎灌之，即愈。蓋

驚涎化穀，能相制耳。喉生瘡。酒清、藜荷根半日，含漱，其汁瘡乃止。肺

虛熱上攻也。麥門冬一兩，黃連半兩，為末，煉蜜丸。倍子

大，每服二十九，麥門冬湯下。用蓖麻子仁一枚，朴硝

一錢，同研，新汲水服之。連進二三服，効。杏仁去皮熬

黃三分，和桂末一分，研泥，裹含之。嚙汁。時珍曰：咽喉

雖熱而能引熱下行，蓋亦從治之義。

咽喉怪症。咽喉生瘡，層層如疊，不痛，日久有膿，出臭氣。

廢飲食，用臭橘葉煎湯，連服必愈。雞子一枚，開一竅，去

黃，朝白着米醋燻火，頓沸，取下，更頓如此。三次乘熱飲

之，不過二三度，即愈。草湯。主之用甘草二兩，蜜水炙水

傷寒，兩閉，少陰証，甘草湯。主之用甘草二兩，蜜水炙水

二升，煮一升，半服。五合。日二服。腫痛，用生射干、猪脂

各四兩，合煎，令焦去滓，每噙棗子許，取瘡。肺中冷也。甘

草乾姜湯。溫之，甘草炙四兩，乾姜炮二兩，水三升，煮一

升，五合，分服。黑龍膏。按龐安時傷寒總病論云：元佑五年，自春至秋

漸黃，二郡人患急喉痺，十死八九。速者半日，一日而死。

預酒化下... 匙或掃入喉內取惡涎盡為度後含甘草片

蒸熟作小菜永無喉患... 喉疾者煎湯或研末服俱可

吹喉散... 凡遇一切喉痛喉腫喉爛吹入喉內俱可治愈

飛淨... 三分五分... 如無真者上廣黃亦可各為極細

火噴... 屢愈屢發... 無夜熱咳嗽吐紅等項

洗去... 凡遇此症... 凡治鎖喉諸法總宜吐去痰涎

鑽喉... 凡遇此症... 凡治鎖喉諸法總宜吐去痰涎

亦癢... 一法以廣東萬年青... 亦癢一法以廣東萬年青

出壁... 紫和白糖... 凡治鎖喉諸法總宜吐去痰涎

為要... 凡治鎖喉諸法總宜吐去痰涎

單雙... 巴豆一粒... 凡治鎖喉諸法總宜吐去痰涎

之故... 甘草水... 凡治鎖喉諸法總宜吐去痰涎

粒化... 見奇功... 凡治鎖喉諸法總宜吐去痰涎

喉服... 牛膝根... 凡治鎖喉諸法總宜吐去痰涎

喉吐... 然後咯... 凡治鎖喉諸法總宜吐去痰涎

喉痛... 須在臘月... 凡治鎖喉諸法總宜吐去痰涎

尋常... 薄荷葉... 凡治鎖喉諸法總宜吐去痰涎

三百十四

各入分青黛元明粉飛淨雄黃各五分大冰片二分共
 為極細末吹喉能治咽喉一切痛腫之症如加陳胆星
 灰燥為末五分在內和勻更妙
 爛喉症○新得良方用蘿藦湯煎紫蘇葉八分頻服神効
 誤食碗絲○頃刻喉舌腫大難于飲食急以綠麻杆一枝
 燒了當烟筒呼吸其腫即消無患矣
 咽中結塊○不通水食危困欲死者以百草霜要取鄉間
 燒亂草的錫煉方是直百草霜煉蜜丸如芡實大每取
 新汲水調化一丸灌下甚者不過三九此藥名百炙丸
 諸物卡咽○竹絲卡以爛竹葉土內者煎湯服○諸獸畜
 骨卡以虎骨或象牙磨水服○禽骨卡以野苧麻根搗
 丸本禽骨煎湯下○魚骨卡取本魚生眼珠以腐衣裹
 之拚命吞之下咽即愈

心痛門

卒患心痛○鑄墨二錢熱小便調下○牙關緊閉欲絕以
 葱白五莖去皮鬚搗膏以匙送入咽中灌以麻油四兩
 但得下咽即甦少頃重積皆化黃水而下永不發再
 得救人○訣云一個烏梅二個棗七枚杏仁一處搗男
 酒女醋送下之不害心疼○到老○或經年頻發安息
 香研末沸湯服半錢○五靈脂炒一錢半乾姜炮三分
 為末熱酒服立愈
 心腹冷痛○冷熱氣不和山危子川烏頭等分生研為末
 酒糊丸梧子大每服十五丸生薑湯下小腸氣痛加炒
 茴香葱酒下二十九丸○燒酒入飛鹽飲即止○以布裹
 椒安痛處用熨斗熨令椒出汗即止○冷氣腹痛吳茱
 萸二錢搗爛以酒一鐘調之用香油一盃入鍋煎熱傾
 菜酒人鍋煎一滾取服立止○鵝屎燒存性酒服一錢
 即止

冷口熱痛○川椒四兩炒出汗酒一碗淋之服酒

冷熱心痛○姜汁調青黛一錢服之

卒熱心痛○伏龍肝末方寸匕熱以水濕冷以酒服

之良○黃連入錢咬咀水煎熱服○生麻油一合服

寒厥心痛○及小腸膀胱痛不可止者神砂一粒竹用熟

附子去皮鬱金橘紅各一兩為末醋麩糊丸如酸棗大

熱厥心痛○或發或止久不愈身熱足寒者用元胡索去

皮鬱金附子乾姜等分為末每渴酒或白湯下二錢○不可

忍鬱金附子乾姜等分為末醋糊丸梧子大珠砂為衣

每服三十九丸男酒女醋下○或發或止身熱足寒久不

愈者先炙大溪崑崙引熱下行內服金鈴散用金鈴子

元胡索各一兩為末每服三錢溫酒調下

心脾冷痛○高良姜四兩切片分作四分一兩用陳廩米

半合炒黃去米兩用陳壁土半兩炒黃去土一兩用

巴豆二十四個炒黃去豆一兩用炒黃三十四個炒黃

去蠶吳茱萸一兩酒浸一夜同煮再炒為末以浸茱萸

酒打糊丸梧子大每空心姜湯下五十九丸○心脾痛如

錐刀刺腹脹用葱花一升同吳茱萸一升水八合煎七

合去滓分三服立效○雞心槿榔高良姜各一錢半陳

米百粒同以水煎服之

脾胃冷痛○白艾末沸湯服二錢

心胃氣痛○時珍曰荆樛王妃胡氏因食蕎麥麩着怒遂

病胃腕當心痛不可忍盤用吐下行氣化滯諸藥皆入

口即吐不能奏功大便三日不通因思雷公炮炙論云

心痛欲死速覓延胡乃以元胡索三錢研末溫酒調下

即納入少頃大便行而痛遂止

心脾氣痛○久患心脾疼痛服醒脾藥反脹用蓬莪莖麩

畏煨熟研末以水與酒醋煎服立愈蓋此藥能破氣中

之血也○凡人胸膈軟處一熱痛者多因氣及寒起或

致終身或子母相傳俗名心氣痛非也乃胃腕有滯爾

惟此獨步散治之甚妙香附米醋浸暑者炒為末高良姜

酒洗七次暑炒為末俱各封收因寒者姜二錢附一錢

因氣者附二錢姜一錢因氣與寒者各等分和一錢

米湯入姜汁一匙鹽一捻調下立止不過七次除根

心痛

心口痛

心脾痛

心胃痛

心口痛

心脾痛

○氣實有痰者牡蠣煨粉酒服二錢○不止者用田螺殼溪間者亦可以松柴片層層疊上燒過火吹去松灰取殼研末以烏沉湯寬中散之類調服二錢不傳之妙

心氣疼痛○自然銅火煨醋淬九次研末醋調一匙服即止○用生礬一皂子大醋一盞煎七分服立止○白芨石廬皮各二錢為末煉蜜丸黃豆大每服三九艾醋湯下○青木香皂角各一兩為末糊丸梧桐子大每湯服五九甚効○水菘花為末熟酒服二錢又法男用酒水各半煎服女用醋水各半煎服一婦年三十病此服一服立効○膏梁根煎湯服甚効○不問遠近以山羊糞七枚油頭髮一團燒灰酒服永斷根

男婦心痛○殊砂明礬枯等分為末沸湯調服○當歸為末酒服方寸匕○大芎一個為末燒酒服之一個住一年兩個住二年○不拘大小男女大馬兜鈴一個燈上燒存性為末溫酒服立効○檀香後跟一對燒灰酒服淨取清水服即止

急心氣痛○五十年陳壁土枯礬二錢為末蜜丸艾湯服

○古文錢一個打碎大核桃三個同炒熟入醋一碗沖服○核桃一個棗子一枚去核夾桃紙裹煨熟以生姜湯一鐘細嚼送下永久不發○諸心一核每歲入椒一粒同薑酒煮食良

婦人心痛○急者好官粉為末葱汁和丸小豆大每服七丸黃酒送下即止粉能殺虫葱能透氣故也

妊娠心痛○煩悶麻子仁一合研水二盞煎六分去滓服血逆心痛○生葱搗汁服二升即愈

心腹諸痛○艾附丸治男女心氣痛腹痛少腹痛血氣痛不可忍者香附子三兩蘗艾葉半兩以醋湯同煮熟去艾炒為末米醋糊丸梧子大每白湯服五九○赤麴香附乳香等分為末酒服○三月三日採桃花晒乾杵末以水服二錢七良○五倍子生研末每服一錢鉄杵內炒起烟黑色者為度以好酒一鐘傾入杵內服之立止○欲死用人尿同蜜搗勻新汲水化下

心腹諸疾○三物藪急丸治心腹諸疾○暴百病用大黃巴豆乾姜各一兩搗篩蜜和搗一于杵凡小豆大每服三九凡中客卒忤心腹脹滿痛如錐刃氣急口噤停尸

平身方卷四

卒死者以暖水或酒服之或灌之未知更服三丸腹中
鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即噤
心腹惡氣○艾葉搗汁飲之
心腹氣痛○烏藥水磨濃汁一盞入痛皮一片紫蘇一葉
煎服

瘧塊心痛○僵蚕末二錢白馬尿調服并傳塊上
心痛吐水○不飲食發止不定唯黃二兩醋二斤慢火
煎成膏用乾蒸餅和丸梧子大每服七丸姜湯下

中惡心痛○或連腰臍蓋如雞子大青布裹燒赤納酒中
頓服當吐惡物愈○吳茱萸五合酒三升煮沸分三服

○破網中燒灰一錢猶尿燒灰五分溫酒服
心痛疝氣○溼熱因寒鬱而發用烏子降溼熱烏頭破寒

鬱烏頭為烏子所引其性急速不審胃中也川烏頭山
后子各一錢為末順流水入姜汁一匙調下○四肢逆

冷全不飲食桂心研末一錢熱酒下取効
心痛不遂○四十年者黍米淘汁隨意溫服

食積心痛○陳神麴一塊燒紅溼酒上大碗服之
積年心痛○不可忍不拘十年五年者隨手見効濃汁煮

小毒食飽不着鹽會用之有効再不發也○十五年者
煎湖茶以頭醋和勻服之良

鬼症心痛○桃仁一合爛研煎湯服之○東引桃枝一握
去粗皮切水二升煎半升服

透中心痛○橘皮去白煎湯飲之甚良
心下大痛○用椒五分沒藥三錢研細分二服溫酒下○

胡椒菜豆各四十九粒研爛酒下神効
心痛欲死○狗屎燒研酒服二錢神効

心痺心煩○肉熱茜根煮汁服
蚊心痛○刺痛吐清水龍胆一兩去頭到水二盞煮一

盞隔宿勿食平旦頓服之○如刺口吐清水白熟艾一
升水三升煮一升服吐虫出或取生艾搗汁五更食香

脯一片乃飲一升當下虫出○治小兒蚊咬心痛面青
口中沫出陰死者取扁竹十片剉以水一石煎至一斗

去滓煎如錫隔宿勿食空心服一升重即下也仍常煮
汁作飯食○海上歌云心頭急痛不能當我有仙人海

土方蕭蓄醋煎通口噤管教時刻便安康○薏苡根一
斤切水七升煮三升服之虫死盡出也○用葱莖白二

心痛

三百廿八

寸鉛粉二錢為丸服之即止蒸能通氣粉能殺虫也○
槐木耳燒存性為末水服盡許若不吐飲熱水一升吐
虫之出

心痛有虫○治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人
所食多少搗絞取汁換麩作餅或冷淘食良久當利
出虫長一尺許頭似壁宮後不復患矣○芫花一兩醋
炒雄黃一錢為末每服一字溫醋湯下○多吐清水鰾
鱧淡煮飽食三五度即瘥

心脾痛○不拘男女五靈脂等分為末水煎石菖
蒲調服三錢作餅猪肉一二片
淫痰心痛○喘息者半夏油炒為末粥糊丸棗豆大每服
二十九姜湯下○白螺殼洗淨燒存性研末酒服方
寸七立止

九種心痛○一五二蛇三風四悸五食六飲七冷八熱九
氣也又治連年積冷流注心膈乃落馬墮車燕血中惡
等証丸痛凡用狼毒炙香吳茱萸湯泡已豆去心炒取
霜乾姜炮人參各一兩附子炮去皮三兩為末煉蜜丸
梧子大每空腹溫酒下一丸○用桂心二錢半為末酒

一蒸半煎半煮飲立効○當太歲上取新生槐枝一握
去兩頭用水三大升煎取一升頓服
心腹脹滿○痛悶欲死鹽五合水一升煎服吐下即定不
吐再服○蔓菁子一大合揀淨搗爛水一升和研濾汁
一盞頓服少頃自利或自吐或得出汗即愈○未得吐
下取楠木削曰四兩水三升煮三沸飲之

心腹虛脹○手足厥逆或飲苦寒之劑多未食先嘔不能
飲食山藥半生半炒為末米飲服二錢一日二服大有
功效忌鐵器生冷

胃腕血氣○作痛水紅花一大撮水二鐘煎一鐘服
血氣攻心○痛不可忍蓼根洗到浸酒飲○沒藥末二錢
水一盞酒一盞煎服

寒氣心疝○三十年者射罔食茱萸等分為末蜜丸麻子
大每酒下二九日三服

大熱心悶○槐子燒末酒服方寸匕
心落嘔噦○心下痞堅生姜八兩水三升煮一升半夏五
合洗水五升煮一升取汁同煮一升半分再服
伏梁結氣○在心下不散桃奴三兩為末每空溫酒服

二錢
心熱尿赤。面赤唇乾。咬牙口渴。導赤散用木通生地黃

膜外氣疼。及氣塊。延胡索不限多少。為末。猪胰一具。切

肺癰唾濁。心熱。薰末。頻食之。

調中快氣。心腹刺痛。小烏沉湯。香附子。擦去毛。焙二十

人卒心痛。詵曰。常食乾饅。飯令人熱。中唇口乾。不可同

失笑散。治男女老少。心痛腹痛。等證。悉胎產門。

心腹氣脹。胸膈不快。脾虛。不食。畢澄茄。打神。麩糊

丸。梧子。大姜。湯下。七十九丸。噎食不納。畢澄茄。白豆蔻

腋氣門

諸腋狐臭。伏龍肝。末。頻傳之。胡粉。常粉之。或以胡粉

三合。和牛脂。煎稠。塗之。三年。醃醋。和石灰。傳之。姜

汁。頻塗。絕根。自己。唾。擦腋。下。數。過。以。指。甲。去。垢。用。熱。水。洗

數。遍。如。此。十。餘。日。則。愈。後。用。辛。夷。細。辛。杜。衡。末。醋。浸。一

夜。傳。之。日。苦。瓠。殼。烟。燻。之。後。用。辛。夷。細。辛。杜。衡。末。醋。浸。一

切。開。摻。末。夾。之。夜。明。砂。末。或。汁。調。搽。牛。脂。和。胡。粉

腋。臭。陰。溼。凡。腋。下。陰。下。壓。臭。或。作。瘡。青。木。香。以。好。醋。浸

腋。下。疔。癰。瘦。下。陰。下。為。末。傳。之。研。末。搽。之。以。消。為。度

一。府。校。老。姬。右。腋。生。一。癰。漸。至。長。尺。許。其。狀。如。長。瓠。子

久而潰爛。一方士教以此法用之。遂出水消盡而愈。

腋氣

胸脇門

胸脇疼痛○因驚傷肝者枳殼一兩麩炒桂枝生半兩為
 細末每服二錢姜棗湯下
 胸腹冷氣○烏藥性和來氣少走泄多但不甚剛猛同沉
 香同磨作湯點服治胸腹冷氣甚穩當
 小結胸痛○正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主
 之半夏半升黃連一兩括樓實大者一個水六升先煮
 括樓至三升去滓納二味煮取一升分三服
 胸脇滿痛○凡心胸脇下有氣結實硬痛脹滿者生薑
 一斤搗碎雷汁慢炒待酒以絹包于患處熨熨之冷
 再以汁炒再熨良久豁然寬快也○時珍曰按素問云
 有病胸脇支滿者妨于食病至則先聞腥臊臭出清液
 先唾血四肢冷目眩時時前後血病名曰血枯得之年
 少時有所大脫血或醉入房中氣竭肝傷故月事衰少
 不來治之以四烏鯁骨一蘆薈為末丸以雀卵大如小
 豆每服五九飲以鮑魚汁所以利腸中及傷肝也觀此
 則其入厥陰血分無疑矣○羚羊角燒灰水服方寸匕

胸下痠癢○及傷飲食者煮黃丸用雄黃一兩巴豆五錢同
 研入白麩二兩滴水為丸梧子大每服二十四丸漿水
 煮三十沸入冷漿水沉冷吞下以利為度如神
 病後胸脹○天行病後而胸脹滿熬薑熨之
 酒癖胸脹○時復嘔吐腹有水聲川芎莢三稜炮各一兩
 為末每二錢葱白湯下
 心煩胸滿○連胸欲死者香薷搗汁一二升服
 腹脇積塊○風化石灰末半升瓦器炒極熱稍冷入大黃
 末一兩炒熱桂心末半兩炒米醋攪成膏攤紙貼之
 脇下疼痛○地膚子為末酒服方寸匕○小茴香一兩炒
 枳殼五錢麩炒為末每服二錢薑酒調服神効
 兩脇氣結○兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食用狼毒三兩
 附子一兩旋覆花三兩搗末蜜丸彈子大每服三丸食
 前白湯下日三服
 腸脇卒痛○大豆炒二升酒三升煮二升頓服
 腹脇刺痛○腎臟虛冷痛不可忍棘鍼鈎子一合焙桂柳
 二錢半水煎五分入好酒半盞更煎三五沸分二服
 脇漏出水○不止用烏牛耳垢傅之即瘥

胸脇

痲痺不痿○膝下硬如石京三稜一兩炮川大黃一兩為

末醋熬成膏每日空心生姜橘皮湯下一匙利下為度

胸脾痰嗽○胸痛微背心腹痛痞滿氣不得通及治痰嗽大

瓜蒌去麩取子炒熟和殼研末麪糊丸梧子大每水飲

下二三十九日二服

胸中脾痛○引背喘息欬唾短氣寸脈沉遲關上緊數大

括樓實一枚切薤白半斤白酒七升煮二升分再服加

半夏四兩更善○枳實搗末湯服方寸匕日三夜一

胸痺結胸○胸痹心下痞堅留氣結胸脇下逆氣搶心枳

實薤白湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白半斤括樓

一枚桂兩以水五升先煎枳朴取二升去滓綱餘藥

煎三兩沸溫分三服當愈

傷寒胸痛○傷寒後卒胸膈閉痛枳實麩炒為末米飲服

二錢日二服

胸痹急痛○胸脾痛如針刺不得俯仰自汗出或徹背脊上

不治或至死可取生韭或根五斤洗搗汁服之○胸痹

痛徹心背喘息欬唾短氣喉中燥痒不治殺人用括樓

實一枚薤白半斤白酒七升煮二升分二服

手臂門

手指腫痛○漿水入少鹽熱漬之冷即易之

風癩癢手○鐵砂四兩礪砂三錢黑脚白礬六錢研末以

熱醋或水拌溼油紙裹置袋內任意執之冷再拌

代指腫痛○麻沸湯漬之即安○猪膏和白善土傅之○

甘草煎湯漬之○地榆煮汁漬之半日愈

十指疼痛○及指惡瘡消毒止痛鏡面草搗爛傅之

手指掣痛○醬清和蜜溫熱浸之愈乃止

手指赤色○隨月生死以生薤一把苦酒煮熟搗爛塗之

愈乃止

驚掌風病○蕪艾員者四五兩水四五碗煮五六滾入大

口瓶內盛之用麻布二層縛之將手心按瓶土藥之如

冷再熱如神

手臂疼痛○當歸三兩切酒浸三日溫飲之飲盡別以三

兩再浸以瘥為度

痰注臂痛○天仙藤白朮羌活白芷稍各三錢片子姜黃

六錢半夏製五錢每服五錢姜五片水煎服仍間服干

三百二十二

金五套丸

風熱臂痛○桑枝一小升切炒水三升煎二升一日服盡
許叔微云常病臂痛諸藥不効服此數劑尋愈觀本草
切用及圖經言其不冷不熱可以常服抱樸子言一切
仙藥不得桑枝煎不服可知矣
痰溼臂痛○右邊者南星製蒼朮等分生姜三片水煎服

之
手臂腫痛○時珍曰一人病手臂一塊腫痛亦用蓖麻搗
膏貼之一夜而愈

臂脛疼痛○虎骨酒治之不計深淺皆効用虎脛骨二大
兩搗碎炙黃羚羊角屑一大兩新芍藥二大兩切三物
以無灰酒浸之養至七日秋冬倍之每日空腹飲一盃
若要速服即以銀器物盛于火爐中煖養三二日即可
服也

脾橫瓜赤○煎羊脂摩之
穿掌腫毒○新桑葉研爛會之即愈
時傷冷痛○猪腎一對桂心二兩水六升煮三升分三服
熱毒攻手○腫痛欲脫猪膏和羊屎塗之○手足腫痛欲

脫以水煮馬屎汁漬之
血餘怪病○手十指節斷壞惟有筋連無節肉重出如灯
心長數寸遍身綠毛卷名曰血餘以茯苓黃連煎湯飲
之愈

歷節腫痛○風熱攻手指赤腫麻木甚則攻府青兩膝遇
暑熱則大便秘牛蒡子三兩新豆豉炒透焙各一兩為
末每服二錢白湯下

手背皴裂○大風子搗泥塗之
凍指欲墮○馬糞煮水漬半日即愈
熱病餘毒○攻手足疼痛欲脫用稻穰灰煮汁漬之
手足心痛○乃風也椒薑末等分醋和傅之良

毒攻手足○腫痛欲斷蒼耳搗汁漬之并以滓傅之立効
春用心冬用子○時疫流毒攻手足腫痛欲斷用虎杖
根到煮汁漬之○天行餘毒手足腫痛欲斷作坑深三
尺燒熱灌酒着底居坑上以衣壘之勿令泄氣○傷寒

遺毒手足腫痛欲斷黃蘗五斤水三升煮潰之○傷寒
後毒氣攻手足及身體虛腫用鼓五合微炒以酒一升
半同煎五七沸任性飲之○傷寒時氣毒攻手足腫痛

手背
三百二十一

欲斷牛肉裹之腫消痛止。○傷寒肢痛手足。○欲脫取

手足麻木。○不知痛痒。霜降後桑葉煎湯頻洗。

手足心毒。○風氣毒腫。蓋未等分酢和傳之立愈。

手足痛風。○冷痛如虎咬者。用樟木屑一斗急流水一石

煎極滾泡之。乘熱安足于桶上熏之。以草薦圍住勿令

湯氣入目。其功甚捷。此家傳經驗方也。○黃蜂窠大者

一個小者三四個。燒灰獨頭蒜一碗百草霜三錢半同

搗傳上一時取下埋在陰處。忌生冷葷腥。

手足發指。○毒痛不可忍。用壁間泥擊窠為末入乳香少

許研勻以醋調塗乾即以醋潤之。

手足偏風。○葫蘆葉火療厚鋪床土趁熱眠于上冷復易

之冬月取根春碎熬熟用。

手足不遂。○大風及丹石熱風不遂用消石二兩生烏麻

油二斤置鑊中以土壅口紙泥固齊火煎初時氣腥

熟則氣香更以生麻油二升合煎得所收不津器中服

時坐室中重作小紙屋然火于內服一合發汗力壯

者日二服三七日頭面之疔瘡皆滅也然必以火為使○

鼓三升水九升煮三升分三服。○又法鼓一升微熬囊

貯漬三升酒中三宿溫服常令微醉為佳。

手脚酸痛。○微痛用脂麻熬研五升酒一升浸之有隨意

飲之。

入水肢腫。○作痛生胡麻搗傳之。

手足癩疽。○此疽喜着手足肩背累累如赤豆剝之汁出

用薰薑葉煮汁服一升并食乾熟菜數頓少與鹽醬冬

月用子研水服。

手足甲疽。○熏黃蛇皮等分為末以泔洗淨割去甲入肉

處傳之。○頭痛定神効。

刺傷手足。○犯露水腫痛多殺人以桑枝三條燒火炮熱

斷之以頭熨瘡上令熱冷即易之盡二條則瘡自爛仍

取韭白或薤白傳上急以帛裹之有腫更作。

肉雖怪病。○有人手足忽長倒生肉刺如錐痛不可忍者

但食葵菜即愈。

風痰注痛。○躑躅花天南星並生時同搗作餅甑上蒸四

五遍以稀葛囊盛之臨時取焙為末蒸餅丸梧子大每

服三九溫酒下腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良

三百二十四

痛風走注○黃躑躅根一把糯米一盞黑豆半盞酒水各

一疏徐徐服大吐大泄一服便能動也

風寒溼痺○四肢攣急膝腫不可踐地用蘇子二兩杵碎

以水三升研取汁者梗米二合作粥和葱椒姜豉食之

手足皸裂○白芨末水調塞之勿犯水○附子去皮為末

以水麴調塗之良○山藥一截磨泥傅之○老絲瓜燒

存性和臘諸脂塗之○生白果嚼爛夜夜塗之○猪脂

着熱酒中洗之○以酒柯猪脂洗并傳之

指甲軟薄○時珍曰蠶蚕之病風者治風化痰散結

行經所謂因其氣相感而以意使之者也又入指甲軟

薄者用此燒烟熏之則厚亦是此義

指痛木痺○遲延必生蛇頭蛙節蠅蚰銀硃其搗擦之

手丫枝痛○痛苦無奈者通草屑為末雞蛋清調搽即消

驚掌風癢○以斷艾側柏葉湯煎熱熏洗一月愈○雄黃

甲片火燒熏之愈○豆腐泔水洗手亦愈

手足凍裂○白芨為末蘿蔔內滾蠟燭油調敷數日可愈

誤斷指頭○椴香末搽之七日不落水冒風不必再換

腰痛門

腰腹諸痛○煇硝雄黃各一錢研細末每點少計入背內

腰脚疼痛○天麻半夏細辛各二兩絹袋二個各盛藥令

勻蒸熟交互熨痛處汗出則愈數日再熨○新胡麻一

升熬香杵末日服一小升服至一斗永痊温酒蜜湯姜

汁皆可下○甜瓜子三兩酒浸十日為末每服三錢空

心酒下日三

腰脚風痛○不能履地身角子一于二百個洗淨以少酥

蒸香為末蜜丸梧子大每空心以蕪荜子酸棗仁湯下

三十九丸

腰痛脚氣○木瓜湯治腰膝痛脚氣羊肉一脚草菓五枚

梗米二升回回豆即胡豆半升木瓜二斤取汁入沙糖

四兩鹽少許煮肉食之

腰脚錐痛○支腿者猫兒屎燒灰壓津調塗之

腎臟風壅○腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大温酒服八

十丸平明微利惡物如青膿膠即是風毒積滯也未利

再服一百丸取後食粥補之一月仍常服温補藥

三百二十五

腰脚冷痺○疼痛有風川烏頭三個生去皮臍為散醋調

塗帛上貼之須臾痛止○行履不穩者算解二四分

杜仲入分搗篩每旦溫酒服三錢七禁牛肉○腰脚風

血積冷筋急拘攣疼痛者取茄子五十斤切洗以水五

斗煮取濃汁濾去滓更入小鎗中煎至一斤切洗以水五

生栗粉同煎令稀稠得所取出搜和更入麝香硃砂末

同丸如梧子大每日用球米酒送下三十九丸近暮再服

腰脚風氣○作痛太黃二兩切如棋子和少酥炒乾勿令

焦搗篩每用二錢空心以水三合入姜三片煎十餘

沸取湯調服當下冷膿惡物即痛止

卒腰脊痛○不能轉側鹿角五寸燒赤投二升酒中浸一

宿飲

腰脚疼痛○或頑麻無力兒絲子洗一兩牛膝一兩同入

銀器內酒浸一寸五分暴為末將原酒煮糊丸梧子大

每空酒服三十九丸○用海桐皮二兩牛膝芎藭老

活地骨皮五加皮各一兩甘草半錢煮黃仁二兩生地

黃十兩並洗淨焙乾剉以綿包裹入無灰酒二斗浸之

冬二七夏一七空心飲一盞每日早午晚各一次長令

醞醞此方不得添減禁毒食○傷敗者鹿茸塗酥炙紫

為末每酒服一錢

腰脚無力○韭子一升揀淨蒸兩炊久暴乾去黑皮炒

黃搗粉安息香二大兩水煮一二百沸慢火炒赤色和

搗為丸梧子大如乾人少蜜每日空腹酒下三十九丸以

飯三五匙壓之大佳○粟子食數升即能起行此是腎

補之義○腰脚不隨變急冷痛取虎歷骨五六寸刮去

肉膜塗酥炙黃搗細絹袋盛之以瓶盛酒一斗浸之燻

大微溫七日後任性飲之當微利便効也○又方虎腰

脊骨一具前兩脚全骨一具並于石上以斧搥碎安鐵

床上交炭火炙待脂出則投無灰濃酒中蜜封春夏七

日秋冬三七日任性日飲三度患十年以上者不過三

劑七年以上者一劑必瘥

腰脊脹痛○蕙藜子搗末蜜和丸胡豆大酒服一丸日三

服○芥子末調酒貼之立効

卒然腰痛○大豆六升水拌溼炒熱布裹熨之冷即易○

不可俯仰用鼈甲炙研末酒服方寸七日

腎腰疼痛○生葛根嚼之燕汁取効乃止
冷氣腰痛○元胡索桂心當歸三味等分為末温酒服三
四錢隨量頻進以止為度遂痛止蓋元胡索能活血化

氣滯腰痛○青木香乳香各二錢酒浸飯上蒸勻以酒調
服○牽牛不拘多少以新瓦焙赤安于上自然一半生

初以水一盞煮熟連湯温下痛即已未住隔日再作
分作三服每服用白麪三匙水和捍開切作碁子五更

腎虛腰痛○用破故紙一兩炒為末温酒服三錢神妙或
加木香○錢○青娥丸治腎氣虛弱風冷乘之或血氣

相搏腰痛如折俯仰不利或因勞傷腎或廣溼傷腰
或損墜傷或風寒客搏或氣滯不散皆合腰痛或腰

問如物重墜用破故紙酒浸炒一兩為末以蒜搗膏一兩和丸
炒一斤胡桃肉去皮皮二十個為末以蒜搗湯下常服壯

筋骨活血脈烏鬚益顏色○茴香炒研以猪腰子批
開摻水入內淫紙裹煨熟空心食之塩酒送下○用杜

仲去皮炙黃一大斤分作十劑每夜取一劑以水一大
升浸至五更煎三分減一取汁以羊腎三四枚切下再

煮三五沸如作羹法和以椒搗空腹頓服○枸杞根杜
仲萸薢各一斤好酒三斗漬之罌中密封鍋中煮一日

飲之在任意○用猪腰子一枚切片以椒搗醃去腥水入
杜仲末三錢在內荷葉包煨食之酒下○用羊腎去膜

陰乾為末酒服二方寸匕○用羊脊骨一具搗碎煮和
蒜薤食鹽少酒炒○如鐘刺不能動搖鹿角屑三兩炒

黃研末空心酒温服方寸匕○日三
虛寒腰痛○鹿角去毛酥炙微黃附子炮去皮臍各二兩

鹽花三分為末棗肉和丸梧子大每服三十九空心温
酒下○糯米二升炒熟袋盛拴靠痛處以茴香研酒服

陰虛腰痛○不能反側鹿茸炙兔絲子各一兩船茴香半
兩為末以羊腎二對用酒煮爛搗泥和丸梧子大陰乾

每服三五丸温酒下日三服
久疹腰痛○積年有時發動六月七月取地膚子乾末酒

溼氣腰痛○蟻螻草連攪是科慈白連鬚七科棗七枚煮
三百二十七

腰痛

酒一瓶常服終身不發
寒溼腰痛○蒴藿葉火燎厚鋪床墊趁熱眼于上冷復易

腰痛如刺○用八角茴香炒研每服二錢食前鹽湯下外
以糯米一二升炒熱袋盛控于痛處○獨活杜仲各二

兩炒研末每服二錢鹽湯下
腰痛難轉○煎茶五合投醋三合頓服

腰重作痛○板柳為末酒服一錢
老人腰痛○及腿痛用棠球子鹿茸炙等分為末蜜丸梧

子大每服百丸日二服
腰痛不止○天羅布瓜子仁炒酒服以浮傅之○絲

瓜根燒存性為末每溫酒服二錢神效甚捷
髮瘦腰痛○宋宮人腰痛率心徐曰髮瘦也油灌之此

物如髮長三尺頭已成蛇能動搖腰之痛需惟一髮爾
打墜腰痛○瘀血凝滯破故紙茴香炒辣桂等分為末每

酒服二錢故紙五腰痛行血○冬瓜皮燒研酒服一錢
閃挫腰痛○用白蒿草子炒三兩白粟米炒一撮乳香沒

藥烏梅肉各半兩為末陳蜜丸彈子大每嚼一丸熱酒

下○橙子核炒研酒服三錢即愈○用豬鬃一校批

片鹽椒醃過入甘遂末三錢荷葉包煨熟食酒送下
婦人腰痛○向東蕤荷根一把握搗汁三升服之○鹿角屑

炒黃研酒服方寸匕日五六服
氣溼脾痛○腰膝痛用牛膝葉一斤切以米三合于豉汁

中煮粥和鹽醬空腹食之
腰重刺脹○八角茴香炒為末食前酒服二錢

風冷傷腎○腰背虛痛杜仲一片切炒酒二升漬十日日
服三合○杜仲為末每日以溫酒服二錢

腰痛措牙○香附子五兩生姜二兩取自然汁浸一宿炒
黃為末入青塩二錢藥牙數次其痛即止

煖益腰膝○治腰膝暖水臙盆顏色其功不可具載硫黃
半斤桑柴灰五斗淋取汁煮三伏時以鐵匙炒于火上

試之伏火即止候乾以大火煨之如未伏再煮以伏為
度煨了研末穿地坑一尺二寸投水于中待水清取和

硫末坩錫內煎如膏鐵刺炒出細研酸丸麻子大每空
心塩湯下十九丸王昭服之年老貌童功倍常人

反腰血痛○桂末和苦酒塗之乾藥上
腰痛藥酒

肩背乳門

虛火背熱○虛火上行背內覺如炙者附子末津調塗

背腿間痛○一熱痛不百思老莠花根末米醋調傅之如

項強筋急○不可轉側肝腎二臟受風也宜州木瓜二

個取蓋去穢沒藥二兩乳香二錢半二味入木瓜內縛

定飯上蒸三四次爛研成膏每用三錢入生地黃汁半

蓋無灰酒二盞煖化溫服之入患此自午後發黃昏時

定予謂此必先從足起少陰之筋自足至項筋者肝之

合今日中至黃昏陽中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱

之時故靈室畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎三

臟受邪故發于此時于授此及都梁丸服之而愈

項下熱腫○俗名蝦蟆濕五葉藤搗傅之

背腫如盤○治背土忽腫如盤不識名者取水巾白石

項強硬○不得顧視大豆一升蒸色變囊裹枕之○不

得顧視穿地作坑煨赤以水洒之令冷鋪生挑葉于內

虛寒積癖○在背膜之外流于兩脇氣逆喘息久則管衛

凝滯漬為癰疽多至不救用胡椒二百五十粒蝎尾四

個生木香二錢半為末粟米飯丸菜豆大每服二十丸

橋皮湯下名磨積丸

擔肩癰痛○倍子飛丹煉細末醋調搽即消○又方黃柏

末一錢蜈蚣一條烘研末和勻豬胆汁調搽亦愈

男女乳潰○成片無鬚痛痒不休蚌殼末五錢輕粉五

分冰片一分研勻銀花湯調搽兩三次結膿收功

乳起開花○寒水石一錢冰片五厘葶薺汁調搽可愈

乳起結核○初起並不疼痛最惡之症每日山茨菇一錢

胡桃三枚共搗酒服以散為度否則變患莫測

奶串久潰○乳癰串爛年久不愈洞見內腑搖船櫓上首

手捏之處舊藤籬剪下煨末參之乾處香油調搽即愈

簾珠倒掛○胸間兩旁各生紅白癰泡浸淫疼痒直長一

條連生十餘個不等久則變入膿端午日人家簷口所

肩背乳門

腹痛門

攬腸沙痛○陰陽腸痛手足麻痺○此身上有紅點以燈草蘸

油點火燂于點上○用河瀉○此亦冷水淬之澄清服一

二合○欲死者用馬糞研○以之立愈○童子小便服

之即止○天行病小腹痛○小腹痛黃末蜜丸納屎

孔中入半寸○疔刺不思飲食○川烏頭等分生研為

末酒糊丸○如梧子大每服此丸生薑湯下小腹痛苗

冷氣腹痛○吳茱萸二錢搗爛以酒二鐘調之用香油一

盃入鍋煎熱傾茶黃酒入鍋煎一滾取服立止

腹中虛痛○白芍藥三錢炙甘草一錢夏月加黃芩五分

惡寒加肉桂一錢冬月大寒再加桂一錢水二盞煎一

半溫服○三柰丁香當歸甘草等分為末醋糊丸梧子

腹中冷痛○三柰丁香當歸甘草等分為末醋糊丸梧子

冷氣拂痛者取一二寸搗碎同吳茱萸煎湯飲之亦將

隨行卒患心痛嚼一二寸熱湯或酒送下亦効○以布

裹川椒安痛處用熨斗熨令椒出汗即止

腹痛熱滿○羚羊角燒末水服方寸匕

小腹痛○青黑或赤色不能言者苦參一兩醋一升半

煎入合分二服

卒患腹痛○山豆根水研半盞入口即定○令人騎其

腹溺小便于臍中

內釣腹痛○木香乳香沒藥各五分水煎服之

陰毒腹痛○燒酒溫飲汗出即止○厥逆唇青卵縮六脈

欲絕者用葱一束去根及青頭白二寸烘熱安臍上以

熨斗火熨之葱壞則易良久熱氣透入手足溫有汗即

陰證腹痛○桑椹繩包風乾濕伏天為末每服三錢熱酒

下取汗○面青甚者鴿子糞一大抄研末極熱酒一盞

和勻澄清頓服即愈○交接身毒腹痛欲死假猪血乘

熱和酒飲之

虻虫腹痛○棋棋二兩酒一盞分二服○白鴿屎

腹痛

二百三十一

燒研飲和服之

蠱疰腹痛○雄猫屎燒灰水服

鬼疰腹痛○不可忍者獨頭葱 故香 如裏火搗和醬

惡疰腹痛○不可忍者○熟酒服一二錢立止

臍下絞痛○芥子末蜜丸梧子末并華水寅時下七丸中

時再服○木瓜三片桑葉七片大棗三枚水三升煮半

升頓服即愈 野葡萄根七錢葛根三錢水一鐘煎七分入

童便止○野葡萄根七分葛根三錢水一鐘煎七分入

雷飲腹痛○依日十四枚巴豆一枚破十六枚合搗為三

心腹氣痛○烏藥水磨濃汁一盞入橘皮一片蘇一葉煎

腸痛如打○大豆半升熬焦入酒一升煮沸飲取醉

脾痛不止○荔枝核為末醋服二錢數服即愈

急吐痰病○用木八頭髮三十根燒過酒服即以水調芥

子末封在臍內大汗如雨即安

腹痛脹滿○厚朴半斤製甘草大黃各三兩棗十枚大枳

實五枚桂二兩生薑五兩以水一斗煎服四升溫服入

合日三嘔者加半夏五合 如彈丸吞之立愈

少腹脹數○厚朴半斤枳實五枚以水一斗煎取五

升入大黃四兩再煎三升溫服一升轉動更服不動勿

服 中脹滿○痛悶欲死盥五合水一升煎服吐下即定不

吐更服○蔓菁子一大合揀淨搗爛水一升和研濾汁

一盞頓服○小頃自利或白吐或得汗即愈

腹脹積聚○葶藶子一升熬以酒五升浸七日服三合

中脹緊脹○白糖以酒三升煮服之不過再服 豬血濾去水晒

乾為末酒服取洩甚効 腹滿癰堅○如石積年不損者必効方用白楊木東枝去

粗皮辟風細到五升熬黃以酒五升淋訖用絹袋盛滓

腹痛

三百三十一

食果腹脹○不拘老小用桂末飯和丸菜豆大吞五六丸

老幼腹脹○血氣凝滯用此寬胸順氣若四炒丸商州枳

殼厚而綠背者去穢四兩分作四分一兩用蒼朮一兩

同炒一兩用茴香一兩同炒黃去四味只取枳殼為末以四

味煎汁煮麩糊九梧子一升壓破酒五升漬二七日空腹每

腹中癖氣○生芋子一升壓破酒五升漬二七日空腹每

腹中痞積○大黃十兩為散醋三升蜜二匙和煎丸梧子

大每服三升如羣石在腹用大豆半升生薑八分水三

升煎一升已來頓服瘥○觀音柳煎湯露一宿五更空

腹中積滯○烏金石即鐵崖也三兩自然銅為末醋熬一

兩當歸一兩大黃童尿浸晒一兩為末每服二錢紅花

酒一盞童尿半盞同調食前服日二服

腹中血塊○血竭沒藥各一兩滑石牡丹皮同煮過一兩

為末醋糊丸梧子大每服三四十九

腹中虫病○大麻子仁三升東行茱萸根八升漬水平旦

服二升至夜虫下

心腹惡氣○艾葉搗汁飲之○杏仁桂枝橘皮訶梨勒皮

等分為丸每服三十九丸白湯下無忌

水蠱腹大○惡實微炒一兩為末麩糊丸梧子大每米飲

腹大如箕○用蜈蚣三五條酒炙研末每服一錢以雞子

連進三服瘳入末在內攪勻糝糊沸湯煮熟食之日一服

小腹堅大○如盤胸滿食不能消化用麴末湯服方寸七

脾溫腫滿○腹腫如鼓喘不得卧海金沙散用海金沙三

錢白朮四兩甘草半兩黑牽牛頭末一兩半為末每服

一錢煎倒流水調下得利為妙

腹冷麻痺○不仁者多煮葱白食之即愈

腹冷氣起○白芥子一升微炒研末湯浸蒸餅丸小豆大

每姜湯吞十九甚妙

腹痛

三百三十二

陰冷入腹○有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿日夜疼悶欲死以布裹包囊下熱氣大通日再易之以消為度

腹中虛冷○不能飲食食輒不消羸弱生病蒼木二斤麴一斤炒為末蜜丸梧子大每服三三十九丸米湯下日三服

○大冷加乾姜三兩腹痛加當歸三兩羸弱加甘草二兩○食輒不消羸瘦弱因生百病大麥蘖五升小麥麴半斤或五合杏仁二升熬黃香搗篩糊丸彈子大每服

虛冷短氣○川椒三兩去目并去合口者以生絹袋盛浸無灰酒五升中三日隨性飲之

腎臟積冷○氣攻腹脇脹滿疼痛用大木瓜三十枚去皮核剉空以甘菊花末青蘘末各一斤真滿置籠內蒸熟搗成膏入新艾茸二斤搜和丸如梧子大每米飲下三轉筋入腹○釜底墨末和酒服一錢○茱萸炒二兩酒二

芍藥各五錢為末黃蠟溶化和丸梧子大每空米飲下二九待膿血出盡服十宣散補之

腹癰有膿○薏苡仁附子敗醬湯用薏苡仁十分附子二分敗醬五分搗為末每以方寸匕水二升煎一升頓服

臍虫怪病○腹中如鐵石臍中水出旋變作虫行遶身匝痒難忍撥掃不盡用蒼朮煎湯浴之仍以蒼朮末入麝香少許水調服

青腸氣痛○婦人少腹痛馬蹄根為末每米飲服二錢日二服極効

惡風入腹○久腫惡風入腹及女人新產風入產戶內如馬鞭嘘吸短氣咳嗽者用鯉魚長一尺五寸以尿浸一宿平旦以木篦從頭貫至尾文火炙熟去皮空心頓食勿用鹽醋

少腹絞痛○昔有人素多酒慾病少腹絞痛不可忍小便如淋諸藥不効偶用黃芩木通甘草三味煎服遂止

諸蟲門

寸白虫病○先食諸肉一食乃以沙饒水調黑鉛灰四錢
 五更服之虫盡下食白粥一日○胡粉炒煨方寸匕入
 肉臚中空心服大効○赤藤善殺虫利小便連酌飲之
 其甘如飴送曉虫出盈席心腹頓寬宿疾遂愈○酢石
 糶東引根一握洗剉用水三升煎取半碗五更温服盡
 至明取下水虫一大團永絕根○日食榧子七顆滿七日
 虫皆化為水也○用榧子一百枚去皮火燃燉之經宿
 虫消下也胃弱者啖五十粒
 蚊虫心痛○治小蚊咬心痛面青口中沫出臨死者取扁
 竹十片剉以水一石煎至一斗去滓煎如飴隔宿勿食
 空心服一升虫即下也仍常煮汁作飯食○海上歌云
 心頭急痛不能當我有仙人海上方扁竹醋煎通口燉
 管教時刻便安康
 蛔虫攻心○刺痛吐清水龍胆草一兩去頭到水二盞煮
 一盞隔宿勿食平旦頓服之
 心痛有虫○芫花一兩醋炒雄黃一錢為末每服一字温

醋湯下
 腹中虫病○漏盧為末以餅臚和方寸匕服之
 腹中白虫○馬齒莧水煮一碗和鹽醋空腹食之少頃白
 虫盡出也
 腹中長虫○棟實以淳苦酒漬一宿綿裹塞入穀道中三
 寸許日二易之
 一切虫病○狼毒作末每服二錢用錫一皂子大沙糖少
 許以水化開即時空腹服之次早即下虫也
 諸虫在臚○久不痊者棋榔半兩炮為末每服二錢以葱
 蒜煎湯調服一錢
 小兒虫病○凡殺虫藥多是苦辛惟使君子榧子甘而殺
 虫亦異也凡大人小兒有虫病但每月上旬清晨空腹
 服使君子仁數枚或以湯煎湯嚙下次日虫皆死而出
 也或云七生七煨熟食亦良忌飲熱茶犯之即瀉
 肝勞生虫○眼中赤脈吳茱萸根為末一兩半粳米半合
 雞子白三個化蠟一兩半和丸小豆大每米湯下三十
 丸當取虫下
 制殺諸虫○生蒸漢生紙各四兩為末蒸餅丸梧子大
 三百三十四

每服二十九白湯下

除三尸虫 ○桃葉杏仁服一升
下不止 ○真寶文藝各一兩桂半兩
川烏頭二兩為末

重衣去虱 ○百部素瓦為末
以竹籠燒燻之自落亦可

疔氣成癩 ○山野人好嘔風
在腹生長為虱癩用敗梳敗

者取一升調服即下出
一芬燒研以一分用水五升

銀梨垂痒 ○皂礬川椒棟樹子
黃豆各炒一錢柏油調燻

殼散 ○疔疔核燥寒水石各二錢
冰片七分研勻勿

出氣麻油調搽溼者燥疹神効
疥疥各二錢白薇白芷花柳炒出汗
細末用臘脂油和勻搗擦之甚効
薰法用紅棗三枚

煎艾雄黃花柳各三分以
上四味安火爐內燒熏焙衣

平身方卷四 下部

關格門

小便閉 ○脹悶欲死二三日則殺
人膩粉一錢生麻油

一合相和空心服 ○鹽和苦酒
傳臍中乾即易仍以搯

汗灌臍內并內用紙裹鹽投水中
飲之 ○大小便閉脹

欲死兩三日則殺人以芒硝三兩
泡湯一升服取吐即通

然通臍平者以紙圍環之 ○甘遂
末以生麩糊調傳臍

中及丹田內仍艾三壯飲甘遂湯
以通為度 ○時珍曰

外甥柳喬素多酒色病下極脹痛
二便不通人叩子思

此乃溼熱之邪在精道壅脹遂路
病在二陰之間故前

阻小便後阻大便病不在大腸臍
脫也乃用棟實茴香

穿山甲諸藥人牽牛加倍水煎服
一服而減三服而平

服冬用榆皮 ○巴豆連油黃連各
半兩搗作餅子先商

葱鹽汁在臍內安餅子上灸二七壯取利為度○豬脂

姜汁各二升下酒五合和煎分服

關格脹滿○千金用葵子為末猪脂和丸梧子大每服五

反胃關格○氣噎不通丁香木香各一兩每服四錢水一

氣壅閉格○不通小便淋結臍下防悶兼痛滑石粉一兩

水調服

癰閉不通○小便急痛無問久新荆芥大黃為末等分每

溫水服三錢小便不通大黃減半大便不通荆芥減半

下部閉寒○葫蘆根一把搗汁和水絞去滓強人每服一

下焦結熱○小便淋閉或有血出或大小便出血瞿麥穗

一兩甘草炙七錢五分山梔子仁炒半兩為末每服七

錢連鬚葱頭七個燈心五十莖生姜五片水二器煎至

七分時時溫服各立效散

大小便血○好墨細末二錢阿膠化湯調服熱多者九相

宜○劉寄奴為末茶調空心服之錢即止○鹽黃散治

腸風大小便血淋瀝疼痛用蟹黃蛭蛻紙並燒存性晞

蚕沙白蠶並炒等分為末入麝香少許每服二錢用

米飲送下日三服甚效

產後秘塞○五七日不通不宜妄服藥丸宜用大麥芽炒

黃為末每服三錢沸湯調下理弱間服○大小便不通

用挑花葵子滑石煨鄒等為末每空心葱白湯服二錢即利

利大小便○莧實為末半兩分二服新汲水下

小便久閉○諸藥不効以麝香少許和患者頂心頭泥作

條入尿管封馬口使氣透入尿管內不過一時即通

小便不出○溺管痛不可忍淡豆豉五錢煎湯溫服

大便不通○除有病者仍從病治如無故不通用蘆薈一

錢硃砂五分共研細以飯為丸桐子大開水即通

女子轉胞○小便不通腹脹如鼓數日垂死用猪胞吹脹

以鷺毛管安上插入陰孔捻胞氣吹入即大尿

小便不通○調乾麩圈出臍眼高寸許以葱裝射直安臍

中麩圈內填蘆麥三五裝熱氣道臍內其便即通

三百二十六

結燥門

大便壅結。臍粉半錢沙糖一彈丸研。九梧子大每服五
 丸。臨臥溫水下。又方。臍粉二錢黃丹一錢為末每米
 飲服一錢。皂礬一錢。巴霜二個。同研入雞子內攪勻
 封頭。溼紙裹煨熟食之。酒下即通。當歸白芷等分為
 末。每服二錢米湯下。
 大便閉塞。羊胆汁灌肛門內。即通。猪胆九妙。
 大便風秘。香白芷炒為末。每服二錢米飲入蜜少許連
 服二服。荻藜子炒一兩猪牙皂煨去皮酥炙五錢為
 末。每服一錢。鹽湯送下。
 大便卒結。羊蹄根一兩水一盞煎六分溫服。
 大腸乾結。厚朴生研。猪膽煮搗和丸。梧子大每姜水下
 三十九丸。
 大便燥塞。以松子仁研泥。加生白蜜三錢水調服。
 大便不通。十日。至一月者。冬共子三升水四升。煮取一
 升。服不瘥。更服。葵子末。人乳汁等分。和服。立通。用
 牽牛子半生半熟。為末。每服一錢。姜湯下。未通。再以茶

服一方。加大黃等分。麻子煮粥下。葱椒搗空。心服
 多。其功神聖。兼能取水。猪胆治大便不通。以葶筒
 紙入下部三寸灌之。立下。
 大便不快。裏急後重。用桃仁三兩。去皮。吳茱萸二兩。食
 鹽一兩。同炒熟。去鹽。茶每嚼桃仁五七粒。
 大腸難閉。桃花為末。水服方寸匕。即通。
 三七粒。搗作餅。烘掩臍中。扎定。良久氣通。即通。不通。再
 作。松子仁。柏子仁。麻子仁。等分。研泥。落白蠟和丸。梧
 子大。每服五十九。黃芪湯下。
 燥渴。秘。九月十月。熟菰蘇實。取甄拌乾。葛粉。銀石器
 中。慢火炒熟。為末。食後。夜臥。各以沸湯點服。二錢。
 乾糞塞腸。脹痛不通。用毛桃花溼者。一兩。和麩三兩。作
 餅。熟。空。食。之日。午。腹。鳴。雷。當。下。惡。物。也。
 熱黃便結。用蕪菁子。搗末。水和絞汁。服少頃。當瀉。一切
 惡物。砂石。草髮。並出。
 老人閉塞。綿黃著。陳皮。去白。各半兩。為末。每服三錢。用
 結燥

大麻子一合研爛以水瀉漿煎至乳起入白蜜一匙再煎沸調藥空心服甚者不過二服此藥不冷不熱常服無閉塞之患其効如神○柏子仁松子仁大麻仁等分同研溶蜜蠟丸梧子大以少黃丹湯食前調服二三十丸日二服

老人冷秘○風秘或泄瀉煖元臘除積冷溫脾胃進飲食治心腹一或痞癖冷氣疏黃柳木槌研細半夏湯泡七次焙研等分生薑自然汁調蒸餅和杵百下凡梧子大每服十五丸至二十九空心溫酒或姜湯下婦人醋湯下

大便溼悶○腸胃有溼大便秘塞大樞榔一核麥門冬煎湯磨汁溫服或以蜜湯調末二錢服亦可
大腸冷積○威靈仙末蜜丸梧子大一更時生薑湯下十丸至二十九
大腸冷秘○陳皮連白酒煮焙研末每溫酒服二錢米飲下

痔病秘結○用此寬腸黃連枳殼等分爲末糊丸梧子大每服五十九空心米飲下

大便頻數○宗廟曰今人惟知半夏去痰不言益脾蓋能分水故也脾惡溼溼則濡困困則不能治水經云水勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩半夏大棗各

三十枚水一升養瓶中慢火燒爲熟水時呷之便已也
麻子仁丸○治脾約大便秘而小便數麻子仁二升芍藥半斤厚朴一尺大黃枳實各一斤杏仁一升熬研煉蜜丸梧子大一每以漿水下十九日三服不知再加

大便秘結○不通用猪苦胆于羊角內灌入直腸大便即可通利而不燥結矣○內服松子仁五錢研爲泥生白蜜一兩開水調服
糞門暴腫○腸胃流熱下注則糞門暴腫外以木鼈子磨塗糞門內服防風通聖散歌曰防風通聖芥麻黃歸芍

芎芩桔梗助薄荷葱翹梔滑石硝黃姜配石膏方
正水脹急○大小便不利欲死甘草五錢半生半炒胭脂坏子十文研勻每以一錢白麩四兩水和作碁子大水煮令浮淡食之大小便利後用平胃散加熟附子每以二錢煎服

腸風下血門

腸風下血。○黃芪黃連等分為末，麩糊丸。葉豆大，每服三十丸，米飲下。○木香黃連等分為末，入肥猪大腸內，兩頭紮定，煮極爛，去藥食腸，或連藥搗為丸服。○茶窠內，著藥燒存性，每服三匙，空心糯米湯下，或入麝香少許。○蜜炙蘿蔔，任意食之，昔一婦人服此，有效。○腸風下血，連蒂燒存性，為末，每日空心溫酒服二錢。○瓜燒存性，血不止，茄蒂燒灰，米飲服二錢。○霜後乾絲瓜，燒存性，為末，空心酒服二錢。○用寒藥，及脾弱藥，俱不効者，瀉用山裏果，俗名酸棗，又名鼻涕團，乾者為末，艾湯調下，應手即愈。○柏子十四個，槌碎，囊貯，浸好酒三盞，煎入分服，立止。○松木皮，去粗皮，取裏白者，切曬焙研為末，每服一錢，臘茶湯下。○便前近腎肝，便後近心肺，皂角刺灰二兩，胡桃仁破紋紙炒，槐花炒各一兩，為末，每服一錢，米飲下。○不拘遠年近日，用枳殼燒黑存性，五錢，羊脛炭為末，三錢，五更空心米飲下，如人行五里，再服一服，當日見効。○破絮燒灰，枳殼炒等分，麝香少

許為末，每服一錢，米飲下。○皮鞋底，垂蕪，蛻核，桃殼，紅雞冠花，等分，燒灰，每酒服一錢。

腸風瀉血。○早茨，樹上葦，瓦焙為末，每服一錢，溫酒下。○椿葉，牛生半，燒為末，每服二錢，半米飲下。

久近腸風。○下血用，緊灰三錢，枳殼燒存性，五錢，為末，每服二錢，五更米飲下。一服，天明再服，當日見効。○油膩毒物。

久病腸風。○痛痺不止，地榆五錢，蒼朮一兩，水二鐘煎，鐘空，心服，日一服。○瀉血，藥不，搗敗皮巾子，燒灰，白礬燒各一兩，人指甲，燒焦，麝香各一分，乾姜炮，三兩，為末，每服一錢，米飲下。

脾毒腸風。○因營衛虛弱，風氣襲之，熱氣乘之，血滲腸間，故大便下血，用臭椿根，刮去粗皮，焙乾，四兩，蒼朮米泔浸焙，枳殼炒各一兩，為末，醋糊丸，如梧子大，每服五

熱毒腸風。○蕨菜花，焙為末，每服二錢，米飲下。○濕痢腸風。○變通丸，治赤白下痢，日夜無度，及腸風下血，用川黃連，去毛，吳茱萸湯泡過，各二兩，同炒，香揀去各

平身方卷四
腸風下血
二百三十九

為末以粟米飯和丸梧子大各收每服三十九赤痢廿
草湯下黃蓮丸白痢姜湯下茱萸丸赤白痢各用十五
丸米湯下此乃浙西河山純老方救入甚効

陽風下重○用鱧鱧二斤治淨酒二盞煮熟入鹽醋食之
陽毒痔漏○下血不止用川黃蘗皮刮淨一斤分作四分
三分用酒醱童尿各浸七日洗晒焙一分生炒黑色為
末煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十九久服除根

酒痢腸風○黑散子治風入臟或食毒積熱大便鮮血疼
痛肛出或久患酒痢木饅頭燒存性攪欄度燒存性烏
梅去核粉草炙等分為末每服二錢水一盞煎服

腸風臟毒○下血不止旱蓮子草瓦上焙研末每服二錢
米飲下○何首烏二兩為末食前米飲服二錢○雲臺
子生用甘草炙為末每服二錢水煎服之○豬臟入黃
連末在內煮爛搗丸梧子大每米飲服三十九

臟毒下血○百草霜五錢以米湯調露一夜次早空心服
○用獨蒜煨搗和黃連末為丸日米湯飲之○新槐
花炒研酒服三錢日三服或用槐白皮煎湯服

臟毒赤白○地錦草洗暴乾為末米飲服一錢立止

下血危篤○不可救者絲瓜剖天羅一個燒存性槐花減
半為末空心米飲服二錢

大腸下血○荆芥炒為末每米飲服二錢婦人用酒下亦
可拌麩作餛飩食之○荆芥二兩槐花一兩同炒紫為
末每服三錢清茶送下○敗瓢燒存性黃連等分研末

每空心溫酒服二錢○葶藶搗汁大半鐘好酒半鐘空
心溫服三日見効○用槐花荆芥穗等分為末酒服一
錢七○不拘大人小兒腸痔風及肉痔下血日久多
食易飢先用海螵蛸炙黃去皮研末每服一錢木賊湯
下三日後服豬臟黃連

下血不止○櫻潤皮半斤括樓一個燒灰每服二錢米飲
下調下

積年下血○寒食蒸餅烏龍尾各一兩皂角七挺去皮酥
炙為末蜜丸米飲每服二十九

便前下血○令人面黃用酢石榴皮炙研末每服二錢用
茄子枝煎湯服

無破遺血○亂髮及瓜甲燒灰酒服方寸匕

糞後下血○萱草根和生薑油炒酒沖服○桑樹上白蘚

腸風下血

三百四十

花水煎服或末服亦止吐血。不拘大人小兒五倍子末艾湯服一錢。白雞冠花並子炒煎服。

結陰便血。雄黃不拘多少入棗肉線繫定煎湯用器一兩化汁傾入湯內同煮自早至晚不住添湯取出為末共棗杵和丸梧子大每服三十九丸煎黑鈔湯空心下只三服止。

男子便血。黑豆一升炒焦研末熱酒淋之去豆餼酒神。腸痔下血。多年不止用木賊根殼各二兩乾姜一兩大黃二錢半並子銚肉炒黑存性為末每粟米湯服二錢甚効。

大腸更出。不斷斷之復生行坐不得。鷓鴣末水調半兩服自愈。穀道生瘻。已決漏者牡丹末湯服方寸七日三服。久不愈用雞脆脂燒存性為末乾貼之如神。

大腸血虛。用梧根白皮一兩人參一兩為末每服三錢空心溫酒調服米飲亦可。忌油膩溼麪青菜果子甜物。雞猪魚羊蒜薤等。

下部蟲。梅葉桃葉一併煮爛蒸極熟細小器中隔布

坐蒸之更盡死也。病人齒無色舌上白晝睡憤憤不知痛痒處或下痢乃下部生虫食肛也。桃仁十五枚苦酒二升盥一合煮六合于上半月望前服之更盡死。

槐角丸。治五種腸風瀉血糞前有血名外痔糞後有血名內痔。大腸不收名脫肛。穀道四面皆治之。槐角去梗炒一兩地榆當歸酒焙防風黃芩枳殼麩炒各半兩為末酒糊丸梧子大每服五十九丸米飲下。

葛血腸紅。新得良方。歸身二錢地榆炒黑一錢日一服。忌姜椒並一切辛熱之物。

相火閉結。大黃末一兩牽牛頭末五錢每服三錢有厥冷者酒服無厥冷五心煩蜜湯服。

脫肛門

夫腸脫肛。烏龍尾。即梁上。鹿同。屨屎。燒烟子。補丙。坐上。熏之。數次。即不脫也。蛇牀子。甘草。各一兩。為末。每服。一錢。白湯下。日三服。並以蛇牀末。傅之。木賊。燒存性。為末。用羊血。蘸藥。炙熟食之。以酒送下。猪腰子。去皮。蘸炙亦可。

脫肛不收。芍根。搗爛。煎湯。薰洗之。貼水。荷葉。焙研。酒服。二錢。仍以荷葉。盛末。坐之。用五倍子。末。三錢。入白礬。一塊。赤石脂。伏龍肝。為末。傅之一。加白礬。黑色。下痢。脫肛。赤石脂。灰。芭蕉。自然。洗煮。入朴。硝。少許。洗軟。堅硬。用芭蕉。葉。托入。以枯礬。龍骨。少許。為末。搽肛頭。用真麻。油。點火。滴于上。以枯礬。龍骨。少許。為末。搽肛頭。積痢。脫肛。枳實。石上磨。平蜜。炙黃。夏。五。製之。繇。乃止。痢。疔。歷年。不入。者。生。鐵。二。斤。水。一。斗。煮。汁。五。升。洗。之。日。

再

虛冷脫肛。石灰。燒熟。故帛。裹坐。冷。即。易。之。

風熱脫肛。鐵粉。研。同。白。飯。末。傅。上。按。入。

痔漏脫肛。胡椒。子。一。升。粟。糠。一。升。乳。香。少。許。以。小。口。瓶。燒。烟。薰。之。虎。脛。骨。兩。節。以。蜜。二。兩。炙。赤。搗。密。蒸。餅。丸。梧。子。大。每。清。晨。溫。酒。下。二。十。丸。取。効。

老小脫肛。香附。子。荆。芥。穗。等。分。為。末。每。服。一。匙。水。一。大。器。煎。十。數。沸。淋。洗。

脫肛瀉血。右耳。五兩。炒。白。芷。馨。一。兩。蜜。陀。僧。半。兩。為。末。蒸。餅。丸。梧。子。大。每。米。飲。下。二。十。丸。

下血脫肛。白雞。冠。花。防。風。等。分。為。末。糊。丸。梧。子。大。空。心。朱。飲。服。七。十。丸。

肛門腫痛。馬齒。莧。葉。三。葉。酸。草。等。分。煎。湯。薰。洗。一。日。二。次。有。効。

肛門凸出。故屋。東。壁。上。土。一。升。研。末。以。長。皂。莢。搗。末。粉。之。仍。炙。皂。莢。更。互。熨。之。虎。骨。燒。末。水。服。方。寸。匕。日。三。次。

腸頭挺出。秋。冬。鳩。胡。荽。子。醋。煮。熨。之。甚。効。

肛門生瘡。肛門。主。肺。肺。熱。即。肛。塞。腫。縮。生。瘡。白。蜜。一。斤。三。百。四。十。二。

猪胆汁一枚和微火煎令可九九三寸長作挺塗油

蝨蝨下門見五臟則死以猪脂和馬蹄灰綿裹套入下

蝨蝨日數度痔腫痒杏仁膏頻頻傅之

蝨蝨赤痛○兔絲子熬黃黑為末雞子白和塗之

蝨蝨下○木饅頭連皮子切炒灰荅荅荅等分為末每

服二錢米飲下亦治夢遺名鑿陽丹

下痛肛痛○不可忍者熬鹽包坐熨之

脫肛氣熱○臘月陰乾猪胆五分孩兒茶二分片腦一分

老幼脫肛○萬年清連根煎湯薰洗○又方五倍子炙研

未敷之

內痔腫痛○孩兒茶麝香為末煙津調傅之○朝陽黃土

黃連末炭硝各一兩用猪胆汁同研如泥每日旋丸棗

丸藥○不可忍者胡黃連末鷺胆汁調塗之○不可忍

痔漏門

酒下敷○煎湯熏洗○冬瓜煎湯洗之○桃根木煎汁浸洗之當

効用○紫荊皮五錢新汲水煎服○用熱童尿入罈

有重出○紫荊皮五錢新汲水煎服○用熱童尿入罈

痔重作痒○古石灰川烏頭炮等分為末燒飯丸梧子太

雞冠痔疾○黃連末傅之加赤小豆末九良

五痔肛腫○先以柳柳湯洗過以荻灸上七壯取効

沸湯一盞煎湯頻洗○用木籠仁三枚仍塗少許

痔瘡乳核○芫根一握洗淨入木臼搗爛入少水絞汁于

不器中慢火煎成膏將絲線于膏內度過以線繫痔當

微痛候痔乾落以紙燃蘸膏納竅因去根當永除根也

痔如虫咳○芫絲子熬黃黑為末離子白和塗之

內痔不出○草烏為末津調點肛門內痔即反出乃用枯

痔藥點之○馬齒莧不拘鮮乾者熟急食之以湯熏洗一

痔瘡初起○其孔閉即愈矣○痔痛毡襪烘熱熨之冷又易

吐血痔血○向東囊荷根一把搗汁三升服之

痔瘡出血○槐樹上木耳為末飲服方寸匕日三服○椽

子粉糯米粉各一升炒黃滾水調作果子飯上蒸熟食

之不過四五次効○桃葉一斛杵納小口器中坐蒸之

有虫自出○木瓜為末以鯉魚身上涎調貼之以紙護住

翻花痔瘡○作痛胡麻子煎湯洗之即消○發歇不定者

痔瘡風腫○阿洗對炒黃為末烏梅肉和丸梧桐子

是也白僵蚕二兩洗對炒黃為末烏梅肉和丸梧桐子

大每姜蜜湯空心下五九妙○許仁則方用槐

內外痔瘡○片腦一二分葱汁化搽之○許仁則方用槐

角子一斗搗汁晒稠取地胆為末同煎九梧子大每飲

服十丸兼作挺子納下部或以苦參末代地胆亦可

外痔長寸○用槐花煎湯頻洗并服之數日自縮

諸痔發痒○用全蠶不拘多少燒烟熏之即効秘法也

大腸氣痔○作痛下血百藥煎末每服三錢稀粥調服日

下部痔露○掘地作小坑燒赤以酒沃之納吳茱萸在內

生之不過三度良○用此寬腸黃連椒殼等分為末糊丸梧子大

痔病秘結○蜘蛛絲纏之即落○腫痛用穿山甲尾尖處

肛門鼠痔○蜘蛛絲纏之即落○腫痛用穿山甲尾尖處

一兩炙存性釐甲酥炙一兩麝香半錢為末每服一錢

真茶湯服取効○熊胆塗之神効一切方不及也

十年痔瘡○稻葉燒灰淋汁熱洗三五度瘥

下血成痔○益母草葉搗汁飲之○五月五日采蒼耳莖

腸痔下血○益母草葉搗汁飲之○五月五日采蒼耳莖

葉為末水服方寸匕其効○葱白三升煮湯熏洗立効

痔瘡

酒盡乃止為

末酒服一錢日三服○熱多者尤佳
錢梅花炒研末一錢米飲調服未止再服

肛門酒痔○經瓜燒存性研末酒服二錢
酒痔下血○黃連酒浸煮熱為末酒糊丸梧子大每服三

四十九白湯下○青蒿用葉不用莖用莖不用葉為末
糞前冷水糞後水酒調服

痔瘡如瓜○腫痛如火柳枝煎濃湯洗之艾炙三五壯
虫痔裏急○板榔為末每日空心以白湯調服二錢

痔瘡有虫○不止者用瓦月砂即瓦糞也慢火炒黃為末
每服二錢入乳香五分空心溫酒下日三服○作痒或

下膿血○取槐白皮濃煎汁先熏後洗良久欲大便當
有虫出不過三度即愈仍以皮為末綿裹納下部中

痔漏腫痛○荆芥煮湯日日洗之○諸腫七個綿脂十
個洗水和勻搽七次即愈○旱蓮草一把連根鬚洗淨

用石臼搗如泥以極熱酒一盞衝入取汁飲之浮傳患
處重者不過三服即安○慈涎白蜜和塗之先以木髓

子煎湯熏洗其冷如水即効一人苦此早用午安也
腸風痔瘻○銅青蜜陀僧各一錢麝香少許為末津和塗

之○槐葉一斤蒸熟晒乾研末煎飲代茶久服明目
五痔諸瘻○忍冬圓治消渴愈後防發癰疽先服此用恐

冬草根莖○花葉皆可不拘多少入瓶內以無灰好酒浸
以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許碾為細末以浸

藥酒打麪○糊丸梧子大每服五十丸至百丸湯酒任下
此藥不特治癰疽大能止渴○芥子末以水蜜和傅乾

即易之○香白芷為末每服二錢米飲下并煎湯熏洗
痔漏出血○

久近痔漏○三十年者三服除根用蓮花蓋黑牽牛頭末
各一兩半當歸五錢為末每空心酒服二錢忌熱物五

日見効○黑白牽牛各一兩炒為末以猪肉四兩切碎
痔漏有虫○食盡以白米飯三匙壓之取下白虫為効

痔漏脫肛○胡荽子一升粟糠一升乳香少許以小口瓶
燒烟熏之○絲瓜燒灰多年石灰雄黃各五錢為末以

臟毒痔漏○清及香油和調貼之收上乃止
下血不止川黃柏皮削淨一斤分作四分三

三百四十五

分用酒醋童尿各浸七日洗晒焙一分生炒黑為末蜜

諸瘡痔漏○久不結痂用生薑連皮切大片塗白礬末炙

上下諸瘡○或在頂或在下部用苦參五升苦酒一斗漬

下部漏瘡○苦參煎湯日日洗之

一切漏瘡○故布裹燒赤為末每服一錢○土瓜根搗

傅之燥則易○用槐樹北陰白皮三十斤剉以水一石

煮一斗去滓煎如飴又取通都廁上羅鼠屎雌鼠屎各

十四枚燒汁盡研和之蠟蠟酒一升和勻瘦人食五合

當有虫出也童尿製爐甘石牡蠣粉外塞之內服滋補藥

漏瘡不合○乃腎虛也牽牛末二錢半○切開猪腎中竹

葉包定煨熟空心食湯酒送下借腎入腎一絛一橫而

得其便惡水既泄不復淋瀝粉一錢為末雪糕丸麻子

漏瘡膿血○白乳香二錢牡蠣粉一錢為末雪糕丸麻子

大每姜湯服三十九

九瘻有孔○苦瓠四枚大如蓋者各穿一孔如指大湯煮

十數沸取一竹筒長一尺一頭插瓠孔中一頭注瘻孔

上冷則易之○大腹皮煎湯洗之

九漏有虫○治九漏燭燻同陰乾馬齒苋等分為末以泔

水洗淨和臘猪脂傅之日三上○乾人屎乾牛屎隔綿

一貼之重聞其氣即出若痒則易之重煮乃止

一切冷漏○人吐蚘虫燒灰先以甘草湯洗淨塗之無不

瘻者慎口味蒟根燒灰千年石灰等分為末油調傅之○

螻蛄漏瘡○性研以米泔別浸柳葉取汁洗瘻後乃納灰

少許于瘻中錢鯉甲二七枚燒灰諸脂調傅

蠟漏不愈○相通者半夏末水調塗之日二

槐湯炙痔○以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾炙其上七壯

槐角丸○治五種腸風瀉血等症悉前腸風下血門

不禁門

小便不禁。治心腎俱虛，神志不守，小便便淋瀝，不禁用白茯苓、赤茯苓、芩、等分，為末，以新汲水，按法洗去筋，焙乾，以酒煮地黃汁，搗膏，搜和丸，彈子大，每嚼一丸，空心，鹽湯下。○雄雞翎，燒研，酒服，方寸匕。○上熱下寒者，鹿角霜為末，酒糊丸。梧桐子大，每服三四丸，空心，溫酒下。○小便卒數。○非淋，令人瘦，石膏，半斤，搗碎，水一斗，煮五升，每服五合。

小便頻數。○金剛骨，為末，每服三錢，睡時，溫酒下。○小便頻數。○益智子，鹽炒，去鹽，烏藥等分，為末，酒煮山藥粉，為糊丸。○如梧子大，每服七十九丸，空心，鹽湯下。○凡人小便頻數，不計度數，便時，莖內痛，不可忍者，此疾必先大腑秘熱，不通，水液，只就小腸，大腑愈，加乾，渴甚，則渾身熱，心躁，思涼，水如此，即重証也。此疾，本因貪酒，色積有餘，毒腐，物瘀，血之類，隨虛，水入于小腸，故便時，作痛也。不飲酒者，必平生過食，辛熱，葷膩之物，又因色傷，而然。此乃小便頻數，而痛，與淋症，澀而痛者，不同也。宜用。

葶藶一兩，水浸少時，以鹽半兩，同炒，去鹽，為末，每服二錢，水一盞，煎入分，和滓服之，使水道轉入大腸，仍以葱湯，頻洗，穀道，令氣得通，則小便數，及痛自減也。○山藥，以礬水者，過白茯苓等分，為末，每水飲服二錢。○白果，十四枚，七生，七煨，食之，取効止。○下焦虛冷也。羊肺一具，切作羹，入少羊肉，和鹽，破食，不過三具。○鹿角霜，白茯苓等分，為末，酒糊丸，梧子大，每服三十丸，鹽湯下。○心虛尿滑。○及赤白二濁。○益智子，仁，白茯苓，白朮等分，為末，每服三錢，白湯調下。

腎消尿數。○乾姜，半兩，以鹽四錢，炒，黃成，顆，雖黃一兩，半為末，蒸餅和丸，菜豆大，每服十丸，至三十丸，空心，鹽湯下。○鹿角一具，炙，搗，篩，溫酒，每服方寸匕。○日二膏，瘕，尿多。○其人，飲少，用秦，微二分，出汗，瓜蒂二分，為末，水服，方寸匕，日三服。

小便過多。○象牙，燒灰，飲服之。

小便無度。○破故紙，十兩，酒煮，茴香，十兩，鹽炒，為末，酒糊丸，梧子大，每服百丸，鹽酒下，或以米，搽，豬腎，煨食之。

消中尿多。○日夜尿七八升，冬葵根，五斤，水五百四十七。

不禁

每月平日服二升

老人遺尿○不知出者草烏頭一兩童便浸七日去皮同

男婦遺尿○枯白礬牡蠣粉等分爲末每服方寸匕温酒

下虛尿床○羊肚盛水者熟空腹食四五頓瘥

遺尿且澀○桑耳爲末每酒下方寸匕日三服

遺尿淋瀝○痛不可忍雞肫肉黃皮五錢陰乾燒存性作

一服白湯下立愈○用雞臙脰一具并腸燒存性酒服

夜用雌女用雄

婦人遺尿○本人草薦燒灰水服立瘥

屢中尿床○用燕蓍草卽燕窠中草也無毒主眼中遺尿

燒黑研末水進方寸匕○麻鞋綱帶及鼻根惟不用底

七量以水七升煮二升分再服○用猪脰洗炙食之

老少尿床○白紙一張鋪席下待遺于上取紙晒燒酒服

止小便利○雞腸草一斤豆豉汁和米作羹吸粥頻食之

少小便床○雞腸根五錢煎酒夜飲

小閉門

小便不通○蚯蚓糞朴硝等分水一升以車前

塵三指撮水服之○滑石末一升以車前

四畔方四寸乾卽易之○冬月水和○戎塩湯用戎塩彈

丸大一枚茯苓半斤白木二兩水煎服之○時珍曰按聖惠

研攤絹上貼少腹連陰際須臾卽通○時珍曰按聖惠

方治小便不通用地參草一把水煎服之○亦東垣治小

此物能益陰氣通小腸無陰則陽無以化○瓜蒌焙研每

便不通用黃蘗知母滋腎之意○臍腹用化○瓜蒌焙研每

服二錢熱酒下頻服以通爲度○臍腹用化○瓜蒌焙研每

瀉爲佐凡小便不通而口渴者邪熱在氣分肺中伏熱

不能生小是絕小便之源也法當用氣味俱厚陰

藥猪苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之化源若邪

熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素問所謂無陰

則陽無以生無陽則陰無以化膀胱者州都之宮津液

之黃藥知母是也

小便不利。膀胱熱閉。小便不快。井泉石海金沙車前子

滑石各一兩。為末。每服二錢。蜜湯下。有水氣。枯蓼瞿

麥丸。主之。瞿麥二錢。半括。蓼根二兩。大雞子一個。茯苓

山芋各三兩。為末。蜜和。丸。梧子大一服。三九日。三素知

益至。七八丸。以小便利。腹中溫為知也。膀胱水氣流

滯。浮萍日乾。為末。飲服。方寸匕。日二服。蒲席灰七分

滑石二分。為散。飲服。方寸匕。日三

小便艱難。或轉胞。腹滿悶。不急療。殺人。用秦芫一兩。水

一盞。煎六分。分作二服。又方。加冬葵子等分。為末。酒

服一匕。不通。乾。著。藥。兩。燒。灰。滑石半兩。為末。每米

飲服三錢。樺皮濃煎汁。飲之。

小便熱短。蠶蛻紙燒存性。入麝香少許。米飲。每服二錢

小便瀰痛。杏仁二七枚。去皮尖炒黃。研末。米飲服之。

卒小便閉。脹。不洽。殺人。葱白三斤。剉炒。帕盛。二個。更互熨

小便閉。氣透。即通也。諸藥不効者。以真麝香少許。和患

者。頭頂心泥。作膠。入尿。莖中。紙封。孔口。使氣透入。尿莖

內。不須過一二時。辰則小便。可以通暢矣。

小便虛閉。兩尺脈沉微。用利小水藥。不効者。乃虛寒也。

附子一個。炮去皮。臍。鹽水浸。良久。澤瀉一兩。每服四錢

水一盞。半燈心七莖。煎。服。即愈。因腫毒未潰。小便不

通。用葱切。入麻油。煎。至黑色。去葱。取油。時塗。腫處。即通

汗多。便閉。老人。虛人。皆可。用。肉蓯蓉。酒。浸。焙。二兩。沉香

相火。秘結。末。麻仁。汗。打。糊。丸。梧子。大。每。服。七。丸。白。湯。下

冷者。酒。服。無。妨。治。五。心。煩。囊。湯。下。

通利小便。龍葵根。與木通。胡荽。煎湯。服。通利小便。

小腸結澀。時珍曰。聖惠治小腸結澀。不通。心煩。悶亂。用

栗奴苦竹。鬚。小豆。葉。炙。甘。州。各。一。兩。灯。心。汁。葱。白。五

寸。銅。錢。七。文。水。煎。分。服。取。効。乃。止。

立不得洩。病不得洩。則微通。立則不得。涓滴。通用。通

利藥不効。唐問其平日。自製黑錫丹。常服。因。悟。曰。此。必

結砂。硫。飛。去。鉛。不。死。鉛。砂。入。膀胱。則。偏。重。猶。可。洩。立

諸淋門

小便淋痛。○葵花根洗對水煎五七沸服之如神。○石葺滑石等分爲末每飲服刀圭最妙。○諸淋赤痛三葉酸漿草洗并取自然汁一合酒一合和勻空心溫服之通利小便專除痰粟米粥絕去他味旬餘或月餘痊此五穀治病之理也。

李淋不通。○好墨煨一兩爲末每服一字溫水服之。○菱粉一兩芭蕉根四兩水二大盃煎一盃半入滑石二錢分三服。○取地膚草蒿自然汁服之遂通至賤之物有回生之功如此。

小便淋瀝。○防已防風葵子各二兩或咀水五升煮三升牛分三服。○或有白者以赤根棧葱近根截一寸許安臍中以艾炙七壯。○服血藥不効者用牡蠣粉黃蘗炒等分爲末每服一錢小茴香湯下取効。

五種淋症。○勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至甚者透榕散用消石一兩不夾泥土雪白者生研爲末每

服二錢各依湯使勞淋勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便須服補氣丸散小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便後赤色臍下急痛並用冷水調下氣淋小便滿急尿後常餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末先入銚內隔紙炒至紙焦爲度再研用溫水調下小便不通小麥湯下率患諸淋只以冷水下並空

心調藥。○使消如水乃服之。○苧麻根兩莖打碎以水一盃半煎半盃頓服即通大妙。○赤藤根即做草鞋者白茯苓苧麻根等分爲末百沸湯下每服一錢如神。○石首魚頭石十四個當歸等分爲末水二升煮一升頓服愈砂石淋痛。○小便瀉痛用黃爛浮石爲末每服二錢生甘草煎湯調服。○馬蘭花七枚燒故筆頭二七枚燒粟米一合炒爲末每服二錢酒下日二服名退神散。○小便淋痛或尿血或砂石脹痛用川牛膝一兩水二盃煎一盞溫服一婦患此十年服之得効。○牛膝亦可或人麝香乳香尤良。○小便淋瀝沙石痛不可忍用玉蜀黍根葉煎湯頻飲。○痛不可忍用薏苡仁子葉根皆可用水

諸淋

煎熱飲夏月冷飲以通為度○疼不可忍用蘿蔔切片
 蜜浸少時炙乾數次不可過焦細嚼鹽湯下日三服
 石淋破血○浮石瀉○一手為末以水三升醇一升和煮二
 升澄清每服一升○牛角燒灰酒服方寸匕日五服
 小便石淋○石淋取細白河沙三升炒熱以酒三升淋汁
 服一合日再服○宜破血羅麥子搗為末酒服方寸匕
 日三服三日當下石○車前子二升以絹袋盛水入升
 煮取三升服之須臾石下○桃木膠如棗大裏以冷水
 二合冬以湯三合和服日三服當下石○石盡即止○便
 中有石子者胡桃肉一升細米煮漿粥一升相和頓服
 卽瘥○雞矢白日中半乾炒香為末以酸漿飲服方寸
 匕日二當下石出
 小便氣淋○臍痛益和醋服之○結澀不通白芷醋浸焙
 乾二兩為末煎木通甘草酒調下一錢連進二服○雞
 陽草三兩石韋去毛一兩每用三錢水一盞煎服
 血淋尿血○苦蕒菜一把酒水各半煎服
 血淋熱痛○黃芩一兩水煎熱服○白薇芍藥各一兩為
 末酒服方寸匕日三服○蓮房燒存性為末入麝香少

許每服二錢半飲調下日二○痛不可忍香附子陳
 皮赤苓等分水煎服○葶根煎湯頻服大妙亦治諸淋
 ○芭蕉根旱蓮艸各等分水煎服日二○生地黃汁車
 前葉汁各三合和煎服○時珍曰一男子血淋痛脹祈
 死以藕汁調髮灰每服二錢服三日而血止痛除
 血淋心煩○石燕子商陸赤小豆紅花等分為末每服
 錢葱白湯調下
 男婦淋血○亦治五淋多年煮酒瓶頭箬葉三五年至十
 年者尤佳每用七個燒存性入麝香少許陳米飲下日
 三服有人患此二服愈○用真百藥煎車前子炒黃連
 各三錢半木香二錢滑石一錢為末空心燈草湯服二
 錢日二服
 老人血淋○車前五合綿裹煮汁入青梁米四合煮粥飲
 汁亦能明目引熱下行
 熱淋血淋○不拘男女用赤小豆三合慢炒為末煨葱一
 葶搗酒熱調三錢服
 小便熱淋○白茅根四升水一斗五升煮取五升適冷暖
 飲之日三服○海金沙草陰乾為末煎生甘草湯調服
 諸淋

二錢一加滑石○馬齒莧汁服之○生藕汁生地黃汁

男女淋疾○自取瓜甲燒灰水服○野葡萄根七錢葛根

熱淋如血○蠶種燒灰入麝香少許水服二錢極効方也

小便淋瀝○生續斷搗絞汁服即馬薊根也○兔絲子煮

汁飲○或有或無用大蒜一個紙包煨熱露一夜空心

新水近小○琥珀為末二錢麝香少許白湯服之或萱

草煎湯服老人虛人以人參湯下亦可蜜丸以赤茯苓

湯下○小便渾濁○如精狀木香沒藥當歸等分為末以刺棘心

急淋陰腫○泥葱半斤煨熟杵爛貼臍上

冷淋蒸痛○翻葉研末每服三錢水一盞葱白七寸煎六

分去滓食前溫服日二○婦人患淋○久諸藥不効以王不留行十

餘葉煎湯服次日病減入分再服而愈

熱淋莖痛○麻皮一兩炙甘草三分水二盞煎一盞服日

二取効○葡萄搗取自然汁生藕搗取自然汁生地黃

搗取自然汁白蜜各五合每服一盞石器溫服

老人病淋○身體熱甚車前子五合綿裹煮汁入青梁米

四合煮粥食常服明目○身熱腹滿小麥一升通草二

兩水三升煮一升飲之即愈○青豆二升橘皮二兩煮

豆粥下麻子汁一升空心漸食之併飲其汁甚驗

妊娠患淋○冬葵子一升水三升煮二升分服○車前子

五兩葵根切一升以水五升煎取一升半分三服以利

為度○膏淋如油○海金沙滑石各一兩甘艸稍二錢半為末每

服二錢合和頓服當尿下白汁○葶草搗生汁三升酢

諸淋

三百五十二

兩為末。即時人參湯調下。二錢。如無桑上者。即用他樹者。以炙桑白皮佐之。桑白皮行水。以接標。蟄就腎經也。

○羊骨燒研。榆白皮煎湯服。二錢。○淋癰溺血。○取乳香中夾舌者。研細米飲服。一錢。

胞轉淋閉。○阿膠三兩。水二升。煮七合。溫服。○尿血不定。○鬱金末一兩。葱白一握。水一盞。煎至三合。溫服。日三服。

小便尿血。○茅根煎湯。頻飲為佳。○香附子新地榆等分。各煎湯。先服香附子湯。三五呷。後服地榆湯。至盡。未効。

再服。○益母草汁。一升。少瘥。○吐血及耳鼻出血。○生地黄汁。半升。生姜汁。半合。蜜一合。和服。○高莖菜搗。

傳臍上其効。○柏葉黃連焙研。酒服。三錢。○下焦結熱。○小便淋瀝。或有血出。或大小便出血。瞿麥。七。

二兩。甘草炙。七錢。五分。山梔子仁炒。半兩。為末。每服。七。

錢。連鬚。葱頭。七個。燈心。五十莖。生姜。五片。水二盞。煎至。

七分。時時溫服。○小便血條。○淡豆豉一撮。煎湯。空腹服。或入酒服。○勞傷。

弱血。茅根。薤白。等分。入蜜一匙。水二鐘。煎一鐘。日一服。

男婦溺血。○治丈夫婦人無故尿血。用胡燕窠中草。燒末。

酒服。半錢。匕。龍骨末。水服。方寸匕。日三。

尿後鮮血。○以鏡面草。搗汁。入少蜜。水進。兩服。即愈。

心熱尿赤。○面赤唇乾。咬牙。口渴。導赤散。用木通。生地黃。

炙甘草等分。入水。竹葉。七片。水煎服。○腎消飲水。○小便如膏。油用。葱香炒。苦楝子炒。等分為末。

每食前酒服。二錢。○直指秋石丸。○治濁氣于清。精散而成膏。淋黃白赤。黯如。

肥膏。蜜油之狀。用秋石。鹿角膠。炒。桑螵蛸。炙。各半兩。白。

茯苓。一兩。為末。糕糊丸。梧子。大。每服。五十丸。人參湯下。

淫熱白濁。○少年思慾不遂。相火鬱結。兼受溼熱。致有此。

症。以大黃三錢。裹入無節。饅頭。內蒸熟。晾燥。炒研細末。

以生白酒調服。即瘥。○又方。以六一散。熟水調服。三錢。

亦愈。○小兒尿如米泔者。減半服之。亦愈。○疹後白濁。○病發疹時。觸受穢氣。病愈之後。遂變遺濁。不。

分晝夜。葛粉。一兩。蛇退。一寸。半焙燥。朱。賊。川。芎。米。炒。掛。

塵。各五錢。共研末。好酒。法。丸。每服。三錢。開水。送下。一。

料。愈。蓋。觸。穢。毒。過。不。透。今。仍。用。透。解。之。法。故。効。耳。

平易方卷四 赤白濁 二百五十三

赤白濁門

小便赤濁。○心腎不足精少血燥口乾煩熱頭暈怔忡鬼
 絲子麥門冬等分為末蜜丸梧子大壹湯每下七十九
 ○心虛者蓮子六一湯用石蓮肉六兩炙甘草一兩為
 末每服一錢燈心湯下。○火鬱溼熱六一散調服三錢
 小便白濁。○用葦麥炒焦為末雞子白和丸梧子大每服
 五十九丸。○用葦麥炒焦為末雞子白和丸梧子大每服
 ○生蘿藦剉空甕蓋入吳茱萸黃蘗滿蓋定簾住糯米飯
 蒸熟取去茱萸以蘿藦焙研末糊丸梧子大每服五十
 丸。○鹽湯下。○生白果仁一十枚搗水飲日一服取効止。○清
 五錢。○生白果仁一十枚搗水飲日一服取効止。○清
 明柳葉煎湯代茶以愈為度。○構葉為末蒸餅丸梧子
 大每服三十丸。○肉蓯蓉鹿茸山藥白茯苓等分為末米糊丸
 腎虛白濁。○內蓯蓉鹿茸山藥白茯苓等分為末米糊丸
 梧子大每服三十丸。○黃芪鹽炒半兩茯苓一兩為末每服一錢白
 氣虛白濁。○黃芪鹽炒半兩茯苓一兩為末每服一錢白
 湯下。

虛勞白濁。○榆白皮二升水二斗煮取五升分五服。○羊
 骨為末酒服方寸匕。○日三
 溼痰白濁。○牡荊子炒為末每酒服三錢。○
 尿渾白濁。○心脾不調腎氣渾濁用厚朴姜汁炙一兩白
 茯苓一錢水酒各一碗煎。○碗溫服
 脾虛白濁。○過慮傷脾不能攝精遂成此疾以羊脰骨
 灰一兩姜製厚朴末二兩麩糊丸梧子大未飲下百丸
 日二服。○加茯苓一兩半
 白濁滿腹。○不拘男婦用益智仁鹽水浸炒厚朴姜汁炒
 等分姜三片棗一枚水煎服
 小便如泔。○乃腎虛也。○用王瓜根一兩白石脂二兩兔絲
 子酒浸二兩桂心一兩牡蠣粉一兩為末每服二錢大
 麥粥飲下。○小兒尿如米泔者以六一散一錢溫水服
 尿白如注。○小腹氣痛茶籠內荳葉燒存性入麝少許米
 飲下
 濁遺帶下。○治丈夫元陽虛僂滿氣不固小便下濁餘瀝
 常流夢寐多驚頻遺洩婦人白淫白帶並治之。○白茯苓
 苓去皮四兩作置以猪苓四錢半入內煮二十餘沸取
 赤白濁

出日乾擇去猪苓為末化黃蠟搜和丸彈子大每嚼一

白濁頻數○滋而如油澄下如膏乃真元不足下焦虛寒

錢水一盞入鹽一捻煎七分食煎溫服日一服効乃止

赤白濁淋○好大黃為末每服六分以雞子一服破頂入

藥攪勻蒸熟空心食之不過三服愈○及夢洩精滑真

珠粉丸黃蘗炒真蛤粉各一斤為末每服一百丸空心

温酒下黃蘗苦而降火蛤粉等分為末糊丸梧子大每服八

母炒牡蠣粉煨山藥炒等分為末糊丸梧子大每服八

分清丸○治濁病用芡實粉白茯苓粉黃蠟化蜜和丸梧

子大每服百丸鹽湯下

白濁夢遺○半夏一兩木猪苓二兩同炒黃去苓入濕壯

蠟一兩山藥糊丸梧子大每服三兩伏苓湯下腎氣

閉精氣妄行者宜用與下元虛憊者不同○心腎虛損

真陽不固兔絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩酒糊

丸梧子大每服三五丸空心鹽湯下

遺精門

內熱遺精○鐵鑊末冷水服一錢三服止

心虛遺精○猪心一個批片相連以飛過硃砂末摻入線

驚悸遺精○木饅頭炒白牽牛等分為末每服二錢用米

飲調下

腎虛遺精○北五味子一斤洗淨水浸按去核每以水洗

核取盡餘味通置砂鍋中布濾過入好冬蜜二斤炭火

慢熬成膏瓶收五日取出火性每空心服一二茶匙百滾

湯下○多汗夜夢鬼交用猪腎一枚切開去膜入附子

末一錢溼紙裹煨熟空心食之飲酒一盃不過五服効

腎虛失精○水膠三兩研末以酒二盃化服日三服

虛滑遺精○白茯苓二兩縮砂仁一兩為末入鹽二錢精

羊肉批片參藥炙食以酒送下

益汗遺精○鹿角霜二兩生龍骨炒牡蠣煨各一兩為末

小便遺精○蓮子心一撮為末入辰砂一分每服一錢白

遺精

二百五十五

湯下日二

精滑不禁○元氣虛寒大腑滯泄手足厥冷陽起石煨研

鍾乳粉各等分酒煮附子末用麩糊丸梧子大每空心

米飲服五十九丸以愈為度

麥遺白濁○用韭子每日空心生吞二十粒塩湯下

白濁遺精○石蓮肉龍骨益智仁等分為末每服二錢空

心米飲下○盜汗虛勞桑螵蛸炙白龍骨等分為細末

每服二錢空心用塩湯送下○陽盛陰虛故精泄也真

珠粉丸主之用蛤粉煨一斤黃柏新瓦炒過一斤為細

末白水丸如梧子大每服一百丸空心用温酒下日二

次蛤粉煨而且能補腎陰黃柏苦而降心火也

漏精白濁○雪白塩一兩并築緊固濟煨一日出火毒白

茯苓山藥各一兩為末棗肉和蜜丸梧子大每棗湯下

三十九丸蓋皆以濟鹹脚腎兩得也○治夢遺小便數用

韭子二兩桑螵蛸一兩微炒研末每旦酒服二錢○蓋

韭乃肝之菜入足厥陰經腎主閉藏肝主疎洩素問曰

足厥陰病則遺尿思想無窮入房太甚發為筋痿及為

白淫男隨洩而下女子綿綿而下韭子之治遺精漏泄

小便頻數女人帶下能入厥陰補下焦肝及命門之不

足命門者藏精之府故同治云

夢遺失精○蘇子一升熬碎研末酒服方寸匕日再服○

乳香一塊捱指大跗時細嚼含至三更嚥下三五服即

虛勞弱精○用新韭子二升十月霜後采之好酒入合漬

一宿以清明日童子向南搗一萬杵平旦温酒服方寸

匕日再服之○玉鎖丹治腎經虛損心氣不足思慮太

過真陽不固凝有餘瀝小便白濁如膏夢中頻遺骨節

拘痛面鰲肌瘦盜汗虛煩食減乏力此方性温不熱極

有神効用五倍子一斤白茯苓四兩龍骨二兩為末水

糊丸梧子大每服七十九丸食前用塩湯送下日三服

積熱夢遺○心忪恍惚臨中有熱宜清心丸主之黃蘗末

一兩片腦一錢煉蜜丸梧子大每服十五丸麥門冬湯

下

心虛夢洩○或白濁白茯苓末二錢米湯調下日二服

勞心夢泄○龍骨遠智等分為末煉蜜丸如梧子大殊砂

為衣每服三十九蓮子湯下

遺精

二百五十六

睡即洩精○白龍骨四分 芫子五合為散空心酒服方寸

夢遺遺尿○芫子一升 稻米二斗水一斗七升煮粥取汁

六升分三服 夢遺便澹○牡蠣粉醋糊丸 梧子大每服三十九米飲下

日一服 夢遺食減○白色苦參三兩白朮五兩牡蠣粉四兩為末

用雄猪肚一具洗淨砂罐煮爛石白鳩和藥乾則入汁

丸小豆大每服四十丸米湯下日三服久服息肥食進

而夢遺立止 小便白淫○因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓

等分為末酒糊丸梧子大每服三十九丸煎補骨脂湯下

日三服 精氣不固○破故紙青蘘等分同炒為末每服二錢米飲

下 益精固精○補血黑髮益壽有奇功還筒子半兩笑實半

兩金銀花二兩破故紙酒浸春三夏一秋二冬五日焙

研末二兩各研末蜜糊丸梧子大每服五十九空心搥

滋陰養血○溫補下元三才丸用天門冬去心生地黃二

兩二味用柳葉以酒酒之九蒸九晒待乾秤之入參

酒下日三服 固精強骨○金毛狗脊遠智肉白茯苓當歸身等

煉蜜丸梧子大每酒服五十九 固元丹○治元陽久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱疝氣

婦人赤白帶下血崩便血等疾悉煉服門 四精丸○治思慮色慾過度損傷心氣小便頻數遺精用

秋石白茯苓實蓮肉各二兩為末蒸棗和丸梧子大 每服三十九空心搥湯送下

秋石交感丹○治白濁遺精秋石一兩白茯苓五錢兎絲

子炒五錢為末用百沸湯一盞并華水一盞煮糊丸梧

子大每服一百丸搥湯下 腎消溢精○房慾無節及服丹石遂致水弱火強口舌乾

精自溢出胡桃肉白茯苓各四兩附子一枚去皮切片

姜汁蛤粉同焙為末蜜丸梧子大每服三十九米飲下

平易方卷四 遺精 癩疝 三百五十七

癩痢門

小腸疝氣○危急者元胡索鹽炒全蠍去毒生用等分爲末每服半錢空心鹽湯下○用川烏頭山巵子各一錢爲末順流水入姜汁一匙調下○達臍衝心連蒂老絲瓜燒存性研末每服三錢熱酒調下甚者不過二三服卽消○奪命丹治遠年近日小腸疝氣偏墜擊癩臍下撮痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長及陰間溼痒成瘡用吳茱萸去硬一斤分作四分四兩酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童便浸一斤分作四分四兩酒浸二兩爲末酒糊丸梧子大每服五十九粒空心鹽湯或酒吞下○用猪脬一枚洗入小箇香大箇香破故紙川練子等分填滿入青鹽一塊縛定酒煮熟食之酒下其藥焙搗爲丸服參得疝氣○小腹及陰中相引痛如絞白汗出欲死者沙疝氣危急○地膚子卽落蒂子炒香研末每服一錢酒下○天仙藤一兩好酒一盃煮至半盃服之神効疝氣入腎○茴香炒作二包更換熨之

木腎疝氣○楮葉雄黃等分爲末酒糊丸梧子大每鹽酒下五十丸

疝氣偏腫○甘遂茴香等分爲末酒服二錢○刮之立住用綿袋包陰囊取天花粉五錢以醇酒一盃浸自卯至午繼煎滾露一夜次早低院坐定兩手按膝飲下卽愈未下再一服○山棠棣肉茴香炒各一兩爲末糊丸梧子大每服一百丸空心白湯下

勝膀胱氣○勝膀胱氣用葫蘆巴合桃仁麩炒等分爲末爲散半以酒糊和丸梧子大每服五七十九粒空心鹽酒下其散以熱米飲下與丸子相間空心服日各一二服○集要治疝氣勝膀胱小腸痛用茴香鹽炒晚蚕沙鹽炒等分爲末煉蜜丸彈子大每服一丸溫酒嚼下○勝膀胱氣痛腎冷橘核炒研每溫酒服一錢或酒煎飲之陰癩偏腫○氣脹不能動者杜丹皮防風等分爲末酒服二錢其効○偏墜或小腸疝氣下元虛冷久不愈者沉香木香各半兩胡蘆巴酒浸炒小箇香炒各二兩爲末酒糊丸梧子大每服五七十九粒陳皮連白九錢硫黃四錢爲末笑丹用荔枝核四十九個

癩痢

末盪水打麩糊丸菜豆大遇痛時空心酒服九丸良久

再服不過三服其效如神亦治諸氣痛

狐疝陰癩○超越舉重卒得陰癩及小兒狐疝傷損生癩

並用地膚子五錢白朮二錢半挂心五分為末飲或酒

服三錢忌生葱桃李

癩疝脹痛○及小腸氣痛香附末二錢以海藻一錢煎酒

空調下并食海藻

卵腫偏墜○用雙蒂茄子懸于房門上出入附眼視之茄

薦所患亦薦茄乾亦乾矣○絲瓜架上初結者雷下待

瓜結盡葉落取下燒存性為末煉蜜調成膏每晚好酒

服一匙如在左左睡在右右睡

陰疝欲死○凡縮入腹急痛欲死狼毒四兩防風二兩附

子三兩燒以蜜丸梧子大每服三九日夜三度白湯下

○發時腫痛如刺用生射干搗汁與服取利亦可丸服

偏墜腫痛○陳石灰炒五倍子山梔子等分為末炒和醋

調敷之一夜即消○蘇方木二兩好酒一壺煮熟頻飲

立好○芙蓉葉黃蘗各三錢為末以木龍子仁一個磨

醋調塗陰囊其病自止○木蓮藤煎湯煎下漸收

寒疝腹痛○小便陰中相引痛自汗出欲死以丹參一兩

為末每服二錢熱酒調下○透臍手足厥冷自汗出脈

弦而緊用大烏頭煎主之○大烏頭五枚去臍水三升煮

取一升去滓納蜜二升煎令氣盡強入服七合弱人

服五合不瘥明日再服

寒疝引脇○肋心腹皆痛諸藥不効者大烏頭五枚去角

四破以白蜜一斤煎令透取焙為末別以熟蜜和丸梧

子大每服二十九冷鹽湯下永除

寒疝往來○吳茱萸一兩生薑半兩清酒一升煎溫分服

癩疝

三百五十九

寒疝諸疾○胡蘆巴右腎命門藥也元陽不足冷氣潛伏

不能歸元者宜之宋憲民和劑局方有胡蘆巴丸治大

人小兒小腸奔豚偏墜及小腹有影如卵上下走痛不

可忍者用胡蘆巴八錢茴香六錢巴戟去心川烏頭炮

去皮各二錢棟實去核四錢吳茱萸五錢並炒為末酒

寒疝滑泄○腹痛腸鳴自汗厥逆熱附子去皮臍元胡索

炒各一兩生木香半兩每服四錢水一盞姜七片煎七

分温服

冷氣疝瘕。胡蘆巴酒煎晒乾。蒼麥炒研。麩各四兩。小茴

香一兩。為末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽湯。或

鹽酒下。服至兩月。大便後。出白膿。則除根。

小腸氣墜。用八角茴香。小茴香各三錢。乳香少許。水服。

取汗。治小腸疝氣痛。不可忍。用羌活。香荔枝核。炒黑。

各等分。研末。每服一錢。温酒調下。

血病初起。胡椒菜葉。按揉之。狀用小豆。豉豆各一升。蒸熟。作三

下部卒痛。如鳥喙之狀。用。小豆豉豆各一升。蒸熟。作三

囊更互坐之。即止。

膀胱石水。四肢瘦削。小腹脹滿。穉根白皮。桑根白皮。各

二斤。白朮四兩。黑豆五升。流水。煮四升。入清酒

二升。再煮。至三升。日再一服。之。

小腸臟氣。痛不可忍。蓬莪。研末。空。葱酒。服一錢。

婦人疝瘕。名小腸氣。馬鞭。厚。酒煎。滾服。以湯浴身。

取汗甚妙。

昆布。腫。治膀胱結氣。急宜。氣用昆布一斤。白米泔浸

一宿。洗去鹹味。以水一斛。煮熟。劈細。入葱白一握。寸斷

之。更煮極爛。乃下。鹽酢。糝。姜。橘。末。調和。食之。仍宜食

梁米。粳米。飯。極能。下氣。無所忌。海藻。亦可依此法。作之。

疝氣。卵腫。脹痛。不可忍。唵珠丸。用礞砂。乳香。各二錢。黃

蠟一兩。研溶。和丸。分作一百八丸。以綿縫。露一夜。次日

取出。蛤粉。為衣。每用一丸。乳香湯吞下。日二服。取効。

奔豚。疝氣。作痛。或陰囊。腫痛。用生川烏。尖七個。巴豆七

枚。去皮。油。為末。糕糊丸。梧子大。硃砂。麝香。為衣。每服二

丸。空心。冷酒。或冷鹽湯。下。三兩。日一服。不可多。

寒。疝身痛。腹痛。手足厥冷。不仁。或身痛。不能眠。用烏頭

一味。以蜜。二升。煎。減半。入桂枝湯。五合。解之。得一升。初

癩疝男陰

疝氣初起。新得神方。紫蘇葉八分。橘核沙糖炒八分。牛

膝酒炒一錢。杜仲酒炒一錢。五分。荔枝核連肉十四枚。

炒透。杵碎。炒黃米五錢。並煎湯。漚。汁煎藥。七服。全愈。其

黃米。須仍煮粥。飯不可輕棄。五穀。寒熱疼痛。并欲生

囊。癰者。用新鮮地骨皮。生姜各四兩。共搗如泥。以絹包

於囊上。其痒異常。一夕即消。永不復發。

男陰門

陰下懸癰。○生于穀道前後初發如松子。大漸如蓮子。數十日後赤腫如桃李。成膿即破。破則難愈也。用橫文甘草一兩。四寸截斷。以溪間長流水。一盃河水。井水不用。以文武火慢慢薰。水炙之。自早至午。令水盡。為度。開視之。中心水潤。乃止。細到用無灰好酒。二小盃煎至一盃。溫服。次日再服。便可保無虞。此藥不能急消。過二十日。方得消盡。功化守康。朝病已破。眾醫拱手。服此兩劑。即合口而愈。

下部懸癰。○擇入神不在。口空。心用井華水調。百藥煎末。一兩。服之。微利。後却用秋壺蘆一名。苦不老。生在架。上而苦者。切片置瘡上。灸二七壯。蕭端武病。此運年。灸遂愈。

陰囊溼痒。○炒炭紫蘇葉。才。撲之。○丈夫陰囊溼痒。及陰汗。鑄鐘黃土。細末。撲之。○陰下溼汗。滑石一兩。石膏煨半兩。枯白礬少許。研搽之。○甘草煎湯。日洗三五度。○綿黃著酒。炒為末。以熟猪心點。妙。○大蒜。淡鼓。搗丸。

梧子。大。硃砂。為衣。每空。腰。灯。心。湯。下。三十丸。○出水。不。瘥。用。五。倍。子。臘。茶。各。五。錢。膩。粉。少。許。研。末。先。以。葱。椒。湯。洗。過。香。油。調。搽。以。瘥。為。度。○烏。賊。骨。蒲。黃。撲。之。

腎風囊痒。○川椒。杏仁。研膏。塗。掌。心。合。陰。囊。而。卧。甚。効。○稻。草。燒。皂。角。烟。熏。十。餘。次。即。止。○用。猪。尿。跑。火。炙。以。鹽。酒。喫。之。

囊瘡痒痛。○紅椒。七粒。葱。頭。七。個。煎。水。洗。之。○用。蠟。面。茶。為。末。先。以。甘。草。湯。洗。後。貼。之。妙。香油。調。搽。即。愈。

玉莖溼痒。○肥皂。一個。燒。存。性。香。油。調。搽。即。愈。

陰囊溼瘡。○腎。有。勞。熱。麻。黃。根。石。硫。黃。各。一。兩。米。粉。一。合。為。末。傅。之。

陰下痒痛。○車。前。子。煮。汁。頻。洗。

陰痒生瘡。○胡。麻。嚼。爛。傅。之。良。

陰風作痒。○好。燒。酒。浸。百。部。擦。之。不。過。六。七。次。風。皆。盡。落。

○陰。毛。際。肉。中。生。虫。如。虱。或。紅。或。白。痒。不。可。忍。者。白。果。仁。嚼。細。槓。擦。之。取。効。

陰冷發悶。○冷。氣。入。腹。脹。滿。殺。人。釜。月。下。吐。和。雞。子。白。傅。

之○冷氣入腹腫滿殺人醋和熟灰頻熨之○漸入囊
內腫滿殺人車前子末飲服方寸七日二服○漸入腹
腫滿醋和麩熨之○陰下冷痛入腹則腫滿殺人莫根

陰冷入腹○有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿日夜疼悶
欲死以布裹椒包囊下熱氣大通日夜易之以消為度
○以食吳茱萸總牛胆中百回命乾每取二七枚嚼納

腎邪冷氣○力弱者用大茴香六兩分作三分用生附子
一個去皮分作三分第一度用附子一分茴香一分同
炒黃出火毒一夜去附子研茴香為末空心溫酒下一

錢第二度用二味各一分同炒存性出火毒以附子去
一半留一半同茴香為末如前服第三度各一分同炒
存性出火毒全研為末如前服之

腎臟虛冷○腹脹滿胡蘆巴炒二兩熟附子硫黃各七
錢五分為末酒煮麩糊丸梧椰子大每鹽湯下三十九丸
○氣攻腹脹滿疼疼痛大木瓜三十枚去皮核剉空以
甘菊花末青鹽末各一斤填滿置籠內蒸熟搗成膏入

新艾茸二斤搜和丸如梧子大每米飲下三十九丸日二
風冷傷腎○腰背虛痛杜仲一斤切炒酒二升漬十日日
服三合○三因方杜仲為末每旦以溫酒服二錢

陰莖熱瘡○稍瓜燒灰傳之
雞子黃調傅之○大如升核痛人所不能治百馬鞭草
搗塗之○作痒用桃仁炒香為末酒服方寸七日二仍

裹包痛處仍以熱湯洗之
陰腫如斗○如刺汗出者小蒜一升荏根一升楊柳根二
斤酒三升煎沸乘熱熏之○荔枝核青橘皮茴香等分

各炒研酒服二錢日三○生蔓菁根搗封之神驗
時疾陰腫○囊及莖皆熱腫以羊屎黃蘗煮汁洗之
陰囊腫痛○葱白乳香搗塗即時痛止腫消○高莖子一
合搗末水一盞煎五沸溫服

急淋陰腫○泥葱半斤煨熟炸爛貼臍上
陰腎腫痛○荔枝核燒研酒服二錢○椒欖核荔枝核山
查核等分燒在性研末每服二錢空心茴香湯調下

男陰

三百六十二

水病囊腫○牡蠣煨粉三兩乾姜炮一兩研末冷水調粉

掃上須臾囊熱如火乾則再上小便利即愈○一方用

葱汁白麩同調小兒不用乾姜

外腎偏腫○桂末水調方寸匕塗之

陰痛極痛○馬齒莧搗傅之良

陰潰囊腫○木饅頭子小箇香等分為末每空心酒服二

錢取効

陰疽腫毒○凡風寒淫癘骨內冷痛及損傷入骨年久發

痛或一切陰疽腫毒並宜草烏頭南星等分少加肉桂

為末姜汁熱酒調塗未破者能內消久潰者能去黑爛

二藥性味辛熱能破惡塊逐寒熱遇冷即消遇熱即潰

外腎生瘡○蚯蚓屎二分紫豆粉一分水研塗之乾又上

之○痛爛者以蜈蚣一分蚯蚓溼泥二分水研和塗上乾

即易之禁熱食酒蒜芥菜○蒸及頭潰爛痛不可忍久

不瘥者以五月五日繁縷燒焦五分入新出蚯蚓屎二

分水作餅貼之乾即易禁酒麩五分辛熱食等物甚効

○臭腐用猪胞一枚連尿去一半煎一半紅新磚焙

乾為末入黃丹一錢參之三五次瘡先須以葱椒湯洗

陰頭生瘡○蜜炙甘草末頻頻塗之神効○人不能治者

龍甲一枚燒研雞子白和傅

疔陰瘡○用孩兒茶末米泔洗淨傅之甚効或加胡黃

連等分○鏡繡即鏡上綠也同五倍子等分米泔洗後

傅之○爐甘石火煨醋淬五次一兩孩兒茶三錢為末

麻油調傅立愈○每浮石燒紅醋淬數次二兩金銀花

一兩為末每服二錢半水煎服病在上食後在下食前

一年者半年愈○產門更痛痛不可忍用杏仁去皮

燒存性杵爛綿裹納入陰中取効○有二種一者陰蝕

如精陰瘡○鈔粉二錢銀杏仁七個錫鏡內炒至杏仁黃

去杏取粉出大毒研搽効○黃鸞青鸞麝香等分傅之

陰頭疔蝕○雞內金不落水拭淨漸逐焙乾出火毒為細

末先以米泔水洗滌乃搽之亦治口疳○男女陰蝨用

肥猪肉煮汁洗不過二十斤
陰上栗瘡○取停水淫處乾卷皮為末搽之神効
男女下疳○母猪糞黃泥包蟻存性為末以米泔洗淨搽

立効
便毒初起○鱖魚一枚山慈五錢同搗爛敷之即消
金伐木也○以胡桃同嚼食二三枚能消便毒便毒屬肝

夜即散○貫衆酒服二錢良○冬葵子末酒服二錢○
射干屬金有木與火行太陰廢陰之積痰故治便毒此

是厥陰溼氣因疲勞而發取射干三寸與生薑同煎食
前服利三兩行甚効○黃瓜萎一個黃連五錢水煎連

服効○不問已潰未潰或初起發熱用金錢花俗名高
藤系花連莖葉自然汁半盞煎入分服之以滓傳上敷

毒托裏散氣和血其功獨勝○葱白炒熟布包熨敷次
乃用傅藥即愈○穿山甲搗入穀芒熟灰中炮焦為末二

通氣藥即愈○穿山甲搗入穀芒熟灰中炮焦為末二
商入麝香少許每服二錢半温酒下

囊溼精少○石斛氣平味甘淡微鹹陰中之陽降也乃足
太陰脾足少陰右腎之藥深師云囊溼精少小便餘瀝

者宜加之一法每以二錢入生薑一片水煎代茶飲甚
清肺補腎也

魚口毒瘡○白礬枯研寒石麴糊調傅上即消○初起未
成膿者用南五倍子炒黃研末以百草霜等分以臘醋

調塗于患處一日一夜即消
陰毒腹痛○回陽丹用不灰木煨牡蠣燬高良姜炒川烏

頭炮白芍藥各一錢為末入麝香少許每用一錢男用
女唾調塗外腎女用男唾調塗乳上得汗即愈○露蜂

房三錢燒存性葱白五寸同研為丸男左女右着手中
握陰卧之汗出即愈○雞糞烏豆地膚子各一把亂髮

一團同炒烟起傾入好酒一碗浸之去滓熱服即止
陰毒卒腫○用雄雞冠血入熱酒中飲之暖卧取汗○雞

血衝熱酒飲
男女陰毒○銀硃輕粉各一錢用五日獨蒜一枝搗和作

餅貼手心男左女右兩手合定放陰下頃間氣回汗出
即愈但口中微有氣即活○寒水石不拘多少為末用

兩餽飯搗丸粟子大日乾每用一九炭火煨紅燒研以

滾酒調服飲葱醋湯投之得汗愈

房勞陰毒○胡椒七粒葱心二寸半麝香一分搗爛以黃

蠟溶和做成條子插入陰內少頃汗出即愈○腹痛欲

死殺猪血乘熱和酒飲之

陰痿陰汗○陽起石煨為末每服二錢鹽湯下○沒石子

治陰汗燒灰先以湯浴了布裹灰撲之甚良

腎虛陰痿○羸瘦精衰少力用續猪腎一對切片枸杞葉

半斤以豉汁一盞同板塩煮羹食

陽虛陰痿○甚有補益鹿角霜白茯苓等分為末酒糊丸

梧子大每服三十丸鹽湯下

腎虛精竭○羊腎一雙切于豉汁中以五味米糝作羹粥

食

老人腎硬○治老人腎藏虛寒內腎結硬雖服補藥不入

用羊腎子一對杜仲長二寸潤一寸一片同煮熟空心

食之令人內腎柔軟然後服補藥

玉莖強中○不痿精滑無歇時時如鍼刺捏之則脆此名

腎漏用破故紙非子各一兩為末每用三錢水二盞煎

六分服日三次愈即止○玉莖強硬不痿精流不住時

時如針刺捏之則痛其病名強中乃腎滯漏疾也用非

子破故紙各一兩為末每服三錢水一盞煎服日三即

住

男女轉脬○不得水便寒水石二兩滑石一兩葵子一合

為末水一斗煮五升時服一升即利○乾箬葉一兩燒

灰滑石半兩為末每米飲服三錢○小便轉脬甘遂末

一錢猪苓湯調下左通○非小腸膀胱厥陰受病乃強

恐房事或過恐小便當治其氣則愈非利藥可通也沉

香木香各二錢為末白湯空腹服之以通為度

小便出血○當歸四兩剉酒三升煮服一升頓服○白芷

常歸等分為末米飲每服二錢○蒲黃末每服半錢生

地黃汁調下量人加減或入髮灰等分

便癰腫痛○鼠粘子二錢炒研末入蜜一匙朴硝一匙空

心溫酒服○皂角一條醋熬膏傅之屢効○穿山甲半

兩猪苓二錢並以醋炙研末酒服二錢外穿山甲末和

麻油輕粉塗之或以末塗之

陰陽易病○傷寒初愈交合陰陽必病拘急手足拳小腹

男陰

三百六十五

急熱頭不能舉名陰陽易當汗之滿四日難治蓋一把
 雄鼠屎三七粒水煎服取汗○傷寒後婦人得病雖瘥未滿
 薄粥和酒服發汗即愈○傷寒後婦人得病雖瘥未滿
 百日不可與男台為病拘急手足拳腹痛欲死丈夫名
 陰易婦人名陽易速宜汗之即愈滿四日不可治也
 乾姜四兩為末每用一兩白湯調服覆衣被出汗後手
 足伸即愈○男子陰腫小腹絞痛頭重眼花宜猥鼠屎
 湯主之用猥鼠屎十四枚豈根一大把水二盞煮七分
 去滓再煎二沸溫服得汗愈未汗再服
 腎氣作痛○黑白牽牛等分炒為末每服三錢用猪腰子
 切縫入茴香百粒川椒五十粒參牽牛末入內扎定紙
 包煨熟空心食之酒下取出惡物効
 腎臟氣發○攻心而熱欲死及諸氣奔豚喘急錮二兩石
 亭脂二兩木香一兩麝香一錢先化錮急入亭脂急
 炒焰起以醋噴之傾入地坑內覆住待冷取研粟飯丸
 芥子大每服二九熱酒化服取汗或下或通氣即愈如
 大便不通再用一九入元明粉五分服
 木臟氣痛○雞心栴榔以小便磨半個服或用熱酒調末

一錢服之
 腎氣上噦○腎氣自腹中起上築于咽喉逆氣連屬而不
 能出或至數十聲上下不待喘息此山寒傷胃晚腎虛
 氣逆上乘于胃與氣相併難經謂之噦素問云病深者
 其聲噦宜服此方如不止灸期門關元腎俞穴用吳茱
 萸醋炒熱橘皮附子去皮各一兩為末麪糊丸梧子大
 每姜湯下七十九丸
 外腎偏痛○皂角和皮為末水調傅之良
 下部諸疾○龍液膏用壁白茯苓去皮焙研取清溪流
 水洗浸去筋膜復焙入甕瓶內以好蜜和勻入銅釜內重
 湯桑柴火煮一日取出收之每空心白湯下二三匙解
 煩鬱躁渴一切下部疾皆可除
 腎臟風瘡○澤瀉皂莢水煮爛焙研煉蜜丸如梧子大空
 心溫酒下十五丸至二十丸
 腎風下疳○生瘡用驢蹄二計片煨灰蜜陀僧輕粉各一
 錢麝香半錢為末傅之
 確砂損陰○猪蹄一具浮萍三兩水三升煮汁半升漬之
 冷即出以粉傅之
 男陰

玉莖作痛○甘草稍用治胸中積熱去莖中痛欲死用牛膝并
胡索苦棟子尤妙○小便不利莖中痛欲死用牛膝并
葉以酒煮服之今再括出表其神功○乳香葱白等分

飛絲纏陰○腫痛欲斷以威靈仙搗汁浸洗

腎黃如金○高莖子一合細研水一盞煎五分服

交接勞復○卵腫或縮入腹痛欲絕礬石一分硝三分大

麥粥清服方寸匕日三服熱毒從二便出也○丈夫熱

病後交接復發忽卵腫縮入腸腸痛欲死燒女人月經

赤衣為末熟水服方寸匕即定

腎中無陽○乾姜氣薄味厚半沉半浮可升可降陽中之

陰也又曰大辛大熱陽中之陽其用有四通心助陽一

也去臟腑沉寒痼冷二也發諸經之寒氣三也治感寒

腹痛四也腎中無陽脈氣欲絕黑附子為引水煎服之

名姜附湯

男子臍冷○白堊土研末雞湯服之

補益腎氣○豇豆開花結莢必兩兩並垂有習坎之義豆

子微曲如人腎形所謂豇豆為腎穀者宜以此當之昔盧

廉夫教人補腎氣每日空心煮豇豆入少鹽食之蓋得

此理與諸疾無禁但水腫忌補腎不宜多食

紫金藤丸○補腎臟暖丹田興陽道滅小便便填精髓豐顏

色潤肌肉治元氣虛面目黧黑口乾舌澀夢遺虛驚耳

鳴目淚腰膝沉重百節酸疼項筋緊急背脾勞倦陰汗

盜汗及婦人子宮冷月水不調或多或少赤白帶下

並宜服之用紫金藤巴戟天去心三兩吳茱萸高良姜

肉桂青鹽各二兩為末酒糲丸梧子大每溫酒下二十

丸日三服

腎囊注漏○新得良方用葦葶艸苦參甘艸湯加白礬少

許間日薰洗後上藥紫刺皮黃蘗獨活各炒三錢蘆薈甘
石三錢甘艸水童便製生石膏生大黃各三錢血竭蚌
殼粉五倍子製乳香沒藥各一錢冰片五分各為極細
末和勻磁瓶封固香油調于陳荷花瓣貼如用蠟油
或鳳凰油調更妙

陰腫痛痒○以荷葉浮萍蛇床子等分煎水日熏洗之
陰忽腫大○生諸葛菜根洗去泥春爛封之即消或無鮮
者以枯者水浸為塗亦可此方於人所不能治

平易方卷四 男陰 腐氣 三百六十七

脚氣門

寒溼脚氣○磚燒紅以陳臭米泔水淬之乘熱布包三塊
 用藤夾住綿被覆之三五次愈○無名異末化牛皮膠
 調塗頻換○白芷芥子等分為末姜汁和塗之効○白
 芍六兩甘草一兩為末白湯點服○腿膝疼痛行步無
 力胡蘆巴酒浸一宿焙破故紙炒香各四兩為末以木
 瓜切頂去瓢安藥在內令滿用預合在釜定蒸爛搗丸
 梧子大每服七十九空調膏塗之藥乾再塗腫消為度
 ○一個去皮臍為散姜汁取土烏葯不犯鐵器布搗去土
 蜜及刮屑好酒浸一宿以烏葯雞子瓦罐中水煮一日
 香少許尤佳痛入腹者送下甚効○脚弱病人用杉木
 去雞子切片蘸食以湯調塗以帛裹之取汗永不發也
 為補灌足排樟腦于兩脚間用綿棚定月餘甚効○羊
 角一副燒過為末熱酒調塗以帛裹之取汗永不發也
 風溼脚氣○紫蘇子高長氣諸痛用荆莖子環中炒烟熏
 十九空酒下○治脚

風毒脚氣○搶之沒指者

刺愈此法貴賤皆可

五九生姜湯下取小便

澤牛子搗末蜜丸小豆大每服

一切脚氣○猪肝作生

利乃止亦可吞之其子黑色正

又和槐白皮蒸之尤良

分裹近壁以脚踏之令脚心熱

脚氣欲吐○每且飽食午

後少食日晚不食若飢可食豉

粥若覺不消欲致霍亂

者即以前代之高良姜一兩水煮頓服

脚氣衝心○白礬三兩水

煎一斗五升煎沸浸洗○黍穰一

石煮汁入椒目一升更

煎十沸漬脚三四度愈○煩悶

心下結硬腹中虛冷陳

皮一斤和杏仁五兩去皮夫熬

少加蜜搗和丸如梧子

大每日食前米飲下三斗丸○

脚氣入腹○脹悶喘急用

威靈仙末每服二錢酒下痛減

脚氣腫渴。大升入赤小豆一升，煮熱食，豆飲汁。一升再入水三升，煮之。
脚氣腹癢。心腹脹滿，小使澀少，馬薊煎汁，非冷非熱，或老人
煮食之。用木瓜切片，囊盛踏之。○杉木煎濃湯，日浸洗。
或或汁調服。二錢甚利。○沙木腿杉木煎濃湯，日浸洗。
脚氣風痺。○松葉酒治。○二風痺不能行，衆療不得力，服
此一劑，便能遠行。不過兩劑，松葉六十斤，細剉，以水四
石煮取四斗，九升，封頭，七日發，澄飲之。取醉得此酒力者，
米并饋飯，泥釀封頭，七日發，澄飲之。取醉得此酒力者，
甚衆。○牛乳五升，硫黃三兩，煎取三升，每服三合，羊乳
亦可。或以牛乳五合，煎調硫黃末一兩，服取汁，尤良。
脚氣走痛。○蘿蔔湯洗之，仍以蘿蔔晒乾，爲末，鋪襪內。
脚氣腫痛。○骨痛，薊薊根，碎酒醋共三分，根下合蒸熟。
脚氣溼癢。○極痒，有虫，烏柏根爲末，傅之。少時有涎出，良
酒患脚氣。○有人嗜酒，日須五七盃，後患脚氣，甚危，或教

以巴戟半兩，糯米同炒，米微轉色，去米，不用。大黃一兩，
剉炒，同爲末，熟蜜丸，溫水服五七丸，仍禁酒，遂愈。
脚氣成漏。○跟有孔，深半寸許，其痛異常，用人中白煨
水氣，脚氣，桑條二兩，炒香，以水煎，每日空心服，無禁忌。
腰痛脚氣。○木瓜湯治腰膝痛，脚氣，羊肉二升，取汁入沙糖
梗米二升，回豆，即胡豆，等升，木瓜二升，取汁入沙糖
新久脚氣。○血竭乳香等分，研以木瓜一個，剉孔入藥
在內，以麪厚裹，砂鍋煮爛，連麪搗丸，梧子大，每溫酒服
三十九丸，忌生冷。
脚氣上攻。○結成腫核，及一切腫毒，用甘草遂末水調，傅腫
處，卽濃煎甘草汁，服其腫卽散。二物相反，而感應如此。
脚氣痞絕。○杉屑屬金，有火，其節煮汁，浸持脚氣腫滿，九
塊，大如石，且死，困不知人，搗搗上視。三月，家人號哭，榮
陽鄭洵美傳。杉木湯服半食頃，大下三行，氣通塊散。方
用杉木節一大升，橘葉切一大升，無葉則以皮代之。大
脚氣

腹棋榔七枚連子碎之童子小便三升共煮一大升
 者乃得兩服若一服得快即停後服此乃死病曾有救
 男婦脚氣○骨節皮膚腫溼疼痛此故傳之云
 忘事五加皮四兩酒浸遠智去心四兩酒浸並春秋三
 日夏二日冬四日酒乾為末以酒浸為糊丸梧子大每
 服四五十九空日酒下藥酒壞別用酒為糊
 老人脚氣○嘔逆者猪腎一對以醋蒜五味治食之日作
 一服或以葱白粳米同煮粥食亦可○猪肚一枚洗淨
 切作片水洗布絞乾和蒜醬椒醋五味常食亦治熱
 風溼膝痛○脚氣風溼虛汗少力多痛及陰汗燒髮末一
 匙頭投沸湯淋洗痛處
 疏導脚氣○枳殼炒二兩四錢甘草六錢為末木瓜湯服
 消除脚氣○每寅日割手足甲少侵肉去脚氣
 風冷脚氣○白礬石煨二升酒三斗漬三日稍稍飲之○
 風毒脚氣○煨黃末三兩鐘乳五升煮沸入水煎至
 三升每服三合

足趾門

脚心腫痛○因久行久立致者水和蚺蚺糞厚傅一夕愈
 脚腿紅腫○熱如火炙俗名赤遊風用鐵鑪水塗解之
 風溼脚痛○鍼砂川烏頭為末和勻炒熱綿包熨之
 背腿間痛○一照痛不可忍芫花根末米醋調傅之如不
 住以帛束之婦人產後有此尤宜
 病後足腫○但節食以養胃氣外用狗脊煎湯漬洗
 腰脚冷痹○疼痛有風川烏頭三個生去皮臍為散醋調
 塗帛上貼之須臾痛止
 腎水流注○腿膝攣急四肢腫痛甘遂二錢生研為末以
 積猪腎一枚分為七瓣入末在內加木香四錢淫紙包
 煨令熟每用二錢溫酒嚙下當利黃水為驗
 膝風疼痛○菊花陳艾葉作護膝久則自除○草烏細亨
 防風等分為末搽靴襪中及安護膝肉能除風溼健步
 毒熱足腫○作痛欲脫者苦參煮酒漬之
 溼滯足腫○早輕晚重用草烏頭一兩以生薑一兩同研
 交感一宿蒼木一兩以蒸柏一兩同研交感一宿各焙
 足趾

乾為末酒糊丸梧子大每服五十九酒下
溼氣脚軟○樟柳根切小豆大煮熟更以菘豆同煮為飯

風氣脚弱○痺滿上氣田舍貧家用此最良
洗到一

酒以水三斛煮取九斗漬麴去滓取一斛
飲如常釀

風毒膝攣○骨節痛用豉三五升九熬丸
暴以酒一斗度

腰脚疼痛○天麻半夏細辛各二兩絹袋二個
各盛藥合

勻蒸熱交互髮痛處汗出則愈
為度○新胡麻一升

未空心溫酒服一錢逐日以微醉為度
○新胡麻一升

熬香杵末日服一小升服至一斗
永瘥溫酒蜜湯姜汁

皆可下○治腰脚風溼痛不止
蒸法用荆葉不限多少

置大甕中其下着火濕之以病人
置葉中須臾當汗出

蒸時當旋旋喫飯稍倦即止
便以被蓋避風仍進葱豉

酒及豆酒亦可一升揀淨蒸而炊
久暴乾簸去黑皮炒

腰脚無力○韭子一大兩水煮一二
百沸慢火炒赤色和

黃耆粉安息香二大兩水煮一二
百沸慢火炒赤色和

搗為丸梧子大如乾入少蜜每日
空腹酒下三十九以

飯三五匙壓之大佳
脚筋痛○用木瓜數枚以酒水各干煮爛
膏乘熱貼

于痛處以帛裹之冷即換
日三五度

水病脚腫○葱莖葉煮湯漬之
日三五次妙

腫脚起○煎汁飲之以滓傳之
腰脚攣○煎汁飲之

至一斤切洗以水五斗煮取濃汁
濾去滓更入小罐中煎

更入麝香珠砂末同丸如梧子大
每日用秫米酒送下

脚膝浮腫○荷葉心葉本等分煎湯
洗之

足壁筋急○桂末白酒和塗之
一日一上

丈夫脚冷○不隨不能行者用
醇酒三斗水三斗入瓷中

灰火溫之漬脚至膝常着灰火
令冷三日止

鶴膝風○酒醅糖四兩肥皂一個
去子芒硝一兩五味

尤妙也○紫荆皮三錢老酒煎服
日二次

平身方卷四

二百七十一

夏月趾腫○不能行走者九月收茄根懸簷下逐日煎湯

脚多淫汗○楊花着鞋及襪內穿之○荊芥葉搗傅之

脚氣入皮裏○以行脚○草烏細辛防風等分爲末○被石熱傷者草鞋

脚底木硬○以牛皮膠生薑汁開化調南星末塗烘物熨之

脚腫○大蒜搽足○心令熱即安仍以冷水食一餅○停取

脚陰癢○無名異二錢麝香一字研酒半盞午後空腹

脚腫○以猪腰子一個去膜切片用藥四錢在中溼紙包煨熟

脚腫○金星草背上星刮下傅之即乾

脚腫○桑耳猪耳牛屎各五錢胎髮灰男用女女

脚腫○地蛆和塗之或乾塗之

脚腫○麝香末以酒瓶上著葉夾末貼之○用桃柳槐椿棟五

脚腫○以十層以帛拈定三日洗除去一層不用一月痊愈

脚腫○人乳桐油等分○和勻以鷺翎掃塗神效○猪胆

脚腫○鹿角末水六合○和方寸七温服一合○其脈上下

脚腫○鹿角末水六合○和方寸七温服一合○其脈上下

脚腫○鹿角末水六合○和方寸七温服一合○其脈上下

脚肚生瘡。初起如粟，搔之漸開。黃水浸淫，痒痛潰爛。遂

至遠，歷而成痼。痼疾用酸，權皮煎湯，冷定日掃之。取愈

乃止。○如癩，桐油人乳等分，掃之。數次即愈。○初起如

粟米，大搔之，不已，成片。包脚相交，黃水出，痒不可忍。久

成痼，疾用百葯煎末，唾調，逐瘡四圍塗之。自外入內，先

以貫仲煎湯洗之，日一次。

脚上臭癢。○一人兩足生瘡，臭穢，近夜宿五夫人祠下

夢神授方，用蒲藍子一枚，生研為末，入膩粉少許，井水

調，唾依法治之，果愈。蓋此物不燥，服餌止宜。入瘡科也。

○熟雞子黃一個，黃蠟一錢，煎油塗之。

足上風瘡。○作痒甚者，皂角炙熟，略之。

疔疽青爛。○生于臍脛間，惡水淋漓，經年瘡令敗為深疽。

青黑好肉，虛腫百藥不瘥，或瘥而復發。先以藥蝕去惡

肉，後用豕屎散甚効。以猪屎燻，乃復發。先以藥蝕去惡

足瘡生虫。○南方地卑，溼人多患。乃傳以平為期，有驗

風毒攻注，而然用牛或羊或猪，吐去屎，不洗，研如泥，看

瘡大小，入煨過泥，礬半兩，以上血勻塗帛上，貼之，須臾

瘡入心，徐徐連帛取下，火上炙之，出絲髮，馬尾于萬

足上凍瘡。○以醋洗足，研藕傅之。○一作耳足凍瘡，橄欖燒研

凍瘡裂折。○蒸熟藕搗爛塗之。○薤蒿刻空，滾蠟燭油塗

尸膠折裂。○無冬夏者，雞屎煮湯漬半日，取瘡乃止。○焯

雞眼肉刺。○枯礬黃丹朴硝等分，為末，搽之。次日浴二三

次，即愈。○脚生肉刺，程繫若根，謂繫于襪帶上，也。○先

以湯浸，刮去一層，用黑木耳貼之，消爛不痛。○剝去皮

以燭雞湯洗之。○刺破以新酒醉之，消爛不痛。○剝去皮

脚腫痛。○不能着地，用黃牛屎入盞炒熱，罨之。一合愈

嵌甲作痛。○不能行履者，濃煎陳皮湯，浸良久，甲肉自離

嵌甲作瘡。○足趾甲入肉作瘡，不可履。鞋礬石燒灰，傅之。

平易方卷四 三百七十三

知母燒存性研搽之

割甲侵肉○久不瘥礪砂礬石為末裹之以瘥為度○不

割甲成瘡○連年不愈川烏頭尖黃藥等分為末洗了貼

之甲以愈為度

足趾甲疽○石膽一兩燒烟盡研末傅之不過四五度瘥

○治甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫黃

水浸淫相染五指俱爛漸上脚跌泡漿四邊起如火燒

瘡日夜怪增醫不能療綿綿礬石五兩燒至汁盡研末色

如黃丹收之每以鹽湯洗拭用末厚傅之以軟綿煖裹

當日即汗斷癢乾每日遍塗湯洗濯有濃處使淨傅

其癩乾處不須近有急痛處塗麻少許令潤五日即覺

即癩起依前洗傅十日癩漸剝盡軟處或更生白膿泡

舉發者黃著二兩藺茹一兩醋浸一宿以豬脂五合微

火上煎取二合絞去滓以封瘡口上日三度其肉自消

○甲疽生于脚趾邊腫爛用藺茹三兩黃芪二兩苦酒

浸一宿以豬脂五合合煎取膏三合日三塗之即消

婦人甲疽○婦人指甲內生瘡惡肉突出久不愈名臭田

螺用皂礬日曬夜露每以一兩煎湯浸洗仍以礬末一

兩加雄黃二錢硫黃乳香沒藥各一錢研勻搽之

足釘怪疾○兩足心凸腫上生黑頭瘡硬如釘脛骨生碎

孔髓流出身發寒顫惟思飲酒此是肝腎冷熱相吞用

炮川烏頭末傅之內服韭子湯効

遠行足趺○水調半夏末塗之一宿即沒也○成泡者水

調生麩塗之一夜即平

脚弱病人○用杉木為桶濯足排捺搖于兩股間用帛纏

山行辟蝱○山中草木枝上有石蛭着人足則穿凡人肉

中害人但以臘猪膏和塗足脛即不着人也

脚軟且疼○一少年新娶後得脚軟病且疼甚鑿作脚氣

治不効後用杜仲一味寸斷片折每以一兩用半酒半

水大蓋煎服三日能行又三日全愈此乃腎虛非脚氣

也杜仲能治腰膝痛以酒行之則為効甚容易矣

肝虛轉筋○肝臟氣虛風冷搏于筋遍體轉筋入腹不可

忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱漬之○吐瀉赤蓼莖葉切

足趾

三百七十四

正易方卷四

三合水一盞酒三合煎至四合分二服
海水傷裂○凡人為海水鹹物所傷及風吹裂痛不可忍

末煎湯浴之一夕即愈
脚了潮爛○脚趾縫了感受潮溼水氣紅赤腫痒搔之疼

痛似如爛腐步履難行用烏柏樹嫩葉水浸軟抹燥嵌
脚了內立時痛止收燥而愈○如女子脚蹠腫上所受

溼氣忽起白泡痛腐以此貼之亦能止痛
脚底起泡○凡行遠路足底起泡水調白麩塗之即平○

又蘿葡子炒研和白礬末鋪鞋底永不痛
脚趾脫疽○用土蜂房煨研末以醋調搽應手而愈真神

方也內服驅溼保脫湯方用米仁三兩茯苓二兩白木
一兩車前子五錢水煎服一連十劑永無後患此症發

於脚趾漸上至膝色黑肉陷痛不可忍逐節說落亦有
發於手者

女人紫足○并趾足襠瘡俱載前女陰門內
平易方卷四終

板藏華藏寺巷大有堂

補遺經驗良方

萬金方○產婦累日不下危急之至用此方法草麻子十

四粒去殼砂雄黃各一錢五分蛇脫一尺燒存性研

末飯和丸彈子大先將花椒湯淋洗產婦臍下將藥一

丸放于臍中用紙數層覆蓋以棉帛束之若兒頭出產

門即取去之不可遲誤一婦三日不下舉室愈惶服破

血行經閉交骨之藥罔効吳葵山先生製一方以車前

為君冬葵子為臣白芷枳殼為佐已時服午時產

急救而崩○舊爛棕櫚心或舊棕葉衣之領陰湯瓦燬黑

研細末每服叁錢童便調服立止
婦人乳癰○砂仁去殼五冬葵子八分研末蒲公英五

錢括萎仁三錢煎湯調服初起在四日內者三服可消

乳頭破爛○敗龜版炙研末加冰片少許麻油調搽即愈

初生連舌○小兒初生啼哭不出者須看舌下若連舌如

石櫛子急以指甲摘斷之或用蘆葦削作刀割之微有

小兒齒齠○初生齒根有黃筋兩條以蘆葦削刀割斷猪

平易方卷四 補遺經驗良方 三百七十五

乳點之為妙如兒口難開先點乳○一凡小兒初生
 大小便不通腹脹欲絕急令婦人以溫水嗽口唾兒前
 後心并臍下及手足心共七處以紅赤色為度即通
 內胎驚○新產小兒或月內外忽發驚搐一二周時不
 愈諸藥無藥可治惟取鼠卵兩枚拌以硃砂懸掛陰乾
 研末用開水調送二三匙其搐立止能乳子目視奇効
 竹衣胎○治小兒無皮膿血淋漓及胎中遺毒赤劍楊
 梅瘡胎皆然者并治婦女為丈夫梅瘡所過結毒之
 氣漸全陰戶蝕爛流血不止沿至產門外繞胎門腫硬
 潰膿出水不休疼痛不堪將此藥擦之如小便必衝去
 須要勤搽漸愈○甘石一兩黃連汁滓三次再煎
 便濟○勤搽漸愈○甘石一兩黃連汁滓三次再煎
 煨存性取淨末兒錢五錢猪胆汁七次紫甘藤皮五錢燒
 錢煨水片五分為細末入雞子黃煎黑去黃候冷
 調搽○即可愈麻油二兩入雞子黃一枚內服丸藥開後
 西黃二分硃砂七分雄黃七分乳香五分山慈姑一錢
 眞麝香一分沒藥五分研勻蜜丸約重三分金銀花煎
 湯調服一丸大人不可不必服如欲稱量候瘡好後每逢

小兒節氣○調服一丸二丸出時必稀須過週歲方可搽此藥
 一兒胎○凡小兒初生發疳止見啼哭不見病形延至
 連樹取皮下水三錢同煎服○對果亦可治三人荔枝核七枚
 杵碎平地水三錢同煎服○對果亦可治三人荔枝核七枚
 兒其卵甚大日盛熱水安于中堂隨抱小兒外候端午
 日午時以脚盆盛熱水安于中堂隨抱小兒外候端午
 一浸再將小兒在于中堂隨抱小兒外候端午
 印痕于檻將艾圍在于中堂隨抱小兒外候端午
 小如故此法其應如響上溼印處灸三壯其卵遂漸收
 胎毒胎搶○治小兒胎毒頭上紅赤極是必頭搖出血
 毒後大錢五分活獨活白鮮皮一片血肉白附子蛇床子黃
 丹各五錢羌活獨活白鮮皮一片血肉白附子蛇床子黃
 各三錢不拘大人小兒俱可通治○小兒胎瘡用乾摻凡屬
 痒瘡不拘大人小兒俱可通治○小兒胎瘡用乾摻凡屬
 三兩熬鮮嫩槐枝六兩熬枝枯去滓以鉛粉一兩輕粉
 一錢煨石膏三錢研勻入麻油內蒸熟調搽
 抱龍丸○治小兒傷風發熱咳嗽痰喘乳食不消夜啼驚
 補遺經驗良方
 三百七十六

跳痰涎壅盛手足發搐倦睡昏沉等症每服一丸四五
 歲者每服二三丸勾藤薄荷湯化服如痰多加帶皮生
 姜一片忌食糟鴨鮮肉生冷油膩麪食閉氣等物陳胆
 星五錢切薄片灰燥研細末務須買京城同仁堂者明
 雄黃二錢二分水洗淨天麻一錢八分煨甘草一錢五
 分僵蚕三錢二分水洗淨附二錢用鹽酒醋姜汁每樣製
 防風一錢八分四製香附二錢用鹽酒醋姜汁每樣製
 開臨用時各樣秤用五分合二錢甚妥白附子一錢五
 分煨麝香三分天竺黃二錢以上各為極細末秤準和
 勻重篩煉蜜為丸每料分作八十九丸以硃砂為衣
 偏正頭風○荷葉蒂七個水煎服外用靛青花擦之
 日即止
 風斑皮片○當歸尾桑白皮防風薄荷生甘草海桐皮各
 一錢皮消三錢胆礬花柳各三分水煎重洗
 洗時眼方○當歸尾桑白皮防風薄荷生甘草海桐皮各
 一錢皮消三錢胆礬花柳各三分水煎重洗
 牙疼散○青鹽火硝硼砂樟腦各一錢共研末擦之○青
 鹽硼砂雄黃各三分蟾酥五厘冰片一分火硝光明粉
 黃柏生石膏各五分共研末擦牙止痛如神

擦牙散○每日清晨擦牙齒不可間斷至老齒能堅固并
 可無齒痛之患兼可不生癰毒幸勿輕視生石膏一兩
 生明礬三錢共為細末每日清晨擦齒一次
 燕窩生瘡○其菜地上曲蟻屎和米泔汁安瓦上煨燥配
 百草霜各等分共研末以香汕調擦即愈如老人皮膚
 枯燥者以熟地汁單擦亦効
 黃水潤膿○黃水流到即生蔓延無休蚕豆殼燒成炭研
 東丹少許以真菜油調塗藥乾以油潤之三日即愈○
 又方海螵蛸五錢五倍子炒焦枯礬兒茶黃丹赤石脂
 蜜陀僧鉛粉各二錢為末溼者搽之燥者柏油調擦
 膿瘡拔毒○須拔去毒水然後收口可効坐板及流膿瘡
 並可治立青四兩礬紅二兩為細末香油調擦則瘡內
 出水其毒可拔惟畧有疼痛須忍之
 膿窩瘡○黃柏二錢硫黃二錢五分雄黃二錢石膏一錢
 煨海螵蛸二錢輕粉五分共為細末麻油調擦
 水窩瘡○石菖蒲研末擦之即愈
 坐板瘡○飛滑石生大黃人中白蜜陀僧各三錢研末搽
 又方以砂仁殼煎湯淨之○用茅廁坑墀上之泥刮下
 補遺經驗良方
 三百七十七

漆瘡腫爛○細以麻油調搽三次全愈極効
 凍瘡○蘿蔔剉空蠟燭油灌內灰火調搽如溼處燥處
 凍瘡潰爛○蠟子殼煨研極細麻油調搽如溼處燥處
 天泡瘡○絲瓜刮下青皮或葉搗汁調搽或用溼敷患處
 膿瘡收口○拔毒膏後瘡不起邊內有紅肉即用此藥收
 口甚易耳水片三分石決明煨二錢川連一錢血竭五
 分琥珀末一錢乳香一錢寒水石煨三錢黃柏五錢共
 為細末如瘡甚者再加飛礬五分搽藥時用溫苦茶洗
 沙木腿○杉木花多煎濃湯日日浸洗自能漸愈
 外痔搽藥○五倍子十個取核桃大者錐孔去子金頭蜈
 蚣二條剪碎兒茶一兩五錢敲碎為度取和勻裝入倍
 子內用紙封固瓦上煨以青烟盡搽皮硝湯揉洗後搽
 胆一錢永固五分再研以猪胆調水片少許調搽可愈
 痔瘡○爛石○木髓子水磨濃汁加湯熏洗可以斷根
 ○煎湯熏洗○木髓子水磨濃汁加湯熏洗可以斷根

痔漏瘡痛○鯉魚鱗棉裹如棗形納入肛門坐時痛止
 勞苦痔毒○辛苦勞碌之人忽患腸痔臟毒愈而頻發膿
 水常流○因乏方醫藥調治失宜將成管漏每日用魚
 好酒服○一因乏方醫藥調治失宜將成管漏每日用魚
 脚痔瘡○水仙花銀研末溼者搽之燥者麻油調搽
 皮癬癩○上槿皮一斤勿見火晒燥磨末燒酒一酌掬
 麪四兩○七日常搽擦年久者搽葉擦之○老年人胆
 頸面花癬○核桃葉擦之○臘梅花陰面溼癬○葶藶鐵
 頸燥癬○痛熱地汁塗之○如而腿刮下鏽粉葶藶鐵
 線粉擦之○立癢○線粉擦之○立癢○線粉擦之○立癢
 眼癬○錢甘石童便米醋黃連水煨過當歸尾淨末各
 一錢○煎子花擦之○可搽○紅擦之永不發
 雲頭白癩○治遠年牛皮蛇皮一切頑癬無不除根海風
 藤土大黃根白果肉板櫛各五錢兩以酒煎酒半壺浸
 錢斑蝥七個金錢松新根皮一兩以酒煎酒半壺浸
 藥七日後以酒擦瘡日擦五七遍補遺經驗良方

治毒初起○內照方一服即行消散如毒勢狂者連服三

起三天之內消用雞子一枚隨量飲食內攪勻入芒硝二錢

服無不盡消好酒送食隨量飲食忽患懸癰初起如蓮

懸癰初起○子會治一人年力少壯忽患懸癰初起如蓮

于一粒三斤之內遂大如梅李赤痛非凡難以行走隨

用全蝎二十個洗去鹽反上煨研配胡椒肉三兩共搗

勻用好酒送下一頓食盡次日腫痛減其大半又將前

藥減半連服二日患若失蓋治病原要審人強弱毒起

遲速而施療治故不必拘于炙甘草之方一例而論也

額生痰核○全重一個冷茶洗淨鹽味以核桃一枚將

肉取出置全重于核桃殼內用黃泥裹好入灰火內煨

好取出全重研末以紹酒沖服每服一個不拘幾服痰

核消盡則不必再服矣

五毒發背○金星草和根淨洗慢火焙乾每四兩入生甘

草一錢搗末分作四服每服用酒一升煎二三次沸更以

溫酒二三升相和封固時飲之忌生冷油膩毒物

玉紅膏○癰疽發背對甲大毒腐去孔深洞見隔膜者用

此填塞瘡口自能生肌長肉收口當歸二兩白芷五錢

紫草二錢甘草一兩二錢以麻油一斤浸藥七日煎藥

枯去滓再熬油滴水成珠下白臘二兩攪勻離火畧冷

次下血竭細末四錢輕粉四錢待成膏蓋好聽用愈宿

愈佳凡瘡口深陷以新棉花塗此膏塞之即日痊好不

得加減藥味恐反不効

金花散○治男婦新久爛腿連年不愈并廉瘡瘡毒等症

能去腐長肉收功煨石膏一斤飛淨東丹二兩二味和

勻再篩再碾如治爛腿腫瘡用真香油調茶上蓋油紙

好肉上一換不可用茶水洗如有膿水流開只好抹在

雖愈復發發後再擦自然奏効諸瘡毒用昇葯提過之

後用此散呼膿長肉將收口時須用生肌入寶丹

銀青散○男子下疳極痛潮痒女子陰戶兩傍淫瘡瘡

膿水淋漓紅腫疼並治玉莖楊梅疔腐及小兒痘疤

橫爛痘後餘毒不清滿頭發黃泡等症用此皆効白螺

殼取墻頭上白色者佳火煨過揀去泥研細取淨末一

兩取攪核火煨存性取末二錢寒水石另研極細取淨

補遺經良方

三百七十九

末二錢冰片隨用時每藥二錢加水片一分若共研勻
以磁瓶盛貯勿使出氣臨用時以麻油調茶淫處燥
消毒神效○鮮山藥一兩不見火注紅珠一兩松香一兩
全竭十個白糖一兩共搗爛團之雷頂藥上蓋紙周時
一換癰疽初起即取已成三次收小出毒隨愈
心窩成漏○凡胸膈一錢如碗大無皮潰腐浸淫流
膿血水經久不愈等粉日未之即止
臍眼出水○龍骨枯錢飛滑石一錢五分黃茶一錢淡底
寒溼皮蛙○榆麪二錢煎湯洗後再用麻油調茶
閃腰挫氣○番葡萄乾一兩好酒煎服重者兩服愈○研
砂研細末用好酒調服即愈○注不留行一錢二分炒
入咬傷痛○咬傷若牙黃入肉不去必爛毒難愈重者傷
命輕者必成錮疾速用人尿浸一小時辰待其牙黃毒
出然後用藥用荔枝核焙研細搽之外用務肉益貼
雖落水亦不爛○青州柿餅一個令人漱口潔淨將餅
咀爛盛淨磁器內飯鍋上再蒸極爛敷之三日可全愈

跌打損傷○一切跌打損傷遍身青腫痰停作痛及墮仆
內傷一服即愈用白木耳四兩黑者亦可焙為細末每
服一兩用麻油三匙串好酒調服日服三次藥完全愈
此方係那督憲治漸印示傳佈以惠民百發百中○又
方自熬銅醋煨七次血竭乳香去油沒藥去油各三錢
番木鱉油燻去毛上炒紅花蘇木屑各一錢傷輕者四五分
麝香二分共為細末每服傷重者一錢傷輕者四五分
紹酒調服得汗即愈
跌傷○才傷撲跌傷沙傷風天南星防風等分為末好
酒調敷瘡口即愈後藥天南星姜汁妙防風白芷天
炒等分研極細末每服三錢童便和好酒調服即咬牙
縮舌腰背反張勢在垂危服之立可回生打損傷內有
瘀血者亦効○再治破傷風以及婦人產後驚風先以
手三指並連直插入病人口內可大者易治若只有
二指可入者其症必危難治用此法驗可知生死等症
○風乾黑魚頭煨焦研末每服三錢砂糖酒調服
補遺經良方

皮金膏。○跌仆擦傷。釘鞋打傷。足跟病久。蔭瘡。擦痛。并凍
 瘡。足跟。腫爛。凡小。擦傷。刀傷。皮光。潮溼。皆易。廣東。皮金
 紙一張。此即。神效。之極。軍中。宜多。備之。
 過宿。即愈。神效。之極。軍中。宜多。備之。
 勞傷。肩臂。○書瀉。無力。易痛。虎骨。四兩。酒炙。敲碎。羚羊。角
 芍藥。松節。當歸。續斷。熟地。五加皮。紫荊皮。絡石。藤。各二
 兩。臘月。桑葉。絲瓜。筋。藁本。羌活。各五錢。燒酒。十斤。浸養
 七日。每日。飯後。不可。問斷。未時。氣血。注于。臂須。未時。飽
 肚飲。一杯。服完。一料。可愈。重則。二料。全愈。
 捐傷。敷藥。○生。大黃。生。半夏。楊。仁。芥。菜。大。茴。香。各。一。錢。生
 山。梔。去。殼。二。錢。五。加。皮。二。錢。胡。椒。五。分。共。為。細。末。加。葱
 頭。三。個。香。糟。一。兩。同。搗。爛。敷。患。處。
 修煉。花。蕊。石。方。○治。一切。金。刀。箭。鐵。傷。及。跌。撲。損。傷。的。咬
 至。死。者。急。以。此。藥。修。傷。處。其。血。化。為。水。再。搽。便。活。更。不
 疼。痛。如。跌。撲。內。傷。血。入。臟。腑。用。熱。酒。與。童。便。各。半。調。服
 一。錢。隨。量。飲。酒。蓋。暖。安。臥。即。愈。能。定。痛。行。痰。無。害。兼
 治。婦。人。子。死。腹。中。胎。衣。不。下。等。症。用。童。便。溫。服。一。錢。立
 效。明。礞。黃。四。兩。花。蕊。石。一。兩。各。無。不。效。如。黃。豆。大。之。塊。用

有蓋。無。鈎。紫。砂。瓶。一。個。將。藥。拌。勻。裝。入。蓋。好。封。固。再。用
 紙。巾。黃。泥。週。圍。糊。上。頂。一。寸。許。厚。候。泥。乾。燥。再。將。細。鉄
 絲。周。圍。紮。緊。仍。用。紙。巾。黃。泥。周。身。糊。上。一。寸。許。厚。放。于
 磚。一。塊。上。用。銀。珠。書。五。行。外。畫。硃。八。卦。畫。卦。要。從。下。倒
 畫。至。上。安。磚。于。爐。內。以。火。字。朝。南。向。火。門。擇。上。吉。閉。戶
 齋。戒。沐浴。將。藥。安。于。磚。上。字。上。用。燥。銀。炭。十。斤。籬。壘
 周。匝。爐。火。自。寅。時。發。火。先。文。後。武。漸。漸。上。滋。候。炭。燒。過
 為。度。經。宿。勿。動。次。早。取出。研。細。末。對。瓶。聽。用。勿。使。走。氣
 方。磚。上。硃。畫。八
 卦。中。畫。一。圈。放
 丹。瓶。離。南。坎。北
 須。依。方。位。安。置
 離。南。火。①
 坎。北。水。②
 火。氣。恐。大。頂
 砌。紙。爐。以。免
 火。氣。冲。延。并
 防。露。天。風。雨

下 補遺經驗良方 三百八十一

海藻昆布芫花各二兩膏炭灰水熬化成膏入

米醋一飯碗再將生南星生半夏五倍子各一兩共為

細末加風化灰二兩炒紅色大黃末二兩收為膏羅之

成者羅過百日初起者不可消不消再羅候消盡不羅已

流火方木蓮蓬藤葉煎湯熏洗以腐滓敷之三日可愈

諸疔初起○木蓮蓬藤葉煎湯調擦可愈并欲成囊癰者新鮮地

骨皮生薑各四兩共搗如泥以絹包于囊上其痒異常

一皮即消永不發○荔枝核十四枚小茴香二錢紫

背大葵西兩蒸白酒二筋煎服勿問即愈○附片偏墜

方木蓮藤頭七個每日煎湯薰卵自有涎下不週七日

則那漸收小矣○兩酒浸曬燥勿炒小茴香一兩共

小腸疝氣○蕎麥麵四兩酒浸曬燥勿炒小茴香一兩共

磨為末酒糊為丸如桐子大每服一錢空心湯下服

至兩月大便內必有淫熱之物如膿者世山方効○又

方荔枝核二兩研碎防風荆芥青皮胡蘆芭蓋智仁小

茴香各一錢山梔川棟子各二錢丁香胡椒各五分生

姜二片水煎熱服○葫蘆芭七錢小茴香三錢共為細

末每服三錢滾湯調服二三劑可愈

腎囊風痒○初滾飯湯洗之洗過數次即瘥○一法以鼈

癩疔○發時揚手擲足披頭大叫口吐痰涎不省人事

等症犀角末五錢赤石脂三兩姜蚕一兩薄荷葉一兩

朴硝二兩為末麩糊丸桐子大每服三十丸滾湯送下

忌食油膩○苦參四兩為末蜜丸桐子大每服五十九

薄荷湯下○紫豆大艾圓灸鬼哭七壯其穴以二大

羊癩風症○并在指甲下手指節上二指之間即是

全蠍十個酒洗蟬蛻三十個雄黃川貝母天竹黃橘

紅防風羌活勻藤石葛蒲遠志肉甘草水炒天麻茯苓

姜衣各五錢真琥珀當門子一錢共為細末煉蜜為丸

如圓眼大辰砂為衣每服一丸開水化下

卒然鼓脹○猪脾淡煮每日食一具吃十餘日可消脹○

鼓脹發腫○隔年西瓜切蓋用大蒜肉裝滿蓋好黃泥封

下男古卷四 補遺經驗良方 二百八十二

同埋于土內上用炭燒過時出火氣每日將蒜隨意食之可愈

骨蒸勞熱○北沙參大熟地銀柴胡龍甲醋炙知母釵石

淡鹽湯送下三錢久服可愈○馬料豆二酒杯浮

夜出盜汗○五倍子炒二分枯礬少許同為細末用本人

津唾調塗臍上外以膏藥貼之効○馬料豆二酒杯浮

五竅出血○耳口鼻一齊出血名曰上虛下竭死在須臾

不及用藥先將冷水當面噴幾口婦人急分開頭髮水

隨服補血湯用粗紙數層冷醋浸透搭在額門其血即止

脫力勞傷○香附醋炒二兩砂仁一兩白木土炒五錢為

末每服二錢燈心湯下氣血虛者加蜜炙嫩黃芪一兩

吐血勞傷○小紅棗肉搽好者二斤水煮熟去皮核黑糖

一斤麻油四兩共搗研爛不見星成做一餅磁盆盛之

每晚用一兩滾水調服○又方生藕汁半盃好童便半

盃隔水蒸熟徐溫服常服可以見効

百病消散○強壯之人外感發熱胸膈飽悶俱可治氣虛

之人或吃十分之六十分之三可也葱頭七個生薑連

皮五片陳茶葉三錢焦查肉三錢六神麩三錢砂糖半

酒盃水二碗共煎服加陳酒隨量飲得汗諸病消散暑

熱天時除去姜用不必取汗

水梅丸○治中風痰厥牙關不開用此擦之能開兼治喉

痺乳蛾每用一枚噙嚙津液吐涎立愈青梅頂大

者二十枚食鹽十二兩淹五日取梅汁以明礬三兩結

梗白芷防風各二兩皂角三十條俱為粗末拌汁和梅

補遺經良方

二百八十三

惟恐脊內生虫預先用此治之往往灸後體健旺者頗

多新鮮白芥子白鴿糞五靈脂各五錢生甘草二錢生

大蘇二枚右藥四味各為細末與蒜搗爛用好米醋化

麝香一分將藥蒜調勻攤一條于本人之頂骨起至尾

萬春膏。治風吹隔七日，再灸以三次為度。一切內症，疼痛跌打，閃挫，風氣等症，貼之即愈。方傳內府，大黃、四兩、當歸、紅花、防風、黃耆、南星、各一兩。川烏、羌活、獨活、麻黃、牛膝、白芷、羌活、各五錢。用麻油四兩，入桑枝、柳枝、槐枝、各二兩，煎至枯色，去滓，候油溫，將上藥春浸七日，夏浸三日，秋浸十日，冬浸半月。文武火煎至諸藥枯色，去滓，再用絲綿兜濾淨，將油入鍋內，以文火再熬至滴水成珠，離火，加入錫粉二十兩，用桃枝不住手攪，俟油微溫，旋入後藥膏內。錫粉春夏用者，每料需用三十二兩，秋冬用者，每料用鉛粉二十兩，如此老嫩合宜。煎煉成膏，貯于鉢頭內，再擇吉日，隔湯蒸化，不可見火。加入後開藥末，乳香、沒藥、煨不，出汗取細末，各入錢取細末四錢，木香、磨取細末，入錢丁香、沒藥、煨不，出汗取細末，各入錢下旋攪，以勻為度。分碗盛，所越年方，用隔水蒸化，便子難貼，不可用火烘，詳有失。

張加阿魏二分，斑毛三個，去頭足，翅米炒過，如貼火衰，泄瀉，每張加硫黃細末一分，貼上其効更速。

諸病宜忌之脈。此條應在脈論之後，今特表於此者。

傷寒、頭痛、中風、喘急、虛勞、衄血、癆瘵、腹脹、下痢、癯瘦、墮傷、中惡、中毒。

未汗宜陽脈，欲人用。心已汗，宜陰脈，忌陽脈。心未汗，宜陽脈，忌陰脈。心已汗，宜陰脈，忌陽脈。心未汗，宜陽脈，忌陰脈。

諸病宜忌之脈：傷寒宜浮滑，忌沉澀；頭痛宜沉細，忌洪大；中風宜微弱，忌洪數；喘急宜沉細，忌浮大；虛勞宜沉細，忌浮大；衄血宜沉細，忌浮大；癆瘵宜沉細，忌浮大；腹脹宜沉細，忌浮大；下痢宜沉細，忌浮大；癯瘦宜沉細，忌浮大；墮傷宜沉細，忌浮大；中惡宜沉細，忌浮大；中毒宜沉細，忌浮大。

新產、癰疽、疔瘡、癩癧、瘋癩、霍亂、消渴、脫血、冰腫、欬嗽、心痛、已汗、宜陰脈、忌陽脈。

補遺經 驗良方 三百八十四

崩漏 宜微弱忌實大
蠱蝕 宜虛小忌緊急

帶下 宜虛遲而清忌疾急
腹痛 宜沉細忌弦長

怪脈

雀啄 連三五至而歇 歇而再至如雀啄食脾絕也

屋漏 良久一至屋漏滴水之狀胃絕也

彈石 從骨間劈劈而至如指彈石腎絕也

解索 散亂如解繩索精血竭絕也

魚翔 浮時忽一沉如魚翔之似有似無命絕也

釜沸 如釜中水火然而沸有出無入陰陽氣絕也

王海 寒則脈遲實則有力虛則無力可以脈知也若得病之

由及所傷之物豈能以脈知哉故醫者不可不問其由

使胸中了然然後診脈則疑似不能惑也我求愈疾

而巳豈以困醫為事哉若二三公之言可以發愚蒙之聾

痧喉論

邇年痧喉一症日甚一日且多殞命者其故何也祇緣舍
本求末重於咽喉而忽於痧子早進寒涼遏伏厲邪之故
耳蓋天有不正之氣即為厲氣人若感之便能為害近年天
道南行冬不藏陽每多溫暖及至春令反有暴寒折伏皆
為非時不正之厲氣感觸者蘊釀成病所以其症發必一
方長幼男女相氣弱為傳染與厲疫同稟氣旺者雖感重
邪其發亦輕稟氣弱者即感微邪其發亦重第人肺主一
身之氣肺主皮毛脾主肌肉肺開竅於喉鼻氣通於天
氣受邪之時從口鼻而入於肺脾發必由肺脾而出於肌
表當厲毒發作之時熱淫之氣浮越於肺脾而於此必
現咽喉腫痛鼻塞噴嚏咳嗽等症惡濁身疼痛等形此
非厲邪痧子為本咽喉痧等形為末乎今醫不究其受
病之因乃執內經諸痛屬火紅腫為熱急進寒涼甚至用
犀羚石膏金汁黃連等味稍兼辛涼表散以為雙解之法
體質強旺者幸藉元氣充足或以敵邪致愈稟之單弱者
平易方卷四 痧疾 二百八十五

即變音啞喉腐氣喘腹瀉齒鼻流血舌縮唇焦膚乾無汗
發厥口噤種種險欵醫家見之猶曰病重藥輕更以寒涼
倍進必致痧毒內陷燔灼愈騰喉閉痰升命歸泉路要知
頭面紅腫喉赤正痧毒外達之勢當此之時需進表散開
達之劑寒涼清膩等藥一味不可兼雜使其痧從汗透則
其毒自然不留其毒既洩吧喉豈有不愈所以先賢諸敗
毒散中皆用表散亦同此意命名也余非業醫者因從前
子女慘遭其害爰是潛心醫學究研歲運司天數年以來
稍悟一班凡有親友患此者商治於予皆以表散開達為
主直待痧回腫退鼻有清涕遍身作癢脫皮方進涼血清
解之味糜不應手速效近見燕杭此症盛行殞命者不少
予仰體
上蒼好生之德敢將一得管見佈告四方並非立異忌能
眩玉求售惟冀醫林高士藥業仁人鑒予微忱勿加訕詈
則患者幸甚余亦幸甚

論症

一凡形寒壯熱咽喉腫痛頭疼體痛咳嗽胃悶鼻塞嘔惡

兩目汪汪手足指冷脈來濡數或現浮數此即驚邪痧
症需進後方荆防葛根湯兩三劑俟其暢汗痧透點至
足心舌有楊梅刺方進辛涼清解之味總之痧慎於始
若有一毫胃臆未清便是痧疹未透不可早進寒涼還
伏以至不洽
凡痧疹欲出未出之時宜早為發散以解其毒則無餘
患若不預解使之盡出或早投寒涼遏伏多致毒蓄於
中或為壯熱日久枯痺或成驚癇或為瀉痢或為咽喉
腐爛咳血喘促或作浮腫疔蝕而死此雖一時戾氣之
染然未有不由於人事之未盡也
一凡痧疹遂巡不出者乃風寒外束皮膚閉密也宜荆防
葛根湯主之外用芫荽酒苧麻蘆酒夏之咽喉如有腫
痛腐爛者宜合玉鑰匙散吹之
一凡形寒發熱面若裝珠痧不出肌即現上吐下瀉腹痛
如絞甚至發厥口噤目閉神昏此乃內挾溼滯痧穢外
感戾毒暴寒折伏表裏為病陰陽不通最屬危候每至
朝發夕死不能過兩三日者若投寒涼清解如同操刃
急進藿香正氣散撤去大棗加煨葛根牛蒡子蟬衣焦

麵等味兩劑得暢汗吐瀉厥止痛停痧得熨赤扶過
三日庶無妨礙但此症吐瀉之後津液大傷必然發渴
思冷切勿與吞冷水甘蔗水梨一切寒涼之物切忌切

一凡痧疹已出而復沒者乃風寒所遏而然若不早治毒
必內攻以致喘急音啞而死急用升麻葛根湯加荆芥
牛蒡子桔梗蟬衣櫻桃核浮萍草枇杷葉等熱服外用
芫荽酒芩麻醮酒曼之痧疹復出喘止乃可無虞倘體
質單弱不能透達者需用透邪煎或柴歸飲發之如進

二湯仍不熨赤者急進托裏舉癘湯
一凡痧疹只怕不能出若出得暢盡其毒便解故治痧疹
者貴慎於始發熱之時當察時令寒暄酌而治之倘時
令嚴寒即桂枝葛根湯或麻黃湯俱可用勿拘辛溫遲
疑二湯內俱加入牛蒡子蟬衣桔梗發之如時令大熱
以升麻葛根湯加生石膏二錢亦可倘時令平和以荆
熱火亢熾稍加生石膏二三錢亦可倘時令平和以荆
防葛根湯加浮萍草發之務使發得透暢莫使其絲毫
遲遲至生變幻纏綿痧後切忌大葷海鮮酸鹹辛辣之

物以杜後患切囑切囑

葛根強壯者錢半牛蒡子三錢桔梗錢制芥錢蟬衣錢
枳殼錢象只錢半白杏三錢仁錢勿生草防風錢
加枇杷葉浮萍草各三錢
玉鑰匙散如黃藥珠等名二分

珊砂錢吹藥須用新項銀罐先翻後晒層層間煉如
昇格馨之狀鬆脆為貴置冷地出淨火氣研極細末
再加蠶蚕冰片如此修合庶不致弱體吹之作瀉

蘇葉錢上養梗錢桔梗錢陳皮錢茅朮少錢厚朴錢半
甘菝錢十勞子炒錢赤茯苓錢焦麩錢半麩錢半
煨葛根錢蟬衣錢
升麻葛根湯
丹麻葛根錢赤芍芩荊芥錢牛蒡子炒錢桔梗錢
蟬衣錢櫻桃核錢浮萍草錢生草錢
透邪煎

當歸錢防風錢荆芥錢白芍錢煨牛蒡子炒升麻錢
炙甘草炒蟬衣錢

當歸錢柴胡錢白芍酒煨荆芥錢牛蒡子炒炙甘草

升麻錢柴胡錢當歸錢白芍酒炒白芷錢穿山甲錢

防風錢浮萍草錢炙甘草

用芫荽兩許酒水各一碗煎滾以苧麻根蘸酒夏之

用蘿蔔汁碗許雄黃玄明粉各一錢研細末調入咽喉

腐爛者以羊毛筆蘸汁洗掃之不腐者漱喉吐去老痰

然後吹藥
附錄經驗良方
刑曹案廣被毆後以傷風死者保辜限內於律不能

不擬抵呂太常合暉常刊秘方以荆芥黃蠟魚鱉三味
以魚鱉炒黃色各五錢艾葉三片入無灰解一碗重湯
煮一炷香熱飲之汗出立愈雖百日切不可食雞肉後

其子慕堂登庚午賢書以為刊方之報也
小兒誤吞鐵釘刺新炭皮研為末調磁三碗與小兒食

之其釘自下
此方見蘇沈良方蘇沈者蘇東坡沈存中也此書世無

傳本惟永樂大典中有之紀曉嵐先生校四庫書得之

適其孫誤吞鐵釘百計不效以此方試之果炭屑裹釘

而下
凡人身佩漢玉古玉可避瘟疫瘴厲一切不正之氣出

本草綱目
雲間鐵山朱氏手書

武進莊一夔著

治慢驚風心得神方

慢驚之症緣小兒吐瀉得之為最多。或久瘧久痢或痘後
 疹後或因風寒飲食積滯過用攻伐傷脾或乘賊本虛或
 慢服涼藥或因急驚而用藥攻降太甚或失於調理皆可
 致此症也。其症神昏氣喘或大熱不退眼開驚搐或乍寒
 乍熱或三陽晦暗或面色淡白青黃或大小便清白或口
 唇雖開裂出血而口中氣冷或瀉痢冷汗四肢冰冷並至
 腹中時响喉內痰鳴角弓反張目光昏暗此虛症也亦危
 症也俗名謂之天吊風虛風慢脾風皆此症也若再用寒
 涼再行消導或用疝星抱龍以除痰或用天麻全蝎以驅
 風或用知柏苓連以清火或用巴豆大黃以去積殺入如
 反掌實可畏也若治風而風無可治治驚而驚亦無可治
 此實因脾腎虛寒孤陽外越元氣無根陰寒至極風之所
 由動也治宜先用辛熱再加溫補蓋補土所以敵木治本
 即所以治標凡小兒一經吐瀉交作即是最危之症若其

屢作不止無論痘後疹後病後不拘何因皆當急用參朮
 以救胃氣不惟傷食當急救之即傷寒傷暑亦當急救之
 蓋其先雖有寒暑實邪一經吐瀉業已全除脾胃空虛倉
 廩空乏若不急救恐虛痰上湧命在頃刻矣庸醫見之皆
 誤指為熱為食投以清火去積涼藥立時告變為之奈何
 與其失之寒涼斷難生。活不若失之溫補猶可救療此語
 發明吐瀉驚風之理最為明透後之君子願無忽諸今將

- 一 慢驚吐瀉脾胃虛寒也
- 一 慢驚身冷陽氣竭過不出也
- 一 慢驚鼻孔煽動真陰失守虛火燦肺也
- 一 慢驚面色青黃及白氣血兩虛也
- 一 慢驚口鼻中冷氣中寒也
- 一 慢驚大小便清白腎與大腸全無火也
- 一 慢驚昏睡露睛神氣不足也
- 一 慢驚手足抽掣血不行於四肢也
- 一 慢驚角弓反張血虛筋急也
- 一 慢驚乍寒乍熱陰血虛少陰陽錯亂也

一 慢驚汗出如洗陽虛而表不固也

一 慢驚手足痠痿血不足以養筋也

一 慢驚身雖發熱口唇焦裂出血却喜飲冷茶水以及

所吐之乳所瀉之物皆不甚消化脾胃無火可知唇之

焦黑乃真陰之不足也明矣

大凡因發熱不退及吐瀉而成者總屬陰虛陽越必成慢

驚并非感冒風寒發熱可比故不宜發散治宜培元救

本加薑桂以引火歸源必先用辛熱沖開寒痰再進溫

補方為得治經驗二方列後

伏龍肝三兩丁香研末炮薑錢胡椒研錢肉桂研錢或

右五味煎一酒杯灌下吐瀉立止按服後方定獲奇

效

熟地錢當歸三錢不吐在把錢多黃肉六錢枸杞子錢

炮薑五錢條芩錢炙甘草錢棗仁錢肉桂錢五味子錢

補骨脂錢白朮錢

生薑三片紅棗三枚胡桃一箇打碎為引仍用龜心

土一兩煮水煎藥取濃汁大半杯加附子三分煎水

攪入諒兒大小分數灌之如咳嗽不止者加薤殼一

錢金櫻子一錢如大熱不退加白芍一錢泄瀉不止

加丁香六分只服一劑即去附子只用了香七粒隔

二三日只用附子一二分蓋因附子太熱中病即宜

去之也如用附子太多則小便閉塞不出如不用附

子則沉寒臟腑固結不開如不用丁香則泄瀉不止

此所謂神而明之存乎其人用者審之此方乃救陰

固本之要藥治小兒慢驚稱為神劑若小兒吐瀉不

寧已甚或微見驚搖胃中尚可受藥糜乳便利者並

不必服逐寒蕩驚湯只服此藥劑而風定神清矣

如小兒尚未成驚不過昏睡發熱不退或時熱時止

或日間安靜夜間發熱以及午後發熱等症慈屬虛

陰均宜服之若新病壯實之小兒眼紅口渴者乃實

火之症方可暫行清解但果係實火必大便閉結氣

壯聲洪且喜多飲冷茶水若吐瀉交作則非實火可

福幼編

知矣此方補造化陰陽所不足實回生起死有神功倘大虛之後服一劑無效必須大劑多服為妙

幅幼編 凡例

此編專以溫補見長凡小兒既成慢驚必於後開條目內有數處相合者即放心照方服藥勿謂此書與古方疎風散熱之藥不同仍泥用古方以自誤也
此編乃獨得之奇實發古人不傳之秘但天下之大凡小兒患此症者待命殷諄是以任憑有志活人者翻刻廣傳實治郵願
近時所賣之抱龍牛黃等丸皆疎風化痰之藥急驚最為對症若慢驚之甚者下喉即死
急驚與慢驚全屬相反急驚之症當其驚風大作喉中多有熱痰用抱龍等丸下喉即醒再用清熱消導之藥一劑而安慢驚乃係寒痰虛風非逐寒補腎如何能愈古人每以一方治二症未究其致病之根源若不分急慢虛實施治為禍匪小
近代醫家皆云驚風一症先須鎮驚開竅往往用硃砂

及金銀器物煮水仍煎清熱散風之藥所以愈治愈危從未聞治愈一人良可歎也

小兒病篤不免求神問卜而星上替者必云某日可服藥某日服藥無效或云有鬼祟等語但慢驚之症實因虛極生風非速加溫補不能奪命遲則愈難望即速依方服藥切莫遷延

海內醫書未可枚舉諸子雖各執一見議論紛陳然失之於此者仍得之於彼惟慢驚一症自古沿今相承錯謬殊堪扼腕是以此編專辨慢驚一症與各書不同倘有經驗之方稟不列入恐反覺舉一漏百且為字不多俾為善者易於翻刻

凡為善濟人及有一切陰騭者子孫當得福報倘能將此書翻刻廣傳使天下後世活人無窮又非尋常陰騭可比其翻刻為善者之子孫更不知當如何昌盛費甚小而功甚大何不為此

此編既得一知半解可以活人寧敢隱而不宣况小兒諸病之後均能轉此最為幼科第一危險之症業於姑蘇中州等處付梓矣第恐世遠年湮沉淪滅跡為之

奈河惟望四方仁人君子既刻焉復與坊內商之使其附刻於行世各醫書之尾方得遍傳且可免埋沒之

福幼編

世之醫者委云小兒無補法只此一語禍延靡窮夫小兒藏腑柔嫩經脈未充易於受邪而人之未深偶遇身熱惡食積為和解足矣乃醫者始必羣聚煎風消剋之藥重劑雜投不應則繼以沉寒固冷殊不知風藥多則陰血受傷而多汗亡陽氣亦隨耗再用苦寒傷胃俾陽明無司運之權而太陰亦天傳送之度以夫充之經脈柔嫩之臟腑受此無窮之消伐慢驚風之所由致端在是也當此之際尚不可不思補偏救弊之法猶謂那未盡而熱未除必驅之萬無可生之路而後已殺人壽手未刃慘於此者至慢驚風一症亦有無所因而發者此根於賦稟本虛陰陽失互相生長之機漸形歇絕之狀惟審其偏勝力為補救庶幾十得一二耳若猶以外因治之縱使稍為和緩致病之由捷也今讀毘陵莊在田先生福幼編其言慢驚致病之由則究本窮源治則絲絲入扣立方則審其陰陽之辨而直

