

門 武 9
編 608
卷

重刊長秋

小兒初生

驚癇

疳

小兒諸病

痘瘡

麻疹

婦人產前

產後

婦人諸病

傷寒

中風 并瘧

中暑 附霍亂

瘧

黃疸 附黃胖

症 附破傷風

脹滿

痢 附泄瀉

痛風

淋疾

附轉胞遺溺

肺痿肺癆

腸癰

痔 附脫肛

血症

蟲症

諸雜方

疼飲 附嗽嘔

嘔吐

積聚

疝氣

大瘡

奇瘡 奇疔

湯火傷

疔病

反胃

噦

心胸痛痺

脚氣

癰毒

金瘡

走獸傷 附諸中毒

脾胃

噎隔

癩癩 附在

發熱

水氣

輕瘡

跌撲 附竹木刺

口咽喉

耳病

鼻病

眼病



千金曰小兒始生其氣尚盛若遇疾病即須下之不及時則必成別症

千金曰兒初生以綿裹指拭口舌上青泥惡血謂之玉銜若啼聲一發即入

腹成百病矣身見也○陳文中曰黃連甘草百沸湯泡拭兒口用朱砂○徐春甫曰以綿帛裹指蘸甘汁拭口次用黃連少許同甘草煎拭口今昔連湯今之無大害也

千金曰斷臍時若按汁不盡則令暖氣漸微自生寒令兒臍凡斷臍法不足信只此一語不可忽也

千金裹臍法雖不容取無妨按臍後宜用尋常所用治臍濕之藥并裹臍之法也

千金曰浴兒者以猪膽一枚取汁投湯中以浴兒不患瘡疥勿以雜水浴之兒生三日

宜用桃根湯浴按赤木玄珠曰三日浴兒俗禮也倘兒生脆弱逾十數日或半日亦無害此言最得之○按大抵尋常之兒初浴後七八日或十餘日而無病可後浴夏月異也

幼書載集驗方滿月產婦與兒出新頭以生油杏仁臍粉擦頭去凡邪不知可否

按本初之俗兒生七日始剃頭此法不可取蓋尋常兒生七八日脆弱三日又四五日亦可

千金曰兒衣綿帛特忌厚熱慎之慎之肌層未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱可信也

按兒胎氣實者慎勿厚暖衣帛過度則遠助胎熱裏五樹特而為諸病初俗好以綿貼臍中

大不可也頭顱諸陽之會也兒之始生其氣尚盛用此等事之為微治以廣通可然胎寒之者不抽於此

兒衣忌厚熱

剃頭法

浴兒法

裹臍法

斷臍

初生戒灸

下胎毒論

數道無乳
鎖肛
初生不乳

千金曰：新生無疾慎不可逆針灸之。如逆針灸則心驚動其五脉，因毒成痼，惟陰癩瘰癧可針灸之。凡灸癩瘰癧，先下鬼使，虛乃承虛灸之。未下有實而灸者，氣通前後不通，殺人。按鬼使賦云：其氣孔感者，雖北方絕不可灸。脆弱者，四肢厥冷，喘聲不出者，禁浴外施灸，焮肉根，參附以挽回陽氣。地之寒濕之毒不可取。

古方書有兒始生落草服永粉朱砂黃連甘草薑汁牛黃猪乳臍蒂等下胎毒之法。○按胎生下胎毒為急務也。若失下半年歲或週歲有胎毒沉痼於腸胃間為疳者，一灸則不可治也。下毒之方紫丸固不可欠，兼胎熱者硝黃亦為得也。

可割破之，或可散脫血不止者死。○鎖肛以紫丸硝黃等或用蜜道乎。

不乳有三類：下惡血入腹，心腹痞滿，短氣不能吮乳者。○母取冷過度，氣入胞，免着冷不肯飲乳者。是為胎寒，亦名難乳。○有初生受風，鼻不吃乳者。○此皆先倍所說也。又別有一症，非毒非熱，稟受純虛，真元不足，而食本無力不能吮乳者，是為胎怯，最危急，投參附以峻補元氣，則或幸而得乳矣。

撮口有
撮口瘡

初生腹痛

變蒸

癩症

真癩凡癩之撮口不治也。胎毒之猶或可治，投疎利之劑通腸胃，澀澀可也。按今世醫者見此症者，其法不一，或投以寒藥，或投以熱藥，皆非其法也。

如撮口故名。○胎受穀氣，心脾熱，氣塞於口。○又有一症，孫奎所謂撮寒瘡，準不效。口中白漫，口中焦虛而熱，不得下降也。此是為虛陽上攻，此症稟賦脆弱兒多有之，不容考胎熱用。有冷氣在腸胃，腹痛宜溫胃降宿冷。○顧願經曰：初生小兒至夜啼者，是有瘀血腹痛。法宜疎利。

張介賓曰：小兒變蒸之說古所無也。至西晉王叔和始一言之，繼自隋唐巢氏以未則日相傳，演其說益繁，然以予觀之，似有未必然。○薛氏曰：此證小兒所不免，無生可。○按胎盛也，何以知之以脆弱兒少，此證也。治法可微下劑中魚施參表。

癩 千金曰：病先身熱，刺手癢，驚啼叫喚，而後發癩，脈浮者為陽癩，病在六腑外，在肌膚，猶易治也。病先身冷，不驚，刺不啼呼，而病發時脈沈者為陰癩，病在五臟內，在骨髓，極難治也。病發身軟時醒者謂之癩也。身強直反張如弓，不時醒者謂之瘰也。○按治方陽症空參表為先，隨症涼瀉，陰症空溫補。瘰多太方脈家所傷，寒者同之，較早。

寒涼

嘔吐

吐有多端最為難治者胎毒吐之症也此症先備所未言初生胎毒不盡毒氣沈痼於腸胃間或數月或周歲一感時氣忽然嘔吐荏苒數日元陽虛脫成陰痼此最危篤十中不救一遇此症當其病元氣未虛之時須以瀉法疎滌腸胃中之痰滯幸而而治者百中之一二耳此症下固死不下亦死是以其用瀉法豈不愈於拱手而待斃乎○疳疔以上為勞疔以下為疳疔名異症一轍疳疔能生蛇瘻凡生後六七日腫子成能咳笑應和人百日任脈成能自反覆百十日凡骨成能獨坐二百十日掌骨成能匍匐三百日臑骨成能獨立三百六十日膝骨成能行此其定法若不能不能依期者必有不手之處今全曰小兒新生無疾慎不可逆針灸之如逆針灸則忍痛動其五脉因喜成痼惟陰痼疔可針灸之凡灸痼當先下見使虛乃承虛灸之未下有實而灸者氣逼前後不通殺人

灸法

疳疔

生不成立煩針

懸壺容忤

千金引小兒懸壺方論曰凡小兒所以有懸病者是婦人懷娠有惡神導其腹中胎垢嫉他小兒令病也懸小兒也娠婦人不必悉招懸魅人時有延年懸之為病喜微之下痢寒熱或有去來毫毛鬢髮髮鬚鬚不悅是也宜服龍膽湯容忤者是外人來氣息忤之一名中人皆吐下青黃白色水穀解離腹痛大亂面色變易其候似痼但眼不上插身其脈急數是也服龍膽湯加參歸法不兒生不作聲者此由難產少氣故也可取兒臍帶向身將之令氣入腹仍呵之至度啼聲自痊亦可以葱白徐徐鞭之即啼古法白兒齒齦上有小胞子如粟米狀以溫水蘸熟帛裹手指輕之擦破即口開便安不用服藥未知然否記以備後考小兒夜啼欲飲乳若口唇到乳上即啼而不乳者急取燈照口若無瘡舌上必腫也

不作聲

撮口

夜啼

此言治也

小兒初生

○賀川子曾曰凡赤子已生斷臍帶後須絞其汁血盡然用五倍子粉糝之以紙全裹之屈曲安臍上別用絹帶自其背纏束兒若頻啼須視臍帶大抵六七日乃褪落有經二七朝不褪者又褪後俗多灸其臍者大不可也恐小兒不堪火攻之若因登天吊撮口等之病又用其所褪落臍帶燒之存性与兒飲之以下胎毒其兒登痘疹甚少驗之屢效又已脫未登聲前肌濕者不逾三日而死又肌黃色者死又生兒七朝內有頭肉腫起如瘤其色与平肌肉不異者此蓋脫時頭為陰戶所夾瘀血結聚所致須用三稜針畧破其出色如煤其腫立消

○正宗曰胎瘤者初生小兒頭上胸乳間腫起大者如饅小似梅李此皆胎中瘀血凝滯而成雖候兒滿月外方可用針刺破內如赤豆汁則安

○產前編曰斷臍帶法見胎洗後推以軟綿拭去軟綿裹之別寸許用紙擦蘸油點火燒斷世俗皆以麻線繫約之以刀截斷之而後洗之最為不妥。以衣被覆其上於近臍三處燒斷即帶着臍者編概三寸許

○又遍身有如白屑者而粘俗之不落者取婦人之髮毛既脫者洗之即落

初生

○藏胎衣法。盛在新瓶內。以青帛裹瓶口。擇向陽高燥之地。天德月空處。掘地三尺埋之。
○又見生下。啼聲即絕。有不啼者。俗語名之為草迷。多因臨產艱難。以致兒生。氣閉。所以不啼也。急以手繫其背。使氣通則啼。又值寒氣所逼。亦不能啼。宜用熏臍蒂法。其法須急用棉絮包裹。抱於懷中。且勿斷臍。用油紙燃點火。於臍蒂下往來熏之。令火氣由臍入臍腹。則啼聲自出矣。若氣絕無生。面青甲黑。是形雖存而命已不立。安望其生哉。
○初生不乳。其故有二。腹中積惡未下。令兒腹滿氣短。嘔吐不乳。當用甘連湯。按不加黃連不効或見腹痛多啼。面色青白。宜入參湯。若四肢厥逆。須用人參湯加附子。凡初生不乳。葱白濃煎。與飲之。最有助。

○又初生眼不開。熊胆黃連。各少許。用滾湯。淬洗其目自開。
○又初生大小便不通。最為危候。與猪苓湯及紫丹。以開其結。可望生。若延至七日。謂之一臍。肚腹硬脹。常作呻吟。則難治矣。

○又初生鼻塞不能息。吮乳不得者。用瓜蒂散。吹鼻中。口鼻吐出涎沫即安。
○初生噤口之證。失治多至不救。其候古上生瘡。如黍米狀。吮乳不得。啼聲漸小。須用大柴胡湯。若肚腹脹硬。二便不通。宜用紫丹。又有一種。口吐白沫。牙關緊急。生南星。龍腦。研為極末。用指蘸合生薑汁。放大牙根。擦之立效。如口不開者。吹入鼻孔。次用

辰砂五全蠍三硼砂三龍腦麝香各一研為細末。用乳母唾調。抹口唇裏及齒上。中病即止。又口撮如囊口。吮乳不得。右強唇青。面黃赤。其證為危候。腹滿便結。須用紫圓。身熱多驚。宜大柴胡湯。俱用辰砂五僵蠶一蛇脫皮一麝香五研為末。用蜜調敷唇口。或氣高痰盛。或手足抽搐。俱當詳證治之。固難藥論矣。若更口吐白沫。四肢厥逆。虽有神丹。終屬無濟。

○初生洗浴不可久。洗後能去臍濕為要。勿令尿濕浸臍。如不知慎。遂致肚臍浸漬不乾。名曰臍濕。須以龍骨枯礬各一香一研為細末。敷之臍中。鹿角燒為末。敷之亦佳。甚則燉赤成瘡。名曰臍瘡。須以黃連二胡粉龍骨各一為末。敷患處。庶不致濕氣內攻也。

○嬰兒毒在腹中。無所容浮。故痛。又伸引。睡臥不寧。努脹其氣。衝入臍間。所以臍忽腫赤。虛天浮光。名曰臍突。外以赤小豆。豆豉。天南星。白斂。各一為細末。用五分。芭蕉汁調。敷臍四旁。日二次。內須用甘連湯。及伯州散。其腫自消。

○又見臍中痛。曲腰不乳。臍雙眉者。名曰盤腸氣痛。內服小建中湯。外用豉豆豉。生薑各二。葱白五食鹽一同炒熟。置臍上。熨之最佳。

○又見喉裏上腭腫起。名曰懸壅。以綿纏長鍼。留鋒。刺之。浮去青黃赤汁。未消者。來日再刺。刺後以鹽湯拭口。用朴硝龍腦各一硃砂硼砂各五研為極末。用蜜調。蠶翎蘸搽。

初生

口內。○又見牙根腫如水泡。名曰重銀。治法如前。須用石膏黃連甘草。水煎。腫自消。

○又見舌伸長而收緩。名曰吐舌。面紅煩躁。口渴尿赤。宜甘連湯。如不通。生地以治之。

○又見口中搖動。唇焦舌乾。煩熱便穢。名曰弄舌。宜石膏黃連甘草湯。○古下腫突。似古形者。名曰重舌。宜甘連湯。外以青黛。研砂黃礬黃連人中白。凡化硝。各一水片。研為細末。吹之。甚妙。○又有木舌。治法可推量。捺蒲黃功。

○初生偏體頭面赤。若丹塗者。名曰胎赤。宜甘連湯。○又小兒皮膚赤熱而腫。色若蓮遊走不定。行於遍身。名曰赤遊風。多發於頭面四肢之間。若歸心腹則死。宜石膏黃連甘草湯。及硝黃丸。外用破法。刺出毒血。毒甚者。用黃蘗草烏頭。各為末等分。用漱口水調敷。頻以漱口。水潤之。毒輕者。不用敷藥。在百日內者。忌用破血。用赤小豆不拘多少研為細末。用雞子清調塗患處。乾則再塗。甚效。

○又見生無皮者。有二端。父母素有梅毒。傳染胞胎。既生下。或上半身赤爛。或下半身赤爛。甚至色帶紫黑。又月久未足。生下太早。無皮赤爛。俱屬惡候。內宜甘連湯。及遺糧丸。外用石灰四兩未經水濯成塊者。用水泡之。沒指半許。露一宿。面上有浮起如雲片者。輕之。取之。微帶清水。視其多寡。對小磨香油亦如之。以順攪成膏為度。用雞翎搽之。自愈。又以黃蘗石膏各半研為細末。搽之。濕則乾。搽乾則用猪苦胆調搽。月分未足者。內服黃香桂枝五物湯。外用早

稻白米作粉。時時搽之。其皮漸生神效。

○又搗搦刺手顫。及引竄視。謂之驚風八候。搗謂肘臂伸縮。搦謂十指開合。掣謂肩頭相搯。顫謂手足動搖。反者身仰向後。引者手若開弓。竄則目直而似怒。視則睛露而不活。其搗以男左女右。手。男大指在外。女大指在內為順。反是為逆。此候急驚慢驚皆同云。

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

驚風

○千金方曰病發身軟時醒者謂之癇也身強直反張如弓不時醒者謂之瘈也此癇瘈之辨也所謂癇即聖惠方以降稱驚風急驚即陽癇慢驚即陰癇

○醫通曰小兒吐瀉之後脾胃虧損津液耗散故筋急而搐為慢驚也俗不知風乃虛象因名誤實反投牛黃抱龍等祛風藥致大枉者不知其幾大低登汗後失血後產後癰疽潰後氣血津液過傷不能養筋而然手筋惕肉跳顫振相類分氣血緩急兼補養為治庶有生理若妄加灼艾或飲以發表之劑死不旋踵矣

○搐搦掣顛及引竄視謂之驚風八候 詳於初生門

○產三月編曰見暴性熱煩急面紅唇赤痰壅氣促牙關緊急二便秘瀉脈洪數者名為急驚風柴胡桂枝湯桂枝加龍蚘湯越脾加木湯枳子蘆皮湯石膏黃連甘草湯調胃承氣湯小承氣湯半夏厚心湯茯苓湯欬或臨證三黃丸滾痰丸硝黃丸紫丹華巨擇兼用之

○又見緩之搐搦時作時止面色淡黃或青白相兼身心溫和不昏睡眼合或卧露睛脈來遲緩神氣慘澹大便青色者名曰慢驚風桂枝加苓朮湯桂枝去桂加苓朮湯或兼參熊九華

驚癇

○清人羅浮陳復正曰。小兒體脆神怯。不耐外感。壯熱。多成痲病。後世是名驚風。痲病固四出。有頭搖手勁者。口噤。脚掣。急者。皆反張者。則驚風中。別條抽掣。搐搦。角弓反張等名。以赫世人。幼科翁然宗之。病家仕之不疑。不治外溢之和。反投金石。腦麝之藥。十中十死。而不悟也。小兒驚風之名。貽害千古。在賢知且不免焉。茲約通國。共為屬禁。革除驚風二字。不許出口。務擇傷寒名家。循經救治。以打破小兒鬼關。天人共快也。蓋痲病非止一端。男婦皆有。不特小兒為然也。如太陽過經。風病誤下。瘡家誤汗。產後汗。多遇風等証。皆變成痲。然男婦病此。醫亦皆循經救治。未聞以驚風之治治痲者。名小兒上痲症為驚風。以施治者。由宗人之訛傳也。明喻嘉言闢除驚風。指明痲症之說。誠善矣。○陳復正所著幼科集成二之上有詳論

○猿頭丸 治癩癩 寒烏 霜 猿頭 霜 廣人參 肉桂 茶 右糊丸 白湯用

○癩癩灸法 大椎ヨリ龜尾マテ寸ヲ取リソレニニ折リ龜尾ヨリ當ノボセ當處ニ点ス又上下ノ点ノ真中ニ点ヲオロシ又上下ノ点間ノ寸ヲ取ニニ折リ中折目ヲ中ノ点ニアテ左右兩上下五ヶ所点ス一ヶ所五十壯ツ、二百五十壯ナリ ○按灸法不詳晰

○灸点圖

○口訣曰痲病ニ大毒ハ昆若玉ナリ鹿皮ヲ去能干シ粉ニシテ四包トナシ灸セザル前ニ包白湯ニテ可用二度ニ二度ナガラ起ル其後灸ヲナシ家方猿頭丸ヲ用ユサテアトニ包

ノセ不起者本復ノシルナリ ○按以上法不知何人試驗

疳

○小兒五疳秘方小兒疳痢晝夜數十行惡症皆備温補之諸茶盡不効者唯用之效如神
寒中ノ鳥糞羽足トモニ去ラズ腹ヲ切割テ腸ヲ去リ芥葉車前子紅花各等分又
能縫合セ赤土ヲ以テ塗リ封シ固メ粉糲ヲ用テ蒸焼スル一晝夜ニ又取出シ火
毒ヲ去リ細末シ鰾鱧魚ト同シク餌食トナス又右末ヲ煎湯トナシ肥兒丸ノ類
ナドヲ服スルモ可也 茶終

○雞肝丸 理小兒疳癖虛羸疳眼生翳赤子一切眼目或痘毒入眼者方

雞肝一頁 胡連 肉豆蔻各五分 芙蓉花六月花落者佳二分 右四味咬咀以水一合無灰

酒半合煮肝及心至水殆盡而出肝心切片、餌之日三四次以藥汁和寒
製米粉為丸服

諸症

○津田曰小兒虫癖ノ症ハ見ヌキモノ也泣テ泪ナク物ゴトニキモノイリ小
 便白ク濁ルカ或ハキラヲ見ル如キ小兒ノ通ズルカナドハ是レ虫癖ノ證ナリ
 癖トハ只腹ニカタマリノアル症ト思フズシ此症ニ疳一通リノ療治ニテハ一切
 効ナキモノナリ是淨府湯ガ、リノ積塊ヲセムルヤンハイニ療治スベシ
 虫積ニカ、ルト疳證ニカ、ツテ治スルトコ、ノアンバイヲ能ク心得ベシ去ル
 ニヨツテ腹ノ泄スル症ニ治積ノ藥蘇ニテ効アルヲ多シ予ガ日頃ノ經
 験ノ方ヲ左ニ記ス錢氏白朮散ハ虛癖ヲ治シ淨府湯ハ熱癖ヲ治シ消
 疳退熱飲ハ腹滿ノ癖ヲ治シ肥兒丸等ノ如キハ食癖ヲ治ス其外丁
 子ノ如キハ寒癖ノ嘔ヲ治シ赤蛙櫻皮蝦蟆童便香附子百部根ノ如キハ
 能ク疳ノ諸虫ヲ治スルモノナリ

○又曰スベテ小兒ハ濕熱臧油ノ物ト甘味ノ物ヲカタク禁スベシ只好キ物ハ梅干
 梨蜜柑栗ナドノルイナリ



[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, mostly illegible due to fading and ghosting.]

児


○小言曰

夏月何事モナキニ俄ニ大熱シテ煩渴シ乳ヲ吐ス微ク下利眠ニ似テ眠ニモ無リ
半眼ニシテ夢中ニ驚キ痢ニ非ス驚風ニモ非ス食傷ニモアラス是ハ名状ニマ
有リ即無罪暴熱ト云モ也 是ハ脈ヲ以テ言フ決ス脈數急ナル難治トス又
沈伏シ或ハ絶脈四肢微冷スルモ有或ハ妄語スルモ有凶候也暫時ノ内ニ顔色
憔悴スルモ也脈ノ數ニ怪ムヘキホトニセハシキハ必死ナリ 三日ヲ過スシテ死ス當日ニ死
スルハ驚風トス此驚風ニ仕ニクキモノ有初ハ葛根湯也 三黄湯大小柴胡四
逆又ハ熊胆紫圓モ其時ニ臨テ運用次第也 雜治多シ ○小児肝門ニ細虫ヲ
生シテ痒カルヲ有陰蝕虫ト云ハ非疳ノ候アリテナレルモノ也 鬲命肝俞不
容天枢ニ灸シテ其虫ハ去モノナリ度ニハナキ病ナリ

○香龍散

治遺瀉方 反鼻ナキ了香二分 右末毎服五分或モ温酒或白湯下

○一兒眼吊シ聲出ス乳哺ナク日ニ幾度モ引付三黄ヨリ大小柴胡ノ屬泉散ハ猶更
十日餘ヲ経テ一効ヲ得ス衆醫手ヲ束ヌ予風ト斯ノ如キハ癖積ナリト思イテ淨府湯
ヲ用ニ貼テ再灸セス又一女兒十二歳瘡疥内攻腫状ヲ為ス一門人之ヲ治ス赤小



豆湯ヲ与フ夜間痲ヲ發ス針灸スレハ甦ス水毒衝心ストナシテ甘遂丸又ハ楸柳
子末ヲ黑豆煎汁ニテ送下ス灸カ藥カキテ甦タリ呼吸穩ニテ衝心ノ勢ニアラ
ス少頃アリテ又灸ス前方ヲ用ルニ甦セス更ニ三黄湯或ハ紫圓ヲ投シテ甦ル間
モナク灸ス藥驗ナキ故ニ三蘊香圓赤竜丹ノ屬齒ヲ開テ灌ケル少ク甦ルニ似
テ正氣薄シ其度ニ灸ハ手足心天枢神闕章門カハルカハルニ大灸ヲスレハ通セス
其正氣ノナキ中ニモ更ニ痲ヲ灸シテ播擲スル時アリ深更ニ予ヲ迎フ前來ノ病状
如何トモスルヲ能ハサルニ彼淨府湯ノヲヲ思ヒ出セリ則一貼ヲ与フ未タ盡サルニ
甦リテ再灸セス夜明テ少正氣アリ灸痕水包痛苦スルヲ云猶前方ヲ守ルニ
小便快利腫消シテ全愈ス

○喻喜言高

小児初生以及童幼肌肉筋骨藏府血脉俱未充長陽則有
餘陰則不足故易於生熱熱甚則生疾生風生驚亦所恆有設當日直以
四字立名曰熱疾風驚則後人不眩因四字不便立名乃節去二字後人不
解遂以為奇特之病且謂此病有八候以其頭搖手勁也而立抽掣之名

以其卒口噤牙急也。而立目邪心亂搖擗之名。以其脊強背反也。而立角弓反張之名。相傳既久。不知其妄造。遇其等証。無不以為奇特。而不知小兒之滕理未密。易於感冒風寒。病則筋脉牽強。因筋脉牽強。生出抽掣搖擗。角弓反張。種種不通名目。而用金石藥鎮墜。外邪深入藏府。十中卒死。間有體堅證輕得愈者。又訛為再造奇効。遂至各守端門。雖日救數兒。不啻知其罪矣。如方書中有云。小兒八歲以前。無傷寒。此等胡言。竟出自高明。偏足為驚風之說樹幟。曾不思小兒不耐傷寒。初傳太陽之經。湯藥亂投。死亡接踵。何由見其傳經解散耶。此所以誤言小兒無傷寒也。不知小兒易於外感。易於發熱。傷寒為獨多。世所妄稱驚風者。即此也。小兒傷寒。要在三日內。即愈為費。若待經盡方解。必不能耐矣。又剛瘥無汗。柔瘥有汗。小兒肌滕不密。故剛瘥少。柔瘥多。世醫見其汗出不止。神昏不醒。往往以慢驚風證為名。而用參耆木附等藥。閉其滕理。熱邪不


得外越。亦為大害。但此金石藥為差減耳。所以凡治小兒之熱。但撤其出表。不當固其入裏也。仲景原有桂枝湯法。若合而不用。從事東垣內傷為治。毫無厚十里矣。清陳復正亦有此說。詳于驚癇門可參考。

○ 治小兒驚風 枳椇子 俗名 石一味煎 蘇 然紙屨洗鼻中

○ 治小兒龜胸 十棗湯 控涎丹 龜背葛根湯

痘

○小兒痘疹之參者ヲ用ルハ膿漿ノ厚薄ヲ見テ増減スベシ若シ參者ノ功満足
 スレバ膿漿モ必ズ満足スコト時ニ至テハ減ズルカ去ルカノ見合セハ其證ニヨルベシ若シ
 コノバヲ過テ參者ヲ多服スレバ必ズ實々ノ禍ヲマ子ク又虛寒ノ痘ニ桂附ヲ用
 ル目的ハ唇舌ヲ見ルニ在リ唇舌淡白ニメ舌上ニ滑涎アラバ正シク是虛寒ノ證
 ナリコト時桂附ヲ恐レテ用ザレバ其變反掌ニ在リ且コノ證ニ桂附ノ功満足スレバ
 滑涎モ去リ唇舌モ紅活ニ轉ズルモノナリ是ノ時ニ又桂附ヲ去テ只平補スベシ
 是虛痘ニハ參芪ヲ主トシ虛寒ニハ桂附ヲ用ル大段ノ別レ茲ニ在リ但シ虛
 痘ニモ桂附ヲ用ルコトアレバ只參芪功ヲメクラス為ノミ又實痘ニ參連等ノ
 涼劑ヲ用ルニハ名胎ヲ見テ加減スベシ其胎ノ模様白胎ガ厚クカリ其中ニ少シ
 黃地ヲ輕クメハ梔子黃栢連翹花粉ノルイ重クメハ苓連石膏ノ大劑トイハド
 モ避ザルバナリサテ又コト胎ニ少シ黒ミツノリテ津液ナク大便秘結口渴等ノ証
 アラハ大黃朴硝等ノ浮菜イカホド多ク用ヒテモ恐ルニ足ラズコト時只一應ノ
 涼菜ノミヲ用テモ實熱モルコトナク遂ニハ黑陷紫陷等ノ證蜂起メ救フコト能
 ハズ是涼菜ト浮菜トヲ用ル手段只名胎ノ厚薄ニ能ク心ヲ用テ菜ヲ施スベシ



痘

右八痘瘡始終ニカ、リタル要案ニ其要ヲ自由ニ用ル目的ヲ知ルハ脉ヨリ七層古下膿ノ厚薄トニ在リ猶詳ニ痘科鍵ヲ見テ熟スベシ津田玄仙

○^八朱巽曰痘之出形症有四虛實有^四又宜辨也形症之^四毒壅血熱氣虛血虛是也虛實之四者表虛裏虛表實裏實是也根點稠密不尖鬆色帶慘黯隱々皮膚欲出不出者名曰毒壅報點深紅漸入焦紫而灰斑疔者是為血熱灰白頂陷平痛不起者是為氣虛色淡根散或痘色与肉色無異者名為血虛身無大熱肌膚柔嫩悠々自汗者此為表虛大熱無汗皮毛焦枯喉喘氣粗面目浮腫肌肉疼痛并風寒外籠者為表實飲食減少嘔吐頻々小便清冷大便溏泄精神困倦者為裏虛渴欲飲水二便閉澀或飲易消或腹脹不欲食者為裏實毒壅血熱同表裏之實血虛氣虛同表裏之虛善治者解其毒壅凉其血熱扶其氣虛滋其血虛疎其表實固其裏虛清其裏實補其裏虛以平為期無傷中和斯良醫也

○^四又曰四節者升陽散鬱也清熱解毒也托裏行漿也補脾滲溼也痘之出也^四有生長收藏之道焉故十二日而功成此十二日之間又節之為四若始見點之時痘

點稀疏形尖圓而色明潤其落如珠顆粟粒頭面胸背俱少數從口角而起作五次出痘出熱減飲食如常神氣清爽二便無阻易齊易長而無夾症者此輕而煩不必藥也若見點稠密隱々皮膚欲出不出形積屑而色慘暗或帶淡紅漸變焦紫或連肉鋪紅大熱不退敷至四日而猶不齊此痘毒內壅火鬱不散治外陽散鬱蓋陽氣升則毒隨之而出於臟腑火鬱散則痘得盡顯于肌表內無毒則外易成功失而不治其毒不雷滯臟腑則停滯肌肉難以成功起痘之機在此一時其歸重者在陽明之標其所用者皆陽明之標藥也此際切忌寒涼使痘冰伏并遠辛熱恐痘枯涸必用清輕之劑使痘有生發之機方無變症此初一節之成法也若身無大熱肌膚燥嫩自汗悠々乍凉乍熱飲食減少精神困倦吐瀉清冷痘色灰白而不振此氣虛不能載毒外達治宜補中益氣使元氣內實自能托痘外出不致內攻若行升散則愈虛其表矣又有積熱一症二便秘澀唇裂舌坑內火亢甚而身反惡寒宜急下之以救其陰不然則身發青藍斑而灰矣然此症不常見痘至四日氣血漸分時當小長若輕而煩者則氣歸于內血附于外痘勢

痘

尖鬆大熱已退神清氣爽飲食如常二便無阻不必藥也。若初出痘毒壅鬱已行升陽散鬱而大熱不退內症疊出或痘點深紅欲變焦紫或火毒內亢致痘枯涸或生雲斑或生疔毒急宜清熱解毒治在陽明之本蓋此時表氣已和裏熱未解必使熱退十八則自能行將若不解其毒熱疎其壅滯則氣血不能交會何以成漿哉若大便秘者當少行通利使溼熱分消而火亢之患至于灌漿之時必無泄浮之憂所謂前結而後泄者也若始屬氣虛之症不宜清涼惟宜補中益氣使痘易長耳。痘至七日氣血乃虛正當行漿其治務宜補益何也以其原屬氣虛之証必重賴參耆乃可成漿縱使毒壅火盛之症亦常補托以其初行升陽散鬱次用清涼解毒中氣必然耗散又氣血外化為膿漿五臟必虛不行補托漿何由滿毒何由化若疫寒者又宜姜附溫熱之劑以助陽氣也惟肺有雷毒痘色枯燥水滄錯喉者少避參耆耳此亦初出未行升陽散鬱使毒停氣道而然其鬱毒未解者便于補托藥中佐以升散火毒未解者亦于補托藥中佐以清涼必漿濃毒

化乃為吉兆。此時已盡顯收層其主在肺不在陽明矣。痘至十日乃當收靨必從唇口先收靨後巴紅身熱盡退飲食進而神氣復乃為上吉。若漿未滿足則殼澆肉白或漿難收治宜補脾滲溼少加收斂之劑使正氣復而餘毒消則功自成矣。此四者治痘之成法也。

○ 稀疏圓整。瑣屑稠密。輕鬆壅滯。尖聳平塌。凸起陷下。

○ 唇口陽明絡也。痘瘡飯重陽明故宜先從唇口間見則知無壅鬱之患矣。

○ 朱巽曰凡見積熱形症一熱即下遲則不能斡旋三日即灰矣若其為症氣粗聲啞喘急面目浮腫舌上生苔及唇烈舌炕大便秘結毛焦皮燥肌膚大熱悉宜下之惡熱者單下之惡寒者雙解之下後裏已寬但其肌熱不解或泄浮未止或痘不現並繼以升陽散鬱若下後內外皆鬆解而痘出快者不惟忌升散亦不必清熱解毒也此積熱之症若初失下竟與升散其死誰救與原非積熱之症既行升散之後四日之間仍有煩燥悶虬渴飲不食唇腫腹脹或大便秘結或泄青黃汁水外則身熱乾涸痘色焦紫四五

痘

日以涼膈加蜜下之以救陰氣六日之上好行補若四五日間便秘失下七日定
 變泄瀉而灰既曰先泄後結先結後浮蓋謂脾經溼熱之毒內囑而未解
 耳又小長用芩連者蓋因火毒燥血亦下以救陰也又特為劑之輕者耳
 頭面浮腫者屬太陽面目壅腫者屬陽明兼惡寒者屬太陽太陽用太陽
 標藥宜輕陽明用陽明標藥宜重疹起于標時外輕者升散之外重者吐越
 之小長時略下內攻者死痘前泄者屬太陰毒解痘前驚者屬陽明鬱散
 鬪喘屬虛寒憂牙屬實熱○凡痘後餘症但看原濃之豐約何如果豐也
 今之為症是虛宜補益果約也今之為症是熱宜清解外剝者形敗內
 攻者氣敗形氣俱敗生機息矣豈可岐為二端而云失于解成內攻失于
 補成外剝乎痘之形色既惡無生意矣但神清氣爽能食便調此毒壅
 肌肉未出皮表也痘之形色既善矣但內症疊出者此毒已盡出肌肉內
 無壅滯矣所以有內症者非擊動風疾亦新傷之所致不可作凶論
 ○封眼在六日半 鍵

○發熱一二三日當解表托裏使其易出亦有氣弱而不能出者當微補其
 氣氣和則出快切不可用著恐脹理一密則痘難出也四五六日以清涼解
 毒為主使其易長清涼則無血熱枯燥之患解毒則無壅滯黑陷之
 虞七八九日以托裏排膿為主治法當溫補氣血使其易成膿十一與十二三
 日以收斂清利為主大和氣血補脾利水使其易靨此始終之大法也雖
 然常者可以而變者不可必當隨時參詳凡見紅點之時如痘輕少不可過
 表後此恐成斑爛或乾紅色此紫急宜疎利不然後此必成黑陷毒未盡出而
 而清涼使痘凝滯而難出熱未盡解而溫補則毒鬱蓄而難靨故三日
 之內出至足心為齊苟未盡出于解毒之中宜兼發散若專于寒涼則痘
 遲滯不出七八日之間毒未盡解于溫補之中又兼解毒若偏于燥
 割則毒盛不能靨十一二日之間漿未滿足必大補氣血略兼解毒若不然
 恐有癰毒疔疔之患此變通之妙要在隨時制宜也 鍵

○從唇口見者痘必輕從額額耳輪見者痘必重 鍵 ○辰口陽明絡也痘
 之標在肌肉本在陽明故陽明之絡先見為順而於他部先見為凶也以其
 本經鬱甚乃越經而出也急宜重散陽明之鬱庶可變重為輕 鍵

痘

痘之行漿無分寒熱虛實俱宜補托以其氣血外化為膿漿臟腑空虛故也今有行漿之時少服參耆反增煩悶氣血既化為膿漿豈不怒不可神者乎所以不受補者以其火毒未盡解也故服參耆反增火邪而增煩悶也又或陰血虛涸不能配于陽氣復進參耆以助陽痘血愈涸而煩悶增也一空清火一空養血繼以補托庶免餘患鍵

○一發熱頭面中有大頭數點餘痘不出復不除熱此名報痘須急剔下破否則顧敗正氣鍵

○痘初出時凡三五相連者必密單見形者稀毒之淺深于此亦可預決鍵

○痘初見人中左右者甚重如粒大色潤者不妨人中內見多者亦重一見點若臍若肛門四圍成堆者皆重症也一初出即發數粒于山根上者重同

○又有初出愛人皮薄光亮一二日即長大是未至而至厲氣使然也後必衰痒塌而死鍵

○痘至四日理該易方若毒甚未除何敢輕易惟加人參四五分足矣此名喚漿法鍵十神解毒湯條下

○凡痘出三日後先見者先起脹後見者後起脹根紅頂白面與目漸浮腫鼻塞流涕口角流涎兩眼朦朧不欲開順候也即不然兩腮間有一二起脹

慌目頂白根紅亦順候也鍵起脹條

○凡起脹時色焦紫者毒盛也形大皮薄而起縐紋者毒盛氣虛也滿頂紅者血滯也滯者治之焦者清之氣虛毒盛補而兼解之但面部有二悅目可愛用藥當節則枯者潤薄者厚而生意自沛然鍵

○痘至五日而內外症平空皆起發不退紅正氣虛也本方倍人參加黃耆其紅自轉古人以此為喚漿法鍵

○又四日起脹大駛亦非吉兆何者表虛毒甚也七日後腫退倒靨皆此症之衰遇此須分虛實預防之鍵

○當起脹時有一等光活可愛嬌嫩艷觀手捧之則破燈照之如琉璃此假脹也又名空歡喜急救表或可幸活不則必癢塌而死鍵

○如五日即帶黃色此假漿也請以神彩辨之有神有彩者為真漿此則無或補或瀉惟古是準鍵

痘

痘出七日陰中之陽盡發于外內則空虛如鍋中甕內之氣妙不可言
陽起一分陰亦長一分故其漿宜漸黃根紅暈亦宜漸緊如一線周
匝不鋪散不灰暗晝夜痛楚飲食倍常二便少身微熱吉症也反
是者逆至此而決生死惟視血暈散膿色真偽耳真者實色
燁々手捏粘絲偽則土黃色聚者氣拘血而化毒也散則氣虛散而
無華氣將竭矣血暈全無者死○膿者毒所化也六日後專看膿色
故有膿者生無膿者死使或有或無而根脚不紅或連肉灰紅作癢煩
燥目閉復開作瀉乾嘔不食少睡氣虛不能拘血化毒也急峻補之倘
此時舌見黑苔有刺生意絕矣不惟不容補即補之何益乎將行至
七日腫要過頸漿要過胸腫者毒外出也言過胸者從上下也至陽物
亦要灌陽物宗筋之會也兩脚不灌不妨又兩手臂亦宜滿不然臨
收時必不食而生衰手臂脾所主也○痘至七日忽大瀉者氣陷也急
以駐公車補澀之若漿色正而根血一線緊繞定雖瀉無事漿色
不正根盤不化血散不斂毒在內也七日而毒在內如命何

鍵

○八九日漿行似足忽眼開而陷毒內攻也內攻者必悶虬煩燥根暈飛
散若無是而唇舌潔淨本方加桂附治之唇燥舌赤本方加芩連
解毒治之

鍵

○又八九日有一等土黃而硬者醫往往作正漿痘目之不知此為陰陽失政
致將水注于中板膩或塞而黃硬也俗呼曰板黃痘須急審舌救之古
人云珠不在大在乎體之明漿不在足在乎色之正土黃者黃而無彩也
灌膿發泡氣過盛也本方加白木茯苓滲泄之擦破水出者敗草散掩之
○七日而躁虬不寧換破即乾萬不救一何者痘以七日為界七日前氣血外
行七日以後氣血內入外行時尚不欲留毒初內入時乎故七日後躁亂者
毒內攻也毒內攻者必死○凡灌膿時額上如湯泡皮肉盡赤而乾者死
諸痘總灌而兩唇先黃硬者死擦破無膿血者死擦破而瘡痕隱
然有生意穢氣觸也不當作死症論
○痘至十日毒氣解矣膿亦轉黃色作蒼蠟矣元氣實者靨必循次
而結如角與陽物先結正收也身漸輕快腫漸消解眼朦々欲開食

痘

倍常便如故從上至下逐漸收靨結痂後色紅可無慮矣如結靨
時身忽發熱亦不必慮乃蒸漿作靨也○凡一時靨盡或靨即落者毒
燥也急宜解之此症必膿未充足如聲啞煩悶喘促不食死期迫矣否則
必發癰毒始解○又有當收不收者痘至十日正結靨之期靨而不靨非氣
虛必血熱也氣虛本方加參耆丁桂血熱本方加苓連解毒氣虛血熱視唇舌
紅不辨之亦有時令致然者時寒用溫劑以斂之時熱用清劑以解之○當結
靨時而渴飲無休津液竭也本方加麥門五味渴甚下瀉尤甚者難治凡
渴切忌利小便便愈利渴愈甚矣戒之○凡不及期而眼開者重輕則不
拘又過期而眼不開者亦重十二日者眼開期也○九日十日半靨而不靨而
作瀉者不必慮乃陽氣內回非貫膿時比也本方倍白朮茯苓治之切忌澀
劑不知誤用後必不食而作痢○二十三日形有如火燒烟燻者生死最難決
若音不清食不入破處乾枯煩亂不寐死症也音清能食睡臥安寧肥破林
滿神靜氣爽生症也又當分虛實治之唇舌潔淨溫補清解之唇燥舌苔
便秘單解之解而苔去惟用和平之劑斯攻補兩盡矣

○凡當靨時而流漿不止過表故也然亦有飲水或靈淫致者兩者皆本方倍
朮茯苓加蒼防燥之或腐爛而和皮脫去者倒靨也本方加參耆丁桂
主之破者復灌消者復腫空處復出一層藥之功也俗呼名翻空痘逆痘有
此乃吉兆也○痘至結靨未有不作臭臭者但腥臭者佳尸臭者死全無氣
臭知有餘毒也須解之○額與足遲靨者不必慮獨陰獨陽也額與足先靨
者重陰陽反悖也○謂十日而補脾滲溼蓋痘之常也至于危險之症此時
作膿窠者有之若不察而槩用苦寒得無謬乎昔人有曰當補者補當瀉
者瀉不泥于書不滯于俗始可以寄人軀命旨哉言也

○收靨漸結漸落色明而厚順也或粘肉不脫或嵌入肉中或生粘半揭或
痂畔有衣或薄如竹膜色煤黑者險也有虛實有寒熱實而熱者連翹
飲主之虛而寒者本方加耆參肉桂治之治癢色亦然癢紫紅者實也粉
紅者虛也粉白者氣血衰也氣血衰而服藥不轉者成
○痘後出癩名癩蓋痘落發此吉兆也不可作尋常癩癩治止許疎凡之
劑加菊翹一二品足矣治丹與隱疹亦然

痘

○ 醫後諸症不能采舉大都惟看前此得膿之豐約何如果豐也則症屬虛

○ 文政三浪年二月九日

西九杯淨痘瘡法見点云為大金經法教

淨痘瘡法治定 ○ 十一日 淨生齋 益淨煩痘帝法起卷王時久介

度之而大便通之 益淨煩痘帝法起卷王時久介

今日淨菜方十神解毒湯加石膏大黃法轉方之 益淨煩痘帝法起卷王時久介

淨前方 ○ 十三日 益淨煩痘帝法起卷王時久介

淨轉方之 ○ 十四日 益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

痘

○ 醫後諸症不能采舉大都惟看前此得膿之豐約何如果豐也則症屬虛

○ 文政三浪年二月九日

西九杯淨痘瘡法見点云為大金經法教

淨痘瘡法治定 ○ 十一日 淨生齋 益淨煩痘帝法起卷王時久介

度之而大便通之 益淨煩痘帝法起卷王時久介

今日淨菜方十神解毒湯加石膏大黃法轉方之 益淨煩痘帝法起卷王時久介

淨前方 ○ 十三日 益淨煩痘帝法起卷王時久介

淨轉方之 ○ 十四日 益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

益淨煩痘帝法起卷王時久介

○加減連翹飲 香川 歸翹芍柴芩通旁甘
○加減潤燥湯 同 治痘後咽喉腫痛或口舌生瘡或目赤腫痛者
歸堯芍連芩果通薄竹甘

活幼心

法○痘胎毒也○虛實寒熱之辨 諸病有虛者元氣自虛也
宜補也痘疹有表虛有裏虛亦元氣虛也宜補也此其相同者也
諸病有實者邪氣實也可瀉也痘疹有表實有裏實此則元氣

完固而毒氣不能為害不可瀉亦不必瀉也此其不同者也諸病有虛
之甚者陰有餘陽不足則寒自虛生宜溫熱之劑補之也痘疹有虛
之甚者亦陰有餘陽不足而寒自虛生亦宜溫熱之劑補之也此其相同
者也諸病有寒自外入者外感是也當其在表宜發散之久而入裏則鬱
而為熱宜清解之痘出而風寒外籠宜溫而散之或外寒入內而為吐
泄諸症亦宜溫之而已外可發汗內不可清解也諸病有虛熱者元氣虛津
液竭而火從虛中起補之則熱自除也不必解熱也痘疹亦有虛熱者
元氣虛而毒氣肆也當以補元氣為主而畧兼解毒可也三者皆同而有不
同者也諸病有實熱者血氣未虧而邪氣壅盛單用寒涼瀉之可也痘
疹亦有實熱者稟氣強血氣盛而毒氣亦盛亦單用清涼解之可也
此又其相同者也矣○氣血之辨 蓋氣體天而親上血體地而親下痘之出

初發熱至症出
齊教日內調治
法

也其高起也。痘夫白潤氣之位也。其四暈根脚紅活血之位也。若虛宜補氣血。虛宜補血者通頂紅色成血痘者氣虛血忘行也。宜大補其氣氣充則轉白而不可補血。蓋陽不能從陰陰愈長則陽愈消也。其有血虛者多由胃氣損傷元氣不足所致。蓋陰必從陽陽生則陰長也。明醫雜著曰血虛而用參者以補氣則陽旺而陰血愈消甚矣。按不可也。蓋痘瘡以胃氣為主則補血必先補氣明矣。○

加味升麻葛根湯 發熱之初其或增寒壯熱頭痛壯熱頭痛咳嗽鼻流清涕者多因於外感不可不發散也。當視兒強弱而用藥。發汗兒體氣素壯實者用加味升麻葛根湯汗之體氣素怯弱者用加味參耨飲汗之然皆不可出汗多。○白粉葛一錢 升麻分 赤芍分 甘草 桔梗 防風 蘇葉 五分 小川芎四分 山查淨肉 八分 牛蒡子

棟淨炒香研 生薑三片同煎熱服取汗

加味參耨飲 人參三分 茯苓五分 小川芎 桔梗 前胡 各四分

陳皮 甘草 各二分 貝母 五分 粉葛八分 製半夏 四分 牛蒡子 四分 山查肉 六分

生薑三片熱服取汗

敗毒和中散 發汗之後或身熱不退而煩燥者且勿峻攻姑少待之其或煩悶燥渴而妄語者用之清之切不可輕用柴胡黃芩乾葛花粉等之清

解劑 連翹 牛蒡子 酒炒黃連 陳枳殼 防風 荆芥

桔梗 紫草茸 酒洗 蟬退 小川芎 前胡 木通 升麻 甘草

麥門冬 各八分 大便秘澀者加酒炒大黃 服此覺煩悶少解即宜勿服

聽其瘡出外則中自安

升清平胃散 發熱之際有偶感風寒飲食停滯而腹痛者用此方一劑痛

或吐泄文作而日月
腹痛甚若此感寒

而停食也宜
并消于胃散

立止然停食作腹痛與毒氣作腹痛分辦明白方可用藥。小川芎

炒附 蒼朮 紫蘗 姜汁炒 厚朴各五分 藿香 砂仁 白芷

陳皮各三分 炙甘草二分 炒麥芽一分 山查肉一錢 生姜三片同姜帶煎服

參砂和胃散。或胃氣弱而有寒嘔吐不思飲食或食下即吐其吐多順

快而無聲面青白唇淡精神倦怠宜此方。治虛寒嘔吐 人參 砂仁

半夏各四分 白朮 白茯苓各五分 藿香 陳皮各三分 炙甘草二分 煨薑三片煎

木苓調脾散。治虛 或脾氣虛弱飲食不化而泄瀉者其泄滑利而色

帶白宜此方。白朮 白茯苓各七分 酒炒芍 真神麩 炙甘草各五分

白扁豆姜汁浸炒 砂仁 炒香附 厚朴各三分 煨薑三片大棗二枚 或加人參

或有毒氣作吐瀉者其吐必酸刺而有聲神氣不甚困倦其泄必黃色臭穢雖

或吐泄交作胃腹多不痛此則毒氣由吐泄發洩所謂吐泄為順候而不必止者也

清解散。有毒氣壅盛於內不能驟發於外而驚搐狂燥者宜用此

方而宜之察其痘形紅紫面赤唇紫聲音亮口氣粗手足熱脈洪數此

毒氣壅盛者也。防風 荆芥 蟬退 桔梗 小川芎各四分 前胡

乾葛 升麻各五分 酒炒芩連 紫草 木通各六分 牛旁 連翹各五分

山查肉八分 甘草三分 生姜三片同煎溫服

蘇解散。有內毒本盛外為風邪所束鬱滯不得出而驚搐狂

燥者宜此方察之或形色多同前但聲重鼻塞或鼻涕脈浮數者此

毒盛而為風寒所束者也然此症多在寒涼之月。前方去芩連加紫

蘗白芷各五分 羌活四分 生薑三片同煎帶熱服

溫中益氣湯。又有氣血虛弱送毒氣不出而驚搐狂燥者宜此方托

之察其痘形淡、在皮下不見紅活唇淡面白或帶青脉又遲緩煩

燥發狂譫語亦是血氣虛而送毒氣不出者也。人參、白朮 各五分

黃耆 八分 當歸身 酒洗 白茯苓 各六分 炙甘草 川芎 各四分 白芷

防風 各三分 南木香 官桂 各二分 山查肉 六分 生薑二片 大棗二枚 煎服

調元化毒湯。若身熱三日即出痘先發於天庭司空印堂等處者或

一齊出而調密者或乾枯而紫黑者或成片不分顆粒者皆血氣凝

滯而毒氣肆行最為可憂急宜活血養氣而解毒用此方或身熱

大便秘而出不快者此毒氣鬱滯血氣不流行也用此方去參耆加小

川芎清之。綿黃耆 生用 八分 人參 四分 白芍 生用 當歸 酒洗 各六分 牛蒡

連翹 各七分 酒炒 芩連 各八分 防風 荆芥 桔梗 前胡 木通 各五分

紫草茸 酒洗 六分 紅花 生地黃 各三分 甘草 蟬退 各四分 山查肉 八分

生薑一片 溫服。腹痛去參耆加炒枳殼 八分 大便久秘者去參耆

加酒炒大黃 一錢 五分 若血氣凶毒氣俱旺而脈洪數者歸芎減三之一去參耆

加減參耆藥飲。有鼻塞聲重咳嗽惡寒而出不快者風寒蔽之也宜

發散之用之方。藜蘆 六分 人參 陳皮 小川芎 羌活 防風

荆芥 各四分 桔梗 白芷 甘草 各三分 冬加麻黃 五分 生薑三片 煎服不可出汗

平和湯。或有邪穢所觸伏陷而出不快者其痘必癢宜用此方解之外以蒼

木紅末 沉檀等燒之以辟其氣。人參 當歸 桔梗 白芍 紫葳

黃耆 各四分 防風 白芷 甘草 各三分 官桂 沉香 檀香 乳香 藿香 各二分

薑附湯。痘正出時有忽然傳風眼直視牙緊者此調護不謹而

為風邪所襲也且勿輕用驅風峻藥宜此方。白附子 二錢 老生薑 二錢

○二味濃煎湯灌下二三酒盃出微汗即愈

清毒活血湯。痘色紅紫乾枯或帶焦黑者毒熾而血凝者也必不成膿

痘出齊後起發
潛濃數日內
調治法

瀉腹時或有六七
日不大便而寒熱
作痛者毒盛而秘
也。用清毒湯血湯
去參。若加懷牛
膝二錢。煎藥熟
加至三錢。煎藥熟
去渣入生薑半酒
盃。服之。如又不通
用前藥加酒炒大
黃三錢。微利之。若
仍不通。用猪膽汁
滴入。穀道中。即通
。終不可用硝黃。大下
。恐下後變他症。則
危矣。

急宜用此方。紫草茸 當歸俱酒洗 前胡 牛旁 木通各六分
生地黃 生白芍俱酒洗 連翹 桔梗各五分 酒炒芩連各七分 甘草四分
山查肉八分 人參三分 生黃耆八分 生薑一片 同煎煩渴者去黃
耆加麥門冬酒炒花粉各八分

參歸鹿茸湯。痘色淡白。疱不尖圓。根無紅暈者。氣虛而血縮者
也。必不成膿。急宜用參歸鹿茸湯。或千金內托散。鹿茸酒洗神聖之
三錢 嫩綿黃耆密炙一錢
五分 當歸身酒洗一錢
五分 炙甘草六分 人參一分 生薑一
片 好龍肉三箇 同煎去渣入好酒二盃 溫服。見有能飲酒者 濃煎藥汁
與酒相半和服亦好。虛弱未甚者 服此二三劑 其痘即轉紅活行漿。困
倦手足冷 飲食少者 加木香三分 丁香 官桂各五分 寒戰咬牙者 再加官桂
三分 製附子八分 泄瀉者 去當歸 加麩炒白朮 酒炒白芍各八分 木

參耆湯

音啞者若痘
色虛陷灰白血
氣虛弱 送毒
不出 毒留於肺
肺氣受傷 以致
失聲 則危矣
宜參耆湯清
補湯 兼平金
內托散

香丁桂各三分 另用參耆木散止瀉

千金內托散若不得鹿茸則換之 人參一錢 當歸身 蜜炙黃耆各一錢
五分 酒炒白芍

大川芎各六分 官桂 炙甘草 山查肉各五分 南木香 防風 白芷

炒厚朴各三分 生薑一片 龍眼肉三箇 同煎入好酒和服。隨症加

減法同上。有用人乳和藥服者 雖於瀉膿有理 但人乳性涼 脾胃弱 大便滑或泄者 忌之

痘瘡頭粒通紅成血泡而不成漿者 宜用參耆湯大補其氣

人參 蜜炙黃耆各五分 炙甘草一錢 官桂五分 生薑一片 煎服

參耆清補湯。出痘稠密 毒火既盛 然元氣虛弱 津液枯竭 不能
制火 以致虛火炎蒸 或煩或渴 或咽喉痛 或鼻時出血 難任溫補 痘必不能
成漿 結痂大 凡年長之男女 嗜慾久 開血氣既耗者 多有此症 最為難治 不
用清涼此方調之。人參八分 麥門冬去心酒蒸
各一錢二分 白花粉酒洗
各一錢 生黃耆各一錢

吐

泄

前胡 牛旁各五分 炙甘草 生甘草各三分 酒炒白芍 生芍各四分
 當歸酒洗八分 紅花酒洗三分 大川芎 生地黃酒洗各三分 桔梗三分 山查肉五分
 生薑一片 龍眼肉三箇 同煎溫服 遇此症者此藥當頻服
 此症也
 施連二陳湯。吐有^{此症也}二端。吐而酸苦有聲吐訖反快者毒火上騰也。用此方止之。吐而有物無聲不苦吐訖困倦不思飲食者胃氣擾也。參砂和胃散^{主之方見前}
 薑汁炒黃連 薑汁炒梔子各五分 白茯苓八分 制半夏四分 去白陳皮
 炙甘草二分 生薑一片 同煎緩服 吐止即無服
 加味四苓散。泄而糞黃臭穢小便赤澀者毒氣奔越也。此方主之。症色必紅也。
 朱苓 木通各八分 澤瀉 赤茯苓各七分 車前子各炒 黃連
 黃芩俱乾炒 牛旁制見前各五分 燈心一團 同煎食前服
 參朮散。泄而糞青白滑利者虛寒也。症色必淡白。此方主之。如虛滑不

漿足回水至結
 亦還元數日
 內調治方

止兼用七味豆蔻丸。白朮二兩 人參 白茯苓各二錢 砂仁 炙甘草
 薑炒 苡仁炒 家蓮子去心炒 真神麩炒 山查肉各五分 肉豆蔻
 柯子 廣陳皮各四錢 南木香三錢 右為細末 每用二錢 清米飲調食
 前溫服 兒有不肯食者入稀粥內和服又可
 七味豆蔻丸。肉豆蔻 柯子 砂仁 南木香 白龍骨各五錢
 赤石脂 枯白礬石各七錢 麩糊為丸 加薑豆大 每用清米飲下三十九或
 二十丸 兒大小與之 兒有不能吞丸者將丸研碎入粥內服之亦可
 歸荖湯。身涼而汗不止者此方主之 有痰用白附子熟水磨服 切不
 可用二陳湯 恐燥陽明孤陽無陰不能施化也 至收醫時用之無妨
 當歸身五錢 蜜炒黃芩三錢 酸棗仁炒研二錢 水煎服
 養胃開痰湯。症出稠密而膿不甚滿者至此時飲食多減 痰液

逆效
紫黑
寒戰
咬牙

多盛宜用此方。渴者去半夏加麥門冬。分北五味九粒吐逆者加藿香

砂仁各三。灌膿時忌用木苓半夏恐其燥乾。津液膿漿不行也。至此將

膿固時可用矣。○人參 白朮 炙甘草 白茯苓 山查肉 山藥 炒

家蓮子 去心炒 各五分 製半夏 桔梗 各三 生薑一片煎服

此時有欬逆者 俗呼 胃氣上越也。取真黃土鼻邊聞之立止

此時漿滿或為寒所薄。時痘俱紫黑如紫葡萄色不必驚恐。急以上好肉桂

磨湯或煎湯服之立見如舊

建中湯。有寒戰咬牙者此真氣外發而內虛寒也。宜建中湯大補之

人參 二錢 蜜炙黃耆 三錢 白朮 當歸身 各一錢 大川芎 八分 大附子

乾薑 炒 肉桂 炙甘草 各一分 丁香 五分 生薑一片 溫服 一服立止 甚者不

二服。收膿後寒戰咬牙者同此方調治。 寒戰咬牙之症有熱自寒 然屬寒者 多故立此方須明辨

有寒
不壓面

溫表調中湯。九日十日間膿漿足而色蒼蠟者必且發熱蒸蒸此回水之

候也。蓋真陽運化其水自然消燁而收膿也。其元氣不足者則不能及時回水而

當壓不壓面矣。此虛寒症也。必身涼而手足冷。須大補氣血而助之收結。宜用此方

蜜炙黃耆 二錢 人參 白朮 白茯苓 官桂 大川芎 當歸身 炙甘草

炒乾薑 錢 防風 分 白芷 丁香 附子 各五 生薑一片煎服

清表散毒湯。有發熱蒸蒸而當壓面不壓者毒氣未解也。退其熱則痘自

收宜此方 地骨皮 麥門冬 酒炒花粉 各八 牛蒡 連翹 當歸 各五

宋苓 澤瀉 酒炒黃芩 木通 生甘草 各四

或用沙糖生酒盃白沸湯調一碗。溫服。謂之甘露回天飲。能令熱退痘收。好

但毒盛者恐未必效

水壓面

腹痛

結痂後有忽然頭頂大痛者餘毒未收也或因多服熱藥所致急宜用大連翹飲去不通車前石加什麻栝梗各四錢苦等荷各四錢散上攻之火庶可免日患

患處若乾痂堆積不落內又空膿即以瓦粉用鴨蛋調敷立收而落

消毒散四湯。當膿血時或忽然腹痛其痛着在中脘此熱毒凝滯瘀血作痛也宜之

牛旁 生白芍 酒洗 桃仁炒 酒炒大黃 各一錢 紅花 沒藥 乳香 俱用燈心

藥將熟投入 水煎溫服立愈

大連翹飲。結痂後發熱吐盛胃腹手足頭面俱熱大便秘澀小便赤澀

者餘毒盛也當解毒此方主之。連翹 牛旁 柴胡 當歸 赤芍

防風 各八分 木通 車前子 荆芥 酒炒黃芩 酒炒山梔 滑石 甘草

蟬退 各五分 生薑一片煎服大便秘者加酒炒大黃

補中益氣湯。發熱稍緩頭面不甚熱手心脚心熱手背脚背不熱精神困倦

大便便利者虛熱也宜此方。人參 八分 蜜炙黃耆 一錢 白朮 當歸身 各八分

柴胡 什麻 川芎 各四分 炙甘草 五分 陳皮 四分 渴者加麥門冬 一錢 五味子

備用緊要 諸症方論

夾疔丹 麻疹

九粒 生薑一片煎服

玄參升麻湯。痘有夾疔而出者有紅赤點而無頭粒多隨出而隨沒又有長

丹而出者紅赤成片如雲頭而突起此皆毒火浮遊散漫於皮膚之間也遇者

不必驚惶但用此方二三劑散其毒火其丹疔自退。玄參 去芦 升麻 各二錢

甘草 八分 防風 荆芥 牛旁子 各六分 有水麻疹而出者用前方加栝梗

酒炒黃芩 各六分 令其麻疹先退痘瘡自當起發

參芩白豆豉表湯。痘痒者表虛也此為危症宜此方。蜜炙黃耆 一錢 五分

人參 一錢 炙甘草 官桂 防風 白芷 各八分 當歸 川芎 栝梗

原朴 各六分 南木香 三分 生薑 一片

一方外治痘痒用荆芥穗為末紙裹緊搓糊粘紙頭令不散仍焙乾燈上

燒之却於桌上春去灰指定痒痘頭用荆芥火點痒處一下患者自以為妙每

痒症悉點之立止

穢氣觸犯而癢者急燒蒼朮紅棗或黃茶葉以辟之甚者內服平和湯方見

痘痛為實此為吉兆用生芍藥為末酒調下一錢五分立止甚者不過二服

參歸大補湯。痘出齊後有面目腫脹而痘不脹者此血氣虛弱不能拘攝毒氣

以成膿故其毒散漫妄行內分也此為危候急宜大補其血氣以收攝其毒則痘

灌膿而肉脹自消矣宜此方。人參 當歸 蜜炙黃耆 各一錢 川芎

桔梗 山香肉 炙甘草 防風 白芷 薑炒原朴 紫草草 各六分 南木香 二分

生薑一片煎服

四聖膏。痘出齊數日後其間有紫黑脹硬獨大而無根暈者痘疔

也。用此膏填入或拔毒散點之。玳瑁 碗豆 俱燒研 亂髮灰 三分 水片 半分

用油脂調成膏先將金銀簪撥開疔口將藥填入瘡內即轉紅

痛

腫脹

癰疔

癰毒

臭爛

血血

空替點前
須是出
毒賊子

拔毒散 雄黃 一錢 胭脂濃浸水調點疔頭 即時紅活

三豆蔞水 上癰毒外治宜此方內服大連翹飲 黑豆 苡仁

赤小豆 各用一合以酸醋浸脹搗研釀漿時久以鵝翎刷之紅腫退去

其効如神 又方用赤小豆為細末清水調敷乾即易之

生肌散 痘瘡原多潰爛收結後或手足等處仍作熱臭爛出膿

水不止者此方敷之 地骨皮 黃連 炒黃柏 炒五倍子 生甘草 等分

為細末乾摻之即熱退結痂而愈其有仍作熱作膿而不即愈者內毒

未淨也仍用大連翹飲解之

綿繭散 有餘毒流注各處出清水者此方摻之 治痘瘡身軀肢節上

出綿繭不拘多少用生明礬末填在內燒令汁盡成灰為末乾摻之 有痘蝕瘡膿水不絕

痘有鼻中衄血者毒氣上衝于肺也此其毒外洩亦非惡候不必驚惶

只用髮灰散或清肺治之切不可用寒涼

清肺湯。酒炒花粉 麥門冬去心 天門冬去心皮 甘草 桔梗

當歸酒洗各五分 酒浸生白芍 酒炒片苓 酒洗牡丹皮 蜜炒知母各四分

生薑一片如有髮灰入錢尤妙

瘡有口舌生瘡者如瘡色紅紫湧盛者熱毒也用清上飲如瘡色淡白者虛火也用參朮清補湯方見前 外用赴蓬散搽之

清上飲。薄荷 防風 甘草各四分 白粉葛 牛蒡 連翹 桔梗

酒炒芩連 酒炒花粉 麥門冬各六分 生薑一片煎服

赴蓬散。薄荷葉 黃柏。各等分為細末入青黛少許和勻搽之

瘡有咽喉腫痛者首尾俱用利咽解毒湯外用玉鎖匙吹之

利咽解毒湯。山豆根 麥門冬各一分 玄參 桔梗 牛蒡子各七分 防風 甘草各五分

喉咽

口瘡

小便不利

生薑一片煎服每藥一煎分三起緩服

玉鎖匙。明砂一錢 朴硝五分 姜蚕一條 片腦五釐。為末以竹管吹之

道寸赤散用此方不磨者用後六十八葉八正散。瘡有小便赤澀者用之

木通 赤茯苓去皮 麥門冬各八分 車前子微炒 生地黄各四分 甘草

人參各二分 燈心 如龍眼肉大同煎饑時服

清毒撥發湯。瘡毒入眼有赤腫而不能開者宜之收效數十劑之後也

酒炒黃連 當歸酒洗 天花粉酒蒸 牛蒡 草決明 桔梗 甘

草 白茯苓各四分 川芎 羌活 柴胡 防風 薄荷 生地黃 山梔酒洗各三分

生薑一片同煎食後良久服大便秘澀者加酒炒大黃一錢五分

豬尾膏治熱毒入心經而狂燥不知人事 冰片一分 刺豬尾血一錢同研濕酒調下

毒入眼

麻疹

麻疹形如麻痘疹形如豆皆象其形而名之也麻痘俱胎毒而痘出五臟臟屬陰陰主閉藏其毒深而難散麻出六腑腑屬陽陽主發散其毒淺而易散臟陰多虛寒故痘可溫補腑陽多實熱故麻宜解散然麻雖屬腑而其熱毒之氣上蒸于肺肺主皮毛實受其毒是以發熱之初雖似傷寒而肺家見症獨多咳嗽噴嚏鼻流清涕眼泡腫眼淚汪汪面腫腮赤是也治之法惟在宣發其毒以盡出之於外雖紅腫之甚狀如漆瘡亦不足慮以其既發于外即可免內攻不若痘家之必顧其收結蓋麻疹有所大忌宜慎

忌多用辛熱 忌用補法
宣毒發表湯 麻疹初發熱欲出未出時宜此方 升麻 白粉葛 各八分 桂梗 各五分 荆芥 薄荷 甘草 各三分 牛蒡子 炒香 連翹 志芩 研碎 前胡

附古今治痘要方

枳殼炒 淡竹葉 各六分 天氣大熱加黃芩 炒六分 大寒加麻黃 八分

化毒清表湯 麻已出而紅腫大甚宜用之 牛蒡子 連翹 天花粉

地骨皮 黃連 黃芩 山梔 炒 知母 乾葛 玄參 各八分 桔梗 前胡

木通 各六分 甘草 薄荷 防風 各三分 日渴加夾冬 門冬 各一錢 白石膏 煨研 三錢

大便瀼加酒炒大黃 一錢二分

清熱導滯湯 有毒氣流注而成痢者宜之 黃連 條芩 白芍

炒枳殼 山查肉 各一錢 厚朴 去皮 姜汁炒 青皮 檳榔 各六分 當歸 甘草 牛蒡子 連翹 紅多者加紅花 三分 地榆 五分

十神解毒湯 九味神功散 荆防解毒湯 四聖散 鼠粘子湯

保元湯 異功散 木香散 回生丹 八正散 無價散

辰砂益元散

急驚風
古謂之
陽痲

古語云急驚風慢驚風

清熱鎮驚湯。連翹 柴胡 地骨皮 龍膽草 鈎藤

黃連 山梔 片苓 麥門冬 木通 赤茯苓 車前子 陳枳實

各四 甘草 薄荷 各二 滑石 細末 燈心 淡竹葉 三片 水一盞 鐘

加減涼膈散。連翹 片苓 山梔 枳實 前胡 各五 大黃 一錢

薄荷 甘草 各二

宣風散。陳皮 枳殼 甘草末 黑牽牛 取頭末一兩二錢

右用密湯調服微利為妙服前而疼熱未除後二方隨用一方

辰砂益元散抱龍丸牛黃丸等藥急驚俱可用慢驚功不可用之

有慢脾風者即慢驚失治而甚者耳 因吐瀉而得者最多

溫中補脾湯。白朮 半夏 黃耆 人參 白茯苓

慢驚風
古謂
痲之陰

聲啞

吐

治疳本

白豆蔻仁 乾姜 砂仁 各五 官桂 陳皮 甘草 白芍 酒炙 各四分 噎噎虛寒

甚者加熟附子五分。老生姜一片大棗一棧水二茶鐘煎八分

治小兒驚風並退只是聲啞不能言并諸病後不能言

大天南星一箇泡去皮臍為末量兒大小每用二三分四五分用猪

膽汁或淡薑湯調成稀糊食前服之即能言

薑米湯。吐多而胃氣欲絕者用是安胃。老生薑二兩陳米

二撮如無陳米食米亦可

用莪朮三棱檉榔厚朴等以消積用川黃連胡黃連等以清熱用

史君子其蕪荑川練蘆芩等以殺此治本而並治其標也

疳疔已久而脾胃極虛而不可單攻者當兼用六神散與肥兒丸

相間服之此補兼施活法也有癖塊加阿膠

痢

大瀉天君丸 治疳虫蝕脊身熱 盜瀉瘦十指 痲瘡 瀉齒 疳等症
痢病重急後重身熱腹痛者俱可用單白無紅者去地榆桃仁加
去白陳皮四分木香三分滯澁甚者加酒炒大黃二錢。

川黃連 條實黃芩 大白芍 山查肉 各一錢 枳殼 厚朴 姜汁

檳榔 青皮 各八分 當歸 甘草 地榆 各五分 紅花 酒洗 桃仁 一錢

木香 二分。惟十日半月外則當加減其法見于後 厚朴 陳皮

黃連 黃芩 白芍 三味酒炒各六分 生山查肉 一錢 厚朴 陳皮

青皮 檳榔 各四分 甘草 炙三分 當歸 五分 地榆 四分 桃仁 六分

紅花 三分 木香 二分。如延至月餘覺脾胃弱而虛滑者用酒炒

苓連 白芍 各六分 陳皮 厚朴 木香 各三分 酒炒地榆 四分

紅花 二分 當歸 人參 梔子 炙甘草 各五分 照掃去紅花 桃仁 檳榔

麻 名痧子

疹

○疹子出沒常以六時為準 假如子後出者午時即收 午後出者子時即收
乃陽生陰成 陰生陽成 造化自然之數也 增補麻疹心法

麻疹精要

大青湯方
 而白虎湯去粳米
 加大青去參木通
 生竹茹竹葉
 消毒飲方
 鼠粘子荊芥
 甘草
 又方
 牛蒡子炒三荆芥
 防風竹麻各一甘草五
 清肺湯方
 桔梗麥門冬款冬
 花杏仁貝母生薑子
 分甘草減
 犀角地黃湯方
 犀角生半牡丹皮
 芍藥各等
 犀角二味用之數
 清咽滋肺湯方
 去參鼠粘子荊

麻疹者手足太陰陽明二經蘊熱所發小兒居多大人亦時有之是亦時氣傳染之類其
 發熱時多咳嗽多嘔多嘔眼中如淚面浮腮赤多滯多疹多熱多渴多煩悶甚
 則躁乳咽痛唇焦神昏通身紅赤起而成粒白淨而小斜目視之隱隱皮膚之下以手
 摸之其肌肉之間其形若疥其色若丹以其陽氣從上故頭面愈多者為順法當清涼
 散為主藥用辛散以升發之涼潤以清解之切忌酸收凡動氣燥悍及一切溫補之藥慎
 不可犯誤用禍不旋踵幸散如荊芥薄荷前胡葛根麻黃石膏鼠粘子涼潤如黑參
 枳實根歲莖麥冬生甘草苓連貝母連翹竹葉皆應用之藥又當隨所發月時量
 兒大小及見證輕重而為劑劑若漸出漸收者其勢雖輕而熱尚未平須防喘急若
 連綿三四日者其熱雖盛而勢已發泄必無他變宜大青湯或消毒飲加黑參石
 焦麥冬竹葉若發熱時偏身汗出或衄血者此毒解也勿遽止之若汗出太多血流不
 止當以清肺湯去款冬杏仁加麻黃根以斂汗犀角地黃湯以止血遲則氣虛神耗

芥菜石膏湯方
竹葉石膏湯方
竹葉石膏湯方
竹葉石膏湯方
竹葉石膏湯方
竹葉石膏湯方
竹葉石膏湯方
竹葉石膏湯方
竹葉石膏湯方
竹葉石膏湯方

白虎湯方
和世大石膏方
甘草二粒米六
夾冬升
夾冬升
夾冬升
夾冬升
夾冬升
夾冬升
夾冬升
夾冬升

無比散方
取黃牛黃共燒存
性入龍腦少許
研細吹之
加味清胃散二方
即本方加犀角
連翹甘草

為難治也若發熱時或嘔吐或白痢者此火和內逼毒氣上下行便宜清熱解毒利小便
切勿止瀉大凡疹證發熱時未有不渴者但當與淡豆豉心湯勿與冷飲致成水蓄多
生癰及幼也即薑暈酒麪生冷水菓咸須禁之麻疹多有熱疹在肺初發時必咳嗽宜清
熱透表不得止嗽麻後欬切忌辛溫酸澆但用清咽滋肺湯以清餘熱疹
壅自愈多喘者熱和壅肺也切勿定喘惟應大劑竹葉石膏湯去牛復加貝
母黑參薄荷如冬天寒甚麻毒為寒鬱於內不得透出而喘加蜜酒炒麻黃一
劑立止夏月熱勢甚者即用白虎湯加竹葉忌用什麻誤服必喘然喘為肺
氣壅遏故喘必兼嗽而張口擗肩者肺氣不通不治也故諺有喘而欬嗽者可療喘
而不嗽者難醫之語其證多泄浮慎勿止瀉惟宜芩連葛根則瀉自止疹家不忌
浮瀉則陽明之邪熱得解是亦表裏分消之義又有疹收之後飲食如常卒然
心腹絞痛遍身冷如冰者此元氣虛弱而中惡氣也朝發夕死急治之凡麻疹以

化斑湯方
玄參二錢鼠糞子一
此胡分荊芥防
瓜各六連翹七
木通八枳殼四
脫各五甘草四
燈心廿竹葉十
片

解明似錦為吉黑晦如煤最凶頭面不出者重紅紫黯慘者重咽喉腫痛不食者重
黑黯乾枯一出即沒者不治鼻扇張目無神者不治鼻翳者重黑者不治牙疳
臭爛者不治疹之牙疳最為難治外用無比散吹之內服加味清胃散更加荊芥
石羔緩則不救疹中諸患不宜依證施治惟當治本本者乎大陰足陽明二經之邪
熱也解其和熱則諸證自退矣○有夾痘而出者此毒氣大盛故一齊湧出
不必治疹但當托痘為主然治痘宜溫治疹宜涼此又不可不審大人男婦出疹當與外
感並治惟清涼解毒夜隨天時寒暑施治凡麻痘並作藏府凡熱文患也麻則
凡邪外感痘為胎毒內發二者相雜未暈發燠多有誤認痘出大密而毒之不
救殊不知其為疹夾痘也當與化斑湯續頻進麻毒解而痘自起矣○有
腫行漿疹子極以痘最難者然痘則必有頂盤疹雖有漿而頭粒必不怪根盤
必無紅暈也疹後痘不結痂及元氣虧損當大補脾胃參生不可誤認和熱未

盡復與清熱退火之藥

初發在熱至已出而熱不少衰者其證必重清熱透肌湯出盡而吐熱不退者竹葉石膏湯去半夏加荊芥黑參

葛根解肌湯初發熱有熱數日止而復作者為熱邪未透

四物湯換生地赤芍加連翹黑參沒後見者為餘邪未盡宜之

白虎湯加黑參三枚亦有色黯不起大便結唇舌燥赤者為火和內鬱宜之

涼血飲子色紫赤而黯是火毒熾盛原粒起者可治宜之

謬語煩躁者黃連解毒湯調益元散大便秘者涼膈散下之

初發在熱至已出而熱不少衰者其證必重清熱透肌湯出盡而吐熱不退者

竹葉石膏湯去半夏加荊芥黑參有熱數日止而復作者在初發熱為

熱邪未透葛根解肌湯沒後見者為餘邪未盡四物湯換生地赤芍

發熱

加連翹黑參

色貴紅潤形貴尖從耳若色雖紅潤而越起二便艱澀者清熱透肌湯

清熱透肌湯初發在熱至已出而熱不少衰者其證必重宜之

玄參石膏鼠粘子荊芥防風前胡葛根杏仁各等分甘草減半

竹葉石膏湯出盡而吐熱不退者宜之去半夏加荊芥黑參

方總論中出

葛根解肌湯有熱數日止而復作者有早熱而暮退者在初熱

時為熱邪未透宜之葛根前胡荊芥鼠粘子連翹芍藥蟬脫

木通各等分甘草減半

四物湯沒後見者為餘邪未盡宜之芍藥二錢芩芩一錢芩芩一錢

當歸熟地各一錢

正出之際而煩熱轉甚乃知熱未透而復內攻也清熱透肌湯

形也

涼血飲子。若色紫赤而顯是火毒熾盛，兩粒起者可治宜之。

生芩一錢黃連五錢芩前芥玄參各一錢紅花三錢芍藥牡丹木通各八分

黃連解毒湯。誤語煩躁者宜之。黃連一錢黃芩黃蘗山梔子各二錢

益元散。前證者若黃連解毒調此方。滑石水飛六兩甘草二兩一兩

涼膈散。若頂粒焦者無論紅淡皆為熱劇之候，並宜白虎湯。常用石膏乾燥無汗加麻黃以汗之大便秘者此方下之。薄荷各八兩

連翹一錢大黃一錢芒消一錢桔梗八分山梔子黃芩各一錢

白虎湯。下之亦有麻發如雲頭大片其形有二一者大片燉赤一者大片之上復有小紅點粒皆火和熾盛所致。此方加黑參竹葉若麻出

斑爛如錦紋或出膿血腥臭不乾心胸煩悶嘔吐清水身溫熱者此

方加黃芩第木方見總論中。

清咽滋肺湯。未出之先最喜效甚。毛數開而麻易出，透其效自己若出盡及沒後而效仍不止者宜此方。效嗽多痰去來冬加橘皮茯苓方總論中見。

甘桔湯。有感觸風寒，效嗽煩悶嘔逆清水眼赤咽痛口舌生瘡者此方主之。桔梗一兩甘草二兩加芩連。

人參白虎湯。沒後見者宜之。即本方加參去知母易麥門冬以滋化之。

消毒飲方總論中出。初起吐浮順候嘔吐是胃中熱邪不得發洩而作嘔。

根解肌湯。正出及正沒時見者宜之。加枳實黃連多痰者更加貝母

枳實根。

石斛清胃散。若沒後而嘔者脾胃虛而熱滯也宜之。

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

石斛茯苓牡丹枳殼扁豆藿香橘皮芍藥各等甘草減生薑水煎

四苓散 泄瀉常候發熱時瀉而黃赤稠粒小水短澹者屬熱此方加木

通滑石已出人參白朮湯去知母易麥冬豬苓澤瀉各一白朮各一

胃苓湯前證如瀉下清稀白沫腹疼喜得溫按者屬寒宜之去蒼

木加煨薑蒼木厚朴橘皮豬苓澤瀉白朮茯苓芍藥甘草各一

肉桂各五

枳殼湯渾利窘迫而腹痛脹滿或噎氣如敗卵者為飲食停滯

宜之加檀藥木通而平胃散去蒼木加枳殼

枳實湯理中湯 麻疹泄瀉屬熱者多屬寒者少辨治宜早不可令其瀉久瀉久則

正氣下陷或成腫滿或下利並宜此三方之類以理脾胃為主○枳實湯方枳實十一

蒼木二理中湯方白朮一人參乾姜各五一方加橘皮五一方加茯苓白朮各五

瀉白散 若後復猶見紅赤為肺經風熱未盡宜之

桑白皮地骨皮各一甘草五生薑水煎加荊芥薄荷黑參牛房閑

不欲開更加連翹木通

道寸赤散目赤而腫痛者風熱上壅也宜之○生地五木通甘草各一竹葉

加荊芥黑參

柴胡飲子 若為風熱所侵而目眼眶赤爛者宜之不治為終身痼疾

此胡羌活防風芍藥桔梗荊芥生薑各一甘草五

麻杏甘石湯 麻黃四杏仁五甘草二石膏半○若將發之際或

為風寒暴襲或因肢體坦露寒鬱熱邪不能外出此全盛之勢

未萌與出後沒早不同如氣粗喘促腹中脹痛煩擾不安而不得出急奪之或越脾湯去棗宜用石羔輕則升麻湯以升發之

發不出

把

若因觸犯霧露風寒，隱現不能發出，以新猪矢冲湯，隔簾蒸之，冷則更添滾者，并取猪矢燒灰，葱白湯，下三錢。

○越脾湯 麻黃^{六兩}石膏^{半斤}生姜^{三兩}大棗^{十五枚}甘草^{二兩}

○什麻湯 什麻^{一斤}葛根^{芍藥}路^{甘草}分^八

○新猪矢冲湯 方如法 ○葱白湯 方如法

○三拗湯 麻黃杏仁甘草^{各一} 姜枣水煎 選用凡寒早沒

○酒風散 川芎羌活防風荆芥藿香人參茯苓強蠶蟬脫

各等分 甘草炙橘皮厚朴^{各減} 以陳解之

○門冬甘露飲 方 玄參黃芩枳實根連翹^{各一}甘草^五燈心^半

竹葉^{二十}麥門冬^二 渴乃肺胃熱盛之候，唇口必紅，二便秘澀

者宜之

○七味臬散 人參臬藿香木香茯苓甘草^{各五}葛根^一 若二

便清利唇色不紅而但渴者，此必寒涼太過，脾虛不生津液而作渴也。宜之去木香加梗米，渴而煩躁者是熱邪凌燥，心包百虎湯，加炙冬竹葉，正沒時竹葉石膏湯，去半夏，渴而腹脹者本

虛實滯為難治也

○除熱清肺湯 石膏^三玄參生芩芍藥貝母^桔薤白^{各一}麥門冬^半

甘草^五 喉中有痰，齶齶而鳴者，熱邪阻逆不得發熱也。見於

初發正出之間，宜之正沒後見者，肺氣受傷也，難治。

○射干消毒飲 射干玄參連翹荆芥鼠粘子^{各等}甘草^減

肺冒熱和為風寒所襲，不能盡達於表，致盛咽傷，故瘡宜清咽滋肺湯，苦瘡而腫痛者宜之。然瘡為麻疹之常不同症。

○ 麥門冬湯即四物湯去芍加麥門冬換生芩 麻疹咬牙皆為熱

例乃陽陷於陰故多惡渴手足熱喜飲冷者此方加丹皮

○ 清胃散生芩四升麻半牡丹五當歸黃連各三 口氣穢濁乃熱邪

蘊隆於胃此方加石膏連翹生甘草

○ 當歸湯 當歸芍藥各一川芎五大黃三甘草五 牙疳腐爛是熱

留陽明餘毒上衝所致加味清胃散加石膏荊芥大便秘者此方微利之

外用栗根白皮煎湯法如漱淨以無比散或燒鹽散取橡斗大者實鹽

燒存性以碗覆地入麝香少許研細敷之次之如通眼色白者自外入內者無膿血者

○ 綠袍散 荊芥薄荷青黛各三甘草一硃砂玄明粉各二 右為末

散點舌上令其自化 若滿口唇舌黃赤白爛獨牙齦無恙者

此為口瘡非牙疳也

○ 此為口瘡非牙疳也 胃中餘熱未盡毒壅上焦二便必多艱澀

○ 赤散 以淨心脾之火外以綠袍散敷之

○ 四順清涼飲 當歸芍藥甘草大黃酒蒸各一右四味水煎入生蜜已熱

服 大便秘結火壅血燥而耗津液麻疹大非所宜無論日期前後連

宜清潤宜之甚則涼膈散以通利之

○ 黃芩湯 黃芩三甘草芍藥各二大棗十二 麻之作疳為熱和內

陷在正沒或沒後而痢下色白者宜之加防風枳殼

○ 白頭翁湯 白頭翁二黃連黃蘗秦皮各三 煎證下膿血者宜此方

去黃蘗加防凡或因食積而滯下者枳殼湯見檀藥木通

○ 厚朴湯 即平胃散去蒼朮加茯苓乾姜○又方厚朴乾姜阿膠

各四 黃連六石榴皮艾葉各五 腹中作脹時痛時止者宜之

○ 各四 黃連六石榴皮艾葉各五 腹中作脹時痛時止者宜之

○ 各四 黃連六石榴皮艾葉各五 腹中作脹時痛時止者宜之

乾姜黃芩黃連人參湯法如亦有浮久而成痼者宜之

苦丁根艾葉煎湯法如麻屬火候最易墮胎若初孕正出時須驗其

色之紅淡熱之重輕而與疎解疎解之中佐以清冷滋血安胎為主

四物湯加條芩艾葉荊芥紫蘇之類若胎氣上衝急用之方

磨檳榔續進以降之。一切實脾行氣溫燥之藥礙麻疹傷子氣宜禁

雙和湯 即四物湯加黃耆肉桂甘中姜棗一麻患既平形體羸

瘦精神倦怠飲食減少或咳嗽不止或便泄不已或身熱不除皆真元

虧損恐成勞瘵並用此方去川芎以和之嗽加橘紅貝母欬如麥冬

百合酒加白木菟豆食難消化加砂仁穀芽血俱虛合

四君子湯隨證調之切禁寒涼傷犯脾胃之藥專力資培綴圖

平復可也。人參白木茯苓各二錢甘中一錢

新防艾葉煎湯法如麻後發瘡多緣生水澡浴太早水氣留泊肌

腠而發但須日以此方洗之不可用瘡甘朱重塗

水痘者色淡漿稀故曰水痘色赤者曰赤痘大連翹湯解之即大

欬去牛豆力

烏頭湯十治歷節痛脚氣痛寒疝痛風 麻苳芍 甘酪三川烏

五枚 治風冷脚痺疼痛不可屈伸 烏頭細 蜀椒各三 甘秦附

烏欬五 治七氣藏府虛冷心胸氣上勞乏不能飲食

半參木桂附沉各一厚朴二兩橘三分○姜煎

乾姜黃芩黃連人參湯法如亦有浮久而成痼者宜之

苦根艾葉煎湯法如麻屬火候最易墮胎若初孕正出時須驗其

色之紅淡熱之重輕而與疎解疎解之中佐以清冷滋血安胎為主

四物湯加條芩艾葉荊芥紫蘘之類若胎氣上衝急用之方

磨檳榔續進以降之。一切實脾行氣溫燥之藥礙麻疹傷子氣宜禁

雙和湯 即四物湯加黃芩肉桂甘中姜棗一麻患既平形體羸

瘦精神倦怠飲食減少或欬嗽不止或便泄不已或身熱不除皆真元

虧損恐成勞瘵並用此方去川芎以和之嗽加橘紅貝母欬加麥冬

百合酒加白木菟豆食難消化加砂仁穀芽血俱虛合

四君子湯隨證調之切禁寒涼傷犯脾胃之藥專力資培綴圖

平復可也。人參白木茯苓各二錢甘中一錢

各二錢

新防艾葉煎湯法如麻後登瘡多綠生水澡浴太早水氣留泊肌

腠而癢但須日以此方洗之不可用瘡甘茶重塗

水痘者色淡漿稀故曰水痘色赤者曰赤痘大連翹湯解之連翹

飲去牛黃方

烏頭湯千金治歷節痛脚氣痛寒疝痛風 麻 苳 芍 甘 棗 三 川 烏

同銘方千金治風冷痺痺疼痛不可屈伸 烏頭 細 蜀椒各三 甘 棗 附

五爪龍本草烏欬毒ヤブカヲシ清熱解毒本草

半夏散厚治七氣藏府虛冷心胸氣上勞乏不能飲食

半參木桂附沉一厚朴二兩橘三分○姜煎

歷節痛 蒸菜

アチラフミン

○ 乾姜黃芩黃連人參湯法如亦有浮久而成痼者宜之

○ 苦根艾葉煎湯法如麻屬火候最易墮胎若初孕正出時須

色之紅淡熱之重輕而與疎解疎解之中佐以清冷滋血安胎

○ 四物湯加條芩艾葉荊芥紫蘇之類若胎氣上衝急用

磨檳榔續進以降之。一切實脾行氣溫燥之藥礙麻痧傷子氣

雙和湯 即四物湯加黃耆肉桂甘中姜棗一麻患既平形

瘦精神倦怠飲食減少或欬嗽不止或便泄不已或身熱不除

虧損恐成勞瘵並用此方去川芎以和之嗽加橘紅貝母欬加

百合酒加白朮菟豆食難消化加砂仁穀芽血俱虛合

○ 四君子湯隨證調之切禁寒涼傷犯脾胃之藥專力資培

平復可也。○ 人參白朮茯苓各二錢 甘草一錢

○ 新防艾葉煎湯法如麻後登瘡多綠生水澡浴太早水氣

腠而發但須日以此方洗之不可用瘡甘末重塗

○ 水痘者色淡漿稀故曰水痘色赤者曰赤痘天連翹湯解

飲去牛膝方 烏頭湯十治歷節痛脚氣痛寒疝痛風 麻 苈 芍 甘各三錢

○ 同銘方十治風冷脚痺疼痛不可屈伸 烏頭 細 蜀椒各三錢

○ 五爪龍本烏欬本 清熱解毒本

○ 半夏散本 治七氣藏府虛冷心胸氣上勞之不能飲食

○ 半參木桂附沉 厚朴二兩 橘三分 ○ 姜煎

ヤブカニン

歷節痛 ○ 蒸菜

婦人產前

○津田玄仙曰婦人妊娠中服帶ヲセバ極テ安産也試驗ニ果然後藤香川モ此論有云
○賀川玄悦曰婦人受孕經畢後十日之間為其候矣過之已往後經復動不能
作孕也其免之期初孕者滿三百日則免如經產者二百七十五日折衷其旬
而計之可以不失其大要焉矣○始孕三旬則病阻蓋以後經不能行而及
期病也或頭微痛或心中憤焉或解惰不欲執作至四十五日若五日益熾
其大凡其人脉類數惡寒發熱頭痛口渴嘔吐咳逆上氣不食腹痛下利
耳鳴煩悶或欲嘔酸果實多臥少起其疑似疫者當按三部而後發決
○又曰經畢後七十五日候孕與否可決凡孕者其指頭之脈或倍於寸中氣衝之
脉或倍於寸口是謂三部之脉○按三部而不得決者候之腹右手循膻而拊而
下之至于天樞左手起自橫骨之際微推而上之則臍下任脉之經脈之然有物
起其指下按之隱然有氣力焉者乃娠也凡按腹者候之肌膚之間故其手宜
輕否則胎氣逃散不得見矣輕而拊下之而臍下之肌膚礪指者乃娠也凡
孕皆存橫骨之際大抵始身過七十五日則見其大僅如獨栗子但又須兼按
氣衝乃決之矣

前產

○又曰左腹下為血室右腹下為委食之府故如血塊腹脹者率居于左邊而按之或者數塊累之焉偶當任脉者亦切按之其物凝然膠結愈深愈固可以一按而決矣故按腹右得者定為燥屎左得者定為瘀血必無不中者

○又曰假如八九月不見其經者試令不轉側而直起座若能之者是非妊娠也

○又曰任脈虛成一道者寧胎之候也○凡孕婦忌數浴孕至九月法當漸浴

但以熱湯濡巾拭之可也○凡子在胎其頂當橫骨上際而倒懸而胎高而

九月也漸陷而其頭入於橫骨之中故腹橫骨之間按之而不可容指則

不逾十日而免○凡臨產之脈宜浮數強夫產難脈亦貴按之而有力者

○水瘕見点之時已水瘕力催斗登又出才後瘕如長不心力

才胸腹三癸人手足心三癸也其別十一師口按

○惡阻八增損白木散或烏梅ヲ加ラ効アリ○即理中湯加夏茯苓

○本草綱目曰女人之經一月一行其常也或先或後或通或塞其病也復有交常

而古人並未言及者不可不知有行期只吐血衄血或眼耳出血者是謂逆行有三月一

行者是謂居經俗名按季有一年一行者是謂避年有一生不行而受胎者是

謂暗經有受胎之後月一行經而產子者是謂盛經俗名胎胎有受胎數

月血忽大下而胎不墮者是謂漏胎

○小言曰俗云木女ト云有又石女ト云即暗經ナリ經水常ニ不行受胎ノ時ニ下ル下ル

トツモ娠ス是ヲ墮血ト呼フ○子癩ト云モノハ娠婦俄ニ癩シテ卒倒スルヲ云

病原候論ニ出又病ニ子姪娘僵仆胎上搶心下血ノ候ト云トハ異ナリ子癩ニ非ニ母

癩ナリト雖氏其因ハ胎動ニ屬ス手足搐搦直視反張ス甚キニ至テ舌ヲ吐テ數寸或ハ宿

食ヲ吐ス又甚シキハ糞汁ヲ吐ス是ハ必死也能ク治シタルハ滿月ニ至テ母子共ニ安

穩ナルモノ多シ分娩ノ後モ癩ニナリ幾タヒモ癩ニ卒倒スル故ニ母癩ト云ナル氏子

癩癩スルノ兩三度ニ及ハハ子宮必ムル故ニ回生ノ術ヲ行フテ出セハ母ハ必救フモ

也又胎氣自然ニ墮テ臨月ナレハ母子全キモノナリ賀川家ニ從テ回生術ヲ學ハ

サレハ如斯ハ救フナラズ起死回生ノ事此一術ニ在リ習ヒ得ヘシ葉ハ浮心積ノ屬ナレ

氏羚羊角湯ヲ用ヒ來ル奇驗アリ

○羚羊角湯治子癩 羚羊 木通 橘皮 厚朴 吳茱 乾姜 烏頭 右水三合煮取一合分服

○大金方治妊娠忽然下黃汁如膏或如豆汁胎動腹痛○黃芪 兩

前產

川芎一 糯米合 右三味煎服 醫通

受胎二月分リテ之ヲ病ハ三月目ノ經水ノメクラトシテメクルフ不能ハ此時マ
ス、甚ク四月メハソク止モノ通例也又一向ニヤマヌモアリ又四月ニテモ止ヌハ其人ハ
塩梅所アリ醫書ニ脾胃虛弱ト云ルハ面白カラス八九ヶ月ニ至テ此証ヲ登ルハ凶候
ナリ是ハ妊者六ナリト持前血氣不順ノ人ニテ八九ヶ月ニ至リテ經行メクラト云ル見
ニ故ニ胎ヲ育スルカモナク胎勢ナク皮肉薄クテ胎モ皮下ニ墜クメクト云ルニ應スルモナリ津
液ノナキニ甚危キ症也モノ多シ油断スヘカラズ惡阻經室ハ敢テ婦人ノ虛實ニ限ラヌ
也

○

懷孕六七箇月或八九箇月忽見身胎殊乱動三二日間或痛或上或有
水下惟腰不甚痛胎未離見山邊文伯產育編曰弄產弄產名未和所出

○

臨產一箇月前有勿心然腰痛却又不產名曰試月又各試胎日

○

孕婦腹痛名胞阻須審其痛痛在心底之間多屬宿食宜橘皮大黃朴瀉湯
或痛在腰腹之間多屬瘀血胎動下血須防胎墮宜芎歸膠艾湯或痛在
少腹之間多屬痰水腰冷小便不利茯苓乾姜白朮甘中湯或大小便閉少

腹痛劇峰密芒硝煎溶以攻之經曰有故無損是也

○

凡妊娠一切凶危之候面赤舌青其子必死面青舌赤口中沫出其母必亡若面唇
舌俱見青色口角兩邊流涎沫者子母二命俱不能保也

○

未產腸先出名曰盤腸生兒將免時腸自在產上邊見已產下其腸自收若不
收者多將淨盆盛溫水寒天則熱水少入香油養潤待兒并胞衣下時產母畧
仰臥從其吸氣引而上之須用女人輕巧者香油塗手徐徐送入或將醋半盞水
七分調停喫產母面每喫一縮三五次盡收又有兒并胞衣下後膀胱壅出
產戶者同前法送入兒後速施之有效

惡阻

諸藥不效者用二陳湯兼服一味胡黃連丸奇驗

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

○津田玄仙曰初産陰門上ノ交骨開カテニ當飯川芎髮灰麝香敗龜板右五味ヲ煎湯トナシ用ユヘシ交骨開ケテ安産スルヲ妙ナリ

○又曰横産逆産ニ兩足ノ小指ノ先ヘ小艾三ツ許リ灸スベシ

○又曰難産ノハヤメニ麝香一味ハ本煎ヘカクベカラズ

○又曰産後下ガルニハ四物湯加延胡索沈香牡丹古血有テ下ラテニ六大黄ヲ加フ此藥ニテ古血トモニ下ル右五服ホドモ用ユベシ其中ニ下ルナリ

○又曰後産下ラサルニ産母ノ難産ニヨツテ血上ルヲ多シ延胡索沈香大黃當飯川芎芍藥肉桂右七味水煎シ用但シ七八服モ用ユベシ二三服ニテハ効ナシコレニテ下ラサルニハ良善ヲ大ニ加用ベシ朽タレテ下ル

○又曰産後陰門ノサケタルニ靈天蓋ノ末ヲツケベシ後門トツニナリ

○又曰兎柳痛ニ不換金正氣散牡丹皮延胡索肉桂烏藥ヲ加用甚効産前産後ノ經驗甚多シ

○治死胎不下諸藥不驗方 水銀五桂枝分 右先末桂枝和水銀温酒或米飲送下

產後生肌完膚散 賀川 治分梳瘻裂者 大蒜^{百錢} 輕粉^十 莽草^{七十三} 燒^五

右以胡麻油調塗之神效

○斷脰 賀川子脰曰凡斷脰帶有二要附脰者宜短且去血附胞者宜長且不去血附脰者長宜四五寸許須用手指扼之使其帶中黑血不得滯着而留四五寸用麻線扎紮之距紮寸許復一紮紮訖後竹刀截去其兩紮中間附胞帶須紮之不然帶中血盡忽斂縮以不便把持也如律婦雖不用紮而可也 斷脰法又有初生脰

○南陽曰產後小腹上痛兮兒枕痛上云皆瘀血二屬又甲字湯折衝飲也然此類可用之八却于痛甚三六正神湯奇効アリ

○產育編曰產時胞胎既下忽爾眼黑頭眩神昏口禁不知人宜桂苓黃湯及獨龍散若惡露上衝心昏暈數次精氣脫者名曰脫榮但察其面目如眼閉口開手撒平冷六脈微細之甚或浮而散亂此即脫證非湯藥可治也

○又曰兒頭出產戶男女皆向母之穀道出女子生下必轉而仰男子必俯

○又曰產後十有餘月當無經水其經先期乳汁必眾

○又曰產後惡露露不下腹中脹痛宜桂苓黃湯若瘀血及小水俱利大便秘腹痛宜小承氣湯小便不利腹痛里宿甚宜湯○又曰產後惡露日久不斷時以淋漓當審其血色之污濁淺淡臭

穢而辨方藥淺淡宜芎藭膠艾湯污濁臭穢宜桂苓黃湯

○產後頭痛無寒熱身痛之表證又無便秘之裏證宜桂枝茯苓丸為湯用之以下皆做之

○產後左腹痛宜桂苓黃湯右腹痛而便閉宜調胃承氣湯胸滿而痛宜柴胡桂枝湯

○產後心煩宜三物黃芩湯

○產後乳汁暴湧不佳當詳其證治之無兒食乳欲斷乳者宜炒麥芽煎服

○產後乳房忽然紅腫堅硬疼痛增寒壯熱頭痛欲成乳癰也若乳兒之時乳被兒口中氣吹以致乳管不通結核名曰乳吹當早消之久則成癰外用南星半夏殭蠶白芷

皂角刺草烏頭^考末用葱汁合蜜調敷更有乳內結核如圍棋子不腫不痛但堅硬不散日久內潰謂之乳巖其證或五七年或十餘年從內潰破狀如珍珠洞穴深陷

有如山巖甚凶若乳頭生小細瘡痛謂之妬乳鹿角甘草為末雞子黃調^銅因炎最之若瘀血上攻乳房忽然細小下垂長過於腹此名乳癰宜煎煎芎藭二味湯不時飲以其餘葉薰鼻則瘕散乳即上升以上諸證多見胸膈苦滿證宜小柴胡湯若有

餘證則審證處方兼伯而散硝黃丸牛黃丸類宜擇用之

○婦人陰中作痛名小戶癢痛極手足不能伸舒當取芎藭地黃芍藥乳香搗餅納陰中其痛即定○婦人陰癢生虫若甚則體倦怠小便淋漓以桃仁研膏合雄黃末

後產

雞肝切片。熊葉。納之於戶中。其去一聞肝腥。皆鑽肝內吃食。將肝提出。其病即愈。
○婦人陰挺。多因分娩用力太過。陰中挺出一物。蛇。或如菌。或如雞冠。右之癩病類也。用蛇赤子烏梅。蒸水薰洗之。更以豬油調葱薑末敷之。無不愈者。

產後

○賀川曰。產後有二種。一屬虛證。一屬瘀血。必十日後發其病。頭痛發熱而咳。身體無所不惡。其善食而乳出濃汁者。為血虛。如瘀血則血氣上逆。其人不食。少乳。

○鎮元丸。賀川。產後顛狂者。敗血上衝也。水銀。黑錫。辰砂。各十錢。右三味以枳木片攪之。於鐵盆中。而以不見星為度。糊丸。先以寅刻服半。不已次日寅刻服之。

○南陽曰。產後ノ血暈ハ虚實ノ二種有テ。實ナルハ死症ニ非ス。必生ク其看法ハ顔ヲシカメ當ヲ嚙頭ヲカツカツト云ナカラフ仰ケニソリ反リ手モ握リナトシテ。萬事陽證ヲ見ス也。必驟キ驚クヘカラス。禁暈術ヲ行ヒ右側卧セシムルハ再發セズ。此術ヲ知ラスニハ心下（小腹）ヨリズキト升ル動氣ヲ能押テ中位ノ枕ニ横ニ右ヨリニシテ卧シムヘシ。脚ハ伸テ上ル左足ヲ下ノ足ノ前（打越）セテ陰戸ノシマルヤ。ニスルノミ是瘀血ノ血暈ナリ。但胞衣未下シテ發暈スルハ惡証トス方ハ三黃湯抽刀散ヲ服スヘシ。水服シテモヨシ。其跡ハ巫神湯ニ折衝飲ニモス也。脱血ノ血暈ハ當ヲ嚙スニテ口ヲ明キ頭ヲ俯シスルト引込レル如ク脈沈伏ニテ

九

產或八手足厥逆，是陰症，必死也。○產後血熱，甚三十八外感，可扶公力下。

○芍藥湯 治產後下利及經閉帶下，氣足冷時，發熱乾噎，食臭，心腹妨脹，雷

鳴切痛，下利不止者。芍藥、芍附子、乾姜、縮砂、丁香、甘草。

右六味以水一合半煮取一合。○若下利數日而浮腫者，實脾飲也。

○通乳方 香川 桔果、大蘗、中蘗、小蘗、甘草。

○月方 王不留行、穿山甲、桔梗、枳甘、芍。

○津曰翁曰：產後五心煩熱，目眩耳鳴，口燥咽乾，面色赤白，怔中驚悸，自汗周

身麻痺，潮熱，健忘等之症，數日不止，補攻清滋之諸藥不効者，是陰戶

風入之症也。此元氣欲食，亦二子細十十七十一，全匱之三物黃芩湯奇驗。

○山邊文伯產育編曰：胞衣素無不下之理。兒既出戶，即不斷臍帶，以帛裹兒，居于產

母臂尻之側，令母寬心安意，少頃，母覺腹痛，將胞下候也。乃下胞之人，促臍帶，緩急隨

呼吸而引之，則出。萬無一失，或不用此法，亦寧靜待時。時至則胞自下。今胞不下，由俗習

失常，其因穩婆慌忙逼迫，產母聽從努力，為之氣力羸備，兒既生下，急緊約帶，腹中閉塞，

氣不升降，家人喧鬧，其躁如奉漏沃，性故氣逆不能下胞。夫胞下兒，本可連綿之物，必當

續下而截斷之，故連綿之氣，離于左右，因不得下。假令蚯蚓在地中，半見地上，人將出之，徐々

引之，則首尾皆出。若急引之，則其半斷絕在地中者，終不可得而拔焉。然胞當下之物，如誤

斷臍帶，亦唯令產母寬心安意，高枕蓐卧，則自下。世不曉此理，若胞下小遲，則家人驚

怖而迎醫，醫至診曰：元氣虛，曰氣血兩虛。投四物湯大補湯類，兼以獨參湯。其言曰：

若胞不下，則致危急。家人信其言，或符水咒說，以求愈乎。淫昏之鬼，產母聞之，其氣畏

怯，上逆益熾，遂為之昏沈，不省人事。或胞不下，胸腹脹滿，喘急難治。俗斷臍帶，必先

急繫之，以物鎮住，益恐其或上衝也。殊不知胞衣本無上冲之理也。世謂胞衣上衝心而死，

蓋保護失常，氣逆而死也。其謂不繫之則上衝心，亦守己。唯是世人陋習，中心不安，且憂

且疑，其胞不下三四日間，其帶腐爛，則大驚怖，生血暈。家人固章，益緊約帶，令坐產

椅，合臘醋，啜面，或呼叫，心氣錯亂。醫亦徒束手，以待其斃。悲哉！余為之不得已，論

其治法，後來君子，勿輕視之。余所謂手法，并治試之，然後果可論。其是非矣。夫胞衣

不下，不同白數多少，令解帶蓐卧，作桂苓黃湯，兼浮石丸。睡則食，飲則飲，

隨其所好。此法朝用則夕下。若不下者，次日往而診之，必滯于陰內，則拔去之。假令臍帶

腐爛，經五六日，或十餘日間，亦用前湯及丸。臭穢自從前後下，其臭撲鼻，而難聞矣。

若保護失常多過，母力既脫，非治之所及，能審別治否。最為要矣。凡子既危，而胞衣

後產

尚在腹內。瓜熟而蒂未離之時。特至則下于少腹。而下之有手法。其法以手循臍帶而上。以中指受其衣。輕覆衣中之血。從容俟之。而會其本可下之物。不拘俗習。任自然。則不用手法而自下。或問云。謂血入衣中。脹大不能下。然否。余答云。胞衣在腹中。亦必自縮小。不知脹大。失其不能下。日脹大者。徒用藥汁。或進飲食。束帶制之。故閉塞而二便不通。因致之耳。熟于用方法。利前後則安。胞未下而奔血暈。先手法鎮血暈。投湯藥。血暈能治。則自下。或手法下之亦佳。又胞衣出子宮過半。滯於陰內。二三日間。比遠不者。其形腐爛而大。又過五六日間。愈爛水氣下。故縮小。假如鮮魚之腹。固密而小。經日腐爛而大。復經日倍腐爛。而失其形。實不異于此。余教療產婦驗之。又婦因產難。或保護失常。精氣殊脫。世醫所謂大虛之類。胞衣不下。二三日間。誤急下之。則死。其治之。先令產母守臥。頻手桂苓黃湯。及獨龍散。二時許。而察其聲氣色。精氣稍復。及以手法下其胞可。又手前方。高枕守臥。安意熟睡。則衝逆能治。故二日間即下。

○又曰產後玉門不開。手桂苓黃湯。而除瘀血。則清血充暢。其不開自治。亦有初產因傷必腫疼。煎甘草湯洗之。其腫傷自平。或肛門挺出。葱白者熟。以帛裹之。蒸肛少頃。而後以手法收之。

○又曰臨盆危後。不起。則不血暈。其不起而昏迷暈。心下至少腹。輕以按搗。數次。自然活。宜一桂苓黃湯。及獨龍散。

○通乳方

露蜂房

十五錢 五錢生 姜炒五錢霜

穿甲

桔梗

右醴服

諸症

○津田子曰仲條家秘本ノ中ニ婦人ノ痞積ヲ治メ神効ノ奇方アリ

蕪人散

婦人一切ノ良方産前産後ノ諸病一切ノ血ノ道經水ヲ順流メ子ヲ生ス

當飯

三兩一夜
酒三浸焙

川芎 二兩

白朮 三

白芍 二兩

酒二浸焙

黃芩 二兩

木香 五

甘草 五分

右細末温湯下後方正氣散ト相對メ利ヲ得

正氣散

治痞積之神方

楨榔子 三兩

莪朮 二兩

丁子 一分

右細末温湯下

此ニ方常ニ六分ニ調ヘ持ナリ蕪人散ヲ用ル時婦人痞積アルニ六蕪人散ニ

正氣散ノ粉三分一ヲ加ヘ入ル妙ナリ痞甚キハ各半ニ調ヘ用ベシ猶モ痞甚

キハ正氣散ノ煎湯ニテ各半ノ粉茶ヲ用ベシ婦人一切血ノ方痞積最上ノ妙

方ナリ初メハ薄茶一服ホドウ、用其後ハ一服半ホド三度ニ及フトキハ二服ホ

ド用ヘシ初ヨリ強ク用ユレバ單テ効ナシ惡血ヲ追ハライ血ヲ順ス○惡血流リ

滯テ諸病生ズコノ茶ヲ用ル寸ハ血ヲ順シ肥息火ナリト云

玄云右ハ仲條家秘本ノ全文ナリ予亦コノ方法ニツイテ試驗ノ一條アリ

婦諸

傳本ノ如クニ調合シテモ又煎湯ニシテモナルホト奇効アル方ナリ然レモ婦人ノ痞積ハ勿論一切ノ諸氣滯氣鬱ヲ兼テ患フルモノナリ中六七人ハアルモノナリ譬氣滯氣鬱ノ症ヲ兼ストモ氣道ヲ順ズルハ治積不易ノ法ナリ故ニ本方ノ藥人正氣ノ二方正氣天香湯ノ中ノ烏朮香附子ヲ少シ炒リ三合シ煎湯トナシテ用テ見ルニ其効更ニ奇ナリソレヨリ家傳三合湯ト名ツケテ婦人ノ血滯積聚ノ諸証ハ勿論男子久積虫癖氣鬱等ノ諸証ヲ治メ頻リニ神効アリサテ藥ノ増減ハ時ニ臨ニテ宜ニ從フベシトハ血虛ニハ方中ノ芍藥ヲ倍シ虫癖痞積ノ諸症ハ了子莪朮木香檳榔ヲ倍シ芍藥芍ヲ減シ甘草ヲ去リ氣鬱計ニハ天香湯ヲ倍スルルイ是レナリ餘ハ推シテ知ルベシ

三合湯 香附一烏朮^{各二錢} 陳^二蘗^二 干姜^四 當歸^三 芍^四 朮^三 白芍^三 苓^五 木香^三 檳^一 莪^二 了子^二 甘草^一

前方坐藥 治其婦人久不產陰中隱々如虫嚙冷々如風吹或轉^胞不通或胎子慣墮者 硫黃桂皮芍藥了香

玄仙曰我カノ灸法ト 其婦人ノ左右ノ幅ヲ取リ其寸ヲ三ニ取三兩ノ形ヲナシ其婦人ノ臍ニ灸ス 處ニ五十ニテ灸ス

後方坐藥 治其經閉痰帶下不斷或濃淋下疳腐臭不可近陰中突出如菌子如雞冠不堪煨痛者 桃仁大黃礬石龍腦右三方細末以絹袋盛大如指束內

陰中坐臥任意勿行走急小便時取出更安新者耳若夫前方惟宜溫道下體之氣而後方則下瘀血及青黃濁汁以其諸症漸退為度 後藤氏帳中遺稿

婦人姓辰不可訣者用苦薈末一二錢湯調下若姓娘者必腹痛是其驗也

了香飲 治婦人血積或帶下吐沫上氣腰冷時寒熱欬嗽方

香附子^二 乾^一 菴^一 石菖根^一 當歸^八 丁香^川 芍^一 紅^花 水煎或如阿膠

坐藥 治女人赤白帶下經日不止者方 杏仁甘草^{各三} 丁香^一 枯^一 礬^一

此腦五厘 右五味為末盛絳囊納藏中三日一換 囊如細指大以系繫視小解則出之 而再納若覺微痛者 赤白淋露者先用甲字湯逐瘀滯而行坐藥了香飲香 姜湯又有大小柴胡主之者

諸婦

○清心湯 治婦人一切經水不調逆上 當芎芎大苓連沉香附
縮桂丁紅木香芍 右末味振出

○甲字湯 即桂枝茯苓丸加甘草生姜 ○婦人為病屬瘀血者什之八九
經閉腰脊痠痛急引脚新舊腹痛或天氣陰睛頭痛頸強發作有時不係
與積者皆屬于瘀血外施鋒鍼刺絡出血者為良又治產後小便不利
水腫病屬瘀血者有驗或加附子手足引痛之證為瘀血結滯之因中
風偏枯歷節風痛癱瘓痛脹滿麻木冷痛濕痺男女并通用又加
或烏頭有塊者加薑甲腸癰加薏苡仁膿既成者更加大黃

○巫神湯 治婦人血暈昏厥或振寒小便不利上衝頭眩惡心或嘔或吐產後諸
証婦人百病運用多端 ○即五苓散加乾姜黃連木香

○香姜湯 治赤白帶下方 ○香附二錢芍藥一錢乾姜六分甘草二分右味煎
凡帶下腰及脚冷痛牽引者帶下數年眼目腫子散大殆似內障候者不可必
為血虛之候而行補血之策其治在下氣之方及芎藭主之若夫數年患之

臭惡不可近廁中之氣及窓外者為難治又面目四肢羸瘦無大肉潮熱
盜汗雖止婦然難救療况先經赤白穢物有臭氣者別是一證藏内生
蝕瘡下膿汁也必覺隱痛不可以破血補血而處置自其因懸隔

○腰脊痛 經來腹痛

經行不足或閉不婦人腰脊痛六此大絡二瘀血結滯又

凡故三寸委中ヨリ出血ニテ此絡ニ痛ノ除テ有 ○經ノ來テニ前日ヨリ腹痛ニ

或寒熱ヲ發スルモ有俗ニ出ト云即九痛ノ一ニテ經來即腹痛ト云也多ハ

胎孕ナリカ又ル治方ハ破血ノ劑十左驗ナキモノニ地黄丸ヲ用テ宜テ有其人ノ

虛實ニテ痛時ニ桂枝茯苓丸料ヲ用テ經終ル止テ又來月ノ經行ニ用テ數

月如此ニ連服ニテ止テ有又捨テ置テモ年ヲ經止モ有桂枝茯苓丸折衝飲温

經湯ヲ運用スニ又壯年ノ人ハ偶ニ胎ヲ受ルテ有夫ヨリ出虫ノ止モ有

○滯下矣 八膠 或ハ下膠中節ヲ又キ又キニテスル

○陰中生蟲者內難肝之法有產後條

婦諸

○產音編曰。婦人陰中有肉突出者。名曰陰痔。俗稱茄子痔也。流硫黃水易治。流白水難治。用烏頭燒存性。醃醋熬煎。○婦人陰冷。久之血凝。凝滯。多變他證。且難於受孕。內服八味丸。外以遠志。乾姜。蛇床子。吳茱萸。研細綿裹。納陰中。日二易。○又曰。婦人陰吹。陰中時々氣出有聲。如穀道轉。失氣狀。金匱謂穀氣實胃氣下泄。用膏髮煎。即精膏煎。丸髮服也。

○婦人經閉諸治。治不効者。以龍骨麻油煉如小指大。納子宮內。驗。

○雙白丸。春治白帶如神。石灰。西。白茯苓。西。右為末。水丸。每服三十九。空心白水下。

○治赤白帶下。蒼朮。麩。不抱。多少。用雞子清。為丸。每服三五十九。白湯送下。即愈。

○乳岩。八最初。至下小核。時ヨリメキツハリトカド。十指。三押。操時ハ肩ノ方ヘツキトヒツナリ。遂ニ六腕ヘモヒツクモノ也。何トナク氣分モ不宜。唯ノ核トハ違テアルモノ也。木槿。木。具スベテ乳核ハタ。マルキカ。或平タク。ノ角ナキハ。害ナシ。少シニテ。毛角立タル處アリテ。肩杯ヘヒツクハ。油断ナラズ。隨分氣ヲ散ス。振ニメ内外ノ治法。懈ルヲナカレ。

○消乳腫。取水仙根。絞汁。敷患處。效。

傷寒

○大承氣湯。和氣ヲ發表ノ藥ナドニテ上。一ツリノボセ頭痛最モ強キ症ナドニ沈香ナドヲ加テ輕ク用ヒ引サグルヲアリスベテ承氣ノ類引サゲノ為ニ輕ク用ルヲアリ。茶。終。

○病人素ト元氣虛弱脾胃カイナキ人ニ只ガタノトフルイ手足ガ冷汗ナキ證アリ。ア時ハ補中益氣湯ニサシヒキメ虛弱ヲトリタツレハ汗出ルモノナリ。茶。終。

○體厥ハ此證黑胎芒刺ヲ生シ裏証甚キヲ苓連ノ如キ只清熱ノミヲ用テ斬ルイ療治ヲシテイル時ハ熱結内ニ極リテ假リニ寒冷陰ニ似タルスカタヲアラワスナリ。ア証ヲ見ワクルニハ右ト小便トナリ。茶。終。脈厥是理上下同シ是失下之誤カ抑火ノ誤カ也。

○スベテ大黃芒硝ノ如キ下藥ヲ用テ諸証ハダシクヨクナレ只黑胎バカリ残りテ去ザルモノアリ是ハ胎ガ厚キユイナドニトレカ子テ只右ノ上ニアルナリ後ニハ自然トハゲルモノナリ疑テ又下スベカラス。茶。終。

○近時一種之疫アリ無右胎發熱惡風指頭冷或煩渴好熱湯潮熱下利譫語或清穀下利熱毒甚ト至モド下ナク陰態アリ是ニ柴胡合逆湯ヲ用テ奇驗アリ。小言。

○太陽證ハ頭痛項痛腰痛ニ強キハ折ル様ニ痛ム。ア者リ陽明ノ證ハ目痛眉骨

傷寒

痛鼻乾リ少陽ハ腹痛耳聾寒熱嘔而口苦シ

○戰汗ニモ死證アリ先ツ戰シテ汗不出ハ明日又戰スヘシ其時汗出レハヨシ若汗不出ハ中氣ノ虚ニテ厥モ止ス汗モ不出シテ死ス去テカフ死スルニモ限ラ子氏急ニハ不愈津液ノメクルヲ待テムルト治スヘシ凡戰シテ瘥ヲ登スルハ死ス又潮時ノ戰汗ハ皆治ス引潮ノ戰汗ハ邪不盡總テ潮時ニ戰スルモノ也ト云余未試小言○大承氣ヲ投シ熱退テ食モ相應ニル精神瘳ノ如ク又狂ノ如ク狐ツキノ如シ晝夜不寐三煩躁ス歸脾湯ヲ投シテ翌日狂躁止テ本心也○

○傳變不常

有局外之變者皆因人而使蓋因疫而登舊病治法無論某經某病

但治其疫而舊病自愈○急證急攻○內壅不汗 表裏分傳之證以大劑麻

黃一毫無汗者裏氣一通有自能汗解○下後脉浮 裏證下後脉浮而微數身微

熱神思或不爽此邪熱浮於肌表裏壅滯也雖無汗宜白虎湯邪從汗解若大下後

或數下後脉空浮而數按之豁然如無宜白虎湯加人參按宜桂枝湯○下後脉

復沈 裏證脉沈而數下後二三日脉復沈者猶在餘邪也宜更下之○下後身反熱

應下之證下後當脉靜身凉今反熱者此內結開正氣通鬱結暴伸也不久自息

○下後脉反數

應下失下口燥舌乾而渴身反熱或四肢厥欲得近火壅被此

陽氣伏也既下厥回脉大而加數舌上生津不思米飲此裏邪去鬱陽暴伸也宜

柴胡清燥湯去花粉知母加葛根是下後身反熱義同按宜柴胡去半夏加枳

實湯○因證數攻 溫疫下後二三日舌上復生胎刺和未盡也再下之胎刺雖未

去無鋒芒而軟然熱渴未除更下之熱渴減胎刺脫日後更復熱又生胎刺更

宜下之凡下不以數計有是證則投是藥但其中有間日一下者有應連下三四日者

有應連下二日間一日者其中寬緩之間用清澹之藥○病愈結存 下後脉

證俱平腹中有塊按之則疼此邪氣已盡其宿結尚未除也此不可攻攻之徒損元氣須

飲食漸進胃氣稍復津液流通自能潤下也○下格 愈後脉證俱平大便二三日不

行時作嘔飲食不進此為下格宜調胃承氣熱服頓下宿結惡物嘔吐立止嘔吐止慎勿

驟補若少年參芪則下焦復閉嘔吐仍作也此与病愈結存彷彿彼則妙在往來蛙

声一證故不嘔而能食一安一危者在乎氣通氣塞之間而已矣○注意逐邪勿拘

結糞 溫疫可下者約三十餘証不必悉具但見舌黃心腹痞滿便於達原飲芩

黃下之按小柴胡湯 芩實為開門祛賊之法 即使未愈邪亦不能久羈 二三日後餘邪入胃

傷

仍用小承氣微其餘毒大凡容利貴早逐豈徒致糞結而後行哉勿拘于下不
厭進之說按三承氣功用彷彿然邪傳裏但上焦痞滿者宜小承氣湯中有堅結者
加芒硝軟堅而潤燥病久失下雖有結糞然多粘膩極臭惡物得芒硝則大黃有湯
滌之能設無痞滿惟存宿結而有痞熱者調胃承氣湯宜之三承氣功效俱在大
黃○畜血 胃移熱於下焦血分膀胱畜血也小腹硬滿疑其小便不利今小便不利
者責之畜血也小便不利者有畜血者胃實失下至夜發熱者熱留血分更加失
下必致瘀血初則晝夜發熱日晡益甚既投承氣晝日熱減至夜獨熱者瘀血未
行也宜桂枝湯服湯後熱除為愈畜血盡而熱亦盡大勢已去亡血過多餘
焰尚存者宜犀角地黄湯調之至夜發熱亦有痺瘡有熱入血室皆非畜血
並未可下宜審發黃一證胃實失下表裏壅閉鬱而為黃熱更不泄搏血為
瘀凡熱經氣不鬱不致發黃熱不干血分不致畜血同受其邪故發黃而兼畜血
也俱畜血一行熱隨血泄黃因隨減○桃仁承氣抵當湯瘀血ヲ去ルノ正面トスレ
柴胡加大黃ニテ治スルノ多シ畜血ノ証ハ脈ト腹候ニテ吉兆ヲサリ必死トスルノ非ス
必ス補藥ニ泥ムヘカラス其下盡ルト少クツノ食モナル脈ハ浮大洪數九モノ多シ只

心神如狂或八健忘ノ如シ熱解シテ數日ヲ經テ起色アレヒ如癡ナルノ有リ不苦
其肥立ノ姿ニテ安心シテ俊ツヘシ本復スルナリ○自汗 是伏邪中瀆氣通得
汗邪欲去也若脈長洪而數身熱大渴宜白虎湯得戰汗方解若裏証下後續
得自汗雖四五日不止身微熱甚則汗甚熱微汗亦微此屬實乃表有留邪也邪
盡汗止汗不止者宜柴胡不可用止汗之劑矣有裏証時當盛暑多作自汗
宜下之若面無神色唇口白表裏無陽証喜熱飲稍冷則畏脈微欲絕想
忽得自汗於無味者為虛脫急當峻補補不及者死大病愈後數日每飲
食及驚動即汗此表裏虛怯宜人參養榮湯○止汗ノ藥ヲ服シ度様ニ
見ヘメル病人大便秘シ古上ニ胎モ少シアラハ輕ク下スヘシ柴胡加大黃ニテ度々
効ヲ取レリ又虛脫シテ汗多キハ柴胡四逆湯ナリ○盜汗 裏證下後續得盜
汗者表有微邪也若邪甚竟作自汗設不止者柴胡湯屬虛怯者黃耆湯○予
シハク試ルニ何病ニテモ大病後ハ盜汗ハアル是ハ邪氣新ニ去リ氣血榮衛和調セ
ナリ故ナリ必ス恐ルニ不及飲食元氣ヨクハ不久シテヤム小柴胡ニテ萬ノ盜汗止セ
ナリ若シヤマスハ骨牡蠣黃耆ノ主治ナリ○狂汗 義子戰汗同因其人稟
賦充盛陽氣衝擊不能頓開故狂躁甚也○發斑 邪留血分裏氣壅閉則伏

傷寒

邪不得外透而為斑若下之內壅一通則衛氣亦從而疏暢或出表為斑則毒邪亦從而外解矣若下後斑漸出不可更大下設有下證少年氣壯下之若復大下中氣不振斑毒內陷則危宜投裏舉斑湯○此証犀角湯○此証犀角湯○此証犀角湯
黑色三升下後緩カニシテハ必死○解後宜養陰忌投參朮○用參宜忌有前利後害之不同○下後間服緩劑下後熱不能頓除當寬緩候餘邪聚胃再下之宜柴胡清燥湯○按柴胡去生夏加枯藜湯可也○下後反痞疫邪留於心胸令人痞滿下之痞應去今反痞者虛也宜參附養榮湯○下後反嘔胃氣虛寒也宜半夏藿香湯○奪液無汗温疫下後脉沈下證未除再下之下後脉浮微熱法當汗解三五日不得汗者其人預亡津液也飲食半月津液漸回方可得汗或有為戰汗者可見脉浮身熱非汗不解血燥津枯非液不汗○補瀉兼施證本應下然開失治邪氣一毫未除元神將脫補之則和毒愈甚攻之則幾微之氣不勝其攻補瀉不及兩無生理不得已勉用陶氏黃龍湯○按元補瀉兼施ハ二物ニナリテ思フ様ニ出来ヌナリ何レカ少シモ多キ方ノ症ニヨリテ方ヲ處スヘシトテモ死症ナラハ兩端ノ下ハ損ナリ熱勢クダケテ後自汗ナリ脈ヲ診セトスル時手フルくトフルルモノニ眞武湯ヲ投シテ救フ得タリ○承氣加參如人方肉食而病

適來以致停積在胃用大小承氣連下惟是臭水稀糞而已於承氣湯中加人參一味服之雖三四日所停之完穀及完肉於是方下蓋承氣藉人參之力鼓舞胃氣宿物始動也○藥煩應下失下真氣虧微投承氣少頃額上汗出髮根燥痒邪火上升手足厥逆甚則振戰心煩如狂狀此中氣素虧不能勝藥名為藥煩急投善湯即已藥中多加生薑亦可也○停藥服承氣腹中不行或次日方行或半日仍吐原藥此因病久失下中氣大虧不能運藥名為停藥乃大凶之兆也宜生薑以和藥性或加人參以助胃氣更有和實病重劑輕亦令不行○虛煩似狂此根源虧損因不勝其利元氣不能主持故然也法當大補然有急下者或下後厥回六脉至煩燥少定此因邪氣少退微陽少伸也不二時邪氣復聚前證復起勿再下之急宜峻補補不及者死此證表裏無大熱下証不備者庶幾可生○神虛謔語應下稽遲血竭氣耗煩熱謔語諸下證具而數下之渴熱並減下證悉去五六日後謔語不止者不可以當實此邪氣去元神未復宜清燥養榮湯加辰砂○奪氣不語時疫下後氣血俱虛神思不清惟向裏床睡似寐非寐呼之不應此正氣奪也凡此症表裡無大熱者宜人參養榮湯莫如靜守○按熱下利其人大便素不調邪氣忽乘於胃便作煩渴一如平素泄瀉稀糞而色佳黃而已此狀和傳裏不能稽留於胃至午後

傷寒

潮熱便作泄瀉子後熱退泄瀉亦減次日不作潮熱利亦止為病愈潮熱未除利不止者宜小承氣湯利自止○熱結傍流以胃家實內熱壅閉先大便閉結續得下利純臭水全然無糞宜大承氣湯得結糞而利立止服湯不得結糞仍下利臭水及所進湯藥因大腸和勝失其傳送之職和猶在也病不減宜更下之○大膠腸閉其人平素大便不實設遇疫和傳胃但蒸作極臭如粘膠至死不結愈蒸愈閉以致胃氣不能下行疫無路而出不下即死但得粘膠一去下證自除霍然而愈○大便閉結疫和傳裏內熱壅鬱宿糞不行蒸而為結漸至黑硬下之結糞一行痰熱自除諸症悉去○溫疫愈後三五日或數日反腹痛裏急者非前病原也此下焦別有伏邪欲作帶下也○脈厥緣應下失下脈微細甚至於無○體厥身脈厥義同俱緩可用大承氣湯○虵厥疫和傳胃裏熱如沸虵動不安因嘔出此常事也不可泥胃中冷則吐虵之句○呃逆為胃寒之說不可泥各從其本證治之見白虎證則投白虎見承氣症則投承氣若果胃寒丁香柿蒂散四逆湯功効殊捷○氣復嚴正甫年三十時疫後脈證俱平飲食漸進忽於肢體浮腫別無所苦此即氣復也蓋大病後血未成氣暴復血乃氣之依歸氣無所依故為浮腫嗣後飲食漸加浮腫漸消若誤投行氣利水藥則謬矣張德甫年二十患噤口痢晝夜無度肢體僅有皮骨痢雖減毫不

進穀以人參一錢煎湯入口一時身忽浮腫如吹氣球自後飲食漸進浮腫漸消腫間已有肌肉矣凡水氣足於肢體常重氣復足不於肢體常輕為異○大病後三焦受傷不能通調水道下輸膀胱肢體浮腫此氣也子氣復懸絕宜金匱腎氣丸及腎氣煎若誤用行氣利水藥必劇見○余桂玉年四時疫後四肢脫力竟若癱瘓數日後右手始能動又三日左手方動又俞桂園子室所患皆然○古白胎漸變黃胎和在胃家舌上黃胎胎老變為沉香色也白胎未可下黃胎宜下○按黃三九上直三下三六早白胎八藥汁十上七毛漆リテ黃ヲナストト胃ニ集リ各ヲ見テ今日下セト思ハ一日七延テ下七八根ヲ枚キル如クニル○古黑胎有黃胎老而變焦色者有津液潤澤作軟黑胎者有舌上乾燥作硬黑胎者下後二三日黑皮自脫下後裏證去古尚黑者胎皮未脫也不可再下若誤下舌反見離之黑色者危急當補之又有舌上俱黑而無胎非下證也陰證之舌也妊娠及見此南陽曰此紫明○古芒刺熱傷津液此疫毒最重急當下又老人微疫無下證舌上乾燥易生胎刺用生脈散○古裂失下血液枯極多有此證又熱結傍流日久不治下則津液消亡在上則邪火毒熾亦有此證急下之裂自滿○古短

舌硬 舌卷 皆和氣勝真氣虧急下之和毒去真氣回者自舒 ○舌卷下失音
 此難治ナリ凶兆也小兒六枚カノ多シ ○白砂胎 一石水 胎 舌上白胎乾硬如砂皮乃自白胎
 之時津液乾燥邪雖入胃不能變黃宜急下之 ○唇燥裂 唇焦逆 唇口皮起 口臭
 鼻孔如煙煤 胃家熱多有此證固當下唇口皮起初用別證互較鼻孔烟煤疫毒在胃
 下之無辭 ○口燥渴 更有下證者寧之 ○目赤 咽乾 氣噴如火 小便赤黑涓滴作痛
 小便極臭 揚手躑足 脈沉而數 皆為內熱之極下之無辭 ○潮熱 和在胃有此證
 宜下然又有不可下者熱入血室与神虛謔語似裏非裡 ○善太息 胃家實呼吸不
 利胸膈痞悶有此症 ○心下滿 心下高起如塊 心下痛 腹脹滿 腹痛按之愈痛
 心下脹滿 以上皆胃實也 ○頭脹痛 胃家實氣不下降下之頭痛立止頭痛別無
 下證者未可下 ○小便閉 氣結不舒大便行小便立解 ○大便閉 轉屎氣極臭 更有
 下證下之有血液枯竭虛燥者宜密煎導 ○四逆 脈微 體微 皆陽微也 屬氣閉可下下後凶也
 ○發狂 胃家實陽氣盛也宜下之有虛煩似狂有狂汗勿誤 ○凡陽證似陰外寒而

內必熱故小便血赤陰證似陽格陽之證也上熱下寒故小便清白但以小便赤白
 為據以之推之萬不失一 ○舍病治藥 ○舍病治藥 ○輕疫誤治每成痼疾

○支體浮腫 此條吳子有詳論 潮熱シテ渴シ古黃心下滿悶時二腹痛之脈數九八下スヘ
 シ一身面目浮腫シテ喘急ノ證ヲカ子小便不利スルハ疫ニ水腫ヲ合病ス其疫ヲ
 治スレハヨシ小承氣ナリ又先年水腫ヲ患ヒタルカ疫ニヨリテ又腫タルハ治療ハ疫
 ニアリ此ニ脚氣腫滿ヲ登スルアリ 腰脚弱クナリテアルヲ疫後故ナリト誤ルナカシ
 又愈テ後數日足ヨリ浮腫シテ小便不通段々心腹ニ至ル是ハ水氣モアルハ脚
 氣ト見分テ肝要也又愈テ後數日先自足腫シ小便不通シハサシテ少クモナリ
 通身浮腫スルニ喘モナク別ニ煩シキ所モナキハ氣復ト云モノナリ蓋シ血氣ノ依
 リ歸スル所ナリカ氣ノ方カ血ヨリ先キニ生スルトヨリトヨナキ故ニ暫ク浮腫シテ居ル
 靜養スルト自然トナラレ ○裏症下ヲ失シテ面目浮腫及肢體マテ微腫シ小便自
 利スルハ表裏ノ氣滯ル也水ニ腫タルニ非ス且承氣裏氣一タニ疎シ表氣一タニ煩ス
 レハ浮腫頓ニ消ス絶穀ノ後故ニ脾胃虛弱ト云ナカレ誤リ補ヘハ必ス大切ニ及シ
 ○一商人患疫ニ三度下シテ愈ト云ハ氏餘和ニ三度聚リテ再復後ニ戰汗シテ愈タ
 レハ微邪ノコリテ餘熱サツハリトセヌ又柴胡加大黃ニ漸ク去シタル日數延引シ

傷寒

予ケリ食モナリニ至リテ通身浮腫又他ニ苦クナシ身無微熱行歩ニカノナキノニナ
 リ桂枝加苓朮湯ヲ予ヘテ三日ニ腫消シ平復ス○一士人ノ室潮熱舌黃身痛飲食
 乏シク夜ニハ譫語スト云足ヨリ浮腫シテ及周身面目家人等驚キサハク瘡醫以
 為疫ト木ト合病ス不可救予ニ乞フ脉沈伏ス時乾嘔粘唾唇口皮卷テ下ヲ失フナリト
 大柴胡ヲ予フ一日ニ二三下スルト兩日ハカリニ熱降ク腫ハイツナク消シテ全快シタリ○
 勞復 因妄動遂至發熱前證復起惟脉不沈為辨輕則靜養可復重則大補氣血
 ○食復 吞酸作嘔或心腹滿悶而加熱輕則損穀自愈重則消導方愈○自復
 以伏邪未盡也撤其餘邪自愈○瘧疫兼證 患瘧續發疫證者以疫法治之患
 疫續發瘧證者以瘧法治之○發熱反加頭疼身痛脉浮者宜白虎湯汗
 之服湯後不得汗者因精液枯竭也加人參○汗下後表裏之證悉去繼而一
 身盡痛如被杖甚則不可反側周身骨寒而痛非表證也經氣漸回身痛自
 愈 以上吳又可之論
 ○戴元禮曰婦人病中經水適來或經水失節此為熱入血室其血必結故使寒熱往來
 如瘧晝則明之夜則譫語宜小柴胡湯或加生地黃

○一高商專疫ヲ患ヒ一醫達原飲ヲ用ヒ五六日ヲ經テ同篇也仍テ
 予ニ乞フ之ヲ診スニ脉浮大數惡風發熱頭汗自汗飲食ハ様子ニ合
 テハ少シ予以為可治即桂枝加葛根湯ヲ投シ其表ヲ攻ム又五六日ヲ經
 テ同篇也此時ニ右胎黃ヲ帶フ少シ下スベキト小柴胡加大黃ヲ予ヘテ二行
 微利シテ自汗益々多シ脉浮大ニテ眼目無神口渴シテ熱湯ヲ好ミ右
 上砂ノ如シ呼吸セハシク呼ハトモ不答大ニ驚キ可救ノ策ナシ何故ニ如斯ナリ
 タルト尋ヌルハ先刻惡寒スルヲ甚シク戰汗ニモナルヘキヤト思フウチニ如斯ト
 云今更戰シテ汗ナキハ虛ナリト思ハトモ予ヲ束子テ逃レ歸ル其夜半死ス
 ○一士人ノ室疫也教醫ヲ經テ予ニ乞フ診之耳聾スレテ熱少シ只煩シテ胸
 中安カズ時嘔シテ舌ハ胎ナシ粘痰ヲ唾シ時々惡寒ノ氣有テ足冷テ
 足袋ヲハリ食ハ希粥ヲ食スレテ少シ精神多シカニテ挨拶モナリ脉微數ニ
 予澤テカハ少ナシ 小柴胡加 附子症也 予思フニ可治ト仍テ黃連湯ヲ予フ無驗

傷寒

云有ニシテ小柴胡ニ轉ス又無驗煩躁甚シリ可下蓋カト工夫ニ下症ナ
シ仍テ竹茹温膽湯ヲ与フ又無驗其ウ十次第ニ痰レテ今ハ難治ト云不
數日死ス

○一士人ノ室夜ヲ患フ兩耳聾煩燥純熱渴之ヲ甚ク熱飲ヲ好ム舌上黃胎ニ
シテ離々乾燥シテ舌ハ齒ヨリ外ニ出ヌホドホマリ言語分ラズ空語ト氏
何ノイワレハ知レズ食ハ糊飲ヲ与ヘテ口ニ入レハ飲ム故ニ藥ト入レ替ニ蛤殼
ニテ一ツ位ツ、ハ吹キ込ム前板齒ニ垢ツキ飲食ノ滓ヤナト乾着シテ反カヘリ
テ黒シ脈細數ニテカ無ケ宅猶胃氣アリ腹ハ春ニツケ凡動氣ハ少シ十分承
氣ト思フ前醫ノ藥ヲ見ルニ大柴胡ナリ大便ニ日ニ度位滑便ナリ仍テ
枕元ニ暫ク坐シテ着ルニ少シ手ヲ出スと思ヘハ直ニ夜着ノ中引込ム所惡
風ニ似タリ仍テ足指ヲ見ルニ少シ冷ルニ似タリ小柴胡ニ痰苔四逆ヲ合方
ニシテ一貼ヲ与フ翌早朝ニ診スルハ不思儀ニ舌上潤ヒテ齒ノ垢如矢仍テ

又ニ貼ヲ投ルニ諸症益穩ニテ三四ヲ経ルト言語モ分カル猶前劑ヲ与ヘテ
十四五日ヲ経テ苦勞ナシト云ニ至リ經ニ本復セリ○按既濟湯如柴胡亦可

○鄭湛若赤雅云。方土脉疎。地氣外泄。人為常燥所燥。膚理不密。而疎相感。草木之氣通
焉。上腕鬱悶。虛煩。下體凝冷。吐之不可。下之不可。用藥最難。且温中固下。外降陰陽。及灸
中脘氣海三里。或灸大指及第五指。皆能止熱。予試立驗。

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

中風 痿厥 瘳 健忘

○津田子曰四十以上ノ人無病ナルニフト洪大ノ脈ガウツツ有リ是レ多クハ中氣ノ崩シヤリ速ニ灸治服茶ヲシテ其前兆ヲフセクベシ

○勻氣散 元氣飲食常ノ通ニメ只口眼ニガミテ中風ノ如クナル證ニ用テ効アリ又虚人ノ病氣ヲ治メヨク効アル方ナリ 茶然

○言曰卒中風急ナルハ何事モ無キ人卒ニ倒レテ人事ヲ省セス大声ニテ其名ヲ呼トモ不答即死ス又鼻息漸シテ快寝シタル人ノ如ク頻ニ欠シ大汗如流スル有リ痰沫ヲ吐スル有リ穢物粘黒ニテ煤モ非スヨシ粉ヲアツノ如キヲ吐スル有リ是ハ猶更必死也又喘スル有リ脈洪大弦牢ニテ指ヲ敲スル如ク薬水ヲ口ハ入ルニ之ヲ飲ム氣ナリ自然下咽ハ流レテ通セシトスル時トツクリト音ヲ高クシテ腹内ハオサマルハガシ飲ム氣ノアルナリ一向ニムセシテ不通モ有リ初ハ何病トモ知レス困ル時モアルモノナリ正面无見ルハ口眼歪斜シ人中ノ溝モユカニトシテ有リ又手足ヲ動スヲ氣ヲ付テ見レハ半身ハ伸モ屈モセスニ有リ是ヲ卒中風ト云急症中ノ緩症也二三日内ニシテ本氣ノツカヌハ夢中ニ漸々顔色瘦テ諸候衰ハ遂ニ死ス遺尿スルハ其發シタル時ニ自利スルモノ也少シ正氣ニ近キ病者ハ何ノワケモ無ク煩悶シ躁ク有リ能ク心ヲツクヘシ小便セシト欲シテ口言ヲナス仕形ヲスル精神モナリ徒ニ身ヲ悶スルモノ

右病苦ト混シヤスシ是ハ夢中ニナリタルハ何病ニモ此状ヲ為スヲアリサテ件ノ如ク卒
倒ニテ顔ノ邊ヲ自身ニ撫テ痒ヲ搔カ如キ形ヲナスヲアリ是ヨリ醒ルノ候ト医書ニ有レ凡
必ス左ニ非ス少シ輕キハ呼ハ眼ニテ人ヲ逆視テ言語ニシテ久見ユルモアレト少シモ答
ルノナラヌハ二日ヲ経テ強ク病勢ツノリ大切ニルモノ多シ始ヨリ少ツハ應答ノ
ナルハ二三日ノ内ニ少ク食氣ナト出テ醒ルヲ有リ是急症中ノ緩症ノ又緩症也又輕
キハ急ニ半身不遂ニテ言語難出テ流シ或ハ手ハカリ不仁スルモ有リ足ハカリ不仁
スルモアリ言語ニ滯ナキモ有リ手足ハ何ノ事モナク口ハカリ言ハレヌモ有リ氣ヲヨリ
手足痺レ或ハ面モ半分痺レ虫ノハフカ如ク覺ユルヲアリ大醉ノ後ニ極テ麻木
スルノ類兼テヨリ催ノ有ルナリ○又俄然トシテ眩暈倒ル脈浮強ニテ面色赤ク
手足ニ麻痺ヲ帶ヒ言古モ少シ滾ル全ク中風ナレ眩暈ヨリ發スル有リ白虎加人參
或ハ參連白虎ニテヨシ總テ眩暈ハ白虎ニテ功ヲ得ルヲ有リ○

○治中風方

棕櫚 紅花 左麻等分水煎服

○外感ノ後ニ寒熱不退シテ脚麻痺シテ漸クニ覺ナク睡ノタメニモ痒ト云ヘシ
是ハ足ノ指ヲ動カ甚テ見ルニ少シハ動カストノナルハ輕シトシ重キハ少シモ動
カストナラズ手ヲ以テ動カストキハ筋絡ヘ拘急スルモアリ日月ヲ経レハ寒

熱モ止テ他ハ苦ムヲナク平卧ス甚シキハ手臂ノ拘急スルモアリ其不經
ナルカ為ニ大肉削カ如ク飲食モ味不変言笑モ常ノ如ク見ユ是ハ中
風ト同因ニテ癥塊瘀血ノ因ニ係ル桂枝加苓朮附湯 桂枝茯苓丸ノ類ニ

附子モ烏頭モ加フヘシ芍藥甘草附子モ用ユルニ台ニマルニテ異ナリ又

年中ヲ刺シ出血シテ十ノ六七ヲ治ス○又大病後ニモ痒スナリ是

ハ血氣未復也別テ小兒ハ大病ホトニナクモ腰ノタメニ多シ日月ヲ経

テ調ヘハ愈ユ是ハ中風ニハ屬セズ又麻疹後ニ痒スハ皆浮腫ヲ帶テ喘

ノ大筋牽急ニ按セズ痛ハ是ハ脚氣ニ屬スルモノニテ痿痺ハ非ス八風ノ

灸ニ越婢加水或水防己湯ノ類外臺桂柳湯加丁桂ナリ、其ノ所ニテ是

ハ疾トスヘカラス○陰痿天賦ニテ性盛ノ夫ニ近ツク不能モノ有又半

全ナリ陰痿元ハ病ニテ氣痿ニ屬ス露蜂房奇驗アリ氣ヲクキテ

癱瘓ハ其氣ヲ轉スヤウニ治スヘシ○一士人背痛ハ甚ク寒熱日ヲ輕テ
 瘵癱シテ起ツク不能ノミナラス疼痛シテ轉側シカタク葛根加附子ヲ予
 ヘテ寒熱漸ク退ケ氏瘵ハ始メ如シ桂枝加苓朮烏頭ヲ用ユ三年ニテ痛
 ミ去リ起歩スニ十四椎突起シテ龜背ニナリタリ○又昨日ニテ何ノ事モ
 ナク居タルニ俄然トシテ腰以下瘵弱シ他人ノ身ノ如クニナルアリ是ハ素門ニ
 瘵厥ト出ル病也其腰以上ハ常ニカワラス是追見タル病人一人モ治シタル
 ナシ又數年ヲ経テモ不死試ニ人手ヲ引亮ニ兩脚軟弱ニテ繩ノ如ク
 ニヨレテ坐セシメントスレハ兩足ノ跗モツレテ解ス手ヲ引テハツス骨ナキカ如シ
 後世是ヲ瘵軟脚軟ナト名ツク○兼テ中風ヲ催ス人ハ能ク睡ル狂ヲ催
 ス人ハ一切ニ睡ルヲ不能何ノワケモナリシヒルハ中風カ又ハ脚氣ノ催也又
 又瘵ヲ立テ瘵レル是ヲ死肌ト云癩病ノ漸也血色ヲ察スヘシ虫ノハ

フカ如クニテ搔テモ知レス又指ノ一二本屈ムルト手ヲソノ子ハ伸ヒス痛モ痒モ
 無キハ中風ノ漸也又肉脱シテ細ハ癩モアリ又脚氣ニモ手指ノ拘攣ス
 ルトアリ混スヘカラス麻葉ヲ食セハ一身麻痺シテ歌哭癩狂スル
 曼陀羅花ヲ用ヒタルト同シ又歩行スル度ニツマツクハ何レ脈弦大ニテ
 カヲ帶テテ熱ヲ催シタルヤト見ヘ又眩暈シテ耳ナド鳴リ項背強リ精
 神不爽何カ思慮シテ居カト云形ニウキ立ズ或欠ヲ澤山ニ健忘ノ瘵
 ヲ加ルモアリ皆中風ノ候也

○ 麻木摺藥 燒耐 辣茄 片腦 右屨敷患上煎湯ハ葛桂木附之甚



暈霍

○霍亂ハ暈也ト雖暈ハ傷暑也霍亂ハ素問ニ出病形ノ有様ヲ以名付ル
 ト諸書ニ見ユ其形ハ腹痛甚ク手足逆冷大汗出煩渴乾嘔轉筋
 六脉細伏ス老壯ノ別ナク一晝夜ホトニ死生ノ有リニテ數刻苦メハ顔色
 瘠目上陥リ半眼直視シテ速ニ死ス皆如斯病ムナレ凡其活ルハ脉細
 伏ト雖有胃氣腹急迫スレ凡腹勢アリ嘔スル内ニ宿物ヲ吐シ又ハ白
 沫如米泔者ヲ浮下ス惡証ノ霍亂ハ藥水共ニ吐スレ凡乾嘔ニ快吐
 セズ吐瀉ノ無キヲ乾霍亂ト云テ重トス救カキテ多脉脈ヲ考合セテ
 昔山ヲ云ヘシ其因ヲ考ルニ皆食傷ナリ夫故ニ吐瀉ノ有リ貴フナリ
 心腹卒痛スレ先ツ備急紫圓ヲ先鋒ニ決吐下ラレハ忽ニ手足冷
 白過リ脉モ出ツ死症ハ備急紫圓ノ力ニ不崩或藥ヲ吐ニ自然手ノ

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

喝 霍

汗ラレ又様ニ病ニ多シ夏ハ萬物腐ヤル時故厥内ニテモ消化
ニテ大府へ行カ又中ニ腐ル也元ヨリ如斯ハ田中一納置ヘカラス故件々ノ
形ニ病ハ輕キハ半夏藿香湯加朴大下リ過ルハ本方加猪縮惡心止メ
ハ加烏梅トモ有暑ニ傷レタル云氣テ寒冷ノ藥ヲ不可与甚渴スレ
死白虎ノ渴ニテナシ如何ニ平和ヲ貴ク金匱ニハ人參白虎ヲ用タル凡
此句傷寒論ニテ是ハ喝ノ治法ナリ先理中湯厥冷セハ加附子真武
四逆見合次第也吐逆不止水藥口ニ入ル直ニ吐スルハ五苓散ナリ夫
モウケヌハ増損白朮散ヲ小服ニ合セテ与フヘシ夫モウケヌハ小夏加狀
一口切リニ効ヲ取リタシハアセル不可吐煩悶ヤミテ睡ヲ催トヤカテ四肢
濕ニ脈ニ波スナリ腹痛ハケシキニ天枢神闕ニ灸スヘシ味噌ナトヲ敷
テ濕ルトモアリ霍亂ニ灸ハ至テ道具也関元氣海清冷淵モヨシ

- 喝ハ耕夫旅客ナト冬金ニ鏢スホトノ大暑ニカ行シ眩暈暴シテ倒
レトスルナリ輕ハ頭痛掌熱惡心ナトス晚来新涼ニナルハ不藥ニ治ス
- 盛夏ノ時ニ飢ヲ不覺類ニ飽滿ノ心地スルハ停食シタルナリ早ク夏霍
香湯加朴大ヲ用ユヘシ惡心ナトスルハ大暑ニ困シタル也トテ補藥ヲ用ユ
ル中ニ霍亂スルナリ有能ニ心付ベシ
- 乾霍亂ニスルメ一味ヲ煎服シテ能吐スル者也云未試

瘧

○友松子曰凡瘧疾不問寒熱多少四五發後便可截之用補中益氣湯二錢枳榔三分或五分炮姜一片生薑一片煎露一宿臨發日五更空心溫服渣再煎服於將發之前云云右北山氏經驗之全文予此法方ヲ用テ頻リニ効ヲ得 茶診

○津田子曰瘧力疲カ初ニ區別シ兼ル病人アリ其時ハ舌下脈ニ心ヲツケヨ若シ瘧ナレバ何ホト身ニ大熱アリ氏古ハヤリ常ノ如ニメ胎ナシ又熱ノサメタル時モ脈ニ小數アリコレレバ瘧ノ瘵治ラセヨ若シ舌ニ胎ガアルナラバ是必ス瘧ガ疲ニシタルカ而ハ瘧ノ中ニ更ニ疲氣ヲウケタルモノナリヲ時ハ舌胎ノ厚薄ニ從テ疲ノ治ヲナセ若シ舌ガ白胎ナラバ達原ニ前胡柴胡明ヲ加ヨ若シ舌ガ黄ナラバ更ニ大黃ヲ加ヨ若シ舌ガ厚白胎ニメ熱渴アラバ白虎ヲ用ヨ輕クハ達原ニ石膏ヲ加フルモヨシ是時ニ只瘧バカリヲ治メ療治ニヨルヲアリ心得ベシ

○小言曰瘧最初ハ葛根湯ヲ與テ表ヲ發シ四五日モ経テ小柴胡ニスヘシ若渴セハ去滓夏加枯薑湯也瘧ハ何藥ニテモヨキナレモ柴胡ヲ用ルニ勝タルハ瘧ニ不構道處ヲ良トス瘧ハワテト振テ後ニ發熱シテ大汗出テ小便通シテ解スラ

瘧

平和トス冷物ヲ食スレハ熱強ク頭痛ナトシテアシニ可禁也熱食スレハ熱モハ
ヤク解テ跡輕爽也病勢弱ク成タル時可截小便不利ニテ足ハ浮腫ヲ催シ手足共
ニカク草臥タリト心得テ居テ有大ニ可懼其人必心下三痛タルト云是水気也起卧歩
行ニモ呼吸セハシキモノハ終ニ是脚氣腫滿ニ変ス也也速ニ治スヘシ又截テ後再發シタ
ルカ影ノサス也トテ連日ニテリソク嗽カ出テ肉脱盜汗又是ハ勞瘧ト名ツク久瘧モ勞
瘧ト呼トモ夫ト違テ真ノ勞咳ト同ク必死ニル是ハ瘧母ノアヲハニ見ルモ有油斷
シテ如此ニスヘカラス勞瘧ノ名ハ外臺ニ引經心録是ハ治療ノ誤ニモアラ子氏病
者瘧ヲ輕視シテ保護不宜或早ク陰陽ヲ合セ如此ナルトハ八九ナリ又一體胎
毒固有ノ人發勞セトシタル折柄ニテ病ハモ有ヘシ他醫治シカ子タル跡ヲハ猶更
先瘧ヲ治スルヲ第一トスヘシ方爰カ小柴胡ノ瘧ニヨキト云所ナリ柴胡ノ類ヲ加ル
トモアルヘシ治シソコナタル久瘧ニハ補中益氣加知母柴胡甲ヲ用ユヘシ又柴胡四逆モ運
用スヘシ一通リノ瘧ノ截藥ハ小柴胡ニ加柴胡甲反鼻テ截ル夫ニテ截又ハ可加
附子夫テ截又ニハ常山ニテ截ル又常山ニテ截又ニ前ノ如味ニテ截ルトモ有又發後
湯ニテモ截ヘシ此藥ハ發日ノ朝ヨリ藥ヲ斷シテ瘧ノ發シテ解タル時ヨリニ貼ハ

カリモ服シ夫ヨリ翌日モ其次ノ發日モ如常ニ用レハ截ナリ

○多田五代記曰正曆三年春源賴光瘧病治療千萬不驗諸醫束手儒師舟
橋大納言來杜子美が詩ヲ授テ愈其句曰子璋髑髏血模糊手擲捉還崔
大夫○是ハ此句ヲ書シ水服ス

○瘧之形ニ似タルモノハ婦人産後ノ血証ニ振々トシテ寒慄鼓領ニ發熱後自汗
スルモノアリ又流産セントシテ如此ニフルフ有押付置テ皆治ス

○一種鬼瘧ト云有是ハ病状怪ク如狂或物着ノ如躁亂スルニテ瘧ハ瘧
ナリ惡寒ヲスキアリ又惡寒無キアリ即牡瘧瘴瘧也嘔スルアリ煩渴スル
アリ也百常ニ異ナルトスレ氏終ニハ惡寒發熱ノ瘧ノ并ニナリテ治ス

疸 附黃胖

○小言曰黃疸古ヨリ種々名稱アリ五疸八疸或ハ三十六疸等アリ今是ヲ治スルニ緩急ニツアリ急瘧ノモノハ皆治シヤスク緩瘧ハ多ク治シニクシ猶更年高ノ人ハ半ハ鬼簿ヲ免レス緩瘧ハ常ニ患寒シテ卧床スルニ及ヌ位ニ催ス下累日小便微黃日ヲ經テ漸濃クナルサテ熱アルカ又ハ大黃ニテモ用ユレハ小便黃ニテ沫ハ白ク立モノ也此證ノ小便ハ桶ノ内ノ沫沫トモニ黃ニ見ユルモノ也甚シキハ白紙ヲ染ムヘシ此病察色ニテ知ヘシ障子ヲ立テ日向ニテスカシテ見レハ肌表ニ黃ヲ見ス是ハ日ニ濃クナル早ク見ユル所ハ眼中ナリ病者ニ對セシ時心ヲ付ヘシ白眼ニ黃ヲ帶是ハ内ニ盛ル所ノ精液黃ニリテ早ク見ユルナリ又爪ハ堅ニ條理アリテ精液ノ通所ナリ故ニ黃ヲ早ク見ス下アリ又指爪ヲ傷テ流血黃ナルナリ是數日ノ中ニ瘧黃スルモノナリ此病脾胃ニ濕熱ハシテ瘧ス血液黃ニルハ金ク麴ヲ蒸スル意味ナリ酒色ニ過タル人ニ瘧ス甚ハ金色ニナリ鼻煤ケ右止黒胎ヲカケテ午後潮熱十分ニ胃實ノ證ヲ為シ又薰シスニケタル色ニナリ又黒色ニナル其證ニ至ルト肌ニ光リヲナシテ諸形共ニ映スル也老體ノ人ハ

疸

必死ナリ又白キ衣或犢鼻禪ナト黄ヲ移シ染ルホアリ物ヲ見テ皆黄色ニ見
ユルナリ經久ニ至レハ津液盡テ瓜ヲ搔ケハ黄粉飛落スアリ是ヲ下セハ大便黒
漆ノ如ク炭塊ヲ為ス承氣湯ニテ一下シテ黄減スハ齒兆トスレハ腹滿下候ノ備
リタルハ稀ニテ臍下臍膀大動禁ニテシテ腹勢ナク全虚候備ルモノ多シ是ヲ女
勞疸ト云ナリ難治多シ仲景黄汗ト云モノ黄疸ノ一身未黄シテ黄汗ノ出ルヲ
言ニ似タレ症予未見黄疸ハ周身黄ニナリソノ後ニ黄汗出ルナリ黄疸ハ病名ニテ黄
汗ハ病名ニシタシ又食傷後又ハ疫熱劇燥狂乱シテ一夜ノ内ニ發黄スルアリ是ハ
佳兆ナリ茵陳五苓散茵陳蒿等ニテ皆可治是ハ急發ノモノナリサテ緩發ノモノハ
仙露飲ナトニテ効ヲ取又黄ニ不拘泥他證ノ甚キモノヲ主メ治スルヲモ有ズ夫ノ
入ヘキ所也此證ニ蛄ヲ食セシメテ効アリ○黄胖ハ今民間ニ多ク中人以上ニ
稀ナリ糞土ノ氣ニ感シテ病ハ瓜甲反テ薄ク或擢ケテ不長或ハ片ニヘゲ
テ枯衰スルモノ其先崩也虚里ノ動強ク人迎ニ細音キ喘悸ニテ起歩艱作スハ
益甚シク眩暈ス此證先起歩セテ下欲スルハ未起歩ニ喘息ス久經スルハ面色
青黄微腫ス婦人ハ月經甚薄ク水ヲ加ヘタル位ノ色也皆綠礬礬鐵砂ノ主トル

所ニテ四五年モ瘵人ト稱スモノ皆治スヘシ又虫積ヲ帶ルモノアリ芟出湯ノ證
ヲ以テ考ヘ用ユレハ黄胖速ニ治ス兼用ハ皇盤丸鎮神丸ナリ大便黒ク通シ
テ治ス又諸醫ノ知ラサル黄胖アリ此證ヲ得ト心得テ治スヘシ先微腫周身
呼吸逼シテ起歩スルヲ不能多クハ脚氣腫滿ト見ユルアリ瓜ニテ見ワケル
モノハ意モ付トモ左ナキハ誤ルヲ多シ又痰咳喘息ニテ留飲家ニ此證アリ
是亦混シ易シ此果ヲ知レハ大ニ奇驗ヲ得テ鬼神ヲ感セシムル程ノ
アルモノ也細ニ辨スレハ七分ノ黄胖ニ三分ノ留飲浮腫ヲ併病スル也又脱
血ノ後ニ黄胖ニテリアリ其人唇舌マテモ虚白ニナリ喘悸ス血虚ノ故ニ如此
黄胖ニ心モツカスウカトシテ人ノ手柄ニスルヲアリ又黄胖ニ瓜蒂ヲ用立
消ニ愈ユレハ又立カハルナリ但鐵砂綠礬ニテ不治モノニ用テ効アルヲモ有シ
○鎮神丸 治黄胖病氣上動胸短息不得行歩小便不利者 鐵砂 薑麥
右味糊丸每服八分日三空心白湯送下兼療下血家腹裏生塊動氣不得行歩手
足爪反裂者
○仙露飲 治黄疽 昌陽 右味以水二合煎取一合去滓服
○皇盤丸 療黄胖方 木厚朴 橘皮 綠礬 右糊丸每服五分日

疽

二鐵砂湯送下白湯亦佳。予加蕎麥三錢名綠紫丸。
鐵砂湯原 理虛悸短氣眩暈虛煩并黃胖方 鐵砂八分 牡蛎 茯苓 各二分
桂枝 四分 人參 二分 朮 五分 甘草 二分 右七味水煎分服配用皇盤丸或鎮神丸
此方運用多端專以鎮墜為主也

○戴元禮曰有瘀血一證遍身赤黃但瘀血則發狂大便必黑小腹按之急痛而大便却
自利以蓄血不利小便也宜桃核承氣湯

○一士人留飲三寸咳嗽面色青黃微腫步行不能喘悸三寸水履不着下不能
能足胫又微腫時時飲食不減氣力甚不惡教醫治之無効久
日引延之何レ時ヲ出勤トモ不期先瘖人ナリ腹ヲ診ニ卧セシムレハ胸間動
悸如鼓起アカリテ喘悸甚シ額ヲ推シ背ヲ撫暫有テ穩ナリ脈弦虛ナリ
瓜甲厚ク枯衰シテ不長是黃胖ナリ桂苓朮甘加針蛭參ヲ兼用綠紫丸三
十日許諸症退又三十日許三寸收効今健步面色滑澤無病人トナリ

瘧 附破傷風

○予一婦ヲ治スルヲアリ足ニ刺ヲサシケル刺ヲスイテヨホド血ヲ出サケリ五六日々ナテ疵イヘ
ケルニヨリ海へ出テ貝ヲトリケル家ニ歸リテ大熱狂言面赤キヲ朱ノ如シ脈洪大ニメ
諸藥効ナシ其翌日瘧ヲ發メ病イヨク重リ一ツモ治ヘキヤウスナシ予得ズ大養氣
湯一服ヲ與ヘケル一服メ瘧ヲホトユク又一服メ狂言シツマリ飲食味ヲ知ル又一服メサ
ツハリト治シタリ又一人ノ女産後八日身ノ汗キヲ氣ノドクニ思ヒ湯ヲアヒケル其夜
瘧ノ如クフルイ大熱火ノ如シ翌日ニナリテ俄ニ目ヲ張リ口ヲクヒツメ瘧ヲ發メ諸症大
ニ危シ病家予ヲ信メ死生ヲマカセケル故己ヲ得ズ大養氣湯ヲ与ケルニ服メ瘧
大ニ止ルマリ又一服メ諸證大半退キ飲食モ亦進ム後東垣全生羌活湯十四五服ヲ
與テ全クイヘタリ 茶終

○小言曰瘧バ又破傷風ト呼剛柔緩急アリ其始ハ牙關噤シテ開口能ハス項
頸強急惡寒熱或ハ渴ス脊骨痛テ一時ニ反張スオコリサメアリ其發作急
ナレハ舌尖ヲ嚙切血ヲ流ス甚シキハ反張シテ推骨コキリクト鳴モ有仰臥スル
ヲオラス俯シテ居ルモノ也金匱ニ脈上下スルトアルハズイクトスルヲ即反張スル
ノ象也此病脈弦急ニテ引張ノ勢爰ニ見ユナリ産後ニ稀ニ半産後ニ多シ

瘰

大抵手足指ノ疔ニ雨水田渋ノ氣ニテ上唇ヲ侵シテ必發ス傷口腐レテ臭氣ヲ生ズ常ノ腐臭トハ異ナリナニ六七ヲ治スシシ〇一童女瘰瘡酒湯ノ時隣人猿ヲ引來ルニ紅巾ニテ面上瘰瘡アルヲ見テヤ件ノ猿飛付ニ驚キ倒レテ膝ヲ傷ル猿ノ咬タルヤ又仆タル時ニ傷ルヤハ知レズ其夜瘰ヲ發ス舌大ヲ嚙フ數ニナリ其父豪勇ナル者ニテ女ヲ懷ニ抱テ晝夜不寐反張スル時ニ肩ヲ押付テ救瘰術ノ如クス葛根加附子ヲ与テ數十日ニテ治シタリ〇一桶匠ニテ歲許手ノ大指ニ瘰ヲ得タリ一日出行ス夜間發熱直視牙關禁急人事ヲ省セズ脈沈弦ニ三醫診スレ何病ナルヲ知ラス予ニ乞手ニ瘰アルヲ見テ瘰ナラニヲ知ル其瘰ニ灸セシムルニ不知大艾ヲ上セルヲ數十壯ニテ目偶是ヲ見ルニ似タリ等々此ホドノ艾火汝ハ熱セサルヤト大呼スレ疔不應百壯ニ近キ故止シム葛根加烏頭ヲ与フ次日マテ三貼ヲ盡ス隣人相議シテ又艾火ヲ上スニ知ルト見エテ手ヲ振切其夕少ク正氣アリ猶前方守ル牙關漸緩人事ヲ知ル三日ニシテ快ヲ得七八日ニ全愈ス

不及飲

南陽

与鼓脹方

大麦炒

赤小豆炒

茯苓

各等分

煎服

〇南陽曰鼓脹同難治トシ脹滿ヲハ可治ト云テ其病ニ因アル如クニ古來論スル所也今是ヲ考ルニ一旦ノ病ニテ脹滿シタルハ可治漸以テ漸ヲ以テ脹滿スルハ鼓脹ノ初起ニテ共ニ難治ナリ其因枯血ニ屬ス婦人多ク此病ヲ患フ結閉スルモノ其先兆也又經水不斷ニ病ヲ覃脹ト云婦人ハ腹滿ニ堪ヘヤスリ男子ハ腹滿ニハヤリ困ル其初起ル時ハ疾苦スル所ナリ漸ニ大脹スルニ至テ側卧スルヲナラズモアリ其腹ヲ按シテ大鼓ノ皮ノ如ク引キ脹ル脹ノ強キニ隨テ青筋絡脈乳間ヨリ上腕ノマタリニ多見ハル甚シキハ皮ニヒカリヲ生シテ函者ノ手ノ映スル有是ヲ鼓脹トス甚ハ額下ノ皮膚層腹ニヒカレテ結喉ノ邊マテ引張ル口鼻モ斜ニテ又如此ニ脹ガニ手ニ押セハ腹ヲ按スルノ手サワリヲ脹滿ト云可治ト云ハ別因ニ非ス輕重ノ分也脹滿ニ厚朴ヲ主トス厚朴七物湯三承氣ノ類ナリ後世蘿蔔子大腹皮ヲ主トス附子ノ効多シ血ニ困ル故ニ甲字湯鼈甲湯運用スシ鼓脹ハ藥セズニ置ケバ數年ヲ保ツ捨置テ一良策トス間ニ腹氣煩ニテ治スルアリ

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

○津田子曰小兒大人ニカギラズ泄瀉ノ症ニ青菜ヲモシデ水ニホダテタル如キ菓ヲ下スハ是脾胃ノ虚寒ナリ錢氏白朮散ニ了子附子ヲ加ヘテ神效アリ但シ脾胃虚シテ了子桂枝附子等ノ如キ熱藥ノ相應スル泻ハ大便ニ必ズ臭ミナキモノナリソレヲ腹脹口渴アリトモ熱藥クルシカラズ心ヲ決シテ用ベシ此論張介賓幼科良方吐瀉ノ部ニ詳ナリ熟覽スベシ

○治禁口痢方 水蛙搗碎如泥瓦上炙臨熱入麝香五分煉調塗臍上頃時氣通能飲食 本綱

○小言曰痢病最初ハ何如ニモ發散ヲ專トス疲痢ハ猶更葛根湯ヲ用テ表ヲ達スヘシ下利者ト云句ハ仲景ノ法ナリ○小兒戩ニ三行下利シ陽厥シテ手足ノ冷ル有附子ノ症トナスベカラズ一體陽厥症ニテ在モノナリ如何ニモ毒ノ強ナリ其毒伏結シテ厥冷スル也虚脱シテ厥冷スルトハ違ナリサレ至テ惡症也紫圓ヲ用テ一時ニ厥ヲ開キ効ヲ取ラレ危篤ノ症トスヘシ厥カヘリシ後ハ葛根ヲ用テ微驚ノ氣アルトモ先表ヲ解シテ見合内ニ煩候出ハ救フモ有毒盡テ下モ減タラハ黄芩湯ニスヘシ其後調和ハ桂枝加苓朮湯小兒ハ弄玉湯下ノシテ鹽梅ニテ加附子ニモスヘシ又大便イツマテモシマリカ子ルニハ青陽丸ヲ兼用

痢泄 凡下利者有又幾日腹冷痛シテ二三行下ルハ桂枝加苓朮附湯ニテ曰ケル
此是ニモ病瀉アリ烏苓通氣ヲ用テ速ニ有効

○醫通曰下利黑者有二種如焦黑之黑者此熱極也黃苓芍藥湯下香連丸如
漆黑之光者此瘀血也凝久而然也桃核承氣湯○又曰世醫治痢專守通
因通用痛無補法之例不知因氣病而腸中切痛非溫理其氣則痛不止因
氣陷而濁氣下墜非升舉其氣則後重不除因氣傷而津液崩脫非調補其
氣則積不已因陰虛而至夜微熱腹痛非峻補其陰則痢痛不息○又曰痢不
納食俗名噤口如因邪^留胃中胃氣伏而不宣脾氣因而瀯滯者香連枳朴橘飲之
屬熱毒衝心頭疼心煩嘔而不食手足溫煖者甘草瀉心湯去大棗易生姜此
證胃口有熱不可用溫藥若陽氣不足宿食未消噎而不食枳實理中加
砂仁陳皮木香豆蔻或山查麩麩之類○有水飲停聚者心下必悸動不寧
五苓散加姜汁○有火^心氣衝者黃連解毒湯去黃蘗加枳殼木香○有胃
虛挾熱而嘔逆者連理湯○有積穢太多惡氣薰蒸者三黃瀉心湯加木香○
大抵初痢噤口為濕熱胃口故宜苦燥治之久痢口噤則胃氣虛敗大劑獨參
理中恐難為力也

○痢ハ快下セズ裏急後重シ小便モ大便ノ度々ニ通ス故少許ツ
通シ或ハ不通大便通シテモ何時マテモ廁ヨリ歸ル氣ノナキモノナリ
小便通スレハ夫ニ下便心止テ歸大便ヨリ前ニ小便ノ通スルハ佳兆ト
ス又大便心ハ無ク小便心有テ小便ハカリ通スルハ甚ノ佳兆也赤白
利數行ノ内ニ常ノ大便通スルハ佳兆也シカシ其通スル時腹痛難
堪キト甚モノアリ晝夜數行腹痛後重甚シキモ無熱ハ佳兆
晝數多ク夜少ハ佳兆熱ノサメ又先ニ下ノ止ムハ不煩初起ニ嘔セハ
葛根加半夏湯ヲ用テ解熱ヘシ必早ク方ヲ轉スヘカラス痢
自然ニ減シテ快キモノ也○葛根湯ヲ用テ度數減スルハ何方
マテモ葛根湯也後重強クナラハソコテ毒ヲ疎泄スヘシ大柴
胡湯加厚朴ニテヨシ又金匱ニ氣痢ト云フ出セリ是ハ大便心

泄痢

俄ニ催テ取物モ取アヘス走テ廁ニ行ケハ頻ニ肛門ヘハリテ不通
一快下ヲ得タラハ此苦ハ有マイトイツマテモ居ニ終ニ二点ノ糞汁
ヲ下ス又夫モ無ク一滴ノ小便通スレハ腹痛便心止公是ハ楨芍
順氣湯去大黃加水香用ユヘシ是モ疝ニ属スルアリ彌疝ト
見タラハ痢ヲ捨テ疝ヲ治スヘシ又血痢トテ裏急後重シテ
純血ヲ下シ又膿血ヲ雜下スルモアリ先大柴胡加厚朴ヲ用テ
後ニ桃花湯ヲ用ユ熱ノ甚キ中ニ用テハ無驗熱ヲサザル時
ニ用ユヘシ血止テ水浮ノ様ニナル熱甚ハ血色薄ナルナリ是赤石
脂ノ力ナリ赤石脂ハ白湯ニテ散服シテモヨシ又血痢諸症多
クニハ主方ニ用ル諸湯ヘ赤石脂ヲ兼用ニスル丁モアリ〇五
更浮ハ虚症ニテ實ニ不属サレ氏最初ノ治ヲ失シテ此症ニ

ル故ニ其元ヲ治シテ効ヲ得ルモ有元ヲ治ストハ後重ノ氣味アラハ大柴
胡加厚朴ニテ疎滌シテ見ルヘシ然レトモ虚ニ属スルモノナレハ一帖キリニ痛
體ヲ見無効ハ早リ方ヲ轉スヘシ寒疝ニ属スルモノ多ケレハ其証候
ヲ尋テ烏苓通氣ヲ用ユヘシ〇嘔ヲ兼テハ禁口痢トナル故ニ甚ク
証トス黄芩加半夏生姜湯半夏厚朴湯六物黃芩湯ハ楨胡
湯ホト見合次第也鯉膾ノ法アリ時ニ効ヲ得タリ其法常ノ膾
製スルヤリ久痢ニ烏梅ノ効アリ虫積ニテ嘔吐ノ出ルハ猶更烏梅
圓ヲ煎服スヘシ痢病ニ不構後重甚トキ鷓鴣菜湯ヲ用ユ奇
効見ル有是ハ久痢ノフニ非藥ヲ用テハ小半夏加茯苓湯夫モウ
ケメハ伏龍肝汁ニテ煎服スヘシ飲ウケタラハ粳米ヲ加ヘ胃氣ヲ
タスリルフモ有又吐逆止サルニ奇方アリミソハキノ穂ヲ花ヲトツテ
未開時ニ五六寸ニ切り陰乾莖葉トモ煎服ス神驗アリ〇瘧痢モ

泄痢

初ハ葛根湯ナリ後ニ柴胡加芍藥ナリ○痢病ニ熱ノ有無モ不問天枢ニ灸スルモアリ冷痢久痢別テ痔痢ナリ捷法トス○下利散行脱肛ニ痢モヤニ脱肛入カケキハ補中益氣ニスヘシ又張氏醫通ニ裏急後重頻汚衣者脱氣也益氣湯去帰加猪或更加附子又四君子湯加附子木香

○スホイトヲ以テ濃砂糖湯ニテ大腸ヲ蕩淨ス此法行凝滯毒緩舒腸氣痢病諸症運用甚多

Faint bleed-through text from the reverse side of the page.

○陰痿ノ症ニツアリ脾胃敦阜ノ陰痿ナリ腎虚ノ陰痿ト疝氣ノ陰痿ト也脾胃敦阜ノ陰痿ハ不換金正氣散平胃散滲濕湯藥ニテ脾胃ノ濕熱ヲ去ル治ス腎虚ノ陰痿ハ八味丸ノ如キ益陽ノ熱藥ヲ用ユベシ疝氣ノ陰痿ハ疝氣ノ主方何ナリト選用スベシ又腎虚ノ陰痿雀肉ヲ茶餅トシ煎テ

○小言曰一士人夜燕ス小解セントスルニ起テ不能坐中其病ナルヲ不知皆笑カレ一時ハカリニテ能ク起ツ深夜皆散ス玄閣ヲ下ルト又痿ス辭ルト思テ人ニ休息セシム暫クシテ又起テ得テ辭シ歸ルニ常ニ異ナルヲ無シ是ヨリ二三日四五日ニ一発ス仍テ来テ治ラ

○又曰痢ハ快下セス裏急後重シ小便モ大便ノ度々ニ通スル故少許ツ通シ或ハ不通大便通シテモ何時マテモ廁ヨリ歸ル氣ノナキモノナリ小便通スルハ夫ニテ便心止テ歸ル大便ヨリ前ニ小便ノ通スルヲ佳兆トス又大便心ハ無ク小便心有テ小便ハ通スルハ甚ノ佳兆也始終此容體ヲ問ヘキ也何レ小便ノ快通ハ吉兆也

熱ノサメ又先ニ下ノ止ハ不煩初起ニ嘔セハ葛根加半夏湯解熱ヘシ必早ク方ヲ轉スヘカラス凡葛根湯ヲ用テ度數減スルハ何方マテモ葛根湯也後直強クナラハソコテ毒ヲ疎泄スヘシ

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]



○南陽曰

痛風膝頭一痛ヲ移シ腫モノ有大ニ可畏證ナリ前後ノ肉瘦テ痛苦スルハ鶴膝風
 ニルコトアリ是ハ難治ニテ廢人ニナル也サレバ痛風ヨリ発スルハ少シ脚氣ト云テ膝
 計リ痛モノヨリ発スルモノ多シ六物附子ヲ烏頭ニ代テ用ユシ又方書ニ膝蓋
 風俗ニ膝ツクラト云モノ膝頭ヲ強痛テ膝蓋ノ左右ニ膿ヲ催ス此病早ク鍼
 シテ血汁ヲ出スコトアリ膝邊ヲ按シテ心ニ深ク是ヲ求ムハ自然ニ水勢手ニ
 應スルモノ也是ヲ刺テ如膏水ヲ出セハ立所ニ治ス三日程ノ間ナリ此瘻ヲ去レ
 ハ終身烏歩スサテ痛風ノ因ハ枯血ニ二其皆瘦テ手足トモニ冷ハ或ハ
 瘡疥ヲ不発灸痕ナト立所ニ治シテ膿ヲサズ又其人色黒キ方ノ人ニ多シ
 以上皆乾血ニ見故ナリ婦人ハ經閉スルモノ多シ甲字加附子湯ナリ温泉
 効アリ常ニ脚氣急ナトノ證アルハ腹部ニ其因アリテ積聚ノ有方ヨリ引張
 モナリ委中刺絡ノ効アリ此病破血ヲ以温散ヲ主トセハ無不治又一種
 項背強痛シテ顧盼スルコトナラヌ人アリ葛根加附子甚ハ烏頭ナリ此
 中ニ吐血シタル人ヲ時々見タリ俗ニ年肘又長命痛ト云ハ痲二屬ス
 南陽曰鶴膝風ハ至テ治シ惡シ瘡人ニナルモノ多シ早ク鍼シテ惡汁ヲ去レハ又
 燒酒ニテ蒸ス針ハ外科ノ手ニ任スハ膝頭ヲ按スルハ惡汁ノアルハ指下ニヒキテ自

節痛 然ニ水勢アリ鍼ハ膝ノ内邊ヨリ入ルナリ惡汁ヲトリテモ歩行ナリカケルモノ有

トモトテモ瘵人ニナルナラハ惡汁ヲ取テ正法トス万ニ全快ナリソムヘシ又濁酒未瀝
モロニ生牛膝根ヲ加一煮テ布一包ニテ日ニ蒸ス且服スヘシ

○或得治痛風症奇方於三河新城人傳予未試 柴胡 桂枝 防風 羌活

香附子 芍藥 生地黃 右七味以水一合酒五勺煮取一合分服

○蚯蚓油 治痛風 蚯蚓十條 漬燒耐一夜去泥麻油一合煎七分去滓塗痛處

○蝸牛油 治痛風 蝸牛去殼十 麻油合煎七分塗痛處二油合塗益良

○鐵彈丸 醫通 治筋挛骨痛 川烏頭炮一兩 乳香 沒藥各一兩 五靈脂 麝香一錢

為末滴米為丸彈子大食後薄荷湯送服濕酒各服一丸

○治絡煎 烏頭 乳香各等 地龍焙 右三味以水二合煎至半入燒酒二合煮兩三沸數蒸患處神驗

獨活湯治中風濕日久致腰背手足疼痛 獨活 當歸 白朮 香桂 牛膝 甘

○胞系乃矣 鹽滌治

○巴豆膏 治轉胞 巴豆五分 田螺肉一錢 右三味共搗成膏和勻一寸許

紙ヲ圍ニ切膏ヲ傳臍下一寸五分ニハルヘシ痛劇ハ尤驗アリ加麝香益效

○小言曰轉胞丹田氣海水分一邊へ針スヘシ此他絡ノ脹タラント覺元所ヲ

按シテ針スヘシ

○淋病痛劇者鷄卵ニ砂糖ヲ入テ服ス奇效アリ

○潤通湯 理久淋腹拘急枯瘦者 麻子仁 木通 車前子 冬葵子各一

滑石 當歸 地黃 阿膠各五分 右八味煎服腹脹滯者去地黃加虎杖根

○踏通曰赤石治血淋莖中熱痛○又曰牛膝三兩煮成入麝少許

地體湯此治血淋要劑但淋久不止元氣下陷者為功禁○又曰朴硝雪白

者治痛淋殊效每服二錢血淋用冷水下氣淋木通湯下石淋炒研用温

水下○石膏火煨同琥珀滑石乃石淋之要藥○諸久淋元氣下陷面色痿

黃飲食難進服清熱利水藥轉劇者補中益氣殊効或六味丸兼用又効

○丙字湯 理淋諸淋方 甘州分 當歸 地黃 滑石 黃芩各五分 皂子四分 澤瀉一分

○丙字湯 理淋諸淋方 甘州分 當歸 地黃 滑石 黃芩各五分 皂子四分 澤瀉一分

○丙字湯 理淋諸淋方 甘州分 當歸 地黃 滑石 黃芩各五分 皂子四分 澤瀉一分

○丙字湯 理淋諸淋方 甘州分 當歸 地黃 滑石 黃芩各五分 皂子四分 澤瀉一分

○丙字湯 理淋諸淋方 甘州分 當歸 地黃 滑石 黃芩各五分 皂子四分 澤瀉一分

淋遺

右七味以水二合煎取一合分服○血淋加阿膠又散服虬髮灰灸隱白
太鐘二穴六七壯或須滑石槌散散間服經年不治者兼年再造散若陰
腫疼痛癢疥或成漏者烏藤丸間服其腫疼痛劇者忘憂湯洗之
○如意湯陽理五淋疼痛方 桔梗 甘草 瞿麥 古煎服血淋加虬髮灰
○轉胞 平水丸 甘遂丸 木防己 去石羔 加茯苓 芒硝湯 虛人桂
枝加苓朮附湯 八味丸料



○淋病

ハ吐実ノ人ニ多シ先ツ五淋ト云フ諸書ニ舉タル内ニ石淋ハ大抵血
淋ト合病ス痛甚シリ忍兼テ寒熱モ有或絶食ニテ疲止モ有血淋ハ
血内ニ如魚腸凝タルモノ雜下シ尿孔ヲ塞リ故痛苦モ強ク数日ヲ経
面色青唇舌青白膈間ニ悸ヲ生シ呼吸迫シテ終ニ黄胖病ニナリ淋
家ノ治テハ治セフモ有是ハ治シヤスシ今ハ不拘桂苓朮甘如鐵
參多事解丸 綠礬丸 主之 黄胖ニナラヌハ連延シテ死ニ至ル有治法
龍胆泻肝湯或加滑石或東洋再造散ヲ兼用ス夫ニテモ治セム
猶血多疼痛ハ南陽ノ如意湯ニ亂髮霜ヲ多加ヘシ筋ヲリ
黄連煎膠湯中ニ加ヘテモ用ユ久来ノ血淋ハ猪苓湯モ用ユ連綿
トシタルハ腎氣丸ヲ兼用スヘシ氣淋ト云ハ血モ白濁モナリ小便心
許ニテ不通頻數ニテ痛ム是ハ虚脱ノ人ニ多ク又婦人ニ多ク龍
胆泻肝湯ニテ無効ハ附子ヲ用ヘシ病候ヲ尋テ病ヲ治スフモ有一婦

淋

人此症ニ腰痛立フ不能桂枝茯苓丸料ヲ用テ治セシマアリ膏淋ト云ハ小便ニ脂ノ如キモノ支リ下リ消渴ノ便ノ如ク通利ノ後ニ猶便心有ハ多房失精家ニ屬ス腎氣丸ヲ用ユヘシ瘦テカサリ盜汗ナトスルニ至リハ狀腫ヲ催シトシテ大病ニ至ル若痛甚ハ平卧不能起小便ノ痛ニテ痔兼ヤミ脱肛ナトスルモノ定例也痔ヲ兼テ治スヘシ祛風辟瘴湯ナトテ却テ効ヲ取テ有又一種囊ノ後ニ結核夫ヨリ脹起シ腫癰トナリ夫ニキラス尺灸ニ凝所ナトハ心ヲ付テ問フシ膿ヲ為シ口ヲ開クト小便此膿口ヨリ通ス故ニ瘡口塩氣ヲ受テ白ハセテリ數年淋病ト猶ニ老ルアリ是其小便セシト時ニ指ニテ瘡口ヲシツカト押ヘテ微ニ通スレハ傷口ニシミズ瘡口モ治ス龍胆浮肝湯或南陽ノ五物解毒又莖ノ中ヨリテ瘡口ニテ膿ノ出ルアリ其只腐爛ノ形ナリ痔疾ノ漏ヲ作ルト同形ニテ四邊ハ生肉ニテ誠ニ針ノ穴ノ如クナリサレ氏小便其

此泄故治シ難仕年ノ人ハ存ノ外早ク愈モアリ何レ性命ニハナリナシ是モ龍胆浮肝加土茯苓或化毒丸ノ類兼用スモアリ若其口腐爛ニ全ク下疳ニテモアリ都テ甘草ヲ主トス痛甚ホト効アリ龍胆浮肝加滑石ニテ五淋共ニ皆治ス滑石槌石甘散ヲ兼用スモアリ虫積ニカマフス鷓鴣菜湯ニテ奇効アル人アリ冬効モアリ八膠ナト選用スヘシ愈後強歩力作梁肉酒ヲ禁ヘシ又小便膠濁ハ淋ハ異ナリ邪熱ニニ膀胱ニ入レト口ト濁ハ熱斗リ入ハ赤リハカリ濁五苓散ヲノ外黄色ハ茵陳五苓散ノ症尋ヘシ膠濁ハ滑石ノ主治ナリ猪苓湯ナト用ヘシ小便餘瀝モ淋ニ似ルモノ也清心蓮子飲ナリ八味丸モ宜
○ 淋病奇方治諸藥不効者 藜麥 梔子熒 葛粉 甘中
右煎服四五日必效

淋

治淋病

海金沙

木通

砂糖

甘中

右为散兼用諸湯藥

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

○小言肺癰ハ主氣靈ニ出ス此病ノ始登ル時ハ風邪ノ咳嗽ニ異ナラズ又膈ニ引テ咳ノ
 度ニ痛ム其痛所隱クトシテ左右ノ肋骨間ニ常ノ咳嗽ニモ引釣痛アリ意ヲ用
 テ辨ヘシ此證聲音サビタル声ニテ咳モヒシケタト云様ナリ濁唾臭キモ也其中ニ米
 粥ノ如キカタマリタルモノアリ水ニ投シテシレハ沈ニ形散シテ底ニ凝リ間々血ヲ帶ルモ
 ノアリ尤臭腥アリ其人氣息モ臭ク自ラ臭氣覺フ或背脊ニ微腫ヲナスア
 或微寒熱自汗盜アリテ勞瘵ニ似タルアリ其脈浮弦或大数或滑数ナト皆可
 治勞瘵ノ半ヨリ併病スルハ本病力難治ナル故ニ必死ナリサテ上ニ膿ヲ作シ
 タルヲ肺癰ト云下ニ毒ヲ畜タルヲ腸癰ト云ニテ必肺ノ藏ハ膿ヲナシタルニ非サルハ
 シ膈間肋骨一引釣処カ毒ヲ結タル所ト見エ飲食氣力脈候トノヒタルハ必死
 トセス古方桔梗白散ヲ用エ全匱ニ已成膿ハ難救トアレトモ必不可然肺癰ニテ治
 スヘシ白散ヲ兼用ユルモ有又一種咳嗽ニテ臭氣アレハ膿ナキニ肺癰湯ヲ用テ効
 ヲ取ルモノ是欲作未作ノ時ナル中何モ此證ニ桔梗ヲ主藥トス禁忌ヲ嚴ク
 スヘシ少ク厚梁ヲ食スレハ再復ス遂ニ死ニ至ルモノナリ○肺癰ハ膿ナリ疼モサ
 シ是ハ却テ勞瘵ノ一種ニシテ難治トス其證余未詳矣甘草湯ナト可用也

肺癰湯 南陽 國老 桔梗 各六分 貝母 枯蕒根 各五 杏仁 四分 白芥子 三分 生姜 二分 水煎

肺癰

○醫通曰肺癰蓋由感受風寒未經發越停留肺中蘊毒為熱或挾濕熱痰涎垢膩蒸滯肺竅皆能致此慎不可用溫補保肺藥尤忌發汗金匱皂莢丸葶藶大棗浮肺湯千金桂枝去芍藥加皂莢湯葶藶湯宋人十六味桔梗湯俱肺癰專藥○初起疑似未真生大豆紋漿飲之不覺腥氣便為真○
按是原肺病也故不覺香臭必在之症也

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

○南陽曰腸癰又內癰トモ云其發スル食傷ノ後ニ發ス又婦人産後ニモアト半

産後ニ發スルモノ多シ此病ハ俄ニ發スルモノニテ緩ニ起ルハ稀ナリ其痛初起ニハ腹中一面ニ痛テ何ノ分ケモナリ手ヲ近フナラズ能ク按スハ臍傍以下ニ塊ヲ結ビ多ハ臍上ヨリ横骨際ヨリ塊ヲ結フ指夫モ近フナラズ刺痛ス或面如鼓側卧スルナラズ嘔吐甚マリ寒熱甚シ渴シテ絶食スルモアリ積痛ト混シヤスシ積痛ハ何ホト痛ムトモ按摩スルナラズ好ム腸癰ハ按スルナラズ又皮膚層甲錯ト云病状可味膿ヲ作ト腹中鳴ルト他病ニ無キ聲アリ杓ニテ水ヲ汲カハス音ニ似タリカワクト云時アリ一間ヲ隔テ聞ユルホト高クナル腹痛ツヨキ人ハ第一ニ是ヲ問ヘシ又手足厥冷冷汗如流煩渴スルアリサテニ便共ニ不利スルモノ也小便ニ臭氣アリ既ニ膿ヲナスノ際ニ至レハ小便白濁スルモノ有膿ヲ小便ヨリ下スヲ小腸癰ト云ヘト小便ヨリハカリ出ルハ無ク大便秘共ニ下膿ス膿ヲ下シテ後痛頓ニ退クヲ佳兆トス痛不止膿ノ下リ少ク絶食ニテ痛甚ハ難治トス此病十八九ハ治ス飲食ヲ節スヘシ少ク厚菜ヲ食ハ再復ス大人小兒男婦ヲ不問皆病ハ此意以仁大黃破血之諸藥ヲ主トス又下膿ノ

癰腸

痔キ人有又臍中ヨリ膿ヲ潰スアリ是モ不拘下膿スルハ自然ニ口收ルナリ又表(浮テ結ヒタルハ外科ニ刺セテ治シタルモ見タリ是腸癰ハ入レカクシト思ハル也

○香川一方 治腸癰 薏 附 芎 將 柀 甘 又方 薏 耆 芎 歸 附 甘

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

○脫肛不收者 以大根干葉煎汁洗蒸溫和而緩々入之又收而又脫反覆不愈者灸於後門周圍三七壯而必驗 董春傳誌

○小言曰痔疾肛肉脫出スルハ癖ニシテ大便秘スルハ入レモ又押出ス故ニ朱明丸ヲ諸湯ニ兼用シテ滑便ニシテ置ヘシ一切ノ痔強ク痛ハ 痔瘡清湯或三黃湯或如外麻

藜 吾ヲ莖葉共洗フ痛ヲ去納リヤスシ又 無花果葉柳葉モ効アル 一ツニ龍腦五厘ヲ蓋ヲ挑テ入置ハ水ヲ出スヲ雞翎ニテ腫上ニスル奇効有又

熊胆ヲ塗モヨシ艾葉ヲ煎醬油樽ニ入テ孔ヲ開キ肛ヲ蒸ス又礬石湯ニテ蒸モヨシ外科正宗ニ出タル枳殼湯ニテ蒸モ效アリサテ又下血多ヲ腸風

下血藏毒下血腸癰便血ト云腸癰ノ論モ多端ナレ腸内ヨリ下血スルハ非ス肛門ニ小孔ヲ登シ夫ヨリ浮出ス如系ニ射ル有六七合或升餘ニ至ル暈倒セントスルモノハ三黃湯主之神氣不定ノ様ニテハ猶更用ユヘシ如此ノ數十日ニ及ハハ肌膚青蒼唇舌割白ニテ虛悸胸間鼓シ人迎ノ動脈甚シク耳内ニ響音キ眩暈シ手足ノ爪モ不榮シテ反カヘリ折レシトシテ黃胖病ト不異地榆槐花ノ類一切ノ藥無驗是ハヤハリ黃胖病ニ取扱テ針砂湯ナリ 本草

痔

痔瘡湯加蒜荳豉三斤煎取汁下 ○灸長強八鬲

○乙字湯陽理痔疾脫肛痛楚或下血腸風或前陰痒痛者方

柴苓分錢升大分甘草三分姜仁四分芎味水煎 ○諸瘡疥禁洗傳之藥誤枯藥洗傳頓愈後上道鬱冒如氣癢纖憂細慮或如心氣不定者并主之而灸長強腸風下血久服無効者宜理中湯

○肛邊瘡瘡之生之痒不可忍或黃汁下流之瘡是也 有是二藥藥八惡干下有見計所乘也 又肛外之物之生之如指頭緊痛是也 俗謂之牛如痔十上云之十上云 又肛內頻之痛之內痔也 是也 氣之塞其心氣不定之乳三黃湯加蒜荳豉長強二款十壯之灸之入之都痔之灸之効アリ 又肛外之孔之生之膿汁下流之其孔幾ツモ登之終身不愈之瘡是也 痔漏瘡上云近時之割下肛門ト一ツニテ内ヲ洗去テ瘡スル有又脫肛ヲ藥線ニテ切下有痔ニ化毒丸ノ類ヲ用テ効ヲ取下有又舊下血祛風辟痔ノ類効ナク脈浮大ニテ無カト見ラハ益氣湯ニ入シ不効者理中湯加扶 ○又小兒肛門痒細蟲ヲ生ル下有陰蝕蟲ト云名ニ似タレ蝕スレラ又虫痔ト名ニアタ

此是之非不痛之屬之濁浪湯之洗之背版之灸之入シ又女人陰所甚痒之ヲ搔ハ如火モ有痔之屬前湯之洗ニ黃湯加升麻ヲ用膠服ニ艾灸スヘシ方書ニ婦人陰所ノ病ヲ暗疾ト云ヘリ

- 蠟皮散 衛生總微論 治蝮虫耗損氣血已成痔者 蠟皮 一斤 熬甲 一斤 酥炙
- 蛇蛻皮 一斤 露蜂房 一斤 右為細末入射香末一錢拌匀每服半錢茶飲調下
- 治痔疾痒痛 葦菜濃煎汁蒸肛妙

○生肌膏血 凡諸噎膈逆屬胃中瘀血者或血蓋等用之以激發胃宿
滯同氣相感之力一涌而蕩散無餘真補中寓通之良方
○脫血用大劑人參益氣以固血惟血色鮮明或見紫塊者宜之若見晦淡者為血
寒而不得歸經須兼炮黑乾姜或大劑理中溫之
○若血色如珠光亮如
漆吐出即乾以指甲剔之成片而起者雖能食不倦後必暴脫而死
○若血中見似
肉似肺如爛魚腸此胃中脂膜為和火所燥凝結而成方書咸謂死然吐後凝結既
去而不發熱能進飲食令服小劑異功保元大劑六味都無多有得生者
○為則案診血症也其法有三焉一曰少腹硬滿而小便利者二曰病人不滿脈
而自言成滿也三曰病人喜忘尿難難大便反易其色必黑為有血也仲景
氏診血症之法不外於茲矣

○生肌膏血

生鴨血亦可

凡諸噎膈逆屬胃中瘀血者或血蓋等用之以激發胃宿

滯同氣相感之力一涌而蕩散無餘真補中寓通之良方

醫通四卷吐之條

○脫血用大劑人參

益氣以固血惟血色鮮明或見紫塊者宜之若見晦淡者為血

寒而不得歸經須兼炮黑乾姜或大劑理中溫之

○若血色如珠光亮如漆吐出即乾以指甲剔之成片而起者雖能食不倦後必暴脫而死

○若血中見似肉似肺如爛魚腸此胃中脂膜為和火所燥凝結而成方書咸謂死然吐後凝結既

去而不發熱能進飲食令服小劑異功保元大劑六味都無多有得生者

○為則案診血症也

其法有三焉一曰少腹硬滿而小便利者二曰病人不滿脈而自言成滿也

三曰病人喜忘尿難難大便反易其色必黑為有血也仲景氏診血症之法不外於茲矣

力皆血... 治心腹切痛不可忍按輕却痛按重則愈皆虛寒證服熱藥并
針灸不痊此藥主之○此方虛寒ノ虫痛百方効ナク諸醫手ヲ束メ難證ニ用テ効
神ノ如シ其証身ニ寒熱ナク腹滿不硬カラズ二便常ノ如ク飲食皆熱物ヲ好シ常ニ
熱手ヲ以テ腹ヲ推セバ暫快活ヲ覺ヘ其痛緩クシテ間斷ナク兩唇朱ヲ塗ルガ如ク
時々乾嘔アリ脈ハ大方微數或緊數ナリ凡ソ諸痛症緊數等ノ脈ニ自ラツケテ
用ニ但シ此緊數ハ虫痛ニテ氣ノ凝滯ヨリ自然ト脈モ假リニ激シテ緊數ニ来ルナリ
桂心 三分 路 半兩 白芍 半兩 遠志 半兩 右為剉散每服四錢水一盞半姜五片寒
二枚煎七分去滓入錫糖一塊如皂夾子大煎令饒食前温服 津田玄仙

○加味小建中湯 證治 治心腹切痛不可忍按輕却痛按重則愈皆虛寒證服熱藥并

針灸不痊此藥主之○此方虛寒ノ虫痛百方効ナク諸醫手ヲ束メ難證ニ用テ効
神ノ如シ其証身ニ寒熱ナク腹滿不硬カラズ二便常ノ如ク飲食皆熱物ヲ好シ常ニ
熱手ヲ以テ腹ヲ推セバ暫快活ヲ覺ヘ其痛緩クシテ間斷ナク兩唇朱ヲ塗ルガ如ク
時々乾嘔アリ脈ハ大方微數或緊數ナリ凡ソ諸痛症緊數等ノ脈ニ自ラツケテ
用ニ但シ此緊數ハ虫痛ニテ氣ノ凝滯ヨリ自然ト脈モ假リニ激シテ緊數ニ来ルナリ

桂心 三分 路 半兩 白芍 半兩 遠志 半兩 右為剉散每服四錢水一盞半姜五片寒
二枚煎七分去滓入錫糖一塊如皂夾子大煎令饒食前温服 津田玄仙

○セメシイ十 殺虫ノ功妙也一匁 行十匁分也 ○古書三虫ト云ハ 虻虫寸白虫蟻虫也

○神効制虫法 鷓鴣 山椒 右等 茶葉 少 右三味以水一合煎取半

和姜汁一酒杯熊胆五分以胆消為度運用多端或兼用紫圓

○千金治蛇攻心痛 用猪胆一枚苦酒半升和之火煎令沸三上三下藥
成放温空瓶飲三滿口虫死便愈

魚 ○下寸白與方 櫃子 右一味丸連日多服

○千二一多症三蒲黃一果飯二文于食也云云八多細其才吐下三于愈

○蘇頌謂其味甘平... ○蘇頌謂其味甘平... ○蘇頌謂其味甘平...

○蘇頌謂其味甘平... ○蘇頌謂其味甘平... ○蘇頌謂其味甘平...

○蘇頌謂其味甘平... ○蘇頌謂其味甘平... ○蘇頌謂其味甘平...

○蘇頌謂其味甘平... ○蘇頌謂其味甘平... ○蘇頌謂其味甘平...

以考其說

年臨之時... 初多居回理長江生後廟

以此

其園徑多... 艾陽

河內... 艾陽

河內... 艾陽

靈樞腧腧又曰蛟腧 ○張機腧字作蛟用 ○孫思邈腧字作

腧用 ○蛄蛄蛄三字戶恢反音同音義同也 ○後世蛄作疣蛄

作痛甚非 ○醫書大全石蛄 ○本草細目人龍 ○靈樞曰心腸

痛懷作痛腫聚往來上下行痛有休止腹挾喜渴涎出者

五卷 蔓難

名

是蛟蛭也。病源候論曰：蛟虫一尺動則吐水，出則心痛，貫心則死。千金曰：少小有蛟虫結在腹中，數發腹痛微，下白汁吐悶寒，熱飲食不生，肌皮肉痿黃，四肢不相勝舉。傷寒論曰：虺厥者，其人當吐虺，令病者靜而復時煩，此為藏寒。虺上入臍，故煩須臾復止，得食而嘔，又煩者，虺聞食臭出，其當自吐虺。靈謂虺之大體，其餘三書諸變之淵源也。金匱曰：腹中痛，其脈當沈，若弦反洪大，故有虺虫。病源候論同。赤水玄珠曰：虺脈滑數。滑利脈也。靈樞曰：肘後脈以下三四寸搏者，腸中有虫。肘背皮肌堅厚，度理地三四寸，尺膚上。史記曰：循其尺索刺，瘰而毛美而奉髮，是虫氣也。君公得十，毛美，毛焦，三作。赤水玄珠曰：望其唇則紅虫也。整宗必讀曰：面色乍青乍白，乍赤吐清水。

虫也。景岳全書曰：凡見心腹痛證，但揉按重捻而痛得暫止者，多有因虫而然也。

小淨府湯 治心腸痛懷吐涎喜湯

鷓鴣菜 分 蜀椒 三分 半夏 撮 苦楝根皮 椹皮 各三分

甘草 二分 生姜 片 熨日三貼 小兒一貼

大淨府湯 治心腸痛懷吐涎喜渴而頭目背脊卒痛如錐刺虫噬二便阻隔腰脚拘急者

鷓鴣菜 八分 檳榔子 六分 大黃 三分 甘草 三分 枳實 三分

若惡苦者去大黃與之別作大黃硝石丸兼服

神功丸 治心腹卒痛及與大小淨府虺族不下者

大黃 丁子 各一兩 巴豆 三兩 去皮 搗如脂 鷓鴣菜 六兩 ○右四物先搗大

蔓腹腹大呼吸短急等神功丸連服七服此丸大便微利志急可大淨府湯此症不可拍厥

黃丁子為末研巴豆內中合治一千杵用為散更取鸕鷀煎
汁如膠飴者和丸麻子大密器內貯之莫令歇氣法微伸
景備急圓

獨步丸 治就與得食即嘔或惡就藥而吐逆者

鸕鷀菜 十兩 蜀椒 一握 大黃 三兩 虛人 去之 ○糊丸服五十九至

一百丸以上以就下為知辟方內去鸕鷀湯送下

一物鸕鷀煎 錢十 屢與大小淨府藥氣不徹與族不盡者宜之

右以水八合煮取六合分溫三服以母就下為度所謂藥氣不

徹者壯人實家可與神功丸虛家久病不堪服者本煎主之

煎法不拘於
大老壯年

以方尺布裹之隨熨患處以痛止為度

煎法 惡藥 鸕鷀菜 半斤 蜀椒 五合 入水一升半煮至一升

浴法 見聖

浴法 兒家惡就藥服之不得徹者主之 鸕鷀菜 一斤

右以水一斗五升煮一斗二分灌大盆內象心浴臍腹以下半

身以汗出為度就下者至再三浴

禁忌 生冷甜膩肉麪酒酢及飲食過飽大飢

治例 ○胃冷三由吐就スル者理中安就湯二宜シ下利

腸痛スルモ亦佳ナリ○吐就スル者理中安就湯二宜シ下利

脈沈ナラズ胃中冷ニ屬セリ理中安就湯二宜シ○藏寒ニ由テ

吐就スル者ハ必四肢厥冷スルナリ理中安就湯二宜シ○吐就

世ナモ此ノ厥ヤ果又蛇胆ニ屬セバ終日モ愈ヘ又ゾ加附子湯ヲ持

重世其入下利清穀心腸痛懷ノ諸候アリ○世貫心ノ證三四

肢厥冷スル人比々有ル直ニ其貫心ヲ治セバ厥逆ハ自然ニ愈

此方貫心湯ニ宜シ○蔓難ノ蛇ニ肚腹細急滿脹シテ藏氣絶
 閉シ脉息ヲ短數ニルコアリ此人十ノ七八手足厥冷スルヲ吾家
 名ツケテ蔓脹ト云蔓脹ヲ治セバ厥證ハ治スルヲ神功丸急ニ服
 セシム○蛇厥ニ吐瀉ナク卒然トシ發スル胸塞氣短シテ言語ニ難
 キコ殆トト食厥ニ類スルアリ何レ腸胃ヲ閉達セバ厥證ハ霍然クルコ
 急ニ神功丸ヲ與フベシ○蛇厥ニ胸中微煩ニテ吐蛇饑痛スルハ證ニ隨
 フテ加附子湯理中安蛇湯ヲ選用スベシ若シ厥微ニテ胸中微煩ニテ
 洋府ヲ選用昔前厥者ハ後必發熱ノ場所アリ若シ卒然ニ目前ノ厥
 ノミヲ療セハ後來發熱ノ熱ヲ煽ク害アリ以上四件ハ蛇厥ノ偏證ナ
 一藥ニ曾テ藏寒ノ論ノミニ拘ルベカラズ
 理中安蛇湯 治胃中冷而吐蛇心腹煩痛者○人參 三分 乾薑 五分

雲木 茯苓 各五分 甘草 蜀椒 各三分 鸕鷀菜 八分 ○是陶氏安蛇方
 中去烏梅加升草鸕鷀菜也烏梅之酸徒收胃氣耳不如鸕鷀之制蛇逆
 加附子湯 治藏寒而吐蛇手足厥冷若下利清穀 前方加附子五分也
 錢氏白朮散加鸕鷀菜 治蛇家吐瀉登熱渴而腸痛者
 葛根 五分 藿香 三分 白朮 四分 茯苓 四分 木香 一分 人參 二分
 甘草 三分 鸕鷀菜 六分 新加之
 清肌安蛇湯 治寒熱往來肌膚枯燥如瘡似勞者
 柴胡 四分 黃芩 三分 半夏 五分 人參 二分 葛根 四分 麥門冬 六分
 鸕鷀菜 六分 生薑 一片 甘草 三分
 刪敏淨府湯 治蛇家熱利心腹脹痛者○柴胡 四分 茯苓 四分
 山查實 三分 黃芩 三分 澤瀉 四分 鸕鷀菜 八分 半夏 三分 甘草 三分
 三分處者還
 加人參 三分

貫心漸症極危
瀕死之人貫心湯
之凶毒ニテホル者ハ
熊膽汁一盞許ヲ
傾服セシメテニ
靜マラハ追更ニ方
品ヲ選用スベシ

原是同春淨府去臭猪苓胡黃連三皮我木人參加鷓鴣菜
者也故目刪繁淨府以別家制大小淨府云

○貫心之煩症貫心湯ヲ與工微セズバ二三劑ニ至又不徹神功ヲ
與工ヨニ方徹底ヲ見サルモノハ遠ニ他疾トスベカラス三日ヲ過シテ死
團然トメ下ルゾ貫心退カバ將息ハ大淨府湯ナリ

○貫心之漸証其人實家ナラバ神功ヲ與工ヨ若ニ身ニ大熱ナクニバ
貫心湯ニ宜シ貫心退カバ大淨府湯ニ宜シ若シ其人本下利セハ神
功九宜シラズ刪繁淨府理中安蛇之類宜シ

貫心湯 治心中串痛呼吸將絕顛倒昏昧者○南部草烏頭二錢
蜀椒五分 乾薑七分 真根人參五分 鷓鴣菜一錢五分
右五味以水四合煮取三合去滓內飴一合微火沸烱取二合半

蛇淋飲加
紅花

通評虛實論曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也

頭痛之變ニ頭瘡アリ醫人他藥ヲ用ヒ久ニ不愈モノハ蛇毒ゾ蛇
淋飲加紅花ニ宜シ

雀眼四令散之屬ヲ用ヒ鰻鱓臭ニ炮芥苡子ヲ豆油ニ

和シ浸炙リテ食セシムルハ愈蛇家ノ雀眼ハ蛇飲ニ非スハ
効ナシ下利スル者ハ刪繁淨府ニ宜シ

兒童紅吻若クハ鼻下爛紅等遺毒ニアラハ蛇毒ナリ遺毒蛇
毒俱ニ大淨府加紅花湯ニ兼テ大推ニ灸スルヲ毎日七仕ナハ必驗ア

リ○口鼻唇牙熱爛膿臭等諸毒功ハ蛇阻ヲ為所也可知
蛇淋飲 治蛇阻膿血淋疼陰莖腫起癩爛或尿陰腫起下
白物等之症百治不効者○鷓鴣菜二錢 木通一錢 甘草五分

刺毒蛇毒
之辨

大黃 七分 右四味五合水煎取三合去渣温服

痢毒八痛悶シ不移頑^新拘牢也就毒八之ヲ按シ手ヲ駐ルハ指下感痛沸ト鳴リ渡リ鮮散スル氣味有

禁口証ヲ憂シ此毒六毒汁壞血胃中ニ汎濫シテ然シルナリ

天行痢

馬脾風 暴卒喘急或效或嘔或微利或直視欬揚或目眶下陷

眼光昏翳矣宜麻杏甘石兼神功丸可就有者本方加鷓鴣菜○

右方奪命丹牽牛大黃之九菜也後世人參桂柳等ヲ加ヘテ用テ有

毛^備急丸ニ方^モレリ○黃耳杯可也此症漸瘳頓症ト有リ

就家治下利而心下鞭滿痛支呼吸一身不可轉側者十未^備散

加鷓鴣菜 芫花甘遂 大戟^{各三分} 以鷓鴣換大棗

癰

新製

就家治過經數十日熱仍不解其人津液枯渴舌焦而縮髮全空
謹言者 仲景方 夾冬門冬湯兼獨步丸每服一錢若渴者加石膏
若煩者加竹竹如黃連 本方夾冬門 夏 半夏 人參 甘草
大棗 各三分 粳米 六分

治例參連 三黃抑肝抑膽熊膽朱砂羚羊角等也

抑癰飲 治就癰又小兒驚搐號泣怒罵屬就者多宜之

柴胡 六分 釣藤鈎 四分 鷓鴣菜 八分 甘草 三分 大黃 三分

右以水三合煮取二合分温再服

苓桂木甘湯^{仲景方} 治病後心下滿上氣頭眩○苓 茯苓 三分 桂枝 三分

蒼朮 三分 甘州 三分 以水一合勺煮取一合三勺服

就瘰八胃內群就各自差池シテ思ヒニ槍擊シ上部ノ筋脉ヲ動

就瘰母之就

消渴

遺溺

浮腫
淋瀝

蛇腫

暢スルナリ又蛇瘡ハソノ群蛇交互ニ糾結メ上迫シ胃口食管ニ壅閉
スルナリ貫ハ蛇ハ母蛇臍内ノ藏器ヲ擊擄シ衝心ノ如ニ貫心スルナリ
茯苓建中湯傳芳治病後心下悸而腹裏拘攣者今新加鷓鴣
菜蜀椒以貫本治方旨同蛇瘡苓桂木甘之例
茯苓芍藥桂枝甘草大棗膠飴以水三合煮取二合內飴
消渴滋陰降火加石膏湯奇驗有蛇渴大淨府加石膏輕症
小淨府二宜シ

蛇動遺溺結毒遺溺俱ニ小淨府湯三宜シ丈夫女人久年
遺溺ハ蛇淋飲ニ宜シ鷓鴣菜二三斤ヲ服セハ愈ニ緩ニ服スベシ又
一切小便閉若浮腫若淋瀝若尿等宜東洋艾山湯蒲黃換木通
蛇之水病ト思ハルハ先目上ニ臥蚕狀ヲ見ハスヲ必セリ○毒腫ニ蛇ヲ

又
一劑毒内攻腫重



蟲脹
脹蛇脹之辨

兼ナルト有小淨府ヲ用蛇盡ハ瘡藥ヲ用ヒヨ東洋赤小豆湯奇方
也○兒童生冷甜膩ヲ過食シ腸胃ヲ傷損シ下利洪腫氣滿短
息者消化道寸水之方無効者必蛇藥ト知ベシ蛇藥ヲ用蛇下テ自腫
退也餘腫通利セザル治例ハ理中分消敦阜方ニ依有効ト必セリ
東洋赤小豆湯 赤小豆 五錢 商陸 一兩 麻黃 七分 連翹 大黃 五分
桂枝 三分 生姜 一錢 右七味以三合煮小豆煎餘藥生取一合半
分消去積實加鷓鴣菜湯 雲木 茯苓 豬苓 澤瀉
腹皮 橘皮 原朴 縮砂 香薷 鷓鴣菜 甘草
敦阜方 蒼朮 紫朴 橘皮 甘草 夾心 赤小豆
商陸 木瓜 梔子

龍洲家語曰古之蟲脹因蟲毒而脹也今之蟲脹因蛇毒而脹也

故因蟲毒煮治之以蟲茶因就毒者療之以就茶
 李仲梓曰鼓脹者中空無物腹皮細急多屬干氣也蓋脹
 者中實有物腹形充大非蟲即血也○按不足為證
 千金方曰蓋脹但腹滿不腫水脹脹而四肢面目俱腫大有醫者
 不善診候治蓋以水茶治水及以蟲茶如此者仲景所謂愚醫
 殺之又曰心勞熱傷心有長蟲名曰蓋長一尺貫心為病又曰勞
 則生熱熱則生蟲心蟲曰蛔○按蓋脹之名不思蟲創之ハ
 必ヤ蓋毒ニメ止ハ其外ニ蟲下梅又キ物ハラシ又ヤ心蟲ヲモ蓋下枳
 スケハ八蓋ニ二物アリ古蓋脹蓋毒ニ因テ臏脹又ヤ今テ彼蓋毒
 ニ屬スモノニヒタリ廿六今ハ蛔毒ニリ脹スルヲ蓋脹云テ可ナクヤ
 家語曰今之蓋脹猶古之蓋脹也而今之為蓋脹也真非古之蓋脹

拔毒能因足
 脚痺疾者神
 效兼用可也

矣就毒是己○鼓脹脹滿者瘴氣結毒冷熱結滯之變中
 滿氣宜腹皮細急也治方除瘴解毒釋滯之茶可也水在不可
 大淨府湯 治初蓋吐實之證○脾怯之者刪繁淨府湯
 拔蓋湯 治蓋脹久年不愈者 鵝鴝菜 七分 檳榔子 五分
 啟甲 七分 酢炙 大黃 四分 廿三分 乾漆 五分
 以水二合八勺煮取二合隨症加減
 礪砂丸 治蓋瘴氣滿心腹堅牢不散胸中連背疼飲癩瘕僂僂等
 啟甲 二錢 礪砂 十錢 乾漆 八錢 生漆 二錢 桃仁 五錢 各五錢
 烏頭 六錢 芫花 七錢 右八味為末白嚴醋煮熟少和麩為丸
 綠豆大每服五十九至百九空心温酒下加減法若蓋氣難散者
 加雄黃十錢麝香五錢

德本磁石丸 治中實氣滿鼓脹 浮石 滑石 各三分

磁石二錢 將軍四錢 九槓子大服一錢 引至二錢半

灸法 章門 痞根 腎俞 至十萬壯以徹為度

靈樞上膈篇云 共為下膈者 晬時乃出 ○相州之玄仙之

子理中 蜀椒 烏梅 二斤 付八十分 一斤 付五十六分

獨步丸 乾漆丸 九二其効神之如之有

獨步丸 乾漆丸 九二其効神之如之有 瘡又毛再發又此也

虛者元氣自虛也 神也此其相同者也

有裏實此則元氣

冒反

奇應丸

熊胆十雙位 麝香百二十分 金箔百枚

右百粒 存少 夕位 二九 八

沈香 人參 各六

麝香 麝香 金箔 百枚

藥酒方

酒一升 鷄卵五枚 砂糖十錢 桂枝二錢 枳二錢

右浸酒十五日 成而服之 桂林須盛囊

藥湯方 同 硫黃三斤 鹽三升 酒一升 右水四斗 五升 攪煮 減一分為度

○奇効丸 菽 合歡 各五錢 藥三錢 胡連二錢

○奇應丸 熊胆三錢 沒沈各四錢 麝香一錢 金箔

○黑丸子 合歡五錢 沈香一錢 木香二錢 黃連四錢 熊胆三錢

○調中散 茯苓五錢 菽五錢 朴木藿良 各三錢 木三錢 椒丁各三錢 甘三錢

○黃精湯 製黃神 石膏 翹 連 苓 菝 薄 甘 或 加 黃 芩 消

○平心丸 青藤石三錢 沉五錢 苓 將各四

○葳連湯 治諸氣疾 衝心 直視 煩悶 或吐血 不者 方 葳 連 各等 少加

熊胆文妙 ○熊參湯 參 熊 等 主治同方 小兒驚風 亦可

胃反

德本磁石丸 治中實氣滿鼓脹 浮石 滑石 各三分

磁石二錢 將軍四錢 九槓子大服一錢 日三至二錢半

灸法 章門 痞根 腎俞 至十萬壯以徹為度

靈樞上膈篇云 此為下膈者 晡時乃出 ○相州之玄仙之

茶談辨曰 後世胃多有寒證 烏梅丸 附子理中 蜀椒烏梅

可加タル煎汁 二下 七日之間 食之 絕之 治之 其効神之 如之 有

胃反 德本之理中散 加牡蠣玄胡索之煎汁 獨步丸 乾漆丸

力又八面方 兼十手抄也 又瘡毒內攻 胃反二妙也 瘡毒又再發之也

法也 瘡胎毒也 ○虛實寒熱之辨 諸病有虛者 元氣自虛也

宜補也 瘡瘡有表虛者 裏虛亦元氣虛也 宜補也 此其相同者也

諸病有實者 邪氣實也 可瀉也 瘡瘡有表實者 裏實此則元氣

藥酒方

酒一升 鷄卵 五枚 砂糖 十錢 桂枝 二錢 枳 二錢

右浸酒十五日 成而服之 桂林須盛囊

藥湯方

同 硫黃 三斤 鹽 三升 酒 一升 右水四斗 五升 攪煮 減一分為度

奇効丸

菽 合歡 各五錢 麩 三錢 胡連 二錢

奇應丸

熊胆 三錢 沒沈 各四錢 麝 一錢 金箔

黑丸子

合歡 五錢 沈香 一錢 木香 二錢 黃連 四錢 熊胆 三錢

調中散

茯苓 五錢 菽 五錢 朴木 藿良 各三錢 木 三錢 椒丁 各三錢 甘 三錢

黃精湯

製黃神 石膏 翹 連 苓 芩 薄 甘 或加黃芩 消

平心丸

青藤石 三錢 沉 五錢 苓 將 各四

菱連湯

治諸氣疾 衝心直視 煩悶 或吐血 不者方 菱連 各等 少加

熊胆文妙 ○熊參湯 參 熊 等 主治同方 小兒驚風 亦可

方 ○胆熨名湯

胆礬十兩 礬砂二兩 右三味以布袋盛之 煎以水 煮十餘沸

因將煮汁于滓投桶中用水一石煮適寒溫敷治以十百為一紀

○黑龍治用... 煎螺... 合歡... 我連乾橘... 熊胆...

○白散 治留飲痛疝痛積痛... 熊胆...

○赤寶散 甲六十 乙四十 丙二十 丁一 右散

一方 胡椒丁子 山椒三 肉桂二 麝香三 附子四 紫柏花四 硫黃四 蟾酥

又方 蛇床百 丁子五 山椒日 附子三 右煉蜜

又方 蟾酥三 何片二 志柏花二 丁子一 右煉蜜

患精方 龍骨一 訶子二 宿砂二 辰砂右丸 溫酒調服

東洞翁丸散方 ○救急

○大竹蔗丸 大黃十 黃芩四 人參五

右三味為末糊丸

東洞先生曰治心下痞鞭不大便者南涯先生曰治血凝于心下氣鬱不伸者也其症不大便或心下痞鞭或痛是所異於黃鐘丸也

黃鐘先生曰治血氣不伸于下結聚於心下而痛者也

○夾鐘丸 消石六 甘草人參 當歸二 大黃八

右五味為末苦酒三合煮成二合內諸藥攪之勿令焦著如飴狀而下火

內消石杵為圓服之即消石大圓也一方加甘遂五分

東洞先生曰治腹中有堅塊而心下痞鞭或腹痛急迫者南涯先生曰治血塊在膈上心下痞鞭或腹痛食不下者

血凝滯或腹生塊者

○姑洗丸 甘遂 大戟 白芥 各六分

右三味為末煉蜜為丹服即控涎丹也

○治胸膈有毒而喜吐涎沫咳唾掣痛者

○治痰飲在胸血氣不得循者也其症咳嗽短氣胸間掣痛或項背強痛

雖疑似於十棗湯之症異其經在也十棗湯者在于心下血氣必迫故心下

痞鞭滿頭痛汗出脈弦也此方者毒在胸間血氣閉塞故無前症脈自

閉也

○治度在胸間掣痛或血氣凝滯而胸中結水逼上咳唾者此方之症疑

似于十棗湯及南呂宜考南呂亦同胸膈有事故也

○仲呂丸 大黃 牽牛子 各六分 甘遂 三分

右三味為末糊丸即神祐丸也

○治腫滿小便不利不大便脾痛者

○治水聚于心下走血脈中者其証心下鞭滿手足青筋出憤起為痛或

骨節腫痛或脾間牽痛或陰囊腫明少腹痛也

○治血氣自內迫而驅逐水於上依連內若脾間有事而迫心下則疑似紫

圓紫圖者自外逼內宜明不

○雜寶丸 吳茱萸 芫花 芒硝 各三分 商陸 四分 甘遂 二分

右五味為末糊丸即平水丸也

○治脚腫而痛小便不利不大便者

○曰下部結水衝氣者其証水腫腰以下甚乾嘔短氣或脘傍有水塊

捫之為水聲陰囊腫大也

曰治下齋血氣之變故下結水此方多治下部之狀

○林鐘丸 甘草 黃連 大黃

右三味為末糊丸

曰治心煩心下痞不大便急迫者

曰治氣逆滯者其症不大便煩悸初生兒多用之

曰血氣自下迫上故以大黃降氣獨迫之氣乃以黃連治不伸于上

之血氣甘草以治逆而所迫之氣

○夷法丸

大黃 浮石 桃仁 赤石脂 消石

右五味為末糊丸乃浮石丸号夷則丸

曰治腹中有堅塊而見血証者

曰治腹中有堅塊而水滯者其症經水不利少腹脇傍有堅塊有水或

腹脹如鼓有青筋也大黃牡丹湯桂枝茯苓丸之輩兼用此丸可也或

○治腹中結水或生塊不下通者

曰因浮石能治血症先人製此方竟以浮石為丸之類可也

○南呂丸 大黃 黃芩 甘遂 青礞石

右四味為末糊丸即痰痞丸也

○曰治胸膈有毒喘者

曰治有留飲血氣不循者其症心下痞下痞滿腹中雷鳴或咳嗽短氣也半

○夏浮心湯小青竜湯之類兼用此丸可也

○白血氣不伸于下故氣停滯于上水亦停也

○無射粉 牡蠣 角石 輕粉

右三藥為末以雞白和之傳瘡上

東洞先生曰治諸瘡膿汁出者

羸香先生曰唯乾瘡耳

○應鐘散

大黃十 芩藜六

右二味為散服

治轉戾不可治者

曰治大便難心下痞枳之濡而煩悸者或諸症難治而上衝不大便者

○伯州散

反鼻燒透 酒 津蟹燒存

角石各半

右三味為末酒服治無名毒腫

○曰治諸瘡膿汁難痊者

曰治諸瘡惡腫服之起脹膿潰也橫痃瘰癧之類可必平之

曰治氣不宗血凝滯為腫物膿未成者或已膿成者所謂瘰癧便毒

諸瘡結核者或疔瘍生青筋痛甚者或止截疔之血或紅紫疔者凡

血凝滯氣不行者主逐凝滯之血也

○栲肉丸

栲肉

鹽漬者

梔子

存性各

巴豆一 輕粉八

右四味為末服三分或四分

○曰治諸瘡毒者

曰治諸瘡毒惡腫焮痛者所云疔瘡橫痃疔乳岩乳疽之類宜

用此散

曰披解瘡血諸瘡刺痛或腐爛而痛者此方之症位淺故有氣動之息

○七寶丸

午膝輕粉

各四

丁子三 土茯苓三

大黃一

各

右五味糊丸每服四分日二服凡六日至七日止服後服后方丸每服五分自

八日止服待口中腐爛愈而能食復前方如初

曰治瘡毒骨節疼痛諸痼疾其毒難動者

曰治瘡毒難愈骨節疼痛或頭痛或諸結毒凝滯難治者

曰治氣不動血凝滯結毒疼痛者此方乃唯動結毒而已非去毒故服

此方後必服后方也

○後方九 大黃五雞活香五巴豆七

右三味為末糊丸

羸齊先生曰服前方後必與此方浮下其動搖之毒若惡雞活香者與

紫圓亦可也

○續七室丸 水銀三消石三凡石六食塩二

右四果先碎消石凡石合二味內鍋中以茗盪覆之以泥固封上火

○燒之半日許而下火取盤中之霜以糊為丸服之如服七室丸法

東洞先生曰治七室丸証而劇者

○浮石丸 浮石 桃仁各半

右二味為末糊丸

東洞翁曰治腹不滿其人言我滿而腹皮見青筋者

○桃花散 桃花 大黃二甘遂一

右三果為散服湯法以水一盞二分先煮桃花取八分內大黃再煮

取六分內甘遂末服治水腫腹滿不大便者

東洞先生曰治腫滿大小便不通者

羸齊先生曰治血氣內攻是水腫者或癰瘰內脹或痺甚內攻水腫短氣

急迫者麻黃加木湯此湯兼用有治効也血氣迫水滯于心下非此方所

治若腹脹之水去迫益甚不可不知也此散麻黃加木附湯或越婢加木

附湯兼用可也

○生乳 消石^{十六} 食盐^三 凡石^{十二} 綠岩^{十八} 雲母^二 青塩^三 半

右八味各別搗為末燒之如燒續七宝丸法糊丸麻子大每服三丸若病重者服五丸日一服之如服七宝丸法

曰治肺痿肺癰諸瘡毒在膈者

曰治胸間血毒凝結難動者及外生瘡者也所謂肺癰噎膈癰瘡梅毒之類宜此丸大平目的同續七宝丸

○生乳煉製法

サワタシ^{五六} 及寸位ノ^八 桶^六 ヲ用イソノ^六 方^八 右ノ^六 割^六 日藥味^六 トロ^六 トロケルヲ以テ度トス燒シトスル時^六 カワカワリトテワケト
トフタノ間へ西ノ内位ノ紙ヲ一重ハサヘシ乳ヲ紙ヘトルタメナリ其上^六 ヲ

大凡セシコフ一本位ノ間燒ナリ^{ハナ} 中ニテクツク煮ル音止ヲ以テ度トナス少シ燒

過ハヨケレ目方ヘルナリシカニテ傍へ預メ^{ハナ} 丸ヲホリヨキ燒キナリ

タル寸其穴中へサカサニイ^{ハナ} 封スハシ是ハクキヨリ氣ノ洩ヌタ

メナリ如此シテ^{ハナ} 此時乳ハフタノ紙へ針ノ如クタケカスハソコへユビリツキテノコルナリイカニ

○生乳又方

水銀 凡石丹岩消石食盐 右五味

○保嬰丸

布^七 味^七 各五^七 為末^七 入射^七 熊胆 麝香 龍腦 菝葜 檳榔子 右朱砂為衣

○左左羅丸

熊胆 麝香 龍腦 菝葜 檳榔子 右朱砂為衣

方

○保童丸方有前 生ふたん平ふんをててせよ

ひたぬれ... 七人といふ... 用ひ方

○清心錠 阿蘭龍胆一 廣東人參知 黃連

神効 能胆三 或用胆五分 麝香三分

○鎮心錠 辰砂一 胆紅 腦紅 麝香五分

○保童丸 莪朮 查猪 澤麵 芽 燕艾 木夏 甘 連 胡

丁木 檳 各三分 麝香 腦紅 胆紅 右為丸 朱砂 為衣

○敗毒煎 羌活 防風 藜菜 十番皮 蓮葉 側豆

葱冬 白芷 或加烏頭 右水酒煮 犀 燕 患 處

○熊胆丸 小兒一切 牽牛 鶴虱 知母 大黃 威靈 莪朮 青皮

木香 七錢五分 陳皮 黃芩 枳實 五錢 黃連 二錢 甘草 五分 赤小 三錢七

雄黃 乳香 二錢五分 丁子 同 麝香 三分 龍 五分 熊胆 五分 胡黃連 二錢


○妙効丸 佛門事親 沉香 丁子 木香 乳香 麝香 三棱 莪朮 牽牛

黃連 雄黃 雷丸 胡連 鶴虱 黃芩 大黃 熊胆 甘草 各三錢 赤小豆 三錢

檀香 輕粉 麥巴豆 粒 右二十一味 為丸 朱砂 為衣 阿蘭 上好 麝香 四分

○紅丸子 辰砂 熊胆 買自麝香

右乳鉢内ニ混和シ別ニ葛粉ニ煮テ餅トシ葉ニ和シ丸ス 目方一分宛ニ丸シ一粒六十五文 一包五粒 三錢ニ賣ル



方 散 一 包 一 粒 一 包 一 粒

一 第 一 氣 有 者 一 散 一 氣 有 者 一 散
神 氣 有 者 一 散 一 氣 有 者 一 散
一 大 人 一 粒 一 小 人 一 粒 一 散 一 氣 有 者 一 散
一 大 人 一 粒 一 小 人 一 粒 一 散 一 氣 有 者 一 散
一 大 人 一 粒 一 小 人 一 粒 一 散 一 氣 有 者 一 散

都 散 一 包 一 粒

散 一 包 一 粒 一 包 一 粒

○玄仙翁曰虚勞ノ長病昨日ニテ細數ノ脈ナリシガ急ニ緩脈ニナリ病人モ
快クアルアリ是レ反テ死ニ近キヲニテ恐ルベシ其死三日ニイデス
○又云脈ニ散脈ト云フテ脈ガコキガ三ニウキベリノ十キ脈ナリ覺ガタキ脈ナリヘリ
ノ十キト云フニ心ヲツケベシ此脈ノ病ハ一旦快ク見ヘテモ遂ニ死症ナリ
○虚勞トドノ證灸ヲ多クスエル病人又ハ平常ノ人ニテモ多ク灸ヲスル證
日ハ脈ガ大數ニナルモノナリ驚クベカラス
○又曰面色青白眼中青冷ハ滋陰降火ノ候ナリト切要方義ニ見ヘタリ
○又曰長病大病ノ人眼ノ光リ急ニ甚シキハ死多クハ其日ノ中ヲ出ヌモノナリ
○又曰諸病古ニ皮ナキガ如シテ赤ク潤ヒナクヒニワレル古アリ此古アル病人大ニ
渴シテ熱湯ヲコムモノナリ是多クハ虚古ナリ大熱アリトモ先ツハ涼薬ハ
斟酌スベシ十全大補ノ如キ温補ヲ用テ居ルウキニ諸症退イテ快氣スル
モノ多シ此等ガ彼ノ療治ヲ持テイルバナリト得ト味フベシ又一種虫證ニ此
此証アルナリ能ク見ワクルヨフニカクベシ
○又曰古ニ潤アリテ淺黄色ニシテ熱湯ヲ好ムハ極虚ノ古ナリ此古ニ少シモノ

勞

イヒノシブリカゲンナルハ難治ノ症ナリイツレ桂附ハ必用ノ症ナリ産後脱血ノ時ニ多クアル古ナリ

○言曰勞瘵ノ名ハ肘后方ニ出タルモノ医書ニテハ始メ其ハ病源候論以下千金外臺ニ論シ下宋元ニ至リテクハシク記スル所ニ虚損諸不足ヲ勞瘵ニ組入ルハ甚不冷味ナリサテ此疾モト胎毒ニ根サシテ新血ヲ不榮シテ乾血癆滯ノ人風寒ニ傷レテ咳嗽ヲ發シ欲愈ノ時ニ調節不具或勞動スルアリテ輕邪ニテモ散シテ子テ數ニ再復シ勞ニル或瘧後疫後ノ勞又ハ葶勞瘵皆同因ナリ瘵勞ハ十七ハヲ可治サテ其發スルニ遲速ノアルハ外ヨリ動サレテ發スル故ナリ廿氏大槪十七歳ヨリ三十三歳ノ際ニ發スルナリ是ハ血氣既ニ盈ントスレ氏毒アル故ニ潤澤セテ情慾勤キ心勞スル折カラ外感ニサレテ發スルカ故ナリ老成ニ至レハ一通手合スニテ勞スルヲ薄ク倍ノ所謂身ヲキタヘルト云氣味ニテ胎毒ヲ畜メタル人モ勞ヲ免ル也廿氏其後ニ至リテ噎膈中風鼓脹ニ至ルモ其因ハ一毒ナリ又是ニ似タルモノハ氣癆ナリ素問ニ心氣痿ト云モ也又疝氣モ其状ヲナスヲアリ但脈不細數也是氣癆ヲ治シテ勞瘵ヲ治シタリト思フハ可笑ナリ然トモ是モ筋ノ

違タル瘵治ニテハ死ニ至ルヘシ又此勞瘵老人ハ俄ニ脈細數ニテラズ壯年ノ人ハ息ニ數ニナルモノ初ヨリ數ニナルモノ多シスベテ胎毒ニ根サテ勞動外感ニ引レテ發ト云フ合テ治スヘシ脈細數ニ至テ決不可治也○柴胡加龍蚘參連白虎酸枣仁湯半夏厚朴心竹葉石膏湯柴桂湯大黃廋虫丸五物解毒湯化毒丸蟹甲ノ場所アリ元年外感ニ屬シテ病付モノナレハ補法ハ不簡アルヘシ

○柴胡姜桂湯 動悸アリテ呼吸ヘサワリ咳スルニヨシ盜汗小便不利スルハ猶更ヨシトカリウルオヒノアル向ノ咳ヲ的二用ユ

○勞瘵脈數喉裏常有喘鳴足趺目下浮腫鼻傍扇動胸腹白疹出者不日死

○氣癆ハ人勞瘵ニ似タリ只脈不細數素問ニ心氣痿ト云モ也 酸枣仁湯 柴胡加龍蚘温胆湯ノ類選スヘシ眩悸常ニ舟ニ乘カ如ク手足煩熱セハ參連白虎湯夜中眠ル不能ニ狂スルハ有柴胡加龍蚘朱砂安神丸又微疫再復シタルモノ真勞ノ形ニ似タリ證候ヲ不詳ハ大病ニ至ル

可慎此六勞ナリト心得テ誤テ四花ノ灸ナトシテ外邪ナレ火逆スル故大病
ニスルナリ其古白胎黃胎ハモトヨリ胎ナリ只地アレシテサツクモ横堅ニ裂テ有
モ疫ニ属ス是ハ勞ノ形ナクフヲト食乏シテ煩ハ微疫ヲ不知他病トナシテ

誤治スルヲアリ此證ニ逢ハ最初ニ惡寒シタル有ヤト問ニ有ト云猶更時
過ル故忘テ居モアリ右古候ヲ以疫止トヲ知テ可治少毛熱ノ往來ナル
ハ輕疫カト心得ヨ又勞トス人疫ヲ受テ合病スハ甚劇症ヲ無救汰

又痰唾ノ臭ハ肺癰ヲ催アリ肺癰ハ可治ナレ本病ハ不治又瘰癧モ勞
形ヲ去蓋合病スモノ多ク死症ナリ是又瘰癧血絡中ニ凝結シタルナリ小

柴胡加石羔神驗アリ葛根湯モ背脊ノハルヲ目當トス連翹飲モ
用五物解毒化毒丸モ用ユ

○ 瀉瀉丸 生熟 反梟 酪 丁香 大黃 各一
生乳 麝香 各一方
五里

右糊丸每服五分日二服體大發赤疹者冀望効運用諸病

○ 中正湯南 即半夏藿香湯去苓加朴大連楮 ○ 經年宿停食毒在內

為積之証候或似痰似積宜察其因而治之又得病治之中間傷食嘔
吐者一女子不能穀食經三年而不治始食赤小豆醬又惡之靡食愜意
者甘諸糖盈口而護生更問其所得病則三年前過食桃花飯爾後
覺臍腹常如飽心神憤々惡聞食臭只臥深閨年此湯數十日而數病又
一少女惡白飯只食菜魚二年許服此湯百日許而全愈運用多端

○津田子曰大病長病ノ中フト眼工赤筋ノ張ルヲアリ是多ハ痰厥ノナス所ナリ
リハ天麻湯ニ土瓜根一味ヲ加テ効ヲトリシトズビクアリ但シコノ症足冷
ノ症多クハナレヌモノナリ

○薄荷荷圓 薄荷 良姜 桔梗 干姜 右煉密

○小言哮喘又哮喘トモ云病ト共ニ老ルアリ乱刺シテ韭菜鍼ニ腫シテ宛出血シ

急迫立トヨ退アリ此症諸ノ藥効ナキ其因病ニ係ルモノアリ腹候ヲ察スヘシ

○又巨哮喘ニ声アリテゼレト云咳嗽喘ト皆麻黄ノ主治トス外邪ニヨリテ表症ニ属スハ

ナリ喘息ニテ胸痛スハ桔萎枳實湯上氣ノツヨキハ蘇子降氣湯頌項強急スハ

葛根湯心下急迫スハ甘草乾姜湯ニ底野迦ヲ兼用ス或砂糖湯代用ス

○茶實丸小言喘息救急方 茶實生熟 百合根 榿石各等 三味丸每服一錢

○醫通曰治痰先治火治火先養陰是為治痰治火之的

○哮喘胸痛ヲ的ニ桔萎枳實湯上氣ノツヨキハ蘇子降氣湯頌項強急ス

ルハ葛根湯急迫スハ甘草乾姜湯砂糖湯兼用一士人哮喘患フ後ニ下

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

痰

指ヨ得輕粉ヲ多服シテ二三年ニテ治シタリ

○一商婦秋間ニ至シ大ニ喘息シ若ク常ニ動作不自油廢ナリ予ニ治ヲ求ルニ任セテ診スニ燧櫓ニ臂ヲ支ヘテ坐ス數十日動ク不能睡ルニ此形ニテ少ク倚側ニ立テ所ニ喘悸甚ク食ハ一椀位ト云仍其登スル時ヲトフニ脊ヨリ頸マテ如板ニリテ顧ミ痛ム葛根湯ヲ与テ五貼許テ起テ歩スルヲ得ルニ數日重テ全愈ス

○一老人久ク吼喘ヲ患声四隣ニ響ケリ甘草乾姜湯ニテ底野迦ヲ投シテ愈タリ登スルヲ前劑ニテ愈ス此證砂糖湯ニ喘帶ニ急迫ニ緩故也

○小兒百日熱十束湯控涎丹奇驗

○白咳嗽甚シキニ合谷ニ鍼シテ止ムアリ只恐ルヘキハ微寒熱ヲ帶テ咳ナリ

○柴胡羌活湯 動悸アリテ呼吸ハサワリ咳スルニヨシ盜汗小便不利ナスルハ猶更ヨシ本論ノ主治ニ拘ラスル方ヒノアル向テ咳ヲ的ニ用テ往來寒熱スルモノハ咳ニ拘ワラスニ柴胡桂枝湯ヲ与テ

○酸漿散 久嗽諸藥不効者神驗 酸漿霜 烏梅末 各等 以對症茶下

○咳嗽甚シキハ合谷ニ鍼シテ止ムアリ

○姓者五六ヶ月ヨリ咳ヲミツキテ藥驗ナリ分曉スト立所ニモハアリ子嗽ト云療疾ノ候ナリハ苦勞ニスルモノニ非ス

○小言曰反胃又翻胃全置二胃反ト出同義ナリ是ハ膈ト違テ食物得ト
 胃中ニ細ク出朝ニ食シテ暮ニ吐ス瀝囊ト云モノ同義ナリ近來此病多シ全
 胃ノ力乏飲食不能消化故ニ噯氣酸辛鼻ヲ衝キ嘈雜スルヲ頻ニテ腹
 痛甚シリ吐セハ痛乍止故ニ指ヲ以テ探吐ス食物ヲ吐盡ノ後ハ水ヲ吐ス何
 水ノ出ヤト思程多ク其水モ吐盡セハ煤色ノ物又海苔ノ如ク吐クモ有滑便
 ノ人モアレ先秘閉ス便ノ通スルハ痛薄シ大槩朝飯前決リ汗食後ニ
 至テ腹痛シ以上ノ語ル症ヲ作シ晚間晡後ニ吐ス此等飲是病過數日湯羹湯羹湯主之
 其人飲食ノ味不変却テ貪食平日ニ異ナリ此病寒病ニ屬ス膈膈ニ堅
 塊アリ是ヲ按セハ五體ニヒキコタユ數十日ヲ経タルハ腹ノ津液ナリ筋ハリテ
 常ニ鳴或足跗ニ微腫有又腹面ニ物浮出テツクリト頭足有カ如ク掛セ
 ハ又魚干クトト鳴テ没ス不鳴ニ無ナルモ有出沒無定所非塊非絡脈ノ
 凝結此物ノ見ルハ大病ニテ一快ヲ得モ又再発是必大腸ノ脂膜切テ腸ノ
 ホカレテ收ラサルナラシト意ヲ用テ胃反ノ人ヲ見ニ果シテ大腸ノ脂膜切工
 ルニ定位ニ不救也サテ此病原皆瘀血胎毒ナリ凡此病人何ニテモ見アタル
 モノヲ貪食シ食スレハ必腹痛ス魚肉餅麵生冷菓實ノ類ヲ食セハ別

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

冒及テ大痛シテ腹ニ至テ吐ス故ニ嚴禁スヘシ仍日用ノ食物常法ヲ定ム一日ニ
陳倉米一合ヨリ二合半粥又ヤワヲカノ湯取ノ飯是ヲ四度ニ分テ食セシム
飲物ノ多ヲ嫌カ故ニ藥モ一貼ニ限り湯水モ一合ヲ一日ノ分量トス茶ハ
別テ惡シ燒塩ヒシホ梅干燒味噌位ノヲ三テ食セシム物テ消化シ易ク
食セテ自然ニ胃力復スルニ經日月而愈ニテ後モ禁食專一也此法ヲ守
ル人ハ皆可治不能守人ハ辭テ不ノ藥病狀ハ施覆花代赭石湯附子梗
米湯ニ似タレ凡曼倩了字背ニ徹痛セハ神效神效湯吐甚ハ安中散疝積
參考シテ桂枝加附子烏頭湯ニ新新方ニテ兼用スルモ大十建中
散モ用スシ秘閉甚ニハ大黃甘草湯ニ加吳茱萸牡蠣ヲ用上積聚門ニ
語ル赤丸毛生漆ヲ酒ニテ用スルモ此筋ニ工夫シテ用ス
○安中散局治癖囊病神驗 延胡 茴香 桂枝各五分 蛎粉一分 良姜三分
乾姜三分 甘草五分 右七果水ニ合煮取一合服忌酒肉麵餅一切厚味塩茶
○香脂丸 治血積結痛 阿魏五分 乳香 沒藥 丁香各三分 右四果糊每服一分日三
○了字湯神 理癖囊病舊痛吐宿水得食痛劇嗜雜噎氣酸臭衝鼻
昏暮吐終日所食之物吐後痛如失次日又作前狀者方

右九味以水一斗合煮取一合分服忌生冷粘滑魚鳥肉油膩酒餅等物
○曼倩湯同 治陳久腹痛發作癖囊嗜雜吐食者○即四逆散加吳茱萸牡蠣
蛎一分 柴八分 芍七分 枳七分 吳萸一分 甘草三分 右六味煎服
此方了字湯同効只有彼驗是
驗者或桂苓木甘草蛎可者

芍一分 苓一分 吳萸八分 木枳各六分 橘四分 參三分 甘姜各二分 即茯苓加
右九味以水一斗合煮取一合分服忌生冷粘滑魚鳥肉油膩酒餅等物

○小言曰噎膈八病因ノ論多端ナレ胎毒瘀血ニ属ス瘦テ気ノ勝タル性急如烈
 火機會ヲ以テ世ニ居ル人ノ病也又猪首ノ人ニ少鶴首ノ人ニ多其病状食物咽喉
 ニツカヘ飲下不下其昔ハ白沫シハト聚出冷水ヲ飲テ通時モアレ是ハ初起ノ
 也後ニ強テ湯水ヲ飲ハ鼻孔ヨリ出テ終ニ八支タル食物ヲ吐出サテ粥
 モ通カタキハ糯米ノ粥又麵類ニトロクヲカケ又餅團子喉ニテ散セ凡物ヲ
 食スヘシ夫モ通カキナコヲカケテ飯ヲ食スレハ奇妙ニ通ル此症下レハ必吐
 ルナシ心神不寢外ニ苦腦ナシ壯年ニテ病ハ大半治スル也丹水子ノ利膈湯
 或半夏浮心湯及急湯ナト又菴羅果一味煎服スルモヨシ何故ニ喉ニツカヘ
 タルカ偶ニ下レハ又吐スルヲ無ト云フ尋ルニ喉ノ食道ノ左右ニ大絡有其絡中
 ニ瘀血凝結シテ癆瘕ノ如クニナル故ニ食道ヲセハメテ通用ヲ塞其所ヲ通
 過レハ胃中ニ納ル故吐スルヲ無也是ハ吐ニハ非不下也往時西京ニ橋本鍼源
 ナカ云人刺絡ヲ以テ行ル膈ヲ治スルニ人迎ノ邊ニテ絡ノ怒脹シ食道ヲ依モ
 ノヲ索得テ鋒鍼ヲ上ニテ刺ス黒血ヲ流ス絶粒ノ人立所ニ食スルヲ得
 タリ然日又前若ク登ス時ニ偏ノ絡ヲ刺ト又得食其癆瘕ノ所至テ知カ
 マシ一二度刺セハ鍼ノ痕邪魔ニナリテ刺テ不能終ニハ又不通ニナリ死スレ氏

噎

其通久時生ヲ万一二七望ヘシ或曰膈ヲ病人一日面部ヲ撫ルニ覺快日ニ按摩シテ全快シタリト是ハ喉咽ヲ依ル孫絡ノ面部ニ浮タルヲ按摩シテ結滯通暢シタルナラン病因考ニ思慮ヲハカキテ治タルヲ記是モ絡脈順流シタル方ニサテ其機アラハ早ク思慮ヲ省キ日ニ灌水スヘシ庶幾クハ可治也

○利膈湯治膈噎百發百中 半夏 山梔子 附子 甘草 生姜 三片 五味煎服
○烏神散 治膈噎食不可 河豚一尾去腸胃以紅花填滿燒存性白湯送下又天石為末湯送下亦良

○宗對馬守殿膈噎妙方紀伊巫相公臣何氏全左衛門歳五十餘患膈噎三年諸藥無效用後方半割愈 午リト云鳥取上品人參好 右先ケリノ腹ヲ少キリ開キ膈内へ人參ヲサシ入口ヲ縫シカシテ頭ヨリ尾迄繩ニテ際ナク卷米異桶中へ一夜漬置取出シ背瓜ヲ去リ霜トナシ糊丸一羽ヲ一割トス

○津田子曰嘔吐ノ証ニ動氣ノ強キハ必ず煎湯ハウケヌモノナリタトハ相應ノ藥ニテモウケヌモノナリ其時ハ下焦ノ穴処へ針灸ヲ見ハカラフニシテ動氣ヲ引サケ藥ハ九葉カ散葉ニシテ用ヒソロク動氣ノ静リクナシテバ又煎葉ニテウケスヘシ此心得ナシニ湯葉ヲ用レバ反テ病ヲヲコズリ吐モ動氣モ引サリ葉ノトガニナルモノナリ心得ベシ

○又曰右ニ白ニ厚クカハリ寒熱往來アツテ嘔吐アル症小柴胡湯効ナクハ仲景黃連湯奇効アリ方ハ醫方集詳論アリ

○奇方 諸嘔不受水藥者 用鼠尾尾州穗ヲ抽花未開時五六寸ニ切り陰乾シテ莖葉トモニ煎服ス神驗アリ

○津田子曰噯氣ノ症其因四ツアリ脾胃虚寒ノ噯アリ宿食ノ噯アリ
 心下痞鞭ノ噯アリ酒積ノ噯アリ脾胃虚寒ノ噯ハ毎ニ熱湯ヲ飲ハナヨル
 臭ニナシ主方ハ理中湯ニ丁香木香陳皮ヲ加ヘ甚シキモノニハ附子ヲ加宿食
 ノ噯ハ玉子クサシ不換金正気散ニ其時ノ消食ノ加味ヲシテ用又宿食
 ノ次シキハ噯氣有テ泄泻腹脹等ノ症アリテ三四年以外ヲ経テナラザ
 ルモノアリ此症ハ香砂平胃散ニ厚朴ヲ大ニ加テ用エベシ治セズト云フナシ
 但シ此症噯氣ナケレバ十分ノ功ナシ
 ○又曰ハ子ヤキガ堅ク痞テ玉子臭キ噯ガアラバ生姜泻心湯ヲ用エベシ
 シノ症ニ泻ガアルナラバ半夏泻心湯ヨシ若シ大便カ秘結シテ心下堅ク
 噯アラバ旋覆代赭石湯ヲ用テ奇効ヲ得ルヲ毎々ナリ三方用ヒヤウソ
 シタイ如此方ハイツレモ傷寒論ニアリ
 ○又曰大酒ノ人ノ噯氣多クハ酒癖ノイタス所ナリ噯氣ノ中ニム子ガ痛ムキニ
 アルモノナリ主方ハ順氣和中湯ヨシ方ハ方彙ノ翻胃ニ出タリ

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

嘔散

治用服者痛 喘螺各三

時日...

[Faint, mostly illegible handwritten text on the right page, likely bleed-through from the reverse side.]

○癰癤灸法并九方出于小兒驚癰門

○大柴胡或龍胆湯少和十九之類妙切十九兼用效

○癰癤治方 常用起瘰丸 鷓胡菜大生漆 菖藁 大黃名甲家方治癰灸法

下穢物或吐者可也時々備急戒此四試治否法 葛藟王去麁皮為末分為三四服用白湯下

○腹證奇覽載上癰癤治法

[Faint, mostly illegible handwritten text on the left page, likely bleed-through from the reverse side.]

ノ

○津田子云スベテ痞ノ類腹ノ左ニアルハ大事ナシ右ニアルハ油断ナラヌモノ也
 ○又曰腹ノ痞ヲ按ニ水ニ浮タルモノヲイロフ加ク予ニ隨テ動ク痞アリ是證
 病人當分見ワケヨシトモ遂ニ死症トナル療治ヲハヤクコトハルベシ
 ○又曰スベテ積ノ療治ハズイフ元氣ヲ取りタテルヤウニスベシ積ノ動ゼヌヨフニ
 スベシ内ヲ調ハ積ハ自然ト消テナクナルモノナリ
 ○又曰脈ニ結脈促脈代脈ノ三ツアリ結ハ緩脈ノウチギレ有テツマツク脈ヲ云フ促ハ
 數脈ノウチギレ有テツマツク脈ヲ云フ結促ハ蹶突ノ應トテ諸病積塊アル
 病人カ或ハ氣血留滞シタル病人ニハ時々アル病脈ナレバ深クキツカフニ非ズカ
 テ代脈ハ全クノ死脈ニテ其形状忽クノ間ニ變改シテ代ル故ニ代脈ト云フナリ
 ○大概食積ハ右位シ血積ハ左位ス瘀血有病人ハ多ハ夜ガキニ様子悪キ者ナリ
 ○辣茹丸 氣味辛勇猛烈運用無極 辣茹 右味細末糊丸茶末為衣
 ○赤丸 治血癰腹痛 生漆 大黃 麵粉各等 右蜜丸每服五分日二夜一發
 赤疹為知

○津田子云スベテ痞ノ類腹ノ左ニアルハ大事ナシ右ニアルハ油断ナラヌモノ也
 ○又曰腹ノ痞ヲ按ニ水ニ浮タルモノヲイロフ加ク予ニ隨テ動ク痞アリ是證
 病人當分見ワケヨシトモ遂ニ死症トナル療治ヲハヤクコトハルベシ
 ○又曰スベテ積ノ療治ハズイフ元氣ヲ取りタテルヤウニスベシ積ノ動ゼヌヨフニ
 スベシ内ヲ調ハ積ハ自然ト消テナクナルモノナリ
 ○又曰脈ニ結脈促脈代脈ノ三ツアリ結ハ緩脈ノウチギレ有テツマツク脈ヲ云フ促ハ
 數脈ノウチギレ有テツマツク脈ヲ云フ結促ハ蹶突ノ應トテ諸病積塊アル
 病人カ或ハ氣血留滞シタル病人ニハ時々アル病脈ナレバ深クキツカフニ非ズカ
 テ代脈ハ全クノ死脈ニテ其形状忽クノ間ニ變改シテ代ル故ニ代脈ト云フナリ
 ○大概食積ハ右位シ血積ハ左位ス瘀血有病人ハ多ハ夜ガキニ様子悪キ者ナリ
 ○辣茹丸 氣味辛勇猛烈運用無極 辣茹 右味細末糊丸茶末為衣
 ○赤丸 治血癰腹痛 生漆 大黃 麵粉各等 右蜜丸每服五分日二夜一發
 赤疹為知

積。五虎丸試治血積痛 血竭 靈脂 乳沒 蒲黃 右等分糊丸

○阿魏丸 阿魏 乳沒 丁香 煨三 右糊丸

○驚甲湯 驚 大黃 虎杖

○阿魏化痞散通醫 枳 紅花 木帰 芍 各一 鼈 酥炙 大 八錢 蒼朮 兩一

○勝金散 治癩血痛 當歸 胡索 各五 桂枝 五靈 各半 右為細末白湯服若煎服則各等分可也

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

○小言曰心痛ハ難治ニテ又急症ナリ其人常ニ脈弦急ナルモノ多シ是ニ緩急

ノ二ツアリ急ナルハ人ヲ呼ノ間モナリ死ス免角救フハナラヌ病ナリ金匱ニ云トコ

ロノ病状今ノ見トコロト符合ス背痛徹心心痛徹背ト云ハ心背一時ニ痛也

心下ハ手モ近クハカラス少シナリテモ忍フナラス背ハ五俞ノ邊痛強或ハ

ムツクリト腫ルモ有平臥スルヲナラス起坐シテ苦ム胸膈ノ痛ハ常有ノ症

ナラズ吐血スルヲアリ心痛ハ鳩尾ノ真中少シモ服ハ不偏痛ム又一種酒客

ノ胸痛ハ吐血後其痛ヲ忘ル有其緩ナルハ間々救フヘシナテ積痛モ心痛ニ

甚似タリ只積ハ撫摩スルヲ好ム按者ノ手ヲ放シカヌルモノナリ是真心

痛ニ非ル所ナリ心得ヲリヘシ又血ナト俄ニ止テ心痛スルモノ時々見受タリ

是ハ下血癰瘡シテ愈ル也劇症ハ十ヶレ長十ハ二病ムコトアリ是等ノ

症兎角温藥ヨシ又甘味ノ品ヨシ此症ニ腰部ハ灸ヲシテ驗アリシ

○千金細辛散 治胸痺達背痛短氣方 辛甘 各兩 枳實 乾芩 木 各三兩

桂枝 各五兩 右搗以酒服方寸匕

胸心

○心下痞痛乾姜黃連黃芩人參湯實者大柴胡心煩スル者平
夏瀝心三黃心痛按摩ヲ喜フ者皆真心痛ニテ又建中湯或芍藥甘
艸湯急迫ヘ運用スヘシ又桂枝加附子痛ハ參連痛ハ熊矢多紅螺散只建中湯
ハ取氣懸絶ナリ腹ノ見分ニ意ヲ付テ急痛ト痞トノ分ヲ見ルヘシ

苦痛ハ同シ苦痛ナリ

○膈間痞疼アリ常ニ痛ヲ覺ルノ類滾痰丸ヨリ胸膈ノ間ニ云分ルモ夫ヨリ
才ヨリテ眩暈ナトスルモノ此藥運用アリ

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

○小兒夜熱腹ニソカタキ處アラバ夜熱清涼飲妙也シヨリナクハ升陽散火湯効有津田

○清涼至聖湯 此清痧熱之劑○此症以銀針刺可出黑血又三和散加降神香檳金久服効驗之醫案アリ

薄荷地骨皮牡丹皮山梔子 玄參天花粉 細辛倍用

右水二鐘煎七分稍冷服○玄云ク細辛ヲ倍シ用ルト此ノ稍冷服ノ法所要ナリ
以ベテ痧熱ニテラス痘瘡或ハ疫熱正回ノ証先醫其對症ノ藥ヲ用
テ應セス難治ノ熱症ニ用テ効ヲ取ルト甚多シ療治茶誌

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

○當飯四逆湯加沉香吳茱萸烏藥ヲ大醫家之祕方也病氣一切ヲ治其効妙 津田玄仙

○内消散 治一切疝氣 草菓枳殼大茴小茴砂仁烏藥檳榔童皮沈香木香陳皮橘核

苦助枝核川練子甘草右十五味末空心酒下○一醫家之祕方也 津田玄仙吳茱萸加効ナリ

○内疝散三四以上ノ人腹滿鼓脹ノ如クニ別ニ苦ハ處ナキ人アリ是色酒疝ノ三因也

此其ヲ久服シテ酒色ヲ禁スル時ハ脹漸ニ消ス予經驗タビクナリ 茶談

○疝氣ハ肝經ノ寒鬱鬱リ發ス肺ハ筋ヲ主ル故動スレハ筋ヲ病シムルナリ又腎

ニヤトル故遺精等ノ症ヲ發ス ニヤトル故遺精等ノ症ヲ發ス

○療治茶談四編ニ疝氣ヲ説クテ詳ナリ

○疝氣ノ症ニ補藥ヲ用ルハ大禁ニテ其治ニアラス其謂ハ疝氣ハ塞ノヤマイナリ

故ニ其藥ニ木香木通茯苓附子桂枝牽牛子大黃巴豆蜀椒ノ如キモノニ 茶談

○小言白水腫腰部ニ水氣多ハ疝ナリ

○濕疝ハ囊常ニシメリテ痒シ不可數枯葉上逆耳痛眩暈スルナリ有癩

疝ハ素門ニ出ス俗トビント云是ハ是ハ母多足モ同症也橙奇藥也又橘

痲

核モ用ユ又鋒針ヲ囊ノ皮ヲ切レハ水ヲ出シテ治スモ又不明ニ溜ルモノナリ十
分キ水ヲモナクテ所ヲ浅クサスヘシトテ痲淋藥ニ更テ前論ノ人ナリトテ

○小豆湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ小豆湯ニシテ治ス
○白朮湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ白朮湯ニシテ治ス
○麻黃湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ麻黃湯ニシテ治ス
○桂枝湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ桂枝湯ニシテ治ス
○葛根湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ葛根湯ニシテ治ス
○升麻湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ升麻湯ニシテ治ス
○羌活湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ羌活湯ニシテ治ス
○獨活湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ獨活湯ニシテ治ス
○麻仁湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ麻仁湯ニシテ治ス
○杏仁湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ杏仁湯ニシテ治ス
○桑葉湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ桑葉湯ニシテ治ス
○枇杷湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ枇杷湯ニシテ治ス
○梨葉湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ梨葉湯ニシテ治ス
○橘葉湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ橘葉湯ニシテ治ス
○柚葉湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ柚葉湯ニシテ治ス
○檸檬湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ檸檬湯ニシテ治ス
○酸棗湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ酸棗湯ニシテ治ス
○櫻桃湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ櫻桃湯ニシテ治ス
○李子湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ李子湯ニシテ治ス
○桃子湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ桃子湯ニシテ治ス
○李子湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ李子湯ニシテ治ス
○桃子湯 治痲疹 痲疹ノ起ルニハ桃子湯ニシテ治ス

自是以下十三方皆妙於茶於中

○桂枝加附子湯 治寒痲心腹疼痛手足逆冷身軀拘急

桂枝芍藥附子各六分 甘草大棗生姜各三分 右六味水煎服

コノ方ハモト傷寒論ニ出タル方ナリ然ルニ尚因ハ寒痲ヲ治スル最上ノ神方トナシテ
神効ヲトル是コノ人ノツカヒヲボヘナリ予モ尚因ガ經驗ニスカリテコノ方ヲ試ルニ大
効ヲトリシトモヒクナリ但シ甘草ヲコノ通りニシテハ甚タ甘過テ病人イヤガルモ
ノ多シ芍藥ハ字多ヨシコノ方ニ吳茱ヲ加ヘテ治効更ニ奇ナリ予ガ驗効甚多シ

○枳縮烏附湯 治寒痲兼痰飲兩證雜出痰喘胸腹痛者

枳實縮砂半夏香附各三分 陳皮厚朴大茴延胡各八分 木香 川芎
乾姜各五分 甘草一分 川烏附子各五分 右十四味竹瀝姜汁水煎服

コノ方枳縮陳湯ニ烏頭附子ヲ加ヘタル方ナリ痲疹ノ經驗ハ友松子先生ノ傳也
予又是ニ吳萸ヲ加テ前證ヲ治ス其効更ニ奇ナリ

○勻氣散 治虛人痲氣神効 白朮四分 烏藥三分 天麻人參各一分 沈香白芷

青皮甘草木瓜紫蘇各五分 右十味姜棗水煎

○痲

○治痲丸 諸痲兼用之劑 大苗小苗 川練 吳茱 良姜 右等 右糊丸

丸ズル法 葱白根ヒゲ氏ニ細カニキザニスリバチノ中へ入レテスル時ハ大方トケ水トナル其
中へ右五味ノ藥ヲヒタシ一夜ツケテ明朝ハ日ニホス時晚ニハ又右ノ葱ノ水ノ中へヒタ
シオクテ前ノ如シ又明朝日ニホス毎夜カクノ如ニメ右ノ葱水藥ノ中へノコラスホシ
ツケ細末トナシ丸ズル糊ハ古酒ト水ト等分ニ合セテ中へ米粉ヲ入レ火ニ子リ
テ糊トスコノリの中へ右ノ粉藥ヲ入レテ丸ス鹽湯カ酒ヲ以テ空心ニ服ス

○聚香飲子 治七情所傷遂成氣痲心腹引痛不可俛仰

乳香 沈香 丁香 木香 檀香 藿香 各五 延胡 姜黃 川烏 桔梗 桂心 甘草 各二
右十二味 姜末煎服

コノ方其証ニアハ甚タ効アル方ナリ然レモア七情痲ハ醫
者ノ見ソコ子ル証ナリ予一婦ヲ治シタルアリ其婦一子死メ後ナキカナシムコノ二月
バカリ其証咳痰アツテ腹痛メ息ヲヒキトメヨコニ子ルナラズ喘急甚シ一醫ハ
瓜華根実湯ヲ用ヒ又一醫ハ十束湯ヲ用テ共ニ効ナシ予ハ七情痲トナシテ
コノ方ヲ用フ五六服ニメ治シタリコノ愚案ニヨツテコノ方ノツカイアンバイヲ
知ルバシ七情ノニ字ヲヨククハ心ヲツクベシ

○補腎湯 治寒痲肚腹疼痛泄浮胸腹痞塞或虛火上攻舌胎不食○又腰

痛治諸治無効者有効 附子 人參 白朮 茯苓 黃芪 木瓜 各五 菴活

乾姜 沈香 各三 紫蘘 川芎 甘州 各二 右十二味水煎服

コノ方ハ尚因ガ家方ニメ方書ニナシクシキ泄浮ノ證腰痛ノ證ナトニハエテ痲氣ノ証
カアルモノナリヨクハ心ヲ用テ經驗スヘシ

○菴朮菴活附湯 治寒痲小腹疼痛泄浮不止甚則交血利者

菴朮 菴活 附子 大朮 甘草 右六味水煎 尚因ガ家方ニ

○痲秘湯 治痲大便結燥 枳殼 木香 檳榔 大苗 川練 吳茱 童皮 右水煎

此方一大家ノ秘方ナリ痲秘ノ証ニ用テ大便ヲ快利スル妙也

○古柁附湯 治寒痲入心腹痛及小腸膀胱氣疝刺脾腎氣攻寧急極痛難

忍腹中冷重如石自汗不止等 柁子 附子 各等 右三味水一盞酒半盞鹽一撮煎

此方痲氣急痛常ナラズル時ニ用テ即効ヲル酒鹽ヲ入ザレバ即効ナシ

○四味苗香散 治寒痲小腹痛 當飯 大苗 附子 良姜 各等 右水煎尚因家方

○大黃附子細辛湯 治疝腹脹滿痛甚欲絕者以此方不為下利者不治

大黃 附子右六分 細辛右四分 右水煎

○神保丸 治諸積氣痛項背注痛宜通臟腑之方 全蝎七箇 巴豆霜十 木香

胡椒右五分 右為末蒸餅丸麻子大硃砂為衣每服五七丸

○饑疝湯 治飢則心胃痛得食則痛止者 龍膽 附子 黃連右等分 右水煎

○聖濟總錄犀角湯 夫熱勝則腫而四肢為諸陽之本陽結於外不得行於陰則知熱荒於四肢

故其證為腫沉和在六府則陽脈不和陽脈不和則氣留之以其氣留故為腫也犀角玄參連翹柴胡
升麻木通沈香射干甘草芒消麥門冬右水煎 按如清右湯門之足者宜此方

△四五月ヨリ八九月ニ多ク寒来レハヤム一二年モ催シテ夏ニハ癰

セナリト云ハ脚氣ナレモ幸ニ夫ナリデスム人モアリ終ニ脚氣ノ形ア

ラハレルト有リ以上ノ容體脚氣ノ初起ニハ八腫ノ灸ヲスヘシ氣

根届テ日冬或ハ月ニ灸シテ一二年ヲ過テ其候ヤム人アリ又

年ニ腫ル人ハ八味丸ヲ連服シテ食モ梁肉ヲ省テ淡薄ニスヘシ

ハ治シ易シ是ハ水腫モ同シナリ○三四方ハ六物附子湯ニモ由ル

用エ桂枝加苓朮附湯ハ腹章急シテ痺レルヲ目的トス又微惡熱舌上ニ胎アリテ渴

シ小便不利咳喘脚弱ハ形ノ貝リタルナリ是越婢加朮湯ノ証ナリ又附子ヲ加ルハ

脚ニメグリヲツケル為メナリ○又項頸或ハ手足胸間ナトニ小サキ凶ニテモ押付タル

如ク別ニムツクリト腫ノ有ルコトアリ是水腫ノ偏ニ腫ノ多キト似テ異ナリ大ニ可懼其

筋如何ト云ニ毒ノ結メナリ衛心急ナリ又胸ヨリ喉ニ腫アレハ音聲物ヲフリン

テ言フカ如シ凶兆ナリ又腫少ク数日ノ不利ニテ甚堅ク腫煩渴スルハ是水毒

内ニ伏スルナリ衛心急ナリ又平臥スルコトナラヌハ衛心ノ候ナリ肩息スルハ衛心ス又

○大黃附子細辛湯 治疝腹脹滿痛甚欲絕者以

大黃 附子右六分 細辛右四分 右水煎

○神保丸 治諸積氣痛項背注痛宜通臟腑之方

胡椒右五分 右為末蒸餅丸麻子大硃砂為衣每

○饑疝湯 治飢則心胃痛得食則痛止者 龍

○聖濟總錄犀角湯 夫熱勝則腫而四肢為諸陽之本

故其證為腫况和在六府則陽脈不和陽脈不和則氣留之

升麻木通沈香射干甘草芒消麥門冬右水煎 按如清

三四月
三四月
三四月
三四月

小言曰脚氣者其因痰血人食ニヨリ又脛ヲ風寒

或ハ瘧疾又ハ痢ノ後産後ニモ作ル又下疳ヲ患

ヲ誤ルヲアリ意ヲ付テ見ルヘシ凡ハ實肌熊ノ人

モシビレ小坂ヲ登リテモ息切レルカ又少シ動テモ

ル心地シテ何トナクダルク覺或ハツマサキノカヘリ

履ヲ着ルニ手傳ナクテハナラス又ハヌクルヲ不覺其

サテ夫レヨリ脛ノ内廉腫レテ重ク喘肉ノ直中ノ筋カ

テ急シテ起居ニモ息切シテ再々腫氣モ増ス

ハ治シ易シ是ハ水腫モ同シナリ○三因方ノ六物

用ニ桂枝加苓朮附湯ハ腹急シテ痺レルヲ目

シ小便不利咳喘脚弱ハ形ノ貝リタルナリ是

脚ニメグリヲツケル為メナリ○又項頸或ハ手足

如ク別ニムツクリト腫ノ有ルヲアリ是水腫ノ偏ニ

筋如何ト云ニ毒ノ結ルナリ衝心急ナリ又胸ヨ

テ言フカ如シ凶兆ナリ又腫少ク数日ノ不利ニ

内ニ伏スルナリ衝心急ナリ又平臥スルヲナラハ

脚氣

腹候ニ心得テ衝心ヲハカルヘシ呼吸ノ應ニテ知ルヘシ○手足心ノ平ニナルホトニ腫
タルモ缺盆ノ平ニ腫タルモ惡症ナリ煩渴黒胎ハ白虎ニモ兼氣ニモナルヘシ熱ヲ帶ヒ
タルハ水腫ニ少シ大半脚氣ニ多シ承氣ハヤハリ本方証ニテ腹滿ヲ第一下ス白虎
ハ二時ノ渴ニ用ユ○

○九味栝榔湯

南陽 理脚氣氣血凝滯為腫者方 栝榔二分 紫蘘一分 厚朴
枳實各四分 橘皮各五分 桂枝各五分 大黃三分 木香二分 生姜五分 右九味水煎服
即外臺栝榔湯去甘草加桂朴蘘也

蘘菴防己湯外臺 桑白 黑豆 防己 橘 茯苓 麻 姜 旋 杏 蘘

○洪腫微惡寒效嗽

桂苓朮甘加鐵蛎參 ○虛腫喘悸如黃胖

鯉魚湯香 生鯉魚一尺者

右以水六合煮至三合去鯉服生柚皮獨治
芽山椒等随好入之為避腥臭故也

導水茯苓湯奇良 茯苓 澤朮 萊菔 栝榔 枳 腹陳 砂 楮 燈 艸

○水氣脚氣合病緩症 ○或加郁李

甘遂丸 平朮丸 消萸丸 桃花散 ○以上救急

茯苓琥珀湯鑿室 茯苓 琥珀 滑 甘 桂 ○濕熱小便白濁

琥珀湯東洋 琥珀 商 桂 猪 反 或去桂加丁 ○產後腫少係瘀血者

脚氣水氣諸瘡內攻

赤小豆湯東洋赤豆姜商麻翹大桂反

實脾飲生濟粗朴木枳棗腹附苓干甘姜枣

大橘皮湯明宣五苓散加陳枳滑楨甘姜

木香分氣湯葉氏枳花澤蘘子楨猪夏殼燈

加味胃苓湯類萃蒼陳茯苓猪澤朴蘘附枳姜

千金月令一方參朮犀分等為散蘘子湯下○脚氣心虛恍惚

○此方古以治脚氣... ○此方古以治脚氣... ○此方古以治脚氣...

越婢加苓朮或附脚痺或犀熱毒或一角上衛又

麻石姜枣甘水煎○寒熱煩渴欬嗽

桂枝加苓朮附湯○變急

六物附子湯因三桂朮附苓已甘姜水煎○脚重

木防已加茯苓芒消湯已石桂參水煎○心下堅塊無渴者去石

防已茯苓湯已著桂茯苓水煎○皮水風不短氣

防已黃耆湯已著朮甘姜枣水煎○主治同上可參伍

十棗湯芫遂戟分等先以棗十枚煮去滓內散服○胸中煩疼

白虎湯○大渴黑胎大承氣湯○腹滿黑胎

脚氣水氣諸瘡內攻

八味丸 乾地^六 山茱萸^二 澤花丹皮^三 桂附^四 或加沈

沈附湯^試 附沈地 茯苓澤桂木姜甘 或加參 〇虛水

禹水湯^同 赤豆商榘猪澤冬葵^{水煎} 〇軟腫

栝梅湯^外 或加丁桂沈^朴 栝姜楮枳大甘橘^{水煎} 〇氣血凝滯

唐侍中一方^外 栝姜吳茱菴橘枳^{水煎} 〇氣急軟腫

崔氏一方^外 加郁李^豆 黑豆桑白栝栝^〇 周身洪腫

張文仲一方^外 吳茱栝楮犀夏姜 〇心下堅苦悶欬嘔

犀角旋覆花湯^針 犀旋橘茯苓姜菴 〇煩悶欬嘔

聖惠一方^外 桑白澤茯苓菴杏郁姜 〇欬逆上氣

菴菴一方^外 栝橘枳吳茱姜 〇氣滿

〇津田翁曰水腫之證ニ咳嗽有テ服中動氣ツヨキハキクメテ死證ナリ

〇鯉魚湯^{香川} 鯉魚^{自七八寸至一尺} 昆布^{一尺五寸未輕製造者} 右水一升二合先煮昆布

取六合去昆布内鯉魚煮取三合温服惡苦味者去腸膽惡腥者加柚或椒芽

〇陰水湯^製 即五苓散加生附生^鮮 好沈香^{無上好者代熟南香} 湯成磨沈香末服^{喘噎}

〇通聖蘆湯^言 理諸瘡内攻一身洪腫諸藥不效者 〇牛黃^{夏月發青者暑乾一錢半} 煎服

〇治水散^言 理水腫 冬瓜^{取中} 水^{取中} 右味燒在性為散諸湯

〇水腫者法 其膚ノ色水トシテ潤澤アリテ軟ナル^皮ハ水ニテ治シヤスシ

其腫平身ノ肌ノ如クニテ膚潤ナリ堅タルハ肉水ニテ治シ難シ

〇傷寒熱解既肥立ニカ^リ足ノ甲ニ浮腫アリ夫ヨリ周身浮腫スル附子ノ主

トル所ナリ熱毒内鬱ニテ腫ルハ大黃ノ主ナリ皮水ニテモ皮膚コリト

シテ垢ツキタルハ治惡シ津液ノ枯タル形ナリ大依附子ノ腫ナリ其脈取ニリ

キホト沈ニカレトスルハ不治者多是ニ腰以下腫テ以上ハ瘦衰テ

水

骨立スルハ大虚ノ証ナリ防己黃芪湯八味丸此原湯ノ場ナレバ予ハ沈
附湯加茯苓用ユ多ハ不治也腰以下腫テ瘦ノナキハ病ニ属スルモアリ
烏苓通氣ヲ用一二服ニテ快利スルコアリ又陰腫レ火泡ノ様ニナリ或
屈曲シテ蠅螺ノ如或囊中ニ引込小便分流ス如吹水キハ通利ノ勢アル
也又囊如瓠或如藥罐或爛レテ火傷ノヤウニ痛楚スルアリ婦人ハ玉
門大ニ腫レ雙脚ヲ合スフ不能困ルモノ也其水幸ニ漏出テ消ルモ有又三
稜針ニテ輕クニ刺シテ水ヲトル玉門ハ左右ノ皮ノウスク見ル所ニテトル管ヲ
入テ流ルヤウニスル仕方モアリ又吸瓢ニテ吸セルモアリ

○ヨリリカンギリ 阿蘭葉

○赤小豆葉

先考 經驗

美濃紙ハツ

切種麻袋 切紙ニテ袋

ヲコシラヘ其内へ茅根八分目

兔絲子二分目入レ此藥ヲユツタリトシタ麻袋ハ入レカヘテナハヘイレ
別ニ赤小豆一合ヲバラニテ其十ハヘイレ水ヲ見斗ヒニ入レテ赤豆ノ者
クタルレ迄能煮テ藥袋ヲ引上テ赤豆ヲ食ハシム病重キ者ハコ
レキリヲ食トスベシ尤^百三割モ三割モ食フニ輕症ハ米飯ト各半位ニ
食フベシ 此方茅根六分 菟絲子^三二分ニテスベシ

外科正宗 萬歷丁巳 東海陳實功著

○蟾酥丸 正 治疔瘡發背腦疽乳癰附骨臂腿等症一切惡症及瘡不痛或麻木或嘔吐病重者必多昏憤此藥服之不起發者即發不痛者即痛痛甚者即止昏憤者即甦嘔吐者即解未成者即消已成者即潰真有回生之功乃惡症至寶丹也

蟾酥 二錢 酒化 輕粉 五 枳殼 寒水石 煨 銅綠 乳香 沒藥

膽礬 一錢 麝香 各一錢 雄黃 二錢 蝟牛 二錢 硃砂

以上各為末稱準於端午日午時在淨室中先將蝟牛研爛再同蟾酥和研稠粘方入各藥共搗勻丸如棗豆大每服三丸用葱白五寸患者自嚼爛吐於男左女右手包藥在內用無灰熱酒一茶匙鐘送下被蓋如人行五六里出汗為効甚者再進一服

○蛇螺膏 取諸瘡瘍腐肉方 牛膝 田螺 蛇脫皮 搗和飯調傳

右等分

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

上編 西川 瑚璉 著

一百二十七層位ノ積リニテ効アルナリ 弱人ハ

○即驗丹 治梅毒下部陰股者

大黃 八分 山歸來 五 苓 連 五 天石 五 光明朱 五

輕粉 五 右七味糊丸 七日 服 按以燒酒用之 魚上部効効

○梅肉丸 輕粉 梅肉 梔子 巴豆 右四味糊丸 一方加椒欖黃連

○飛白麩 以鉛 醋 上 置三月而取浮粉

○服粉劑口中腐爛者 松葉一味煎合而用 調胃承氣 甚春傳フ

○五寶丹 治梅毒瘰癧毒 或カロメルヲ用フ

○下部丸 治下部結毒 海人草 七 輕粉 五 光明朱 五 中人七日之分量也

○葛根加附子湯 橫痃腫起者 以此方則不刺而自潰 通用葛根加及鼻之類可也

力瘡癰瘡

○結毒家骨疼不可堪者桂枝加木附葛根加木附之類可兼服以前

後之類

○瘰癧不可訣者以生木車令喘者若不覺腥者是必瘰癧也

○便毒浸淫不愈者白^白灰^白胆礬各二味之煎汁適寒溫敷蒸溫洗淨其効妙

○ロブトリ 石灰水一升以テ一合煎シ大黃末ヲ調和シ膏トナス

○七宝丹 治瘡毒癰疾骨節疼痛者

牛膝 輕粉^{各二} 丁香^{各五} 土硫^{各三} 消石^{各三} 大黃^{各八} 右末之為糊丸

○後七宝 用前方三日用後方二日 巴豆^{各一} 丁香^{各五} 大黃^{各七} 芒硝^{各七}

○伯州散 治諸惡毒瘡 反鼻 角石 津蟹^各 右末酒服以醉為度

○癸池一切瘡濁胎毒疾方 生漆五十錢和味淋酒一升七日飲盡一

身癢疹如癩瘡濁宿疾頓治之旧年血枯腹痛等二妙也 十言

○小言曰三歳ノ兒ヲ携テ夫妻未診ヲ乞フ其兒上脣腐テ懸厭半ヲ蝕

予曰是遺毒也依テ化毒丸三厘ヲ与テ四五日腐肉モ少シ取レ目故五厘ツ

与テ十日餘ニテ治スヲ得タリ 語声ハ鼻ニカレノミ 凡小兒ノ病ヲ診

察スルニ先陰囊ヲ見ルヘシ 紅筋子ヲクハ其父母ノ遺毒ナリ

○小言曰赤村一農人二十三歳下疳愈後骨疼一手拘一足蹇子久兩眼赤

痛頗明ヲ失ハントス貧ニシテ之ヲ療スルヲ不能来テ乞憐先五物解毒

湯ニ島藤丸一日四分ヲ兼用ス數十日ニテ眼少シ見ル手足モヤ、屈伸ス島

藤丸六分ニテ依然タリ仍五宝散二劑ヲ盡シテ眼ハ全快ニ齊シ然レ

氏五宝散ヲ又与ル費ヲ如何トモスヘカラス又五物ト島藤ニスレハ眼又赤ヲ

發ス更ニ五宝散一劑ヲ与テ病人其費ヲカケ愛憐過ナリトテ固辞ス

レ氏外ニシテハ可治ノ藥ナシトテ強テ与ヘ服サシムレハ眼赤ヲ去テ如失

骨疼未治其人類ニ丸藥ヲ服セシマカセ又島藤丸ヲ与

テ年餘ニ至テ少シノ荷物ヲ負テ數里ヲ行テ得タリ常ニ丸藥

ヲ不服ハ心中憤ニテ覺テ剛悍ノ丸藥連服ノ品ニ非スト教テ氏丸藥

○癩瘡 仍丸藥ヲ服シ五物ヲ飲初ヨリ輕粉ノ瞑眩十二
○服スルハ心身輕爽眼力明カナルヲ覺トテ頻ニ乞今十年餘ニ至

○島藤丸 南陽 主癩毒新舊方 大黃 輕粉 各三 桂枝 沈香 甘草

○化毒丸 療癩毒沈深兼理中風偏枯及一切癩毒腹痛水腫嘔噎

○輕粉丸 治諸結毒下疳骨疼淹不愈者 去牛子 各二 大黃 輕粉 各一

○丹霞條 理上部結毒頭痛癩瘡及咽喉腐爛方 鉛 八分 水銀 二

○草解湯 治瘡毒上攻頭痛甚或結毒經久或項背強急往來寒熱咳嗽

○銀花煎 口中腐爛 各二 金銀花 黃柏 粉草 各半 青黛

○防風 玄參 川芎 天麻 烏頭 蔓荊子 各五 燈心草 兩前茶 各三

○朱砂 沈香 各二 人參 五分 右五味盛鉛土蓋上火鎔化內水銀柳箸拌

○右五味以水八合煎取五合去渣數日冷噙之日盡一劑

○是ヲ覆テ細キ方ヲ鼻孔ニ入テ烟ヲ吸其昔病人水ヲ含ハシ

○左右各一管ツカグ晝夜二度十日ヲ以テ一劑ヲ盡ス此方ハ粉劑ヲ用テ眼

○眩スルト異也

○右五味以水八合煎取五合去渣數日冷噙之日盡一劑

○下八 辭草 十八 銀花 三 辛夷

○右十味水煎服此法極妙不啻用於瘡毒頭痛諸頭痛諸藥不効者皆

○可用若頭痛甚者倍加辛夷

○大黃 雞冠雄黃 亂髮霜 各三 薰陸 生乳 各一

○右五味糊丸辰砂為衣每服一分日二夜一稍冷湯服病重者日用至五

○六分後寒熱如感風寒一身發赤疹者大良蓋此藥酷毒最甚得熱

○猛得冷緩若服覺四體發熱憊憊無力者煮綠豆冷飲定或服冷水亦佳

○宜審察其虛實深淺慎勿謾用切忌房勞怒悲酒酢及熱飲生冷等若

○**龍腦真珠丸** 治下疳便毒楊梅瘡骨節疼痛日久腐爛臭敗不堪聞者

或咽喉唇鼻破爛諸藥不効者 大黃二錢 黃芩 兩前茶 阿仙葉各一錢

○**雞** 治六分去腸胃填輕粉容 毛墨塩泥固濟燒存性 桂枝七錢 輕粉二分 甘松一分 珍珠 龍腦各三分

○**逐毒散** 治上部結毒耳目或咽喉作核痛 香附子一分 廣東人參一兩

雞去翼足 以水洗淨以二味內腹中繩三カラケ 蒸也 大抵雞肉汁香附子二

○**五物解毒湯** 治諸結毒 假蘇五分 金銀花七分 芎藭三分 藜蘆五分 大黃二分

○**感享丸** 療癩毒方 薰陸 胡桃肉炒令焦 槐花炒令微黑 大棗各三錢 炒

輕粉五分 右五味別炒胡桃槐花大棗等次薰陸候其鎔沸變黑內槐花拌

取出与大棗同搗篩胡桃細研午輕粉并諸合調糊丸服五物解毒送下五

分病重者服八分

○**通仙五寶散** 春 鍾乳粉三分 大丹砂二分 琥珀 冰片各五分 珍珠二厘

右為細末每服五厘另入飛白麵二分半炒過合作一服每一料一分 作十二貼每

一日用土茯苓一片用水煎作十二碗去渣清晨以一碗入藥一貼攪勻溫服其

茯苓湯須一日服盡不可別用湯水并茶日日如是無不愈忌雞鶩牛肉

房事服藥完不忘

○**山牛湯** 通治微瘡頭痛不止 茯苓四分 忍冬三錢 防風 天麻

玄參各一錢 辛荑仁 川芎各六分 黑豆四十粒 芽茶一撮 右水煎

○**水銀膏** 白臘 十三兩 胡麻油 右煉為膏調和水銀

○**滌除水** ソツル五分 石灰水九十六錢 右調和片布二蒸 洗患處治包皮爛腫下疳

便毒梅毒二因 諸潰瘍又ソツル代白丹卷効又卷石枯卷皆從宜可用

○**龍腦** 二分 輕粉一分 辰砂五厘 葛粉二錢 右為丸土茯苓湯送下七日盡一劑

咳嗽甚者薄荷湯下

癩 ○神化丸 於島藤丸方内加龍腦五分用法臨時斟酌

○登泡 ニハギリニカニタリスヲ合和ス

○治頑癬方 硫黃 鉛丹各八 和火黃 草撥各三

右末ニシニコロシボリ汁ヲ以テ鍊リ貼ス

○雄黃散 治小瘡癬疥 硫雄各一 大黃一 赤小豆五

右末袋麻布浸麻油傳之以手摺之則出而頓差

○療癩風方 稀蒼葉 酸漿草各等 硫黃一 輕粉五

右先搗稀蒼酸漿次末輕粉硫黃合搗擗之日三度

○治面上粉刺方 枯礬石一 生硫黃 白附子各二 右為末味津調擗臨晚上華

○療白癩風方 礬石 硫黃各等 右末酢和傳之

○療陰下濕痒方 礬石一 蛇床子 黃連各三 右三味為末盛

○療腋臭方 燒好礬石 右一味為末絹囊之盛粉腋下

○療風熱結癬搔之汁出痒不可忍方 麻黃根五兩 蛇床子四兩 蒺藜子

礬石各二 白粉半 右末絹袋盛之痒即粉之

輕瘡 ○肥前瘡任再者敷摺肌表速痊慎莫近眼胞及陰所

巴豆 大黃 草麻子 黑胡麻 皓等 右細剉絹袋盛酒漬數摺 小言

又巴豆胡麻二味毛妙アリ

○治凍風瘡奇驗 烟草莖葉細剉水煎敷患處

○濁浪湯陽洗痔瘡為瘰或前陰腫婦人牝戶傷爛熱痒或生瘡者一切下

部諸毒主之若下疳瘡及諸瘡有膿氣者不可洗之 ○荊 金銀 各二蛇床

升麻 半錢 黃柏 半錢 枯槿各一錢 右六味水五合煮取三合半漿溫洗之 ○馬尾

退落俗呼尾味曾者試洗之二劑全愈

○治濕瘡 菝葜 一品煎洗 ○又方以柳葉搗爛煮汁屢洗之效

○用漆子の多るハ堅節ノニダシテ多ク用エレハ忽

治スル妙ナリ

○治凍風瘡奇驗 海參ヲ火ニ炙リ溶カメ患處へ一面ニ塗リ置クニ一傳ケニ

テ一二日ヲ經ルト自然ニ愈ルト妙ナリ

○八毒赤丸 治一切狐妖尸瘡邪祟 雄黃礬石硃砂附地 菝葜牡丹巴豆

蜈蚣一條 右八味為末蜜丸如赤小豆大每五七丸冷水送下 茶送

○灸狐妖法 鬼哭ノ穴ヲ灸スベシ

灸法 如此指ノ爪際ナリ四肢一齊ニ火ヲ

○治狐崇方 小言 別灸鬼谷穴 馬錢二錢 桔梗五分 薑陸二分 右三味水煎服

○又方 小言 狼糞 白雞冠花 右二味等分每用少許以蘆管吹入鼻孔中

○又... 蘇... 治... 瘡... 腫... 痛... 散... 腫... 解毒...
○... 治... 瘡... 腫... 痛... 散... 腫... 解毒...
○... 治... 瘡... 腫... 痛... 散... 腫... 解毒...
○... 治... 瘡... 腫... 痛... 散... 腫... 解毒...
○... 治... 瘡... 腫... 痛... 散... 腫... 解毒...
○... 治... 瘡... 腫... 痛... 散... 腫... 解毒...
○... 治... 瘡... 腫... 痛... 散... 腫... 解毒...
○... 治... 瘡... 腫... 痛... 散... 腫... 解毒...
○... 治... 瘡... 腫... 痛... 散... 腫... 解毒...
○... 治... 瘡... 腫... 痛... 散... 腫... 解毒...

○青陽散

治跌撲疼痛可忍及腫物初發焮痛能散腫解毒

黃蘗

三製末

右一味腫者以醋敷不腫者以燒酒敷之

甚春傳言

○正宗白竹木刺

硬深難出者用蟻蝻搗爛塗刺上一時許其刺吐出

○鐵折肉中以吸鐵石

細末厚傅鐵處即出或象牙末水和塗亦出

○雞鳴散

治打撲折傷 大黃 杏仁 各二 右二味以水二合煮取一合卧時服

後飲好酒醉為度至雞鳴死血盡下

○蘇葉方

食葵根 紅花 右以燒酒煮末熟屏蒸

○針入肉中諸治不効者以螳螂陰乾細末和飯米塗刺上針則出神奇

○王不留行一味末清酒調服右諸竹木針釘入肉中不出者用此方則消

○解不知所行其妙如神

○咽二骨竹木ノ立タルニ巴蕉ノ卷葉ヲホフ口クニテ狐色位ニイリ末ニシテ白湯ニテ用ユ

扶模

奇驗アリ

○針肉中入テ軀内ヲ走り腦マシムルニ人瓜二錢甘草一錢ヲ煎服スレバ必出ル云尤一服ニテ効アリ 貞齋傳尤貞未試ト云

○...

○...

○...

○...

○療毒蛇咬人 乾梯 漬嚴酢中以共 右味為膏塗傷口及毒腫服處

○中烏頭附子毒者煩悶唇裂血流頭重如斗急与生萊菔汁解之童便

○黃龍湯 時後 解諸毒 絞糞汁飲數合至一二升

○鼠毒神方 薩州 疾方 當為 芎 各一 千蘆菜 半 白檀 分 紫檀 分

○廣參 沈香 分 五 荻 分 七 芩 分 一 此方見于救急選方

○堅魚二醉久ハ蓮根一味ヲ頻ニ煎服スルニ其効神ナリ

○河豚ノ毒ニ中リ久ハ藍汁ヲ頻ニソ、ゲバ效アリ

○凡傷一毒二十日八八益十日酸二八八以效下

○思魚二毒八八八益十日酸二八八以效下

○黃連一斤五分 附子五分 甘草一分 白蜜一斤

○凡傷一毒二十日八八益十日酸二八八以效下

○治齒痛方 五倍子大 龍骨中 龍腦十 右末盛箱袋 合膳

○琥珀犀角膏 治咽喉口舌生瘡菌 琥珀 犀角 辰砂各 茯苓 人參 酸末各二 片腦一 右煉蜜成膏子

○崑崙散 南陽 理舌瘡及一切口中諸瘡腐爛并齩齒痛 昆布未經製造者 鹽梅連核

巴豆各二錢燒 枯樵石二分 右四味研末傅瘡處甚良 齩齒痛麻油少許盛

小陶器安火上令沸取葉末二撮容於油中牙掃尖挾綿將綿包之絲以紫之燕

油上藥末浮在者免熱罨痛牙痛立止仙驗此方去瘡所惡肉生新肉敷藥而

慘痛者毒淺不知慘痛者毒深又其腐潰既去生新肉者無痛其度在者去
○甄癰下云モノ急証ナリ會厭落ル即死ス 癰毒ニテハ急死セス ○敷吐ニテ
會厭ノ伸タルハ度ニアリ ○舌祖ト呼モ 醫書ニキ名目ナリ然凡今海内ニ通
用ス若出所了レヤ此病ハ死生ヲ以テ論ス輕キコト非又舌疽ハ古ノ縁通り
ハ瘡ヲ生シ肉陷没シテ瓜ニテ挑取形ナリ段ニ廣クナリ岩ノ缺久ル如ニ陷ルモ
アリ其陷所アカクナリテ四邊紫赤ヲ帶タルハ何處ニテモ潰ニキ兆ナリ又其缺

口病 タル所ヨリ赤肉瘰肉ノ如ニ幾ツモ出ルヲ蓮花舌ト云難治ナリ又一所目堅ク生
 トリテ夫ヨリ潰ハ初マルモアリ甚キハ血流レ出ルモアリ如北ハ三ノ食事ノ三ニテ痛ハ
 丁ナシ凡大ナラ瘡ニ不拘塩味噌ナトシニナルハ大ニ可畏催ナリ病ノ深キハ頰下ノ
 絡中ニグリクト核ヲ結フ大ク累ニトシテ幾ツモアリ何ノ絡ト定ハナク是灸ヲ三五世ス
 レハ又上下左右ノ間ニ結フ又灸シテ數日ヲ経テ解散スレハ本病治スルヲアリ豈
 散可也○唇内ニ灸痕形ヲ登スルハ至テ治シ易シ密佗僧乳香散驗アリ○古
 上細痘子ヲ登スルハ却テ治シカクキヲアリ亦前方ヨシ○赤キヲ如合朱ハ痛甚シ亦難
 治トセス黄栢効アリ○口吻ハ瘡ヲ登シテ開口大笑スルトナラズ或ハ白ク爛レタル如キ
 ハ治シ難ルアリ終身不治モアリ艾湯ナリ小兒ハ疳ニ屬ス大人ハ腰部龜尾ノ灸ニ
 于治スルアリ小兒ハ極脊腹共ニ灸スヘシ一種痔疾ナリトテ肛門ハ瘡ヲ生スルモノ
 俄ニ治シテ口中ニ登スルアリ益以上ノ灸ニテヨシ○牙根宣露或ハ血ヲ出シ膿氣ア
 リテ指ニテ斷ヲ押ハ牙根ヨリ膿出ツ齒痒ク口臭スルハ牙疳ナリ甚治難シ牙動
 于寒中冷物ヲ食セバ寒氣骨ニ徹ス如此モノハ松木節燒テ炭トナシ塩ヲ少

許加ヘ為散臥ニ臨テ牙根ニ塗ル安眼スレハ明旦漱シテ藥氣ヲ去ヘシ如此
 一年スレハ牙根ニシテ膿氣去○走馬下疳ト云ハ牙根膿ヲ作腫張シテ痛ニ
 腐爛シ牙モヌケ落キ一夜ヲ争フ甚シキハ口吻トモニ腫テ絶飲ス其毒ナラ進
 三頰疔ノ明クナリ穿腮ト呼フ可恐病ナリ痘麻ノ餘毒ヨリ登スル多シ紫圓
 涼腦散豈益散ナリ○舌病ノ類數日不治下藥無効ハ四物湯加升麻玄
 參ヲ用エヘシ○一切喉痺纏喉ノ類刺テ可出血又驅風解毒湯加石羔桔梗ノ
 類ヲ服スヘシ又少齒ヲ刺シ出血シ有驗毒甚者不出深刺スヘシ又合谷ニ灸
 スヘシ○重舌本舌共ニ可刺

○乳香散 乳香 辰砂 右細末敷患處

○永礪散宗 永片 硃砂 分 玄明粉 礪砂 錢谷五 ○治咽喉口齒新久腫
 痛及久嗽痰火咽唾作痛○共研末吹搽患上効

○吹喉痺方 巴豆 三箇 枯樨石 四錢 朱砂 少許 右味内鍋燒之為末加
 朱砂少許其色令縞如包紅乃佳

○咽痛刺絡 建安許曰少陰之脈與陰蹻合而行之少陰之氣上結於咽則

陰蹻之脈亦結於踝也下結不通縱脈藥而無効亦必須於陰蹻照海針之

○治齒痛奇方 芹菜 食塩或消石許右絞汁滴耳中屢易

○口舌病諸涼藥及許多吹藥不効者內用理中湯可吹後方

黃連 乾姜 右等分搽塗涎流自愈

○口疳瘡口內如瘡疼者 紅棗十枚 龍腦分二 右研和調吹

○治口內破爛者禁水漱 滑石分一 辰砂分三 龍腦分二 右研敷患處

○治口中生葷者 醋分三 口分一 漱分一 茄分一 大分一 黒分一 燒分一 鹽分一 白分一 桔分一 枳分一 等分一 酢分一 煉和分一 擦分一 入分一 白分一 愈

○古出血者 烏賊骨 蒲黃炒 右研塗

○重膠症台上生瘡形如楊梅 用甘桔加梔子黃連解毒葷可吹青黛散或水

片射香人中白鹿角灰類
○蘆薈消毒飲 治走馬牙疳牙根黒腐臭氣衝鼻若牙銀脆落腮穿唇破者不治 蘆薈 柴胡 黃連 大力子 玄參 山梔子 桔梗 石羔 升麻

羚羊角 竹葉 犀角 右煎服外兼用人中白散或冰硼散腐肉脫去紅肉見者為吉

○人中白散 人中白二 孩兒茶一 黃蘗 薄荷各六 青黛七 冰片五

右湯漱拭淨後吹日六七度
○冰硼散 冰片五 硃砂分三 玄明粉 硼砂各五 右吹法同前○正宗方也

○治走馬疳 大棗二 干姜各燒 枯凡各半 右末傳之

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

未雄

薯蕷 山藥

豆黃卷 モヤシ

白飲

○耳鳴シテ大鼓カ鐘ノ様ニ響ハ耳中ノ絡脈ノフトリテ動脈ノタカブリタル響音ナリ
 動脈ナシニ但腫テフトリタルハ風声ヲ聞カ如クニナル頸項ヨリ強急シテ耳ノ聞ヲ
 妨ケタルモノ有葛根湯ナリ耳中鳴リ痛ムハ五物解毒ナリ傷寒耳聾ハ別ニ
 治スルニ不及熱退ケハ治ス耳鳴ハ尺中出血ヲ宜トス肩部三里ノ灸ヨシ肩井
 一灸シテ治スヘシ耳ノ鳴テキコハサルハ耳前ニモ項頸ニモ絡脈ノ努張シタルヲ
 見テ灸スヘシ多ク益佳ナリ予カ時々聾耳者ヲ治スルハ此手段也スヘテ
 肩ヲ探求テ灸スヘシ凡聾者無風声無鐘声而膜ノ切レルハ難治凡
 聾者逆上ヨリスルト項背ヨリスルト結毒ヨリスルトノ三因ナリ可辨
 ○耳中腫痛膿汁及黄水出者 枯荅 五 紅花灰 分ニ 麝香 厘五 陳皮灰 分五
 右細粉取膿後吹耳中

鼻病

○取鼻痔法 用針二條用絲線穿孔內二針相離五分許以二針頭直入鼻痔根將針線絞緊二三日自然拔落 正宗之畧法

○黃芩清肺飲 宗正 治敵鼻 芎歸芍防芎葛 花粉翹 紅苓薄荷 右十一味水煎 ○按効効於防風通聖散

○鼻痔方 瓜蒂炒 甘遂炒 枯荖五 松香五分 右末香油為丸松香為衣一粒宛鼻中入一日二度化為臭水出

○酒醴鼻方 苦參 當歸各四 右為細末酒糊丸桐子大食後熱茶送下八十粒服盡一劑愈

○津田子曰傷寒ノ餘邪頭ノ中ニ上リフト眼中赤ク風眼ノ如クナルアリ 人參補陽湯百卷百中ノ神方ナリ

○瘡毒目入ントスルモノ必ス白目ニ赤筋アリ頭瘡甚シキモノナリ主方ハ 蔓荊子湯極テ妙ナリ 茶於

○瘡毒目洗藥 終 金銀花三 荊芥三 忍冬三 芎二 藥三 連二 山飯末二 羌活二 ○療傷寒大病後熱毒攻目方 蜂房 右味煮以洗之日六七度

○馬明湯 治眼疾屬先天遺毒者及結毒入眼或疳眼等諸證 海人草 二錢 忍冬 一錢 紅花 四分 甘草 五厘 石菖根 二分 馬明退 一分 右味

○天行赤眼ハ今世風眼ト云寒熱頭痛甚眼中赤筋肉起リ眼胞腫レテ披キ 窺フテ不能強テ披ケハ熱淚流レ詳ニ診スルヲナラズ或陽ヲ惡ニ暗室ニ 隔シテ疼痛甚シキハ昏倒スルニ至ルモノアリ三五日ヲ過レハ醫ヲ作シ膿 水潰爛終身失明ス其初メ疼痛又時速ニ治セサレハ潰膿シ眼腫陷凹シ テ瘡人トナリ其人又便秘閉脈弦數ニテ萬事上衝ス涼膈散或加石膏膏 杯ノ類又定澤ヲ刺絡スニ其効如神潰膿可恐形ニ見テ腫子少シモ殘

眼病

りタル。猶可治也。○赤子胎毒眼入。或目淚下。云モノ輕忽云ハカ
ラズ。早ク紫團ヲ用ヘシ。○頭瘡ヲ誤テ傳葉シテ眼入タルハ鉛丹膏ノ主也

○眼胞爛レ終身ノ患ヲ作スモノ多虫積ノ証ナリ。○

○鉛丹膏 療一切赤眼及障翳不多日者方 巴豆極研 鉛丹各等 右味麻油

及蜜少許和勻塗。頗會乾換之。二三日稍覺嫩痛。隨細泡是其驗也。

○旅途日。風ヲ冒シテ赤眼痛云モノ尺中出血ニテ應手云モノナリ。

○治風眼 甘草 艾葉 二味等分濃煎頻々蒸眼目能緩痛 名忘憂煎

○排雲煎 薄蒸 紅甘 柘苓 連枯 右煎蒸布蒸眼

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

