

KODAK Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2000
LICENSED PRODUCT



經驗丹方

武
609
1

共四



門 武 9
滯 609
卷 1

氣

融

卦 氣 堂 林 六

孫

鍾

水

亦

吳興錢青掄原輯
婺源俞曉園增補

江南狀元
懷德堂氏書
功業完

經驗丹方

彙編

懷德堂梓行

增利經驗丹方序

醫之為業也必實仁術也人有
千奇百怪之病醫者亦有千奇百
怪之方務也轉之生而勿瀕於死
救良醫三折肱而後成乎切而與良
相者多矣有謂醫者以活心為主治
之增其醫於病是也之物然必醫者
天地為生而心而載培欲使一視人所自

所至如順於道德以養生體調燮
身陰陽以通生機惟此在去都氣苗
飲食復焉由乎以養生趣宜共持不淫
備資共戒夏躁貴者持酒過清則
此安我知此皆生之不已之真源而
勿藥之必有善也此源之源至則侵膏
有漸入於後求以得神根亦皮其以
力捕於死且呼吸之頃亦亦晚守

易之所謂醫家吾怪焉必守其
不難經脈決諸寒編藥性賦等
編稍涉穢德念過壹平日年飲
標藉故亦漫而不知病者之延歎
柔雖如望救焚拯溺志誠一則則
倉皇搜箱依樣用藥以圖治收藥
皆積毒而肩囊之支且六七
人不止嗟矣病者之憂乎以堪此

是為內有精... 方有... 戶... 作
人人得... 地... 症... 用藥... 靈... 氣... 之... 起... 而... 為
若輩... 出... 不... 且... 置... 之... 中... 有... 心... 而... 之... 所... 用
乎... 刻... 有... 受... 余... 子... 文... 光... 且... 若... 士... 也... 雅... 與
余... 有... 同... 心... 嘗... 精... 合... 丸... 散... 其... 經... 及... 太... 乙
靈... 膏... 遍... 送... 心... 誠... 且... 又... 刻... 陰... 陽... 文
靈... 應... 萬... 宗... 齊... 論... 道... 初... 說... 諸... 編... 廣
而... 後... 傳... 之... 由... 來... 之... 久... 迄... 今... 吳... 閩

有... 心... 謂... 身... 款... 編... 有... 人... 生... 贈... 之... 平... 靈
板... 糲... 粉... 而... 之... 淺... 識... 乃... 免... 黃... 龍... 見... 尚... 恒
刻... 行... 世... 以... 此... 謂... 吉... 人... 而... 善... 惟... 日
而... 之... 者... 守... 余... 善... 其... 善... 之... 功... 成... 以... 道
其... 與... 人... 為... 善... 之... 德... 且... 將... 來... 活... 活... 之... 在
算... 其... 功... 與... 亦... 在... 施... 藥... 與... 刻... 陰... 陽... 文
等... 書... 下... 也... 亦... 是... 平... 序

時

先考亭立公一生樂善不幸中年棄世垂沒囑峻曰吾家世代種德汝當善承先志峻泣而誌之不敢忘爾時終天悲痛忽患失血幾危踰年稍愈母氏許論峻曰汝犯此症功名之念已矣吾見汝自幼好輯方書不如留意岐黃一可以養生一可以濟世庶不負先人好善之囑也峻遂矢志醫業所夕不怠一聞靈驗奇方必重禮購求或遇急病卽對症試之其有效者輒遵取焉如是十有餘年積集約八百餘方癸未春舊患復發迄今三載病勢日增峻已自料不起矣將欲爲善後計而藹茲



原序
先考亭立公一生樂善不幸中年棄世垂沒囑峻曰吾家世代種德汝當善承先志峻泣而誌之不敢忘爾時終天悲痛忽患失血幾危踰年稍愈母氏許論峻曰汝犯此症功名之念已矣吾見汝自幼好輯方書不如留意岐黃一可以養生一可以濟世庶不負先人好善之囑也峻遂矢志醫業所夕不怠一聞靈驗奇方必重禮購求或遇急病卽對症試之其有效者輒遵取焉如是十有餘年積集約八百餘方癸未春舊患復發迄今三載病勢日增峻已自料不起矣將欲爲善後計而藹茲

原序

先考亭立公一生樂善不幸中年棄世垂沒囑峻曰吾家世代種德汝當善承先志峻泣而誌之不敢忘爾時終天悲痛忽患失血幾危踰年稍愈母氏許論峻曰汝犯此症功名之念已矣吾見汝自幼好輯方書不如留意岐黃一可以養生一可以濟世庶不負先人好善之囑也峻遂矢志醫業所夕不怠一聞靈驗奇方必重禮購求或遇急病卽對症試之其有效者輒遵取焉如是十有餘年積集約八百餘方癸未春舊患復發迄今三載病勢日增峻已自料不起矣將欲爲善後計而藹茲

孤兒襁褓未離嘗聞積德可以貽後而善書中惟捨藥
施方最爲切要幸得友人徐芸兄素存與善之心先後
刊刻陰騭註証并徵今鐸二書行世而舉業之餘亦嘗
旁及小道爰同心遍採神方彙集成編今夏方得脫藁
而峻舊患大作命在須臾但是編積十年之辛勤志欲
公世豈可不終厥事因促梓人速竣其工兼托世伯沈
子翁暨世兄遂公代爲廣施勸布流傳海內峻在九泉
亦可藉以瞑目也

康熙丁亥夏月吳興錢峻青楡自序

附刊丹方補遺序

余聞之古人君子出則爲良相處則爲良醫又曰一介
之士苟存心於利物於人必有所濟嗟乎良相其難矣
良醫豈易易哉夫羲農肇技於黃軒扁盧精能於白髮
膏盲督任之中神其術而爲長者青年朱李由此其選
也余不敏少所指授弗能爲良醫竊意濟人利物之事
隨在可行居嘗與四方君子咨諏藥石又嘗周歷吳越
諸邦所在延訪古先名手醫方若干彙爲一冊試之輒
效用之通神私竊自喜藉此可以利物濟人矣比年秋
謀付梓人流之於世適新安俞君曉園重刻經驗丹方

類編余既重樂此書之大有利濟於人物也余正重樂此書之適相浹洽於鄙衷也爰據生平編集奇方一册附刊於後夫故未敢妄附於爲良之列亦用自托於一介存心之意云爾乾隆十七年壬申秋九日金谿周朗鶴仙氏謹書於金陵光霽書室

自叙

余幼承庭訓無時不以與人爲善四字冰兢於夙夜間然嘗恐淺見寡聞不足以副廣濟之懷而醫之爲道少小善病每經歷吳越輒訪高人異士講明而切究之故嘗宣於口筆於書採於方選於藥幸得此身完然無恙迄今年五十而精神氣力百倍從前蓋其所經驗者固已多矣顧余嘗謂人生而無濟於人者君子謂之虛生苟徒自爲調攝而秘藏不以告人則黃帝岐伯之術何以流傳至今而盧公扁鵲何以有不自醫之說哉故嘗與大兄爾介仲先彥方精選藥料秘製丸散若寸金丹催生丸及太乙靈膏普施廣送毫不取其直此固遠邇所咸知者然猶以爲傳藥不如傳方蓋傳藥則吾一家能辦而傳方則人人可辦也乃網羅舊聞摭拾新編幾費採擇而後付諸剞劂將以布諸海內俾遠邇僻壤之家咸

得一目了然思所以預防而療治之以無負余意其有未曾經驗者槩不收錄書既成仍類之曰丹方類編蓋吳門錢青掄先生舊有此書沈子懷王曾爲重梓而徐士瑤與慕琛吳尚采諸公皆有序余徃求原本不可得倩友抄錄一通今雖刻多方另爲開雕而仍用其名者不敢忘其所自也且亦遂余稟遵庭訓與人爲善之素志也故序數言於簡端以告當世之閱是編者

告

乾隆十有七年歲次壬申中秋月新安俞煥曉園氏書

凡例

- 一古今方書不下數百種而或效或不效未堪盡信茲祇取其經驗之最神者彙集一編因類之曰單方彙編
- 一予自幼酷好單方凡有見聞必勤筆登錄或業醫之所珍秘者亦不吝重物以購得之搜索十載約有八百餘方屢試輒效今春發願公世因遍採方書孰知向所秘錄者皆係古名醫之所製故每方下明載之欲人知所自出也
- 一諸症單方奇效者甚多然太冗繁恐反令人一時難擇故每症止選十中之一以備急需
- 一諸方或得效于實而不宜于虛者或獲濟于寒而不利于熱者俱不妄載以悞人卽有立見神效者亦必註明虛實寒熱之所

宜

一方藥若利害太甚者不敢亂載是編所登皆已所驗過幸勿畏懼加減以致無效

一凡草藥人所難識者俱不載入

凡膏藥丸丹療疾固甚神異然必先預備一時不能救急載亦無益倘有發願施濟者至舍抄錄無吝

一子不善攝生久患咯血經驗神方雖嘗修合施濟而是編之校謬訂訛精力難勝悉托友人徐芸兒代為斧削其苦心亦與子全偶也今予舊患又作精力益加衰疲幸是書之得告成者實賴徐友之力居多

一女科症候不一而調經保產最為緊要而慈幼亦莫先于保嬰

予每加意于斯故先付剞劂但尙未通行故又附列于後

是編所載单方無不神驗只要專信服之自必見功久病久服其病自愈慎毋速期其效半途中止也古云服藥而不言喫藥者蓋謂人能信服其藥始效耳

古今奇方不一而一人搜羅有限未經見聞者諒罄竹難盡同人果有累試歷驗之方幸祈抄錄見示嗣容補入是編

是書務期廣遠流通四方君子發心印施多部福有攸歸若能翻刻尤慰鄙懷

錢峻漫識

辨岐水懸瀾對

延壽堂

身書益博與靈效而四古甚于齊小申誠多指諸目並謂春論
 人果亦果為熱烈之古幸符外維其示臨容師人其識
 古今音式不一而一人對藥亦別未識其因昔為醫者同
 昔蓋臨人指計其藥故效其
 其識自愈神效其效半箱中九也古云如藥而不言與藥
 其識神效其效不一而一也其識其效不一而一也其識其效
 午身誠意于其始夫其始也其始也其始也其始也其始也其始也



買藥辨真假

凡藥必選原枝定切方妙若現成切片者恐真偽高下難辨

醫藥貿易多在市家辨認未精差錯難免諺云賣藥者雙
 眸用藥者隻眼服藥者盲瞽非虛語也許多欺罔百般巧
 詐明者竟此其非暗者其受其侮本資治病反致殺人雖
 上天責報于冥冥然倉卒不能察實或誤歸咎于用藥者
 之錯亦常有也但慙隱皆所固有市家豈獨無情皆因人
 畏價昂貨真實有眼不識世藥物賤價廉反接踵相售是
 以偽飾多充不顧罪積也今峻歷遭其禍目擊心傷辨真
 察類將親所試驗者畧舉數端考正于後此誠生死大關

緊要非比小節尋常務要考究精詳辨其形色察嘗氣味
真偽了明修製治療庶免乖違寧出高價毋為自欺

人參

短壯堅實圓而光潤力全今假者遍行不可不察
但切開有心味雖甜收口畧苦津反稠膩不如真
者生津其色帶呆餘者無二今人買通賣婆詐稱
鄉宜帶刺或央親及親詐稱病後遺多俱當細察
真者明徹如水味甜全不焦苦世上甚少竟勸勿
服假者或帶絲或焦苦或帶臭氣皆係牛膠墨煎
成損胃傷脾更有雜用賤藥煎成或枯燥或柔佞
或味香有砂黑漆色帶綠光俱假目今時醫動必
用阿膠秋石等藥然後設計借名親友珍藏代買
取利害人不淺遇此切不可信

淡秋石

輕鬆入口即化者真稍帶硬者鹹秋石雪亮
必充小粉石膏忌服自製辨正
紫金錠店中亦有真者但內麝香甚貴少以加人須
嘗口中香竄麝人觸鼻者真香緩者無効

犀角

明亮氣香者真今多牛角
做充不香或帶氣味可辨
龍骨紋細五色越竟粘
必牛腥氣並苦異常黃黑明亮堅佞者真今多用
猪胆假造悞人或枯乾或黑軟摠不明潤可辨

牛黃

要嫩黃輕虛重疊可揭氣
息微香摩指即竟透者真
龜膠或黃色帶
味辛手指捻去黏者真
帶黃毛少飽滿而軟真皮黑厚硬毛多味淡者假

冰片

如梅花細辨潔微口氣甚熏人者真若質重如
砂細碎者假其片要厚薄不等若做成光圓者假
偽者甚多但取一粟米大滴入水中若線不散者
真或以米粒大點水中運轉如飛者良緩者假也

熊膽

黃白可服稍帶黑色乃藥傷大毒忌服要長帶
圖者真若帶圓脊駝缺陷不平如三角樣者假
須看角灣中尖細有掛痕者真或耳邊聽之

羚羊角

集集有聲者良其疎漫無痕枯老者假也
要如琥珀色三四五寸長肉飽滿者力全太長
或枯黑無用恐是麋茸太細短又嫩恐是毛茸

滴乳石 必要如雪冬淋糖長五六寸明亮中空色白者真若乳突出而不如淋糖長者假

翠膽礬 成塊如雞卵大顏色青碧如琉璃擊碎縱橫解皆成疊方真今市多以青礬用醋揉假充宜辨

雲母 要白澤作片成層可折通透輕浮者真 陽起石 要明亮如鷺

琥珀 要如血色熟透于布拭吸得芥子者真 硃砂 有以雄黃充

蛤蜊 有花斑起發光亮者真 花蓋石 打開有花白斑以四脚蛙充者當辨 蟾酥 既舌上甜麻揭舌

輕粉 明如雪片粒粒餘筆起者 蟾酥 者真不麻者假 沉香 油潤切如黃蠟者真今賣

沉香 黑色如牛角樣者假忌用 母丁香 如棗核大者真

木香 多有青木香欺人宜辨要堅硬形如枯骨 蘇合油香 只如膏油赤色無滓香極芬烈塗

蘇合油香 上手背香透手心或如鷓膠者真

陳皮 凡使勿用乳柑皮皺子皮忌服今市家多用充入

其味苦辛香為真掛子皮紋細色紅而薄內多筋脈

厚而虛其紋更粗色黃內川貝 質硬味苦者假

白朮 味甜被前細根多雖棄有迹方是野木有効

地黃 皮老粘乾堅實菊花心者 蘘子 假充其多需帶

雲茯苓 堅硬切片光亮玉色者 羌獨活 紫色色節密為羌

黃耆 肉如箭杆柔軟如綿 血竭 摩指甲紅透方妙

川續斷 皮黃皺者方真 巴戟 鮮潔者為真

乳香 透明如滴乳頭者良 阿魏 切開五色柔軟者

川芎 形擇重實潔白 為良油者勿用

桂枝 味辛甜香竅者 真味淡者無用

川連 類鷹爪連珠根毛細密有菊花黃心者真若皮色太黃或毛粗而疎或頭尾等粗實心者俱忌服

棗仁 粒粗胞滿色紫佳 細扁色淡者無用

白荳寇 味辛香入口暈涼真草 寇充者味不暈涼可辨

啞片 假者甚多要柔軟 必帶青香者真

首烏 有做成大者置地中年餘 即生成但皮嫩有筋可辨

三七 味甜以末投諸血 中血化為水者真

附子 頂平肉如鐵色滋潤者佳 西附子肉乾白大而無力

山茹 根鬚多者真 根少者假

漆 濕者以物蘸起細而不斷 而急收塗竹木上速乾者佳

藿香 味辛香烈者真 不香者假忌用

香薷 而長香烈者真細短不香 者是土出食之腹痛忌用

沙蒺藜 黑色粒粗者真 青色粒細者假

懷山藥 堅實細白者真 大而空鬆者假

肉桂 紫潤味甜甚辛香烈人者真 今多假者色紫油潤可觀但切片有細花白點不甚辛香者忌服

丹方彙編總目

吳興錢 暖青掄原編輯

男 明勿晦 較字

婺源俞 煥曉園

姪 時與偕

金谿周 朗鶴仙 全增補

買藥辨真假 凡藥必選原枝看切方妙若現成切片者 恐真偽高下難辨

單方摘要

中風

預防中風

風氣痛 附疾症脫類

虛勞血症

腫脹

反胃噎膈

痰飲

咳嗽

夢遺白濁

傷寒瘟疫

經論單方

目

瘡疾

痢疾

腸風下血

便血淋漓并小便閉塞

霍亂吐瀉 附痧症

心氣痛

一切諸痛

痞積

黃疸

頭痛諸症

目疾

耳疾

牙疼牙疳

咽喉諸症 附口舌諸症

癭瘤

疝氣

下疳及腎囊風囊瘻

瘋症

腳氣足瘡

解諸毒

五絕急症

癲癩狂亂

種毒

疔瘡

跌撲損傷

跌傷風

一切損傷

諸瘧

流注

楊梅瘡毒

瘰癧

痔瘡

諸癰

諸瘡

諸般癰瘡

獸虫傷咬

諸般奇症

補遺雜方

女科纂要

調經大法

求嗣

保產總論

難產七因

受胎保護

臨產斟酌

橫生倒生治法

礙產偏產治法

胞衣不下治法

產後當知

胎前方論

回生丹方論

保嬰纂要

保嬰經驗方

小兒雜症

小兒驚風

痘症 附麻疹

小兒疳症

良方補遺

許真君七寶如意仙丹

濟世方 附不餓丸

觀音大士治百病神膏

紫金錠

雜症諸方

單方

斑痧

其症頭腹痛煩悶眩暈若與別症相同但起于卒然之頃痛甚顛叫按大脉皆沉或右關浮洪胸背腹上有細斑隱

于肌膚之內者是也急尋生芋芳或蠟油各食二三枚如非斑痧難下若真斑痧食甜能下神驗更解此病再用燈草蘸菜油點火照之隱隱紅斑上焯必爆响務要看他紅斑焯盡方止否則復發之患方用蕎麥五錢煎湯溫服自愈不可太熱食忌姜茶酒烟藥忌陳皮

紫蘊甘草半夏誤食者凶

絞腸痧

陰痧腹痛手足冷身有紅點火焯妙陽痧腸痛手足煖針刺出血甚妙。明礬末三錢滾水調服立愈。一用

生芋芳二片下汁神効。鹽少許置刀頭燒紅淨入水中乘熱飲立甦。凡夏天一切腹痛吐瀉切忌服生薑米湯煖者

即死直至飢甚吐瀉

頭中生蠱

水銀和棗肉研爛塗

霍亂

其症吐瀉頭眩眼暈四肢冷用藥稍遲不救急用吳茱萸木瓜食鹽各五錢炒焦用水三碗煎半隨意冷熱

服之立愈。藿香葉 陳皮各五錢水煎服垂死立生。

鍋底煤五分灶額上煤錢五分滾湯攪干下服立効。

乾霍亂 凡手足厥冷欲吐不吐欲瀉不瀉轉筋入腹汗出氣冷

欲絕用炒鹽一兩牙皂一錢水煎服取吐胃氣一回即愈。

吳茱萸三四兩用鹽數兩炒熱熨臍下亦効。鹽二匙

蒸黃童便沖服効。伏暑吐瀉用絲瓜葉一片白梅一枚并

仁全研爛水調服立効。夏暑百病俱

周六一散紫金錠更妙萬無一失。

熱死 伏天行走熱極卒然昏倒斷不可飲冷水遇冷即死法用

熱土圍臍上使數人溺尿令溫熱湯洗更妙急以姜湯或

童便乘熱灌下外用布蘸熱湯熨臍下三寸穴立醒醒

後忌飲冷水飲之立死。凡卒死得紫金錠磨下立甦

毒蛇咬 用針刺傷處出血急用繩紫兩頭浸糞缸內毒不內攻

用雄黃五錢靈脂一兩其末每服二錢酒下再服神効

好。烟管燒熱滴油搽之百試百効用泥蛤蜊搗爛敷咬處即

愈。白芷末一兩水服下死者立生。爛入骨

者白芷末加胆礬射香少許日搽之立愈。

中惡 或往死喪墳廟來家卒死口鼻清血似乎尸厥但腹不鳴

心下溫煖急用犀角同射香硃砂為末服二錢即甦或用

石菖蒲搗汁灌鼻口中即活。慎食一切毒物 俱服紫金錠

猪尾取血飲并縛豚枕之立活。烏骨雞血滴口中立活

斃死 并中鬼惡切忌火照驚惶但痛咬其脚根用皂角末或牛

損傷 復末吹入鼻打嚏氣通即活。烏骨雞血滴口中立活

馬血沖飲死切忌吃冷水急用韭菜汁或熱小便灌之効

去瘀血痛危歸凡五錢大黃酒蒸一兩桃仁二十粒研酒服

湯火傷 破傷進風寒熱垂危蟬退四兩燒灰服愈

軟冷水必死浸冷水中必爛至骨急搗蘿蔔汁或童便

服外用槐花炒研末油調方時止痛或爛茶葉敷爛見

骨者百草霜三錢輕粉一錢五分為末麻油調搽効

喉風 先刀開用巴豆七粒去殼搗去油淨雄黃三錢鬱金五分

每服六分津嚥下立愈。溺壺內厚甲半盞蜜五匙灌下愈

疥瘡 凡手心足背及面上有瘡起泡發癢或寒熱或麻木不痛

此極毒之瘡急用針刺劃斷紫根出血令盡或相用針刀

用巴豆一粒米飯一粒研貼瘡上立時拔疔神効再尋

癩疥疾取肝貼上立愈菊花葉搗汁服一碗死可回生

腫毒初起者金銀花五錢生黃芪五錢當歸八錢甘草一錢人
分上部加白芷中部加杜仲下部加牛膝俱一錢八分婦
人乳癰加橘葉五十片數劑立退仙方壯盛者牛膝用一
兩川山甲土炒研何首烏切各二兩水酒煎服神効立退

牙痛巴豆半粒塞牙縫立止。荔子一個將壳開一孔入鹽填
滿煨研擦合片時再以防風川椒甘草浮麥煎湯漱口愈

氣鼓脹雄精五錢射香三分通姜一斤取汁半碗先用姜汁五
匙調藥徐徐服下其餘姜汁沖酒服完三日後腹鳴立

消二服除根布捫緊肚日服肚子裝大蒜四部十個後裝紅
棗服一個日見歷効忌動氣魚肉毒物如犯房事番覆難救

瘟疫大黃四兩酒蒸晒乾牙皂二兩青黛一兩紫蘇一兩為末
水打糊為丸茶豆大每服百丸冷茶豆湯下三服立愈。

錢五分為末姜汁和丸如彈子大蜜水調服立愈。

瘡疾黑礬為末麵和丸塞鼻內愈。製首烏末日服三錢數日
効。常山末二錢酒炒透烏梅肉四枚研丸服立止忌口

噤口痢沙糖 蜜 蘿蔔汁各一盞飯上頓熱灌下立効
或用田螺二個搗入射三分作餅熱貼臍內立効

吞金羊脛骨燒焦研末三錢米飲下從大便出神効誤吞鉄物
栗樹炭二塊將鉄錘搗極細砂糖和細丸服三錢立出

百虫入耳取鷄血滴耳或非汁姜汁少許滴之
皆効麻油數點滴入耳竅細虫必死

痞積青油一斤煎滾次下蜜佗僧六兩羌活一兩候成膏再下
阿魏五錢射香末二錢退火毒隨患大小攤貼立消

諸虫積小棟樹根向東不出土者佳四兩史君子去壳切二兩
生姜片三兩作一服水煎去渣再熬至一碗加蜜四兩

又熬至一碗露一夕擇朔日五更徐徐熱服虫出立愈多者
再服除根小兒減半若中旬下旬夜午虫頭向下服之無効

血証吐血不止刮灶額上黑煤研細糯米湯服立止鼻血吹之
立止虛勞吐血如湧柏葉蒸焙荆芥穗燒存性各三錢為

末每服二錢入飛麵二錢人參一二錢煎湯待溫調如糊服
酒過口少頃再服立止真淡秋石服二三錢立刻降血更妙

鯽魚仙方治對口癩一切白色陰毒初起活鯽魚一個生山藥
一段樣長用白洋糖二錢全搗極爛敷上神消即去

更治癩癧初起如神婦人乳癧初起用
臘糟全搗敷上立散俱係親試百驗

冬瓜癰及四肢癰毒腫滿 新石灰先水一潤即用醋一碗化開
敷上再加醋甲敷上立消身毒忌用

解諸毒 甘草菜豆水煎服能解百藥毒食巴豆毒泄不止者煎
服川連一錢立解凡中砒霜一切毒藥垂死者急用上

號潔白糖靛花淡豆豉甘草 腰痛 腰子破開塞杜仲線扎飯
等分研勻冷水調灌即甦 上蒸熟去藥吃數個立愈

中蚯蚓毒 形如大麻風眉鬚脫落用石灰泡熱水候冷洗患處
浸良久愈小兒受之搥湯溫洗或鴨血塗之自愈

小兒諸病 瘧疾十日後用代赭石二錢醋煨紅硃砂五分砒霜
一豆大同為末以紙包七重打濕煨干入射一分為

末麻油調一錢塗鼻尖上及眉心四肢神應。痢疾雞子一
個煮二三沸取起去自用黃研碎以姜汁半鍾和勻與兒服

忌食茶神効。瀉痢上木別一個母丁香四粒射一分研末
吐津為丸灸實火納臍中外用膏藥貼牢立止。痢痢青黛

水調服甚効。臍風全蝎甘一個去翅是酒炙為末射香一
分為末金器煎服。卒暴死去不解何病狗糞一九絞汁灌

之即活。瘡塊用攢盒內小磁碟將皮硝裝滿雄黃木蓋
面綿紙糊口以針刺孔合定器上好紙綳緊三日即消

接骨仙方 骨斷粉碎者五加皮四兩雄雞一隻重六兩黑者更
妙去毛連骨皮血與加皮搗爛敷患處用布包好准

貼一週時揭去切不可太過時內自完好神効無
比再用五加皮五兩酒煎服盡量飲醉睡為妙

心痛 山梔子七枚炒焦黃木一盞煎七分入姜汁三匙熱服立
止。寒痛陳皮香附吳茱萸良姜石菖蒲各等分水一碗

煎七分滴麻油五點熱服即愈。一用巴豆一粒燒灰
棗肉為丸服一小丸立止再用一大丸裹臍內立愈

婦人急症 難產橫生不下用巴豆三粒去壳草麻子七粒去壳
射香一分研為一餅貼臍上即產產下即速去其餅

遲者子腸亦出。一切產難必須服當歸一兩川芎七錢分
作四次服立下產後血暈亦急服此藥垂死能甦神効。產

後血暈荆芥穗炒黑存性研末用二錢熱童便調灌
下立効。胎衣不下荷葉剉碎水煎濃服即下神効

頭風 白芷兩半川芎甘草川烏各一兩為末每服一錢茶下神
効。一用生蘿葡汁一蜆壳仰臥隨左右注鼻中神驗

單方摘要

臃瘡 數年爛腿將白蘆肝石醋煨七次研極細麻油調敷日換
取愈親試百効腿瘡年久不愈確口泥研末搽上立愈

瘋狗咬 急於無風處捏去惡血孔干者針刺出血蓋湯洗淨搗
葱貼上用糯米一撮番木別半個切碎斑毛七個去翅

足若過一日多加一個連前藥炒黃去斑毛不用研末酒服
細看頭有紅髮拔去忌房事并忌鑼聲終身忌食犬羊肉

溺死 切忌倒提出水烘無救用鍋子合地急令死腹對鍋臍
覆上人扶牢徐徐推鍋橫移走筋夾口中由腹中水即活

溢死 切忌刀剪斷繩急令抱住以膝頂住陰戶蓋道解下鷄冠
血滴鼻中筆管吹耳即活一切暴死用半夏末吹鼻活

痔瘡 熊胆塗之仙効。用螺銅青射水片各末五厘放螺肉取
水塗愈痔漏旱連草一把連根洗搗爛滾酒沖汁服立効

諸瘡 黃水瘡用磁碟貼面粉菜油調膩多卷紙極點着合薰時
時攪勻待通黃去膿點立愈天泡瘡荔枝核醋磨塗愈

疳症 谷精草或加小青草為末每用二錢鷄軟肝一具全酒漿
飯上頓熟去藥吃肝日日常服凡小兒目盲垂死者立愈

黃疽 陳年蟹壳焙為末酒下愈
枯絲瓜燒灰日服三錢愈

萬靈九轉還丹秘方 臨濟超字輩
寶聚和尚傳

真鴉片 三兩
冬研夏燉 西牛黃 一錢
二分 麝香 一錢
二分

百草霜 九錢

右為細末研勻然後將白米飯二兩四錢研如糊再下
前四味再研勻為丸每丸三厘重丸完用硃砂為衣衣
完入大封筒內封固放在番轉脚爐蓋內將包扎草紙
蓋好微微炭火烘三柱香每柱香搖動爐蓋三次三三
見丸名曰九轉還丹香完移過爐蓋待冷拆封入磁瓶
內聽用 凡用此丹大人每服一九小兒八九歲一九

作二次服四五六七歲一丸作三次服三歲未過作四次服無論大人小兒倘慢多服以濃茶飲之即解

孕婦忌服 修合時務必三日前齋戒忌婦女雞犬見聞

看鴉片真偽法真者成塊視之如鴉毛片之色研開如黃泥嚼之如青草味而帶香嘗之黃連之苦此是真者偽者亦成塊綠色或黑色研開亦黑色並不香雖賤不用

秘授萬靈一粒九轉還丹善治一切危急等症開後

傷寒頭痛發熱 生薑葱白湯下 一赤帶 滑石甘草湯下

傷風無汗惡寒 麻黃桂枝湯下 一產後瘀血作痛 桃仁山查紅花湯下

陰症身冷白汗 乾姜肉桂湯下 一胞衣不下 童便和酒下

一中風口眼歪斜 大麻風星湯下 一跌打損傷 紅花酒下

一小兒急慢驚風 薄荷湯下 一初起痞塊 山查湯下

一偏正頭風 羌活白芷湯下 一氣勞 木香湯下

一霍亂吐瀉 藿香生姜木瓜湯下 一損勞 乳香湯下

一痰結頭痛 天麻甘菊湯下 一心勞 遠志湯下

一傷風咳嗽 生薑紫蘇湯下 一脾勞 當歸湯下

一久嗽痰火 如寒生薑陳皮湯下 如熱石膏知母湯下 一色勞 石燕子湯下

一肺虛勞嗽 人參麥門冬五味子湯下 一下元虛 鹽湯下

一冷風哮喘 蘇冬花紫蘇湯下 一赤目腫痛 防風荆芥湯下

一 遍身骨痛 羌活獨活湯下 一 迎風流淚 蔓荊子湯下

一 半身不遂 左用桂枝羌活獨活全當歸紅花湯下 一 雲翳遮睛 石決明湯下

一 肚痛 砂仁木香湯下 一 星障 木賊草決明子湯下

一 心痛 良姜砂仁湯下 鬱痛 山梔貝母湯下 一 風眼 防風荊芥蔓荊子湯下

一 疝氣痛 荷香川椒吳茱萸核湯下 一 火眼 黃連枳殼湯下

一 兩脇痛 乳香白瀉湯下 一 血貫瞳人 玄參赤芍藥湯下

一 下部腫痛 牛膝米仁木瓜湯下 一 努肉侵睛 密蒙花湯下

一 咽喉腫痛 桔梗甘草牛蒡子湯下 一 青盲眼 枸杞子甘菊湯下

一 赤痢 黃連芍藥湯下 白痢 木香黃連木香湯下 赤白痢 黃連木香湯下 一 眼目昏花 熟地當歸湯下

一 噤口痢 人參升麻黃連石連湯下 一 蟲牙痛 川椒良姜湯下 如火 石膏湯下

一 瘡疾 桃枝楊柳各三錢湯下 一 閃腰脛氣 蘇木紅花湯下

一 小便不通 滑石甘草湯下 一 楊梅瘡 黃連甘草山梔湯下

一 吐血鼻血 芍藥山梔犀角丹皮湯下 一 楊梅結毒 土茯苓湯下

一 腸風下血 槐花炒黑棕燉煨灰湯下 一 遍身生瘡 金銀花苦參湯下

一 脫肛 人參升麻湯下 一 無名腫毒 貝母金銀花連翹湯下

一 番胃 如寒丁香乾姜湯下 一 癰疽未潰 皂角刺穿山甲湯下

一 蠱脹 青皮蘿蔔子湯下 一 痰核初起 貝母生薑湯下

一 水腫 茯苓澤瀉湯下 一 魚口便毒 大黃湯下

一女科經水不調 香附艾葉湯下

一濕痰流注 貝母湯下

一血枯經閉 當歸川芎芍藥熟地湯下

一緊急疔瘡 菊花根取汁和酒下

一血山崩 阿膠續斷湯下

一鶴膝風 牛膝威靈仙湯下

一沙淋白帶 茯苓生姜半夏湯下

一大麻風 麻黃威靈仙防風苦參夏加黃連湯下

諸葛武侯行軍散乳名痧藥 臨濟超真大和尚傳

牛黃射香冰片各三分 硃砂雄黃礬砂火硝各一錢 飛金三十張 研為細末 入磁瓶聽用 點於眼肉 或點舌尖 男左女右 孕婦忌點

孩兒勞方

陳酒童便各一鐘 先煎再加人乳白蜜各一鐘 共煎成膏服 病重者多煎服幾次

梅花點舌丹方 臨濟超真大和尚傳

牛黃冰片蟾酥熊胆各一錢 珍珠射香各六分 硃砂麝砂葶藶血竭沉香乳香沒藥雄黃各二錢 將人乳浸蟾酥熊胆為丸 每重三四厘 金箔為衣 晒兩日 入磁瓶聽用 修合時 預為齋戒三日 忌鷄犬 婦人聞之 此丹專治對口 癰疽 發背 疔瘡 癩癧 乳癰 一切無名腫毒 每服一丸 含于舌底 用白酒儘量飲 醉出汗 如小兒用酒化服 患處不用敷藥 膏藥 自能生肌 長肉 收口 即愈 孕婦忌服

治小兒赤遊風胎毒 驗過此方是呂介翁先生傳

干脚泥一兩 晒乾或烘 加珍珠三分 同研細 菜油調敷 腫處即愈

赤遊內服末藥 此方金雲章先生驗過

川山甲炒炙血餘燬即頭髮炭等分爲末
每服五分輕者三分黑糖拌百滾湯送下

治胃脘中急痛非勞即痰食單方 徐統和驗過

用鹽五分发尖刀頭上炭火上燒紅冷水一茶
杯將燒紅刀鹽淬入攪和飲或吐或不吐即愈

治濕毒癩瘡立效方 章子試先生傳

桐油二兩加川椒三十粒煎枯椒爲度去椒不用加入
輕粉二錢研細白蠟一兩收成膏用綿紙施成膏藥先
用苦參洗淨瘡上用此
貼之兩日一換三次愈

治諸骨梗喉立效方

用急性子二十粒即鳳
仙花子白湯送即下

治乳癰及乳岩效過方

用敗龜板煨存性每服二錢
糖拌酒下盡量飲之即消

治赤白痢疾神效方 丁巽升傳

蘿蔔連頭菜五月午日午時用燒酒硃砂雄黃噴於蘿
蔔上陰乾白痢用赤糖同煎一碗服赤痢用白蜜五錢
同煎服
即愈

治水腫立效方 丁巽升傳

用老扁蒲陰乾陳
者煎湯服即愈

治黃疸水腫立效方 吳仲德傳

菘豆一升煎
湯洗浴即愈

治毒蛇咬方

用川山甲木香各一錢五分為末酒送下
又方用全蝎二個研蜈蚣一條炙研末酒下即愈此方捕蛇師傳

台黃白木蠶立效方

吳外德書

用紫麻葉煎油

台水蠶立效方

下發氏書

明愈

同煎

蘇葛車煎藥五月十日治眼熱腫痛和少並黃實氣蠶
白麻藥煎效方
下發氏書

蘇葛車煎藥五月十日治眼熱腫痛和少並黃實氣蠶
白麻藥煎效方
下發氏書

諸症歌訣

中風

中風身温口多涎。卒然昏倒不能言。急用通關開孔竅。化痰順氣治當先。

瘟疫

瘟疫衆人病一般。四時不正外邪干。要分春夏秋冬治。莫把温寒一樣看。

中暑

中暑中熱不相同。行人中熱在日中。避暑深堂名中暑。暑分寒熱不相攻。

中濕

中濕亦因內外傷。外衝風雨內酒漿。發為腫滿渾身痛。利水和脾發汗長。

脾胃

脾胃之氣要冲和。胃司納受脾司磨。莫使温寒一失節。損傷元氣病難瘥。

痰飲

痰多屬濕津液化。隨氣升降上中下。百病之中兼有痰。隨症調治應無價。

咳嗽

咳嗽無痰却有聲。嗽謂無聲却有痰。有痰有聲為咳嗽。化痰理嗽自然安。

喘急

喘急須分肺實虛。痰火諸般皆作喘。痰火諸般皆作喘。治之莫要有差疑。

歌訣

哮喘

哮喘肺癆積寒痰。令人胸喘起居難。豁痰降火加調理。不遇良方病不安。

瘧疾

瘧是風暑不正邪。為寒為熱兩交加。新瘧可散亦可截。久病還當兼補佳。

痢疾

痢因濕熱并氣滯。赤傷血分白傷氣。赤白相雜氣血傷。清熱理氣先通利。

泄瀉

泄瀉注下濕傷脾。燥濕利水補脾虛。若還久瀉腸虛滑。收澀還將正氣提。

霍亂

霍亂吐瀉心腹痛。轉筋寒熱頭沉重。內傷外感使之然。切忌米湯休早用。

嘔吐

嘔謂有聲吐有物。寒熱傷脾食即出。和胃清火化痰涎。半夏生薑以為率。

翻胃

翻胃噎膈一般病。三陽熱結吐無定。莫將燥劑反助邪。養血生津調胃應。

欬逆

欬逆氣衝上作聲。聲聲不斷火相刑。諸逆上冲皆風火。化痰降氣自安寧。

吞酸

吞酸濕熱在胃口。故作酸水刺心頭。化痰清火平肝氣。蔬食能調病自瘳。

痞滿

痞滿胸膈不通泰。令人夯悶久不快。一消一補慢調和。莫行利藥徒傷害。

脹滿

脹滿起來空似鼓。四肢不腫其中苦。莫將酸利損天和。制肝補脾以為主。

水腫

水腫是濕本是脾。通身浮腫總為虛。利水和脾兼順氣。峻攻瀉水病難醫。

積聚

積有五種聚有六。五臟六腑各所屬。左血右氣中食痰。漫漫消鎔無欲速。

五疸

五疸總是濕與熱。遍身發汗小便血。清熱利水濕自除。但將此治無他說。

失血

失血大抵俱是熱。陽盛陰虛妄行血。補陰清火抑其陽。引血歸經血自歇。

癲狂

癲為喜笑或不常。安神養血是奇方。狂為痰火因太盛。平肝清火化痰良。

邪祟

邪祟難干壯實人。神虛氣弱致相侵。只扶正氣虛邪退。莫費工夫禱鬼神。

頭痛

頭痛須詳十二經。各經用藥要分明。頭腦盡痛手足冷。此為真痛命當傾。

歌訣

二

余愛堂

耳病

耳聾男右因色慾。左右俱聾厚味傷。

女人左聾緣忿怒。補虛順氣病除去。

鼻病

鼻病不聞臭與香。每遇風寒必便塞。

素常痰火肺間藏。清金降火最為良。

口舌

口舌生瘡心穢熱。口苦肝熱移于胆。

涼劑徐投火自滅。此因謀慮而不決。

牙齒

牙痛濕熱有胃火。清火除濕更誅虫。

有風有虫痛非可。或搽或服皆安妥。

眼目

眼翳屬心白屬肺。瞳仁屬腎黑肝木。

上下眼色皆屬脾。五臟精華眼見之。

咽喉

喉痺一名為乳蛾。痰水上壅為腫痛。

多因酒色七情過。祛風清火得平和。

心痛

心痛即是胃脘疼。更有虫食氣心痛。

清熱解鬱藥通靈。臨時審候要分明。

腹痛

腹痛有熱亦有寒。時痛時止應是熱。

死血食積并濕痰。綿綿不止作寒看。

腰痛

腰痛豈止屬腎虛。或溫或涼或汗下。

三因五種要推之。更兼補腎是良規。

疝氣

疝氣七種要詳推。濕熱在內因寒裏。

寒水筋血氣狐癩。陰腫小腹痛如錐。

脚氣

脚腫名為濕脚氣。麻則因風痛是寒。

不腫乾脚氣之謂。腫乃是濕宜分利。

痺痛

五痺手足痛不仁。發散風寒除濕氣。

不過風寒濕氣侵。管教疼痛不纏身。

消渴

消渴要分上下中。下消屬腎共三消。

止屬肝經中胃者。能食不食分治也。

濁症

濁症白色屬腎虛。赤要清心白補腎。

赤者心虛有熱隨。化痰燥濕要須知。

遺精

遺精症是心腎虛。濕熱傷脾精亦泄。

補精養腎澀精宜。理脾除濕再無遺。

淋症

五淋有熱屬膀胱。血石膏勞肉五症。

小便淋瀝痛難當。疏通清熱是良方。

小便閉

小便不通有五閉。悉宜用吐把氣提。

氣血痰熱風者是。上竅既通下竅利。

大便閉

大便不通有虛實。或攻或補用溫涼。

陰結陽結閉不一。臨時對症無差失。

痔漏

痔漏名有二十四。酒色氣風食五事。未破名痔破為漏。祛風除濕解毒治。

腸癖

腸癖即是大便血。腸風糞前色鮮潔。藏毒真後血黯濁。臍寒臍熱不同列。

諸症

諸症多因濕熱生。生于腹內狀難明。或安或下便清寧。或安或下便清寧。

婦人

婦人屬陰多生氣。氣鬱成病最難治。諸病兼理氣調經。香附是女真仙劑。

種子

人生無後實堪傷。誰識仙翁有秘方。只存心田存一點。管教蘭桂滿庭芳。

妊娠

妊娠母病致胎動。母病醫痊胎是和。胎若不安觸母病。但安胎氣毋無病。

產育

臨產之婦莫驚惶。行動頻頻須臥床。氏熱須知蒂自落。著還用藥要安詳。

產後

產後諸症要扶虛。惡露流通是所宜。更有多般發熱症。未可輕教汗下宜。

小兒

小兒十病元傷食。食傷發熱成諸疾。早當消導莫遲拆。免致驚痛疾食積。

驚風

急慢驚風症不同。慢宜溫補急宜攻。更有慢脾風驚症。枉教醫士費神功。

疳疾

五疳心肝脾肺腎。冷熱肥瘦須辨認。肚大青筋體瘦黃。和脾消積須頻進。

癩疾

癩從皮裏膜外生。肝經流血裏成形。日漸長大如猪肺。不遇仙方命必傾。

痘疹

痘疹原來是胎毒。發熱輕遲重則速。痘要溫和疹要清。隨機應變無膠柱。

癰疽

癰疽發背氣凝起。先宜敗毒後托裏。高起屬陽陷屬陰。陽輕陰重費調理。

癰癧

癰癧相連頸項生。虛勞氣鬱結其形。益氣養榮并解毒。內消方顯藥道靈。

疔瘡

疔瘡名有十三種。皆由熱毒附邪風。外宜刺破敷其藥。發汗須教毒外攻。

癩瘡

癩瘡濕毒兼風熱。兩脚生瘡腫爛裂。却除濕熱更誅虫。葱椒湯洗後敷貼。

癩風

白癩紫癩一般風。更有汗斑亦相同。內服敗風丸散藥。外將末劑察其容。

諸症歌訣

歌訣

四

余覽

諸瘡

一切無名腫毒瘡。須臾腫起痛難當。急將妙藥頻敷貼。免使猖狂作禍殃。

癭瘤

癭瘤多緣氣血與痰。結於身體頂頤間。惟有血瘤病最惡。未可尋常一類看。

折傷

折傷打撲痛難禁。瘀血停留忽上心。散瘀止痛須趁早。補虛接骨慢搜尋。

破傷風

破傷風症有多端。汗下和之病自安。發散祛風能奏效。治之莫作等閑看。

經驗單方彙編

發源俞

煥文光甫重梓

吳興 錢

峻青掄編輯

兄

起元爾介

全圖正

烈彥方

男明勿時 姪時與借全較字

中風

中風者言為邪風所中。其受病重。非若傷風之輕也。風是四時八方之氣。常於冬至之日自坎而起。候其八方之風。從其鄉來者。主長養萬物。若不從其鄉來者。名為虛賊風。害萬物。體虛者則中。之。當時未必即發。重感風邪。病遂發焉。藏府有命。命皆在背。中風多從俞入者也。而有中府中藏中血脈之分。中府者其病

在表。多着四肢。故肢節廢。脈浮惡風。拘急不仁。外有六經之形。

證。太陽經證。頭疼身熱。脊強。陽明經證。目痛鼻乾。不得卧。少陽

經證。舌乾口燥。喉陰。以小便續命湯及疎風湯汗之。中藏者其病在

裏多滯。九竅故唇緩二便閉。脾不能言。心耳聾。腎鼻塞。肺目昏。

肝以三化湯。及麻仁丸下之。中血脈者。病在半表半裏。外無六

經之證。內無二便之閉。但見口眼喎斜。半身作痛。不可過汗。恐

虛其衛。不可太下。恐損其營。惟當養血順氣。以大秦苑湯。羌活

愈風湯和之。此皆真中風也。而有氣血之分焉。氣虛者。右手足

不仁。用六君子加鉤藤姜汁。血虛者。左手足不仁。四物湯加鉤

藤竹瀝姜汁。氣血俱虛者。左右手皆不仁。八珍湯加鉤藤竹瀝

姜汁。凡中風者。倒先須順氣。然後治風。用竹瀝姜汁調蘇合

香丸。如口噤。挾開灌之。如挾不開。急用牙皂生半夏細辛為細

末。次入鼻內。有嚏可治。無嚏則死。最要分別閉與脫。二證明白。

如牙關緊閉。兩手握固。即是閉証。用蘇合香丸。或三生飲之類。

開之。或口開心絕。手撒脾絕。眼合肝絕。遺尿腎絕。即是脫証。更

吐沫直視。肉脫筋痛。髮直齒頭上。宜大劑理中湯灌之。及灸

臍下。亦可救十中之一。若誤服蘇合香丸。牛黃至寶之類。即不

可救矣。蓋斬關奪命之將。原為閉証。設若施之脫証。如人既入

井。而又下之。石也。世人蹈此弊而死者。不可勝數。故特表而出

之。惟中藏之證。是閉而非脫者。宜蘇合香丸。牛黃丸。至寶丹。活

命金丹之類。若中府與中血脈之證。斷不宜用。為內有射香

入脾。治肉。牛黃入肝。治筋。龍腦入腎。治骨。葱

反引邪風。深入骨髓。如油入麵。莫之能出。

肥人多中。以其氣盛于外。而歉于內也。肺為氣出入之道。肥人氣

必急。急則痰涎上壅。邪盛可知。所以治之。必先理氣。中後氣未順。痰未除。調理之劑。當用藿香正氣散。和星香散煎服。非特可

治中風之症。中氣中惡尤宜。尋常嘔吐痰厥。非飽悶。皆可用之。

三生飲 治卒中昏噴口眼喎斜 南星 生用 川烏 去皮生用 附子 去皮生用

五錢 末香 錢二 每服五錢 水姜煎服 昔王用之卒中昏噴口

眼喎斜痰氣上壅咽喉有聲六脉沉伏此真氣虛而風邪所乘

者用三生飲加人參一兩煎服即甦夫前飲乃行經絡治寒

痰之藥有斬關奪旗之功每服必用參兩許駕驅其邪而補助

真氣否則不惟無益適足以取敗矣觀先哲用芪附參附等湯

其義可見 范氏家

稀涎散 治中風昏迷如醉形體不收或口 新皂角 四挺去

黑皮

明礬 兩

共為末每用五七分溫水調灌令微微稀冷或涎出

一二升待醒後乃用藥調治毋使大吐恐過刺傷人屢效不可

具述 宗奭曰此法用皂莢一兩生礬五錢膩粉五錢水調一

二錢過咽即吐用礬者分膈下涎也 孫氏秘

中風口噤 荆芥穗為末酒服二錢立愈 賈似道云此方前後

用之甚驗 曾公

舒筋丸 治男婦手足

乳香

沒藥

當歸

骨碎補 炒

木香

白附

木鱉

白膠

牛膝

虎筋骨 美

枸杞

木瓜

甜瓜子

京墨

地龍

酒洗淨焙燥

射香 少

各為末蜜丸如梧子大每服六十丸酒下此方不養

血不去風大為奇吳 選方

中風

三

口眼喎斜 用白鱸一條裝入竹管內尾上用針深刺出血血攤
絹帛上乘熱貼之如歪向左貼右邊歪向右貼左邊立時即正

正即洗去萬病回春

稀莖丸 治四肢麻痺骨節酸痛腰膝無力偏

五月五日六月六

日九月九日采稀莖草去根莖花實淨洗曝乾入甌內層層酒
酒與蜜蒸之又晒乾再蒸如此九次則氣味極香美焙搗篩末

蜜丸服甚效本草

淨萍一粒丹 治左癱右瘓口眼喎斜三十六

七月十五日採蕩

內紫背浮萍晒乾為末細篩煉蜜為丸如彈子大每日煎黑豆
淋酒下一丸服過百粒即為全人若須小風症服二三十丸足

矣附刻陰臨文註証

預防中風

凡人初覺大指次指麻木不仁或手足少力肌肉微掣數年內有
中風之症宜先服愈風湯天麻丸竹瀝枳朮丸各一料此治未
病之先也

愈風湯 初覺風動服此可免倒仆 又治中風內邪已除外邪已
盡當服此以導諸經久服大風盡去縱有微邪加減治之

黃芪蜜炙 人參 當歸酒洗 白芍酒炒 生地 枸杞

杜仲姜酒炒 秦艽 肉桂 甘草 羌活 獨活

防風 薄荷 菊花 細辛 麻黃 蔓荊子

白芷 知母 石膏 柴胡 黃芩 地骨皮

枳殼麩炒 蒼朮米泔洗 每服一兩生姜三片煎空心服萬病回春

天麻丸 治未病之聖藥 天麻 牛膝酒洗 草薢研 元參各半

川羌三兩當歸酒洗兩半生地酒洗兩獨活兩半大附子泡去皮五錢蜜丸

每服四錢。空心酒湯任下。服後飢則食。不飢且止。醫宗必讀

竹瀝枳木丸化痰清火順氣除濕祛暈 人參五錢木香二錢

白朮土炒兩枳實麩炒陳皮去白白茯苓黃連姜汁炒條芩酒炒

當歸酒洗查肉 白芥子半夏白凡皂角生南星製上

白芍酒炒各二兩蒼朮泔水製鹽水為末神曲六兩姜汁竹瀝各一盞煮糊為丸每服百丸食遠淡姜湯下。有火者更宜。醫書

龔子才曰。余屢試前方。有效有不效。不效者。多是脾肺之虛。氣

之弱。惟宜補中益氣湯。六味丸兼而進之。可免中風之患矣。

徐芸柀曰。薛氏有云。預防者。當養氣血。節飲食。戒七情。遠悵懣。

風氣痛附痲症脫刻

痛風者。遍身骨節走注疼痛也。謂之白虎歷節風。都是血氣風濕

痰火。皆令作痛。或勞力寒水相搏。或酒色醉臥當風取涼。或臥

卑濕之地。或雨汗濕衣。蒸體而成痛風。在上者多屬風。在下者

多屬濕。治用活血疎風。消痰去濕。羌活湯加減。凡治痛風。用蒼

朮羌活酒。三味散風行濕之妙藥耳。一切痛風肢節痛者。

痛屬火。腫屬濕。不可食肉。肉屬陽。火能助。火食則下遺遺。溺內

有痞塊。雖油炒熱物。魚麵。切宜戒之。所以膏粱之人。多食煎炒

炙。燻。酒。肉。熱物。蒸。臍。故患痛風惡毒癰疽者最多。肥人多是

濕痰。瘦人多是痰火。

浸酒神方 七輪鱉甲醋炙 淨菊花 防風 杜仲

丹皮 石菖蒲去蘆 牛旁 人參 枸杞各一兩

白朮 萸肉 白茯苓 桔梗 黃芪 姜蚕

遠志去心甘草汁煮 牛膝 蒼耳 熟地 白芍

葶藶 石蟹 花粉 荆芥 白附 天麻

白星 獨活 陳皮 蒼朮米泔浸 白芷 川芎

當歸各五錢 川羌 秦苑 虎骨酒炙 油松節各一兩 用無

灰酒二斗浸之。春夏二七。秋冬三七。封固毋洩氣。每日空心三

次各飲一盃藥渣焙干研細。好酒和丸如梧桐子大。每服七十

丸。空心好酒下。昔竇中書方中年患此。四肢不舉者五載。累

醫罔效。偶遇李讓有此秘方。修合服之。半月身輕目清。病遂除。

骨節風疼 川烏大者三枚生用 全蝎二十一箇生用 生黑豆十二

粒一 地龍去泥土酒洗淨五錢 為末入射香一分糯米飯和丸。菜豆

大。每服七丸。夜臥酒下。微出冷汗。一二服便瘥。赤水

五汁膏 治風痛不拘久 姜 葱 韭 白蘿蔔各

斤打 菜子半斤 煎成膏。滴水成珠。外加麻油東丹石灰收

煉。如汁多加多。汁少加少。做膏藥貼愈。採抄本

左經丸 治手足不遂筋骨 諸痛遍身風瘡 大草烏去皮 木鱉去

白膠香 五靈脂各三兩 班毛五枚去頭 磨細。用生黑豆

去皮為末一升。醋和丸。如艾膏大。每服一丸。溫酒磨下。治筋

骨痛。未經針刺者。三五服見效。此方曾醫一人軟癱。風不能

行。不十日見效。大為奇妙。赤水

風氣

六

風氣痛 老姜 鳳仙葉 香油 川椒末 共搗擦痛

處。或鳳仙子煎湯洗亦效。一用魚膠四兩。姜汁一碗。投膠內。

熬膏攤布上貼患處。即止。書

神應膏 治骨節 乳香 沒藥 各末 皮膠 三 姜汁 二先

將姜汁砂礮內煎數沸。入皮膠化開。將礮取下。盛灰土方入乳

沒末攪勻成膏。用不見烟的狗皮攤膏貼患處。仍用鞋底炙熱

時時慰之。神效。忌鉄器。萬病

風濕臂痛 防風 歸全 各二 麻黃 五 秦苑 一 木瓜

豨薟草 海風藤 白茄根 各三 酒二觔。沙礮內煎四五滾。在

臂上薰洗。每日二次。不可怠畧。錢青掄云。家慈嘗患此症。親

試立效。後治他人無不響應。白鳳仙花浸燒酒飲亦愈。經驗良方

治兩手疼痛麻木 當歸 川芎 白芷 酒芩 妙一

黃連 羌活 蒼朮 米泔 防風 桔梗 南星

半夏 俱姜 桂枝 甘草 各等 生姜 三片 水煎服。萬病

痛風 通身骨節 油松節晚蚕沙蒸酒。每日常服。愈。秘方

瘰注臂痛 天仙藤 白朮 羌活 白芷 各三 姜黃 六

製半夏 五錢 每服五錢。姜五片。水煎服。湯方

濕痰腫痛 經年不 水紅花 蘿蔔莢 白金鳳花

水龍骨 花椒 槐苓 甘草 蒼朮 金銀花

各等分煎熏患處。水稍溫即洗之。甚驗。單方

神仙外應膏 川烏一觔為末。用陳醋入砂礮內。慢火熬如醬色。

敷患處。如病一年。敷後一日發痒。二年二日發痒。痒時令人將

手拍痒處拍至不痒為度。先用升麻皮硝生薑煎水洗。然後敷

藥不可見風。秘方

痿症斷不可作風治。而誤用熱燥攻風之藥。凡不痛者為痿。屬虛。痛者為痺。屬實。症各有別。蓋痿病生于肺熱。因血氣少。虛火

盛制肺金。肺葉焦枯。宗筋不潤。金既不能生水。以致肝水乘肝。脾土受傷。則骨痿軟。而筋弛縱。四肢難舉。不能伸縮轉動。狀若

癰癢者。須白芍黃柏 杜仲 牛膝 黃芪

白木炒各錢 熟地二錢 知母 黃柏各八分 水煎空心服。秘方

腕額起于腎肺虛弱。元神不足。或笑談高興。忘倦。一時元氣不能

接續所致。患者平身正坐。令人以兩手托住下頰。兩筋後送

上開竅。隨用絹條兜額于項上。須避風速服煎劑。不然風邪

外受。必致疾涎壅盛。口眼喎斜。而風中臟腑。十無一瘳矣。

附子漆小泡去 當歸 姜蚕酒炒去絲 人參

半夏 白木 白茯苓各一錢 天麻煨 陳皮各一

甘草三分 川芎八分 燈心四十根 生薑三片 水煎服。秘方

回生膏血虛火旺消補 人乳男用女胎乳 藕汁 白酒頭

白蜜 童便臨時取用 各等分煎膏。滴水不散為度。每晨空心湯

獨乳延生丸 茯苓一觔打碎。用牛乳數觔。人乳更妙。在銅器內慢煎

隨煎隨攪。俟稀稠。以茯苓收之。晒乾磨細糯米湯和丸。如梧子

大。每早白湯服二三十丸。屢効。陰騰文註証刻

二仙膏 牛乳十觔。福圓十觔。煎膏酒服。大補虛損。有回生之功。

扶衰仙鳳酒治五勞七傷并婦人赤白帶下神効 用白毛烏骨雞線雞一隻。將繩弔

死。退去毛屎。切作四塊。入生薑四兩。膠棗半觔。陳酒六觔。裝入

大壺內。泥封口。重湯煮一日。涼水拔去火毒。空心連姜棗食之。

一用烏骨童雄雞一隻。碗鋒去毛肚雜。勿犯鐵器。肚內入建蓮肉。

砂鍋內用酒煮爛。雞頭放鍋外。隨便食之。治虛損亦神驗。俱載醫書

童子癆。乾血。并一。活黃鼠郎一個。入瓶內。將泥搗爛封口。用籠

糠火煨一日。取出研末。每服一錢。酒下。男用雄。女用雌。神效。抄本

傳屍癆。猪腰子兩個。童便二盞。無灰酒一盞。新瓷盛之。泥封炭

火溫養。自戌至子時止。待五更初。溫熱取開。飲酒食腰子。病危

者一月見効。平日瘦怯者亦可用。邵真人經方

血崩。血餘三兩。絲瓜灰四兩。好酒送下。即愈。單方經方

血熱妄行。生荷葉。生艾葉。側柏葉。生地黄各等分。搗丸如

雞子大。每服水二鍾。煎八分服。秘方集驗

虛汗。黃芪。黑豆。煎湯飲之。半月全愈。秘方集驗

腫脹

鼓有十症。氣鼓。食鼓。熱鼓。風鼓。勞鼓。濕鼓。虫鼓。血鼓。疝鼓。狗腹腫

脹。并四肢腫者。如遇患人。腹上用手指按之。有窩可治。脉壯者

易治。脉細并臍窩腫出者難治。

雞裏金一具。真沉香。砂仁各三錢。陳香圓五錢。共末。每服錢半。姜湯

下。一用雄烏猪肚一具。入大蒜四兩。煮爛。連服五七個。忌指

醋醬一百日。單方經方

黃帝曰。水與膚脹。鼓脹。腸覃。石瘕。石水。何以別之。岐伯曰。水始起

也。目窠上微腫。如新卧起之狀。其頸脉動。時效陰股間寒。足脛

腫。腹乃大。其水已成矣。以手按其腹。隨手而起。如裹水之狀。此

其候也。膚脹者。寒氣客于皮膚之間。皤皤然不堅。腹大身盡

腫皮厚。按其腹。皆不起。腹色不變。此其候也。鼓脹者。腹脹。身皆大。大與膚脹等也。色蒼黃。腹筋起。此其候也。腸覃者。寒氣客于腸外。與衛氣相搏。氣不得榮。因有所繫。癥而肉著。惡氣乃起。癥肉乃生。其始生也。大如雞卵。稍以益大。至其成如懷子之狀。久者離歲。按之則堅。推之則移。月事以時下。此其候也。石瘕生于胞中。寒氣客于子門。子門閉。寒氣不得通。惡血當滯。不濕。鯨以留。止日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生于女子。可導而下。

鼓脹者。卽單鼓脹也。始而止于單。是腹脹。日久不治。則四肢浮腫矣。其症亦有二。一爲濕熱所感。一爲虛寒所致。但虛寒者。無過于服金匱腎氣丸爲妙。如係濕熱。用雞屎白炒沉香色研篩一升。盛磁罐

內浸好酒。二觔。麴封口。煮三炷香。澄清。隨意溫服。或用真黃牛肉一觔。河水煮爛。加皮硝一兩。隨意食之。二三日其腫卽消。至

重者。再服全愈。百日之內。切忌酸鹹。生冷。麴食。蠶腥。油膩。硬物。

十種水病。并根源証狀方法。一。清水先從左右肋腫起。根在肝。大戟

二。赤水先從舌根起。根在心。葶藶子。三。黃水從腰腹起。根

在脾。甘遂炒。四。白水從脚腫起。根在肺。桑白皮。五。黑水

從外腎腫起。根在腎。連喬。六。玄水從面腫起。根在外腎。

芫花醋炒。七。風水從四肢腫起。根在骨。澤泄。八。石水從腎腫

起。根在膀胱。藜蘆。九。高水從小腹腫起。根在小腸。巴豆

去皮。十。氣水或盛或衰。起根在腹。赤小豆。右十般腫病。各

有根源。種種不同。看十腫病。根除一味。倍多。餘九味。等分。焙末。

蜜丸梧子大。用赤茯苓湯吞三丸。不拘時。每日三服。愈後服補藥。其方：肉桂去皮、干姜、肉豆蔻、赤茯苓、菝葜醋。

川芎、桔梗各等分。為末。每服三錢。白湯下。空心食前。日午晚。

各一服。二方治水腫。白發百中。獲濟無數。赤水

禹餘糧丸許學士朱丹溪皆贊。此方為水脹之神藥。蛇含石大者三兩。鐵銚燒紅。醋內候冷。取出。研極細。

禹餘糧石三兩、真針砂五兩。海淨炒。干用。醋二鍾。全餘糧銚內煮。干。更用銚并藥燒紅。傾淨。碑上候冷。研細。

羌活、木香、茯苓、川芎、牛膝酒、桂心。

白豆蔻、大茴炒、蓬朮炮、附子泡、干姜泡、青皮。

京三稜炮、白蒺藜、當歸酒浸各五錢。末。入煎三味。拌勻。丸如梧子大。

空心白湯下。三五十九日。三服。更以溫補藥補之。神效。醫宗必讀

脾病黃腫。青丸椒成。赤珠。當歸。酒浸七日。各四兩。百草霜三兩。為末。以所

浸藥酒打丸。如梧子大。每服五丸。至七丸。酒下一月。効。祖傳。世方

鼓脹水腫。乾絲瓜一條。去皮打碎。入巴豆十四粒。同炒。以豆黃

為度。去豆。用瓜。陳米炒黃米。與巴豆先須等分。又去瓜。用米。研細。清水為丸。

每服百粒。滾湯下。腫脹不服藥。自去水。真水銀粉二錢。

巴豆去油。四兩、生硫黃錢一。研成餅。貼臍上。黃水自去。貼時。先以綿一

筋鋪臍上。次貼藥餅。外用帛縛之。如人行三五里。黃水自下。待

三五度去餅。溫粥補之。久患者。隔日取水。秘方。集驗

水腫腹大或遍身浮腫。用葱一斗。入鍋內。以水浸過。用大戟根苗蓋之。

瓦盆合定。煮熟。取葱。不時食之。葱盡。決愈。本草

一用馬鞭草一斤、鼠尾草一斤。水一石。煮取五斗。去渣。再煎。令稠。以粉

和丸。黃豆大。每服二三丸。加至四五丸。神効。附方

水腫 用土狗一名蠖蝓焙干為末。用上半節即消。上身之水。下半節即消。下身之水。左可消。左右可消。右方士以此為神奇。醫宗必讀

腹脹黃腫 亞腰葫蘆連子燒存性。每服一個。食前溫酒下。不飲酒者。白湯下。十餘日見效。簡便方

敷藥 治腹滿如石或陰囊腫。大先用甘草嚼後用此。大戟 芫花 甘遂

海藻 各等分。為末。用礬醋調麵。和藥攤綿紙上。覆貼腫處。仍以軟

綿裹住。醫宗必讀

白遊風腫 螺螄肉入鹽少許。搗泥貼之。神效。摘玄方

腹皮青色 不速治。胡粉是錫粉。鹽熬色變。以摩腹上。子母秘錄

痰鼓 陳葫蘆一枚。去頂用筋鬆其子。將酒灌入。仍用頂封好。重湯煮數沸。去子飲酒。一吐而愈。元氣旺者。斷宜用此。單方全集

反胃噎膈 此症年滿六旬者難治。糞如羊糞者難治。吐白沫者難治。胸膈嘈痛如刀割者死。

反胃噎膈 總是血液衰耗。胃腕乾稿。稿在上者。水飲可行。食物難入。名曰噎膈。稿在下者。食雖可入。良久復出。名曰反胃。二證

名為膈。大抵氣血虧損。復因悲思憂恚。則脾胃受傷。血液漸耗。

鬱氣生痰。痰則塞而不通。氣則上而不下。妨礙道路。飲食難進。

噎膈所由成也。脾胃虛傷。運行失職。不能熟腐五穀。變化精微。

朝食暮吐。暮食朝吐。食雖入胃。復反而出。反胃所由成也。二者

皆在膈間受病。故通名為膈也。此症之所以疑難者。方欲健脾。

理痰。恐燥臍有妨于津液。方欲養血。生津。恐潤劑有礙于中州。

審其陰傷火旺者。當以養血為亟。脾傷陰盛者。當以溫補為先。

雄黃二豆丸 治噎食 神效 大烏梅肉 二十枚 礮砂 雄黃 各二錢

膈症

乳香錢一 百草霜 黑豆 菘豆各四十粒 為末和梅打丸彈
 子大用一丸嚙化待一炷香方行經絡用麵餅一個熱湯泡
 開喫之無碍為妙仍有碍一二日後再一丸三五日除根赤水玄珠

壹膈 第一次服

皮硝

兒茶

礮灰各一撮

射香分一

末燒酒調服 第二次服

沉香錢二

草果錢七

砂仁

木香 五靈脂各五錢

豆蔻兩一

兩頭錢一

萹澄茄錢二

白木二錢 姜汁製 為末好酒調服一錢

第三次服

萹澄茄錢三

麻雀兒七枚 煮熟點茄末食 第四次服

猪牙皂角半觔

棗子觔一 煮熟去皂角服 第五次服

黑豆升一

黃柏

黃芩 黃連各一兩 煮豆食有效江西楊大人傳

一用阿魏錢一 乾屎錢三 為末五更姜片煎食立愈趙王出方

一用白水牛喉去兩頭節并筋膜節節取下米醋一碗炙至醋盡
 為末每用一錢米飲下愈法天生意

一用甘蕉汁二碗姜汁一碗每服一碗日三服即不吐醫宗必讀

噎膈初起 老姜一觔童便浸七日土內埋七日洗淨為末一兩 白木土炒淨末一兩 飯丸

梧子大每晨空心服一錢米飲下有效懷德堂錄

噎膈反胃鼓脹亦治 沉香 薜子 廣皮各二錢 官桂錢一

木香分三 蘿蔔子錢三 俱為末每用三分配狗寶一分須用好泉

水煎通草湯空心調服採醫書

翻胃吐食 黃蜆壳 田螺壳要久在泥中音 各等分炒成白灰每二兩

入白梅肉四兩搗和丸再入砂盆內蓋定泥固燒存性研極細
 每服二錢人參縮砂湯下或陳米湯亦可 一用地龍糞錢一

大黃七錢 朱香三錢 為末每服五錢無根水調服三服見效忌

煎炒醋等赤水

一用乾柿餅三枚連蒂搗爛用酒服甚効醫宗必護

久患咳噎連至四五 姜汁 蜜 全煎三次立效抄本

凡反胃症得藥而愈者切不可便與粥飯惟以人參五錢 陳皮二錢

老黃米一兩 作湯細啜旬日後方可食粥倉廩未固不宜便進

米穀常致不救醫宗必讀

病後胃弱不能飲食者 蓮子肉 炒米各四兩 茯苓二兩 砂糖二兩

調勻每服五六茶匙不拘時服白湯下秘方集驗 人乳各二蓋 飯上蒸熟

隔食隔氣 薑汁 梨汁 姜汁 一服之三日後再服如神抄本

痰飲

百病多兼有痰故諸病以化痰為先善治痰者兼治氣氣順則痰利痰脈浮滑者宜降浮實者宜吐沉小者不宜吐恐虛故也凡治痰症不可全用利藥過使脾氣虛弱則痰反易生而多若脾虛生痰者用健脾燥濕便要利補兼用陳皮白朮為佐也痰乃穢濁之物宜吐不宜瀉瀉則反加別症矣

竹瀝達痰丸能運痰于大腸不損元氣神功 半夏二兩 泡七次姜汁浸透

白茯苓 陳皮去白淨 炙甘草 人參各一兩 大黃酒浸

酒苓冬三兩 沉香五錢 礞石一兩 用瓦蓋好鹽泥封固晒于炭燂如金

色黃 右為末竹瀝碗半姜汁二鍾入鍋內熬一刻將藥和搗磁罐盛之晒乾仍以竹瀝姜汁如前法搗晒七次仍用竹瀝和丸

如小豆大。每服百丸。食遠米飲下。萬病回春

風痰頭運 嘔逆目眩面色青黃脈弦者

生半夏 生南星 寒水石 各

浮起。漉出。搗丸。每服五十粒。姜湯下。極効。古法

小麥麵 三 爲末。水和成餅。水煮。

寒痰氣喘 青橘皮 一片。展開。入巴豆一粒。麻扎緊。火上燒存性。

研末。姜汁和酒服。

天台李翰林治莫秀才到口便止。張果醫說

痰火 天花粉一觔。切片。初以藜汁一鍾拌晒。次以姜汁一鍾拌晒。次以蘿蔔汁一鍾拌晒。次以竹瀝一鍾拌晒。爲末。每服一錢。

好茶下。懷德堂錄

一用桑白皮 四 欵冬 二 薄荷 四 甘草 二 芽茶 四

陳香圓 四 杏仁 五 鵝管石 五 水白糖爲丸。服。衛生備要

雞鳴丸 治男婦咳嗽吐血諸虛如神 從來咳嗽十八般。只因邪氣入于肝。

胸膈咳嗽多加喘。胃嗽膈上有痰涎。大腸咳嗽三焦火。

小腸咳嗽舌上乾。傷風咳嗽喉多痒。膽嗽夜間不得安。

肝風嗽時喉多痺。三因嗽時船上灘。氣嗽夜間多沈重。

肺嗽痰多喘嗽難。熱嗽多血連心痛。膀胱嗽時氣多寒。

暴嗽日間多出汗。傷寒嗽時冷痰酸。此真神仙真妙訣。

用心求取雞鳴丸。知母 炒 阿膠 炒 五味 各 桔梗

人參 各 陳皮 去 馬兜鈴 麻黃 旋覆花 甘草 各

杏仁 去 葶藶 紙 半夏 姜 蜜丸。彈子大。每服一九。五更

烏梅 生姜 連子湯下。萬病回春

咳 嗽

經念自

余愛

瓊林散 治遠近哮喘

桑皮 四兩

五味

甘草 炙

陳皮 各二兩

粟殼 一斤去蒂膜醋浸三夜

冷蜜調服 赤水

久患喘急

杏仁 童便浸換 每以蜜許同薄荷蜜煎服神效 抄本

哮喘

白果 炒 麻黃 錢三

蘇子

半夏 製

欵冬花 錢二

桑皮 蜜炙 杏仁 去皮尖

炒苓 錢一

甘草 錢一

水煎分二

服 金陵一舖家以此方治哮喘無不效者因以此起家 抄本

呂祖仙傳蘆吸散 治新久咳嗽百藥無功服此神奇

鵝管石

陳皮 各二錢半

欵冬花 錢五 年老及虛者加人參 五分

冬月加肉桂 錢半

忌鉄

器為末分七服每夜仰卧將藥一服作三次入竹筒內口噙竹

筒近咽喉用力一吸將溫水一口送下不可多吃水忌油膩并

塩七日藥完後亦少用些油塩至半月後不忌 萬病回春

夢遺白濁

不夢而自遺者心腎之傷居多夢而後遺者相火之強為害若夫心動于欲腎傷于色或強忍房事或多服滯方敗精流溢乃為白濁

瑞本丸 專治夢遺 苦參

黃柏 各二兩

牡蠣

蛤粉

葛根

白螺蛸壳 煨

青蒿 各一兩

神曲為丸

如梧子大空心白湯

下七十九却酒一月終劑而愈百發百中 赤水

夢遺 鐵屑 研末 棗肉為丸每晨服一錢大妙 衛生備要

一方用乳香指大一塊臨卧含口中醒即吐之數次自愈 秘方集驗

丸方 專治夢遺

石菖蒲

遠志

桑螵蛸

益智

棗仁

牡蠣

龍骨

瑁陽

等分丸服隨手而愈 赤水

至念年方

夢遺白濁

七

除疑錄

五珠金瑠丹 治夢遺白濁 能起死回生 黃豆 菜豆 糯米

小麥 各一斤 熟地 半斤各炒 加入蓮鬚 五味 茯苓 各四兩

龍骨 牡蠣 煨各四錢 白洋糖拌勻作糕不拘時白湯下或用蜜

為丸每服八錢 鹿含草浸酒服治夢遺神效 衛生 備要

氣虛白濁 黃芪 八兩炒 茯苓 一兩 為末每服一錢白湯下 經驗 方

淋閉白濁 白茯苓四兩作饘以猪苓四錢入內煮二十沸取出

晒干去猪苓為末黃蠟搜和丸彈子大空心嚼咽一九以小便

清為度忌米醋屢試屢驗 綱目

徐芸禪曰凡人慾動則情熾情熾則神疲神疲則精滑而夢失故

寤寐時須制慾靜養心無他出默坐片刻然後屈足側卧自無

走失慎勿沉溺慾海神不守舍致失攝生之道也

傷寒瘟疫 附目風 寒方

發散傷寒 不問陰陽二症倉卒無藥生姜一葱白 十 好酒二大

碗煎半熱服蓋被週身汗透即解勿令汗太過忌大暈五七日

春依此方夏月葱姜減半冬月加黑豆 二合 煎服尤效如旅次

煎藥不便生姜 五片 葱白 四莖 紫蘇葉 三錢 煎服 無此 秘方 集驗

停食傷寒 陳香糟 六兩 生姜 四兩 水菖蒲根 四兩 共搗炒熱為餅

敷胸前痛處火熨之內响即去如口渴任喫茶水待大便下惡

物愈 單方 全集

傷食 雞硬肝內黃皮燒灰酒服大小停食不化服之即愈

一用麴研沖酒澄清去脚服之最效 三月初三日收野薺菜花

根晒乾貯炭煎湯服之即消 徐龍 秘方

傷寒瘟疫 傷寒瘟疫 傷風

四時感冒風寒 初起葱白連鬚五根生薑沖酒服秘方

大頭瘟 黃連各五錢 黃芩各三錢 吉紅各二錢 元參各二錢

生甘草 連翹 鼠粘子 薄荷葉 板藍根 馬屁勃各一錢

白姜蚕 升麻各一錢 柴胡 吉櫻各二錢 爲末湯調

時時服。或拌蜜爲丸。喻化此方全活甚衆。赤水

時疫不染 蒼朮三錢三分三厘 甘草一錢六分六厘

撫芎八錢五分 乾葛一錢五分 姜三片連根葱頭三個水二碗煎八分

空心服已病者愈未病者不染也。秘方

蝦蟇瘟 以金線田雞搗汁水調空腹燉飲極效。本草發明

辟疫 用雄黃末菜油調塗鼻中空心再服雄黃酒一盃永不染

書方

瘧疾

夫瘧者因外感風寒暑濕內傷飲食勞倦或饑飽色慾過度以致脾胃不和痰留中脘然無痰不成瘧脾胃屬土有信來去不失其時若移時或早或晚者是邪無容地瘧將好也瘧疾來時呵欠怕寒手足冷發寒戰大熱口渴頭痛腰膝骨節酸痛或先寒後熱或先熱後寒或單寒單熱或寒多熱少或熱多寒少一日一發受病淺也易治間日發者或二日連發住一日者皆難治治宜在表無汗者散邪湯爲主有汗者止氣湯爲主在半表半裏者柴苓湯爲主分利陰陽而未已者人參養胃湯加減若用截藥吐出黃膠水者瘧自愈也不可一二日早截早則邪氣閉塞而成壞症又不可遲截遲則元氣衰憊而成虛怯當在三四

瘧疾

徐愛堂

口就截為好。須待熱退身涼。方可飲食也。切不可帶熱飲食。恐不消而成痞。一名瘧母痞。散成鼓者。有之矣。

散邪湯 治瘧初起。頭身痛。無汗。

甘草三錢 羌活 紫蘇

荊芥 白芷 麻黃

白芍 防風各一錢 生姜

葱白三根 水煎。露一夜。次早服。有痰加陳皮。有濕加蒼朮。

夾食加香附同春

正氣湯 治瘧初起。無汗。寒壯。熱。頭疼。口乾。有汗。

桂枝 甘草各三錢 茯苓

半夏炒 白芷 青皮 川芎 草果去殼 檳榔

前胡 柴胡 麥冬各一錢 生姜三片 棗一枚 預先煎服同春 肉桂

柴苓湯 治瘧發寒熱。病在半表半裏。陰陽不分。

柴胡 黃芩 人參

半夏 豬苓 澤泄 白朮 茯苓

甘草 生姜三片 棗二枚 煎服 無汗加麻黃 有汗加

桂枝 汗多加官桂 熱多加黃芩同春

治瘧 陳皮 半夏製 當歸各一錢 柴胡 黃芩

澤泄 茯苓各八分 甘草炙 升麻 干葛各五分 生姜二片

蕪頭一枚 桃頭五個 水煎熱服。忌生冷魚麵。據月坡云。方有百

種。惟此穩當。無悞。須服二十劑。服五六劑後。加人參更妙。陳百坡方

絕瘧十日後 常山酒煮 知母 貝母 草果各錢半 水煎五更

熱服。渣酒浸。發前後。王隱者云。予用此方四十年。奇效不能

盡述。切勿加減。以致不效。養生主論 又方二十日 歸身 青皮 赤生首烏 白生首烏

老姜皮各三錢 河水井水各一碗。煎八分。露一夜。臨來日五更熱

瘧疾 九 餘愛堂

服即愈。經方

外絕藥

大蜘蛛

三枚 信砒 錢一

雄黑豆

四十粒

為末。滴水為丸。詭

豆大。先夜以一九獻于北斗下。次早紙裏插耳內立效。宜明方

間日瘡

白朮 錢一

茯苓

澤泄

猪苓

柴胡

半夏

各一錢

黃芩

寒多一錢

加姜片

大棗 二枚

露一夜臨

日五更服

神效方

三日瘡

立止

蒼朮 錢三

製首烏 錢五

白朮 二錢

知母 五錢

粉草 六錢

四碗煎半雞鳴服

寒多生薑六錢 當歸六錢 生薑五錢

將發服愈。單方

久瘡似癩

當歸

酒洗 牛膝 各五錢

鱉甲

橘紅

貝母

各三錢

鮮首烏

錢五

姜皮

錢二

柴胡

錢半

二味熱加

竹瀝一盞 水三鍾煎

半露一夜發

日五更時溫服

單方

仙

