



武
609
2



門中武
卷 2
第 609 號



痢疾

痢疾赤屬血。白屬氣。赤白相兼。膿血雜痢。皆因脾胃失調。飲食停滯。積于腸胃之間。多是暑濕傷脾。故作痢疾。起于肚腹疼痛。大便裏急後重。小水短赤。身涼脈緩者。易治。身熱脈弦急者。難治。痢初起一二日。元氣壯實者。先用立白散。虛弱者。用芍藥湯。疎通積滯。三四日後。元氣漸弱。調和飲食。加減治之。如不止。服參歸芍藥湯。調理脾胃。補益元氣。久不愈。方可服真人養臟湯。加減治之。切不可驟用粟壳等藥。止寒太早。恐內積氣未盡。成休息痢。亦恐毒攻上。胸腹飽悶。作疼惡心。嘔噦發呃。難治。因毒氣攻胃故也。先水瀉。後膿血者。是腎傳脾。難愈。先膿血。後水瀉者。是脾傳腎。易愈。又有痢下鮮血者。如塵腐色。如屋漏水者。大

孔如竹筒者。嘔噦發呃。煩燥身熱者。俱難治。如魚腦髓者。身熱脈數大。半生半死也。大抵治痢疾。一二日元氣未虛。治宜疏通積滯。此通因利用之法。三四日後不可疏通。恐元氣虛也。當清熱解毒。調養脾胃。為主。經云。行血則便膿自愈。調氣則後重自除。若大腸積滯壅塞。而後重。法當疏導之。若大腸氣虛下陷。而後重。法當升補之。

玄白散 治痢初起。裏急後重。腹痛。血虧。壯盛者。一劑等愈。 大黃二錢 生地 赤芍

歸尾 檳榔 枳壳 炒 牽牛 赤痢用黑。白痢用白。赤白相雜。黑白兼用。半生半炒。

須搗 莪朮 黃連 各二錢。暑月加香薷。炒一水煎。空心溫服。以痢二三次為度。 萬病回春

治一切痢 不拘男女。婦小兒。 木香 方圓一寸一塊。 黃連 五錢。 用水半升。

煎乾去黃連。切木香焙末。分三服。第一服。陳皮湯下。第二服。陳米飲下。第三服。甘草湯下。有一婦人久痢將危。夢大士授此方。因而得愈。孫氏秘寶方。

黑神散 治腸滑久痢。 石榴一箇。煨烟盡。次研。仍以酸榴一塊煎湯服。神效無比。醫方考。

遠年痢。上好豆酒。煖熱一二鍾。每鍾內入姜汁一二茶匙。不宜多服。數十次自愈。

一用哺退雞子壳。毛坑上掛燥。研極細末。將一分百滾湯送下。即愈。

一用臭椿樹皮 五兩 兩前茶 錢半 扁柏葉 二錢五分 莖頭 烏梅 各二 酒水各一碗。煎。須緩緩服。恐泛。俱出單方。

噤口痢 男婦湯飲不下者用烏梅一筋敲碎置盆中將十餘碗水煎泡熟令病人坐盆上待熱氣冲上肛門溫即洗其人亦睡去即扶上床煎粥湯候之如思飲食即與粥湯半碗少頃與稀粥半碗不宜多若小兒照方減半可也

黃連三錢 人參半錢 水一鍾煎七分溫服藥入口即甦

一用烏梅二箇夾住蝸牛一條繩紮任安口中化水滴下愈

一用木鱉子研極細和麵作餅貼臍中亦效俱集驗方

疫痢疫痢者一人有病他 蒼朮一兩 水三鍾煎至二鍾去朮入

白朮 防風 白芍 羌活 人中黃各一錢 煎至一

鍾溫服秘方補遺

便後脫肛日久痢所致者 用蝸牛燒灰猪脂和敷立縮經驗良方

腸風下血方藥雖效貴在節慾戒酒方可除根附臟毒下血大便脫肛

腸風便血壯實者宜用 槐角子五錢 黃連 枳壳 地榆 貫衆各三錢

水煎服 昔潘大司馬患此孫文垣用此方治之一服即止因書其方于壁間遇有便血者治之無不立愈

大腸瀉血虛盛兼宜 髮灰五錢 雞冠花 柏葉各一兩 為末卧時酒服二

錢來早以溫酒投之一服見效普濟方

下血 隨四時方向採側柏葉燒灰研末每日米飲下二錢選方

腸風下血 豆腐末入袋濾出漿者帶渣取來鍋內炒燥研末每三錢如下紫血塊者白糖湯下紅血塊者砂糖湯下雖遠年便

血垂危者服之神效每日用三次秘方集驗

腸風 熟黃芩炒黑 黑棗頭半斤煮爛去皮核 搗爛和麥末為丸梧子大

小兒受毒

早晚共服四錢。終劑即愈。懷德堂自驗方

臍毒下血

大黃

酒浸九蒸九晒二兩

槐花

三兩

木耳

三兩

郁李仁

皂

角子

象牙屑

條芩

血餘灰

升麻

荆芥穗

各五錢

共為

末煉蜜為丸。赤豆大。外以四物湯加蒲黃各一兩為衣。米湯送

下。空心及下午各二錢服完立愈。三吳醫案

昔有一人患臍毒下血數年。自分必死。得一方。只以乾柿燒灰。飲

服二錢遂愈。

又一通判。病此十年。服此方一服而愈。本草

大便脫肛。多主氣虛。人參黃芪川芎當歸升麻水二碗煎八分

食。前服如血虛。加芍藥地黃。血熱加炒黃柏。虛冷加炒黑乾姜

外以五倍子末托而上之。或用苧麻子四十九粒搗爛貼項門

上。即收。收後即急洗去其藥。秘方集

便血淋漓并小便閉塞。淋有虛弱不同。此篇治壯實之症。虛者貴服補藥方效。

男婦血淋。酒瓶頭箬葉三五五年者妙。每用七個燒存性入射香少許。

陳米飲下日三服。有人患此二服即愈。百一選方

淋痛或血糞或沙石脹痛

川牛膝一兩水煎服。

一婦患此十年。服效。直指

一用蜀葵花根洗剉煎五六沸。服之如神。衛生寶鑑

熱淋如血。蚕紙燒灰入射香少許水服二錢。極效方也。衛生家寶

尿血兼治肺疽吐血或舌上出血若鼻衄吹內立止。茅草根車前子湯。調髮灰下效。赤水立珠

男子便血。黑豆一升炒黑研末熟酒淋之。去渣飲。神效。活人心鏡

兔絲子丸治淋症。兔絲子酒蒸五錢。澤瀉二錢五分。桑螵蛸炙用

錢五。為末。蜜丸。梧子大。每服二錢。空心米飲下。醫宗必讀

小便閉塞。田螺一枚。加鹽一撮。和壳生搗。或加大蒜一顆。同搗

便血。小便閉塞。

貼臍下一寸三分用絹帛繫紮之自通。一用麥麵和作圈。

臍外鯽魚一尾連鱗腸搗爛入射香三分生薑四兩和勻填滿。

臍上圈內以碗覆之熟睡立通。一用獨郎大蒜一枚梔子七枚。

鹽花少許搗爛塗紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立效。

又熨法葱白三筋切碎炒熟絹包分兩袋更替熨臍下。單方俱載

便閉毒死 桃枝 柳枝 木通 川椒 枯礬各一兩

葱白七個 燈心一把 水三十碗煎半用磁罐熱盛一半熏外腎。

遇圍以破圍繞不令外風得入冷即易之其效大奇。醫宗必讀

傷寒後便閉 生薑八九塊杵碎水十餘碗麻布五六尺同煎數

沸用桶盛候可通手以布頻熨小便良久用紅豆末一錢江茶

二錢并葦水調服小便如注。赤水玄珠

霍亂吐瀉附痧斑

霍亂者揮霍撩亂也。外感內傷陰陽乖隔以致上吐下利。偏陽多

熱偏陰多寒卒然而成。危如風燭得吐利者名濕霍亂。輕蓋所

傷之物盡出也。上不得吐下不得利所傷之物不得出死甚速。

須用鹽湯探吐得吐則寬切莫與穀食入口即死。直至饑甚吐

瀉過二三時辰方可與稀粥食之。

玉液散治伏暑吐瀉 滑石四兩 藿香 丁香各一錢 為末米

傷暑霍亂吐瀉 猪苓 澤泄各七分 赤茯苓 干葛各一錢

花粉二錢 香薷 黃連 甘草 白朮各五分 泄極加

升麻七分 黃芩 石羔各八分 熱極加 石羔 知母各一錢

吐瀉

腹痛加 芍藥錢炒五 肉桂三分 寒極亦然姜三片煎服秘方集驗

五更泄名腎泄蓋陰感而然脾惡濕濕則濡而困 吳茱萸錢五 同炒香為末每服二錢陳米飲下採醫書 五味去梗二兩

腹痛難忍 取白扁豆葉三十張搗汁冲井水服立驗青浦徐氏抄本

中寒腹痛并絞腸痧 胡椒七粒以布一層包裹不拘自已或他人嚼

碎納臍內隨用膏藥貼上再以熱手按之蓋被而卧少頃腹中

作熱或有汗出則寒氣散而痛自愈矣秘方集驗

如遇痧脹急將病人頭頂紅髮拔去腿彎指頭皆刺出血將口挾

開畏白鴨腳花開花時連根葉風乾包貯 三枝泡湯灌下即活良方救急

發斑不出 用白蠟燭點火照視心胸腹背隱隱紅斑不起在于

肌內取山羊乳飲之即起透而自痊矣經方

心氣痛

心痛即胃腕痛須分新久之殊若明知身受寒氣口食寒物而病

于初得時當用溫散溫利之藥若病稍久而成鬱鬱則蒸熱熱

久必生火若行溫劑寧無助火添病乎此病雖日數多不食不

死若痛方止便喫物與病安之後又縱恣口腹病再發難治

心痛神方 硃砂各三 木香各三 黃占一兩 化開為丸如茶豆大

每服七丸燒酒下極痛時方服效衛生備要

急心痛牙關緊閉欲死 老葱白五莖去皮鬚搗膏用匙送入咽喉中灌以

麻油四兩但得下咽即甦少頃垂積皆化黃水而下神效瑞竹堂方

一用麻油一鍾煎滾冲入燒酒一小鍾乘痛急飲秘方集驗

虻咬心痛 心頭疼急不能當吾有仙人海上方 蒲蓄醋煎通口

心氣痛

嘔管教時刻立安康。一用烏梅三個。川椒十四粒。煎服愈。單方

心口痛。良姜酒洗七次焙研。香附子醋浸七次焙研。病因寒得。附末一錢。因怒得。附末二錢。寒怒兼有各錢半。米飲加姜汁并鹽服。效。韓飛霞醫通書

胃脘疼痛。雄黃一錢。烏梅三錢。為末如豆大。俟胃口痛時須酒服。輕者二丸。重者三丸。集驗方

心氣痛。生芝麻半升。候痛時不必看。隨手取來。不拘多少。放銅鍋內炒黑為末。好酒送下。一服除根。秘方

神仙丸氣散。治治痛氣寒熱氣驚氣怒氣山嵐障氣積聚堅牢不能飲食發則欲死。香附

姜黃。甘草。等分為末。每服鹽湯下三錢。溫當神方

一切氣痛。天台烏藥小者酒浸。茴香炒。青橘皮去白炒。良姜炒。各等分為末。溫酒童便調下。衛生家寶

腎虛腰痛。一切諸痛。腰項痛。過體痛。腹痛。積痛。

破故紙酒浸炒。杜仲去皮姜汁浸炒各一斤

胡桃肉去皮二為末。用蒜搗膏一兩。和九梧子大空心酒下二

十九丸。婦人淡醋湯下。常服壯筋活血。烏鬚美顏。古方

腰閃。只壳。吉更各八分。甘草。紅花各五分。杏仁炒去

製半夏。木通。防風。烏藥各一錢。當歸一錢。水煎服。秘方

諸閃。凡閃腰打傷閃胸并手足損傷不出血。但有青紫內傷者。先以葱白搗爛炒熱。將痛處擦遍。隨用生大黃研末姜汁調敷。盡量飲以好酒。即三月半年不愈者神驗。秘方

脅痛。小茴炒一兩。只壳五錢。為末。每服二錢。鹽湯下。神效。經驗方

脇痛。紅及半身。甚。紅花五分。粉草二錢。大瓜瓞一個重一二兩。連皮搗爛。發水泡者。

一切諸痛。

一切諸痛。

一切諸痛。

一切諸痛。

一切諸痛。

一切諸痛。

一切諸痛。

一切諸痛。

一切諸痛。

一切諸痛。

一切諸痛。

一劑而愈。真神方也。醫旨 緒餘

冷氣腹痛 艾葉同香附醋煮為丸。有奇効。古方

酒積作痛 或瀉者 白滑石 三兩 粉草 錢五 肉果 錢五 白芍 酒炒 一兩

五錢 木香 三錢 紅麴 錢四 神曲和丸。每早晚白湯送下。二錢。自除。醫案

項強筋急 不可轉折。肝腎 受風也。 沒藥 二兩 宣州木瓜 三個 取 蓋去 軀

乳香 二錢 同入木瓜內。縛定飯上蒸爛。研成膏。每用三錢。入生

地汁半盞。無灰酒二盞。化服。愈。本事方

遍體作痛 由氣血凝滯所致者。冷氣 腰痛。四肢拘攣。俱用此方。 玄胡索 當歸

桂心 各等分 為末。溫酒服。三四錢。隨量頻進。以醉為度。遂痛止。蓋

玄胡索能活血化氣。第一品藥也。昔一人病此痛不可忍。服

此而效。趙侍制因導引失節。肢體拘攣。亦用此數服而愈。醫書

痞積

丹溪云。積聚癥瘕不一。積者停蓄之總名也。宜以在中在左在右

分治。凡塊乃有形之物。氣不能成形。痰與食積死血而已。在中

為痰飲。在右為食積。在左為死血。大法鹹以軟之。堅以削之。行

氣開痰為主。不拘何膏藥二張。以一張揭開。用自信末五分

摻之。小兒 再以一張貼上。將背面貼患處。以布包好。數日化為

水矣。治皮裏膜外者效尤速。如貼後腹中脹悶。乃痞積將散。服

只壳 八分 大腹皮 一錢 鹽水洗 蘇梗 八分 厚朴 二錢 青皮 一錢

葶朮 八分 山查 二錢 烏藥 六分 香附 半錢 宿砂 五分 廣木香 三分

水煎空心服三四劑自愈。或用生鷄血乘熱好酒泡滾。盡量

沖服。隨症新久多寡。自消化無形。病深多服數次。或用松香

痞積

徐愛堂

四兩水 革麻子肉二兩 皮硝五錢 共搗為膏攤布上量痞

煎于 大小攤貼加射香二厘痞消膏自落 或用大紅鳳仙花十二朵

獨郎蒜一枚 雄黃二分 同搗青布做膏騎筋貼少刻即去 一方用

南星 獨郎蒜各一枚 雷丸半丸 射香每歲一分 共搗敷單方

神功助化散 其藥夜服大小便見惡物 不可具述 扁蓄 麥芽

瞿麥穗 甘草各五錢 沉香 神曲各二錢 木香半錢 大黃二兩

男用淡竹葉甘草煎湯酒調下 女用紅花燈心當歸煎湯酒

調下忌油膩動氣之物及房事一月神効赤水

腹內龜病 詩云 人間龜病不堪言 肚裏生成硬如磚

自死姜蚕白馬尿 不過時刻軟如綿普濟方

三聖膏貼病 石灰十兩 細紅用好醋蒸成膏八大黃末一兩官桂五

錢攪勻瓦器封貯紙攤焙煖貼患處醫宗必讀

消痞 阿魏二錢 射香一分 銀硃錢 丁香五 良姜二錢

蒜頭十枚 水紅花子不拘 先將阿魏一錢大蒜紅花子三味研

作膏餘為末入膏內狗皮攤貼衛生

高金不易妙靈丹 治男婦好吃生菜茶葉布頭泥炭丸塊并酒積

甘草春夏四錢 大黃春夏六錢 黑丑取豆末 枳榔一兩 雷丸

錢共為細末每服三錢五更糖湯下天明利下積物抄本

食食一切物如茶葉壁泥粹炭 用芝麻一碟拌雄黃三分始服白

湯下三日後只吃炒芝麻半月愈 一用生樞子一斤 每日蘸砂

糖吃數十粒以盡為度或兼史君子肉四五枚 同食更妙單方

四寶丹 若吃生米用生米一斤 麥芽炒 史君子肉兩 枳榔 南星

各一兩 若吃茶葉用茶葉一斤 史君子肉 檳榔 南星 照前 若

吃黃泥用壁土一斤 餘俱照前 若吃黑炭用炭一斤 餘俱照前

共末 蜜丸 梧子大每服五十丸 清晨砂糖水下 大効 萬病

諸虫作痛 口中清涎流出湯飲 烏梅 花椒 生姜煎服 經方

追虫取積散 檳榔二錢 陳皮八分 木香五分 黑丑頭二錢

共末研勻 每服五錢 小者三錢 用砂糖湯調下 五更服 行三四

次以米湯補之 忌魚腥油膩三五日 醫方

治虻舌方 用苦棟根刮去外粗皮 取內白皮二兩 以水三碗 煮

半去渣 用晚粳米三合 煮粥 空心先以炒肉一二片吃 引虫向

上 然後進藥粥一二口 少頃又吃一二口 漸漸加一碗或二碗

其虫盡下而愈 萬病 回春

黃疸 患此症者忌食油 麵猪魚雞鵝等物

症有五者之分 終無濕熱之異 蓋濕熱積于脾胃之中 久而不散

故其土色形于面與肌膚也

黃疸 地骨皮三兩 砂仁兩 炒一 黑棗四兩 砂仁兩 藏肉 用水二碗 煎半 露

一夜五更熱服 深者三帖必効 一法用東引桃根 一把細如

明早晨勿令雞 犬婦人見切細 水一大升 煎半空心服 要時時飲清酒一盞則

眼中黃色易散 否則散遲 徐之才 家秘方

一用雞子三十六黃一醋一合 溫服 鼻中虫出為効 外臺 秘要

穀疸 食已頭眩心中拂鬱不安 苦參二兩 龍胆草碎一兩 牛胆汁

酒疸 身目俱黃 心中懊懣足脛滿 尿赤面黃赤 梔子十五

斑因醉後胃熱身卧當風水濕得之也 黃疸 梔子十五

大黃兩

淡豆豉兩

只實

水煎服

醫書

色疸

額黑身黃小腹滿急小便不利因房事後為水濕所搏而得之也

硝石

凡石

各服等分

為大麥粥汁調服二錢日進三服

豆汗

秘方

陰瘧二疸

肢冷白汗泄利便清脈沈遲者是陰黃耳鳴口淡怔忡微熱四肢無力嗜卧脈沈細寒熱洩白者是虛黃皆以

理中湯

人參

白朮

甘草

各三錢半

干姜

炮各一錢

空心煎服

蔓菁散

治陰黃汗染衣涕唾黃

蔓菁子為末平旦以井華水服一匙日再

服二匙以知為度每夜小便中浸少許帛子各書日記色漸白

則瘥不過服五升而愈醫宗必讀

黃汗

汗如梔子染衣因汗出入水滌浴所致

黃芪

赤芍

茵陳

各二兩

石羔兩

豆豉

麥冬

各一兩

甘草

炙五錢

為末

每服五錢淡姜

湯食遠服自愈

秘方集驗

頭痛諸症

附腦漏鼻症

頭乃諸陽之會症非一端大約宜分十二症治之丹溪云頭痛多

主于痰甚者火多有可吐者有可下者又若眉眶痛者屬風熱

與痰有用虛而痛者總見光明則眶痛甚有肩稜骨痛者眼不

可開晝靜夜劇屬痰頭風者經云首風之狀頭面多汗惡寒當

先風一日則病甚頭痛不可以出內至其風日則其病稍愈蓋

其人素有痰火風寒客入骨髓而然婦人多患頭風者以無巾

幘禦風寒也有偏有正有熱有風有血虛在左屬風與血虛在

右屬痰與熱頭眩者目花黑暗旋倒也其狀頭眩目閉身轉耳

聾如立舟車之上起則欲倒虛極乘寒得之故風則有汗寒則

掣痛暑則煩悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也或七情鬱而

生痰動火。隨氣上厥。此七情致虛而眩暈也。酒色過度。腎虛不能納氣歸元。使氣逆奔而上。此氣虛眩暈也。吐衄崩漏。或產後失血。脾虛不能收攝營氣。使諸血失道妄行。此血虛眩暈也。

都梁丸 昔王定國病頭風至都梁求名醫楊介治之連進三丸卽時病去因求其方 用香白芷一味洗酒爲末蜜丸如彈子大茶清或荆芥湯化下 一用明天麻

大白芷 三兩爲末蜜丸每重二錢用一丸先將荆芥半錢 煎湯細嚼藥丸下甚者不過一丸 百一選方

偏正頭風塗藥 紫荆皮 炒五兩 獨活 去節炒三兩 赤芍 炒 白芷 炒

薰頭風 天南星一錢五分 艾 錢五分 薰之 抄木 薰頭風 童便一盞入葱頭煎服陶隱居屢試方

血虛頭風 赤白首烏 各五錢 川芎 紫蘇 細辛

白芍 藁本 各五錢 甘草 一錢煎服懷德堂錄 頭風乃風寒濕痛 採單瓣白鳳仙花一瓶燒酒浸滿蒸熟去火性隨量飲出汗爲妙 單方全集

腦漏 雄猪胆 一個熬 藿香 兩 攪勻爲丸每服二錢 白湯下 單用藿香末吹鼻亦妙 一用 辛夷 二錢 羌活

獨活 防風 藁本 細辛 各五分 真艾 兩 將前藥爲末 摻艾內捲作條 點火熏鼻 卽愈 醫家抄錄

腦漏流膿 用破瓢 白雞冠花 白蠟 等分 加血竭 射香 各五分 好酒洒濕 蕞艾連藥作餅 貼頂門髮斗 熨愈爲度 單方

鼻淵 卽腦漏因風寒凝入腦戶與太陽濕熱交蒸乃成 白芷 一兩 其患鼻流涕或流黃水 點點滴滴長濕無乾 鼻風 腦漏 鼻症

蒼耳子炒 辛夷仁各二錢 薄荷五錢 為末葱茶清調服秘方集驗

又方 秦艽 酒苓 桑皮 馬兜鈴各八分

白芍錢一 滑石 石羔各二錢 只壳 蔓荆各五分 甘草三分

服四五劑即愈新都治驗

鼻痔 瓜蒂炒 甘遂炒各四錢 枯凡五分 松香五分 香油調硬

些每用一九入鼻內點痔化為臭水一日一次自爛下集驗方

酒齧鼻血熱入肺而然 當歸 苦參各四兩 酒糊為丸桐子大

食後熱茶吞八十九藥盡即愈秘方集驗

鼻中息肉 黎蘆三分 雄黃一分 蜜和日點三次勿點兩畔聖濟方

赤鼻 硫黃 皮硝等分 研如麵臨臥擦一月全愈古方

鼻塞 蓖麻子三百粒 大棗一斤 搗勻綿裹塞日易一月全愈聖濟方

目疾

目疾總論 其症七十二種治之須究其源大約紅為熱白為冷癢為風澁為毒氣之作也風則散之熱則清涼之冷則溫補之氣結則調順之不可用刀針點割偶得其愈出乎僥倖倘或不然終身之患又不宜過用涼藥恐冰其血凝而不流亦成痼疾當量人老少氣體虛實用藥又有腎虛者亦令眼目無光或生冷翳補煖下元益其腎水自愈治北方人與南方異北方之人患眼最多皆因日冒風沙夜眠火坑二氣交蒸治之多用涼藥北方人稟受原與南方人不同也治婦人又與男子異蓋其間有傷胎墜產之藥自當除去須以當歸為重可以活血其餘之藥對症而發小兒患眼又與大人異不過胎毒受孕之時過

食熱物而然。雖過百日一週。亦是胎毒。至一二歲之間。患眼者。此是好食煎炒五辛之熱物。使五臟受毒。攻冲而後發也。至如孩童之患眼。有實無虛。多熱無冷。若遇患眼之稚子。切不可藥吹點之。恐血氣未定。致傷其目。只可以敗毒散治之。如痘疹之後。毒氣鬱結于心肝二經。氣不能泄。攻發于眼目。傷瞳人者。則又素無治法也。

日疾通治 荆芥 羌活 甘草 甘菊 防風

藁本 黃芩 當歸 山梔 赤芍 白芷

乳香 沒藥 各一錢 全蠍 三個 水煎 一碗空心服 凡目疾初起

即至十餘日。急服二三劑。無不立愈。如意為增減。多不驗。秘方。眼中之起。取葶藶提碎。將水酒紙上成粉。候干。刮取點患處。古

洗眼奇方 張道人從道藏內檢來。普濟十方。不論瞽。用皮硝六錢。桑

白皮 生一兩 白水煎。每遇日期。熱洗數十次。

正月 初二 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二
二月 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二
三月 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二
四月 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二
五月 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二
六月 初七 初八 初九 初十 十一 十二
七月 初八 初九 初十 十一 十二
八月 初九 初十 十一 十二
九月 初十 十一 十二
十月 十一 十二
十一月 十二
十二月 十三

光明也。其方千金不易。屢試屢驗。出道。

羊肝丸 治男女肝經不足。風熱上攻。頭目昏暗。羞明及障翳青盲等症。黃連一兩 羊子肝一具

去搗爛。同連末為丸。梧子大。每食後。煖漿水吞十四丸。連作五劑。瘡昔崔承元活一死囚。囚後病死。崔患內障。逾年。半夜獨

坐。聞塔除悉窣之聲。問之。答曰。是昔蒙活之囚。今特報恩。遂告

此方崔服之。不數日。眼復明。劉禹錫傳信方。

眼目障翳 好焰硝 一兩 銅化 黃丹 飛 片腦 各二 銅匙急抄

經念直方 目疾 三三 余受堂

入罐內收之。每點少許。其効如神。克州朱秀才忽不見物。朝夕禮天。夢神傳此方。張三寺仙方

眼藥 京師方好眼藥。能治七十二眼疾。冰片熊胆各一分。潔淨

加工研極細。清晨點上。如觀星。若還低頭。藥不靈。十年瞽目無所見。一點重開顯光明。孫真人海上歌

七十二種眼疾 羊胆一枚。割開入蜂蜜一錢。線紫兩手擦勻。白

水煮一滾。即取出。涼水浸半日。去生水。傾出內汁。點之。秘方集驗

明目散 薄荷甘草共天麻。荆芥防風甘菊花。當歸連喬枸

杞子。川芎白芷蜜蒙花。等分各研為細末。每服三錢。只

用茶。勸君每日進一服。瞳人咫尺見天涯。萬病回春刊施

昏花 用童便煎菊花。洗數次。即好。願濟堂刊施

取下翳膜 麩仁二兩 去油入 蓬砂錢一 射香分二 研勻收之

去翳妙不可言。本草

赤腫 胡黃連浸人乳點之。小兒則塗足心。古方

暴發腫痛 先將青布一塊。水浸洗令乾。另用生姜汁白凡末。將

布蘸擦眼胞上。閉目少頃。淚出痛止。秘方集驗

明目補腎 兼治筋骨疼痛 小紅葱十二個。冷水洗淨去蒂。甘州枸杞子三錢 小馬

料豆四錢 水二碗。煎半。早晨空心連湯共食之。若常明目 枸

杞子三錢 菊花七朵。去蒂。每早白湯下。久服。青育可以復明。秘方集驗

青育 雄鼠胆 鼠胆最小畧驚惶便碎矣 鯉魚胆各二枚 和勻滴之。立效。聖惠方

肝虛雀目 黃蠟不拘多少。溶汁取出。入蛤粉相和。得所。每用刀切下二錢。以猪肝二兩。剖開。摻藥在內。麻繩扎定。水一碗。入銚

子內煮熟乘熱熏眼至溫并肝食之日二以平安為度效集驗方

小兒雀目 羯羊肝一具不用洗竹刀剖開入谷精草一撮瓦礫

煮熟日食之屢驗忌鐵器衛生家寶

天絲入口 石菖蒲搥碎左目塞右鼻右目塞左鼻百發百中或

用木梳垢為小丸放眼角邊即出危氏得效方

烟渣入目 小兒及好吃烟者誤犯如將別湯洗目愈洗愈疼必

至眼瞎而後止須用亂頭髮或綜纒緩緩擦之即愈見抄本抄錄

沙塵入目 取活螻蛄一枚持其斧于眼上影之即出徐氏抄錄

麥芒入目 煮大麥汁洗之即出單方全集

打傷眼睛如突出急擦進用生猪肉一片將當歸赤石脂末少摻肉上貼

之去毒血愈單方集驗

耳疾

耳聾 一荳三斑不去油射香水片共同投葱蜜為丸夾子大絮

綿包裹耳中留三日之後黃水出不痛不痒不須憂若是此方

無應驗罰做人間馬與牛 一月上好新鐵片三塊咬口內用

好磁石塞兩耳靜坐其耳忽鳴而通有頃刻通者有坐數日通

者秘方集驗

蝸牛膏滴耳蝸牛兩 石胆 鍾乳粉各二錢 瓮盆盛末火煨赤

入片腦子一字每以油調一字滴耳中無不愈者聖惠方

耳後銳毒危症也宜急治男女小兒俱効 大天南星兩 存性為末醋塗三次

即愈 一用大黃兩青末香錢三姜黃 楨榔錢三共末蜜調

貼中留一孔效 昔一人右耳後生一毒腫痛寒熱生生子用

耳疾

金銀花。歸尾。赤芍。蓮召。姜蚕。大力子。元參。兩劑而愈。新都醫案

治耳虛鳴。射香少。全蝎十四。薄荷十四。葉麥射。研末滴水捏

作錠子塞耳內極効。一用巴豆。舊蒲同。松脂

黃占和條納。抽之。神效。綱目

耳忽大痛。如虫走或流血或干痛。蛇蛻燒灰。吹入立止。醫書

千金不換停耳丹。耳膿不干。水龍骨錢一。礪砂分五。為末吹入耳門。連用

綿塞之二服斷除。秘方

百虫入耳。胆凡和醋灌入即出。鱧頭燒研。綿裹塞之亦出。李時珍方

壁虱入耳。稻稈灰煎汁灌入即死。垂水而出。江湖紀聞

耳痺。龍骨。射香。輕粉。枯凡等末。吹入耳即愈。

牙疼牙疳 附烏鬚固齒方

牙疼者乃屬陽明胃經也。風熱上侵則有所感而舉之。有熱有寒。有虫有濕熱皆能作痛。

牙疼症甚事多。没有效方。急奈何。蟾酥射香五靈脂。每味一分。研為末。千金一笑散。用一分絹片包上。線扎緊。咬在患處。低着頭。

五般牙疼包除根。海上仙方

一用粗碗一隻。川椒鋪底。樟腦蓋面。覆碗一隻于上。鹽泥封固。慢火煨一夜。次早研細。每用一厘擦牙根。立愈。秘方

一用五倍子一枚。稍開一孔。用鹽填滿。炭火中燒紅。存性。畧出火氣。研末以指擦牙。漱津片時吐出。數次即止。單方

取痛齒法。白馬尾燒灰。存性。點上即落。但不可輕點。恐好齒沾着亦

落。一用白龍骨三錢臨用大蒜一瓣搗爛入奉一二分拌勻。

貼痛處半枝香時即下。馬方

走馬牙疳 五倍子 青黛 枯凡等分先以盥水漱淨搽之。

立效。一用銅青 滑石 杏仁等分擦之即愈。即真方

牙蝕透骨穿腮 生南星一個入雄黃一塊麝香一錢候雄黃作汁。

以盃合定出火毒去麪為末入射香少許拂瘡數日甚效。經方

齒血 三製大黃末二錢用只壳湯加童便調下即止。醫方

固齒烏鬚 猪牙皂角及生姜 西國升麻與大黃 水律旱蓮

槐角子 細辛荷蒂用相當 青鹽等分同燒燬 研細將來

用最良 牢牙固齒烏鬚 誰知世上有仙方 若去白鬚

用雞舌香雄為丁香 雌為雞舌 姜汁塗按去白鬚即生黑者奇效。論

咽喉諸症 附口舌諸症

咽喉腫痛者。或喉痛生瘡者。或閉塞者。或紅腫結核脹灼者。或喉

閉不能言語。俱是風熱痰火。用清涼散加減。或喉閉急症。急刺

少商穴。在大指甲外側。用三稜針放出毒血。併豁吐痰涎為要。

喉閉先兩日胸膈氣緊。出氣短促。甚然 速用雞毛或鷄翎蘸桐油

喉間攪擦。吐痰立開。或用山豆根啣汁嚥之。亦開。切忌牛黃入

口不救。如無藥。如有藥不進者。急將兩臂以手勒數十次。取

油髮繩紮大拇指。以針刺指甲邊。即少血滴下 其喉即解。男左

女右。重者兩手齊針。集方

急鎖喉風兼治雙蛾 用升麻四兩剉碎。水四碗煎一碗。灌服。或用皂

莢搥碎。搗水灌服。取吐。即不吐亦安。或不周此方。將巴豆去殼

綿紙微裹。隨左右塞鼻孔中立通。或白凡錢三慢火熬化。人巴
豆肉二粒研爛候乾。去巴豆取凡研末。用少許入喉中取頑痰
出立愈。一用胆礬一塊含口中。其痰涎自壅上吐盡即愈。單方

集總

急喉痺

其聲如鼾。有如痰在喉中响者。此為肺絕之候。

速宜人參膏救之。用竹茹姜汁調

下。獨參湯亦可。若服之早者十全七八。次則十全三四。遲則十

不救一也。

赤水玄珠

纏喉風

纏喉風者。熱結于喉。腫達于外。且麻且癢也。

用牽牛鼻繩燒灰吹之。甚効。李時珍方

一用淡白梅

一個

將蜒蚰一條。歛在梅內含之。即瘥。

一用白姜蚕

錢二。研細。生姜自然汁少許和水灌下立愈。一用萬年青根頭

切碎。打爛絞汁灌下。吐出痰即好。倘口閉。用牙刷搨開灌下。如

不吐。再用髮稍進喉間。吐出即愈。經驗方

雙蛾

單蛾者。其形圓如筋頭。生于咽喉上。或左或右。雙蛾則兩邊俱生也。若生于咽下為難治。

壁上蜘蛛白

窠。用患人腦後髮一根。纏定蜘蛛窠。將銀簪刺在燈上燒之。存

性為末。吹喉立效。各俱載

喉癰。頭胎黃牛屎。以新瓦洗淨。蓋屎周圍用文武火煨烟盡。存

性取出研末。將蘆管徐徐吸入。自愈。一方。冰片

牛黃各一分胆凡三分大礬砂八分山豆根二錢雄黃見茶各八分

陳白梅去核三個共研末。次將白梅搗爛。入藥和勻。丸如龍眼大。臨

卧含口內。過夜即消。秘方集驗

閉塞不通。臘月初一日取猪胆不拘大小五六枚用黃連青黛

薄荷 姜蚕 白凡 朴硝各五錢裝入胆內。青昏包好。

將地掘一孔。方深一尺。以竹橫懸此胆在內。以物蓋定。候至立春。日取出。待風吹去胆皮青蒂。研末。蜜收。痛吹少許。神驗。此萬金不傳之方。邵真人經驗方

百靈丸 治喉中結塊不通水食者 百草霜蜜和丸。芥子大。水化一丸灌下。甚者不過二丸。簡便方

吹喉藥 硼砂二錢 雄黃三錢 兒茶一錢 冰片三分 薄荷三兩

極細末 共研細末。和入薄荷末。研勻。貯罐。不可泄氣。用蘆管吹入少許。或用茶匙挑入舌上。噙一會。嚥下。日八九次。若鎖喉。風口內乾枯者。以井水調灌。即能開閉。生津。若脾泄胃弱者。不宜多用。餘無禁忌。秘方集驗

喉爛 槐花三錢 牛膝 兒茶 黃連各一錢 共末。夏天

西瓜水服。冬天生梨汁服。丸如菉豆大。每服三丸。秘方錄

咽喉懸癰 舌腫塞痛 五倍子 姜蚕 甘草 等分為末。以

白梅去核。搗丸如彈子大。噙其癰。自破。外科秘方

咽生息肉 先刺出血。豆豉同鹽塗之。神效。秘方

咽喉諸藥不効 丹溪云。此非喉症。乃是鼻中生一條紅線。如髮

懸一黑泡。大如櫻珠。垂挂到咽門而止。口中飲食不入。用土牛

膝根。獨條肥大者。搗碎入好醋三五滴。同打細滴入鼻中。二三

點。即系斷珠。破。吐出瘀血。立安。赤水

骨硬喉歌 縮砂草果威靈仙 清水砂糖共配煎 接連服下

二三碗 諸般骨硬化為涎。古仙方

口疳 紅莖十枚 燒存性加 梅花冰片二分 吹患處立愈 一用

喉症 口舌諸症

縮砂殼煨研。擦之即愈。一用雞肫黃皮燒灰敷亦立効。活切新書

口唇燥裂。用橄欖泡湯服。核中仁研爛敷患處。或胭脂敷立効。

口破兼治牙疳。俱禁水漱。滑石一錢。辰砂三錢。冰片二分。

研末摻患處。集驗方。玄精石二兩。牛黃。硃砂。龍腦各一分。

重舌涎出不入。水漿。為末以針刺舌上去血。鹽湯漱。摻末嚥津。効驗如神。聖惠方

木舌口舌俱硬有衣不能開。薄荷。細茶。共煎。露一夜。青絹裹筋。

上。蘇藥徐徐抹上。愈。秘方

重舌木舌紫舌。大人小兒皆由心火結成。黃連。山支。荆芥。

黃芩。連喬。木通。薄荷各一錢。牛旁一錢。甘草五分。煎服。

舌腫滿口。單用蒲黃末摻之。愈。青蒲徐氏抄本

瘰癧

瘰多著于肩頂。瘰則隨氣凝結。此等年數遠。侵大侵長。堅硬不可

移者。名曰石瘰。皮色不變者。名曰肉瘰。筋脈露結者。名曰筋瘰。

赤脉交結者。名曰血瘰。隨憂愁消長者。名曰氣瘰。五瘰皆不可

決破。決破則濃血崩潰。多致大枉。難治。瘰則有六種。骨瘰。脂瘰。

肉瘰。膿瘰。血瘰。筋瘰。亦不可決破。決破則亦難治。肉瘰尤不可

治。治則殺人。惟脂瘰破而去其脂粉則愈。

贅癭焦法。甘草煎膏。筆梳瘰之四圍。上三次。乃用芫花大戟甘

遂等分。為末。醋調。別以筆梳其中。勿近甘草。次日縮小。又以甘

草梳小量三次。如前仍上。此自然焦縮。危氏得効方

腋下瘰癧。用長柄茶壺蓋燒灰。研末擦之。出水消盡而愈。瀕湖集驗

瘰癧

瘰癧

瘦疾 萬州黃藥子

半斤須除重者如虛輕即是龜州出力慢加倍

取好酒一斗入藥封

瓶口以糠火煨一週時待酒冷時時飲一杯不令絕酒氣三五

日後常把鏡自照覺消即停飲勿服其效如神燒酒時聞香氣

外出瓶口有津即止火不可太猛千金月令方

點瘦

桑炭灰

棗木灰

黃荆灰

桐壳灰

各二升

蕎麥灰炒

右以沸湯淋汁五碗許入斑毛

四十

川山甲

五

乳香

不拘多少

後入煎作二碗以磁器盛之臨用時入新

石灰調膏敷乾則清水潤之神効赤水

此方治一切瘡毒... 凡患疔氣者楊梅不可與... 燒酒同食食則即時果發無不解救

疔氣

附便毒 凡患疔氣者楊梅不可與 燒酒同食食則即時果發無不解救

七疔亦各不同治亦有別如寒疔囊冷結硬如石陰莖不舉或控

舉丸痛得于坐卧濕地洗水以去濕之劑下之水疔囊腫如水

晶陰汗痒搔出黃水或小腹按之作聲得于醉酒行房汗出遇

風寒濕結囊中以逐水之劑下之筋疔陰莖腫脹或潰或濃或

痛裏急筋縮或莖痛痛極則癢或挺出不收白物如精隨溺出

得于房中邪術所使宜降心火之劑下之血疔狀如黃瓜在小

腹兩旁橫骨兩端俗名便癰得之重感春夏大煥勞于使內其

氣流溢滲入脬囊結為癰腫以和血藥下之氣疔上連腎區下

及陰囊或號哭忿怒氣鬱而脹以散氣藥下之狐疔狀如瓦卧

則入腹行則出上下無定如狐之惑也故名之以逐氣流經之

劑下之。癩疔陰囊腫大如升斗不癢不痛。因受濕氣而生。宜去濕之劑下之。

疝氣者。疝本肝經。宜通勿寒。絕與腎經無干。或無形無聲。或有形如瓜。有聲似蛙。是疝病也。治初濕熱在經。鬱久後感寒氣。外束不得踈散。所以作痛。不可執作寒論。須用寒熱相兼用神效湯加減。川烏以散寒氣。山梔以清濕熱。皆是下焦主藥。其效甚速。

木痛即木腎。凡人心火下降。則腎水不患其不溫。真陽下行。則腎氣不患其不和。溫且和。安有所謂木強者哉。木強則傷腎矣。故不可純用燥藥。當行溫。和散。利以逐其邪。則邪自消。榮衛流轉。則愈。宜服枸杞丸。

南星 半夏 白芷 查肉 炒神麴
枸杞 昆布 吳茱萸
各三兩 各四兩 各四兩

滑石炒 蒼朮炒 黃柏酒炒 各三兩 為末酒和丸如梧子大每服七十九空心鹽湯下方

二層茴香丸治一切疝如疝疝尤為要 第一料 大茴香拌鹽五錢炒和鹽秤

沙參 川練子去核 木香各一兩 右為末水煮米糊為丸梧子大每服二錢空心鹽湯下日三服纔完便接第二料照前方加 葶撥兩 枳殼五錢 為丸服若未愈服第三料照前方加 白茯苓兩 附子製一兩 和丸服但每服三錢雖三十年之久大如栲栳者皆可附根醫宗必讀

治疝仙方 小茴 大茴各一兩 猪尿胞一具 入藥扎緊砂罐內酒煮爛連胞搗丸梧子大白湯下五十九筆峯雜與

血疝便毒已未成 斑毛三個 滑石二錢 分三服空心下一服疝氣便毒

毒從小便出如痛用車前

木通

澤泄

猪苓煎服

東垣方

斑白散

治便毒 斑毛 炒一錢

白芷

八分 為末每服六分空心酒下即時

見効 一用

大蝦蟆

一個剝皮 連腸搗爛

入葱

五根 再搗敷却

用皮覆貼其上 一方

乳香

沒藥

各錢半 姜蚕二錢

全蝎

洗淨蜈蚣 錢 斑毛 去羽 足

甲皮

炒

巴豆 去油各四錢 共末重

者酒服一錢輕者六分二次即效

廣瘡魚口橫痃

土茯苓

米泔水洗搥碎忌鉄器 白者佳紅色者能殺人

粉霜以硝皂凡

明凡水銀各二錢銀確合好塩泥封固放爐內文武火昇之一

症止用六厘黃米飲為丸切作七服每服或二粒五粒雄黃為

衣空心酒下忌房事一切毒物大小便不可令人聞 秘方 集驗

保嬰經驗方

保嬰論

嬰兒性命關係全賴初生時乳母保護得宜一失其則生死頃刻醫莫措手容可忽乎即如後患驚疳疔疔等症亦莫不由調養失節所致及至臨病驚惶醫藥無効而父母終不知其病之由來誠可歎也今 峻 窓下徧集古仙聖所錄保嬰要訣畧纂一二刊刻濟世惟冀為人父者嘗於閑時講求使乳母稔知一一如法保攝免致兒患驚虞其間所遇不測雖有天數而保之得宜庶幾慈幼一道不無少補焉爾

保嬰經驗方

回氣法 小兒初生氣欲絕不能啼者必是臨產或冒寒所致急

以綿裹抱懷中未可斷臍將臍帶且置炭火上烘之仍作大紙條醮芝麻油點着于臍帶上往來遍燎之使火氣入臍內則臍中溫暖更用熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可洗浴

斷臍切記

一方用石菖蒲搗生汁入口即活

赤水 立珠

初生不啼看是肛門為脂皮所塞用簪通開

保生 碎事

初生下地即不啼哭不能吞乳奄奄如死者急看喉間懸癭前脣

上有一泡用指摘破以帛拭去惡血勿令噤下即能通聲吞乳

殊密法

初生時先用甘草

二錢 黃連 五分

煎汁拭口吐其惡汁

稍定更與殊密安神定鬼其法用好殊砂一大豆許細研水飛過煉蜜一蜆殼許和殊砂成膏旋抹口中非獨鎮心安神亦解惡毒若面色青白啼聲不響即不須服

葛氏方

拭口法

嬰兒在胎口有熱物蓋胎毒也生下啼聲未出急用軟帛或綿裹指拭盡貴在神速遲則嚙下伏之于心遇天行時氣

久熱乘心心得熱而散流溢于胃胃主肌肉發出于外成瘡疹之毒世之小兒無可免者不知病源在此若依此法庶可免矣

斷臍法

見出胎洗後方斷臍帶則不傷水生癩斷臍須將汁令

盡否則寒濕入腹或作臍風又須于近臍四五寸處以綿絮緊以帛包裹以口咬斷若絮緊則兒血不貫于胞衣自然痿縮弗脹而易下即或延緩數日亦無大害口咬則斷臍不犯乎刀剪自無冷氣內侵可免腹中疝痛之虞如或天時寒冷難產母子勞傷者先紮臍帶以油紙撚點火燒斷令煖氣入兒腹中此又為回生起死之妙法近用蘄艾炙臍亦為所留臍帶不可太長

太長則難乾而傷肌且恐引外風為臍風亦不可太短太短則逼內而傷臟或致成腹痛而夜啼只以見之足掌為度產家要訣

繆仲淳云見初生不可剪臍帶三朝用麩和水成薄餅置兒腹穿

臍帶于麩上將艾火灸臍帶近臍處或三五炷須下帳避風灸

畢仍將臍帶紮好聽其自落至七日方脫者元氣足也廣筆

凡兒生下每日夜將清湯或苦茶蘸軟絹攪兒口內如齒邊有白

點即指爪或細針挑破取桑樹內汁濾清塗之永無驚風撮

口之患慈幼外編

裹臍法 裹臍須令白練搽軟方四寸初綿厚半寸與帛等合之

緩急得中急則令兒吐不可輕解解時閉戶下帳冬間用火令

帳內溫煖仍以溫粉敷之若臍不乾或用枯凡五錢龍骨黃丹各

錢射香少許為末敷之亂髮燒灰敷之亦可或黃柏末敷妙千金論

臍風 張煥論云小兒斷臍後宜用厚帛裹護若乳母不慎或因

浴水入或兒尿棚中未換濕氣所侵或當風解視七日内遂有

此疾令兒臍腫多啼面赤喘急不能乳哺即成臍風用艾燒灰

填臍中愈簡中方

撮口 撮口之症必先大便熱須用生犀角及真羚羊角磨和蜜

汁飲之有效急則用大黃甘草各二錢煎服繆仲淳方

初生七日内面赤喘急啼聲不出即名撮口臍風看齒齲上有小

泡如粟米狀急以溫水蘸青軟帛裹指擦破即愈 方用白殭

蚕四枚炒為末蜜調敷唇內即好保生碎事

白膜裹舌 兒生白膜裹舌刮出血以白凡少許敷之否則發驚

若初生百日內口中生白點無數拭之則去少刻復有口角流涎日夜啼哭不乳又名鵝口白屑皆由胎熱或母貪嗜酒麪遺熱于兒用甘草黃連各一錢煎濃以帛裹手指口中拭去再不復發又法用黃丹為細末竹瀝調塗口中洗之其白點即落一日洗三次再以辰砂益元散燈心湯調下神效赤水

浴兒法 第三朝洗兒用五枝湯極妙五枝湯者桑槐榆柳桃

是也各取嫩細枝二三十節煎湯看冷熱入猪胆汁洗之週歲

內可免瘡疥毒又可避惡邪赤水

初生血皮赤色有紅筋因受胎未足也早白糯米粉撲之肌膚自生聖濟方

初生鑽肚由胎下熱毒結于肚門生下遂致閉塞急令婦人溫湯漱淨口吸嘔兒之

前後心手足心并臍心共七處每處吸嘔五七口以輕粉五分

蜜少許溫水化開時時與少許以通為度全幼心鑑

不尿亦由胎熱大葱白切四片用乳汁半盞同煎片時分四服即通不

飲乳者即飲乳若臍四圍有青黑色及口撮者不可救也

用母羊角燒存性酒下立効保生碎事

不乳 新產小兒或剪刀股裏繫吃乳不下用獨郎大蒜切薄片

放在兩腮以艾灸之如哭即好不哭無救懷德堂抄本

吐乳 白蔻 砂仁各十粒生炙甘草各二錢為末常摻入兒口中即

止 若直出不停留者炒麥芽三錢吉紅一錢丁香三分水煎服立止

危氏得效方

乳兒法 凡乳兒不可過飽滿而溢則成嘔吐太飽以空乳吮之

即消初乳須常捏去宿乳夏天不去熱乳令兒嘔逆冬天不去

冷乳令兒咳痢。母與兒臥以臂枕之。令乳與頭平。則兒不噎。母欲寐即奪其乳。恐睡熟則不知飽足而成嘔吐也。母有娠乳兒必患胎黃。母大醉乳兒必患驚熱。母傷飽乳兒必患喘急。母新房乳兒必患汁瘦。母大怒乳兒必患癩狂。母新吐乳兒必患虛瀉。夏天盛熱時。乳母浴後即與兒乳。使兒熱毒成痢。必須熟揉良久。方可乳兒。經 顯 顯

哺兒方 乳者妳也。哺者食也。乳後不得與食。哺後不後與乳。乳食相併。難以克化。大則成癖。小則成積。疳氣自此始矣。或云小兒無傷乳法。即乳滿而溢為害尚淺。惟與食相併。則乳裹食不化。遂結成痰癖。是傷食非傷乳也。故小兒以乳為主。三歲後方可食糕粥。五歲外方可食葷腥。則一生永無脾胃之疾。而孫

真人葛氏巢氏聖濟經皆云三日即當用哺以助殺神導腸胃。

是在為母者細審兒之虛實而調劑之。濟陰慈 幼外編

月內胎驚 母猪乳同朱砂牛乳少許抹口甚效。本草 發明

夜啼 用蟬脫下半截為末一分薄荷湯入酒調下立止。普濟方

目啼不止 用牛黃辰砂飛各五厘塗兒舌上立止。保生 碎事

護兒法 小兒始生肌膚未實春夏秋宜單衣不宜煖衣煖則筋骨緩弱易發瘡瘍宜舊絮不宜新綿新則汗出表虛易受寒邪。

宜見地氣尤宜見風日不見地氣風日則肌膚柔軟易得損傷。

嘗見富貴之家重裯疊被日在懷抱中雖數歲亦未能行時受

災病而田舍小兒終日暴露或饑或寒絕無他病亦可知愛兒

之不在姑息矣。巢氏 病源

保嬰經 卷之五

初生小兒不得用油膩手棚裹春忌覆頭裹足夏忌飲冷食水冬忌火炙衣被至於飲食小兒腸胃脆窄若稠粘乾硬酸鹹辛辣一切魚肉水菓濕麵燒炙煨炒煎燂俱是發熱難化之物皆宜禁絕婦人無知畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及語云惜見須惜食記之小兒精要

養子真訣云兒喫熱莫吃冷吃軟莫吃硬吃少莫吃多真妙法也

今小兒睡切忌乳母鼻風吹兒顛門成風疾須避自己口鼻息氣

哺兒法 兒生三日應開腹助穀神壯胃氣用粟米煮熟研如乳

汁與兒大豆許慎不可與雜藥厨後方

養子真訣云乳子須調護看承莫縱馳乳多終損胃食舊即傷脾

衾厚非為益衣單政所宜無風頻見日寒暑順天時

小兒雜症

清上散 治小兒胎熱眼腫赤壯熱啼哭及身上紅腫或頭項瘡癩耳出濃汁此方神效

鬱金 甘草 桔梗 花粉 干葛 薄荷葉各

分 為末白湯下五分或一錢仍用艾葉煎湯浸足底引熱下行

赤水 玄珠

仙傳方 治小兒風熱外腎嫩赤腫痛日夜啼哭不數日退皮如雞卵殼狀 用老杉木燒灰入膩粉

清油調敷神效萬病回春

痰喘 巴豆一粒杵爛綿裹塞鼻男左女右痰即下驗過龔氏醫鑑

齁喘 活鮑魚七個以器盛之令兒自便尿養之待紅煨熟食甚

效 一女年十歲用此永不發也集簡方

失音不語 蝦蟆膽點舌尖上立効單方 經驗

舌瘡飲乳不得白凡和雞子置醋中塗兒足底二七日愈

牙疳 用人中白研末擦之立効錢氏方

犀角解毒飲治赤丹紅腫遊走

荆芥穗 防風 黃芩各一錢 犀角剉末 甘草各五分 牛旁子微炒

錢四水煎時服神効 一用灶心土多少雞子清調敷立愈 一

用船底青苔為末調敷

丹瘤 草麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗甚效修真秘旨

盤腸氣痛 乳香 沒藥等分為末木香磨水煎沸調一服効

臍內潰爛出水不止赤石脂研末敷上立愈張綱如屢驗方

陰癩腫大不消 礪砂一分水研塗之大有効

脫肛因久患瀉痢所致宜用葱湯熏洗令軟送上或以五倍子末敷而頻

托入或煎湯洗亦可或以蠶頭燒存性香油調敷

受寒吐瀉不早治成慢驚風 小丁香 陳皮等分水煎服立愈

一用鮮蚌肉一隻敷肛門上立刻縮上張綱如經驗方

中惡卒死 雄黃水飛研末同桃樹枝煎湯調灌立生單方全集

瘧疾 硃砂五分 砒霜一大豆 代赭石五塊 醋煨 用紙包七重打濕

煨乾入射少許為末香油調一分塗鼻尖上及眉心四肢神効

青黃散消瘧母如神 青黛澄去灰土 雄黃飛等分 為末每歲一分空心

及夜淡醋湯調下塊消其八即止屢試屢効亦水玄珠

受暑小兒夏天受暑吐瀉死去採背陰側柏葉如手掌六三枝入井水三盞搗

以絹絞汁新蜜三茶匙和勻灌之即活經驗方

禿瘡 鴿子屎新瓦焙末存性 蘇油調搽三次即愈菜油亦可如瘡磨堆

小兒雜症 餘髮

起先用清米泔水同葱川椒煎湯洗去再搽無不驗者

一方用瀝青二兩黃蠟一兩銅絲一錢麻油一兩火熬膏攤貼

梅瘡起于口內土茯苓末乳汁調服月餘愈外科

耳邊腮腫延及身膚五倍子濕昏包一個研末雞子白調糊遍敷立消

熱瘡雞子煮熟去白取黃亂髮如雞子大相和于鉄銚中炭

火熬之初甚乾少頃即髮焦乃有液出旋取置碗中以液盡為

度取塗瘡上即以苦參末敷之如神劉禹錫傳信方

黃金餅治小兒好乾黃土為末濃煎黃連汁和成餅服立愈

一方菜花炒紅棗去皮飯上蒸熟和勻濕昏包煨研末每服五分

酒下驗過有效如面黃加茵陳同上藥打末為丸每服三四

十九淡湯送下好食茶葉生米及布等物皆治

小兒初生七日若有臍風肚腹必自發出青筋一道行至肚却生

兩盆待行至心不治必詳視其青筋初起速照青筋頭上灸三

壯或行至兩盆處亦照兩盆頭盡處各灸三壯青筋自消必活

竹衣乖并無皮膿血淋漓瘡及胎中遺毒患赤剝楊梅瘡胎皆然者

白蘆甘石煨過入黃連汁內三黃柏猪胆塗灸七次七錢

紫甘蔗皮燒灰存性兒茶五錢菜豆粉七錢水片五分

赤石脂煨五錢共為末先用麻油入雞蛋黃煎黑去黃候冷調搽

即愈內服九藥真西黃三雄黃各乳香

沒藥各五分射香一分山茨菰一錢為末蜜丸重金銀花湯每日

調服一九取愈

毒瘡凡小兒百日內生瘡名曰毒瘡由胎毒所致從身漸延至頭齊眉癩遍則愈若從頭漸至腹者難治內服犀角丸

牛黃 犀角 羚羊角 全蝎洗酒 羌活 防風

羌活 天麻 麻黃 膽星 天竺黃 黃連

京墨煨微烟 以上各等分爲細末蒸餅打糊爲丸芡實大硃砂

金箔爲衣每服一九薄荷湯下

走馬牙疳初起者

兒茶一兩 黃柏 薄荷 青黛各末六錢 人中白溺壺內者佳煨紅二兩

冰片五分 研極細先用溫湯漱淨吹藥疔上日服六七次吹藥從

涎從外流爲吉涎毒內收爲凶內服 蘆薈 銀柴胡

胡黃連 川連 牛旁 元參 吉更 山梔

石羔 薄荷 甘草 升麻 羚羊角各五分 淡竹葉

十片煎六分食後服此方雖穿腮破唇並治神効

小兒驚風

急驚風症牙關緊急壯熱涎潮搐搦竄視二便或閉是也慢驚風症因病後吐瀉脾胃虛損肢體逆冷手足痠癢昏睡露睛是也如或不識宜將見手指重捻一指覺痛而哭者急驚易治若不哭慢驚無救

鎮驚散小兒胎驚 朱砂水飛五分 牛黃五厘 麝少許 猪乳汁調稀服

急慢驚風 歌云 一半丹砂一半雪粉 其功全在青蒿節

任他死去亦還魂 服時須用生人乳乳母 秋末取青蒿節根

內虫爲丸如菜豆大每歲服一粒每方

又方歌云 一錢硃砂七分雪粉 七箇姜蚕三箇蠟全蝎俱去頭足焙末 不

拘急慢與驚風 調服親娘蜜與血乳 兒小者分作三服下

千金散治一切痰喘 全蝎炙 姜蚕各三分 牛黃六厘 冰片一分

朱砂 黃連 天麻各四分 膽星三分 甘草二分 爲末 一分

薄荷燈心金銀煎湯時下

驚風初起 天花粉 茯神 遠志 南星 半夏

天麻 鈎藤鈎 粉草各一錢 水煎服立愈

神效散 引眼撮口 搖擲不定 土硫醋煨十數次細研水飛每服一錢真金煎

湯調下連進三服見脚脛上有赤斑即愈無者不治

神仙一粒金丹 天竹黃二錢 射香 牛黃各四分 雄黃一錢 胆星

四錢 琥珀六分 姜蚕一錢 右為末甘草鈎藤鈎煮湯煎膏為丸珠

砂一錢為衣外又金箔為衣每服一丸海上方

驚風啼哭 燈心裝青竹筒中拷實乾泥塞口糯糠內煨一夜取

出悶隱存性每服三五分煎薄荷湯下神効妙不可言

驚後瞳斜 阿膠米炒 人參各錢 小一盞煎七分日再服愈

驚癩 不知人事 嚼舌仰目者 犀角濃磨水服之古効為末服亦可廣利方

痘症 附麻疹

喫臍帶法 臍帶落下拍去礬新瓦上炙脆烟止為度研末加飛

過辰砂半分 拌勻放地上退火氣用甘草一錢 煎濃去渣煎成膏諒

帶多少調勻搽兒上虧及乳頭上須一日服完解下紅黑糞則

胎毒盡而痘稀矣如遇有梅蕊時用一錢全煎膏更妙諸書俱載

初生解毒 江西豆豉 即淡豆豉 或陳大者七粒 甘草三分 水一小盞飯鍋上頓

小兒未乳之先先以此藥頻挑與食然後飲乳則胎毒消化痘

自稀或竟不出屢試屢驗不可忽之成山印尚傳

稀痘方 赤豆 黑豆 菜豆各兩 研末入新竹筒中削皮留節

鑿孔入藥杉木塞緊用蠟封固臘月浸劑中一月取出風乾每

藥一兩配梅花片三錢每服一錢霜後絲瓜藤絲煎湯下稀痘

神効 朱禹功 仙方

保嬰靈丹 真劈砂一錢 射香分半 草麻子三十六粒擇肥者去衣殼 右藥或

午節或七夕或重九打成膏分作七三股塗小兒頭頂心兩手

心兩足心兩臂灣兩腿灣兩脇肋前後心共十三穴塗如象棋

大不可使藥有餘亦不可洗去聽其自落塗過多次可免出痘

萃書 俱載

浴兒免痘 除夕黃昏時用大黑魚一尾小者二三尾煮湯密室

烘煖浴兒遍身七竅俱到不可嫌腥以水洗去若不信只留一

手足不洗遇出痘時則未洗處偏多也此異人所傳方也醫方摘要

萬金丹 春秋二分兒服一丸毒從大便而出痘必稀少慎勿加減以取不効

茜草根 括蕒根 鼠粘子炒 天麻 連翹各一兩 當歸

芍藥 川芎各七分 升麻 麻黃根各兩半 切片用水五升煎

半去渣入銀器內頭成膏入煉蜜少許調勻再入後藥

朱砂五分飛 冰片 雄黃飛各五分 射香七分 全蝎十四個 蝦蟆灰一分

半為末和分作十九丸以蠟封之如彈子大臨時用猪心血或兔

血調勻熱酒調下 萬病回春

復生丸 治痘瘡不起紫黑陷伏并初作已發未發服之其毒即解五日以前可服其效如神

白芍 西芎 升麻 葛根 甘草各五錢 辰砂一兩二錢

嫩紫草茸兩 右為末蜜丸如彈子大每服一九冰雪兩三水送

下如無三水河水亦可或糯米湯入酒一匙送下亦可 大梁鍾雲山傳

痘疔 用甘櫪滓晒乾真香油點燈燒成灰以津液調勻銀簪挑

破點上立效 一方加珍珠末油胭脂調搽更效 經驗單方

痘症

七

錄愛堂

痘入眼 防風 谷精草 白茯苓去刺等分為末每日食

後服二錢五分米泔水調下

黑麝 用猪第二番血清水半盃酒半盃和勻入龍腦一分温服

良久利下瘀血一二行痘即紅活此方屢驗總論

痘潰難靨 用牆上多年爛茅草白茅草尤妙洗焙為末搽之取其性

寒解毒又多受霜雪能燥濕也水痘變瘡搽之亦效陳文

痘毒 鵝肉蒸熟淡喫其毒自消 若潰爛不愈剝泥蛤蚧皮貼

上即愈屢驗 又仙方 大蚌一只取肉用黃泥四圍封固火煨至紅色取蚌肉

存性研末油調敷立愈張綱如 雄黃 牛糞燒灰為末每錢加冰片二分研細

痘疔 痘後餘毒 人參 白茯苓 金銀花 犀角各三錢 甘草一錢

羚羊角一錢 珍珠八分 蜜丸每日服一錢白湯下日日服神效單方

解毒護童膏 金銀花一筋用水入銅器內煎至渣無苦味為度

粉草四兩用水煎至渣無甜味為度去渣二水沖勻用文武火

慢煎約十碗至三四碗入米白糖收成膏埋土一日出火氣每

早以百沸湯沖一鍾付小兒吃一切瘡毒不生併可稀痘若初

出痘後煎服此膏則遺毒皆盡勝多吃胡桃也陰騰文

問痧 西河柳葉風乾為細末水調服四錢立效或鮮者五六錢

煎湯服亦效 分開頂門有紅筋紅瘰搥破即出 若痧後痢

用柳末四錢砂糖調服單方

痘症

痘症

痘症

麻疹 生生子曰麻疹咳嗽喘急嘗用痘科中大小無比散每服五七分大者一錢即刻喘定而睡醒後神安氣和而愈屢用屢效乃熱毒從小便出也

小無比散 滑石飛過六錢石羔飛過一兩寒水石 粉草各五錢鬱金甘草湯煮

大無比散 粉草一兩飛過滑石六兩飛過辰砂三錢飛過雄黃一錢

痘瘡入目 痛楚恐傷日者浮萍陰乾為末三錢羊肝半個切碎搗爛共汁和

空心調服清茶過口傷目者數服自愈小兒減半

病後生瘡 或痘入目蟬脫淨白菊等分為末每服二錢蜜湯調數服愈

痘毒 斷不可用羯羊糞以新瓦磨光洗淨置糞于中上下以瓦覆定文武火炙燥烟盡存性取出為末麻油調敷神效

疳症

皆出乳母寒熱失入理飲食甘肥過惡積成又因吐瀉痢瘡久病之後皆能亡失津液並疳病

詩云 凡養小兒宜戒敬 酒肉油膩偏生病

生冷硬物凉水漿 不與自無瘡癰症

集聖丸 治一切疳症 屢試屢驗 蘆薈 五靈脂 夜明砂 砂仁

橘紅 木香 莪朮煨各二錢史君子二錢川連 川芎

乾蟾炙各三錢當歸 青皮各一錢五分熟者加龍膽草三錢去砂仁莪

朮 虛者加人參二錢白朮三錢去莪朮青皮 吐泄下痢加白朮

二煨肉果訶肉各一錢五分去青皮莪朮 積痛者加煨三稜川練

肉小茴各三錢去當歸川芎 瘡者加鱉甲三錢 重者加白燕

黃一錢五分川練肉二錢去當歸川芎 為末猪胆汁二個和麵為丸

看大小服米飲送下此方補不致滯消不致耗至穩至妥故有

神功 銅壁山 人方

奇驗方 雞軟肝一具用竹刀剖開將雄黃三分研末摻入肝內

外將谷精草一撮海粉一片先草次粉末肝同貯飯碗內用酒

漿浸一時飯鍋上蒸熟濾去谷精草餘俱服下即愈如不愈再

服無不愈者雞肝男用雄女用雌不可悞錢氏秘錄

疳痢 歌云 孩兒雜病變成疳 不問強羸女與男 煩熱毛

焦鼻口瘡 皮膚枯稿四肢癱 腹中時時更下痢 此方便

用青黛散 孩兒百病服之安 單用青黛水研服是也方仙

疳症遇仙丹 治一切肚大黃瘦 雄黃三錢 射香五分 胆星二分

全蝎火炒去足 姜蚕各一錢 硃砂飛二錢 巴豆五分 共研淨

末神麩糊丸如菜子大每服一九白湯下 此方濟人千萬矣

肥兒丸 治疳症黃瘦 黃連姜汁炒 神曲 麥芽俱炒 胡黃連五錢

史君子四錢 白朮 茯苓 甘草炙各三錢 山查肉 人參各二錢

蘆薈二錢五分 碗盛泥封固置 黃米飯和丸如米大

每服二三十丸米湯下看見大小加減

疳症眼積翳障 并肚大泄瀉面 肉果二個 史君子五錢 胡黃連錢一

蘆薈錢一 夕利錢一 共為末雞肝一具酒漿少許同搗爛去渣

入前藥末調勻蒸熟食之吃二三服立愈

疳症壞日或出痘 蜜蒙花酒洗 谷精草 蝉退去足 望月沙各

兩 共末雄猪肚一個竹刀剖開將藥末摻入水煮熟飲汁食肝

盡一料全愈青浦徐氏傳

附癖疾錢仲陽云癖塊者僻于兩脇 癖疾 癖疾

癖疾 癖疾

癖疾 癖疾

癖疾 癖疾

癖疾 癖疾

脾氣必虛久而不愈必先以固胃氣為主使養正則積自除若欲直攻其結不惟不消抑亦損其脾土脾土虧損必變虛百出矣宜朝服補中益氣湯夕服千金消癖丸間服治之獲效多矣

淨府湯

治小兒一切癖塊發熱口乾等症

柴胡

白茯苓

猪苓

三稜

醋炒

查肉

澤瀉

黃芩

白木

去蘆

半夏

姜製

人參

甘草

姜惠煎服

千金消癖丸

蘆薈

阿魏

青黛

木香

厚朴

姜炒

陳皮

檳榔

麥芽

史君子

去殼胡黃連

查肉

香附

我朮

三稜

醋炒

神曲

水紅花子

微炒

人參

茯苓

白木

去苦

甘草

錢

右為末將阿魏一錢水和麵打為丸菜豆大每服五

十九丸米飲下

剋堅膏

專治小兒癖塊發熱羸瘦者

木鱉子

川烏

甘草

甘遂

當歸

甲片

真香油一觔入藥熬成墨色濾去渣再漫

火熬次下黃丹八兩熬滴水成珠離火加礪砂

阿魏

礪砂

皮硝

水紅花子

射香

蘆薈

阿魏

礪砂

皮硝

水紅花子

為末

入內攪勻攤貼先用皮硝水洗皮膚方貼癖處二三日後覺肚內作疼四五日發痒糞後有膿血之物是其驗也

孤癖膏

桃仁

白蠟

血餘

香油

桐油

生豬腦子

各半

右俱下鍋內文武火熬的腦子盡瀘去渣次下

黃丹十四兩熬成膏待溫下

胡黃連

白芷

蘇木

紅花

三稜

我朮

歸尾

礪砂

射香

各為細末入前膏內攪勻收貯勿令泄氣有塊先用皮硝煎水

洗患處次用姜擦方用絹帛攤貼後用鞋底炙熱熨之五七十遍覺內熱方可瘳即消縮如神

李滄溪傳

治瘳驗方 每一歲用鱉甲一錢全蝎三隻去頭足新雄黃二分

研細末用芝蔴一撮畧炒白糖霜拌五更時送下十歲服十服

二十歲服二十服即愈德堂秘錄

一方用全蝎三枚去頭足土鱉二個去足大桑虫二個全焙乾芝蔴一撮銅

杓內炒煖為末用上好建糖調五更服酒漿送下抄本

薑膏 阿膠 膠州 逸酒 水珠升子各五錢

火燒於下黃世入兩蒸離水丸粒藥火氣膠好三錢根香錢

當歸 甲子錢真香附一兩人藥蒸丸墨子去血再製

煖望膏幾燕蠶麩香木鱉子 川息 甘草 甘瀝

