



武
609
卷 3



經驗單方補遺

許安源命 煥文光

全增輯

全增輯

許真君七寶如意仙丹

服之者照依藥引百病皆除有力之家

廣行施濟功德無量

川烏泡刮去皮尖 川黃連去蘆 人參去蘆 茯苓

去皮 乾薑慢火 桔梗去蘆 肉桂去皮 石菖蒲洗淨厚朴 吳茱萸

去梗 柴胡去蘆 紫苑去鬚 川椒去子炒 猪牙皂角去皮 當歸

酒洗 木香 大附子一個童便 巴豆去殼用紙壓去油 以上十

八味各一兩外加檳榔一兩選用地揀淨稱明五月五日午

時或每月上七日遇庚申甲子福生天德吉日預擇雞犬不聞

處為丹室屏除人事先安奉真君神位具供叩陳合藥救人

情旨如法炮製共為極細末入柏中樽三千下煉蜜或麩糊為

尤梧桐子大上好辰砂為衣潔誠收貯遇病照引五更時吞服
立效禁葷腥生冷一二日

藥引丸則瘟疫熱病三九俱井水下陰陽二毒傷寒傷風三九

俱薄荷湯下陰症傷寒九薑湯下鬼祟邪氣七嵐瘴不服水土

時災伏屍傳癆五痛恆神九顛狂五九俱黑棗煎湯下大麻風

成塊遍身麻木面如蟲行口眼歪斜脫眉爛肉左癱右瘓偏正

頭風五九鶴膝紫白癩風痰風癩五九俱荆芥煎生酒下誤吞

毒藥九消渴泄瀉九諸痢大小便閉九酒毒便紅三九喉閉七

九腮腫丹瘤癰疽疔瘻七九俱溫酒下赤痢黃連煎湯下白痢

甘草煎湯下膈氣五般食積心腹膨脹心氣疼痛七九氣喘咳

嗽三九俱生薑湯下反胃吐食七九薑澄茄湯下腸中氣塊五

煨姜湯下腹中成塊痛不止七九皂角煎酒下痞積五蓬木生

薑湯下腰背痛三九鹽湯下十種水氣五寒冷湯下黃疸五茵

陳湯下蠱脹七九甘草湯下五瘧三九桃枝湯下五淋九燈草

湯下虫積五九史君子湯下瘦蟲三九甘遂湯下腸風臟毒三陳

米湯下膀胱疝氣腫痛九研蘿蔔子或茴香湯下諸痔九淡礬

湯下婦人血崩五百草霜調酒下血暈頭痛七薑湯下血勞咳

嗽九荆芥湯下血氣刺痛三牛膝湯下月水不調子宮冷不受

孕孕笑孕哭五艾醋湯下赤白帶三絲綿燒灰調酒下產後腹

痛下血五阿膠酒下死胎七苧麻煎酒下鬼胎三紙書鐘爐二

字燒入滾水同吞下小兒急慢驚風一歲一丸金銀花薄荷湯

下氣痛一歲一丸薑湯下疳蟲一歲一丸史君子湯下睡涎咬

牙一歲一丸俱淡鹽湯下凡此藥引倘引一時不便止用白

滾湯送下孕婦忌服幼孩不能吞服及常人往病家出入者

當以絳紗為囊入丹三丸佩帶最能辟惡除邪。經商遊宦携之。可以自攝亦便濟人。凡合一料能濟千人。總以齋戒沐浴虔誠修製。雖沉痾奇恙。每有起死回生之功。予因為好善樂施者勸焉。

許真君濟世方

歲值凶歉饑饉者眾。此方所費不多。一料可濟萬人。用黃豆七斗。芝蔴三斗。水淘過即蒸。不可浸多時。恐去元氣。蒸過即晒。晒乾去殼。再蒸三蒸。三晒。搗為丸。如核桃大。每服一丸。可三日不饑。凶年當修合以賑濟人饑。再以銀米隨便賑濟。功德更無量。救及千人。名登仙錄。○不饑丸。芝蔴三升紅棗三升糯米三升焙燥磨末。蜜丸如彈子大。每服一丸。湯水皆可下。或遇凶年。或經遠出。皆足備急。一時自濟濟人。為功不小。

觀音救苦神膏

臨川謝秉志傳

此方係唐天師葉真人誠心濟世。往求大士。賜以良方。曰。以三十六天罡。攻之于外。以菩提水一杯。應之于內。萬病皆除矣。菩提水。甘草湯也。久病七日即愈。新病三日即痊。危病不待日者。作丸如豆大。每服七粒。滾水送下。即甦。真神方也。凡合此膏。須虔誠齋戒于靜室內供設。

大士寶座。以柳枝攪油熬膏時。口念大士寶號。一心存濟世之意。則百發百中矣。但病愈時。仍須焚香念。

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩。百遍叩頭亦百叩。熬膏切忌污穢。以及婦人鷄犬生人。冲破之類。又懷孕未經滿月者。忌貼。

大黃	二兩	甘遂	二兩	葶蔴子	二兩	歸身	一兩	莪朮	五錢	草烏	木鱉子
三稜	生地	川烏	黃柏	大戟	巴豆	肉桂					

經驗單方

良方補遺

三

除愛堂

麻黃 皂角 白芷 羌活 枳實以上十味各八錢 香附 芫花

天花粉 桃仁 厚朴 杏仁 檳榔 細辛 全蝎 五

楮子 川山甲 獨活 玄參 防丰以上十四錢 黃連五錢 蛇脫

錢 大蜈蚣十條

用真香油六斤入藥浸五日煎去渣至滴水成珠加密陀僧四兩飛過黃丹二斤四兩熬至不老不嫩收貯放地下出毒三日

隨病難貼即愈。藥引列後

偏正頭風左患貼左右患貼右正患貼印堂或捲條塞鼻孔中

立效口內常嚼甘草咽之眼科七十二症赤腫病將耳上角用

針刺出血貼上星脹翳膜捲毛倒睫迎風流淚等症捲條塞鼻

孔中左患貼左右患貼右患數十年者亦效常嚼甘艸咽之咽

喉三十六症單蛾雙蛾閉喉風貼上口嚼甘草如欲速效將膏

口含化下立愈牙疼風牙火牙虫牙虛痛飲食難進頭面赤腫

貼上痛止即能飲食勿服甘草九種心痛貼前後心常服甘草

湯病急垂危者作丸服不必服甘草諸般腹痛胃口痛貼胃口

丹田痛貼丹田滿腹痛貼肚臍服甘草湯如病危急者作丸服

不必服甘草中風癱瘓左貼左右貼右飲甘草湯口眼歪斜左

貼左右貼右不省人事痰聲如鋸作丸清湯下若口關緊閉用

鐵快撬開作丸塞入口中用滾水灌下否則作條插鼻中瘡疾

初起一三三四者俱貼臍上飲甘草湯如發過四五次者作丸

早發一時吞下飲熱酒數杯當日便不發忌飲甘草湯刺疾各

種俱貼胃口肚臍四五日即愈若久不愈者紅用龍眼壳核七

枚打碎煎湯送膏丸白用荔枝壳核七枚送膏丸赤白兼者龍

眼荔枝壳核各七枚打碎煎湯送膏丸下不必服甘草湯癆瘵

病內有癆虫者貼夾脊穴尾間肚臍等處口飲甘草湯七日而癆虫盡死咳嗽吐痰貼前後心仍要服清涼降火滋陰降火滋陰補藥禁吞服膨脹小肚脹氣脹俱貼臍下丹田肚臍常服甘草湯如塞在喉中咽不下即貼喉外口含甘草如欲速效作丸服之滾水送下不必甘草湯噎膈食膈氣膈痛膈俱貼胃口肚臍常服甘草湯如塞在喉中咽不下即貼喉外口含甘草如欲速效作丸服之滾水送下不必甘草湯哮喘咳嗽喘喘酒哮喘冷哮喘傷風哮喘咳嗽痰火氣喘俱貼前後心吞服不必飲甘草湯大小便閉俱貼肚臍飲甘草湯自通如數日不通急在旦夕作丸服滾水下小腹用甘草末葱汁調敷立通不用服甘草傷寒時疫貼肚臍飲甘草酒一醉汗出即愈如五六日不便作丸吞下便解而痊婦人赤白帶下俱貼臍下丹田常服甘草湯婦

人難產逆產橫產及包衣不下俱作丸熱酒吞下立刻便產產門小復煎甘草湯頻洗不可服甘草湯婦人經閉不通俱貼肚臍下丹田常服甘草湯如病久作丸服之小臍上用甘草末葱汁調敷上立通不可服甘草湯血塊痞積貼肚臍併痞上口飲甘草湯若人壯健作丸服之一日便瀉出矣虛弱者宜外貼飲甘草湯小兒驚風目翻上氣喘痰壅氣塞不通作條塞鼻貼一膏於臍上如急極作丸服之不可飲甘草湯小兒諸疳症貼肚臍口疳貼牙牀如貼在腰服甘草湯若貼在口不可服甘草湯外科疔瘡內服外貼勿飲甘草湯背疽各癰癩毒俱貼患處日飲甘草湯如腸癰肺癰俱作丸服兼貼肺腫上勿飲甘草湯瘰癧瘡脚氣數十年不愈者攤絹上貼之蓋以竹箬用帶縛定每日一洗一換十日愈矣痔漏內則捲條插入外則貼之飲甘草湯

便血腸血貼肚臍飲甘草湯吐血鼻血貼兩脚底心飲甘草湯

夢遺白濁貼肚臍飲甘草湯

紫金錠一名玉樞丹一名萬病解毒丹山茨菰須有毛包裹者去皮洗淨焙乾二兩川文蛤一名五倍子焙

乾麝香揀淨三錢千金子一名續隨子去殼揀色極白者用紙包裏研數十次去盡油以色白成霜為度

紅芽大戟杭州紫大戟為上一兩硃砂水飛過一兩雄黃三兩

宜端午七夕重陽或天月德黃道上吉日修合預期齋戒靜室焚香將前藥各為極細末至期焚香誠敬將藥攪和極勻用糯

米濃飲調和於木臼內杵數千下極光潤為度每錠一錢每服

一錠此丹通治百病凡居家出行與大工動大兵須珍備之因

例諸症湯引於左山嵐瘴氣暑暈途行及空心感觸穢惡用少

許噙嚼則邪毒不侵中風卒倒不省人事痰涎壅盛牙關緊急

薑湯磨服咽閉喉風薄荷湯磨服膨脹噎膈麥芽湯磨服絞腸

腹痛霍亂吐瀉薑湯磨服中蠱毒及諸藥飲食河鮪惡菌死者

等肉滾水磨服得吐利即解癰疽發背無名疔瘡一切惡毒惡

瘡無灰酒磨服取汗涼水磨塗已潰勿服蛇蝎瘋犬并毒蟲所

傷無灰酒磨服涼水磨塗中陰陽二毒狂言煩悶躁亂不寧涼

水磨服赤痢冷水磨服白痢薑湯磨服邪瘧温好酒磨服小兒

痰涎壅盛急慢驚風薄荷湯磨服婦人經閉不通紅花煎酒磨

服縊溺驚魘氣未絕者薑湯磨灌下時行疫氣常用焚燒則不

致延染孕婦忌服凡服此藥忌甜物甘草數日如急症

不及磨化杵細用亦可

秘傳除瘟救苦丹 治一切瘟疫時症傷寒感冒無論已傳經

未傳經大人每服一丸小兒半丸涼水調服出汗即愈重者連

進二服未汗之時切不可食熱湯熱物汗出之後不忌此丹百

發百中。奇效無比。有力者。宜修合以濟世。最妙。瓜兒天麻
麻黃 乾姜 松蘿茶 棗豆粉 各一兩 甘草 硃砂 飛過 雄黃
飛過各 生大黃 二兩 共為細末。煉蜜為丸。彈子大。收磁器內。勿
令洩氣。

菩提萬應丸 治夏秋一切時症。中暑霍亂。瘧疾。痢等症。輕者一服

重者二服。神效。有力者。宜修合以濟世。最妙。陳皮 厚朴 姜汁

拌蒼朮 米泔炒 半夏 姜汁炒 香附 柴胡 薄荷 黃芩 枳殼 各

兩四 山查 麥芽 炒 神麴 砂仁 各二兩 甘草 霍香 各五錢

用乾荷葉煎湯。拌前藥。曬乾為末。煉蜜為丸。彈子大。每丸重一
錢。隨引服之。一感冒及瘟疫時症。頭疼骨痛。咳嗽痰喘。用生姜

三片。葱白二根。煎湯調服。中暑用香茹煎湯調服。紅白痢用車

前子煎湯調服。泄瀉用姜茶湯調服。水瀉若小便不通。口渴用

淡竹葉十個。燈心十五根。煎湯調服。久瀉不止。用糯米飲調服。

多服自效。瘧疾用白滾水加姜汁調服。久瘧體虛。用人參湯調

服。霍亂吐瀉。用胡椒七粒。棗豆四十九粒。煎湯調服。心胃疼。用

柝榔煎湯調服。黃疸用茵陳煎湯調服。多服自效。其餘山嵐

瘴氣。水土不服。並胸膈飽悶。宿食不消。一切雜症。或在路途。無

引。俱用清茶。或白滾水調服。孕婦忌服。

藶姜丸 又名寸金丹 專治男婦老幼中風。中寒。中暑。口眼歪斜。牙關

緊閉。不省人事。並霍亂吐瀉。腹痛轉筋。或內傷飲食。胃口停痰。

胸膈脹悶。不思飲食。或出外遠方。不服水土。心腹疼痛。惡心作

瀉。及四時感冒。瘧疾。傷寒。頭疼發熱。遍身疼痛。惡寒無汗。服此

藥。俱要發汗。又治傷風咳嗽。山嵐瘴氣。噯氣吞酸。紅白痢疾。婦

人產後昏迷。惡露不盡。小兒急慢驚風。以上俱用淡姜湯化服。

大人一二丸小兒半丸未愈再服以愈為度孕婦忌服

烏藥 防風 羌活 前胡 川芎酒洗 白芷 半夏姜汁 陳

皮 赤茯苓 砂仁炒 木香 厚朴姜汁 藿香 紫蘇 薄荷

蒼朮米酒炒 香附酒浸 神麴炒 枳殼炒 甘草炙 草蓰一兩五錢

仁一兩 白豆蔻仁二兩 共為細末再用真正神麴二十四兩研細

搗生姜汁拌糊為丸用飛硃砂二兩為衣重一錢二分陰乾

十神湯 治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲出疹此藥不問

陰陽兩感風寒並皆治之

川芎 麻黃 乾葛 蘇葉 白芷 陳皮 香附各一錢 赤芍

分八分 甘艸炙 升麻五分 生薑三片煎服發熱頭痛加連翹白中

滿氣實加枳殼桔梗天氣和煖加黃芩去麻黃

一切男婦腹痛緊急不識何症 用鹽微炒以布裹熨痛處立止

霍亂吐瀉痧症烏痧陰痧陽痧絞腸等痧神方

明礬二錢為米粒大粗末用陰陽水送下再用針刺眉心頭頂

十指尖出血立愈百發百中但不可食熱湯熱物用滾水半

盞冷水半盞和勻吞服鹽一錢或再吞一錢即止或將鹽納臍

中以艾葉炙之死亦可活用食鹽一握在心口背心兩脇頻

擦擦出許多紫點一切痧脹中暑霍亂等症雖垂死亦活百發

百中第一良方法也。用蘆艾一把水煎服奇效。用大蒜搗

爛塗兩足心立愈

哮喘方 哮喘有虛實之分熱哮喘鹽哮喘酒哮喘皆虛哮喘也寒哮喘實哮喘也

寒哮喘遇冷風而發熱哮喘傷熱傷暑治各不同

虛哮喘 麥冬三兩 桔梗三錢 甘草二錢 水煎服一劑即愈不必加

去痰之品加則不效矣不能斷根另有藥。實哮喘 百部

炙甘草各二錢 桔梗三錢 半夏 陳皮各一錢 茯苓五分 木煎服二劑即愈

斷根方用海螵蛸火煨為末大人五錢小兒二錢黑砂糖拌勻調服一服即除根若不服上煎藥止可得半也上煎藥

如熱哮喘加玄參三錢寒哮喘即冷哮喘也加乾姜一錢鹽哮喘加飴糖

三錢酒哮喘加梓木三錢

七粒金丹 治哮喘之症神效

精猪肉四兩 人言五錢 將肉剝極碎人言研細末入肉內拌勻外用

黃泥裹好炭火燒肉烟盡取出為細末大米飯搗為丸如麻子

大珠砂為衣每服七丸俟病正發時半夜子時新汲凉水送下

一二服除根愈神效。用青橘皮一枚切開去穰入巴豆肉一

粒用麻紮定火上燒存性為末姜汁和酒一鍾呷服到口便止

神效。將瓦放火上燒紅放鷓鴣糞於紅瓦上自然成灰研細

好酒送下二三錢即愈

痛風奇驗方 痛風風入骨中輕則隱隱骨內痛重則遍身骨皆

痛也亦有走來走去在骨節間作痛不可忍者此等病雖邪入

在骨髓而骨髓屬腎似宜治腎然不可徒治腎也必須治陽明

始效胃經陽明經也大腸亦陽明經也論理去陽明之風宜用

乾葛去陽明之火宜用石膏知母然邪終在骨髓必須用氣分

藥提出氣分然後以補腎藥補其骨髓必能去病

黃芪三兩 白木二兩 生地 玄參各一兩 甘菊花五錢 以上水煎服服

半身不遂方

一劑少止痛二劑痛除三劑全愈加防風一兩更妙

用芥菜子為末好陳醋調如患在左從頭至身手足左半身俱

敷滿如患在右亦照此敷滿蓋煖睡一覺即愈屢驗

偏正頭風神方

用陳醬姜切一片厚一分許。放在痛處。用真蘄艾炙七壯。或九壯。以鼻內知艾香為度。永不再發。極驗。

偏正頭風一服立愈方

何首烏錢三 茯苓錢一 天麻錢一 當歸錢三 防風錢三 水煎作一劑服。神效。屢驗。

頭風不拘偏正立刻止疼方

硫黃錢一 川椒錢一 取紅皮為末三分 右二味拌勻。溶成小餅。左疼塞左鼻。清涕從右鼻孔出。右疼塞右鼻。正疼左右俱塞。清涕流盡。即愈。神驗。

偏正頭風百藥不效一服便可第一神驗方

白芷炒二兩 川芎炒 甘草炒 川烏頭半生半熟 各一兩 共為末。每服

一錢細茶薄荷煎湯調下。
燻頭疼方

用鯨魚頭一個。分中切開。左邊疼用右邊魚頭。右邊疼用左邊魚頭。放在火上燒烟薰鼻。其疼即止。神效。

偏正頭風方

薑撥為極細末。右疼吹左鼻孔。左疼吹右鼻孔。正頭風兩鼻俱吹。二三次即愈。○生蘿蔔汁。隨左右仰臥。注鼻中少許。神驗。頭疼耳邊發腫。太陽疔腮俱疼。不可忍。

大黃兩一 青木香 姜黃 板榔各三錢 以上為細末。用醋蜜和調。塗患處。中留一孔出氣。乾則易塗。二三次即愈。○生大黃末。葱汁調敷。四圍中露一頂。不日即愈。○醋調石灰敷之。即消。破傷風神方

全班毛七厘小人糯米炒焦一分三厘以上共為末黃酒衝服即愈尤能起死回生不可忽視

又方

鴿糞尖者錢三白麥麵兩炒一麻不拘分兩以上三味為細末如遇破傷風腫得頭如斗大或垂死者用好黃酒調藥灌之即生屢驗○用手足十指印香油炒黃為末黃酒沖服汗出即愈真奇方也○雄黃白芷等分為末酒煎灌下即愈

我掌瘋方

硃砂明雄各一錢輕粉五分共為細末用桐油調塗患處以微火烘一炷香為度年遠者五七次年近者二三次即愈屢試屢驗○用核桃大鉛彈子一個每日在手內搓弄搓熟將鉛彈子握緊晝夜不歇如此十餘日即愈但不能除根○真斷艾四五

兩水煎入大口瓶內上用麻布蓋之以手心放瓶口薰之冷則再熱薰數次即愈

張真人傳治鶴膝風神方 此病乃立而行房風濕侵於兩膝故成此疾然治法絕不治腎止治氣而自愈亦不必治風濕也

生黃芪一斤遠志肉此味最能健膝牛膝各三兩金釵石斛四兩用水十碗煎二碗再入金銀花一兩煎一碗一氣服之服後覺兩足如火之熱教病人睡了以厚被蓋之汗出至湧泉始可去被否則斷不可去也一服病去大半再服全愈不分久暫俱可如法治之神效

濕痰流注神驗方

用姜黃母子是大姜黃身上小釘子是也為末將小紅棗去核藥末入內填平用絲綿紫緊塞入鼻孔內隨量飲醉蓋煖出汗已潰者自然

經念單方

良方補遺

十一

余愛堂

全愈。未潰者內消。神效之極。鼻孔照男左女右塞之。藥不可經婦人手。

又方

野花椒半斤 山茱萸半斤 用酒浸。煮三炷香。冷定。將酒盡量飲醉。發汗一身。其毒自散。神效。○用金銀花帶葉和酒糟研爛。用淨瓦礫盛藥。火中煨熱。敷患處。立愈。

經驗藥酒方 治三十六種七十二症。口眼歪斜。左癱右瘓。筋骨疼痛。流痰滯氣。鶴膝等症。應驗如神。

天麻 生地 香附炒 甘菊 棗仁炒 茯神 枸杞 破故布
炒丹參 獨活 川芎 秦艽 熟地 當歸 杜仲炒 牛膝
前胡 羌活 紅花 續斷 山藥 桂枝 百合 蔓荊
子搗骨碎補打以上二十五味各一兩。加白蒺藜八兩。圓眼肉

一斤。去核壳。淨用黃絹袋盛之。好燒酒三十斤。將藥袋入內。封固。煮三炷香。埋土地內。過七日。取出。每日早晚飲小鍾兩三杯。數日見效。酒完再加酒十五斤。圓眼肉半斤。照前煮埋用。

黃疸方 黃疸之症。濕熱入於臟腑。榮衛之間。外感易散。內傷難除。內傷須於補中去水。故難外感。只消去水。所以易。非乘汗而出。即瀉水而行也。

治內傷方 白朮五錢 茯苓三錢 薏仁一兩 龍胆草 山茱炒 茵陳各一錢
水煎服。三服少愈。十服全愈。 治外感方 茵陳 梔子各一錢
龍胆草一錢 甘遂五錢 水煎服。一服去大半。二服愈。四服全愈。如女癆疸。即內傷也。加麥冬二兩 酒疸。亦內傷也。加葛根五錢

脾積黃腫

皂礬煨成赤珠 當歸酒浸七日 百草霜三兩 共為末。以浸當歸

酒打糊為丸。桐子大。每服五丸。至七丸。溫水送下。一月後黃退。即愈。

黃疸方

薏仁四兩車前子一兩茵陳三錢茯苓五錢肉桂二分右水煎服。此方妙在去濕而不走氣。泄火而不利陰。至妙至穩。多服自愈。

黃疸如金方

晴明天氣時。清晨勿令鷄犬婦人見。取東引桃根。細如箸。若釵股者。一握。切細。以水一大升。煎一小升。空腹頓服。服後三五日。其黃離離。如薄雲散開。百日方平復也。黃散動。可時飲清酒一杯。則眼中易散。否則散遲。忌食熱麪。猪魚等物。

黃疸取黃法屢試屢驗

用扛連紙一張。裁為四條。筆管捲如爆竹。或將一口用糊粘固。

外用黃蠟一兩。鉄銚溶化。將紙筒四圍澆勻。不可使蠟入筒內。令患者仰臥。將蠟筒套在臍上。再用麩作圈。護住筒根。勿令倒。勿令洩氣。筒頭上點火。燒至筒根麩圈處。剪斷。另換一新筒。再燒。看臍中有黃水。如鷄子清者。取出。輕者薰四五筒。重者薰二十七。或三七。或七七。筒總以取盡黃水為度。神效。

黃疸神效方

用鮮虎掌草即天南星葉搗爛。貯茶鍾內。平口扣在臍上。一寸許。用汗巾將茶鍾縛住。過一晝夜。除下腹上自起一大泡。用銀簪腳從泡下面刺破。漸漸流出黃水。水流盡。其病自愈。神效之極。如無鮮虎掌草。用乾者為末。水調用亦可。用官栝葉枝一大握。搗汁。生白酒衝服。即愈。如冬月無葉。用根搗汁服之。亦可。屢驗。○用鷄子一枚。連壳燒灰。研末。醋漿一合。和之。溫服。鼻中虫出。

自效。身體極黃者。不過服三枚。即愈。

耳痔不論已未出膿神效方

用頭髮在新瓦上燒灰存性。為細末。羅過每一錢灰加真冰片七厘。研勻吹入耳內。即愈。極驗。用麝脂燒灰為末。加真冰片少許吹之。即愈。用醬茄子擠汁滴耳內。即愈。

牙疼總方

石羔煨三錢 防風 荆芥 青皮 生地 粉丹皮以上各一錢

甘草分五 上前門牙屬心火加黃連麥冬 下前門牙屬腎火加

黃柏知母俱搥水 上兩傍牙屬胃火加川芎白芷 下兩傍牙

屬脾火加白朮白芍 上左盡牙屬胆火加羌活胆草 下左

盡牙屬肝火加柴胡山梔 上右盡牙屬大腸火加大黃枳壳

孕婦用大黃 下右盡牙屬肺火加黃芩桔梗以上所加各一錢二分 以上俱水

煎食後服。

牙疼神效方

雄黃精 明礬各三分 牙硝一錢 真大冰片一分 共為極細末以半

分擦患處流涎即愈極驗無比

紫袍散 治咽喉十八種症

石青 青黛 硃砂 白礬砂各一兩 胆礬 人中白煨 明粉

各五錢 真冰片三分 山豆根二錢 共為極細末入磁罐塞口急時用

二三厘吹咽喉即愈神效無比

乳蛾神效方 乳蛾急症也此方甚效有力者宜預製以救人

臘月八日雄猪胆一個裝入白礬末陰乾之後研末再入臘八

日猪胆內如此三四次如遇患者用一二分吹之即愈神驗

單乳蛾喉癰喉腫痛吐嚙不下命在須臾者

良方補遺

鳳凰衣微火焙黃 橄欖核瓦上火煨存性 孩兒茶 以上各等分爲極細末 每一錢加真冰片半分吹之即能進飲食極效無比

喉風口禁死在須臾方

胆礬五分半生 熊胆 木香各三分 共爲細末用番木鱉磨并花水

調和以鷄翎蘸掃患處如勢急口噤用筋啟齒掃下即消

喉閉方 纏喉風急喉痺單雙蛾湯藥不下者用此極効

巴豆七粒去壳三生四熟 明雄皂子大 鬱金一個如蟾肚大者佳 共爲細末每服半劑清茶調服如口噤咽塞用竹管吹納喉中須臾吐

痰即愈但能灌下無有不活者甚驗

九種心疼胃氣疼神驗方

千年石灰兩生 熟白礬各五錢 共爲末姜汁爲丸桐子大或姜湯

或燒酒送下七丸即愈有力仁人修合以濟世功德無量

九種心胃疼諸藥不效者此藥神效

蒲黃三錢五分 五靈脂酒淘去沙石 木通 赤芍藥 沒藥各一錢 延

胡索 姜黃各一錢半 以上水二鍾煎八分入薑酒少許溫服立愈

桃靈散 治胃氣疼百發百中

白礬 柘礬各五分 五靈脂一錢 乳香八分 共爲細末痛時每服三

分用燒酒送下愈

手拈散 治心胃疼藥下即愈如手拈去故名

玄胡索醋浸炒 五靈脂炒 草果 乳香炙去油 等分爲末酒送下三

錢。猪牙皂角用灰火煨半焦研細羅篩篩過每用二厘火酒下

噎食神驗方

生姜不拘多少五月五日午時用布袋裝好浸於不見天日之東廁內四十九日取起掃去穢物懸空吊晒極乾爲末病二年

歷念單方 良方補遺 余愛堂

著用姜末三分病一年者用姜末二分入麝香一二厘衝白滾水與病者吃下只一服而愈服藥後不可輕叫病人吃飯須先飲米湯一日次日方可少吃稀粥五六日後漸漸吃飯總以少吃為妙忌量腥蓋醬並醬小菜五十日永不發此方極效無比有力者宜預製以救人最妙

朝食暮吐暮食朝吐方 此方腎虛而然非胃寒也人錯治故罔效

熟地_{兩四}山萸肉_{兩三}二味用水五碗煎一碗加肉桂_{錢三}再煎至七分一氣空腹服之一日一劑十日即愈又有食物下喉而即吐者乃腎水虧極也亦非脾胃火症也亦用此方但不加肉桂而加麥冬_{錢三}煎服亦十日即愈後用六味地黄丸吞服二月則再不發矣神方也若濕熱如吐乃中有虫也何以知為濕熱之症

必有痰涎先作穢氣者是也用黑驢尿加入童便菲菜汁少許即愈

翻胃膈食神方

每年五月三十日月小廿九日清晨取不下水老姜用竹刀刮去皮以細篾條穿成串入無生木並無陰人及陰陽人之糞坑內浸七日至六月六日午後取出不可見水即將純陽人尿洗去污懸于無日有風處陰乾入乾磁罈內封貯聽用每服三錢竹刀切碎用新瓦焙乾研細末空心酒下若量大用火酒更妙凡患此症不拘遠年近日將死不救者一服即可回生三服全愈約姜十斤製就可得一斤

膈食屢驗方

用小兒胎髮捏成團以陰陽瓦焙焦存性研細陳酒送下即愈

神效

翻胃神效方

用極大枳壳兩半個。去內穢。將真阿魏六七分。杏仁去皮尖。十餘粒。共搗爛。入枳壳內。將兩半壳合口。外用綿紙裹好。線扎緊。入滾水內。大火煮半日。取起去壳內藥。將壳焙乾為末。燒酒送下。重者不過二次。即愈。神效無比。

九仙奪命丹 治翻胃噎食。其效如神。

人參 甘草 各一錢 南木香 南星 姜製各二錢 半夏 五錢 枳壳 白礬

厚朴 姜汁製 以上丸味共為末。以人參厚朴煎湯

調糊為丸。每服一錢。以平胃散煎湯送下。加山查。名十聖奪命丹。加糖棗肉尤效。切忌諸般生冷及酒。無有不效者。屢驗。

痞塊秘方 不論遠年近日。服之內化無形。不可輕視。

大黃 皮硝 各一兩 小紅花子 研為末 急性子 研為末 各五錢 用白鴨一隻。

擷去毛並臟雜。不可經水。藥共研勻。裝入鴨腹中。用線縫住。盛砂鍋內。入無灰酒兩大碗。上用一砂鍋蓋住。要封口嚴密。文武火炙乾。將鴨翻掉。炙黃色。破開鴨肚。去藥。用新青布將鴨肚內擦得乾淨。患者將鴨分作二三次吃。吃完即愈。

痞塊神效膏

真川白芥子 二斤 穿山甲 八兩 用真桐油二斤。入銅鍋內。先熬半响。次入山甲。熬數沸。再次入白芥子。俟爆止。濾去渣。入飛淨炒黑黃丹 八兩。收之。離火。再入麝香末四錢。去火氣七日。用攤時。隔湯化開。不可用火。一方加阿魏四兩。更妙。此膏效難言。述若有力者。多熬以濟人。甚妙。

又方

良方補遺

良方補遺

七

餘愛堂

青背鯽魚一個重甘草兩者甘遂 杏仁 木鱉子各等分皮硝分
右加葱蜜共搗極爛成膏再加麝香分又搗勻敷貼患處用油
紙隔外慢火熨之塊從大便打出此方世所罕有不可忽視

男婦小兒腹內積塊

用紅蓼花子又名水紅花每日清晨生服三錢白滾水下多服自消
驗甚

瘧疾三方 第一方

陳皮 半夏姜汁炒 茯苓 威靈仙以上各一錢 蒼朮米泔浸厚朴姜
炒柴胡 黃芩以上各八分 青皮 檳榔以上各六分 甘草分 用薑三片
水酒各一碗煎八分飢時服頭痛加白芷一錢無汗加麻黃一錢只
用一劑後俱去之 此方平胃消痰理氣除濕有疏通開先之
功受病輕者一劑即愈勿再藥服後立有起色功奏萬全所云

加減一二即不靈應者正此方也切勿早用人參如閉賊於重
門之內必搏擊害人所傷者大矣直至瘧止之後補弱扶元再
用第三方專為有力者設也若貧家安所得人參而用之只服
第二方多多益善

第二方 此方為主

何首烏生用三錢 陳皮 茯苓 柴胡 黃芩以上各八分 白木錢 當歸
錢 威靈仙錢 薑三片 井水 河水各一碗煎八分加酒五分再
煎一滾空心服二煎三煎並服久瘧加蓬朮一錢 此方妙補瀉
並用虛實皆宜不用參芪並去常山草果平平無奇却都有神效
即極弱之人纏極重之病十劑不發矣 或加何首烏二錢 知母
錢 或加青蒿子八分 麥芽錢 用藥有前功有後效故分一二三也
而第二實為主方既不刻削亦不峻補而功獨歸之國醫到此

經念單方 良方補遺 除愛堂

欽手雖有名方皆不及也。

第三方

白木炒人參以上各一錢黃芪蜜當歸以上各二錢陳皮柴胡
分升分四麻分三甘草分三薑一分棗一枚水二碗煎至八分半飢時
服三五劑後元氣充實永不發矣若三劑後病勢減而不完全愈
必用第二方少則三劑多則五劑而已

三日或間日瘧二三年不愈者一服即愈屢驗神效

當歸各五錢半夏各五錢常山各二錢板榔各二錢紅棗去核
河井水共一斤將前藥並棗用新砂鍋煎爛放屋上露一宿次

日清晨將藥棗溫熱服之連棗做幾次吃完即愈忌鷄肉雞蛋
一月勿食

痢疾奇方 痢為險惡之症生死所關不惟時醫治之失宜而古

今治法亦多不得其道是以不能速收全效今立方何以為奇
不泥成法故奇也立論何以為妙不膠成說故妙也然其藥品
又不外乎常用而已有識者切不可更張勿為庸醫所誤遵而
用之百用百效者也○初起煎方

川黃連去蘆條黃芩 白芍 山查肉以上俱二錢 陳枳壳去穢紫厚

朴去皮姜厚 堅榔 厚青皮去穢以上當歸 地榆 甘草炙

五分上俱紅花酒炒三分南木香分二桃仁去皮夫研 右各如法炮製用

水二碗煎成一碗空心服此方或紅或白裡急後重身熱腹痛

者俱可服如單白者去地榆桃仁加橘紅四木香用分三如滯澁

甚者加大黃錢二用酒拌炒服一二劑仍除之若服過一劑滯澁

已去不必又服二劑矣年幼之人大黃只用一錢右方用之三

五日神效旬日亦效半月外則當加減另詳于後

加減煎方

川黃連酒炒六分 條黃芩酒炒六分 大白芍酒炒六分 查肉錢一

橘紅四分 青皮四分 檳榔四分 甘草三分 當歸五分 地榆四分 桃仁粉六分

紅花三分 木香一分 右如法製水二碗煎一碗空心服延至月餘

覺脾胃弱而虛滑者法當補理具方如左

補理煎方

川黃連酒炒五分 條黃芩酒炒六分 大白芍酒炒四分 橘紅六分 當歸五分 人參五分

白朮鹽炒五分 炙甘草五分 右如法製水煎空心服○以上三方如

婦人有胎去桃仁紅花板榔 右三方隨用轍效或有不效者

必初時投參朮補劑太早補塞邪氣在內久而正氣已虛邪氣

益盛纏綿不已欲補而澁之則助邪欲清而疏之則愈滑遂至

于不可救藥雖有奇方無可如何則初投溫補殺之也古今治

痢皆曰熱則清之寒則溫之初起熱盛則下之有表症則汗之

小便赤澁則分利之此五者舉世信用如規矩準繩之不可易

乎謂五者惟清熱一法無忌餘則犯四大忌不可用也詳于後

一曰忌溫補痢之為病由于濕熱蘊積膠滯于腸胃中而發

也宜清熱邪導滯氣行瘀血其病即去若用參朮等溫補之藥

則熱愈盛氣愈滯而血亦凝久之正氣虛邪氣盛不可療矣此

投溫補之為禍最烈也 一曰忌大下痢因邪熱膠滯腸胃而

成與溝渠壅塞相似惟用磨刮疏通則愈若用承氣湯人下之

譬如欲清壅塞之渠而注狂瀾之水壅塞必不可去無不岸崩

堤塌矣治痢而大下之膠滯必不可去徒傷胃氣損元氣而已

正氣傷損邪氣不可除壯者猶可弱者危矣 一曰忌發汗痢

有頭痛目眩身發寒熱者此非外感乃內毒薰蒸自內達外雖

有表証實非表邪也。若發汗則正氣既耗，邪氣愈肆，且風劑燥熱愈助，熱邪表虛于外，邪熾于內，鮮不斃矣。一日忌分利，利小便者，治水瀉之良法也。以之治痢，則大乖矣。痢因熱邪膠滯，津液枯澀而成。若用五苓等劑，分利其水，則津液愈枯而滯澀愈甚，遂至纏綿不已，則分利之為害也。若清熱導滯，則痢自愈而小便自清，又安用分利為哉。余于此一症，素畏其險，用以調治，經今廿餘年，百試百驗。既而身自患之，試驗益精，然後能破諸家之迷陣，而為奇妙之方論。是用述其顛末，以拯斯人之疾苦，而悉登諸壽域也。

藏經內傳痢神方

紅棗一個，煮熟去皮核，用丁香一粒，宿砂一個，杏仁去皮一粒，研末入棗內紙包，煨存性，甘草湯送下，即愈。

赤白痢方

赤痢：生姜連皮二錢，茶葉二錢，白痢：生姜去皮二錢，茶葉一錢，赤白痢：生姜去皮一錢，連皮一錢，茶葉二錢。以上各加核桃仁五個，水一碗，煎至空心，午飯前皆可服，渣隨意揀食，甚効。

痢疾神驗方

陳茶葉 陳皮 生姜各二錢 食鹽一錢 煎服，不拘赤白，即愈。

大人小兒噤口痢神方

五穀虫水洗淨瓦上焙黃色為末，用黑糖拌勻，及新水送下，即愈。又方：用活蝦蟆一隻，搗爛，加上好麝香六分，同研勻，貼肚臍上，用布束緊，半日即能下飲食，兩日全愈。

水瀉神驗方

南山查肉三錢 白糖三錢 拌勻，溫滾水空心調服，重者不過三服。

良方補遺

良方補遺

三

徐愛堂

即愈並治霍亂吐瀉

水瀉痢疾神效方

用大蒜頭五個火灰煨熟食之一日二次重者不過二日必愈神驗。

血痢血崩方

穀樹皮荆芥等分爲末冷醋調服一錢即愈。

久痢不止方

用陳酸石榴皮焙乾研末每服二錢米湯飲下百方不效服此便止不可輕視。

洞泄有一時來者完穀不化傾腸而出口渴眼突腹痛後重一日瀉十餘次或二三十次或七八十次者此方服之神效。

車前子一兩 薏仁米三兩 人參二兩 甘草各一錢 黃連二錢 白茯苓三兩 白芍三兩

二水煎服一劑即止妙方也。

洞瀉至經年累月不止五更時必痛瀉數次者

熟地八兩 山茱萸四兩 茯苓 白朮 山藥各五錢 北五味二錢 兩桂錢 破故紙二錢 砂仁五粒 人參一錢 水煎服至十劑永不發神方也。

痢疾方

大黃一斤 將水并酒各半用新沙罐煮二日不佳手攪又加厚

朴十兩 姜汁 木香四兩 研碎不 右將二味拌大黃曬乾磨細末

用荷葉水爲丸如桐子大每服三錢 孕婦不可服量入大小

強弱或二錢一錢白痢姜湯下紅痢甘草湯下白痢甘草與

姜同煎湯下水瀉白滾湯下忌生冷麵食。又方淨礞石三錢 白

用姜皮紅用姜炭各三錢 細茶三錢 用白朮煎服二三劑全愈。又

方用火腿骨燒灰研細用紅糖充酒下愈。

跌撲損傷急救散

歸尾酒洗 紅花 桃仁去皮 自然銅醋煨七次 陳蘇皮三錢 地鼈虫
燒酒浸五錢 大黃酒洗 骨碎補酒洗 胎兒骨 乳香 沒藥 血竭
硃砂 雄黃 麝各五分 以上共為極細末收貯勿洩氣如遇
跌死打死尚有微氣者用酒漿調二厘入口即活如骨折瘀血
攻心用藥八厘酒調灌之其傷骨自上而愈神效之極

接骨神方

自然銅醋煨七次三分 乳香去油 沒藥去油 生半夏一個 雄土鱉重此重
凡雄者用銅刀或竹刀切斷以碗覆之半盞其重能自
接上不死者是雄的方可用是雌者不可用火煨存性以上俱
忌鐵器共為極細末每服二厘黃酒送下不可多吃多吃恐長
出多骨矣服藥後須保養四十天復舊此方神效無比有力者
宜修合以濟世

跌打損傷接骨神方

用半兩錢上止有半兩二字者 以火煨之入醋內淬數次即枯研極細末
七厘又甜瓜子火焙乾為末七厘二末和勻用生酒服下即愈
不宜多服多則旁長一骨矣神驗

又方

大路旁墻脚下往來便溺處日久碎瓦片不拘多少拾來洗淨
桑柴火煨好醋淬五七次黃色以指捻之即成粉為度研極細
末每服二三錢好黃酒送下其折骨自接痛止不可以輕而忽
之

夾棍傷神驗膏

大黃 白蠟各四兩 松香 乳香各二兩 沒藥 骨碎補各一兩 續斷
錢二當歸 敗龜板各三兩 以上各為細末猪版油三兩將白

良方補遺

良方補遺

卷

徐愛堂

蠟松香乳香置在銅鍋內同猪油化開將前藥末入油攪勻爲膏貼於夾傷處第二日即可行走。

金瘡神驗方

半夏 松香 去油如油去不淨反疼用新磚二塊火內燒極熱
白二味等分爲極細末拌勻用神驗無比有力者宜預合濟世
甚妙

又方

真降香

切片火上炙去油

荔枝核

血竭

各等分爲極細末敷患處

卽止痛作癢不三日卽愈雖斷指亦能續也神驗。○用荔枝核燒灰存性爲細末填傷口一夜卽平復甚驗。○用龍眼核去外黑核爲極細末敷傷處立止血止疼。○用龍骨末敷之血卽止神效。

湯火傷瘡神驗方

劉奇奴爲細末用桐油或菜油調敷其泡立消其痛立止頃刻結靨愈神驗。○用圓眼壳燒灰爲末真桐油調塗一二次卽愈神效。○用生蘿蔔搗爛敷之甚效。

火燒爛神驗方

用狗骨煨成灰爲細末蘇油調敷卽愈神效無比。○用鐵銹花磨水塗之立愈神效。

蛇咬傷方

用雞蛋三個敲破蛋頭合在蛇咬之處聽蛋內有聲變黑色再用一個合之俟蛋內色變黃白不甚黑再用一蛋合之自愈不疼矣極妙良方也。○用蒲公英搗爛貼上卽愈。○用木香不拘多少水煎服效不可述。○五靈脂一兩雄黃五錢爲末酒調服

經方

良方補遺

三

徐愛堂

二錢仍將藥末敷傷處無不效驗

瘋狗咬傷方

雄黃五分麝二分班貓七個去頭足用水酒均煎空心熱服必俟

腹疼便出小狗方愈如腹疼不止用甘草八分全鮮肉煎湯服

之即止○用班貓七個去頭足糯米和炒杏仁七粒去皮尖雄黃 白芷各八分

共為末黃酒送下毒從小便出愈○多飲生姜汁或韭菜汁毒

自解

蜈蚣蝎螫傷方

白礬 生半夏 各等分好醋調和敷上即止疼毒出愈或為

鏡子磨敷亦可○燒鉄刀頭令赤置白礬於刀頭上化汁乘熱

將礬汁滴於所傷之處立瘥神驗方也○用手指探入鷄喉內

取鷄口內涎塗之立愈或將鷄嘴對傷處吸吸盡毒鷄嘴自去

亦效○用鷄子一個輕敲一小孔在傷處立瘥○用木梳齒內

垢燈上燒油滴傷處立愈○用人頭垢封傷處立愈○用鷄冠

血塗之立止疼○細嚼香附錢之立效○五靈脂二錢炒蒲黃令爛

錢錢各為末或醋調塗患處立愈

產婦大便不通及老人諸虛人風發不通難用行導藥者服此最

妙最穩效若影響

蘇子 胡麻子 各半合研極細用水再研取汁一碗煮粥食

之先下結糞漸得通利極驗○用松子仁去皮酒一盞研極爛

滾水衝服即出蒸又不損人

大便不通方

烏臼樹根方長一寸劈破水煎半盞服之立通但不可多服

大腸火盛肛門腫痛難便或在痔血肛門邊生毒毒者

良方補遺

良方補遺

三

徐愛堂

槐米不拘多少炒深黃色。土塊上去火毒為末。空心黃酒調服。三錢服三四次即愈。若生痔。並一切癩毒。多服自消。極驗。小便不通。腹脹欲死。

蚯蚓五七條。研爛。投入凉水一碗。攪勻。澄清去泥滓。飲下即通。此物大解熱疾。不知人事。幾死者服之立效。

小便不通。腹脹如鼓。危急將死。百藥不效者。

鳳眼草。即臭椿樹子。皂角四兩。水煎五七沸。加麝少許。入磁礮內。將玉莖入礮口內。薰半炷香。時使藥氣入竅。即通。屢試屢驗。

便血不止方

大蘿藦皮。燒灰存性。荷葉燒灰存性。生蒲黃。各等分。為末。每服一錢。米湯飲下。神效。或蜜炙蘿藦。任意食之。亦效。○用山查肉。

為末。艾湯調服。應手即愈。

疝氣神效方 亦治諸氣痛

荔枝核四十個 陳皮九錢 硫黃四錢 共為末。盪水打麵糊為丸。如棗豆。

大遇痛時。空心溫酒服九丸。良久再服。不過四五服。其效如神。

男子下淋。婦人赤白帶秘方

寒水石 蕎麩 各等分。研為細末。五月五日用水為丸。彈子。

大陰乾。臨服時。用一丸。燒灰存性。為末。黃酒調服。汗出即愈。如得病重者。先以熟盞熨臍。或以白鷄冠血塗臍。男用雌。女用雄。

其效如神。

疝氣方

用荔枝核七個 炒枝子一錢二分 山查一錢六分 只壳一錢六分 萊萸一錢二分 牛膝

錢 木通一錢 長流水煎服

赤白帶奇驗方

聖愈方

良方補遺

三

徐受堂

白木錢五白茯苓錢二車前子錢一鷄冠花錢三水煎服效如神赤犯血道白犯氣道鷄冠花腎經聖藥單用亦好終不若此方之奇但赤帶用白鷄冠花白帶用赤鷄冠花反之為妙

白帶方屢用屢効

用鷄子一枚頭打小孔放硫黃末五六分用紙封好外用濕紙重重包裹火內煨熟空心燒酒送下連用三枚即愈○用鷄蛋一個戳一孔入白礬末一錢五分辰砂末五分用紙重重包裹醋浸濕火內煨透畧帶微烟存性去昏將蛋并壳為末加麝五厘分作二服每早熱黃酒調服即愈重者再服一蛋無不愈矣安胎萬全神應湯 治胎孕三月前後或經惱怒或行走蹶跌以致傷胎腹痛腰疼一服即安雖見血一二日未離宮者猶可安之倘先經三四五個月內已半產者及到月分畧覺腰骨酸脹

一服即安數服萬全矣屢試屢驗

當歸 白朮 黃芩各一錢川芎六分白芍炒白茯苓 炙黃芪

杜仲各七分熟地姜汁製八分阿膠珠六七分甘草三分如胸前作脹加紫

蘇陳皮各六分下帶或紅加地榆錢一艾七分見血加川續斷錢一糯米

水煎空心温服

濟生湯 治難產如神俟腰痛即服易產即三四日不生服此自

然轉動生下此方催生第一穩效

枳壳炒香附炒大腹皮姜汁洗炒甘草七分川芎二錢當歸五分

蘇葉八分水煎空心服

難產奇驗方

生半夏 白蘇 等分為細末每遇難產婦入或一二兩日夜不生急用此藥末一錢無灰酒送下不論橫生倒生胎衣不下俱

只一服無不下矣神驗之極

難產順生散

用婦人舊頭繩一條燒灰加入參一兩服之不論橫生逆生即順生矣神效之極百發百中真不可思議者也

生產三兩日極難分娩服之神效屢試屢驗

用真金箔十張溫水研勻再添溫水半鍾先令產婦虛坐又令一婦用兩手將大指按定產婦兩肩穴服下其胎即下矣。於潔淨室內紙書本府或本州本縣官姓名燈土燒灰水調服即產神奇之極屢試屢驗。用竈心土一錢為末酒送下仍酒調搽母臍中即產

產後無乳方

川山甲七片炒研土不留行三錢猪蹄同煮汁飲之其乳如泉

婦人難產方

用酒娘蒜油蜂蜜童便雞白各半盞煎溫服即下此方廣傳亦有陰功也

死胎腹中方

用芒硝二錢童便溫調服立下有一猫孕五子一子已生四子死在腹中用此灌下即下矣又治一牛亦下此方功效甚奇不可以平易忽視

急驚慢驚慢脾等風方

急驚屬陽屬熱其症在腑在表其身常熱其眼常開手足跳躍啼叫哭泣煩燥不寧者是也慢驚屬陰屬寒其症在臟在裏身常不熱眼常不開手足微掣精神倦怠大便或洩者是也又有慢脾風者手足不動遍身皆冷兩眼常合不能啼哭症至此極重屬大虛大熱非大溫補之劑不能回

春。

礞石礞石半夏姜汁陳胆南星 白茯苓各一兩蛇含石醋硃砂

全蝎 猪心血五錢麝香三錢金箔片一百銀箔片三百右各為

為極細末以僵蠶猪牙皂角石菖蒲麥門冬四味等分水熬成

涕膏拌前藥末為丸如櫻桃大量兒大小加減服之若急驚風

為熱症用川黃連薄荷生甘草三味等分煎湯再加生姜自然

汁竹瀝少許調服如慢驚風為寒症用製附子炙甘草等分煎

湯加生姜自然汁竹瀝少許調服每以一九二九為止凡小兒

一二三歲為驚風十歲上下俱為癲癩不論大小皆宜以此藥

治之修合時忌雞大婦人及有喪服之人藥盛貯磁器中以蠟

密封此統治驚症之仙藥也或刊刻廣傳修合濟世功德無量

童氏于金保命散 治小兒一切痰喘急慢驚風撮口臍風等症

真牛黃 真大冰片 琥珀各五厘 甘草一分 全蝎 疆蠶 川黃

連姜汁拌炒各一分五厘 硃砂 明天麻 陳胆星各二 共為極細末貯

磁瓶用黃蠟封口用薄荷燈心金銀煎湯調五七厘不拘時溫

服但能灌下雖將死亦活神效無比有力者宜修合以濟世最

妙

紫金錠 治小兒急慢驚風其效如神。

防風 薄荷 明雄 天竺黃各六錢 明天麻 全蝎 白附子

鈎藤勾 乳香去硃砂各五錢 陳胆星二錢 琥珀一錢 麝香一分

真冰片一分 共為極細末神麴一兩打糊成錠金箔為衣每用

一錠或半錠淡姜湯磨服。

秘傳至寶丹 治小兒驚疳諸症奇效非常先賢合三方面成一

丹隨證調引諸病如遺保嬰之術至矣故曰至寶有力者宜多

修合以濟世最妙。

七氣散五兩妙香散五兩六一散四兩胆南星陳者佳一兩共為末合一處煉

蜜為丸如龍眼大飛條砂為衣每用三歲以上一丸五歲以下

二丸隨證用引研服急驚薄荷湯下慢驚人參白朮湯下

感寒發熱夾驚葱薑湯下疳積身瘦肚大青筋手足細大便

泄瀉小便如泔陳米湯下積聚腹痛姜湯下傷食嘔吐瀉

痢姜湯下赤白痢疾陳米湯下大便秘結大麻仁湯下

小便赤澀車前子湯下發熱薄荷湯下煩渴燈心湯下

霍亂紫蘇湯下喘咳麻黃杏仁湯下諸病後無精神少氣

力不思飲食姜棗湯下七氣散者劑補兼行之劑也陳皮

去青皮各一兩三稜醋炒黃芪錢藿香各五錢茯苓二兩桔梗兩益智仁

各五錢甘草錢甘松各三錢菝葜兩妙香散者安神止氣之法也

木香六錢遠志肉麝香五兩山藥炒一兩粉甘草炙一兩白朮一兩

人參五錢六一散者天一生水地六成之義也六一散四兩扶神

一兩加胆南星者治風痰耳

布袋丸治小兒一切疳疾

夜明砂淘淨二錢人參錢白蕪荑錢史君子錢胡黃連以上各錢川黃

連姜汁炒砂仁去殼枳榔以上各錢真阿魏八分木香五分麝香一分五

疳者只用一分神麩錢以上共為末神麩打糊為丸用時細絹做一袋

精猪肉無皮骨翳膜者或半斤或四兩全藥一丸入袋內將袋

口紫緊新砂鍋淡煮熟與小兒吃藥丸隨意大小若大的重至

二錢可配肉半斤小的重一錢二分可配肉四兩隨小兒食性

酌量可也每藥一丸煮肉三次初次俟肉煮爛下藥二次肉煮

半爛下藥三次肉藥全下其肉湯留少許淘飯與小兒吃不必

拘定一次吃完連服數次百病盡除神效之極不可輕視寶之珍之

小兒不出痘秘方 此方得自異傳效驗之極

羌活 防風 升麻 麻黃 生地 黃柏各五分 歸身 黃連

甘草各三分 柴胡 乾葛 藜本 川芎 黃芩酒炒 蒼朮各二分

細辛 白朮 陳皮 蘇木 紅花各一分 連翹 吳茱萸各半

以上藥合為一劑每逢立春立夏立秋立冬之前一日晚用水

二鍾煎八分露一夜如遇下雨露在簷下次早溫服於一年之

內只服四劑永不出痘即服一二劑出痘亦少服過四劑再不

必服但小兒服藥若瀉乃胎毒去也逢二次服則不瀉矣亦有

初次不瀉者是胎毒輕也同志者若刊刻廣傳功德無量

又方

金銀花揀淨 六安茶各半 陳皮各半 共為粗末湯代茶每日飲數次

終身不出天花雖出亦稀神異。用真蔬油燉水豆腐於春分

秋分前後半月早與小兒食此方驗者甚多勿以平易忽視

痘瘡壞疔力 危黑者人將棄之下喉即活

人參三錢 陳皮一錢 蟬退五分 玄參 當歸各二錢 荆芥穗炒 水二鍾

煎八分灌下喉中即活痘如初起好者不可服必俟壞乃可服

此一劑不必再劑也神效

小兒痧疹發不出方

櫻珠四五斤入磁罐內密封埋土內過雨三個月俱化水矣遇

痧疹不出最危急者取此汁一杯罌口下垂死回生經驗無

比不可忽視有志仁人多預製以濟人功德不小。用西河柳

煎湯去渣半盞用芫荽蘸水擦即出神效無比但洗時勿塗其

頭面又忌夜間洗蓋疥疹晝發而夜發也乳母並兒再以西河柳煎湯飲之更妙

小兒各種火丹 丹毒火症也得於胎熱惡毒故小兒出胎之後多有是症近則五六日遠則兩三月其形症不同總為丹毒人腹腹脹不乳者死

飛灶丹從頭腫起用葱汁塗 急灶丹從頭上起紅腫痛用赤

小豆末和鷄子清塗之 鬼火丹從面上起赤腫用灶心土研

鷄子清塗之 天火丹從背上起赤點痂桑白皮為末羊脂調

塗 天灶丹從兩臂赤腫黃色用柳木燒灰水調塗之 水丹

從兩脅虛腫起用生鐵剉末猪糞調塗之 胡吹丹從臍上起

黃腫用檳榔末米泔水調塗之 烟火丹從兩手起赤白點用

猪槽下土麻油調塗之 野火丹從兩脚起赤腫用乳香末羊

脂調塗之 胡漏丹從陰起黃腫用屋漏處土羊脂調塗 繼

腰丹腰生一紅瘤兩邊生紅筋纏至臍必死用金墨磨濃和雄

黃末塗之 冷丹白色塊者用姜皮一撮煎湯洗之 熱丹紅

色塊者用紫背浮萍煎湯洗之 丹瘤或生頰下如櫻桃突出

色赤而光者是也宜以綿羊腦子同朴硝研爛貼患處立效或

蓖麻子同麩研和敷之 丹疹遍身紅點如酒米者是也川漢

防已半兩朴硝犀角黃芩黃芪升麻各一錢加竹瀝煎服即愈

火丹遍身紅腫是也用當歸赤芍甘草大黃等分每服三錢

水半鍾煎三四分食後服或用前丹疹方服亦效 又火丹發

足踝者用葶藶菜搗敷隨手即消 赤遊風忽然腫癢流行不

止一處是也此症至急救遲則死用雄黃五倍子等分為末醋

調塗之或用無名異為末汁調塗立消或用鐵銹水塗之即消

或用新生荷葉搗爛入鹽少許塗之即消。

小兒夜啼不止狀若鬼祟方

用蟬腹下半截為末一字薄荷湯入酒少許調下立止。古人立方莫知其妙。用私竊官府硃筆在小兒磨上寫一田字勿令人見即止屢驗。

一切癰疽疔瘡癩毒 善能內消。化木從小便而出。萬無一失。極效無比。

乳香 半夏 貝母 白芨 知母 金銀花 天花粉 皂

角刺 穿山甲 如患在上身者用頭十截也。如患在下身者用尾半截也。 以上各一錢用

好酒煎溫服渣搗爛加蜜調敷患處。若乳以蜜木潤之一夜消去。

一切無名腫毒神驗方 如患在上身者肥服患在下身者空心

服

全當歸 一枝要一兩重者 金銀花 二兩 木通 五錢 甘草節 二錢 廣膠 一兩 以上用

無灰酒鍋內煮。其酒不拘多少。服藥後益量飲醉。即益煖出汗。其毒即消散而愈。神效無比。

一切無名腫毒初起神效方

用大瓜萋一個。頂切去一片。將子挖盡。裝入婦人梳下油膩亂髮一大團。再入明礬三錢。以滿為度。仍將切下一片蓋口。通身用黃泥封裹。以新瓦微火煨過。去泥。將存性瓜萋研為細末。黃酒送下。未潰者內消。將潰即出膿。收口。重者不過三服。神驗。一切無名腫毒未破者。

醒南星。大黃等分為細末。燒酒調塗。露頂。即消。神效。○用尿缸底。刮下研細。濃濃四圍。露頂。乾。再敷。潤之。即消。神效。○用蟹壳

一個瓦上炙脆為細末。臨睡黃酒沖服。即消。患小者一壳。患大者二壳愈矣。○用芙蓉葉或根皮或花或生搗或乾研。和白蜜調塗四圍。中留頭。乾則頻易。初起者消。已成者膿出易斂。妙難言述。加赤小豆末。其效更速。○用黃明牛皮膠四兩。穿山甲四片。新瓦上全燒存性。研末黃酒調服。極效無比。○用生藥。鯽魚全搗爛。敷之即愈。極效無比。○用葱連鬚同白。蜂蜜搗極爛。敷之露頂。如重換敷三二次即消。如已有膿將破。不可用。○用芥菜子末。同柏葉搗塗即消。神效。

瘰癧內消驗方

鼠糞七錢 大楓子五錢 巴豆二錢 共搗入大鯽魚肚內。用紙包縛。再用黃泥封固。如法煨煉。俟烟盡。取出冷定。研為細末。米糊為丸。菜豆大。每服二錢。空。心黃酒下。十日全消。神效。

瘰癧神驗方

用鷄蛋一枚。頭打一小孔。採綠萼梅花。將開者七朵。入蛋內封好。煮熟。去花食蛋。如此七枚。全愈。此方效驗無比。不可忽視。

肺癰奇驗方

凡人肺癰初起。時欬而兩胸脇即疼者。是也。即宜速服此方。神效。玄參半斤 天冬四兩 桔梗二兩 炙甘草兩 水十碗煎至二碗。再用蒲公英五錢 金銀花五錢 再煎一碗。飯食後服之。初起者即消。日久者即生肉。奇方也。○用鹽鯢日久。竹油燈絡子一個。連宿油膩燒灰。存性為末。黃酒送下三錢。即愈。極神效方也。不可忽視。

乳癰神驗方

苦瓜兩 穿山甲兩 酥炙每瓜一 錢。人不 壯只 用五 分。粉甘草六 錢。每個分藥一半。挖一孔。將藥裝入瓜內。用好酒二斤。水二斤。同煮至一大

碗臨卧熱服渣搗爛再用酒水各一斤煎連服將渣乘熱敷滿乳用布捆住蓋破出汗無不立愈不論已破未破只用一服神效無比

熨法膏 治乳癰吹乳登時立消此方奇而穩甚效

葱連根搗爛鋪乳患處上用瓦礫盛灰火熨葱上一時葱蒸熟出汗即愈或以葱搗爛炒熟敷上冷即換再炒亦可極效

吹乳神效方

葦地中蚯蚓糞錢二葱子錢一共為細末醋調敷上乾則易之三次

未有不愈者○用雌鼠糞鼠糞雄者圓雌者尖用尖者同葱白搗爛熱黃酒

冲服蓋煖出汗即消初起者神效若十數天後成膿將破者不效○用鹿角燒灰為末酒送下三錢出汗即愈

楊梅瘡神驗方

半角 羊角 穿山甲各二兩皂角刺錢三生大黃兩二羊角穿

山甲三味用濕紙裹煨焦取淨末如前數全皂角刺大黃合為

細末每服五錢陳老酒調服出恭時宜於空地上解完即將土

掩之恐惡氣害人也間二日再服一服最重者不過三服即愈

神驗○用土茯苓二斤用石打碎豬胰子一個去油水四升同

又方

熬成二升去渣用汁再兌入好酒二斤金銀花生地桔梗當歸

各五錢熬成二升溫服渣再煎減半四服全愈此天下第一奇方也

良方補遺

良方補遺

良方補遺

良方補遺

大黃 蘇黃 黃芪 陳皮 蟬退各四兩用猪肉一斤四兩分

作六塊酒六碗水六碗煎至六碗每日食肉一塊湯一碗分作

六日吃三天發汗三天長齊三天貫漿三天結靨共十二天全

愈並無回毒。屢驗。只用一服。不可以平易忽之。雄黃一錢五分杏
仁去皮三十粒輕粉錢共為末。先以洗淨瘡。用雄豬胆汁調搽。二三
日即愈。百發百中。天下第一方也。

楊梅瘡毒臭惡不堪者

橄欖核一個燒真冰片三厘共為細末。用蘇油調塗即愈。無比效
方也。用圓厚五倍子一個。去頂。砂仁三顆。搗碎入子內。仍以
頂合好。用濕紙包裹。火內煨極黑。取出為末。搽患處。即愈。或竟
用五倍子燒灰存性為末。加真冰片少許。搽患處亦效。用大
訶子。燒灰。入麝少許為末。以荆芥黃柏甘草馬鞭草葱台煎湯。
將疔洗淨。然後敷前藥。即玉莖爛一二寸。用此效愈。

瘡方

硫黃 木炭灰 等分為極細末。將癰用穿山甲刮破。擦上效

次即愈。用馬蹄決明子一兩為末。入水銀輕粉少許。研不見
星。將癰刮破。搽上立瘥。用馬蜂窩一個。放瓦上。以枯礬末填
滿孔內。炭火炙焦為末。用蠟脚醋全調即愈。

痔漏神效方

當歸酒洗川黃連酒洗象牙末各五錢小川芎酒洗淨槐花 乳香各二錢

露蜂房一個槐樹上者佳黃蠟兩溶化。入前藥末。為丸。桐子
每服五六十丸。空心瀉湯送下。至五日。漏眼內退出肉管。待

二三指長。用剪剪去。再退出。再剪。肉管盡出。自然從內生肌。長
肉愈矣。神驗之極。金銀花揀淨甘草一斤以上二味。各將
半斤。為末。煉蜜為丸。如桐子大。每服二錢。一日三服。將剩下各
半斤。浸黃酒送藥。一料即愈。一切痔。俱補益漏管。漸退盡。神效
無比。

痔瘡神驗方

用生甘草節大者一百個為末。煉蜜為丸。桐子大。每空心用槐米湯送下。輕則三錢。重則五錢。服半粒。或一粒。即愈。戒房事百日。永不再發。神驗無比。此天下第一奇效方也。若痔腫痛難忍。發來極重者。用地骨皮一兩。荆芥。槐角。殼。金銀花。各三錢。煎湯頻洗。午後空心再進一服。自然漸漸消去。而愈。不可以平易忽視。

廉瘡不拘遠近神效方

用舊爛牛皮鞋掌子。取下依碎。陰陽瓦煨。存性為末。麻油調敷。即愈。神驗之極。用油麵。微子一兩。把葱白五六根。全搗極爛。將瘡洗淨敷上。用布紫緊。即愈。神效無比。不可忽視。

凍瘡手足裂方

用肥鷄油。燉化七錢。入黃蠟三錢。攪勻。凝定。敷患處。一夜其裂即合。神效。

牙痛當治于未痛之先。常用此散擦牙。永不牙痛。

青鹽^三平砂^三胆^凡分^三用^三鹽^內皂^角錢^一共^為細^末撿^大個^五培^子七^隻將^藥末^勻裝^五培^子內^用火^帚每^隻包^過七^次又^共包^七次^將黃^泥包^裹炭^火煨^煉出^綠烟^為止^取出^裝好^每早^辰擦^牙一^次其^功甚^大曉^園驗^方

鼻淵良方 辛夷^八分^八細^辛分^七蒼^耳子^一錢^一防^風分^八川^芎分^五甘^草分^三

白芷^八分^八水^煎連^服四^帖愈^忌牛^肉

疝氣方 用荔枝核七隻 杜枝子^一錢^一山^查分^一錢^一只^壳分^一錢^一菜

黃^一錢^一牛^一錢^一木^一錢^一通^一錢^一長^一錢^一流^一錢^一水^一煎^一服

洗眼仙方 防風^五分^五礪^砂半^二厘^二胆^凡半^二厘^二同^煎水^洗愈

夏二十兩滾水泡七次飯赤豆七十五兩焙紫丹參一百十
 煮晒乾淨末一百六十兩取淨砂一兩瓜面往水
 淨末六鬼箭羽末六十兩草藥店買砂一兩取淨末十
 兩千金子五十兩新者佳去壳去紅茅大吉肉淨骨十七兩焙
 取淨末油取淨末十二兩水北細辛二十四兩取淨末十二
 十二兩雌黃飛淨取淨末十二兩花細辛二十四兩取淨末十二
 兩川烏乾焙取淨末十二兩滑石十四兩淨取正麝香一錢
 研去皮渣不見
 大取淨末三兩
 已上共二十七味選上好道地者擇辰日龍虎日天德月德黃
 道上吉日齋戒蒸服精心修治逐件為細末每樣藥末逐件兌
 准分兩照前方不可輕重君臣相配合式為効陳設拜禱重合
 勻以糯米粉糊和之石臼杵千下勿令婦人雞犬孝服并不修
 容止之人見之用範子印成錠每重一錢作三次用之凡天行
 疫症以一錠用絳囊盛之懸之當胸或繫左肘諸邪退避與疫

之人全床共處永無纏之患如邪已中人伏藏未發畧見寒熱
 恍惚喉燥昏迷狂悶頭痛服之即安瘟疫陰陽二毒傷寒心悶
 狂言亂語胸膈壅滯邪毒發急服此丹霍亂腹痛絞腸痧等症
 或汗或吐或下可保平安腹痛中蠱毒狐狸鼠莽慈蒿河豚毒
 死牛馬肉毒鳥獸毒小兒急慢驚風五疳五痢癰疹瘡癩并昏
 憤不醒牙關緊閉已上諸症皆用薄荷湯磨服中風中氣口眼
 歪斜言語蹇牙關緊急筋脈攣縮骨節風腫手脚疼痛行步艱
 難婦人腹中結塊并月經過期不至腹內作痛或為邪所交腹
 中作痞但有孕不宜服男婦頭暈急中顛邪鬼氣狂亂喝叫奔
 走并失心羊頭諸顛等風已上皆用好酒磨服頭疼太陽疼用
 酒磨入薄荷爛太陽穴瘧疾臨發時取東流水煎桃柳枝湯磨
 服傳屍癆瘵并女子為屍虫所噬俱用清水磨服自落水頭

上皆爇者。及怪迷。死木隔宿者。皆用冷水磨。產赤痢。痢血。凉水磨服。白痢。姜湯磨服。心脾痛。酒磨服。或姜湯磨服。牙疼。酒塗患處。及含少許。吞下。諸痔。并便毒。堅硬未成膿者。若痛大小便難者。清水磨服。癰疽。發背。無名疔毒。對口。天蛇頭等。一切惡瘡。諸風癰疹。赤腫。諸瘤未破時。皆用淡酒磨服。及用冷水磨塗瘡上。日夜各數次。已潰者。不官服。湯火傷。火傷。鼠傷。蜈蚣傷。蛇傷。皆用水磨。參。患處。并用酒磨服。補遺。凡飲食中毒。瘴氣邪。癰惡痢。皆用桃柳枝湯磨服。婦人鬼胎。鬼氣。皆用紅花酒磨服。病起倉卒。中風。五癰。中惡。傳疰。溺死。縊死。壓斃。胸中尚熱者。冷水磨灌。此藥乃衛身之寶。萬勿火烘。鹽滓。汗污。穢觸。孕婦血。癆忌用。

呂祖一 枝梅 治大人男婦小兒新久諸病生死難定之間用藥

芡實大一餅。貼印堂之中。點官香一枝。香盡去藥已後。一時許。藥處有紅斑。暈色。腫起。飛散。謂紅霞。捧日。病垂危。篤其人。不死。如貼藥處。一時後。無腫。無紅。皮肉照常。不變。謂白雲。漫野。病雖輕淺。終歸冥路。小兒急慢驚風。一切老幼。痢疾。俱貼之。紅腫即愈。此方用之。無不預知生死。

硃砂三錢 銀硃一錢五分 五靈脂三錢 麝香三分 葶麻仁五分 雄黃 巴豆仁各五錢 各研細於端午午時靜室中共研。加油臘脂為膏。磁盒收藏。勿經婦人女手。臨用豆大一圓。捏餅貼印堂中。其功立見。用過餅送入河中。

關夫子神授膨脹方 厚朴製黃連 黃芩 當歸 米仁 木香 紅花 草豆寇 製半夏以上各七分 升麻 吳茱萸 木通 大腹皮 枳壳以上各五分 甘草 柴胡 澤瀉 神麴 陳皮

夏方補遺

餘愛堂

青皮以上各共為細末每次姜湯送下五錢日進二服如三錢

日進三服五日見效十日除根

一筆描方 治一切無名腫毒神效四月間於田中收取蝌蚪數

升濾乾水裝入瓦罐內加入冰片三四分繫封罐口再用泥糊

勿令洩氣埋於不見天日土內六十四天取出盡成水矣遇患

無名腫毒之人以筆蘸水在於患處畫一大團圍之逐漸收小

中間留頭其毒即散神驗

防二症設投藥餌殺人其屬用法試驗最奇噴以鷄子四五枚煮熟去壳用銀簪橫門鷄子內透山管兩端三須乘熱置臍上使簪柄立臍中候鷄子微溫取簪驗看若果青黑色則係此症即一面將熱鷄子如前帶腹上輪流轉換使熱氣內達一面用葱之有根鬚者同椒姜搗爛敷臍上以艾炷灸之十餘壯通身汗出令鬚速脫母令脫腫一覺愈倘急切難得椒姜艾即葱一味亦可引粗草紙代艾炷灸之如簪柄不甚青黑則非陰陽二症矣

驚風痰熱立効仙丹 此方吳川霖施藥得來能治急驚若小兒

身有汗者服之即愈若慢驚脾氣敗者勿服

真陳胆星二兩上琥珀一兩明天麻六錢姜蚕頭錢六雄黃錢六西牛黃

二射香二錢薄荷葉六錢天竺黃一兩白附子一兩製大黃六錢赤金箔

六十張已上珍珠琥珀雄黃另研極細共研藥研勻用鈞藤

鈞藤三兩甘草二兩牙皂六錢同煎濃汁搗為小丸如茶豆大

小兒未週歲者服半丸一歲者每服一丸鈞藤湯化下一服即愈

化滯丸方見乾坤生意 藥流和先生箋驗方

理一切氣化一切積毒造化有通塞之功調陰陽有補瀉之妙

久堅沉痼磨之自消黑積乍留導之即去半夏二錢川連二錢

取爭丁香泡廣木香青皮各二錢四分橘紅二錢三稜四錢

未八分蓬木四錢八分共為極細末 巴豆去外壳用整者要

分用滾水煎一時去外衣及心再用上好寒醋二兩五錢浸八

時文火止用銅杓煎至乾巴豆似琥珀色將巴豆研如泥極細

運餘方

良方補遺

色

余受

色

為度同前藥拌和勻再用烏梅肉二兩是上焙乾研細末爭六錢用米醋二兩調杓內慢火調成膏入前藥和勻再用上白麵八錢打和為小丸如粟米大每服七丸或九九人盛者可服十三丸極矣

一治一切肚裏痛溫水送下 一治霍亂吐瀉津液嚥下立愈

一治小兒疳積空心服三丸冷米飲送下 量小兒歲數加減

一治食積肚痛若欲行積淡姜湯熱送下 瀉後飲冷米湯即止

一治水瀉冷水湯送下 一治赤痢甘草湯冷送下

一治白痢淡姜湯溫送下 一治小腸氣痛大茴香煮陳酒溫送下

一治番胃傷食嘔吐津液嚥下 一治一切食難化之物停滯為病就將本物煎湯送下假如停麵積麵湯送下肉積肉湯

送下 此藥力大遇熱湯則行遇冷水則止瀉孕婦不可服切不可多服

無相真人良藥方 人能遵此方存心行事自不生

此方端治人間一切不敬天地不孝父母無仁無義使心用機

損人利己諸般不正之症均皆治之用藥十二味開列於後

好肚腸 一條 慈悲心 一片 信行 十分 忍耐 三兩

溫柔 五分 本分 五錢 公道 三分 老實頭 一箇

正直剛 一塊 方便 隨用 陰隲 全用 小心意 七分

用聰明刀切向寬心鍋炒存性不必焦用金剛研細末三思羅篩過為丸如菩提子大不拘時辰用和氣湯送下忌六般發物暗中箭 笑裏刀 兩頭舌 草內井 無名火 平地風波以上六般發物犯一件即為真惡人若隨時佩服十二味即為真善人善有善報古今不會虧了一人惡有惡報古今不會放過一人報應只爭遲早世人不可不思

古傳養身詩

培養精元貴節房。節房非不用房也但有節制耳更祛塵累最為良。金惟半飽宜
 清淡酒止三分勿過傷。藥餌隨時應勉進。此句專為月功名有分
 不須忙。此句專為讀書幾行俚語若能味。便是長生不老方。
有病者言之

益桑正合一本合正發

我相親慈悲心

異人味与醋甜不五

地次苗命人間一匹不慈天賦不孝父母無子無養對心用蘇

無時真人真藥式

下疳及腎囊風囊癰諸症 附橫

下疳 玉莖生瘡謂之下疳

蘆甘石 乳香 血竭 黃連 各一錢

輕粉 五分 水片 一分

共末米泔水洗淨抹上立效 一川

蝸牛 焙乾研末 枯礬 各一錢

濕則乾摻乾則以香油調塗即愈 見抄本

歷驗神方 治疔瘡疔梗瘡

二蚕繭 出過蟻者燒灰存性 枯礬 五分 輕粉 二錢

兒茶 一錢 五倍子 一八

紅絹 方圓三寸一塊燒灰 共末酸漿水葱白川

椒煎湯洗搽神效無敵

一用銀珠 水煎輕粉五分 兒茶 一錢

老茶葉 三分 黃柏灰 三分 黃喝 二錢

溶化入前藥為丸作二十九好

酒空心下其効無比 靈秘丹

下疳陰瘡

蘆甘石 火煨酸泔五次一兩

兒茶 三錢

為末麻油調敷 即真

腎囊風 痒痛有黃水不乾者

蚯蚓泥同真粉

淨對井水調敷乾為妙永不

下疳囊風囊癰

下疳囊風囊癰

余愛堂

再發。若痒不可忍。用大葉楊柳葉一握。煎水乘熱燻洗。後以蚯蚓屎焙燥研末。搽之三四次即愈。一用牆頭上醬板豆草。或鮮或煎湯洗愈。綉毬花煎洗尤妙。姓伯玉方

陰毬開花。狗禰七煎湯入罐內。將陰毬掛罐口。離湯一二寸。俟

熱氣燻上湯將溫時。傾盆內洗毬。如此三日全愈。集驗

囊癰。瓜蔓五錢。甘草節。金銀花各五錢。連喬。

柴胡。青皮各七錢。水煎服愈。新都醫案

囊癰潰後摻藥。蚌壳。黃連。青黛。各等分研

細敷之。秘方集驗

橫痃。青壳雞蛋一個。蒺藜一合。好酒煮蛋熟。去壳再煎服立愈。

長興莫氏傳

瘋斑

大麻風。老蝦蟆一個。白砒三錢。銅綠二錢。人中白二錢。研末裝入

囊口內。線縫好。外以泥包裹。火煨烟盡為度。取起去泥。約有五

錢。隨輕重配苦參。瓦松各一兩。神曲打糊為丸。如梧子大。每服

五分。滾水或麻黃湯或酒下皆可。眉毛先落。肝經受病。加石

決明。先損眼目。心經受病。加梔子。面起紫泡。肺經受病。加

葶藶。遍身如癬。脾經受病。加白朮。脚底先破穿。腎經受病。

加破故子。五死飲。脾死。麻木不仁。蒼朮湯下。血死。潰爛

生濃。生地湯下。內死。割切不痛。苦參湯下。筋死。手足萎落。

續斷湯下。腎死。脚下有孔。薏苡牛膝湯下。秘方集驗

洗藥。每日洗。桑皮。大黃。芒硝各一撮。水煎。無風處洗。如有

更加鴿屎同煎如爛用琥珀末搽患處此方神驗千金不易錄

凌霄散 治厲風神效 蟬退 地龍 去土焙 白姜蚕 全蝎 各七錢

凌霄花 五錢 共末每服二錢酒調下不時沐浴每浴坐湯中浸一時久服藥神效 赤水玄珠

白點癩 詩云 白點紫癩一般癩 附子硫黃最有功 姜汁

調勻茄蒂擦 但患痒處並無踪 右將粗布擦洗患處令淨

以茄蒂蘸藥擦之 白癩用白茄 紫癩用紫茄 醫方纂要

紫雲瘋 甘草 一兩 川烏 姜汁炒 草烏 黑豆炒豆熟去豆用 防已 各五錢

牛膝 七錢 羌活 上部用 獨活 下部用 川芎 白芷 馬兜鈴 各錢

共末每服七分好酒下外用蛇床子夏枯草煎湯洗數次風

塊即退 集驗方

鴉掌瘋 槐皮 大麥 花椒 地骨皮 艾葉

鴉屎 白芷 煎湯先燻後洗每日數次愈當用猪蹄湯洗

先以滾水洗手浸皮如白浮色石柏枝煨燒為末用滴酒調藥

半酒盞如糊搽之愈 雄黃同穿川山甲火燒燻之數次自愈

乃呂祖法也 集驗方

一用真艾 四兩 水四碗煮數滾入大口瓶內用麻布二層蓋紮將手

心放瓶口燻之如冷再熱再燻無不應效 積德堂孫氏方

一用鴿子尿 水龍骨 各一兩 北常山 一兩 錢為末將

桐油擦掌上患處用藥燻之數次即愈 一用 猪胆 一個

黃柏 八分 乳香 五錢 煎猪油 一兩 擦之 青浦徐方 臘糟 四兩

鶴膝瘋 三陰之氣不足風邪乘之兩膝作痛久則 臘糟 四兩

肥皂去子一斤芒硝 五味 砂糖各一兩 姜汁半碗 研勻日日塗之加火酒更妙 一用 陳艾 菊花 二味作護

膝內久自除患抄錄

神效散治鶴癩兼治附骨疽皮色不變大腿通腫疼痛無奈及癩後脚痛緩弱不能行或腿膝腫痛等症

人參二錢 防風 白木 附子 當歸 白芍

杜仲 黃芪 羌活 牛膝 甘草 熟地各一錢

姜三片 水二碗煎半食前服秘方集驗

汗斑 蜜陀僧六錢 雄黃三錢 硫黃三錢 先以姜擦斑次用藥末搽之次日即焦永不發抄本

一方單用蜜陀僧為末隔年釀醋調搽隨手而愈醫書

酒刺 蛇床子 紅豆 等分為末早洗晚搽周氏秘錄

脚氣足瘡

脚氣始受于濕復挾風寒暑熱之邪而成故先起于腿足必脚屈弱而舉動轉筋肢節疼而足脗痛小腹不仁心中悸動胸前便澁但發熱頭痛身疼之候絕似傷寒人多誤治仲景以脚氣類傷寒症另立篇目以別之蓋為此也羅謙甫云南北脚氣受病不同南方卑濕濕每襲虛而病起于下此脚氣從外受也北方地高無濕共俗飲潼乳酒麪以飲多快食為能或奉養太過亦滋其濕水性潤下氣不能拘故下注于足而成腫痛此脚氣從內受也當推究所因而治之

脚氣上攻結成腫核及一切腫毒 甘遂末水調敷 甘草汁服即消百一選方

濕脚氣足痛腫腫須服防已飲 白木炒 犀角 蒼木炒 生地炒

脚氣足瘡

黃柏酒炒 木通 防已 檳榔 川芎各八分 甘草稍七分

水煎熱服。有熱加黃芩熱甚及天冷熱加石羔。痰加竹瀝姜汁。

或南星。便秘加桃仁。小便澀加牛膝。秘方集驗

腿轉筋上冲入腹 速用木瓜吳茱萸各一錢 食鹽五分 水二盞煎半服。即愈。若不急治。痛冲心上則不救矣。願集

蒼朮散 治一切風寒濕熱足膝腰臂解 蒼朮米泔水浸一日

黃蘗去粗皮酒浸一日 作一服用。水二鍾煎半。食前服。日二三服。醫方選要

脚痛膝痛不能舉步者 山查肉 白夕利各等分 兩蒸兩晒為末。蜜丸。如梧桐子大。每服三錢。用白湯下。或一觔。或一斤。無不愈者。

脚墊痛 人走長路緊急被石塊脚底墊腫不能行步痛不可忍。急用舊草鞋浸尿桶內一夜。將新磚燒紅以浸濕草鞋放磚上。隨以腫脚踏上。火逼尿氣入內。即消。若不早治。恐潰爛難愈。如走長路脚腫疼痛亦用此法。即消。懷德堂秘錄

一粒金 治風寒暑濕不問遠近 白膠香另研 草烏去皮臍 五靈脂

地龍土去 木鱉搗去油各 乳香 沒藥 當歸各七錢半

別香二錢 京墨燒烟盡一分 糯米粉和丸。芡實大。臨發時空心酒化服。一丸。趕到脚面上赤腫不散。再一丸。趕到脚心。出黑汗。乃除根。如病在上。食後臨卧酒下。自然汗出。及中風癱瘓麻痺。不仁。手足不遂。偏枯酒下。二丸。日三進。初中風不省。研一丸。酒調灌下。一醒。是驗。萬病回春

脚氣 止痛

調灌下 一醒 是驗 萬病回春 脚氣 止痛

足患治濕氣雨

共為一包艾葉二兩極熱燒酒擦患

痛止為度抄錄

脚心腫痛因久行久

蚯蚓尿水和敷一夕即愈

風癢足瘡遠近流

黃柏去皮不拘多少用猪胆汁塗搽晒乾

數次酥透柏皮方研末先用花椒煎湯洗過拭乾隨以末藥敷

之二三次即愈秘方

脚指縫爛瘡

鵝掌黃皮焙乾燒灰存性為末搽

或因暑

爛瘡細茶嚼爛敷之單方

兩足血風痛

馬齒莧焙乾淨

黃丹

黃柏

兒茶

枯礬各三錢輕粉一錢

共末生桐油調攤紙上先用葱

椒湯洗淨貼之效單方

爛腿瘡

乳香

白草霜

密煤各三錢

沒藥一分

血竭

龍骨

輕粉各一分

生芝蔴撮

生雞子調做隔紙膏貼懷德堂方

裙帶瘡

嫩長桑根皮用不落水猪油搗敷乾即換數個愈心鏡傳

一用梨葉百片猪油二兩將葉在鍋內炒拌次下上好白蠟二兩

亦搗爛拌在內令化在藥上又下塩一兩亦拌在內燒用微火

不可使藥炒爛取起待冷貼上神效單方

裙風瘡

蘆甘石醋煨研細麻油日日調敷立愈歷驗仙方

肉刺雞眼

草麻子為細末敷上一二時其刺自出痛即止秘方

雞眼

生蜈蚣一條搗爛少許貼上片時拔根抄本

脚城 葶薺半個貼患處過夜次晚再貼五六夜其城連根脫出

一用葱根葶薺搗汁一碗煎再取松香四兩麻油再煎滴水成珠

方入前汁攤膏藥貼即落 一方 蜈蚣一條 礪砂等放

鍾內拌埋地七日取出銀簪點上即脫 秘方 秘錄

驢眼瘡 生脚脛骨週圍如腫瘡樣 田螺去壳搗爛敷數次即愈 秘方 集驗

脚折裂破 此冬月患此行步疼痛 用湯洗淨拭乾將黃蠟一兩溶化入松

香末三分用少許安刀頭上溶化滴入折中即愈神效 赤珠 玄珠

甲疽延爛 綠凡 五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之 每以塩湯洗拭用末厚敷以

軟帛絞裹當日即汗斷瘡乾每日一遍塩水洗淨其痂乾處不

須近洗後或作白膿即擦破敷之自瘥 外臺 秘要

嵌甲入肉 凡石燒灰敷餅惡肉生好肉細細割取甲角愈 肘后 方

末藥方 治脚上一切亂瘡 珍珠 琥珀 各一錢 輕粉 黃丹

乳香 去油 沒藥 石羔 各一錢 沿牛壳 四錢 共末敷 抄本

解諸毒 附吞 銅鉄

中毒 一覺腹中不快即以生豆腐試之入口不聞腥氣此中毒

也急以升麻煎濃連飲以手摳吐即愈 各部 供載

蠱毒 先取炙甘草一寸嚼之嚥汁若中毒隨即吐出仍以炙甘

草三兩生姜四兩水六升煮二升日三服若含甘草而不吐者

非毒也 微分 鐸

蠱毒 昔李熹為雷州推官得治蠱方毒在上用升麻吐之毒在

腹用鬱金下之或合二味服之不吐則瀉活人甚多 范石湖 文集

解相反藥毒 蚕退紙 即出過毒之帛 燒灰細研一錢冷水調下頓服效

解百藥毒 服藥過多生出毒病頭腫如斗唇裂流血或心口飽悶或臍腹撮痛者 黑豆 即馬豆 各半 煮汁服并食豆寬愈 附子川烏天雄斑毛毒 单以

馬料豆煎汁服。皂凡毒。急取麵糊一鉢服之。總集

砒霜毒。菜豆粉。細篩黃泥。四兩生雞清九個。共一處以浸豆水。

和服即解。若有黑羊血再吞更妙。凡服砒人不可仰卧。恐毒流四肢難治。愈後烟酒姜椒煎炒。須忌百日。願體

解信毒。速取梁上燕子窠。用井水三四大碗。放水桶內。將手多攪調之。用夏布手中如柞腐法。篩去泥葉。取所攪之水連灌二

三碗。自吐。不吐再灌。吐盡方醒。方單

斷腸草毒。雞抱卵劈開。以清油調勻。灌之。或服生雞蛋三四枚。

或服熟羊血碗許。總宜吐盡方醒。願體

鉛粉毒。婦人打胎。服之不惟不效。每至致死。不能求生。不得且生子多癡呆。身體發瘡毒。有悞服者。急搗蘿蔔汁飲之。秘方

開口椒毒。吐白沫。身冷欲絕者。地漿水飲之即解。金匱

野蕈毒。飲地漿水三四碗。地漿能解百毒。真神方也。單方

牛肉毒。烏柏樹根皮酒煎。同熱酒服。或菊花連根搗汁酒服。同

犬馬肉毒。杏仁。去皮粒以百沸湯和仁絞汁。作三服。喫或急喫

冷粥一碗。頃刻毒解。思食。單方

菌子并河鮑毒。多服金汁即解。如難得。干地上挖一潭。用水和

泥稍定。服水一二碗。即解。或服紫金錠更妙。錢氏

燒酒毒。火燒悶絕。或受烟煤毒。用白蘿蔔汁。或熱尿灌。俱效。願體

悞食螞蝗。嗜芹菜者。多此疾。空心食地漿水。少許。自下。同

蠟毒。藉汁。蒜汁。冬瓜汁。黑豆汁。及紫蘇汁。俱可解。同

食毒驚。飲藍汁。數碗。或銚膏水亦可。自死六畜毒。黃柏搗

末水調一錢或壁上黃土二錢水調服或飲人乳一碗單方全集

黃鱔魚毒 食此犯荆芥能害人服地漿解之集簡方

白果毒 射香一分煎湯服 豆腐毒 蘿蔔湯飲之即解

草本 煤炭毒 一時運倒不救殺人急以新汲清水灌之言瑤方

鹽滷毒 用生豆腐漿灌下再以鵝翎絞喉數次令吐即活古方

馬大河鮑諸魚蠟毒 心下堅硬或腹脹 盧根煮汁服梅師方

誤食桐油 令人發吐不止 急飲熱酒即解秘方集驗

吞銅錢 羊脛灰煮粥食之神效本草

吞針 蝦蟇眼一只木通湯吞下其針即穿于眼內從大便而出

小兒吞針 將半生牛熟出芽蚕豆搗爛川葶汁為丸吞下秘方

五絕急症

人遇暴症急如風雨延醫不及無不束手待斃若口中有氣心頭

尚溫者急宜按方速治免諸橫妖切莫大焉

五絕 皆用半夏研細末冷水和丸如小豆大塞鼻中并燦末吹

耳內心溫者死一日犹可活此扁鵲法柰人不曉因氣絕多不

救惜哉又急于人中穴及兩足大指甲離甲一韭菜葉各炙三

五壯即活感應篇後集

救自刎法 自刎之人斷食額者可治斷氣額者難治若食額氣

額俱斷更難治全要知覺早急將頭扶住乘其氣未絕額未冷

用絲線縫合刀口據方書用桃花散用石灰二升大黃四兩切

黃將灰細篩收貯瓶內過月餘去火氣 降香末松香末搽治柰

五絕

一時難得迅速之際延醫不及急將活雞一二隻扯下熟雞皮冷則無用將線縫刀口週圍纏護用軟絹帛并棉花扎之外將女人舊布裹脚週圍再纏五六轉勿使泄氣其中自然合一令患者仰臥以高枕枕腦後使頭鬱而不直刀口不開冬夏避風衣被蓋煖若氣從口鼻通出方用白米一合入人參一錢姜三片同煎粥湯飲之接補元氣再延名醫調治可也願体集

鬼魔 灶心土碎打井水調二錢更挑半指甲許吹入鼻中如不醒用艾炙人中穴并兩足大指離甲一莖葉各七壯秘方集驗

凍死 凡凍將死者以灰燒煖盛囊中熨心頭冷即易熱火若不先溫其心便以火烘則冷與火爭必死感應篇載

渴死 用路上熱土大蒜切研爛水調去渣飲之方

癩癩狂亂附鬼崇

驚氣丸發則牙關緊閉涎潮昏塞醒則精神若痴

附子 木香 姜蚕

白花蛇

吉紅

天麻

麻黃

乾蝎

南星姜汁浸一

夜各

蘇子一兩

硃砂錢半

加冰片少許

蜜丸如龍眼大每服

一丸金銀薄荷湯下

一軍犯法臨刑得釋驚痴一丸而愈

一婦痴十年去附子加鉄落亦愈許學士方

遂心丹治癩症

甘遂末三錢用猪心取三管血和藥入內縛定紙

裹煨熟取末入辰砂末一錢分四丸猪心煎湯調下大便下惡

物為效不下再服濟生方

經驗方

鬱金七兩

明凡三兩

為末糊丸每服十九

一婦癩

狂十年服此初覺胸中有物脫去神氣洒然再服全愈李時珍製

歸神丹 猪心二個切。入硃砂二兩。燈心三兩在內。麻繫石器煮。一伏時。取砂為末。同茯神末三兩。酒打丸。梧子大。每服九九。漸至二十五丸。麥冬湯下。甚者乳香人參湯下。百一選方

癩狂 先將病人綁伏。燒當心下來。三指灸七艾。或九艾。再灸兩

太陽六七艾。次用 辰砂三錢 川貝三錢 酒服二次。再用

海風藤半錢 鳳尾草半錢 石菖蒲三錢 川貝半錢 服五六貼。或再服

紫金錠一二錢。愈後。用蘆蒂棗肉為丸。每丸三分。服至三九全

愈。遵此治法。百試百驗。衛生備用

治狂不眠 人參 棗仁各一兩 辰砂五錢 乳香二錢五分 蜜九彈

子大薄荷湯下。一人緣兵火失心。服二十九而愈。神效。赤水玄珠

夜夢亡鬼 人參 黃芪 枸杞 苡仁 白木各錢半

當歸 遠志 茯苓 木瓜 陳皮各一錢 甘草五分

水一鍾。入猪心血一枚。煎八分。飲四五貼。自愈。新部治案

久癩 用不落水猪心一個。去內心血。入 射干三錢 泥封固。煨

待紅取出。存性研末。每服三錢。百試百驗。秘方總集

中諸鬼祟 人為鬼附。昏迷笑哭。或作鬼語。急將兩手大指縛作

一排。用艾圓嵌中間。瓜中盡頭連肉處。灸七壯。或十七壯。鬼即

去。若猶昏沉者。用 麻黃三兩 杏仁七十粒 甘草一兩 水二碗。煎

半灌之。愈後。仍服參芪等補正之藥。秘方集驗

尸厥 由入廟吊喪。問病而得者。 用附子七錢。重者泡熟。去皮臍為末。 分二服。每服酒三盞。煎

一盞。如無附子。生姜汁半盞。一盞。開煎百沸。連灌二服。即醒。

卒厥 無論中風寒暑熱。鬼祟邪氣食痰。 生姜汁一鍾。童便一鍾。調服。立知人事。單方

中惡心痛 殺白烏骨雞薄心即瘥 鬼擊用血塗亦效李時珍方

鬼箭打 鐵屑細淨 胡桃淨肉 桃仁八 全入磁器內加好酒

四觔隔湯煮以糯米置上熟為度每日不拘時隨量煖服蓋被

發汗服時痛稍甚服完漸愈勿以服藥時痛而中止也 一用

炒山梔 麵炒 桃頭七 杵餅貼次日作七丸投炭火中

燒响即愈單方全集

神箭 狗骨燒灰 山枝七 麵飛 糟各一 醋調敷不可針刺

女人病邪女人與邪交通獨言 雄黃兩 松脂兩 溶化以虎

爪攪之丸如彈子大夜燒籠中令女坐上被蓋露頭在外不過

三劑自斷仍以 雄黃 人參 防風 五味子分

為末每旦井水服方寸匕肘后方

