



門中武9
第609
卷4止



腫毒

經曰。凡瘡之痛痒。自屬虛實寒熱。故痛而實者為熱。虛而痒者為寒。然諸瘡痛痒。皆生于心。以心主血而行氣。氣血凝滯而為瘡。疽瘡癰。濶大一寸已上。曰瘰癧。一寸以下。曰瘡癰。諸瘡之中。惟背疽疔瘡最為急症。其初發也。使身體或先熱而後惡寒。或先痒而後疼痛。若其不痛。最為惡症。且如背疽始生。如粟黍粒大。纔有覺時。便用艾于痛處灸之。痛則灸。至痒痒則灸。至痛使毒氣隨火而散。凡毒初起皆可灸。惟頭頂以上屬陽明。斷不宜灸。若失之于初。瘡勢已成。又當審其虛實寒熱。熱實則清之。虛寒則溫之。得毒消膿潰。方為可治之症。

瘰癧背毒歌訣

真人妙訣世間稀。一切瘰癧皆可醫。化血就如

湯潑雪消濃立效肉生肌任他發背膿瘡毒那看疔瘡癩瘰兒

假饒疥癩并風癩乳香五背盡消除甘草節金銀花在四

肢加防風末藥赤芍白芷在腹膜加倍

陳皮各三錢當歸一錢五分乳香沉香貝母各一錢木香八分

角刺五錢劉碎定粉八錢同炒黃去粉甲片五錢蛤粉炒黃去粉右乳香末藥甲

片另研其餘分作四貼每水二鍾煎七分加好酒半鍾冲服前

末俱調干藥內同服上部飽服下部空心服方古

癰疽發背凡中熱毒眼花頭暈口乾背熱槐花子把一大鉄鍋炒

穠色好酒一盞服之乘熱飲一汗而愈如未退再服極效彭辛

菴用此方三十年無不見效保壽堂方背毒未成者用活蟾一隻繫於瘡上半日必昏憤置水中再易

一隻必跟踉再易其蟾如舊則毒散矣累試極效勿輕視醫林集效

凡患癰疽瘡毒者用土中大蝦蟆一個剝全身癩皮蓋貼瘡口于

蟆皮上用針將皮刺數孔以出毒氣自覺安靜且能爬住瘡口

不令長大又可免蜈蚣聞氣來侵神效神妙靈秘丹藥

癰疽初起乾姜一兩炮炒紫色研末醋調敷四圍留頭愈甲一齋方

凡毒初起及經十日以上腫熱疼痛用鷄子一枚新狗糞如蛋大

攪勻微火熬令稀調得所捻作餅子于腫頭上貼之以帛包抹

時時看視覺餅熱即易勿令輕動及散氣經一宿定如日多者

三日貼之一日一易至瘡乃已一切諸方皆不及也抄本

護心散凡癰疽三日內且連進十服方免衰症使毒氣外出稍遲

真菜豆粉兩乳香五錢燈心灰同研和以生甘草濃煎調下一錢

時時呷之。若毒氣冲心有嘔吐之症。大宜服此。蓋紫豆壓熱下氣消腫。解毒乳香消諸瘡腫。毒服至一兩。則香徹瘡孔中。真聖藥也。李嗣立外科方

忍冬濟急酒 金銀花藤五兩。木槌槌碎。勿犯鉄器。生甘草節一兩。水二碗煎半。又入陳酒一大碗。再煎數十沸。去渣分作三服。一晝夜吃完。外即用金銀花葉入砂盆內。研爛加酒少許。打稀爛。調塗四圍。中留一孔。洩氣凶者一日二服。大小腸通利。則藥力到。神效無比。陰隆文刻板

鐵縮散 一切腫毒初起。圍之即消。已成圍之。毒氣不至。九月九日攻走。無膿圍之。有膿未潰。即潰。已潰膿即退出。

- 取芙蓉葉陰乾 五錢 姜黃 白欬 白芨 五倍子各
- 錢 大黃一兩 螻壳五個 陳小粉炒 研末醋調圍醫方

請毒 凡患發背對口一切無名腫毒。及久近瘰癧。先看所患腫處。用生麵水調作圈。依腫處大小圍之。圍高寸餘。實貼皮上。勿令滲泄。罔外密施布巾數重。防火氣侵餘地。患者安身勿動。罔內鋪極好黃蠟片屑。上以炭火炙至黃蠟溶化。毒淺者。皮上覺熱痛不受炙便止。毒深者。全不覺熱痛。再下蠟。隨化隨添。至圍滿。仍前熱火炙至蠟沸。初覺痒後覺痛。久之不可忍。乃去火。以少水微澆。滾蠟上。俟冷揭去蠟。近皮者俱帶青黑色。此毒隨蠟拔去。淺者一二次便內消。深者三四次亦膿去腫消。立愈。次畢外貼生肌玉紅膏。此百治百驗者。秘方集驗

腫毒 及指上瘡。腫。神效。 獨郎大蒜一顆。百合數葉。臙糟敷上。衛生備要

身上諸毒 癩串久不收。口者亦效。 獨郎大蒜一枚。加雄黃不拘多少。共搗

成餅貼之。將艾液餅上炙一壯即愈。秘方

定疼散 山藥一兩 白糖霜 大黃各四錢 打爛敷上即止疼

或搭手發背破爛者。只用糖霜山藥打爛塞入毒內。不臭爛肉去。新肉自生。初時日換三次。三日後一日換一次。煎甘草湯。或

猪蹄湯洗。用軟鵝毛數根紮之。洗去再敷。待肉長滿方止。單方

透膿散 治諸瘡毒。貼骨癰疽不破者。不用刀針。一服即穿透。 原繭蛾一個燒灰酒調服。即

透切不可服二個。若服二則有二口。慎之。此方神效。外科

腮毒 大黃末 姜汁 和勻週圍搽轉。止露一頭。不日愈。

搭手 全蝎 核桃 共研細酒冲服。一二次即痛。單方

手發背 生甘草 炙甘草各五錢 角刺二錢半 土貝五錢 半夏半錢

甲片二錢半 炒黑 知母二錢五分 加姜葱水酒煎。二劑即愈。呂晚

疔瘡 附金

癰疽宜灸。疔毒宜針。明疔易治。暗疔難療。生于口耳目鼻者。顯而易見。生于身體四肢者。隱而難防。及至發作。快認傷寒。半日不治。毒必走黃入心。人即昏憤。若早知覺。急用針或磁峰刺人二

三分。擠去惡血。當摻立馬回疔。丹于針孔內。恐丹一時難覓。可

用蠟牛連壳搗爛敷之。或家菊花根搗敷。內服梅花點舌丹。或

蟾酥丸一二服。俱用菊根汁和熱酒下。出汗即愈。屢見染此症

者。多畏疼痛。不肯針刺。殊不知一染疔毒。皮肉即僵。雖針亦不

覺痛。須用胆速針。慎勿遲延。而候時刻也。

凡手足間生黃泡。或紫黑色。有一條如紅線。急宜以針于紅線所

至之盡處。刺出毒血。不刺則毒入腸胃。不救。惟刀鎌疔忌刺。狀

瘡如韭菜長一七。左側肉黑如燒烙。刺後用益母草葉薰燒灰敷之。方用明凡末

三錢葱白根搗爛分作七塊。每塊熱酒一盃送下。以衣被蓋之。如

無汗再服葱白湯一鍾。少頃汗出。從容減去衣被。其病若脫。忌

風寒房事酒肉魚腥蒜椒辛辣油膩生冷等物。單方集驗

疔毒已篤者二服即愈土蜂房具蛇退一條黃泥固濟燒存性為末

每空心好酒服一錢。少刻大痛痛止。其瘡已化為黃水。潘震山秘錄

追疔奪命丹 羌活 獨活 青皮 甘草節

黃連 赤芍 細辛 蟬退 姜蚕 金絲重樓

防風 澤蘭 金銀花各等分 有濃加 何首烏

白芷 要通利加青木香 大黃 梔子 牽牛

毒在下加木瓜各等分 每服五錢。先將一貼加澤蘭 銀花各一兩

姜十片煎至半熟服。汗出為度。病退再加 大黃二錢 煎熟取

利。二三次去餘毒為妙。此方取效如神。百發百中。若心煩嘔吐

加 甘草節錢一 菜豆粉錢一 酸漿下。嘔逆惡心。加 乳香

菜豆粉 甘草湯下。赤水玄珠

蟾酥乳香膏 蟾酥化酒 硃砂 白丁香 輕粉各一錢

蜈蚣炙一條 硃砂錢二 乳香六分 射香一分 金頂砒五分 製法

罐內炭火煨化。投白砒二兩于化。煨鉛上。烟盡為度。取起候冷。打開金頂砒結在鉛面上。取下所用共為末。糊成

麥子大凡遇疔瘡針破用一粒插入孔內。以膏藥蓋之。追出疔

根為效。秘方集驗

小奪命散 治疔瘡及腦疽 槐花子 蒂丁 干頭子即掃

惡毒其效如神。等 各等分。水煎。通口溫服。加蟾酥少許尤妙。萬病回春

經念單方 疔瘡 金瘡

爛頭疔

白菊花根

白梅二個

蜒蚰二條

共搗爛

加透明雄黃同敷。如乾再另敷。易一二遍。無不愈者。屢驗方

紫馬疔

切不可食肉。生白酒煎蒼葦草紫花蒂。丁車前草服之。

愈。秘方集驗

金瘡 急用自己小便淋患處。口必渴。切不可飲水。但食肥膩之物。解渴而已。若食薄粥。則血沸而出。必死。單方集驗

一方 五月五日將老鼠同石灰搗收。敷金瘡神效。李時珍方

金瘡出血

龍骨

白礬

五倍子

各半

乳香

沒藥

無名異

為末

乾搽

不怕風立

時止血。任痛。生肌如神。採書

一用

五倍子

降香

炒末

敷之

皮肉自痊。懷德堂錄

跌撲損傷

瘀血冲心

從高墜下欲死

倉卒取藥不及。擘開口以熱小便灌之。或卒

墮壓倒打死。將本人如僧打坐。令一人將頭髮放低。用半夏末

吹入鼻中。酸後以生姜汁真麻油攪勻灌之。再以乾荷葉燒灰

熱小便調下三錢。日進三服。自愈。附刊感應篇註証

八厘散

土鱉

乳香

末藥

血竭

各一

大半夏生用

當歸

巴霜

砂仁

雄黃

香甜瓜子

各五分

為末

末收貯。聽用。每服八厘。好酒下。小兒三厘。但能開口。服下即得

活矣。八仙歌訣。此方八仙傳授。千金世上難尋。止疼止痛如神。接骨續筋立應。不問外感為最。那管內

損伶仃。八厘一服保安寧。須臾便得活命。江湖上方姓授

上部損傷如頭破見髓羌活 防風 半夏 升麻

當歸 芍藥 陳皮 生地 甘草 川芎

白芷 茯苓 南星 花粉 蔓荊 姜三片外加

血餘硬錢一落得打錢二味俱為末吞服

中部損傷如手折羌活 防風 當歸 赤芍

陳皮 白芷 甘草 秦苑 黃芪 茯苓

生地 官桂 故帑 花粉 外加 五加皮

血餘硬錢各一前法服

下部損傷如腿足傷當歸 芍藥 陳皮 牛膝

木瓜 防已 川芎 茯苓 羌活 白芷

白朮 秦苑 生地 甘草 外加 血裏硬錢一

如前法服醫方集效

熨法 用生葱連根切碎炒令汁乾乘熱敷患處外用絹帛束之

立刻定痛止血萬病回春

筋骨折傷 急取雄雞一隻刺血量患人酒量冲服痛立止神效

無比赤水玄珠

奪命散 治撲打金刀傷及破傷風天南星 防風 等分為末水

調敷患處出水為妙仍以溫酒調服一錢已死心尚溫者熱童

便灌調二錢 關內傷墜壓者酒和童便連灌三服即甦亦

可煎服三因方

腦破骨折 蜜和葱白搗勻厚敷立效秘方集驗

跌壓痰血積 當歸尾五錢 桃仁去皮尖廿一粒 大黃酒蒸一兩 酒煎雞鳴

跌撲損傷

時服至明取下痰血即愈秘方集驗

跌打損傷神效方

九世還魂草

鹿含草

落得打草

麻皮頭上部倍加

土鱉各等分

下部加

苧根

內傷加 白頭蚯蚓

五味為君。隨便再加紅花蘇木等藥

酒水煎服汗發而愈

有一泥工沈姓者。屋上跌下。服此三

日全愈懷德堂筆記

接骨不知痛骨節傷損腕白接骨者

用鳳仙花根。酒磨服半寸。最多一寸

然後揉托而上則不知痛。但多服傷人。以一寸為極秘方集驗

跌打骨斷

用金櫻子即係金櫻子根也

去皮煎酒熱服。渣敷患處立

愈願濟堂刊施

墜車落馬

筋骨痛不止

玄胡索末。酒服二錢。日進二次。即愈秘方集驗

破傷風

皮肉損破復被外風。襲入經絡。漸傳入裏。其患寒熱交作。口噤。咬牙。角弓反張。口吐涎沫。入陰則身涼自汗。傷處反平陷如故者。其毒即內收。當用萬靈丹發汗。令風邪外出。次以玉真散。患上貼之。得膿為效。如汗後前症不退。傷處不高。漸醒漸昏。時發時止。口噤不開。語多不出者。終為死候。

萬靈丹

茅朮入兩

全蝎

石斛

明天麻

當歸

甘草炙

川芎

荆芥

北細辛

防風

麻黃

川烏湯泡去皮

何首烏各一兩

雄黃六錢

為末蜜丸

或一兩作四丸。或一兩作六丸。或一兩作九九三等。做下以備老壯緩急。取用外以硃砂為衣。磁器收貯。每用葱日九枚煎湯。

化一丸通口服。蓋被出汗愈。如服後汗遲。再用葱湯攤之。汗必如淋。少頃漸去。蓋被其汗自斂。一切腫毒風氣。宜發散者。皆可服。如病無表症。相兼不必發散者。只用熱酒化服。避風。宜食稀粥。忌冷物房事。孕婦勿服。見醫書

玉真散 南星 防風 白芷 天麻 羌活

白附子等分研末敷患處。如打傷欲死。心頭微溫者。熱酒童便灌。亦

二錢連進二服。立可回生。破傷風牙關緊閉。腰背反張。甚則咬

牙縮舌。以童便調服三錢立愈。秘方集驗

一用蟻螬即地蚕也蔣駝脊背捏住。待口吐水。就取抹瘡上。覺身麻

汗出。無不活者。昔一兒額上跌破成風。依此治之。即時愈

嬰童百問

一切損傷

湯火傷 最忌浸冷水中。防火毒攻心。並勿服寒冷之藥。但用好

酒洗拔其熱毒。或服玄妙飲。川連 花粉 元參各二錢

陳皮 吉更 山支仁各一錢五分 淡竹葉三十片 水煎服。

如藥不便服。童便以護其心。使火不能內攻。隨取大黃末。桐油

調敷。即垂危者。皆保無恙。醫方俱載

用猪毛煨存性。研末加 輕粉 白礪砂各少許 麻油調敷。絕無

疤痕。秘方集驗

遍身燒爛 或服蘿蔔汁。或服童便。後隨取好酒一二甕。入浴缸

內。令患者浸酒中。極重不死。單方全集

諸傷 刀割斧砍。夾剪。生半夏研細。帶血敷上。立止痛。能收口。生

一切損傷

肌抄本

刀傷 切不可見水。用圖書石滑石末搽之。或用刀刮青石末

搽之。或大黃炒黑篩末搽之。或葦菜汁拌陳石灰陰乾搽

之。或用堅實細炭并老松香各等分研篩細末以葦菜汁拌

陰乾再篩研細末搽之。如急用不用葦汁亦可。單方

金創出血 葱白連根葉煨熟搗爛敷之。冷即易而愈。本草發明

箭傷 陳臘肉去皮骨人象牙 人指甲各二錢末極細拌

肉內厚敷。過圍即如銳子打入肉以銀確入傷處其鉛即化仍

從傷處隨水銀出。神效 仙方

拔出箭頭 花蕊石形如硫黃有白斑點者火煨七次 研末敷四圍箭頭自出

一用巴豆仁畧熬與蜈蚣同研塗之須臾痛定微痒忍之待極痒

不可恐便搖動拔出速以生肌玉紅膏敷之。秘方

入咬傷 用熱尿洗去牙黃瘀血以蟬酥丸塗孔中。或嚼生白

果塗之。如痛用麻油紙燃火焰熏之用乾屎裝荔枝殼內加

艾圍灸之以不痛為度。單方

咬傷指痛不可忍久則爛脫手指急用人尿入瓶將指浸之一夕

即愈如爛尅蛇烏龜殼灰敷。赤水 玄珠

踢傷或手足或面及擦壞皮肉冬青葉同醋煮數沸畧摘麻油少許在內取

葉搽貼自好。單方 秘錄

杖傷久爛中有四五分淡澤不能收口用此方搽之數日愈 血竭一錢 硃丹 輕粉各二

白占錢 共末搽上一日夜其肉四圍生起兩日即平。公門秘方

杖後即飲童便一碗以免血攻心再用熱豆腐舖在杖傷處其氣

一切損傷

如蒸其腐即紫復易之令紫色散盡轉淡紅色為度若杖瘡

腫痛 雄黃二分 蜜佗僧一分 研水調敷極妙 凡杖後日服

白芨末米飲下神效俱出秘方

夾棍傷 一出衙門即用熱童便一盆將足浸之如便冷燒紅磚

二塊焯之即熱直浸至童便面上浮起白油其傷盡出矣不烘

不癢再用肥皂搗如泥入雞子清和勻罨患處以草帚包裹脚

縛緊一夜不可動即效內服末藥 人中白煨一兩

乳香箬炙沒藥同上 牛膝三錢為末 木耳燒灰存性五 自然銅煨五

錢 再用牛膝煎酒調服三五錢如無末藥用歸尾川芎乳香獨

活壁虱胡麻骨 補紅花五加皮各一錢 生白酒一壺煎數沸縱

量飲避風寒厚 出汗立愈如骨傷加土鱉一枚集驗

諸癰

肺癰之候口乾喘滿咽燥而渴甚則四肢浮腫咳嗽膿血或腥臭

濁味胸中隱隱而微痛者肺癰也大凡肺癰當咳嗽短氣胸滿

時垂膿血久久如梗米粥者難治若嘔膿而不止者亦不可治

也其嘔而膿自止者自愈其面色當白而反赤者此火尅金不

可治也

第一次服四劑 苡仁 條苓 苦絲瓜 甘草各一錢

赤芍 貝母 吉更 瓜萋 廣皮 升麻

丹皮各錢二分 黑塞二 姜一 食後煎服 如大便不通加麻仁

第二次服四劑 赤芍 貝母 花粉 甘草

瓜萋 吉更 知母 百合 獨活 杏仁

連召各等燈心十根白果肉七食後煎服

第三次服四劑 貝母 獨活 百合 甘草

吉更 麥冬 赤芍 知母 花粉 瓜蒌各等

燈心 白果 照前服 以後白鯨紅蘿蔔鴨蛋終身不

可食。食則後發不治。大葷一年後方可吃。茹齋更妙。一方

綠橘葉洗淨。搗絞汁一盞服之。吐出膿血。即痊。單方全集

屢驗方 治肺癰未成即散。已成即潰已潰即愈。神效。吉更一錢 苡仁五錢 貝母一錢

黃芪炒一錢 金銀花一錢 甘草節二分 陳皮一錢 白芨一錢

甜葶藶炒八分 水二鍾煎半。加生姜一片。食後徐徐服。初起加

防風一錢 去黃芪潰後。加 人參一錢 久不斂。加 權欄皮一錢 服土

林新定方

腸癰 小腹堅硬如掌而熱。按之則痛。肉色如故。或嫩赤微腫。小便頻數。汗出皆寒。脉紫實而有力。服此神效。大黃炒

朴硝各一錢 丹皮 白芥子 桃仁各二錢 空心煎服。秘方集驗

肚癰大小腸癰冬瓜癰 白芷一錢 乳香 沒藥各一錢

歸尾一錢五分 大黃二錢 番鱉二枚 去毛菜豆二錢 為末。每服二錢。酒下。

以平為度。抄本

脇癰 金銀花五錢 貝川二錢 角刺 連喬各錢 甲片

赤芍各三錢 白芷一錢五分 地榆五錢 甘草節一錢 當歸二錢 夏枯草一兩

煎汁和 鼠粘子半錢 紫花地丁一兩 生菊花根一兩 和藥服書

懸癰 在肛門前。陰根後。兩相交界處。初起如棧子大。漸如蓮子細。數十日後。如桃李樣。宜急治之。甘草梢四兩

兩水煎服。即愈。外用大黃三錢 熟石羔一兩 紫金錠一錢 同搗碎水調服。

一用 大粉草兩四長流水浸透。炭火炙干。再浸再炙。三次切片。同

歸身三兩水三碗。慢火煎。去渣再煎。稠厚為度。每用三錢。好酒一

杯。化膏空心服。未成即消。已成即潰。潰即收口。單方全集

跨馬瘡成膿者極難 黃芪三錢 人參二錢 川芎 當歸各一錢

白芷 官桂 甘草 防風各五分 一貼痛止。再服內潰。

十貼肉生新部治驗 疔瘡 五爪龍連根搗汁。酒攤服。日進四五次。膿從大便出。未成

膿者內消。如有頭以渣敷上立散。單方全集

天蛟頭 蜈蚣一條 雄黃三錢 二味共研作細末。用雞子清調

搽即愈。一用 猪苦胆入雄黃末五分。蜈蚣末五分。套指上

紫緊愈。單方全集

流注

濕痰流注 初起腫痛無頭皮色不變。久而不治。則發熱作膿。知覺

土茯苓碎打碎四兩 真胆星二錢 川貝 姜蚕炒

純銀花 槐花炒 五倍子各三錢 吉紅 秦艽

防風各一錢 防己八分 木通一錢 白甘遂刮去皮未七分 皂角子鮮者

散碎 肥皂子鮮者敲碎十個 虛弱人加 石斛 苡仁各一錢

痰在頭頂胸者加 夏枯草一錢 痰在背脊者加 羌活五分 痰

在脇助者加 柴胡五分 痰在肚腹者加 赤芍二錢

澤泄一錢 痰在臂者加獨活五分 痰在腿脚者加 木瓜二錢

牛膝五分 用河水九碗。沙鍋內煎三碗。每日早中晚各熱服一

碗。如痰在心之上者。食後服。痰在心之下者。食前服。如虛弱者

流注

分二劑。極虛者分三劑。小兒分四劑。忌食鹽醬茶醋猪肉鮮魚。雞鵝鴨一切發物。炒煎姜椒烟酒生冷。但藥內有甘遂與甘草相反。恐別樣丸散內有甘草者。切不可服。已破頭者。止服四五劑。使氣血調治。不致流他處。隨服十全大補湯。加川貝二錢五分。石斛二錢。滴乳香四錢。須服數十劑。方能全愈。若係多火之人。十全湯內減去肉桂願體集。治流注。石羔兩。官礪三錢。飛麵作十九。將丸穿一孔。貫以鐵線。炭火燒紅。取酒一碗投入。冷又燒紅。入酒內。以丸盡為度。其酒熱即服。一日二服。自消。抄本

一用 地榆 苦參各二兩 紅花 金銀花各三錢 酒水各半盞煎服。近者三劑。遠者七劑。即消。單方全集

楊梅瘡毒

通仙五寶散 鍾乳粉三錢 琥珀 冰片各半 大丹砂二分

為末。入炒飛麵半分。分十二股。每日用土茯苓一觔。水煎十二碗。清晨一碗入藥一股。溫服。其茯苓湯。須一日服盡。不可別飲。重湯水并茶。者再服一料。無不愈者。忌雞鵝牛羊房事。此方古今第一。王范泉傳

初熏 辰砂末一錢。綿帛分作七條。香油浸透。每次熏二條。熏時板橙坐着。暑天用單被。寒天用夾被。蓋之。不可出氣。要口含水。恐傷口皮。熏完吐出。不可吞下。其效如神。秘本

搜風解毒湯 治梅瘡不犯輕粉。重者月餘。輕者半月愈。土茯苓兩。米仁 銀花 防風 木瓜 鮮皮各五分 皂莢子四分 氣虛加人參七分 血虛加歸身七分 水煎日三服。忌茶并毒物房事。此秘方也。潘霞山秘錄

梅瘡

西聖復煎丸 已破危篤百方不效用此如神

乳香 沒藥 兒茶

丁香 焙各一兩 阿魏

血竭

花蛇

各四兩

白麵

炒

斤蜜

六香油

四兩 為末 搗丸

彈子大 每一丸

土茯苓

四兩

煎湯

化服

效

扶搆寶林僧傳

五寶霜

治梅毒瘡并癰疽惡瘡

水銀

一兩

硃砂

各二錢

雄黃

各二錢

白凡

象凡

各二兩半

研勻

礞石

燈臺

蓋定

鹽泥

固濟

文武火煉

升

礞口掃

收每以三錢入

乳香

五分

沒藥

五分

酒

乙

太膏貼之

絕效

楊梅結毒

皂莢

當歸

鮮皮

五加皮

金銀花

各二兩

兩作八貼

每貼加

土茯苓

四兩

立效

懷德堂秘錄

結毒久爛

土茯苓

一斤

生薑

四兩

共煎

數碗

服之

不十日

而愈

其潰

處以藥汁調麵糊之漸愈

曾有陽物爛完半年不愈服此得

生。秘方集驗

癰瘡

內消散

治癰核不拘近久已破未破

花粉

苦參

各五錢

角刺

四十個

土茯苓

三斤

共煎湯當茶飲忌牛肉屢試屢驗奇異方也

書方

治癰簡易方

枇杷葉

一斤

四兩

去毛

梗淨

焙燥

為末

水白糖

拌不拘時服白湯過口服完即愈

一用活

鯽魚

一個

生

山藥

二味一

白糖

三錢

搗敷

神驗無比

二方揚州傳來

神效散

未破用此

而沙

已潰

爛牽至

兩肩

胸臑

亦治

其效如神

沉香

五錢

芫花

三錢

月季花

即月月紅

碎到

入大

鯉魚

腹中

魚須

放尿

內遊

死者

就以魚腸封固酒水各一盞煮熟服之即愈

談楚翁試驗方

初起神效方

甲片

土炒

丁香

白丁香

苦丁香

紅小豆

磨刀泥

姜蚕

去頭足酒炒各一錢

斑毛

去頭足酒炒一錢

右為

末每服一錢。五更時無根水調服。至未時打下毒物。其形如鼠。後用野菊花焙黃為末。陳醋調貼。一日一換。七日全好。萬病回春

乳癰。潰爛幾見臍臍土煉樹子。經霜者妙。川練不用。雄鼠屎。兩頭尖者。是。露蜂房。各三錢。俱煨。共末每服。三錢。酒下。間三日一服。不數日濃盡收斂。抄本

癰癧。初起成塊未破者。將麵捏成薄條。照瘡大小。畧離患處。作圈圍着。再取槐樹根在土內掘出者。白皮數條。照麵皮作圈。放

麵皮之上。用艾作小丸。放栗子中心灸之。肉上畧覺痛。即拂去。

艾丸。另取艾丸再灸。三遍。其麵圈不動。槐根白皮要換。三次連灸三日。即消。一方不拘已破未破。瀝青。好者。兩。草麻子。十四粒。杏仁。去皮尖。十。共搗千餘搥。自然粘軟成膏。攤貼患處。神應。

內服昆布海藻海帶貝母連召甘草元參以應。無不愈者。秘方集驗

痔瘡

腸僻為痔。如大澤中有小山突出為痔。凡人於九竅中。但有小肉突起。皆曰痔。不特于肛門邊生者名之。亦有鼻痔。眼痔。牙痔等。

其狀不一。方分五種。曰牡。曰牝。曰狐。曰腸。曰氣。牝痔者。肛門邊生瘡。腫突出一日數枚。膿潰即散。牡痔者。肛門邊發露肉珠。狀

如鼠奶。痔時滴潰膿血。狐痔者。腸口顆顆發癩。且痛且痒。血出淋漓。腸痔者。肛門內結核有血。寒熱往來。登溷脫肛。氣痔者。遇

恐怒則發。肛門腫痛。氣散則愈。又有酒痔。每遇飲酒發動。瘡即

腫痛而流血。血痔者。每遇大便則血出不止。宜解熱調血。順氣為主。若久而不愈。必至穿穴為漏矣。

治痔油藥。酥合油。熊胆。各五分。頭生雞子。二個。用。三味勻和敷。

痔瘡

餘愛堂

之神效。有一趙姓者患痔垂死用此立愈。靈秘丹藥

藥水

片腦一分

朴硝五分

熊胆三分

蝸牛

螺肉各十兩

橄欖核燒灰五錢

搗爛入藥

浸一夜取水并藥敷瘡無不斷根。同上

痔漏

犀角

象牙各末

乳香

沒藥各一兩

明凡

黃占各錢

銅器溶化占入藥

九梧子大取連喬金銀花二味貯

瓶中入好酒煎半日去渣酒服廿一九自愈。洪武帝親驗方

一用

胡連一兩

甲片麻油炙

石決明煨

槐花炒各五錢

蜜九早晚

各服錢一

如四旁有硬肉突出

蚕繭二十個

入藥即治神效。單方全集

一用

青苔青石上出

焙末加生凡少許再研聽用

先將瓦花一

把水煎滾加鹽滷一碗坐上浴洗其痔漸漸縮小楷乾將藥抹

上但要痛三四次即愈永不再發。外科秘錄

諸癰 附火丹

對口癰初起

桃葉尖九

搗爛摻入愈。

一用

母雞屎抱小雞熱尿

取塗

一用

鮮茄蒂七

鮮何首烏

輕粉各等分

水二鍾

煎八分

一服出膿再服收口

一用

猪苦胆剖開碗盛塗完

即愈

男用雄猪胆女用母猪胆

單方全集

治對口癰神效方

天茄即日牽牛

葉帶莖子採來同

生姜三片

搗

敷早晚一換三日全愈。抄本

熱癰

五月五日午時取獨郎大蒜切片貼眉心

至夏不發

一

用

菊花根搗汁無灰酒冲服

癰在上身空心服癰在下身

飽服自消。秘方總集

小石癰

搽二蚕桑葉滴下支水

點上愈。古方

諸癰 火丹

諸癰 孔內凸出

取烏梅肉搗爛量大小攤貼即消神妙無地草本

磨癩癩 皮底舊鞋一隻去泥淨燒存性研末菜油調敷其膿自

出屢試有效 一用屋內倒掛烟塵猪胆汁調敷 一用磁器

搥碎如粉雞子清調敷 一用 百草霜研細菜油調圍立效

俱驗過 秘方

火丹 滿身生過形 用小兒胎衣瓶內水將雞毛抹上隨手而愈 方單

白蛇纏腰 腰裏起紅泡一團若不早治被其纏腰如務腰樣 蛇壳一條燒灰存性

坑廁板上浮泥刮下同研細用童便調敷數次一二日即愈

一用 白芨 錢八 水龍骨 錢八 共研末無根水調敷 一用

鋼臍灰將臭飯脚水調敷 秘方

諸般流火 野芥臘子 錢四五 研細醋調敷上 衛生備要

諸瘡

棉花瘡 水銀 兩一 白錫 兩一 先化鍋入銀珠 錢六 銅糸 錢五

官粉 兩二 黃香 錢五 硃砂 錢五 輕粉 錢五 右為末用前藥一股

先攤紙上其紙條長七寸加後藥二股亦同攤紙條上捲成條

無太緊臨用時蘸香油點着橫放瓦上令患者覆睡以手托席

用被蓋蒙頭不令走氣口鼻閉息如忍不住略轉動氣即閉先

一條燻眉心次一條燻鳩尾第三條燻臍下一寸次第燻汗如

雨燻盡後睡五日愈 秘方

膿瘡 鉛 兩一 打極薄片剪碎和水銀 錢三 入去衣猪板油研爛

攤油紙上外以川椒 兩二 煎湯洗滌貼之即五六年者可愈 或

黃牛屎尖用陰陽水各一碗和勻化開濾去渣要醋一碗大冬

青葉四十片沙礮內文武火煮于留水醋半盞浸在內每日換三次貼瘡葉盡即消永不發單用冬青葉醋煮熟貼亦效方單

廉瘡潰爛川椒 松香 黃臘各一錢四分 共研忌鐵器用連

根葱白十四段共搗爛做夾紙膏攤貼效心岐傳

血風瘡癰瘡虫瘡坐板瘡疥癬瘡並效 大楓子肉錢五 蛇床子錢五 水銀錢二

枯凡 白錫各一錢 為末先將錫化開次入水銀再入末藥相

油共搗勻搽瘡宜乾些臘猪油亦可用單方秘錄

膿疥瘡 烟膏兩一 東丹兩一 雄黃錢各三 輕粉錢一 為末

末腌猪油調抹如連片將油紙攤藥縛好不動三日脫光集驗秘方

惡瘡 雄黃一錢五分 杏仁三十粒 去皮 輕粉一錢 為末洗淨以猪胆汁調上二三日即愈百發百中種德堂方

天泡瘡 天蘿水調宮粉敷上立愈 若日久作爛疼痛不巳

膿水淋漓者 石羔煨 輕粉各一兩 青黛 黃柏各三錢

共末甘草湯洗淨搽之其疼即止 一用輕粉 青黛等分

瓦花汁調抹立效外科備要

坐板瘡 松香五錢 雄黃一錢 如濕加 蒼木二錢 為末和勻

綿紙包撚作紙條二個臘猪油溶化侵透火燒滴下油搽瘡上立效先醒齋筆記

凍瘡 五倍子猪油搗成膏填入裂 凍耳 用姜汁煎塗 凍

腳跟 茄根煎湯洗 凍折 油臘脂烘熱敷之立效集驗秘方

抓瘡傷水腫痛難忍者 用耳垢封之一夕水盡出全愈 鄭師甫云子常

病此一丐傳此方採醫書

火珠瘡 其瘡如珠。始於髮中。相染不已。亦有傷命者。 用生蘿蔔搗爛。將滴醋浸敷患處。

寒濕瘡 雞子煮熟。去白用黃。慢火炒去油。加黃柏末。搽上立效。

金絲瘡 形如繩。巨細不一。治法于瘡頭截住。刺之出血。後嚼浮萍

塗之即愈。

黃水瘡 取雄指苦胆一個。黃柏一兩。浸焙乾。為末敷之。 周氏抄本

臘梨瘡 酒肉店內油透。陳竹燈臺一個。劈碎。裝磁瓶內。口上用

舊鬚。鐵絲。覆瓶上。倒轉下。再用一空磁瓶。以此瓶合于下瓶口

上。用火煨之。其汁溜下。取抹瘡。神效。 一用石灰窖內燒過紅

土基。流結上。清。輕。虛。百。茸。霜。雄。黃。各。一。胆。凡。六。榆。皮。三。

輕粉。錢。一。猪。胆。汁。調。刺。頭。搽。之。效。 陸德堂方

一用花椒煎湯。或若參湯洗。伊猪骨髓。或黃連末。搽神效。 周氏抄錄

漆瘡 木形人。遇漆起。泡發。痒。變。瘡。用。懈。唾。抹。之。或。磨。刀。水。泥。塗。或

杉木煎湯洗。或懈壳滑石研末。干者蜜和塗之。濕者干末搽之。

或石羔輕粉。韭汁調敷之。 內服 元參 知母

石羔 人中黃 黃連 升麻 連喬 牛旁 各等

甘草 五分 淡竹葉 二十片 煎之。不拘時服。忌浴熱水。兼戒口味。否

則變為頑風癩。愈而又發者多矣。 秘方集驗

肥瘡 極凶者。屢試屢驗。 苦參 胡麻 首烏 靈仙

甘草 石菖蒲 當歸 生地 蓮石 蟬退

金銀花 酒煎服 一用 大樞子肉 五錢 白信 三分

油胡桃 五個 共搗勻。作三丸。夜間取一。先在心口。用手擦至二

更天氣藥散開。仍聚胸堂。仰面而卧。次夕亦然。間一夜再擦。

諸瘡

餘愛堂

丸。七日後全愈。鴻禧東房傳方

頭面肥瘡

輕粉

飛丹

雄黃

白凡

等分研末入葱管內

兩頭紫。煨過。加龜板灰少許研。菜油調抹。立効。良方

面上毒瘡

初起者

急尋水蛭蚰

一二條

用醬少許。共搗塗紙上。貼之即

退。紙上留小孔出氣。此乃凌漢章秘傳極效方也。談楚翁試驗方

海上仙方

頭禿瘡。剝皮瘡。牛皮破鞋各一兩。白凡硫黃各五錢。

舊袍三錢。一處燒為細末。猪油加麵調。連擦三次。須烤干坐板。

黃水腫腿瘡。風癬疥癩。一掃光。孫真人傳

諸瘡

不論肥腫膿疥。濕風坐板神妙。

硫黃

三錢

雞蛋

二個煮熟去白用黃銅器內微炒取油聽用

胡椒

四十九粒為末

菜油

四兩

川椒

三錢去核焙末

將二椒末併蛋油

黃共入菜油內熬數沸。擦瘡神驗。如疥瘡加飛凡少許。醫方秘授

諸般癬瘡

楊梅癬

枯凡

硫黃

各一兩八錢

雄黃

胆凡

輕粉

各一錢

用生板油去皮。入藥擦破數次。其效如神。

一用

乳香

五分

硃砂

五分

雄黃

沒藥

兒茶

各一錢

大楓子

廿个杏仁

四十粒

搗爛絹包擦之

癬瘡蔓延

决明子

一兩

為末。以水銀輕粉少許研不見星。擦破上

藥。立瘥。

東坡家藏方

一用

斑毛

雄黃

銅青

等分末

無根水調敷。起泡刺

破柏燭油敷

五次

潔淨不發

一用杜黃連

即羊蹄根

洗淨搗濾汁

一搗

用

白梅

數枚

同汁搗爛。用甲片刮破患處。抹數次。即愈。神效。屢驗方

鵝掌風癬

川烏

草烏

何首烏

花粉

赤芍

防風 荆芥 蒼朮 地丁各一兩 艾葉四兩 煎先燻後洗

層層起皮痛痒愈醫方秘錄

荷葉癬 田螺一個 開磨入信二分待肉化水抹上即痊古方

牛皮癬及年久頑癬神效 紅粉霜五分 明凡 川槿皮 杏仁皮去油

錢一 牛皮燒灰油調敷立愈赤珠玄珠 蜜位僧三錢 為末津調抹一日三次三日全愈 一用

牛皮血癬 九硫一信三巴豆俱為細末菜油調古仙方

頑癬 白信一分 硫黃九分 硝三分 白凡四分 冰片半分為

末津調擦之秘方

圈癬 穀樹皮剪如癬樣大小以毛背一面用唾貼肉以手不時

撲之即愈秘方集驗

獸虫傷咬

家犬咬 先須忍痛以河水 生虎骨刮末咬處即愈或刮肉古敷

板上油膩拌砂糖敷效感應篇刻

虎傷 搗青松汁數斗頻頻飲之以渣敷咬傷處頻易即效古方

馬咬及踏傷 服童便韭汁妙寒水石末敷在傷處旬日亦愈集驗方

貓咬 薄荷汁塗之有效戴原禮方

鼠咬 斑毛燒灰射香少許津唾調敷或抹猫尿單方纂要

蛇咬 細辛 白芷各五錢 雄黃五分 每服二錢末酒下即效抄本

蜈蚣咬 取蜘蛛置咬處自吮其毒痛即止古仙方

八脚虫傷 其虫隱壁間以尿射入 烏雞翎燒灰雞子清調敷單方全集

蝸牛咬毒行通身者 青蓼子煎水浸之立愈不可近陰令弱也本草

蜘蛛咬 大藍汁一盃入雄黃射香少許點患處仍服其汁神異之極 昔一人被傷頭面腫痛幾不救服此兩日作瘡愈傳信方

蟻毒 其虫咬人至死惟以桑柴灰煎取汁調白凡末傳效 蜂毒 小便洗擦拭干用香油搽之或雄黃末擦之或蜂房末搽之皆效秘方

蝎螫毒 蝎有雌雄兩種雄者螫人痛在一處雌者螫人痛牽遍體用井底泥敷患處干則再易或取新汲水以青布隨痛處搽之濕則再易秘方

鐵樹蜂刺 取芋芳莽擦患處其腫即止無莽用子亦可集驗方 壁虎咬 以清水淋壁上注咬傷處自愈經驗方

諸色惡虫咬傷 姜汁先洗用明凡雄黃貼之立效屢驗神方

諸般奇症

截腸 大腸頭出名曰截腸初截寸餘者可治若腸盡不治 用芝麻油盛于器懸坐上飲大麻

子汁數升愈本草

虱出怪病 臨卧渾身虱出血肉俱壞每夕漸多痛痒難言且舌尖出血身齒俱黑唇動鼻開但飲鹽醋湯半月即安夏子益奇疾方

肌肉化虫 有虫如蠅走于皮下作聲如兒啼急用雄黃雷丸各一兩為末搽猪肉上炙熟喫盡自愈奇疾方

惡肉毒瘡 一女年十四腕軟處生物如豈半在肉中紅紫色痛甚方士用水銀四兩白紙二張揉熟蘸之三日自落李櫻怪證方

行步歪斜 昔一士兩足不痠不痛每行動絕不聽其所用或扭于左而又墜于右或扭于右而又墜于左之玄而行不能一步

一步正走。孫文垣以為由筋軟不能束骨所致。用人參黃芪白芍

以補肺金。以仁虎骨龜板杜仲以壯筋骨。以饒華粉專制肝木

煉蜜為丸。早晚服之。竟愈。治驗

破腸 腸破。腸出鼻穢。急以香油摸腸。用手送入。煎人參枸杞淋

之。皮自合矣。吃羊腎粥十日即愈。奇方

脈溢 毛竅血出。若血不出。皮脹如鼓。須臾眼耳口鼻被氣脹合

此名脈溢。飲生姜汁水各一盞即安。奇方

大腸虫出 行坐 不得用鶴虱灰水調五錢服之。自愈。奇症

腎水 玉莖硬不痿。精流無歇。乃為腎滿。用韭菜子破故紙各

兩為末。每服二錢。水一鍾煎六分。作三次飲。愈則任服。經驗良方

咽喉生肉 咽喉層層生肉相疊。漸漸腫起。不痛多日。乃有竅。臭

氣自出。遂退飲食。用臭橘皮煎湯連服。愈。外科

乳懸 婦人產後兩乳伸長。細小如腸。垂過小腹。痛不可忍。名曰

乳懸。將川芎當歸各二觔。半觔對末。瓦器水煎。不拘時服。餘觔

半判大塊。用香爐慢火。逐漸燒烟。安病人而前桌下。要烟氣不

絕。令伏桌上。將口鼻及病乳常吸烟氣。如藥盡未痊。如前法煎

煎。及燒烟煙吸必安。如用二料已盡。兩乳雖縮上而不復舊。用

冷水磨草麻子一粒于頭頂心塗片時。後洗去。則全安矣。奇疾

人面瘡 江左一商。左膊上有瘡如人面。亦無他苦。只要飲食。有

名醫教其歷試藥物。悉無所苦。至貝母。其瘡乃聚眉閉目。商人

喜。因以小葦筒毀其口。灌之數日。成痂。愈。李世珍方

發斑怪症 有人眼赤鼻張大喘。渾身出斑。毛髮如銅。乃熱毒氣

奇疾

結于下焦也。用白凡滑石各一兩為末。作一服。水三碗。煎半不

任服即愈。奇疾方

眉動 眉毛動搖。目不交睫。喚之不應。但能飲食。有經日不效者。

用蒜三兩取汁。酒冲服。即愈。採醫書

氣奔怪病 人忽滿身皮底。混混如波浪聲。痒不可忍。抓之血出。

不能解。謂之氣奔。用苦杖人參。書鹽細辛各一兩。作一服。水煎。

一大碗。細飲。盡便愈。奇症經方

獨靈寶丹 治男子八角子及婦人。銀杏不拘。搗爛。擦上即愈。集驗方

腹中水鳴 由抑鬱而致。腹中有塊。作痛。行動黃芪。錢柴胡。錢白芍。

麻骨 自頂麻至心窩而死。或用人屎燒灰豆腐調飲。即止。萬痛方

補遺雜方 凡抄錄見示者。隨類即補。

催生神方 臘月兔腦髓一枚。要驅他急。鼠腎。母丁香。

益母草 各一錢。乳香 射香 各一。為末。兔腦髓或兔血。

為丸。艾蕒大。硃砂為衣。陰乾。胞破後。醋湯或亦小豆湯下。一丸。

即產。男左女右。手握藥出。是驗。前壽臣抄錄

黃胆神驗方 三月白 黃藤根 淡竹葉 掛山龍

地橘子 野石榴 秋木香 石葦 好酒三觔。將八味多。

草頭店 同入磁罐內。花箸扎好瓶口。飯鍋上隔湯煮過三炷香。

取出空心服一鍾。量好一錠。神效。治好多人。錢德安破方

對口瘡 用甘蔗渣 焙燥 白狗屎 焙燥 和勻。用竹管將希絹包一。

頭入藥篩。在膏藥上。膏藥不拘。或松香炙膏亦可。貼之。即垂危亦愈。陳氏抄錄

補遺雜方

三

除受

附骨疽生大腿無頭無膿者

黃占三錢

古銅錢到末三分

油胡桃六個

搗碎和勻軟腐衣包好酒空心服。

偷糞老鼠 川猫尿并底泥和勻圍之立愈。

大麻瘋 雷艾半 明礬四兩 棟樹皮半 白椿皮半 煎湯浴

數次愈

瘡癩頭 銅青一兩 松香五錢 葱三根 葶麻子六十粒 搗爛

成膏青布攤貼俱出陳氏

絕癰 六月六日雞鳴時採醬板草畧洗蒸熟一日曬乾不乾 每筋配老姜一筋磨細收貯一日瘡用一錢二日二錢三日三

錢酒服服後飲酒至醉為妙合時忌雞犬婦人神效小梅朱氏施方

天蛇頭 白蘿蔔一段挖空入雄黃末三分蒸半熟套指上愈抄

濟陰纂要方

若城錢峻青掄編輯

婺源俞煥文光重梓

論調經大法

方氏曰婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調不通之中有兼疼痛者有兼發熱者此分而為四也然四者若細推之不調之中有趨前者有退後者則趨前為熱退後為虛也不通之中有血滯者有血枯者則血滯宜破血枯宜補也疼痛之中有常時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前為血積經後為血虛也發熱之中有常時發熱者有經行發熱者則常時為血虛有積經行為血虛有熱也此又分而為八焉夫抵婦人經病內因憂思

忿怒外飲冷形寒蓋人之氣血周流忽因憂思忿怒之所觸則鬱結不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則寒露不盡此經候不調不通作痛發熱之所由也大抵氣行血行氣止血止故治血病以行氣為先香附之類是也

調經通用諸方

婦人百病不出四物湯加減其他一切諸方皆不及也

四物湯

治婦人衝任虛損月水不調經病或前或後或多或少或

服益榮衛滋氣血若

有他病隨病加減

當歸和血如刺痛非此不能除酒炒

熟地補血如臍痛非川芎

治風泄肝木血虛各等分夏倍芍藥

秋倍地黃冬倍當歸

每服四錢煎服若經行臍腹絞痛者血澀也當加

玄胡索苦練子

碎炒

木香檳榔

若經水如黑豆汁者加黃芩

黃連 經水過多別無餘症宜黃芩六合湯四物加黃芩白朮

等分 經血淋漓不絕加乾瑞蓮房炒入 若血崩者加生地

蒲黃 若赤白帶下宜香桂六合四物湯加桂枝香附各減半

若經血凝滯腹內血氣作疼加廣茂官桂等分王石膚云熟

地滯血安能止痛不若以五靈脂代之 月經久閉加肉桂甘

草黃芪薑黃塞子木通紅花 月水不通加野苧根牛膝紅花

蘇木酒水同煎 血氣不調加吳茱萸等分甘草減半 諸虛

不足加香附子 經水先期而來是有熱也宜涼血加黃柏知

母條芩黃連阿膠艾葉香附甘草各一錢 過期不行乃血虛

氣滯之故法當補血行氣加香附紅花桃仁泥蓬義茂各七分

木通甘草肉桂五分 月水不斷加白朮黃芩阿膠蒲黃柏葉

各七分香附一錢砂仁甘草各五分姜三片 經水將來作痛者氣滯也加川連香附桃仁紅花玄胡丹皮義木濟陰綱目

九味香附丸 治婦人百病皆宜

陳皮 去白 當歸 酒洗 川芎 芍藥 生地 俱酒洗

黃芩 酒炒各一兩五錢 白朮 二兩 小茴 炒五錢 香附 童便浸一夕再用醋煮晒干炒

四為末醋和丸如桐子大空心酒下八九十九神妙無比女科載方

玄歸散 治月經壅滯癆腹痛

當歸 各等分 玄胡索 各等分 為粗末每服三錢加生姜三片水煎服

經驗方 治婦人臍腹疼痛不省人事只一服立止人不知者云是心氣痛誤矣

木通 去皮 芍藥 炒 五靈脂 炒 各等分咬咀每服五錢醋水各

半盞煎七分溫服濟陰綱目

求嗣

求嗣總論 易曰一陰一陽之為道男女構精萬物化生乾道成

男坤道成女此蓋言男女生生之機亦惟陰陽造化之良能耳

昔褚澄言血先至褻精則生男精先至褻血則生女陰陽均至

非男非女之身精血散分駢胎而胎之兆道藏經言月水止後

一三五日成男二四六日成女李東垣言血海始淨一二日成

男三四五日成女聖濟言因氣而左動陽資之則成男因氣而

右動陰資之則成女夫褚氏以精血之先後言道藏以日數之

奇偶言東垣以女血之盈虧言聖濟丹溪以子宮之左右言各

執一見貴在乎會而觀之理自得矣大要當從褚氏聖濟丹溪

主經血先至與子宮左右之說為千古定論也

論求子貴養精血。袁了凡云聚精之道。一曰寡慾。二曰節勞。三曰息怒。四曰戒酒。五曰慎味。今之談養生者。多言採陰補陽。久戰不泄。此為大謬。腎為精之府。凡男女交接。必擾其腎。腎動則精血隨之而流。外雖不泄。精已離宮。亦必有真精數點。隨陽之痿而溢出。此其驗也。是故貴寡慾。夫精成于血。不獨房室之交。損吾之精。凡日用損血之事。皆當深戒。如目勞于視。則血以視耗。耳勞于聽。則血以聽耗。心勞于思。則血以思耗。吾隨事而節之。則血得其養。而與日俱積矣。是故貴節勞。主閉藏者。腎也。司疏泄者。肝也。二藏皆有相火。而其系上屬于心。心君火也。怒則傷肝。而相火動。動則疎泄。者用事而閉藏不得其職。雖不交合。亦暗流而潛耗矣。是故當息怒。人身之血各歸其舍。則常凝酒。

能動血。人飲酒則面赤手足俱紅。是擾其血而奔馳之也。血氣既衰。之人數月無房事。精始厚而可用。然使一夜大醉。精隨薄矣。是故宜戒酒。內經云。精不足者。補之以味。然醲郁之味不能生精。惟活淡之味。乃能補精耳。世間之物。惟五穀得味之正。但能淡。食穀味。最能養精。又凡煮粥飯。面中有厚汁。滾作一團者。此米之精液所聚也。食之驟能生精。試之有效。濟陰綱目錢青倫曰。人能行此五者。非特求子者之良藥。亦可為攝生者之真訣矣。

加味四物湯 治血氣兩虛不孕

當歸 酒洗 白芍 炒 菴蓉 各二錢 川芎 熟地 白朮

茯苓 各一錢 人參 五分 每月經前三服。經正行三服。經後三服。

歸附丸 不但種子且無小產產後諸症

求嗣

余愛堂

香附砂鍋內醋煮熟水洗焙末一斤當歸身酒洗焙末十兩鹿角刮去粗皮為末三兩綿紙墊鉄

錫內火炒和勻醋為丸每服三錢早晚各一服白湯下一月後

一入房即孕

金蓮種子仙方一名夢熊丸有小苗二兩無熟地服之立孕神效

熟地 川芎 白芍酒洗 益母 蒼朮各三兩 蛇床子各三兩

條芩酒炒 覆盆子 玄胡索各二兩 陳皮去白 丹參各二兩 砂仁一兩五錢

山茱萸酒浸 香附四製各五兩 右為末用烏骨雞一只緝死乾去毛剖

開去腸內污物用酒洗淨一應物件仍裝入雞肚內不令見水

置壘內入酒三觔封固重湯煮爛取出割下淨肉搗如泥仍將

雞骨酒炙煉為末全原汁入煎藥末內拌勻再用醋煮米糊同

雞肉搗細為丸如梧子大每服四五十九漸加至八九十九空

心清米湯下如月信先期而至者加黃芩地骨皮黃連各兩

信後期而至者加黃芪一兩 人參白朮各一兩半 酒下 白帶加蒼朮

白朮升麻白芷各一兩半

調經種玉湯凡婦人無子多因七情所傷致使血衰氣盛經水不調或前或後或多或少或色淡如水或紫如血塊或崩漏帶下或肚腹疼痛或子宮虛冷不能受孕服此藥神效無比仙方也

當歸酒洗 川芎各四錢 吳茱萸四錢 熟地酒洗 香附炒各六錢 白芍

茯苓 陳皮 丹皮各三錢 玄胡索二錢 右作四劑每劑加生

姜三片水一碗半煎一碗空心服渣再煎臨臥服待經行之日

服起一日一劑藥盡經止則當交媾即成孕矣不效俟後月經

來再服四劑必孕 若過期而經水色淡者加官桂炒乾姜熟

艾各二錢 若先期三五日色紫者加條芩三錢

求嗣

徐愛堂

續嗣降生丹 治婦人體弱子宮冷血寒病冷難成子息神效

歸身酒 洗 桂心 不見火 真龍齒 烏藥 真天者 益智 去枝 杜仲 酒炒

石菖蒲 去毛 吳茱萸 去梗 扶神 各一兩 牛膝 酒炒 秦艽 去蘆 細辛 洗去土

吉更 半夏 湯泡七次 防風 牡蠣 用大斤童便浸透火煨淨二兩 附子 重八錢

入砂心作竅如皂子大 右為末取附子內朱砂研細留下為衣

以糯米糊丸如梧子大每服二十九加至七十九空心淡醋湯

服鹽湯亦可日再服 男子精寒陽事不固白濁遺精及治婦

人血虛帶下肌瘦並效 萬寶全書

神仙附益丸 治婦人百病生育之功如神胎前產後俱服神妙藥又不貴而功效倍常真仙方也宜常服之

香附 一斤童便浸透水洗淨露 益母草 十二兩洗烘為末 右再用香

附 四兩 艾葉 兩 煮汁加醋大半共糊丸每服百粒空心下

保產總論

生產一事造化自然之理本古今常事而人人認為難事時至自
生不必憂疑而人人抱乎憂疑總由此理未明也造化原不令人
難生人多不曉調攝因而難生造化原不令人逆生人多懼怖逼
迫因而逆生難逆兩端關係兩命倘平時不知講求則臨產必至
誤事至穩婆測產時不可不用亦不可專意聽信倚靠蓋此輩無
書傳無師授此理全然不知多執己意胡做亂為誤人性命多矣
凡為夫君者宜平時家中談講令婦女習聞有孕知調攝臨產有
主張不懼怕并詳論穩婆自無難生逆生諸惡以受胎後論即不
能如古人胎教凡可禁忌者亦宜省悟以臨產時論胎至十個月
足形完氣壯手足必動子動則母腹必痛痛急則胞衣必破子自

出胎衣而來。苟不忍耐。順時見其腹痛。半日一日不產。即謂難生。不知是胞衣未破。子未出。胞衣不能忍耐。催其速生。一催之間。因多悞事。故臨產切不可慌張。卽一二日三五日。須要忍痛安心。俾其自然分娩。

論臨產催生藥不可服之太早悞事

催生藥者。原因婦人難產不下。不得已而催之也。至於平素易產者。時至自生。可不必服。如欲服之。求其快便。需待產婦腹痛。必至腰痛甚者。方是將產之候。始可用藥。順勢推之。自當立下。若以腹痛未甚。見身尚未欲生。切不可早服。催藥強其速生。使兒不能轉胞。反致橫生逆產者有矣。有等婦人。不及腰痛。而即產者。又其易也。更何必用藥推之。

難產七因

古名醫湯仲簡先生集錄

一因安逸。蓋婦人懷胎。血以養之。氣以護之。宜時常行動。令血氣周流。胞胎活動。若久坐臥。血凝氣滯。則難產。常見田家勞苦之婦。其產甚易。可證也。

一因奉養。胎之肥瘦。氣通于母。恣食厚味。以致胎肥。難產。常見糟糠之婦。容易生產。可證也。

一因淫慾。古者婦人有孕。卽居側室。不共夫寢。若有孕而犯之。三月以前。常致動胎小產。三月以後。犯之一。則胞衣太厚。而難產。再則子身多白濁物。而不壽。三則子出胎。卽多瘡毒。出痘多細。窳難起。以致死亡。皆由父母慾火所結。可悲也。

一因憂疑。今人不講生產之理。或問禍福于鬼神。禱求于卜筮。或

聞里中有產厄者孕婦疑則懼懼則氣怯故亦難產

一因軟怯如少婦初產神氣怯弱子戶未舒便腰曲不伸展轉傾

側兒不得出又中年婦人生育既多血氣虛損產甚艱難須胎

前服補氣養血之藥調理康健則臨產無虞婦人素弱者亦然

一因倉皇將產之際有等愚蠢穩婆不審正產與轉胎但見腹痛

遽令努力催生產婦聽從以致橫生倒生子母有傷

一因虛乏臨產用力太早及兒欲出母力已乏停住艱難服人參

接方即產

受胎保護

一受胎不宜食牛羊犬肉並蟹鱉烏魚胡椒薑蒜等物

一受胎後不可看戲及鬼怪形像

一最戒暴怒手不可鞭撻蓋如怒傷氣血不能養胎多有因此動胎

不可登梯恐跌有損不可伸手高處取物恐傷胎而子鳴腹中

子鳴亦有治法但令鞠躬片時自安

一受胎三五個月後常要緊束其身勿令胎放或六七八箇月

胎忽亂動兩三日間或痛或止或有水下但腰不甚痛胎未離

經名曰弄產又有臨產一月前忽然腰痛却又不產此是轉胎

名曰試月胎水有無俱不妨但直身坐臥行立不可驚迫以致

悞事二者俱非正產必因曲身觸犯致此

小產當慎

小產因胎藏損傷胞繫腐爛以致胎墮比大產更重視為輕忽而

殞命者有之必須倍為將息大服補血生肌肉養藏氣生新血

去瘀血之藥。世有服墮胎藥者。害莫大焉。

臨產斟酌

一臨產時最戒用力太早。脈訣云。夜半覺痛。應分晚來。朝日午定。知生。由此言之。則身痛半日後。恰當產也。但產之難易。人各不同。同時亦有異。有先難後易。先易後難者。但無一定。如臨產腹痛。不生。非是難生。還是子未出胎。產母切勿懼怕。卽一日二日。以至三五日無妨。安心定氣。任其自然。勉強忍痛。進其飲食。要坐則坐。要行則行。要睡則睡。莫聽穩婆逼迫。用力太早。白已亦勿求速。傍人亦勿多言驚慌。以亂其心。時至自然分娩。一穩婆逼迫有二。有不知時候。惟恐後時者。有急完此家。復往他家。老極悞大事。

一未產前幾箇時辰。子亦要出產戶。轉身至手。被母用力一遍。卽手先出。轉身至脚。母力一遍。卽脚先出。橫生倒生。皆因錯用。力其實無手足先出之理。但于將產時。穩婆以意推度。產婦以意審詳。必是臍腹痛急。腰間重痛。眼中如火。糞門逆急。胞水或血俱下。此時子已出胎。產母方用努力。庶不悞事。如數証未見。卽一日半日不產。切不可驚惶。恐產母見之。必生憂慮。一有憂慮。自然胆怯。力衰。飲食難進。亦不可憫其痛楚。急欲離身。強之用力。用力太早。關係母子性命。可不畏哉。

一有用力太早。致令水衣先破。被風所吹。因而產戶腫脹。乾澀狹小者。但從容俟之。無妨。又有穩婆無知。或有意害人。私以手指。指破水衣者。極要關防。

一將產最戒。曲身眠臥。蓋產母畏痛。多不肯直身行動。以致胎元轉動不順。兒子將到產門。被母曲腰遮閉。再轉又再開。則子必無力而不能動。決是難產。人見其不動。則謂胎死。其實因無力非死也。此時任有良方妙藥。不能令子有力而動。只要產母心安氣和。漸漸調理。可保無虞。又有胞水已下。子忽不動。停二三五日者。切勿戒驚。憂躁暴。蓋驚則神散。憂則氣結。躁暴則氣逆。血必妄行。多致昏悶。知此善調。自然無患。

一將產時。須戒喧鬧。進飲食。蓋進飲食。則氣充膽壯。不致虛乏無力。戒喧鬧。則專靜自安。不致疑懼皇惑。一產時以飲食為本。有等婦人臨產。不能飲食。則精氣不壯。何以用丸。必未產前。預買人參二三錢。將產煎服。

一交骨不開。由元氣素弱。胎前失于調攝。以致血氣不能運達。而然也。用加味芎歸湯。亦可用補中益氣湯。亦可用保生湯。立驗。一天氣寒冷。產母血氣遲滯。兒不能速生。故衣裳宜厚。產室宜煖。背心向火。溫和易生。

一暑月。產婦當溫涼得宜。熱甚。產母則頭疼面赤。昏暈若。產室人眾。熱氣蒸逼。亦致此患。若夏月風雨。亦當謹避。

橫生倒生治法

一將產錯用努力。有手先出。名曰橫生。足先出。名曰倒生。相傳手出者。為覓鹽生。此亦有理。蓋鹽主收斂緊縮。且蜚人痛。兒手得鹽。且痛且縮。自然轉身生下。其治法如手足先出者。急令產母仰臥。畧以塩半分塗兒手心。仍以香油抹之。輕輕送入。推上扶。

正直待兒身轉頭正然後服催生方藥以助精力。則以蜜半小盞飲之。可以潤燥滑胎易產。饑則食以稀粥令其中氣不乏。審其兒欲出來。方扶挾起身。用力一送。兒即生矣。如送手入後兒轉身快。則不必服藥。足先出者亦如上治法。

一手足先出之患。其始也。因穩婆不知時候。誤叫用力。其既也。穩婆無主。張任其出。而不知治法。反叫用力。而致命傷。今後但見兒手足畧有出意。即令產母仰臥。輕輕送入。莫令多出。蓋出少則易入。時未久則易入。如出久則手足青硬。而子必傷。難以扶入。且手足出。非藥可入。又切不可聽寬婦用刀斷兒手。兒手一斷。則必腹中亂。覆而兩傷矣。

子死腹中治法

一產母危急時。當看面舌。面青母傷。舌青子傷。而舌俱赤。子母無恙。唇舌俱青。子母難保。凡產時子死腹中。多因驚動太早。其血先下。胎乾涸而然也。當服藥下之。即不服藥。入不慌。忙逼迫亦遲遲。生下而不傷母。蓋入腹中極熱。食物入內。俱化其胎。雖死產母安心飲食。腹內熱氣薰蒸。胎自柔軟腐化。或一二日三五日自然生下。但所出穢氣令人難聞。此可見死胎不必用刀。況活胎乎。屢見兒惡穩婆輕易用力。動傷兩命。胎死腹中。服回生丹三九。立下產母無恙。若一時無此藥。以平胃散一兩投朴硝五錢。煎三五沸。溫服。其胎即化水而出。

礙產偏產治法

一產時門戶俱正。兒已露頂而不下。此因兒轉身。臍帶絆其肩也。

名曰礙產。治法令產母仰臥，輕輕推兒向上，以手指輕按兒肩去其臍帶。候兒順正，扶挾起身，用力送下。又有生路未正，被母用力一逼，令兒偏柱。左右腿畔兒頭在產戶不下，但云兒已露頂，非頂也。乃額角也，名曰偏產。治法亦令產母仰臥，輕輕推兒近上，審其偏左偏右，以手扶其頭頂端正，用力送下。又有頭之後骨偏柱，谷道兒乃露額，名曰根後。治法于谷道外傍，輕輕推兒令正，然後用力送下。以上三產之難，皆母曲腰坐臥，用力太早，致之穩婆必歷練有分曉者，不可輕易。

胞衣不下治法

一見出戶時，人即以兩手輕抱產母胸，前產母亦自以兩手緊抱肚臍，令胎衣下降。如胞衣來遲，只管斷臍洗兒，但先用軟絹物

繫住臍帶，然後斷臍。繫時宜輕巧，牢固。此帶極脆，要用心繫定。若血流入衣中，為血所脹，胞不得下。治之稍緩，脹滿腹中，上衝心胸，疼痛喘急者，難治。但服奪命丹，速去衣中之血，血散脹消，卽下。回生丹最妙，無不下者。如一時未備，牛膝湯立効。胡氏治法云：產婦胞衣不下，若鄉居藥局遠者，倉卒無之，今有一妙法。產訖胞衣不下，稍久則血流胞中，為血所脹，上衝如胸，下致危篤。若有此症，急宜斷臍帶，以軟物繫帶，必用力牢固繫之，然後截斷，使其子血脉不潮入胞中，胞衣自當痿縮而下，縱淹延數日，亦不害人，屢驗。

一盤腸生，未產腸先盤出，其治法急將淨盆盛溫水，寒天則熱水，少入香油養潤，待兒并胞衣下時，產母畧仰臥，自己吸氣上升。

穩婆香油塗手徐徐送入昔都運恭人每產大腸先出後產產後其腸不收醫不能療偶在建昌得穩婆將醋半盞水七分調停喫產母面每喫一縮三喫盡收此良法也 又有見并胞衣下後膀胱壅出產戶者同前法送入此皆用力太早之故也 一開臍生者兒糞門有一膜閉任見氣故不能出聲以手微拍之則膜破而能哭矣如拍之猶不破須用女人輕巧者以銀簪腳輕輕挑破甚便或不能挑急用燻衣緊包勿令散放以熱水浸其胞衣寒天則加火熱之久則熱氣內鼓其膜自破出聲而甦 一產畢產門不閉乃血氣虛也服加味芎歸湯總補血氣為宜

產後當知

一產後忌大喜大怒產畢未可伸足側臥令血不行宜用衣物靠

任曲膝仰臥以手從心下輕輕按摩至臍日五七次則惡血盡 下次日乃止不問有無病痛宜以滾水或酒攪清白童便日服數次可勉血疾

一乳汁乃血氣所成產後不可多食鹽鹽止血少乳且發嗽夏月忌貪涼用扇食冷物莫當風睡 百日內會合終身有病切戒

一兒生三日相傳洗三朝如冬寒切不可洗恐洗時風入臍中臍風由此起即初生亦浴保全真元

一兒生次日三日即看口中上腭如有白泡子即以銀篋輕輕刮破將泡內白米取出勿落入喉中京墨搽之如次日不取泡老難刮誤事又有馬牙在牙跟處亦須挑破取出以墨搽之

血暈 子方生下母即昏暈者此時即有藥不能入口遲則不救

然其由有三有用力虛而暈者有下血多而暈者有下血少而暈者其暈雖同治之則異當審詳之下血多而暈者昏而煩亂而已當以補血清心藥下血少而暈者乃惡露不下上搶于心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血行血藥崔氏云凡暈者皆是虛熱血奔迸腹中空虛所致欲分娩者第一須先取醲醋以塗口鼻仍置醋于旁使聞其氣兼細細飲之此為上法產後中風 郭稽中論曰產後五七日內強力下床傷動血氣致使風邪乘虛入之或傷于房室或懷憂怒擾盪沖和或因食生硬傷動臟腑得病之初眼澀口噤肌肉攣搐漸至腰脊筋急強直者不可治此乃人自不謹所作非偶爾中風所得也府劑芥穗三錢為末或酒或童便搗開灌之神効

保產良方

胎前方論

宜以健脾清熱養血為主白朮黃芩乃安胎之聖藥益母草活血行氣有補陰之妙以其行中有補也胎前無滯產後無虛均宜服之墮胎乃血氣虛損不能容養胎元亦內多邪熱致血氣沸騰胎不寧靜又胎氣係于脾脾虛則蒂無所附故落宜白朮黃芩為丸若補腎氣則以杜仲續斷為丸若素產難宜白朮枳壳為丸服至臨產快便神驗

安胎飲

- | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 人參 | 五分 | 白朮 | 一錢 | 陳皮 | 五分 | 甘草 | 三分 | 當歸 | 一錢 | 川芎 | 八分 |
| 白芍 | 七分 | 砂仁 | 六分 | 香附 | 六分 | 條芩 | 一錢 | 紫蘇 | 一錢 | | |

胎氣不安或腹微痛或腰痛或飲食不美俱宜服之或至五六

個月常服數帖最妙

滑胎神方 乳香錢五 枳壳一兩 為末蜜丸每服三十九臨產月服

達生散 產時無虞此方余家歷試神效

人參錢一 白芍錢一 陳皮分五 歸身錢二 大服皮錢一

甘草分五 葱葉五 紫蘇莖葉分八 黃楊樹梢分七 春加

川芎夏加黃芩秋加砂仁枳壳

便產神方 此方乃湖郡王太守京中得來甚效思刻施濟

當歸錢一 川芎錢三 枳壳分六 艾葉分五 厚料分七 姜分二

川芎分五 貝母錢一 荆芥分八 黃耆分七 兔絲子錢二 酒洗

甘草分五 白芍錢二 胎至七八九月每月服二三貼產時再

服三四帖易於分娩并杜產後血暈諸病

加減膠艾湯 治胎動漏血有效

阿膠珠炒成 當歸 川芎 白芍炒 地榆各一錢 艾葉炒

甘草分各五 水煎服 胎漏血多起于氣腦血逆火動之故可加

炒黃芩炒香附炒砂仁研細同煎 或有受胎至四五箇月即

墮或至六七箇月漏血要墮者宜前方去艾葉地榆加白朮黃

芩茯苓熟地續斷 氣虛加人參黃芪之類 如傷墮多次受

孕後便宜服千金保胎飲與膠艾湯間服自安

千金保胎丸 凡女子受孕終三月而胎墮者雖氣血不足乃中衝脈有傷中衝脈即陽明胃經供應胎孕至此時必須節飲食絕慾戒怒庶免小產之患服此可以保全

白朮土炒 熟地 杜仲俱姜汁炒 當歸 續斷俱酒炒

阿膠蛤粉炒 香附米四製 益母草 條芩炒各二兩 陳皮 川芎

艾葉各一兩 砂仁五錢 右為末 麩肉為丸 空心每服二錢

神効生化湯 治婦人產畢連服二三劑 逐瘀生新 永免產症 更治產後一切危症 無不立安 神効仙方

當歸八錢 川芎四錢 乾姜炒黑四分 桃仁十粒 甘草五分 水煎七分

加酒半盞服 必須預先煎好 候母生下見時 卽刻與服 永杜產內諸病 渣煎

胞衣不下 牛膝湯 此藥起死回生 服此胞卽爛下立安

牛膝 瞿麥各四兩 當歸尾 通草各六兩 滑石八兩 葵子五兩

加桂心二兩 水九升 煮三升 分三次服 神効

妊娠傷寒護胎法 井底泥 青黛 伏龍肝 右為末攪

勻塗孕婦臍中二寸許 如乾再塗上 以保胎孕也

濟生湯

枳壳一錢 川芎二錢 當歸二錢 蘇葉八分 香附一錢 甘草七分

大腹皮一錢 姜汁五分 水二鍾 煎半待 腰腹痛甚 通日服之 卽產

九箇月後先服一二貼 更妙 胎衣不下者亦可服

保生湯

人參二錢 生地三錢 當歸二錢 川芎一錢 牛膝二錢 水煎臨

產服之最妙

以上數方乃將產之月并產時通用 一則思慮而預防之一則

和其氣血補其真元 母子俱安 并無產後諸病

難產經日不下

真雲母粉五錢 温酒調服 卽產百試百驗

橫生倒產 經日不下 力乏者神效

人參末 乳香末 丹砂末各一錢 研勻雞子白一枚 入生姜自

然汁三匙攪勻冷服子母俱全

平胃散加朴硝方

厚朴 蒼朮 陳皮各二錢 甘草五分 朴硝五錢 水煎服

薛立齋曰下死胎此方最妙

加味芎歸湯治交骨不開產門

川芎一錢 當歸二錢五分 白死龜板酥炙一錢 水煎八分加婦人頭

髮燒存性 研末服

黑神散

官桂去皮 當歸 白芍 甘草 炮姜 生地各一兩

黑豆炒黑去皮二兩 為末每服一錢溫酒下治熱疾胎死腹中自出

朱丹溪云胎得煖則下故用姜桂

胞水先破難產 豬肝六兩 蜜三兩 酒水各三碗煎二碗飲汁立產

催生如神散

百草霜取釜底心者 白芷不見火各為末等分 每服三錢以童便米醋

調和如膏用沸湯下或童便酒煎進二服 薛立齋曰此藥大

能回血治逆產橫生其功甚大

子死腹中

黃鬼目不拘多少 黃色者去毛為末搽之如粉為度每服一錢酒一

盃煎八分服立生此方天下第一

死胎不出未足月者

川芎三錢 當歸 益母草各五錢 夏日用大黃三錢 真射五分 寒

月用肉桂三錢真射五分調勻服或再加丹參五錢服尤妙

預防血暈神方

荆芥穗末三錢見一產下即用童便入溫水調服

血暈黃藥子兩紅花一錢水煎加女人油欵二隻同煎服大小便俱

利血自下也

一用血竭沒藥各一錢研末童便酒服

一用五靈脂蒲黃等分為末童便沖酒服

千金不易牡丹方治產後十三症

當歸三錢川芎一錢生地各一錢五分

益母草各一錢五分延胡索各一錢五分產婦冒風加防風天麻各一錢血暈

加五靈脂醋炒荆芥穗炒黑各一錢三四朝後發熱加炮姜炒人參黃

芩各一錢心膈迷悶加陳皮枳壳砂仁各一錢血崩加地榆黑山梔

丹皮各一錢咳嗽加杏仁桑皮桔梗各一錢死血不行腹硬加紅花

枳實桃仁各一錢飲食不進加山查麥芽各一錢脾胃作脹加白朮

茯苓蒼朮厚朴陳皮砂仁枳壳各一錢心神恍惚加茯神遠志各一錢

胎衣不下加朴硝三錢俱煎飲

產後三方

當歸一錢川芎八分白朮一錢陳皮五分炙甘草二分益母草八分

丹皮一錢紅花七分腹痛加延胡索八分痛甚加肉桂五分山查肉

五分身熱加茯苓二錢炮姜一錢身熱汗出去茯苓加黃芩二錢汗出神

虛加人參一錢

產後中風

保產良方

余愛堂

荆芥同薄荷等分研末童便冲酒服神効

產後玉門不閉

吳茱萸

兔絲子

各一兩五錢

蛇床子

一兩四錢

每服四錢

水一碗煎湯頻洗自効

產後子腸不收

新鮮鯽魚煮焙研細一半搽腸一半酒服即時收上

附神驗雜症仙方

產婦水腫

始自兩足漸至膝間足趾出水乃婦人素有風氣或冲動血脉不可作水腫治之宜服後藥

香附

炒

陳皮

甘草

烏藥

天仙藤

微炒

等分焙為末每服三錢水一盞姜三片木瓜三分紫蘇三分煎七分

空心日三飲待腫消即不必飲此淮南名醫陳景初秘方也

又浮腫方

羌活

蘿蔔子

全炒

去子只取羌活為末每服三錢溫酒

調下每日一飲五服立愈嘉興張昌明秘方

產婦胎動

已見黃水者

乾荷葉蒂二枝炙研糯米泔水調服即安

產婦赤痢

白芍

三錢

條芩

一錢五分

地榆

白朮

各八分

甘草

三分

水煎服三

貼立愈

月水不斷

側柏葉

白芍藥

等分每用五錢水煎半冲酒服

血崩不止

好桂心不拘多少瓦上煨存性空心米飲服三錢神效

月水不通

厚朴三兩 薤仁

紅花各三錢

水煎一碗空心二次服三貼

立通

婦女血厥

凡人平居無所疾苦忽然身不動目閉口噤如死人狀或微知人事眩暈移時方醒此名血厥因出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方醒宜服此藥

白薇

當歸各一兩

人參五錢

甘草一錢五分

每服五錢水二盞

煎半温服

一切乳癰初起

澤蘭一兩

青皮三錢

白芨五錢

加橘葉三十片

水煎半加酒半

盞冲服立散百試百驗仙方

橘香散

治乳癰未結即散已結即潰立刻止痛神效無比

射香

陳皮去白淨五錢

研末酒調服二錢被蓋出汗即愈

外敷方

乳癰初起二三日立消天下第一仙方

活鯽魚一尾連頭骨生搗極爛香臘糟一小團再研勻敷上一

日待消小即取下不消再貼百試百驗

催乳方

當歸

生黃芪

通草

俱二錢

瞿麥

一錢五分

木通

一錢

王不留行

一錢二分

川山甲

一錢五分炒研

雄豬七星蹄酒煮連湯飲

乳岩乳中有小塊不消不痛不癢即名乳岩也宜早治至六七年後潰爛不救

貝母

連翹

炙甘草

當歸

瓜蒌仁

各二錢

柴胡

金銀花

何首烏

蒲公英

白芨

白芷

半夏 各一錢五分

橘葉 四十片 漏蘆

黃連 酒炒各一錢

半枝連 打碎二兩

先將夏枯草半觔和水酒五碗煎至三碗去渣

入前藥同煎就一大碗加入乳香末沒藥末 去油各七錢 不拘時服

外用五倍子焙乾為末醋調敷

再服丸方

夏枯草 蒲公英 四兩 金銀花 漏蘆 各二兩 貝母 橘葉

甘菊 連喬 白芷 雄鼠糞 兩頭尖者 山茨菰

瓜蒌仁 茜根 陳皮 乳香 甘草 紫花地丁

沒藥 各一兩九錢

乳岩初起

青皮 甘草 共為末用人參湯入生姜汁調細細呷之

血崩不止 一日夜五六次至消乃已神驗年壯者不必用人參

陳年舊棕 或棕簞上亦可 燒灰存性每服三錢酒下立愈用藏

此藥愈後陳久無效矣夫冬適遇降結難產胎死腹中驚惶無計問送與服死胎立下母命護全爾時施捨之心遂梓梓動焉又向集巷先生者雖保產過兩丹效九并錄其方加乳以示持歸連後他產數人每談及擊節不已今秋偶過予求其方視之即回生丹也始信此方乃異人所傳而為天下之所共珍者今賴友人互相指實謹當勉力修製海濟并列其方于左願我同志虔心修合博施濟人并傳此方共行方便焉

蘇產良方

本草綱目 卷之... 黃連 酒炒 一錢
... 不拘時服

夏枯草 蒲公英 金銀花 漏蘆 貝母 橘葉

瓜蒌仁 薤白 白芷 雄鼠 甘草 山茨菰 紫花地丁

刺半薯蕷 取可服 熟地 赤芍 甘草 三錢 斷不立愈

血崩不止 一日五六次至斷 凡子 師 總 半 世 普 不 必 凡 人 參

回生丹方論

回生丹保產之仙方也數年前有吳門馬禹琛製合售人每丸價銀壹錢余買二丸并求其方帶歸以防家人產厄幸而不用藏篋三載餘意謂陳久無效矣去冬適遇隣婦難產胎死腹中驚惶無措因送與服死胎立下母命護全爾時施捨之心遂怦怦動焉又慮前效偶然兼之資費甚夥未能驟舉我湖沈予翁曾任上海有柯集菴先生者贈保產遇仙丹數丸并錄其方加引以示持歸連救危產數人每談及擊節不已今秋偶適予求其方視之即回生丹也始信此方乃異人所傳而為天下之所共珍者今賴友人互相捐資謹當勉力修製施濟并列其方于左願我同志虔心修合博施貧人并傳報四方共行方便焉

回生丹方

錦紋大黃一筋

為末

蘇木

三兩打碎河水五碗煎汁三碗用

大黑豆

三升水浸取壳用絹袋盛殼同豆煮熱去豆不用將殼納乾其汁留用

紅花

三兩炒黃色入好酒四碗煎三五滾去渣存汁聽用

將大黃末一筋入

淨鍋下米醋三筋文火熬之以長木筋不住手攪之成膏再加

醋三筋熬之又加醋三筋次第加畢然後下黑豆汁三碗再熬

次下蘇木汁次下紅花汁熬成大黃膏取入瓦盆覆之大黃鍋

粃亦鏟下入後藥同磨

人參

二兩

當歸

一兩

川芎

酒洗

香附

蒲黃

隔紙炒

茯苓

桃仁

去皮尖

川牛膝

酒洗

玄胡索

醋炒

蒼朮

米泔浸炒

地榆

酒洗

川羌活

廣橘紅

白芍藥

酒洗

五靈脂

醋煮化

焙乾

研

三稜

醋浸透紙裹煨

馬鞭草

以上俱五錢

木瓜

青皮

去穢炒

白朮

米泔水浸炒

秋葵子

以上各三錢

烏藥

二兩五錢去皮

良姜

木香各四錢

乳香

各二錢

益母草

二兩

懷熟地

一兩

酒蒸如法製就

山萸肉

五錢酒浸蒸搗爛入藥晒

右三十味并前黑豆殼共晒乾為末入石臼內下大黃膏拌勻

再下煉熟蜜一筋共搗千杵取起為丸每丸重二錢七八分靜

室陰乾須二十餘日不可日晒不可火烘乾後止重二錢有零

鎔蠟護之所謂蠟丸也用時去蠟殼調服其湯又各有所宜開

列于左

一難產橫生用參湯服一二丸卽下如無參用淡淡炒鹽湯亦可

論曰凡胎已成子食母血是月血成塊謂之兒枕將產見枕

先破血裏其子故難產服此丹遂去敗血須臾自生橫產逆產
同治 亦有因氣血虛損難產者宜多人參 凡見手足先出非催生藥可入

必須穩婆先將手足推入方可用藥催之切記

一子死腹中因產母染熱病所致用車前子一錢煎湯調服二三
丸無不下者若因血下太早子死腹中用人參車前子各一錢
煎湯服如無參用陳酒少許煎車前湯

一胎衣不下用炒鹽少許泡湯調服一九或二三丸即下

一產畢血暈用薄荷湯調服一九即醒

以上四條乃臨產緊要關頭一時仰有名醫措手不及起死回

生此丹必須預備

一產後三日血暈起止不得眼見黑花以滾水調服此丹即愈

一產後七日血氣未定因食物與血結聚胸中口乾心悶煩渴
水下愈

一產後虛羸血熱入于心肺脾胃寒熱似瘧實非瘧也滾水下此
丹愈

一產後敗血走注五臟轉滿四肢停留化為腫腫煩渴四肢覺寒
乃血腫非水腫也服此丹愈

一產後敗血熱極中心煩躁言語癡狂非風邪也滾水服此丹

一產後敗血流塞心孔失音用甘菊花三分桔梗二分煎湯調服

一產後便食酸寒堅硬之物與血相搏流入大腸不得化泄痢

膿血用山查煎湯調服

一生產時自節開張血停經絡日久虛脹酸疼用蘇梗三分煎湯

調服此丹

一產後飲食失節兼致怒氣餘血流入小腸閉却水道小便澀結
溺血似雞肝木通四分煎湯調服此丹 又或流入大腸閉却
肛門大便澀難有瘀成塊如雞肝者用廣皮三分煎湯調服此
丹

一產後惡露未淨飲食寒熱不得調和以致崩漏形如肝色潮熱
煩悶背膊拘急用白朮三分廣皮二分煎湯服

一產後血停于脾胃脹滿嘔吐非翻胃也用陳皮煎湯服

一產後敗血入五臟六腑并走肌膚四肢面黃口乾鼻中流血偏
身斑點危症也陳酒化服此丹可愈

一產後小便澀大便閉乍寒乍熱如醉如癡滾水調服愈

以上十三條皆產後敗血爲害也故此丹最有奇功至產後一
切異症醫所不識服此無不立安

仙人傳授回生丹方始末

崑山進士方範註
感應篇附刻于後

先祖主事節菴公未過時祖母朱安人艱于產每有性命憂不得
已爲墮胎計從鄭老醫乞煎劑投之至再弗效鄭聞而驚曰吾此
劑無虛發者今至再而無害必貴胎也亟安之時公家于邑之南
新瀆村暇時偶獨步村西見一道者持筐坐塘涇橋下心異而與
之語灑然有物外之致筐內有回生丹一封因請焉遂手授公曰
藥止一丸用之神效他日依方自製但不可輕示人耳公出金爲
酬笑而却歸視其方平平也及產服其丸立應是生吾父世矯亭
公官學士越四年復孕卽自製服之效如前遂生吾父改亭公官

御史其他投之無弗奇驗然後知往日所遇者仙也而其方仙方也始珍藏而珍傳之以及不佞範凡百五十餘年不啻拱璧邇日莊誦感應篇見一善卽有思齊心見一惡卽有內省心以至濟急救危二語豁然有悟而以此方刻而公之以附于濟急救危之義蓋生育雖愚不肖所恒然二命存亡在呼吸間其危急爲何如而此方萬投萬應良非小補遂附之篇末庶幾哉篇中所稱百善之一也願我同志虔心修製博施貧人并傳報四方共行方便焉計登各省紳衿施濟回生丹姓名于左

遂安翰林院 方象英 施

崑山進士 方 範 施 并刻回生丹方施送

上海名醫 柯集菴 施 蘇州名醫 馬禹琛 施

