



明
號
卷

小青囊第四卷湯名目錄

第九香蘇散

第十神湯

第十一五積散

第十二桂枝湯

桂枝加葛根

名桂枝
葛根湯

目錄一

六日

桂枝加附子

名桂枝加附子湯

桂枝加黃芩

名陽旦湯

桂枝加黃芩以桂心代桂枝乾薑

代生薑

名陰旦湯

桂枝加葛根麻黃

名葛根湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝加黃耆膠飴

名黃耆建中湯

桂枝加人參芍藥生薑

名桂枝加人參芍藥湯

新加湯

桂枝加葛根半夏麻黃甘草

名葛根半夏湯

桂枝倍桂

名桂枝加桂湯

桂枝倍芍藥

名桂枝加芍藥湯

桂枝倍芍藥加膠飴

名小建中湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去桂加白朮湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝去棗加附子紅花

名桂枝加附子紅花湯

桂枝去甘草加黃耆

名黃耆桂枝五苓湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救

逆湯

桂枝芍藥加麻黃石膏

名越婢湯

桂枝去芍藥生薑名桂枝 皂角湯

桂枝合麻黃湯名桂枝麻黃各半湯

桂枝湯二分麻黃湯一分名桂枝二麻黃

湯一

桂枝湯二分越婢湯一分名桂枝二越婢

湯一

第十三麻黃湯

麻黃加生地黄湯

麻黃加黃芩湯

麻黃加白朮湯

麻黃加薑棗石膏名大青龍湯

麻黃去桂枝名三拗湯

小

目錄四

六

麻黃去桂枝加石膏知母名五虎湯

麻黃去桂枝加石膏名麻黃杏仁湯

麻黃去桂枝加薏仁名麻黃杏仁湯

麻黃去甘草加天冬芍藥名杏仁湯

麻黃去杏仁加桃仁黃芩名麻黃桂枝湯

麻黃去杏仁加赤芍黃芩名麻黃黃芩湯

麻黃去杏仁加葛根赤芍名葛根解肌湯

第十四藿香正氣散

藿香正氣加木香玄胡名順氣木香散

藿香正氣加香薷扁豆葛根名二香湯

藿香正氣加香薷扁豆黃連名藿香薷湯

第十五升麻葛根湯

準繩作
帶桂木湯

升麻葛根加紫草木通生薑名如聖湯

升麻葛根加桂枝防風名桂枝葛根湯

升麻葛根加麥冬人參石膏茯苓

名葛根麥冬散

升麻葛根加防風人參川芎羌活

名和散

升麻葛根加連翹桔梗薄荷牛蒡

木通淡竹葉燈心名連翹升麻湯

升麻葛根去芍藥加麥冬花粉生

地名葛根解毒湯

升麻葛根去芍藥加麥冬人參白朮

竹葉名人參麥冬散

小青囊湯名卷之四

第九香蘇散

香蘇散方

香內傷
少外感
多之劑

香附三兩

紫蘇梗二兩

陳皮一兩

甘草半兩

右為麤末每服四錢生薑三片葱

白三莖水一鍾半煎一鍾執服
溫覆取微汗

果山甫曰治四時感冒風邪頭痛發熱之劑南方風氣柔弱傷於風寒俗稱感冒感冒者受邪膚淺之名也內經曰卑下之地春氣常存故東南卑下之區感風之謚居多所以令人頭痛發熱而無六經之證可求者所感人也由鼻而入實於上部不在

六經故今頭痛發熱而已是方也紫蘇香附陳皮之辛芬所以疏邪而正氣甘草之甘平所以和中而輔正爾
頭痛加川芎白芷

頭痛如斧劈加石膏

偏正頭風加細辛石膏薄荷

太陽穴痛加荆芥穗石膏

傷風自汗加桂枝

傷寒無汗加麻黃乾薑

傷風惡寒加蒼朮

傷風咳嗽加半夏杏仁

傷風胸膈痞塞加枳殼

傷風發熱不退加柴胡黃芩

傷風鼻塞聲重咽膈不利加桔梗

旋覆花

傷風痰涎壅盛加白附子天南星

傷風鼻衄加茅花

傷風氣促不安加大腹皮桑白皮

傷風鼻塞頭昏加羌活荆芥

傷風不散吐血不時加生地

傷風不解耳內出膿疼痛加羌活

荊芥

傷風中脘寒不思飲食加青皮枳

殼

傷風嘔吐惡心加丁香半夏

傷風頭暈眼花顛倒支持不住加

炮附子

傷風時作寒慄加桂枝

傷風後時時作虛熱不退加人參

傷風飲食不化加砂仁青皮

傷風一向不解作潮熱白日至日

中不退日日如是加地骨皮柴

胡人參菴藷

初感風頭痛作熱鼻塞聲重加羌

活川芎

感風腰痛不能伸屈加官桂桃仁

感風渾身痛加赤芍紫荆皮

感風頭頸項強急加羌活官桂

感風寒熱頭疼合平胃散加藿香

半夏

感寒頭疼壯熱惡寒身熱合五積

散第十方

感寒頭疼發熱身痛分陰陽合敗

腹痛

毒散加石膏

敗毒散羌活獨活柴胡前胡茯苓甘草

草桔梗枳殼川芎

腹痛加木香

腹刺痛加薑黃吳茱萸七粒

小腹痛不可忍加木香薑棗

心卒痛加玄胡索酒一鍾

小腹痛

心痛

傷食

酒疸

中酒

子

脾胃不和中脘不快加麥芽神麩

飲食不下欲吐不吐加丁香藜蘆

傷食嘔吐泄瀉腹痛加乾薑木香

飲酒太過發黃疸加茵陳山梔

中酒嘔惡加烏梅丁香

冷嗽

脚寒

脚氣

經水

冷嗽不已加乾薑五味杏仁

脚寒加良薑青皮草果

脚氣加木瓜木香牛膝紫金皮吳

茱萸川練子

婦人經水將行先作寒熱加蘇木

紅花

婦人產後發熱不除加參薯

產後虛熱煩渴加人參地黃

產後腰痛加當歸官桂

產後風手脚疼痛合生料五積散

人參敗毒散加地黃川芎

婦人忽然大便腫痛加木香木瓜

產後發熱

產後虛熱

產後腰痛

產後風痛

吳茱萸

婦人被氣所苦胸膈痞痛脇肋刺
痛小便急痛加木香枳殼 又
云加木香砂仁

第十神湯

十神湯方

解利陽
明經瘟
疫時氣
之劑

升麻	葛根	赤芍藥
甘草	香附	紫蘇
陳皮	白芷	麻黃
川芎		

右等分每服五錢薑葱煎熱服取

微汗

一治時令不正瘟疫妄行感冒發熱

一治斑疹欲出

中滿氣實加枳殼

吳綬曰此湯用升麻葛根能解利陽明經瘟疫時氣發散藥也非正傷寒之藥若太陽經傷寒用之則引邪入陽明經傳變發斑矣慎之

吳山甫曰此治外感風寒之套劑也古人治風寒必分六經見證用藥然亦有只是發熱頭痛惡寒鼻塞而六經之證不甚顯者故亦總以疏表利氣之藥主之而已故川芎麻黃乾葛升麻白芷紫蘇香附陳皮皆辛香利氣

之品可以解感肩氣寒之證
赤芍者所以和陰氣於發汗之
中而甘草者所以和陽氣於
利之際也

第十一五積散

五積散方

積者聚也謂麻黃湯桂枝湯二陳湯四物湯平胃散

五方聚成一方也

世方命詳醫門法律

麻黃

六兩去根節 手太陰肺經

手少陰心經及足陽明胃經
發太陰少陰經汗 王海藏云

治衛實之藥

解表溫中泄熱
之劑
去痰消痞調經
之方

五積散

第十一

卷四

十一

甘草 三兩炙 入足太陰厥陰經

藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒熱相雜用之以得其平

肉桂 去麤皮三兩 入足太陰少陰經血分 治衛虛之藥

芍藥 三兩 入手太陰及足太陰經

乾薑 四兩煨 發 諸經之寒氣

陳皮 去白 六兩

半夏 薑製三兩 入陽明太陰少陰三經

茯苓 去皮三兩 入足少陰手足太陽經

枳殼 去瓢殼 炒六兩

桔梗 去頭硬一節及丫尾十二兩 入手太陰肺氣分及足少陰

當歸 兩

川芎 三兩

厚朴 去麤皮薑製四兩

蒼朮 米泔浸去皮二十四兩

白芷 兩三

右除肉桂枳殼二味別為麤末將十三味慢火炒令色轉攤冷次入枳桂令勻每服三錢水一盞

半生薑三片葱白二段煎一鐘

熱服 不炒者生料

○治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷外感風寒

○治感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡寒嘔吐或有腹痛

一治飲食所傷兼感風寒

一治飲食不節寒中陰經胸膈不快腹滿閉塞唇青手足冷脉沉細少情緒腹痛

一治寒濕客於經絡腰脚酸疼

一治風寒濕所搏臂痛或因提挈

重物所致臂痛或腫或不腫

一治冷積嘔吐泄痢

一治癥瘕

一治痘瘡本蘊熱毒小兒熱盛則飲冷熱則當風致被風寒所伏寒熱相搏面青發熱心煩自利

宜此散其內外之寒毒然後熱

氣上行或汗或瘡痘癰疹皆愈

一治女人經滯腹痛

一治產後經風腰膝酸軟遍身疼

痛拘攣

○若調經加艾醋棗生薑

冬月催主
殊奇劫

○若催生加艾醋

若產後加醋炒艾生薑

若中風加麝少許

○若中寒身體強直口禁不語或四

肢戰掉或洒洒惡寒翕翕發熱

或卒然眩暈無汗者此為寒毒

喻嘉言每
吐證用之在
奇效云

所中加香附一錢麝少許

○若於窓罅間梳洗卒然如中呼為

簷風加防風一錢

○若陰證傷寒手足逆冷及虛汗不

止脉細欲絕面青而嘔加附子

若時疫項強拘急加豆豉

腰痛

○若寒腰痛見熱則減見寒則增加

吳茱萸五分

○若腰痛加樺仁木瓜杜仲續斷治惡

血腰痛

若閃挫或勞役腰痛加炒桃仁五

枚

五積散第十一

卷四

十五

身痛

冷泄

丙傷冷物

若身痛加秦艽

療風無問新久通身拘急

若冷泄加炒生薑烏梅肉豆蔻陳

米

若脾胃不和丙傷冷物渾身疼痛

頭昏無力胸膈不利飲食不下

氣脈不和四肢覺冷或睡裏虛

驚至晚心躁困倦入鹽少許同

煎

若腳氣加全蝎三個人酒煎

○若鶴膝風加松杉木二節

○若寒濕流注兩腳酸疼有兼痰氣

加木瓜

腳氣

鶴膝風

寒濕氣

痛風

若筋骨疼痛俗呼為痛風或痛而
游走無定俗呼為走注風加乳

香

若偏墜加吳茱萸茴香桃仁麩蚰

各炒五分

附本方合和湯名治病

偏墜

惡按交

加散以多

味人多不

用之亦

不思而已

予時

用之得

奇驗

忽之乎

○交加散

即本方合敗毒散治風

有汗無汗疑似之間服之

治初得病頭疼發熱無陽毒少

陰諸證而咽喉自痛者或因

感冒後頓用厚衣被堆壅或用

蠻法服生薑熱酒即時遂成上

壅或先有壅熱欲取涼快致為

外邪所襲既有風寒又有壅熱

者附敗毒散方 羌獨活前

柴枳桔參苓川芎 各等分甘草減半

甘草

佐炙二兩 風淫于內以甘緩之

生薑

使三兩 風淫于內以辛散之

大棗

使十二枚 擘 風淫于內以甘緩之 同生薑行脾之津液

而和榮衛

醫聖元戎改桂枝芍藥生薑各一錢半 甘草一錢

右五味水七升微火煮取三升去

滓適寒溫服一升服已須臾飲

熱稀粥一升餘以助藥力溫覆

令一時許徧身漉漉微汗似者

益佳不可令如水流漓病必不

除若一服汗出病差停後服不

必盡劑若不汗更服依前法又

不汗後服小促少從容也其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服用時觀之服一劑盡病猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

一治太陽之為病脉浮頭項強痛

而惡寒

尺寸俱浮者太陽受病也當二三日發以其脉

上連風府故頭項強腰脊痛

一治太陽病發熱風在表則表實故令發熱惡

風

衛氣不能衛也

汗出

榮傷則無以固衛津液故汗出

脉緩

衛氣不能鼓也

者名為中風

一治太陽病頭痛發熱汗出惡風
一治太陽病發熱汗出此為榮弱
衛強故使汗出

一治太陽病先發汗不解而復下
之脈浮者不愈浮為在外而反
下之故令不愈今脈浮當解外

一治發熱汗解半日許復煩躁脈
浮數者可以此更發汗

一治太陽病初服桂枝湯反煩不
解者先刺風池風府却與本湯

一治中風陽浮而陰弱陽脈浮者
衛中風也

熱自發陰脈弱者
榮氣弱也汗自出 齋齋惡寒漸

八三
漸惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔

一治病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈

一治身熱汗出惡寒屬表病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和諧則愈

一治陽明病脈遲汗多微惡寒表未解者

一治自利不渴者屬太陰脈浮而

八三
緩手足自溫者繫太陰 下後
腹滿時痛者屬太陰 太陰病
脈浮者可發汗宜用之

一治厥陰下利清穀不可汗汗出
必腹滿下利腹脹滿身疼痛者
先溫其裏四逆湯乃攻其表以

本方

一治傷寒六七日不大便頭痛有
熱者與承氣湯其小便清者知
不在裏仍在表也須當發汗若
頭痛者必衄宜服本方

附本方加減湯名治病

桂枝葛根湯

即本方加葛根
太陽病項背強几几治

汗出
惡風

桂枝加附子湯

即本方加附子
治太陽病發汗遂

瀰不止其人惡風小便難
四肢拘急難以屈伸者

陽旦湯

即本方加黃芩
治中風傷寒脈浮發熱往來汗出

惡風項強
鼻鳴乾嘔

陰旦湯

即本方加黃芩以桂心代
桂枝乾薑代生薑治傷

寒股節疼痛內
寒外熱虛煩

葛根湯

即本方加葛根麻黃
治太陽病項背強几几無汗

惡風

桂枝加龍骨牡蠣湯

即本方加龍
骨牡蠣治

男子平人脈大為虛勞
面色薄者三瀉及亡血卒喘悸

浮者裏虛也。男子脈虛沉弦，無寒熱，短氣裏急，小便不利，面色白，時目瞑，兼衄，少腹滿，此為勞使之然。勞之為病，其脈浮大，手足煩，春夏劇，秋冬差，陰寒精自出，酸削不能行。男子脈微弱而澹，為無子。精清冷，夫失精家，小腹弦急，陰頭寒，目眩，髮落，脈極虛芤遲，為清穀，下血，失精，脈得之芤動微緊，男子失精，女子夢交。

桂枝加厚朴杏仁湯

即本方加厚朴杏仁治

傷寒喘而有汗，又治太陽病下之微喘者，表未解故也。

○黃耆建中湯

即本方加黃耆膠飴治男女因積勞虛

損，或大病後，小腹作痛，因體沉滯，骨肉酸痛，吸吸少氣，行動喘，或小便乾，唇燥，面目少色，或虛悸，咽乾，陰陽痿弱，悲憂慘戚，飲食無味，久者積年，輕者有日多，耐少起。

漸致瘦削五藏氣竭又治肺
與大腸陽俱不足虛寒之氣小渡
拘急腰痛
羸瘦百病

桂枝加芍藥人參新加湯即本方
加人參

倍芍藥生薑治發汗
後身體痛脈沉遲者

葛根半夏湯即本方加葛根半夏
麻黃甘草治太陽

與陽明合病不
下痢但嘔者

桂枝加芍藥湯即本方倍芍藥
治本太陽病醫反

下之因而腹滿時痛者屬人陰
也服之又治婦人傷寒中風

自汗頭痛項背強發熱惡寒脈
浮而緩惡熱入血室故倍芍藥

桂枝加桂湯即本方倍桂
治燒

挾起而赤者必發奔豚氣從小
腹上衝心者灸其臍各一壯服

此湯

小建中湯

即本方倍芍藥加膠飴一升 治太陽傷寒陽

脈澁陰脈弦腹中急痛 又治厥陰病煩滿囊縮其脈尺寸俱微緩若微浮為欲解不浮為未愈者服之 又治傷寒二三日心下悸而煩者 又治虛急悸衄腹中痛夢失精四肢酸疼手足煩熱咽乾口燥

桂枝去芍藥湯

即本方去芍藥 治脇滿邪氣傳裏

必先自胸而脇以次經心腹而入胃也是以胸滿多帶表證脇滿多帶半表半裏證如下後脈促胸滿者宜此

桂枝去桂加白朮湯

即本方去桂加白朮 治

太陽傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴脈浮虛而瀉者桂枝附子湯若大便硬小便自利者宜服此湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

即本方去桂加

茯苓白朮 治汗下後仍頭痛
項強發熱無汗 心下滿微痛 小
便不利 心下滿痛 小便利者 成
結胸 小便不利 為停飲 故加苓
未以行之 又治厥陰為病 消
渴 氣上衝心 心中疼熱 飢而不
欲食 食即吐 疏下
之利不止者 服之

桂枝加附子紅花湯

即本方去大

花 治婦人傷寒表虛自汗身
涼四肢拘急脈沉而遲太陽標

病少陽本病
經水適斷

黃耆桂枝五朮湯

即本方去甘草
加黃耆 治血

痺

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救

逆湯

即本方去芍藥加蜀漆龍
骨牡蠣 治傷寒脈浮以

火迫劫之亡陽必
驚狂起臥不安者

越婢湯

即本去桂枝芍藥加麻黃石膏 治發熱惡寒脈微

桂枝皂角湯

即本方去芍藥生薑 治肺痿

附本方合和湯名治病

○桂枝麻黃各半湯

即本方合麻黃湯 治太陽病

後之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不可一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽

俱虛不可更發汗更下更吐也

面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必癢者服之

又治陽明病法多汗反無汗其身如蠱行皮中狀者此久

虛故也 又治厥陰之為病煩滿囊縮其脈尺寸俱微緩若浮

緩者必囊不縮外證必發熱惡寒似瘧為欲

愈宜服此

桂枝二麻黃一湯

即本方二分麻黃湯一分

服桂枝湯，若形如瘧，日再發者，宜服此湯解之。

桂枝二越婢一湯 卽本方二分越婢湯一分治

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發汗者

第十三麻黃湯 本方加減湯名十三方附于后

麻黃湯方

麻黃 君去節三兩 輕可去實 辛溫之味主發散寒邪

桂枝 臣去皮三兩 寒邪在經 表實而腠密故用此為臣

甘草 佐炙 兩

杏仁 使去皮七十 個 剉氣

麻黃湯第十三 三十

右以水九升先煮麻黃減二升去
上沫內諸藥煮取二升去滓溫
服八合覆取微似汗不須啜粥
餘如桂枝湯法

一治太陽病或已發熱未發熱必
惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者

名曰傷寒

一治太陽病頭痛發熱身疼腰痛
骨節疼痛惡風無汗而喘者

一治傷寒脈浮緊不發汗因致衄
者

一治太陽病脈浮緊無汗發熱身

面青善怒其三部脈俱弦而浮

惡寒裏和謂便清自調也本方加防風

羌活各三錢謂肝主風是膽經受病大便秘或泄

下赤水並數皆裏不和也

假令得心脈其外證面赤口乾善

笑其尺寸脈俱浮而洪惡寒裏

和本方加黃芩石膏各三錢謂心

主熱是小腸受病也

假令得脾脈其外證面黃善噫善

思善味尺寸脈俱浮而緩裏和

惡寒本方加白朮除濕防已療風寒

各五錢謂脾主濕是胃經受病也

假令得肺脈其外證面白善嚏悲

愁不樂欲哭其尺寸脈俱浮而

澁裏和惡寒本方加桂枝生薑

各三錢謂脾主燥是
大腸受病也

假令得腎脈其外證面黑善恐其

尺寸脈俱浮而裏和惡寒本方

加附子生薑

謂腎主寒是
膀胱受病也

附本方加減湯名治病

麻黃加生地黄湯

即本方加生地
黃治婦人傷

寒脈浮而緊頭痛身熱惡寒無
汗發汗後恐熱入血室者用之

麻黃黃芩湯

即本方加黃芩
治喘渴氣壅

麻黃白朮湯

即本方加白朮
治風濕相搏腰以上腫

大青龍湯

即本方加薑大棗石膏

發熱惡寒身疼不出汗而煩躁
又治傷寒脈浮緩身不疼
但重乍有輕時
無少陰證者

三拗湯

即本方去桂枝
治咳喘氣壅

麻黃湯

即本方去桂枝加
桑白皮 治喘促

五虎湯

即本方去桂枝加知
母石膏 治痰喘

麻黃杏仁甘草石膏湯

即本方去
桂枝加石

膏 治發汗後不可更行桂枝
湯汗出而喘無大熱者
後不可更行桂枝湯
汗出而喘無大熱者

麻黃杏仁薏苡仁甘草湯

即本方
去桂枝

加薏苡仁 治風濕一身盡痛
發熱日晡所劇者此名風濕此
病因於汗出當風或
久傷取於所致者

杏仁湯即本方去甘草加犬門冬芍藥治風濕身痛惡風

脾微

麻黃桂枝湯即本方去杏仁加桃

麻黃黃芩湯即本方去杏仁加赤芍黃芩治小兒傷

寒無汗頭痛身熱惡寒

葛根解肌湯即本方去杏仁加葛根赤芍治疫癘

第十四藿香正氣散本方加臧湯名三方附后

藿香正氣散方

藿香 陳皮去白各三錢

白朮土炒 厚朴紫油者去麩皮薑汁炒

桔梗去麩硬一節及叉尾 甘草炙

半夏黃芩制水 紫蘇各二錢

治四時不正之氣感則增寒壯熱之主劑

大腹皮

白芷

白茯苓各錢

右為麤末每服四五錢水一鍾半
生薑三片大棗一枚去核煎熱
服如欲汗去棗加葱白三莖熱
服溫覆取汗

吳山甫曰風寒客於皮毛腠理
宜解表四時不正之氣由鼻而
入不在表而在裏故不用大汗
以解表但用芬香利氣之品以
主之白芷紫蘇香陳皮腰皮
厚朴苦楝皆氣勝者也故足以
正不正之氣白木茯苓甘草半
夏則甘平之品耳所以培養中
氣而樹中營
之機者也

吳綬曰此方宋人所制非正傷
寒之藥若病在太陽經頭眩發

中風

熱骨節痛者此方全無相干如妄用之先虛正氣逆其經絡雖汗出亦不解變或壞證多矣凡傷寒發熱脈沉與元氣虛并夾陰傷寒發熱者切宜戒之

一治中風

戴復庵曰肥人多有中風於內也肺為氣出入之道肥者氣必急氣急必肺邪盛肺金尅木膽為肝之府故痰涎壅盛所以治之必先理氣為急中後氣

未盡順痰未盡除調理之劑惟當以藿香正氣散和星香散煎服

附星香湯南星四錢木香五分薑煎

一治中氣

中氣之證與中風相似但中風身濕有痰涎多

不能治中氣之證身涼無痰涎須臾便醒其故何也夫中風由氣一源流也皆由喜怒思悲恐五志惟怒為甚所以為病之暴也蓋少壯之人氣血未虛真水未竭適因怒動肝火火畏於水

中氣

小言

藿香正氣散第四

卷四 三八

中惡

不能上升所以身涼無痰涎然
須臾便醒者水吐足以降火也
此名為中氣

一治中惡

其證暮夜或登廁或出
野或遊冷屋或行人

所不至之地忽然眼見鬼物鼻
口吸著惡鬼氣驀然倒地四肢
厥冷兩手握拳口鼻出清血此
名中惡切勿移動其屍服此湯

一治傷寒頭痛憎寒壯熱上喘啞

傷寒

嗽

一治傷暑

戴復庵曰傷暑自汗手
積者本方合五苓散服

一治暑風

戴復庵曰傷暑自汗手
足時自搖擲者謂之暑者

風統已傷於暑毛孔開又邪風
乘之或暑月身癢如針刺間有
赤腫處亦名暑風或加以吐瀉
兼作本方合六和湯加全蠍
附六和湯方 砂仁半錢杏仁
人參甘草各一錢 赤苓藿香扁

傷暑
暑風

霍亂

豆木瓜各二錢 香薷厚朴各四錢 每劑四錢 生薑棗子煎服

○一治內傷外感而成霍亂吐瀉胸痞腹疔氣不升降甚則手足厥冷汗自出或吐而不瀉或瀉而不吐或吐瀉兼作或吐瀉不透先以蘇合丸通其痞塞繼進本

方加木香半錢 或瀉而不吐

胸膈痞滿先以陰陽湯水一牛滾水一牛

或鹽湯頓服以導吐已吐未

吐並用本方進蘇合丸 或吐

而不瀉心腹疔痛頻欲登園苦

於不通本方加枳殼一錢 或

乾霍亂
絞腸痧

吐瀉兼作心腹纏擾本方加官

桂木香各五分

或欲吐不吐欲瀉不瀉心腹纏
擾痛不可忍上下不通言語不
定如見鬼神俗謂之乾霍亂又
謂之絞腸痧先以濃鹽湯頓服

次調蘇合丸繼進本方加木香

枳殼各五分

腹痛

一治腹痛

戴後庵曰腹痛之病所感不一或因寒熱或因

暑濕或因飲食饑飽不問何證皆可用本方加木香五分若腹痛欲得熱手按及喜熱食此是積冷作痛當用理中湯等溫藥如溫藥不效愈痛大便不甚通當微利之用本方加官桂木

痢

香枳殼各五分
以吞來復丹

一治痢

戴復庵曰：凡痢初發不問赤白裏急後重，頻欲登閤

及去而所下無多，既起而腹內後急，宜本方加木香五分，下蘇合丸，或赤痢血色鮮紅，或似蛇蟲形，而問有鮮血者，此屬熱痢，宜本方加黑豆三十粒，下黃連丸。感暑而痢，痛甚而食不進，本方合六和湯，即名木香交加散。

翻胃

一治翻胃嘔惡

瘴氣

一治山嵐瘴氣

藏府虛

一治藏府虛鳴

集要本方條下可考

丹鳴

一治發丹

戴復庵曰：丹狀不一，紫痛亦異，古方名癰疹，大

槩皆因血熱肌虛，風邪所搏而發，然色赤者多，故謂之丹，俱宜用本方。有人一生不能食雞肉及鯉魚、動風等物，纔食則丹

冷嗽

隨發以此見得係是脾風脾主
身之肌肉本方乃治脾之劑屢
試屢
驗

○一治冷嗽喘滿加人參杏仁五味

子 玄治法印用世法屢驗

附本方加減湯名治病

順氣木香散 即本方加木香玄胡
索 治心腹疼痛嘔惡

心腹痛

者熱

○二香湯

即本方加香薷扁豆葛根
治自夏至以後時令暑

熱有人吐熱煩渴而不惡寒者
乃熱病也 若兼有內傷生冷
飲食停滯或嘔吐惡心中腕痞
悶或惡風或憎寒拘急者並治

○藿薷湯

即本方加香薷扁
豆黃連 治暑

醫續留屢試世方

第十五升麻葛根湯

本方加減湯名八方附于

后

治痘疹之總劑

升麻葛根湯方

錢氏方

升麻

解肌肉問熱

白芍

酒炒收陰

健脾補表止腹痛而

之而附氣也痘解不斂賴以收之而成功也又止鼻癢而驅蒸

升麻

升麻葛根湯第十五

卷四

四四

鬱七日前少用
七日後不禁示

北草灸以上各一錢解諸毒瀉
火健脾和中賴此分理陰陽

正君臣
之道也

葛根二錢解肌發
表出汗開腠理

右水一盞煎至一盞去滓稍熱服

日三服

疹

一治疹子初發熱時與傷寒相似

但疹子則面頰赤咳嗽肺葉焦

舉也噴嚏鼻流清涕鼻為肺之竅

液自目中淚出肺熱則移於肝

呵欠喜睡或吐瀉或手搯眉目

唇鼻及面肺熱不可妄用汗下

疹子渴

宜本方發之

一治疹子初發熱之時時令太熱

本方合人參白虎湯即人參石膏甘草知

母粳米發之

一治疹子渴喜飲水純是火邪肺

焦胃乾心火內亢故也初發熱

渴者加天花粉麥門冬

一治痘疹諸證若初發熱解表加

柴胡羌活白芷桔梗防風

若發熱三四日熱甚不減宜解毒

加大力子連翹聖藥紫草桔梗

若痘不出加防風蟬蛻荆芥紅花

痘不出

出不快

若痘出不快清便自調乃邪在表也當用本方微發散

若陽明經出不快者加紫草

若痘出太稠密加人參當歸木香

紫草大力子防風桔梗

若痘初出其間碎密如疥子者夾

稠密

夾疹

夾斑

疹也 皮肉紅腫成片者夾斑

也疹由心熱斑由胃熱宜急解

其毒夾疹加防風荆芥穗木通

麥門冬黃連 ○夾斑加石膏大

參大青玄參淡竹葉

若痘出自利加條黃芩生用

自利

腹瀉

若瀉出腹痛加木香青皮枳殼山

查肉

腰痛

若瀉出腰痛加獨活北細辛治腰痛獨

活為使

頭痛

若瀉出頭痛加羌活藁本蔓荊子

驚悸

若瀉出驚悸加木通安生地黃血

寧心燈心

小便少

痘出小便少加木通車前瞿麥

大便秘

痘出大便秘加大黃

衄

痘出衄血加山梔玄參乃樞機之劑管領諸

氣上下肅清瀉無根之火為聖藥生地黃

眼痛

痘出眼痛加蜜蒙花柴胡明目龍

痘色赤

膽草

治口赤腫睛脹瘀肉高起以柴胡為君乃眼痛必用

之藥

若夏秋之間常有酷熱忽為執氣

所蒸其痘色變或大赤掀發或

糜嫩不堅實本方合白虎湯

湯方用石膏廿二草知母粳米

痘咽痛

若痘出咽痛加桔梗連翹

痘紫

若痘瘡乾或帶紫或火赤血熱也

加當歸尾生地紅花地骨皮牡

丹皮

灰白

若痘瘡灰白色平陷者氣虛也加

人參黃耆防風木香官桂

痘不起

若手足痘不起，脾胃不足也。加防

風官桂、人參、黃耆。

痘發不透

若痘太密，起發不透，又渴者，此津

液不足，加人參、麥門冬、天花粉。

痘出泄瀉

若痘出泄瀉者，裏虛也。加人參、白

朮、訶子、白茯苓。

不結痂

若痘不結痂者，濕熱也。加黃芪、防

風官桂、白朮。

痘後癢

○若痘後遍身瘡癬如疥如癩，膿血

浸淫，皮膚潰爛日久不愈，此毒

氣彌漫散於皮膚，此方主之。

附論 古人謂但見紅點，便不可

小兒痘疹

升麻葛根湯第十五

三

五

此論真折衷

蓋為痘毒少者言後人不達立
言之旨遠謂凡出痘子纔見紅點
其不可服藥殊不知此麻葛根湯
味乃發表解毒通氣血升降陰
陽之劑痘出太密止宜常服以解
之令隨者升之燥者潤之鬱者疎
之過者平之陰精不衰而陽毒不
亢也苟謂麻疎毒少者雖他藥不
可服况葛
根湯乎

附本方加減湯名治病

熱甚

如聖湯

即本方加紫草木通生薑煎服
治痘疹熱甚恐生

他變預解之

○桂枝葛根湯

即本方加桂枝防風入生薑淡豆豉同煎

痘不作膿

痘作痒

治痘瘡發熱之後正待作膿却
不作膿如感風寒宜此溫散
又治疹子發熱之時如時令
太寒以此發之又治痘初出
之時便身癢爬搔不寧者此毒
火留於肌肉之間應出不出游

升麻葛根湯第十五

升麻葛根湯第十五

五

五

疔色變
青灰白

疔中心
凸四圍
平無水
疔倒伏

散往來故作癢也不可作肌肉
虛癢宜此方加荆芥牛蒡王之
又治冬春之間常有暴寒忽
為寒氣所侵其疔色變或青或
灰白頭水凝凍不能成漿加麻
黃膠之 又治疔瘡起發中心
凸起四圍乾平無水者或裏紅
外黑者此由平日感受風寒皮
膚堅厚以致疔毒鬱而不散以
此發之 又治疔癢感風而肌
癢閉塞血凝而不行必身痛四
肢微厥斑點不常或變黑色或

疔頂不
起

疔疹渴

變青紫癢疹此為倒伏宜溫
發散加麻黃蟬蛻眼 又治疔
瘡頂皮不起根脚不開猶是先
出之形不見新生之水此謂起
發不透審察證候如氣本實者
必會感風寒宜此方合奪命丹
附奪命丹方 麻黃酒蜜炒焦
升麻各五錢山豆根紅花子大
九子連翹各二錢半蟬蛻紫草
各錢半人中黃三錢酒蜜丸
葛根麥門冬散 即本方加麥門冬
人參石膏茯苓

和中解
表

痘太熱
而渴

痘出熱
不減

治斑疹毒
太熱而渴

和解散

即本方加人參防風川芎
和中之劑

○連翹升麻湯

即本方加連翹桔梗
薄荷牛蒡木通人淡

竹葉燈心煎 治癰身熱如火
大小便不通而渴 痘勢稠密其
毒必盛宜解毒兼利小便此方
主之 又治痘疹發熱痘已出
熱不少減此毒蘊於中其勢方
張其膽必密宜急解毒加防風

荆芥地
骨皮

葛根解毒湯

即本方去芍藥加麥
門冬天花粉生地黃

入糯米泔煎去渣更加茅根自
然汁一合服 治痘太密津液

不足咽乾
膈燥而渴

人參麥門冬散

即本方去芍藥加
麥門冬人參白朮

入糯米竹葉煎 治痘後作渴
欲飲水此心胃二經受邪熱也

痘燁渴

痘渴

其人必能食大便秘小便赤舌	燥咽乾若食少大小便自調雖	好飲湯咽舌不燥此脾胃虛津	液不足也更加天花粉又治	痘太密津液不足咽乾膈燥而渴
--------------	--------------	--------------	-------------	---------------

