



門  
第  
611  
5

同山

小  
青囊第五卷湯名目錄

第十六補中益氣湯

補中益氣加黃柏知母湯

補中益氣加神麴黃芩名升陽  
益胃湯

補中益氣加益智黃芩半夏蒼朮

紅花名人參  
益胃湯

目錄一

卷五

補中益氣去當歸湯

補中益氣去當歸加蒼朮木香名調

中益氣湯

補中益氣去白朮加半夏黃芩神

麴草豆蔻名升陽益胃湯

補中益氣去升麻加生地川芎細

辛羌活防風名調榮養氣湯

第十七小柴胡湯

小柴胡加五味子湯

小柴胡加牡丹皮湯

小柴胡加生地黃湯

小柴胡加茯苓湯

小柴胡加芒硝湯

小柴胡加白木麥門冬名柴胡半夏湯

小柴胡加陳皮芍藥名柴胡雙解散

小柴胡加枳桔湯

小柴胡加乾薑牡蠣湯

小柴胡加芒硝大黃湯

小柴胡加桂枝芍藥名柴胡桂枝湯

小柴胡加黃連白芍玄參升麻名

味小柴胡湯

小柴胡加生薑橘皮竹茹湯

小柴胡去棗加牡蠣湯

小柴胡去黃芩加茯苓湯

小柴胡去薑黃芩加芍藥湯

小柴胡去半夏加人參栝萸湯

小柴胡去人參大棗加五味子乾

薑湯

小柴胡去人參加大黃赤芍枳實

名大柴胡湯

小柴胡去大棗加大黃赤芍當歸

名柴胡飲子

小柴胡合五苓散

名柴苓湯

第十八 涼膈散

涼膈散加青黛藍根

名活命金丹

涼膈散加遠志菖蒲朱砂

名轉舌膏

小  
補  
中  
益  
氣  
湯  
方

卷  
五

涼膈散加黃連名清心湯

涼膈散合四物湯名三和湯

小青囊湯名卷之五

秣陵朮如王良璨玉卿氏編次

秋浦天池朱正源靜之氏助梓

第十六補中益氣湯本方加減湯名七方附于

后

補中益氣湯方

小  
補  
中  
益  
氣  
湯  
方

補中益氣湯十六

卷五

一

黃耆 蜜炙 一錢

甘草 炙 五分

人參 三分 以上三味除濕熱煩熱之聖藥也

當歸身 酒洗 二分 和血脈

橘皮 不去白 二分 以導氣又能益元氣得諸甘藥乃可若單用

則瀉

柴胡 二分 引清氣行少陽之清氣上升

升麻 二分 引胃氣上騰復其本位 便是行春升之令 乃陽明

經之的藥若補脾胃非此為引用則不能補

白朮 三分 除胃中熱利腰膝間血 忌桃李雀胡荽蒜青魚鮓

右作一劑水二盞煎一盞去渣午

前熱服 一方有白芍 秋冬不用 黃柏 二分 以滋腎水瀉

補中氣湯

卷五

伏火紅花三分入心養血

一治內傷勞倦時疫發熱

一治勞倦傷脾中氣不足懶于言

語惡食澹泄日漸瘦弱吳山甫曰脾主

四肢若遇飢餓無穀氣以養脾故令中氣不足懶于言語脾氣

不足以勝穀氣故惡食脾弱不

足以尅制中宮之濕故澹瀉脾

主肌肉故瘦弱五味入口甘先

入脾參薯歸朮甘草皆甘物也

故入脾即補中氣中氣者脾胃

之氣也人生與天地相似天地

之氣一升則萬物皆生天地之

氣一降則萬物皆死故用升麻

柴胡為佐以升清陽之氣所以

法象乎天地之升生也用陳皮

者一能疎通脾胃一

能行甘溫之滯也

一治瘡瘍元氣不足四肢倦怠口

補中氣湯十六



薦痢

帶

厚肌

皮風痒

遺溺

乾發熱飲食無味

○一治瘧疾經年不愈者名曰瘵音

瘵，老也。經年不愈，則氣血皆虛。瘵，邪深入矣。氣虛則有參、薯、朮、草以補氣，血虛則有當歸以養血。瘵邪深入，則有柴胡升麻以升與之，陳皮消痰，瀉氣能助升麻以成功。若發于晚者，入陰分血也。倍加當歸。

一治久久瀉痢

一治赤白帶

一治產後脫肛

一治中氣不足，衛氣不舒，以致皮

風搔癢

○一治陰陽不調，水火不濟，遺溺

補中益氣湯十六

四

濁 淋

中痛

男痛

○

一治勞淋傷損元氣下陷

一治胃氣虛弱下陷便濁

一治內虛脾胃下陷食不知味五

心煩熱

一治氣虛中滿不思飲食

頭痛加蔓荊子三分主頭痛痛甚

頂痛

者加川芎

治太陽經頭痛

頂痛腦痛加藁本五分

主頭細辛

三分

主少陰經頭痛

頭痛有痰沉重懶倦者乃太陰厥

陰頭痛加半夏五分或一錢生

薑三片

頭眩

內傷勞倦陰虛頭眩加川芎天麻

防風蔓荊子

耳鳴目黃

耳鳴目黃頰頰音腫脛肩膈音肘

臂外後廉痛面赤脉洪加羌活

一錢防風七分甘草三分益元氣瀉

水蒙本五分通經黃連黃芩各

三分消腫

煩亂如腹中或身中有刺痛有血

澁不足倍當歸身五分

噤痛頰腫脉洪大面赤加黃芩三

分桔梗七分甘草三分

口乾噤乾或渴加葛根五分升胃

口乾

噤痛

煩亂

1 草

氣上行 之

口乾舌乾加芍藥主消渴麥門冬

心下痞者音茂悶者加芍藥宣通藏府壅氣

黃連各一錢

痞腹脹加枳實主心下急痞三分厚朴

七分木香砂仁各二分如天寒

加乾薑

心下痞嘔逆加生薑黃連陳皮各

月少加藿香丁香

心下痞脈滑緩有痰加半夏黃連

心下痞脈弦四肢滿閉便難加柴

胡黃連甘草

補中益氣湯十六

七

腹痛

心下痞能食加黃連

腹痛加炒白芍五分炙甘草五分

腹痛惡熱喜寒加白芍五分炙甘

草三分生黃芩三分

天涼時惡熱腹痛加白芍五分炙

甘草三分少加桂

天寒腹痛去白芍加益智善調半

夏五分生薑三片

夏月腹痛不惡寒反惡熱加黃芩

五分白芍一錢甘草五分以治時熱

惡寒覺腹冷痛加桂心五分

腹痛水瀉伏火加白芍秋冬不用

補中氣血氣湯十六卷五八

膈下痛

但加紅花少加黃柏瀉隱伏之龍火

○膈下痛加熟地五分其痛立止如

不止乃大寒也更加桂三分

胸中滯氣加連翹青皮一分或二

分壅滯可用氣促少氣者去之

多吐唾或吐白沫胃口呆痰加

滯氣

吐哩

痰

益智止嘔噦砂仁

身有疼痛者濕也身重者亦濕也

加四苓散一錢四苓散方即五

茯苓白朮猪苓澤瀉

風濕相搏一身盡痛加羌活柴胡

藁本治一百六各五分升麻蒼

十種惡風補中益氣湯十六

秘

木各一錢如病去勿再服

大便秘加當歸稍一錢閉澀不行者煎成正藥不用一口調玄明粉一錢或五分得行則止此病不宜下下之恐變凶證也

瀉泄

○大便瀉泄不已加附子一錢穀不

泄

化加砂仁

○內傷脾胃氣虛下泄加肉豆蔻訶子

嗽

○久病嗽者去人參初病者不去冬月或春寒或秋涼時加不去節麻黃春月天溫加佛耳草二分

久病去參  
初病不去  
之論詳  
醫方集  
詳也

小  
身  
重

補中氣湯十六

卷五

十

治寒嗽及痰升肺氣欬冬花為使欬冬花一分

夏月嗽加五味子二十五粒麥冬

五分如舌上白胎滑者胸中有

寒勿加

夏月天溫嗽加佛耳草欬冬花各

五分

夏月不嗽亦加人參三分五味子

麥門冬救肺受火邪

冬月嗽加不去節麻黃五分秋涼

亦加之

初病之人雖痰嗽不去人參必不

增添若久病肺中有伏火去之



以防痰嗽增益耳

久嗽食不下，乃胸中有寒，或氣澀

滯，加青皮、木香。寒月加益智

草、豆蔻各五分。春初猶寒，少

加辛熱之劑，以補春氣之不足。

為風藥之佐。益智草，夏月加

芩連。秋月加檳榔、砂仁。長

夏濕土客邪，太王加蒼朮、白朮。

澤瀉，上下分消其濕熱之氣。濕

熱太勝，主食不消，故食減。不知

穀味，則加神麩以消之。加五味

麥冬，助人參瀉火，益肺氣。在三

臣夏

伏中為聖藥

注夏病加白芍炒黃柏有痰加半

立方之意解  
得不套

夏去升麻柴胡

脇痛

脇下急或痛倍柴胡人參甘草

精神少

精神短少加人參五分五味子二

十粒

胃脘痛

胃脘當心痛加草豆蔻三分瘦甚

人白朮參耆有用至一二兩者

勞力感  
甚

辛苦勞役之人患頭痛惡寒身熱

又骨腿酸疼微渴自汗脈浮大

無力節菴曰為勞力感寒加辛

溫之劑

小便數

腎虛有熱小便數加知母黃柏生

地麥冬

傷寒汗下後熱不解陰虛火動而

遺尿者加黃柏知母生地麥冬

五味

傷寒後勞復發熱氣高而喘身熱

遺尿

勞復

失精

而煩四肢怠惰只依本方

夢中失精或虛勞煩感或自汗陰

虛不足者加黃柏知母各一錢

五味子九粒麥冬一錢半

有宿食不消心下痞者去升麻人

參加枳實黃連各一錢主之

食不消

不計

不能計者加遠志酸棗仁各一錢

茯神一錢半

脈弱人虛倍人參

自汗盜汗倍黃耆

胃弱食少倍白朮

外熱多倍軟苗柴胡

虛

自汗盜

胃弱

### 附本方加減湯名治病

補中益氣加黃柏知母湯

即本方加黃柏

知母 治狐疝 狐疝者 晝則氣出而腎囊腫大 夜則氣入而腫皆消 果山甫曰 夫狐之為物也 晝則出穴而溺 夜則入穴而溺 以斯證肖之 故名焉 晝屬陽 夜屬陰 晝病而夜否者 氣病而血不病也 故用參 甘草 白朮 以益氣 升麻 柴胡 以舉其下

陷之陽黃柏知母以蒸夫不足  
之坎當歸味辛以活其壅滯之  
血陳皮氣芳以利其陳腐之氣

**升陽益胃湯**

即本方加神麴生黃

結黑血成塊左邊有血癥水泄  
不止穀不消化後血塊暴下併  
水俱作夫血脫益氣古聖人之  
法也先調胃氣以助生發之  
氣故曰陽生陰長諸甘藥為之  
先務舉世皆以為補殊不知其

能生血此陽生陰長之理也故

先調胃氣人身內以穀氣為本

又治內虛脾胃下陷食不知

味五心煩熱又治陽氣下陷

泄瀉加

桔梗

**人參益胃湯**

即本方加益智黃芩

頭勞動則微痛不喜飲食四肢  
怠惰躁熱短氣口不知味腹鳴  
大便微澀身軀昏悶覺渴不喜冷物

補中益氣去當歸湯

即本方去當歸

痞悶 內經曰清陽在下則生  
發泄濁陰在上則生填滿由中  
氣不足而不能升清降濁耳參  
著甘草白朮所以補中陳皮所  
以利氣柴胡升麻所以升舉下  
陷之陽清陽升則濁陰自降痞  
悶自除發泄自止去當歸  
歸者惡其清利故也

調中益氣湯

即本方云當歸加  
木香 治因飢

勞役損傷脾胃元氣不足其脈  
弦洪緩而沉按之中之下時得  
一瀉其證四肢滿悶肢節疼痛  
難以屈伸身體沉重煩心不安  
昔肥今瘦四肢懶倦口失滋味  
腹難舒伸大小便清利而數或  
上飲下便或大便澀滯或夏月  
發泄米穀不化或便後見血或  
便見白膿胸滿短氣咽膈不通  
痰唾稠粘口中沫食入反出  
耳鳴耳聾目中流火視物昏花  
瘡肉紅絲執壅頭目不得安臥

補中益氣湯十六

卷五

十七

不思飲食或氣虛中滿等證

附加感在後

如是顯熱躁是下元陰火蒸蒸然發也加生地二分黃柏三分

如大便虛坐不得或大便秘而不了腹中常常逼迫皆是血

虛血澀加當歸身三分

如身體沉重雖小便數多加茯苓二分黃柏三分澤瀉五分

蒼朮一錢從權以去濕不可常用兼足太陰已病其麻痺

絡于心中故顯濕熱相合而生煩亂

如胃氣不和加半夏五分生薑

三片有嗽加生薑生地二分以製半夏之毒

如痰厥頭疼非半夏不能除此足太陰脾邪所作也

如躁熱加黃柏生地各二分

如夏月加白芍三分

如春月腹痛亦加白芍如惡熱而渴或腹痛加白芍生

校正論  
厚贊也  
方且嘆  
令人多  
不用之

如惡寒腹痛加桂三分去黃芩  
如冬月腹痛去芍藥加乾薑二

分或加半  
夏五六分

升陽順氣湯

即本方去白朮不加半

治飲食不節勞後所傷腹脇  
滿悶短氣遇春則口淡無味遇  
夏雖熱猶有惡寒飢則  
常如飽不喜食冷物

調榮養氣湯

即本方去升麻加生

風治頭疼身熱惡寒微渴  
然汗出身作痛脚腿痠疼無力  
沉痾脉空虛無力庸醫不識因  
見頭疼發熱惡寒便呼為正傷  
寒大發其汗致輕變重殊不知  
勞力內傷其氣血外感寒邪宜少  
用辛甘溫之劑則愈名曰勞力  
感寒故經曰勞者溫之損者溫  
之溫能除大熱此之謂也  
附陶節菴加減并槌法  
元氣不足者加升麻少許須知  
元氣不足者至陰之下求其

補中益氣湯十六  
十九



升

口渴加天花粉知母

喘嗽加杏仁去升麻

胸中煩熱加山梔竹茹

汗出不止加芍藥升麻細辛

乾嘔加薑汁炒半夏

胸中飽悶加枳殼桔梗去生地

甘草少用黃耆白朮

痰甚加瓜蒌仁貝母去防風細辛

腹痛去黃耆白朮加芍藥乾薑

有因血鬱內傷有痛處或大便

黑加桃仁紅花去芍藥細辛

羌活防風黃耆白朮甚者加

大黃下蓋瘀血則愈後依本

方去大黃調理

按東垣立方本旨云夫脾胃虛者

因飲食勞倦心火亢甚而乘其土

位其次肺氣受邪須用黃耆最多

人參甘草次之脾胃一虛肺氣先

補中益氣湯十六

絕故用黃耆以益皮毛而閉腠理  
不令自汗上喘氣短損其元氣人  
參以補之心火乘脾灸甘草之甘  
溫以瀉火熱而補脾胃中元氣若  
脾胃急痛腹中急縮者宜多用之  
經云急者緩之白朮甘草甘溫除

胃中熱利腰臍間血胃中清氣在  
下升麻柴胡以引之黃耆甘草甘  
溫之氣味上升能補衛氣之散解  
而實其表也又緩帶脈之縮急二  
味苦平味之薄者陰中之陽引清  
氣上升也氣亂于胸中爲清濁相

干用去白陳皮以理之又能助陽  
氣上升以散滯氣助諸甘辛爲用  
也脾胃氣虛不能升浮爲陰火傷  
其生發之氣榮血太虧榮氣不榮  
陰火熾盛是血中伏火日漸煎熬  
血氣日減則心無所養致使心亂  
而煩病名曰恍惚者心惑而煩悶  
不安也故用甘溫之劑生陽氣陽  
王則能生陰血更以當歸和之少  
加黃柏以救腎水能瀉陰中之伏  
火如煩不止加生地補腎水水王  
而心火自降

吳山甫曰中氣者脾胃氣也五藏  
六府百骸九竅皆受氣于脾胃而  
後治故曰土者萬物之母若肌飽  
勞役傷其脾胃則衆體無以受氣  
而皆病故東垣諄諄以脾胃爲言  
也是方也人參黃耆甘草甘溫之

品也甘者中之味溫者中之氣氣  
味皆中故足以補中無白朮汁而  
微燉故能健脾當歸質潤辛溫故  
能澤土木以燉之歸以潤之則不  
剛不柔而土氣和矣復用升麻紫  
胡者升清陽之氣于地道也蓋天

地之氣一升則萬物皆生天地之  
氣一降則萬物皆死觀乎天地之  
升降而用升麻柴胡之意從可知  
矣或曰東垣謂脾胃一虛歸氣先  
絕故用黃耆以益皮毛不令自汗  
而泄肺氣其辭切矣予考古人之  
方而更其論何也余曰東垣以脾  
胃爲肺之母故耳余以脾胃爲衆  
體之母凡五藏六府百骸九竅莫  
不受其氣而母之是發東垣之未  
發而廣其意耳豈曰更論

第十七小柴胡湯

本方加減湯善  
二十方合和湯

大名一方共計二  
十一方附于后

小柴胡湯方

仲景方 潔古名王泰  
湯謂不汗不下不利小

便也

柴胡

若半觔 內經曰熱淫于  
內以苦發之 柴胡黃芩之黃  
以發傳邪之熱故用  
柴胡為君黃芩為臣

半表半  
裏之劑

黃芩臣兩

半夏佐半升邪初入裏裏氣必逆是以辛散之物為助故

用半夏為佐

生薑使三兩

大棗使二十枚去核內經曰辛甘發散為陽故用生薑大

棗為使

人參三兩

甘草三兩邪氣傳裏則裏氣不治故用人參甘草之甘溫以

扶正氣

右七味以水一斗二升煎至六升

去滓再煎取三升溫服一升日

三服

或問此方分兩動以筋計與今時製方大有徑庭何也曰此漢時方也蓋古之斗斛銖兩比今不同故今之三兩為漢斤五兩古之三升為今一升也又問半夏黃芩畏生薑生薑惡半夏黃芩胡為同劑曰正仲景製方之神也如彼所畏者畏其能也我所惡者惡其毒也然主治在半夏黃芩不得不用故以生薑製其毒使不得以自縱也若製之太過則盡奪其權將無

有功矣

一治太陽病十日已去脈細而嗜卧外雖已解設胸中滿痛者與服之

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇若痛默默不飲食心煩喜嘔或



煩而不嘔或渴或腹中痛或脇  
下痞鞭或心下悸小便不利或  
不渴身有微熱者此湯主之

血氣弱腠理開邪氣因與正氣相  
搏結于胸下邪正分爭往來寒  
熱休作有時嘿嘿不飲食藏府

相連其痛心下邪高致使嘔也  
此湯主之

傷寒五六日身熱惡風頭項強脇  
下滿手足溫而渴者與服之

傷寒陽脈濇陰脈弦腹中急痛先  
與小建中湯不差者此湯主之

大陽病過經十餘日發汗吐下後  
四五日柴胡湯證仍在者先與  
此湯嘔不止心下鬱微煩者為  
未解也與大柴胡湯下之則愈  
傷寒五六日頭汗出微惡寒手足  
冷心下滿不欲飲食大便鞭音  
脈細者為陽微結必有表復有  
裏脈沉亦裏也汗出為陽微假  
令仍純結不得復有外證悉入  
在裏此為半在表半在裏也脈  
雖沉緊不得為少陰所以然者  
陰不得有汗也今頭汗出故知

非少陰也，可與服此湯，設不了得尿而解。

傷寒五六日嘔而發熱者，柴胡湯證具，而以他藥下之，柴胡證仍在者，復與小柴胡湯。

陽明病發潮熱，大便溏，小便自可，胸脇不利者，與此湯。

陽明痛，脇下鞅滿，不大便而嘔，舌上白胎者，與服之，上焦得通，津液得下，腎氣因和，澱音七然汗出而解。

外不解，病過十日，脈續浮者，與此

湯

太陽病不解轉入少陽，嘔下滿，乾嘔不能食，往來寒熱，尚未吐下，脈沉緊者，此湯主之。若已吐下，後發汗，溫鍼，譫語，小柴胡證罷，此爲壞證，知犯何逆，以法治之。

嘔而發熱，此湯主之。

婦人中風七八日，續得寒熱，發作有時，經水適來，適斷者，此爲熱入血室，其血必結，致使如癰狀，此湯主之。

傷寒瘥已後更發熱，此湯主之。

傷寒壞病前熱未除其脈陰陽俱  
盛重感寒邪變為溫瘧也寒熱  
往來口苦胸脇滿者宜本方加  
芍藥少許桂枝主之若熱多者  
倍加柴胡寒多者倍加桂枝  
如熱多者本方合白虎湯 痰

多者本方合二陳湯

傷寒後飲酒復劇蓋痛本熱未解  
而飲酒則轉加熱盛而痛增若  
脈弦大者須此湯加葛根黃連

烏梅

如胸中煩而不嘔去半夏人參加

瓜萋仁煩者熱也嘔者氣逆也今煩而不嘔則熱聚而

氣不逆邪氣欲漸成實也參茸恐補去之無助熱夏味辛散去

之以無逆氣也瓜萋苦寒用之以通鬱熱于胸中

若渴者去半夏加人參之甘潤瓜

萋根之苦潤相合

若腹中痛去黃芩加芍藥寒邪入裏裏氣

不足寒邪壅則腹中痛芩苦寒性堅而寒中去之則中氣易和

芍藥味酸而利中加之則裏氣得通而腹痛自愈矣

如脇下痞鞭去大棗其能滿中加牡蠣

酸鹹

若心下悸小便不利者去黃芩之

苦寒使蓄水浸行加茯苓之甘

淡滲利則津液通矣

若不渴外有微熱去人參因微熱有表邪

恐其主內之物也加桂枝取汗發散解

表邪也

若欬者去人參大棗生薑加五味

子乾薑肺氣逆則欬參棗薑甘溫中則肺氣愈逆故去

之用五味之酸收欬肺氣乾薑之辛熱以散內之寒氣則欬自止若加葛根芍藥治少陽陽明合痛

一治瘧疫久瘧面黃肌瘦不論淺深

一治伏暑發熱汗渴水入心胞不

能言語

一治瘟疫脉尺寸俱絃數胸脇痛  
而耳聾少陽也此湯主之

一治瘟疫大頭病發于耳之上下  
前後并頭角紅腫者是也若肌  
熱日晡潮熱或寒熱往來口苦  
咽乾目痛胸脇滿悶少陽也本

方加消毒藥

陶尚文治疫病在少陽者本方加  
防風羌活微發之而愈若見  
太陽證大便泄者本方去黃芩  
對五苓散尤當看脉寒熱若無  
寒去桂留苓小便不利是膀胱



脫本病本方合五苓散去桂  
若入太陰無熱證見者用理中  
湯此證必腹痛而瀉明日瀉止  
痛止仍用本方和之 春瘟發  
熱身痛咳嗽口渴脈浮洪而熱  
甚者本方加桂枝治嗽加五味

子渴去半夏加天花粉人參瘦  
病胸膈滿悶本方加枳實橘紅  
黃連如渴加石膏知母

一治吐血蓋由醉飽房勞或醉後  
大怒觸動榮血以致妄行吐血  
者加天冬麥冬送下龍腦雞蘇

吐血

風寒咳

一治風寒咳嗽發熱頭疼

丸雞蘇北方銀柴胡二兩木  
通二兩水半升同浸一宿取  
汁生地六兩為末黃耆一兩麥  
冬四兩阿膠蒲黃炒人參各二  
兩甘草兩半炙薄荷一兩右為  
末蜜二兩先煉一二沸然後下  
地黃末攪勻又下木通柴胡汁  
為丸豌豆大每服二十九嚼破  
熱湯下

酸苦

一治肝膽有實熱令人口酸而苦

加甘草龍膽草青皮之類

髮疽

一治髮疽加連翹金銀花桔梗

一治因怒鬢後際腫痛發熱加連

翹金銀花天花粉

瘰癧乳  
瘡下疳

一治瘰癧乳癰便毒下疳等瘡

小兒似瘡

溫病

熱入血室

一治小兒寒熱似瘡

附本方加減湯名治病

小柴胡加五味子湯即本方加五味子治溫

病發熱而渴不惡寒嗽者

小柴胡加牡丹皮湯即本方加牡丹皮治婦

人傷寒身熱脈弦而長屬陽明少陽往來寒熱夜踈書寧如見

鬼狀經水適來適斷熱入血室不滿實者

小柴胡加地黃湯即本方加生地黃治婦人傷

寒發熱經水適來適斷夜踈書寧謔語見鬼又治產後惡露

方來忽斷欲死又治婦人出

疹經水適來若過四五日猶不止者此熱邪乘血室之虛迫血妄行宜服此清之又治痘癰

小柴胡加茯苓湯即本方加茯苓治小便難潮

熱腹滿

小柴胡加芒硝湯

即本方加芒硝治傷寒十三

日不解胸脇滿而嘔日哺潮熱已而微利此本柴胡證下之不得利今反利知以丸藥下之非其治也潮熱實也先以小柴胡解外後以本方治之

柴胡半夏湯

即本方加白朮麥門冬治痰執頭疼手

足寒熱

柴胡雙解散

陶節菴方即本方加陳皮芍藥槌法

加生艾汁三匙足少陽膽經受病耳聾脇痛寒熱嘔而口苦脈來弦數屬半表半裏宜和解此膽經無出無入有三禁不可汗下利也止有此小柴胡湯隨病加減再無別方立加減法在後如本經證小便不利者加茯苓

本經證嘔者入薑汁竹茹

脇痛加青皮

痰多加瓜蒌仁貝母

寒熱似瘧加桂

渴加大花粉知母

齒燥無津液加石膏

嗽加五味子金沸草

心下飽悶未經下者非結胸乃

表邪傳至胸中未入乎府證

雖滿悶尚在表本方加桔梗

未效本方對小陷湯加桔梗

以上俱本經證

虛煩類傷寒加竹葉炒粳米  
本經與陽明合病加葛根白芍

藥

婦人熱入血室加當歸紅花

男子熱入血室加生地血室

者血海也衝脈為血之海男

女均有此衝脈得熱血必妄

行在男子則下血謔語因邪

熱傳入正陽明府在婦人則

寒熱似瘧

小柴胡加枳桔湯

即本方加枳殼  
桔梗 治瘧疹

後噴嗽脇痛由餘毒在中陰陽  
之氣不得升降也脇居一身之  
左右陰陽二氣之道路也脇痛  
是氣不能升降之故但解毒毒  
氣去真氣行  
所苦自平

小柴胡加乾薑牡蠣湯即本方加乾薑牡蠣

治痞而胸膈滿脹

小柴胡加芒硝大黃湯即本方加芒硝大黃

治婦人傷寒頭痛脈浮醫下  
下之邪氣乘虛而入經水閉不  
行心下結硬口燥舌乾寒熱往  
來狂言見鬼狀脈沉而數者

柴胡桂枝湯即本方加桂枝芍藥

治發熱自汗或寒

加味小柴胡湯即本方加黃連白芍玄參升麻附

加減治病發斑肌熱潮熱或往來寒熱口

苦咽乾目眩耳聾脇痛胸滿  
心煩或乾嘔或煩渴或嗽俱  
依此湯

口燥渴去半夏加天花粉  
咽痛加桔梗倍甘草

嘔加生薑  
斑毒出盛加犀角牛旁子毒盛  
加青黛

胸中煩悶不利加瓜蒌仁  
痰火上喘加桔梗知母貝母瓜  
蒌仁桑白皮喘而舌燥煩渴  
脈數大者更加石膏

脇痛胸滿不利加枳殼桔梗  
心下痞硬加枳實黃連倍用

小柴胡加生薑橘皮竹茹湯即本方加

生薑橘皮竹茹  
治陽證映逆潮熱

小柴胡去棗加牡蠣湯即本方去棗加牡蠣

治水  
結胸中

小柴胡去黃芩加茯苓湯即本方去黃芩加茯苓

加茯苓 治嘔而發熱胸脇滿小便不利

小柴胡去黃芩加芍藥湯

即本方去黃芩

加芍藥 治下後陰弱生熱胸微惡寒 又治寒熱脈弦腹痛

小柴胡去半夏加人參括蕒湯

即本方

方去半夏加人參瓜萋 治發熱而渴 又治瘧疾微勞不任 經年不差 羌後復發名曰勞瘧

小柴胡去參棗加五味子乾薑湯

即本方去人參大棗加五味子乾薑 治少陽寒熱胸滿泄瀉

大柴胡湯

即本方加大黃赤芍枳實去人參

治傷寒十餘日熱結在裏後往來寒熱

治太陽病過經十餘日二三下之嘔不止心中微煩

治二陽併病太陽初得時汗下之不徹轉屬陽明續自微汗



不惡寒

治傷寒發熱汗出不解心中痞

嘔嘔吐下利

治傷寒太陽病未解脈陰陽俱

停必先振慄汗出而解但尺

脈實者以此湯下之乃解

治傷寒六七日目中不了了睛

不利無表裏證大便難身微

熱為實也急宜此湯下之

治陽明病發熱汗多

治陽明病心腹脹滿喘而短氣

潮熱者邪在裏為實者

治傷寒無表裏證發熱七八日

雖脈浮數者以此湯下之

治腹滿不臧者

治腹滿痛為實者

治汗出譫語有燥屎此為風也

須下之過經乃可下下之若

早者語言必亂以表虛裏實

故也下之乃愈

治煩熱汗出則解又如癰狀日

哺所發熱者屬陽明也脈實

者與之

治少陰下利清水色純青心下

必痛口乾燥者

治傷寒後脈沉沉者內實也

治內傷飲食鬱在裏身熱煩躁

數者

治春溫發熱身痛咳嗽口渴渴脈

實而執甚渴者加知母石膏

治溫疫發狂不知人加當歸

治癘疫胸膈滿悶大便不通

治癘疫內熱大便難病後五六

日不惡寒

反惡熱

柴胡飲子

即本方去半夏大棗加

大黃當歸芍藥

治

切積熱肌骨蒸往來寒熱及傷

寒發熱汗不解骨蒸肺痿喘嗽

婦人經水不通等疾又治痘

瘡初出毒疑血聚成黑色頭焦

黑者乃榮血不流行內外毒氣

壅遏此證甚危其人必大小便

秘喘急煩躁又治痘瘡大便

硬二三日不更衣痘瘡始終要

大便疎而潤謂之裏氣和若有

阻難即毒邪留伏于裏腸胃壅

過不得運化故也 又治痘疹  
出不快熱甚大渴腹脹滿大便  
不通煩躁發熱微微出反密者必  
治痘疹發熱微微出反密者必  
口燥渴唇焦裂小便赤少大便  
秘身雖不大熱却蒸蒸然此毒  
深熱亦深故表不大熱而裏熱  
也宜以此下之

### 附本方加減湯名治病

柴苓湯

即本方合五苓散

治發熱泄瀉裏虛 又治傷寒

衣證未解外邪傳入半表半裏  
又治內傷發熱及雜病發熱  
又治瘟疫  
發狂而泄瀉

又命內... 未... 人半... 半... 裏

### 第十八涼膈散

本方加減湯... 方合和湯名... 方

共計四方  
附于后

### 涼膈散方

一名連翹飲子  
劉河間  
李東垣涼膈散方中

去大黃芒  
硝加桔梗

連翹

山梔

薄荷

黃芩

涼膈散第十八  
四六

大黃各半兩

芒硝二錢半

甘草一兩半

右為麤末每服五錢水煎去滓入蜜少許溫服或加竹葉三十片

李東垣減去大黃芒硝加桔梗同為舟楫之劑浮而上之治胸膈中與六經熱以其手足少陽之氣俱下胸膈中三焦之氣因

相火游行于身之表膈與六經乃至高之分此藥浮載亦至高之劑故能于無形之中隨高而走去胸膈中及六經熱也  
果山甫曰茶梳味苦而無氣故瀉于中連翹薄荷味薄而氣薄故清熱于上  
大黃芒硝鹹寒而味厚故諸實皆瀉用甘草者取其性緩而戀膈

治諸風痙瘓手足搖擗筋攣疼痛

治傷寒表不解入于裏下症未

全者

治下後燥熱怫鬱結于內心煩懊  
懣不得眠

治胃中濕熱上蒸自汗

治心火上盛膈熱有餘目赤頭眩

口瘡唇裂

治三焦六經積熱

治藏府積熱煩渴咽燥喉痺

治鼻衄吐血加歸芍各五錢生地兩

治咳嗽痰涎

治淋閉大小便不通

治譫語狂妄腸胃燥澁

治風熱內壅

治痘疹裏熱

東垣去大黃  
芒硝加桔梗

治瘡疹發斑

治痘瘡熱極黑陷

治痘瘡熱甚黑陷腹滿喘急小便

赤將死者加枳實厚朴約以五

之得利者立效

治痘疹表裏俱熱純陽無陰證

治斑疹欲發之加防風荆芥

治斑疹加葛根一两荆芥赤芍川

芩防風桔梗各半兩

治風熱上攻耳聾

治咽喉痛涎嗽加桔梗一兩荆芥

半兩

治嗽而嘔加半夏一錢半生薑三片

治淋瀝加滑石四兩茯苓一兩

治風眩加川芎防風各五錢石

三兩

治酒毒加葛根一兩

治小兒驚風熱極

退表裏熱加益元散效速

附本方加減湯名治病

本草綱目卷之八



活命金丹

即本方加青黛、藍、石

轉舌膏

即本方加遠志、菖蒲、蜜、虎骨、朱砂為衣。治中風、癱瘓。

舌塞不語

清心湯

即本方加黃連五錢。瀉三焦六經之火。

附本方合和湯名治病

三和湯

本方合四物湯。治月經不通。

