



特別
†9
611
6



門中武
第 611
卷 6

青囊第六卷目錄



第十九五苓散

五苓散加車前子生薑燈心名別味五

苓散

五苓加茵陳名茵陳五苓散

五苓加山梔名山梔五苓散

行... 目錄

三十一

五苓加海金沙芍藥甘草滑石石

葦名金砂

五苓去桂名四苓散

五苓去桂加辰砂名辰砂五苓散

五苓去桂澤瀉名猪苓湯

五苓去猪苓加生薑硝半夏陳皮

名挂苓白朮丸

五苓合平胃散名胃苓湯

五苓合四君子湯名春澤湯

五苓合益元散去猪苓加石膏寒

水石名甘露飲

五苓合益元散加寒水石名甘露飲

五苓合益元散加寒水石膏名性

散木

第二十理中湯

理中湯蜜丸名理中丸

理中加附子名附子理中湯

理中加枳實茯苓名枳實理中湯

理中加枳實茯苓蜜丸名枳實理中丸

理中加丁香名理中加丁香湯

理中加青皮名治中湯

理中加茯苓名補中湯蜜丸名調中丸

理中加瓜蒌牡蠣枳實黃芩蜜丸

名增損理中丸

理中去白朮加茯苓附子

名四順湯

理中加甘草一倍蜜丸

名四順丸

理中加茯苓黃連

名連理湯

理中加黃芩白芍

名黃著湯

理中去乾薑

名溫中丸

理中去人參加厚朴

名和中湯

第二十一防風通聖散

防風通聖加菊花地骨皮生地

名通

聖菊花丸

防風通聖加天麻菊花熟地

名通聖天

丸麻

防風通聖合益元散

名雙解散

小毒藥
第二十二黃連解毒湯

水丸名大金花丸

黃連解毒加石膏麻黃白芷

名三黃石

膏湯

黃連解毒加茵陳澤瀉茯苓

名加

散

黃連解毒去山梔

名二補丸

黃連解毒去山梔

又名三黃瀉心湯

黃連解毒去山梔加艾

名三黃熟艾湯

黃連解毒去山梔加大黃

名金花丸

黃連解毒去山梔黃柏加大黃

名三

黃丸

黃連解毒去山梔黃柏加甘草

名二

黃湯

黃連解毒去山梔黃柏加防風名

金丸

黃連解毒去山梔黃芩名連柏二物湯

黃連解毒去芩連名梔子柏皮湯

黃連解毒合四物湯名解毒四物湯

黃連解毒合神芩導水丸名解毒丸

小青囊湯名卷之六

秣陵朮如王良璨玉卿氏編次

東官 鄧逢年于田甫助梓

第十九五苓散

本方加減湯名八方合和湯名五方

共計十三方附于后

五苓散方

仲景方 苓者合也通行 津液越伐腎邪專為

者。苓之功也。故曰五苓散。太陽膀胱經之下藥。太陽高則汗而發之。下則引而竭之。使邪從膀胱出也。

茯苓 君 經曰淡味滲泄為陽水 飲內蓄須滲泄之必以其淡

為主故用此 其平者為君

猪苓 臣 去皮 各半兩

白朮 佐 土炒半兩 脾惡濕水 飲內蓄則脾氣不治益脾勝

濕必以甘溫為助故用此為佐

澤瀉 使 兩 經曰鹹味滲泄 為陰泄飲導溺必以鹹為助

故用此 為使

桂 使 去麤皮錢半 水氣不行 則腎氣燥經曰腎惡燥急食辛

以潤之散燥滋 腎必以此為使

右為末每服二錢熱湯或米飲調

下日三服加滑石二兩尤佳

一治傷寒太陽病後汗後大汗出
胃中乾煩躁不得眠欲飲水

治傷寒中暑大汗後胃中乾煩躁
不得眠

治傷寒表裏俱熱飲水反吐名曰

水逆

治傷寒或攻表不解當汗而反下
之利不止

治霍亂熱多欲飲水者陽邪也

甫曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且瀉名曰霍亂霍亂責之裏邪裏邪責之水穀是方也桂能建中木能

安穀茯苓猪苓澤瀉能安水水穀得安則霍亂自止矣

治傷寒脉浮表不解自利

治胃弱小便少臧二苓澤瀉加白

朮桂

治傷寒小便不利而渴

所秘故令小便不利不利則不能運化津液故令渴水無當於

五味故用淡以治水扶苓澤瀉白朮猪苓雖有或潤或燥之殊然其為淡則一也故均足以利水然其為桂性辛熱則能化氣經曰勝胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣此用桂之意也桂有化氣之功故並稱曰五苓濁陰既出下竅則清陽自出上竅又熱隨弱而出則渴不治可以自除雖熱小便不利亦有因河下之熱內向津液而致者不可強以五苓散利之強利之則重

亡津液益虧其陰故曰大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈師又曰太陽隨經之邪直達膀胱小便不利其人如狂者此太陽之邪不傳他經自入其府也五苓散主之亦是使陽邪由溺而泄耳

治傷寒渴欲飲水水入即吐吐已復渴名曰水逆由心經受熱而

小腸不利也宜服之

○治發黃

戴元禮曰發黃有陰陽二證陽證發黃宿熱蓄在脾胃瘧熱與蓄熱相搏蒸鬱而黃凡病人身體發熱頭面汗出頸以下都無汗渴飲水漿小便不利通身頭目悉黃身乾無汗弱又不利則熱不外越必蘊蓄而成黃證宜五苓散用茵陳煎湯或梔湯調服

治陰黃

戴天禮曰陰黃乃太陽經中濕體痛發熱身如薰黃

終不如陽黃之胡如極子色也

當問其小便之利與不利小便

治傷暑

戴天禮曰嘔而渴者受冷香薷湯或本方瀉而渴者

本方合平胃散瀉而發熱者

本方熱而汗多畏風甚者服本方暑氣攻裏腹內刺痛小

便不通本方加水香

酒引暑入腸內酒熱與暑氣相

并發熱大渴小便不利其色如

血本方去桂加黃連有因傷

暑用水沃面或入水洗浴暑濕

相搏自汗發熱身重小便不利

服本方傷暑而大汗不止甚

則真元耗散宜急收其汗本方

倍桂或加黃

茵如木之數

治傷濕

戴元禮曰若因浴出未解

裙衫身上未乾忽爾熟睡

三五... 五苓散第十九... 六

攻及腎經外腎腫痛
腰背攣曲服本方

治傷酒惡心嘔逆吐出宿酒昏目

眩暈頭痛如破

治腫

戴元禮曰腫病不一遍身腫
四肢面腫脚腫方謂之水氣
然有陽水陰水腫總各鍾也寒
熱氣所鍾聚也應陰水陽水及
蠱脹服藥外並宜赤小豆粥佐
之如編身腫煩渴小便赤澀大

便多閉此屬陽水亦有雖煩渴
而大便已利者此不可更利本
方加木通大腹皮半錢以通小
便感濕而腫者其身雖腫而
自腰下至脚重腿脹滿尤甚于
身氣或急或不急大便或澀或
不澀但宜通利小便多服本方
加木瓜腹皮蘿蔔子有患生
瘰用乾瘰藥太早致遍身腫不
可妄施他藥若大便如常或以
自利當導其氣自小便出本方
合五皮飲若腫只在下本方合

除濕湯加木瓜 病後浮腫此
係脾虛本方一分平胃散二分

治蠱脹

治脚氣

戴元禮曰若久履濕而得
兩脚或腫或瘡本方加水
瓜蘿蔔子各五分大黃一錢
脚氣小便不通本方合除濕湯
加木瓜 若大小便俱不通本
方合復元通氣散 附除濕湯
方即半夏厚朴蒼木各二兩藿
香陳皮去白白茯苓白朮各一

兩甘草炙七錢薑棗煎 復元
通氣散即茴香川山甲各二兩
白牽牛玄胡甘草陳
皮各二兩木香半兩

治陰癰氣

戴元禮曰陰囊一挾偏
墜或俱腫脹或一挾縮
入小腹用手按捺方得還舊是
為癰氣若大小腑不通本方合
木香丸法用斑貓十個去頭足
翅剉碎同炒木香丸炒去斑貓
出火毒濃煎心湯調五苓散
下木香丸六七十九或燈心煎

水酒各半煎調五苓散
木香丸方補骨脂炒香華溢茄
枳殼酸粟米飯包外用濕紙包煨各四十兩
黑碎牛炒香取頭末一百二十兩
木香二十兩滴水丸菘豆大

小腸氣

戴元禮曰氣因寒聚為疝今謂之橫弦整弦統臍走注小腹痛不問何證皆可用本方加茴香五分或一錢若逆上攻心下不覺痛而見心痛者宜用

生韭菜自然汁和本方為丸茴香湯下

伏暑衄者茅花湯調下

伏暑吐血茅花湯調下

小便血

戴元禮曰痛者為血淋不痛者為尿血尿血本方合四物湯若服藥不効其人素病于色者乃虛證本方合膠艾湯吞鹿茸丸或附子八味丸或辰砂妙香散君小便自清後有

數點血者本方加赤芍一錢
亦有如砂石而色紅却無石淋
之痛亦屬虛證本方合膠艾湯
吞鹿茸丸或八味丸或辰砂妙
散若血氣凝滯陰癩其間竅
道閉塞致使莖腫或因忍溺而
得者並用本方灯心湯調下
外用荆芥木通甘草湯洗
附膠艾湯方即四物湯加阿膠
艾茸草
鹿茸丸牛膝鹿茸五味各兩
石斛棘刺杜仲陽起石巴戟山

藥光絲子附子川練肉磁石桂
心澤瀉各一兩沉香半兩酒糊
為丸

妙香散麝香一錢人參木香各
二錢半辰砂三錢桔梗甘草各
五錢遠志茯苓茯神黃耆山藥
各一兩為細末
八味丸見第七卷廿七方附方

小便急

戴元禮曰若小便常急編
數雖多而所出常少放了
復急不澀痛却非淋證亦有小
便畢少頃將謂已盡忽再出些

小書卷六

卷六

者多因自忍尿或忍尿行房事而然宜本方減澤瀉之半加阿膠

膠吞八物丸

八物丸見七卷二十七方附方

淋閉

戴元禮曰古名曰癃癃者罷也

滴瀝澀痛者為淋小便急滿不通者為閉俱用本方以燈心湯

下小便不通臍下脹燈心湯點滴莖中痛不可忍者此五淋

痛本方加阿膠七分或加車前

子末或合益元散熱極成淋本

方減桂加木通滑石燈心瞿麥

為末研麥冬連根葉車前草白

龍草蜜水調下淋瀝有血本

方合五淋散小便艱澀如淋

不痛而癢屬虛本方合妙香散

五淋散方赤茯苓六兩當歸

生甘草各五兩赤芍山梔各二

十兩為末妙香散方見本方

小便血條下

暑瀉由感冒暑氣或啖飲日中所

五苓散第十九

十一

晒之物坐日中熱處證狀與熱

瀉略同本方加車前子兼進來

復丹 來復丹方硝石一兩同硫黃一兩為末磁器內微火

用柳木筴攪火不可太過研細名二氣末加太陰玄精石研飛

兩五靈脂青陳皮去白各二兩疏黃明者一兩醋糊丸磁豆

大每服米飲下二十九

○交腸 戴禮曰交腸之病大小便清濁混淆本方合調氣散各一

錢加阿膠末五分白湯調下調氣散方白蔻丁香檀香木香

各二兩藿香甘草炙各八兩砂仁四兩為末

每服二錢

痢 戴禮曰赤痢血色鮮血或如

蛇蟲形而間有血鮮者此屬熱痢本方加木香五分粟米少許

下香連丸 若因感暑氣而成

刺者其人必自汗發熱而垢嘔
逆渴欲引飲腹內攻刺小便不
通刺血頰併本方合香薷飲加
黃連一錢白湯調下或蜜水
香薷飲方香
薷厚朴扁豆

酒渴乾葛湯調服

疸戴元禮曰疸大略有五黃脾二
色也脾藏受傷故病見於外通
身面目悉黃者本方加茵陳或
本方合平胃散酒疸因飲酒

過傷而黃俗名酒黃本方用乾
葛湯或梔子仁湯調下二三錢

治中濕昏踈

一切留飲水停心下半夏薑湯下
或加葶藶

啖嗽果山甫曰水寒射肺而成啖
嗽者此方主之上焦有火渴

飲涼水水為火格不得潤下停
留於膈水寒射肺故令人啖嗽
淡足以滲水故用茯苓猪苓澤
瀉白水辛溫足以散寒故用桂

心非水寒為患
則苓非所宜

咳嗽加五味

頭痛加川芎

心氣不定加麥門冬

嘔逆加人參

痰多加半夏

喘加馬兜鈴喘嗽煩心不眠加阿膠夏月新汲水調下

大便閉加黃芩

腹中氣塊加三稜莪朮

治瘦人臍下悸動吐涎沫而欲眩

者水也

熱加青皮

盜汗加麻黃根

目赤加赤芍石膏

附本方加減湯名治病

加味五苓散

即本方加車前子生薑燈心

治伏暑及胃濕泄注下或煩或渴或小便澀

茵陳五苓散

即本方加茵陳發黃小便不利

承氣膠

漢曰痾者黃之名也五者黃汗黃

痾病者黃之名也五者黃汗黃痾酒痾穀痾女勞痾也

氣微寒而味苦平為陰中之陽則兼濕熱而治之也故為黃家

君主之藥茯苓猪苓澤瀉白木味平而淡故可以導利小便

宜桂取其辛熱能引諸藥達熱邪蓄結之處利曰經

其者從之此之謂也

山梔五苓散

即本方加山梔小兒臍突燈心蜜水

青囊裏

五苓散第十九

卷二

十五

蘇

水瀉

金砂五苓散

即本方加海金沙
藥甘草滑石石膏

調下

治五淋

四苓散

即本方去桂
治濕生于

內水瀉小便不利
經曰濕勝則濡瀉故濕生于內者令人水瀉濕併于大腸故小便不利白木燥而淡燥則能健脾淡則能利濕茯苓甘而淡甘

則能補中而淡亦滲濕也
苓枯而淡澤瀉鹹而淡枯者有漆利而無補益鹹者直能潤下而兼滲利丹溪曰治濕不利小便非其治也

辰砂五苓散

即本方去桂加辰砂
錢半治中暑煩渴

身熱頭眩霍亂吐瀉小便赤少
精神恍惚又治傷寒表裏未解頭疼發熱心腹鬱悶唇口乾
焦神思昏沉狂言譫語又治

中暑
亂傷寒
在暑瀉
汗

五苓散第十九

五苓散第十九

十六

睡覺 乾 瘧渴 暑瀉 小便血

吐後飲 水 煩渴

暑氣攻裏大渴不止 又治濕熱自汗小便不利 又治熱壅上焦咽喉疼痛吞嚥乾物不若常時之潤 睡覺口乾全無津液 心煩燥 又治瘧疾渴甚 又治小兒伏暑吐瀉作渴 又治小便下血

豬苓湯

即本方去桂澤瀉 治嘔吐而病在膈上後思飲水

桂苓白朮丸

即本方去猪苓加生薑硝半夏陳皮 治

煩渴

附本方合和湯名治病

胃苓湯

即本方合平胃散 治水瀉 又治暑瀉由感暑

氣或啖飲日中所晒之物坐日中熱處而瀉 又治痢赤白相雜者加倉米一撮 平胃散見第七卷二十四方

春澤湯

即本方合四君子湯 治無病口渴與病後而渴

五苓散第十九 卷之七

水瀉 痢 瀉

暑

暑熱濕

暑吐瀉

又治汗下併霍亂吐瀉津液去多五內枯燥而煩

甘露飲

即本方合益元散去猪苓加石膏寒水石治暑

桂苓甘露飲

即本方合益元散加寒水石治伏暑熱

二氣及胃濕泄注下或煩或渴或小便閉澀

桂苓白朮散

即本方合益元散加石膏寒水石治胃

暑濕熱吐瀉轉筋腹痛益元散方滑石六兩甘草一兩

第二十理中湯

本方加葛湯名十四方附于后

理中湯方

蜜丸名理中丸

人參

乾薑炮

甘草

炙各一兩

白朮

土炒二兩

每服四錢水煎服服後飲粥少許

溫覆衣被

小奇囊

理中湯第二十

卷六

霍亂吐利寒甚者倍乾薑 渴欲
飲水者倍白木 臍上築者腎
氣動也去白木加桂枝一兩或
二兩 吐多者去白木加生薑
二兩 下多者倍白木 如霍
亂吐利而悸者加茯苓二兩

如霍亂蕪之腹滿者不宜用白
木宜加大附子一枚水浸文武
火炮令裂表裏皆黃折去皮臍
用 如四肢拘急或轉筋亦去
白木加附子或加煨石膏一兩

腹中痛

凡腹中痛可按可揉者內
虛也不可按揉者內實也

傷酒泄

吐血

吐利

渴

自利渴

治中脘痛

王海藏曰中脘者屬土脈沉遲內寒者與之

飲食不節寒中陰經胸膈不快腹

滿閉塞唇青手足冷脈沉細少

情緒或腹痛急加青皮

飲酒過度及啖炙博熱物發為鼻

衄加川芎一兩或加乾葛去薑

傷酒晨起必泄加乾葛吞黃連丸

黃連丸用黃連十二兩酒五升煮乾為末糊丸空心下二十九

傷胃吐血加川芎乾葛或扁豆

治發熱吐利心下痞硬不渴

治傷寒譫語熱躁甚大渴喜飲

治少陰病但欲寐又欲吐不吐心

自利

煩五六日自利而渴

治太陰病腹滿而吐食不下自利

益甚時腹自痛

治太陰病腹滿吐食不下或腹痛

嘔吐脈沉者加半夏陳皮厚朴

藿香生薑寒甚加附子

吐

嘔

胃虛嘔吐惡食不思食兼寒者

寒或食久還吐或朝食暮吐暮

食朝吐脈遲而微瀯皆虛寒也

宜服此溫之

無病之人卒然嘔吐定是邪客胃

府明知犯寒宜本方溫之

患心

消惡心乾嘔欲吐不吐心中映漾

如畏船

蛇厥

治蛇厥為胃寒所生經曰蛇者長

蟲胃寒即吐蛇加川椒五粒攢

榔五分

嘔逆

治胃中呃逆

自利

治沉寒陰厥四肢逆冷唇青自利

脈微

陰黃

傷冷中寒脈弱氣虛變為陰黃加

茵陳

瘧

治胃瘧善饑而不能食食而支滿

腹大

結胸

治誤下初未成結胸

活人云若誤下初未成

結胸者急頻與理中湯自然解了更不作結胸蓋理中治中焦故也此古人亦說不到後人消息得之

奔豚去木加桂或加吳茱萸

治四肢強直失音不語

治慢驚脾胃虛寒泄瀉

奔豚

失音

驚馬

小兒脾胃不和

治小兒脾胃不和心腹疝痛痰逆

惡心嘔吐心下虛煩痞滿膈塞

不通飲食減少短氣羸困溫中

逐水止汗去濕泄瀉注下水穀

不分腹中雷鳴霍亂吐瀉手足

厥冷

小兒腰
痛
疳瀉

治小兒受寒腰痛

治痘大便瀉則裏虛宜止其瀉加

訶子吞豆蔻丸

豆蔻丸方即肉蔻五錢木香砂

仁龍骨訶子肉各五錢赤石脂
枯礬各七錢半麵糊丸黍米大
一歲服三五
十九米飲下

治痘後泄瀉

泄瀉有二證如能食而渴脈盛者此熱入

瀉後泄

大腸也渴者內熱也食能多者
邪熱殺穀也脈盛而數熱證也
如食少不渴脈微小此裏氣虛
不能禁固水穀也宜本方或為
丸加熟
附子

治痘腹痛便清者受冷也加桂原

無腹痛或飲冷而痛同治

治痘有外感寒而內傷冷有陰陽

不和被冷激相搏於裏不能發
外令人脹喘痘色白而無血腹
中虛鳴

治痘內虛而不能使陽氣以副榮
衛者出而復沒斑點白色或黑
色其人必不能乳食大便自利

或嘔或厥此胃虛而不能出謂
之伏陷也加黃耆官桂 或因
誤下後毒氣入裏而黑陷者宜
溫養而表出之先以本方溫其
裏後以桂枝葛根湯疎解于表

桂枝葛根湯即桂枝湯加葛根
方見第四卷桂枝湯附方

心傷寒

附本方加減湯名治病

理中丸

即本方以蜜為丸

治傷

寒兩感拘急二焦氣虛白汗及手足汗出或手背偏多或肢體振搖腰腿沉重向赤目紅但欲睡眠頭面壯熱兩脇熱甚手足自溫兩手心熱自利不渴大便或難或如常度或口乾咽燥或渴欲飲湯不欲飲水或少欲飲水嘔噦間作心下滿悶腹中疼痛或時喜笑或時悲哭或

時太息或時言語錯亂疑作謔語狂言者非也神不守舍耳始得病於寤寐之間或恐悸頭項不甘心痛行步只如瞽此陰盛陽虛之故也兩手脈浮沉不一或左或右往來不定有沉瀼弱微弦九種陰脈形狀按之全無力浮之損小沉之亦損小皆陰脈也宜先緩而後急先緩宜先用黃耆湯黃耆湯即本方加黃耆白芍也如大便秘結用調中丸調中丸即本方加茯苓也後急

虛寒嘔
小兒吐
長虫
愈後吐

腹痛
中脘痛
中焦痛
喘促
傷寒舌
其

舌黑
失音
吐利寒
戰
陽氣脫
自利

辨別

小兒虛寒

黑水本在 又治虛寒嘔嗽 又
治小兒厥陰臟寒吐長蟲或胃
中虛 又治痘後聞食即吐
此是胃久虛蟲無所食故聞食
臭即吐食已易飢加
烏梅肉黃連川椒

附子理中湯

即本方加附子 治
腹痛不可按揉內實
者 又治中脘痛脈沉遲內寒
者 又治口食冷物客寒犯胃
中焦痛甚脈沉遲者 又治胃
虛寒公痰涎壅塞少有動作

嗽頻促脈來沉細者 又治腹
痛額頭顴黑手足散引脈沉下
無氣以息而暴死者 又治傷
寒舌黑手足厥逆吃逆者 又
治五藏中寒四肢強直失音不
語 又治痼冷太陰腹痛吐利
寒戰 又治瘦手足厥逆此陽
氣欲脫必自利不止或吐脈沉
細微弱或
浮大而虛

枳實理中湯

即本方加枳實茯苓
治寒實結胸雖痛

身重

理中湯第二十

卷八 廿七

經胸

而無煩躁等證此因下後虛逆寒氣獨結也

枳實理中丸

即本方加枳實茯苓蜜丸 治傷寒結胸

欲絕心膈高起手不得近用大陷胸湯不差者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻氣房相搏結于胸中當用此丸理其氣次療諸疾 又治寒實結胸雖痛而無煩躁等證此因下後虛逆寒氣獨治

吐

理中加丁香湯

即本方加丁香 治嘔吐腹痛

山甫曰嘔吐而痛即止者為火嘔吐而痛不止者為寒然寒則叔引胡為能吐師曰寒勝格陽故令吐也治寒以熱故用丁香乾薑時多損氣故用參白朮甘草

治中湯

即本方加青皮或加陳皮 治食積心腹滿痛 又

治霍亂吐瀉 又治胃中虛過傷生冷腥膾吐逆不止 又治

食積 霍亂 吐

寒嘔

瀉

小書

卷一

食冷物停滯傷脾胃之氣不煖

所食之物不能消化瀉出食如

故加乾薑

又治嘔吐加青皮半夏

補中湯

即本方加茯苓或加橘皮

蜜丸名調中丸 治脾胃

不和寒而作嘔 又治泄瀉

解復與之不

過五六丸

四順湯

即本方去白朮加茯苓熱

附子 治身熱脈沉苦煩

默默不欲見光時腹痛下利

又治霍亂吐下

心腹作痛手足

逆冷

四順丸

即本方加甘草一倍

兆云陽病深熱而厥畢竟

脈象外證雖狂語揭衣被也陰

厥脈沉遲而形靜也若不能辨

理中湯第二十

廿九

本陰 用 泄 傷 熱利

陰陽者且與此丸試之是陽厥
便見熱證是陰厥便見寒證可
漸進理中
四逆也

連理湯

傷寒陰證而渴戴元禮曰
傷寒亦有下利水穀不係熱利
純是陰證而反見渴者此是陰
在下陽在上兼因泄瀉津液既
去枯燥而渴其人雖引飲所飲
自少而常喜溫不可投涼劑宜
此湯 又治溇泄五虛者死關

吐利 泄 逆

細辨寒少氣前後泄利飲食不
入元是冷瀉因瀉而煩渴飲引
轉飲轉瀉 又治盛暑內傷食
生冷 又治傷寒協熱自利

黃耆湯

即本方加黃耆白芍
治證見理中丸條下

溫中丸

即本方去乾薑
治脾寒嘔吐咳嗽自利

和中湯

即本方去人參加厚朴
治小兒脾胃不和嘔逆惡
心冷熱不調減食泄瀉
腹痛腸鳴少力嗜臥

奇製

理中湯第子

卷六

一三十一

荆芥穗 二錢

薄荷葉 半兩 以上二味清上藥

出之

大黃

芒硝 各半兩 以上二味通利藥

滑石 三兩

梔子仁 二錢半 薑汁炒或甘

也風熱之在決瀆者由溺而泄

石膏

桔梗 各一兩 以上二味清肺胃

連翹 半兩

黃芩 一兩 以上二味驅諸經之遊火也

防風通聖散廿一

卷六

當歸

川芎

芍藥

各半兩 以上三味和肝血也 風之為患肝木主之故也

甘草

二兩

白朮

二錢半 以上二味和胃氣而健脾

右為麤末每服一兩生薑二片水

一二盞煎七分溫服日再服

一治卒中風不語

一治傷風邪傳入裏內熱鬱結秘

塞壅悶

諸風潮搐手足痠癢加大黃梔子

茯苓各二錢

煨者筋脈急也癢者筋脈緩也或縮

或伸動而不止俗
謂搖擗者是也

一治諸風熱鬱結憎寒發熱筋攣
痺肢體焦痿頭目昏眩耳鳴鼻
塞口苦舌乾咽喉不利涕唾稠
粘咳嗽上氣

破傷風如在表者則辛以散之在

裏則苦以下之兼散之汗下後
通利血氣祛逐風邪每一兩內
加荆芥穗大黃各二錢調全蝎
末羌活末各一錢

傷風咳嗽喘急每一兩加半夏桔

梗王映紫苑王映各二

防風通聖散廿一
各二
三四

錢

一治洗頭風

一治傷寒瘟疫不能辨

一治傷寒未發頭項身體疼痛并

兩感諸證

一治瘟疫陽明經病發于鼻額并

二目不開及面部或執氣喘口

乾舌燥咽喉腫痛不利脉數大

內實執者普濟消毒飲與本方

間服普濟消毒飲方 本連各

半兩八分 參三錢 橘紅甘草

玄參各二錢 連翹桔梗板藍根

馬勃鼠粘子各一錢 蟬蟬升麻

各七分 柴胡八分

一治時行瘟頭面腫盛目不能開
 鼻塞口乾舌燥內外有熱或咽
 喉腫痛不利或內實大便不利
 煩燥脉洪數者

一治熱邪積久鬱于皮膚輕則發
 為小斑重則發為丹毒平人發

斑如錦紋或赤色大便結心中
 煩躁總為執鬱

一治失下發斑 果山甫曰失下者
 腸胃燥實當下而
 失于下也失下則熱無所泄而
 結于胃胃主肌肉故肌肉間見
 紅斑也方中有大黃芒硝甘草
 乃調胃承氣湯也瀉腸胃之熱
 實加連翹梔子黃芩薄荷乃涼
 膈散也散胸膈之執邪解表有

防風麻黃薄荷荆芥川芎
有石膏滑石黃芩梔子連翹復
有當歸芍藥以和血枯梗白木
甘草以調氣故能令榮衛皆和
表裏
俱暢

腸胃燥結便溺淋閉去麻黃加滑

石連翹

一治因下津液而成燥淋閉

一治熱結大小便不通

一治腸胃怫鬱結水液不能浸潤

於周身而但為小便多出

一治濕熱內餘而時有汗洩

一治癰病由熱甚生風痰鬱于胸

一治腸胃燥鬱水液不能宣行于

外反以停濕而泄

一治燥濕往來時結時泄

一治一切風熱燥證鬱而惡物不
下腹滿撮痛而昏

一治腹滿澀痛煩渴喘悶譫妄驚
狂

一治表之陽和正氣與邪熱相合
并入於裏陽極似陰而戰煩渴

一治風熱走注疼痛麻痺

腰脇走注疼痛加硝石當歸甘草

一服各二錢調車前子末海金
沙末各一錢

大便閉結邪熱暴甚腸胃乾燥癢
汗咬牙上竄睡語筋轉驚悸每
一兩加大黃梔子各二錢調杖
苓末二錢
肌肉蠕動每一兩加大黃梔子各
二錢調菟活末一錢

打撲損傷肢節疼痛腹中惡血不
下每一兩加當歸大黃各三錢
半調乳香沒藥末各二錢
飲酒中風身熱頭疼加黃連鬚二
錢葱白十莖

一治汗斑內外挾熱

一治暴瘖不語語不出聲

一治腎水真陰虛心火邪熱暴甚

僵仆

一治腸風痔漏

一治產後血液損虛以致陰氣虛

衰

頭面腫

戴人云頭面腫者為風乘陽明也陽明為血氣俱多加薑葱豆豉同煎取微汗以草莖刺鼻中出血其腫立消

耳聾屬少陽厥陰熱多宜用此開

痰散風熱

一治目病發壅腫兩臉如桃合而

痛不可忍

一治時行暴熱風腫火眼腫痛難開或頭面俱腫

一治鼻塞不通肺經風熱壅塞鼻碍不通不聞香臭或感風寒熱來濁涕

鼻癢加白附子殭蠶

頭旋腦熱鼻淵經曰膽移熱于腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕不已也此為足太陽脉與陽明脉俱盛也每一兩加黃連薄荷各二錢半如氣逆者調木香末一錢治風刺勞汗當風汗出為酸鬱及

瘡勞汗出於玄府脂液所凝俗
云風刺去芒硝倍芍藥當歸發
散玄府之風當調其榮衛

癰疹或赤或白倍麻黃鹽豉葱白
出其汗麻黃去節亦去芒硝鹹
走血而內凝故不能發汗依前

方中加四物湯第一方黃連解毒

湯第二方合而飲之日二服內

經曰以苦發之謂熱在肌表連
內也

- 一治頭生屑遍身黑黧紫白斑駁
- 一治惡毒兼消除大小瘡

一治厲風世俗名大麻風

一治風熱瘡疥久不愈

一治天疱瘡北方名薄皮瘡嶺南名火疱瘡此瘡

多濕熱為源脈沉一便秘澀者

解表兼攻其裏

一治便癰此是內蘊熱毒外挾寒

邪或交感強忍以致精氣鬱結

疼痛大小便澀

小兒急慢驚風每一兩內加大黃

梔子各二錢調茯苓末二錢

一治小兒諸疳積熱

一治痘疹熱甚拂結而反出不快

一治痘疹黑陷將死

一治痘疹乍出乍隱此伏也

斑疹夾出去芒硝大黃

痘出譫語妄見時狂叫者此五藏

熱毒蘊積陽氣獨盛無陰氣以

和之輕者用膽導法重者用本

方使無留滯也

附本方加減湯名治病

通聖菊花丸 即本方加菊花地骨皮生地黃 治目

通聖天麻丸 即本方加天麻菊花熟地黃 治風眼

附本方合和湯名治病

雙解散 即本方合益元散一兩加葱白十莖豆豉一合生薑

傷風寒

痘不出

生兩水一碗煎八分溫冷服一
 半取吐吐後服一外稍熱出汗
 能解利四時傷寒內外所傷
 又治風寒暑濕饑飽勞役內外
 諸邪所傷以致氣血怫鬱變成
 積熱發為汗病雜病又治傷
 寒傷風或有汗無汗表證悉具
 內熱口乾若自汗去麻黃又
 治痘疹應出不出心法曰有數
 證不同或內素實皮厚肉密毒
 氣難於發越一旦恃其體厚不
 怯風寒又為外邪所襲或體素

弱者風寒易感以致腠理閉密
 氣血凝澀故應出不出也其證
 頭痛四肢拘急便溺蓋覆常惡
 風寒強者宜本方發之以上
 諸證其大黃苦硝麻
 黃三味宜視病加減

第二十二黃連解毒湯

本方加減湯名十二

方合和湯名二方共計十四方附于后

黃連解毒湯方

黃連

黃柏

黃芩

山梔

右各等分每服一兩水二鍾煎一

三行五集

黃連解毒湯廿二

卷二

四五

鍾

治傷寒雜病熱毒煩躁口渴喘

滿

一治陽厥極涼蓄熱內甚世俗為

陰毒

一治傷寒及時疫三日已汗解或

因飲酒復劇煩悶乾嘔口躁呻

吟錯言不眠

一治汗吐下後寒涼諸藥不能退

其熱勢

治陽毒上竅出血

吳山甫曰治病必求其本

陽毒上竅出血則熱為本血為標能去其熱則血不必治而自

黃連解毒湯

黃連解毒湯

卷之二

四六

歸經故用此苦寒之物主之然
惟陽毒實者用之為宜若陰虛
之火則降多二陰苦從火化
而血出益甚是方在所禁矣

一治瘟疫毒發狂

一治熱痢

一治小兒熱甚脫肛

一治積熱瘡瘍燉腫作痛煩躁飲

冷脈洪數或口舌生瘡

痘疹發熱經水忽行却非天癸之

期此毒內蘊擾亂血海迫經妄

行合四物湯第二方服

子治痘夾疹

心法曰疹由心熱宜急解其毒

治痘在夏秋之間忽為酷暑所蒸

變為大赤掀發或糜嫩不堅實

者合五苓散第十方服

痘後便膿血加生地黃

痘後口氣臭出血名走馬疔瘡加

雄黃為丸竹葉湯下

疹子發熱自汗太多合人參白虎

湯服

白虎湯石膏甘草知母人參粳米

疹子渴喜飲水純是火邪肺焦胃

乾心火內亢故也合人參白虎

湯

疹子既出熱甚不減便澀合白虎

湯

疹子初後熱甚或日久不減令人

參白虎湯

喜笑不休痰及火也加半夏竹瀝

薑汁

附本方加減湯名治病

既濟解毒丸 即本方以水為丸又名大金花丸 治中

外諸寢汗咬牙時語驚悸弱血
淋閉映嗽衄血頭痛并骨蒸肺
痿喘嗽

三黃石膏湯 即本方加石膏麻黃
淡豆豉 治瘟毒表

裏俱盛五心煩熱兩目如火鼻
乾面赤大渴舌燥 吳山甫曰
寒毒藏於肌膚至夏變為熱病
熱病未除更遇溫熱者曰瘟毒
熱病之最重者寒能制熱故用
石膏苦能下熱故用芩連塊拍

疝

麻瘻
咽乾大

佐以麻黃淡豆豉之發散者以
瘟熱至深表裏俱實降之則鬱
揚之則越鬱則瘟熱猶存兼之
以發揚則炎炎之勢皆燼矣此
內外分消其勢兵
家之分擊者也

加減瀉黃散

即本方加茵陳澤瀉
茯苓 治大人小兒

黃疸此藥退脾土
復腎水降心火

三補丸

即本方去山梔 治肺痿
又治三焦有火咽喉乾

赤
小便秘

燥小便赤澀大便秘結 吳山
甫曰少火之火無物不生壯火
之火無物不耗內經曰壯火食
氣是也故少火宜升壯火宜降
今以三物降其三焦之壯火則
氣得其生血得其養而三焦皆
受益矣故
曰三補

三黃瀉心湯

即本方去山梔 治
心膈實熱狂躁面赤

三黃熟艾湯

即本方去山梔加熟
艾 治傷寒四五日

黃連解毒散

存
無病

盜汗 咳血 衄血 口瘡

黃連

心火

八頭瘦

後大下熱痢 諸藥不效者

金花丸

即本方去山梔加大黃水 治中外諸寢汗咬牙

時語驚悸溺血淋閉咳嗽衄血頭痛并骨蒸肺痿喘嗽

三黃丸

即本方去山梔黃柏加大黃 治脾熱口疳口氣

如用黃芩春四兩夏秋六兩黃連春四兩夏五兩秋三兩冬二兩大黃春三兩夏一兩秋二兩冬五兩 又治黃疸 又治吐

血 又治消渴羸瘦不生肌肉 善穀 吳山甫曰火炎則水乾 故令消渴燥萬物者莫熯乎火 故令羸瘦不生肌肉火甚則速 於傳化故善穀芩連大黃苦寒 物也寒勝熱苦瀉火火去而陰 自生陰生而 肌肉自長矣

二黃湯

即本方去山梔黃柏加生 甘草 治天行大頭瘦病

吳山甫曰大頭者炎上作火 之也故用芩連之苦瀉之甘

黃連解毒

辛

去積血

草之甘

緩之

聚金丸

即本方去山梔黃柏加防風治小兒大便下血發

熱煩躁腹中熱痛作渴脈來弦數或驚熱日赤昏澀或有酒毒

去血

連柏二物湯

即本方去山梔黃芩治黃疸

梔子柏皮湯

即本方去山梔黃連治躁熱發黃

黃疸

附本方合和湯名治病

解毒四物湯

即本方合四物湯治經水不

解毒丸

即本方合神芩導水丸

筋脚拘攣咬牙驚悸一切執毒

神芩導水丸方大黃枯芩牽

牛滑石各等分滴水為丸小豆大每服十九丸漸加至十五丸

經水不
住
熱毒

