

武門 補卷 12 4

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三卷目錄 許仁則

天行病發汗等方四十二首
天行病方七首
天行嘔逆方七首
天行嘔噦方七首
天行喉咽痛方二首
天行衄血方四首
天行口瘡及口乾苦方四首
天行欬嗽方五首
天行發斑方三首

岡氏家藏

天行發瘡疏豆疱瘡方一十三首
天行虛煩方二首
天行狂語方三首
天行熱毒攻手足方五首
天行大小便不通脹滿澀方四首
天行熱痢及諸痢方四首
天行嚏瘡方八首
天行陰陽易方二首
天行虛羸方二首
天行後禁忌方二首

天行勞復食復方六首
天行差後勞發方五首許仁則

唐王燾先生外臺秘要方第三卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

男龍錫爲光父仝校

天行病發汗等方四十二首

病源夫天行時氣病者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大温者此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少率多相似者此則時行之氣也從立春節後其中無暴大寒又不氷雪而人有壯熱爲病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變爲

冰

温病也從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也一名時行傷寒此是節候有寒傷於人非綱目之過也若三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶小輕也五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重也七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦小微也其病與温及暑病相似但治有殊耳然得時行病一日在皮毛當摩膏火灸愈不解者二日在膚可法鍼服解肌散汗出愈不解三日復發汗若大汗則愈不解者止勿復發汗也四日在胃服蔡蘆丸微吐之愈若病固服蔡蘆丸不吐者服赤小豆瓜蒂散吐之即愈視病者尚未了了復一法針之當

解不愈者六日熱已入胃乃與利湯下之愈百無不如但當諦視節度與病耳若食不消病亦與時行病俱發熱頭痛食病當速下之時行病當待六七日下之時行病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胃五日入胃入胃乃可下也熱在胃外而下之則熱乘虛便入胃然病要當復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此爲病三死一生此輩皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出刺者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生但論人有彊弱病有難易功効相倍耳病者過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩躁不

芩 脚

安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕水和服之當以新汲冷水令彊飲一升若一升半可至二升益佳以指刺喉中吐之隨手愈不即吐者此病輩多不善勿彊與水水則即結心下也更當以餘藥吐之皆令相主當者不爾必危若此病不急以猪苓散吐解之者其死始速矣亦可先以去毒物及法針之尤佳其湯熨鐵石別有正方補養宜導令附於後

養生方導引法云清旦初起以左右手交互從頭上挽兩耳舉又引髻髮即流通令頭不白耳不聾又摩手掌令熱以摩面從上下二七止去汗氣令面有光又摩手令熱從

體上下名曰乾浴令人勝風寒時氣寒熱頭痛百病皆愈

又時氣病一日太陽受病太陽為三陽之首主於頭項故得病一日頭項腰脊痛

又時氣二日陽明受病陽明主於肌肉其脉絡鼻入目故病二日內熱鼻乾不得眠夫諸陽為表表始受病皮膚之間故可摩膏火灸發汗而愈

又時氣病三日少陽受病少陽脉循於脅上於頭耳故得病三日胷脅熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於藏故可汗之而愈

又時氣四日太陰受病太陰為三陰之首是知三日已後

諸陽受病訖即傳之於陰而太陰受病焉其脉主於咽嗌故得病四日腹滿而嗌乾其病在胃脘故可吐而愈也

又云夫得病四日毒在胃脘故宜取吐有得病二三日便心胃煩滿此爲毒氣已入或有五六日已上毒氣猶在上焦者其人有痰實故也所以復宜取吐也

又時氣病五日少陰受病少陰脉貫腎絡肺繫於舌本故得病五日口熱舌乾渴而引飲其病在腹故可下而愈

又時氣病六日厥陰受病厥陰脉循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此爲三陰三陽俱受病毒氣入於腸胃故可下而愈

又時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病竟故也今病不除者欲爲再經病再經病者謂陰陽諸經重受病也

又時氣病八九日以上不解者或是陰陽諸經重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未即相傳致使停滯累日病證不改者故皆當察其證候而治之（大素出第九卷中並必七日蓋剝復之義耳）（舉平元弱氏曰七日傳經盡再傳經義耳）

廣濟天行壯熱煩悶發汗麻黃湯方

麻黃五兩去節　葛根四兩　梔子二七枚擘　葱切一升

香豉一升綿裹

右五味㕮咀以水八升先煮麻黃葛根三兩沸去沫內諸藥煎取二升五合絞去滓分爲三服服別相去如人行五六里更進一服不利覆取汗後以粉粉身忌風及

諸熱食出第一卷中半本書

肘後療天行一二日麻黃解肌湯方

麻黃一兩去節　升麻一兩　甘草一兩炙　芍藥一兩

石膏一兩碎綿裹　杏人三十枚去尖雙人　貝齒三枚未

右七味細切以水三升煮取一升頓服覆取汗汗出則愈便食豉粥補虛也忌海藻菘菜千金大書同

又方

麻黃二兩　黃芩　桂心各一兩　生薑三兩

右四味切以水六升煮取二升分三服忌生葱張文仲大書同

又葛根解肌湯方

葛根四兩　芍藥二兩　麻黃一兩去節　大青一兩

甘草一兩炙　黃芩一兩　石膏一兩碎　大棗四枚擘

桂心一兩

右九味切以水五升煮取二升分溫三服相次服之覆取汗差忌海藻菘菜生葱炙肉等張文仲大書同

又療二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方

柴胡八兩　人參三兩　甘草三兩炙　黃芩三兩

生薑三兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升分三服微覆取汗半日便差如不除更服一劑忌海藻菘菜羊肉餅卞末宇大書范汪張文仲同此張仲景傷寒論方

又若有熱實得汗不解腹脹痛煩躁欲狂語者可服大柴胡湯方

柴胡半斤　大黃二兩　黃芩二兩　芍藥二兩　枳實四枚炙　半夏五兩洗　生薑五兩　大棗十二枚擘

右八味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服當微利忌羊肉餅此方四首最第一

急疾須臾有幸可得藥處便不可不營之保無傷死諸小療爲以防窮極者耳忌羊肉餅卞末宇大書此第二卷中同上

刪繁療天行三日外至七日不歇內熱令人更相染著大青消毒湯方

大青四兩　香豉八合綿裹熬　乾葛　梔子各四兩

生乾地黃一升切　芒消三兩

右六味切以水五升煮諸藥味取二升五合去滓下芒消分三服忌蕪荑熱麪酒蒜等物一方有石膏八兩

又療天行五日不歇未至七日皮肉毒熱四肢疼痛疆若參吐毒熱湯方

苦參八分　烏梅七枚　雞子三枚取白

右三味以苦酒三升煮二物取一升去滓澄清下雞子白攪調溫去沫分再服之當吐毒熱氣出愈

又療天行七日至二七日藏腑陰陽毒氣天行病欲歇而未歇或因食飲勞復心下脹滿煩熱生地黃湯方

生地黃切一升　黃芩三兩　桂心二兩　甘草二兩炙

竹葉切一升洗　香豉一升綿裹　薤心一升　芒消三兩

尖鼠屎三七枚　乾葛一兩　麻黃三兩去節　石膏八兩碎綿裹

右十二味切以水九升煮取三升去滓下芒消分三服忌蕪荑海藻菘菜生蔥等

又療天行二七日外至三七日不歇或寒或熱來去喘嗽四肢羸瘦飲食不能腹中虛滿熱毒不安生地黃湯方

生地黃汁一升　生麥門冬汁一升　赤蜜一升　人參二兩

白朮三兩　桂心一兩　甘草二兩炙　地骨皮四兩

升麻三兩　石膏八兩碎綿裹　薤心一升

右十一味細切以水九升煮諸藥味取二升去滓下地黃汁更煎三兩沸分溫五服晝四夜一服忌蕪荑生蔥海藻菘菜桃李雀肉等物

又療天行三七日至四七日勞病不歇熱毒不止乍寒乍熱乍劇乍差發動如瘧鼈甲湯方

宋板喻下有音吸二字
瘖烏含瘖烏玄反又按等
生地
慶

鼽痛骨節疼也 諸家病

今本千金出第十卷 起

鼈甲三兩炙 大青二兩 石膏八兩綿裹碎 牡丹皮一兩
烏梅肉一兩 常山三兩 竹葉切一升 牛膝根三兩
甘草一兩 香豉一升綿裹

右十味切以水九升煮取三升分温三服日三忌生葱生菜鯉魚海藻菘菜蒟蒻燕薁

千金療天行熱病五六日以上宜服苦參湯方

苦參三兩 黄芩二兩 生地黄八兩

右三味切以水八升煎至二升去滓温服半升日再忌蕪荑出第九卷中

又凝雪湯療天行毒病七八日熱積胃中煩亂欲死起死

音塔斤

揄湯方

芫花一升

右一味以水三升煮取一升半漬故布薄胃上不過再三薄熱則除當温四肢護厥逆也

第十卷中 揄接揄音臾斤也推也以故布摺方漬而苔胸上也又摺也

千金翼療天行脈浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解其表證續在此當發其汗服藥已微除發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也宜服麻黄湯方

麻黄三兩去節 桂心二兩 甘草一兩炙 杏人七十枚去尖皮兩人

右四味切以水九升先煎麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半分服八合取汗不須飲粥投此湯易得汗忌菘菜海藻生葱（深師同出第九卷中此張仲景傷寒論方）

崔氏療時行數日而大下熱痢時作白通諸藥多不得止吾思舊方多療傷寒後下痢耳未有尚在數日便兼除熱止下者也四順湯熱白通苦温故吾思作此湯以救數十人兼主傷寒黃連龍骨湯方

黃連三兩止利除熱　黃蘗三兩止熟除熱　艾如雞子一枚熟除熱毒止利
龍骨二兩止利除熱

右四味切以水六升煮取二升半分三服無不斷者忌

豬肉冷水

又其年時行四五日大下後或不下皆患心中結滿兩脅痞塞胷中氣急厥逆欲絶心胷高起手不得近不過一三日輒便死發諸醫用瀉心湯余用大小陷胷湯並不得療重思此或是下後虛逆而氣已不理而毒復上攻毒氣相搏結於胷中縱不下者毒已入胃胃中不通毒還衝上復搏於氣氣毒相激故致此病療之當先理其氣次下諸疾思與增損理中丸方

人參二兩　白朮二兩　甘草二兩炙　乾薑六分炮
栝樓根二兩　枳實四枚　茯苓二兩　牡蠣二兩熬

商　諡時疆麻昔傳時眞漢本作時

右八味末之以蜜和爲丸服如彈子一丸熱水下不歇復服余時用此劾的神速下疾即折續復與之不過服五六丸胷中豁然矣用藥之速未嘗見此然渴者嘗加栝樓不渴除之下者當加牡蠣不下勿用余因以告須軍韓康伯右衛毛仲祖光祿王道豫靈臺郎顧君苗著作商仲堪諸人並悉用之咸歎其應速于時枳實乃爲之貴難者曰傷寒熱病理中温藥今不解之以冷而救之以温其可論乎余應之曰夫今諺厥行始於項强刺色次於失眠發熱中於煩躁思水終於生蒼下痢大齊於此耳忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等（大書深研方同）

又阮河南療天行七八日熱盛不解艾湯方

苦酒三升　葶藶子二合熬擣　生艾汁取一升無生艾熟艾乾艾亦可用無艾可艾根擣取汁

右三味煎得一升頓服愈若有牛黄丙一刀圭尤良此宜療內有大熱也阮河南曰療天行凡除熱解毒無過苦酢之物故多用苦參青葙艾葶藶著酒烏梅之屬此其要也夫熱盛非苦酢之物則不能愈熱在身中既不時治治之又不用苦酢之藥如救火不以水必不可得脫免也又曰今諸療多用辛甜薑桂人參之屬此皆貴價難得常有此行求之轉以失時而苦參青葙葶藶子

艾之屬所在盡有除熱解毒最良勝於向貴價藥也前後數衆並用之得病內熱者不必按常藥次也便以青葙苦參艾苦酒療之但稍與促其間耳無不解（大書千金集驗同並出於第一卷中）

又茵蔯丸療瘴氣時氣及黃病瘧瘴等方

茵蔯二兩　大黃五兩　梔子人二兩　鼓五合蒸　常山三兩　豉一兩去心皮熬　巴豆一兩去今香　苦酒二兩　杏人三兩去尖皮熬

右九味擣篩蜜和爲丸初得時氣三日內平旦飲服每服一丸丸如梧子大加人行十里久或吐或利或汗如不吐及不利不汗更服一丸五里久不吐利汗則以熱飲投之老小以意量減黃病（疫）瘴癘時氣傷寒瘧瘴小兒驚熱欲發癇服之無不差者療瘴特神驗有人患赤白痢者服之亦差春初有宿熱依上法服之取吐利當年不憂熱病忌蒓菜蘆筍野猪肉生葱生菜（出大書第二卷中千金同）張文仲療天行若已五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食大黃湯方

大黃半兩　黃連半兩去毛　黃蘗半兩　梔子半兩擘

右四味切以水八升煮取六七沸內豉一升葱白七莖煮取三升分三服此許推然方神良又療傷寒已五六

外 趙 蒸 捲

日頭痛壯熱四肢煩疼取汗並宜老小忌猪肉冷水
備急 大書 小品
同

又支太醫桃葉湯熏身法

水一石煮桃葉取七斗以鷹席自圍衣被蓋上安桃
湯於牀簀下取熱自熏停少時當雨汗汗遍去湯待
歇速粉之并灸大椎則愈

又廣丘蒸法

經云連發汗汗不出者死可蒸之如中風法後以問
張苗苗云曾有人疲極汗出臥單籠中冷但苦寒踡
四日凡八過發汗汗不出苗燒地排葉蒸之則得大
汗被中傳粉極燥便差後用此法蒸汗得出療之 大書 急

方
同

又療天行熱毒垂死破棺千金湯方

苦參一兩

右一味㕮咀以酒二升半舊方用苦酒煮取半升去滓
併服當吐如烊膠便愈神驗 大書 肘後同延年治天行四五
日結胷滿痛壯熱身痛此

延年祕錄療天行頭痛壯熱一二日水解散方

麻黃四兩去節　大黃三兩　黃芩三兩　桂心二兩
甘草二兩炙　芍藥二兩

右六味搗篩爲散患者以生熟湯浴訖以煖水和服方寸匕覆取汗或利則便差丁壯人服二方寸匕七忌海藻生葱菘菜生菜古今錄驗同千金無黃芩芍藥

又梔子湯主天行一二日頭痛壯熱心中熱者方

梔子 三兩 黃芩 三兩 豉 一升熟綿裹 葱白 切一升

石膏 四兩碎綿裹 乾葛 四兩切

右六味切以水七升煮取二升六合去滓分温三服如人行八九里再服忌麪酒生冷等物

又解肌湯主天行病二三日頭痛壯熱者方

乾葛 四兩 麻黃 三兩去節 芍藥 二兩 黃芩 二兩

甘草 一兩炙 大棗 十二枚擘 桂心 一兩

右七味切以水八升煮取二升半去滓分三服得汗愈忌海藻菘菜生葱等 翥孝璋處

又療欲似天行四五日熱歇後時來時往惡寒微熱不能食者知母湯方

知母 二兩 枳實 三兩炙 梔子 十三兩 豉 一升蒸別裹

右四味切以水六升煮取二升半去滓分温三服如人行八里一服忌蒜麪

又療天行五日頭痛壯熱食則嘔者竹茹飲方

竹茹 二兩 生薑 三兩 黃芩 二兩 梔子 十二兩

右四味切以水五升煮取一升六合去滓分温三服忌
蒜熱麪等五日
又療天行五六日頭痛骨節疼痛腰痛兼痢黄芩湯方
黄芩三兩　梔子人三兩　芍藥二兩　豉一升綿裹
右四味水六升煮取二升半去滓分三服忌物依前
又柴胡湯天行五六日壯熱骨煩疼兼兩脅連心肋下氣脹急硬痛不能食恐變發黄者方
柴胡三兩　枳實三兩炙　栝樓三兩　黄芩三兩
龍膽二兩　大黄三兩切
右八味切以水九升煮取二升七合去滓分温三服忌

熱麪蒜並出第九卷中
又竹茹飲主痢後得天行病頭痛三四日食即嘔吐者方
竹茹二兩　橘皮二兩　生薑四兩　人參二兩
蘆根切一升　粳米一合
右六味切以水六升煮取二升五合去滓分温五六服
中間任食忌熱麪生冷張文仲處
又療天行熱病七八日成黄而目身體悉黄心滿喘氣麤氣急者茵蔯丸方
茵蔯三兩　大黄五兩　梔子人二兩　黄芩二兩
鼈甲二兩炙　常山二兩　芒消二兩　巴豆一兩去皮心熬

升麻二兩　豉三合
蒸

右十味擣篩以蜜和爲丸如梧子大患者飲服三丸以
得吐利則差忌菰菜生葱生菜野猪肉蘆笋出本事第十卷中
救急療天行熱氣頭痛骨肉酸疼悲熱等疾若初病一日
在毛髮二日在皮膚三日在肌肉必未得取利旦宜進豉
尿湯方

豉一升　葱白切二升　小便三升童子者爲佳

右三味先蒸豉及葱白令相得則投小便煮取一升澄
清及熱頓服或汗或利但差則得如未歇依前更進一
劑頓明有效

又如不除進柴胡湯方

麻黃二兩陳者去節　柴胡三兩　黃芩三兩　甘草二兩炙
乾葛三兩　石膏五兩碎綿裹三沸出之　葱白根切一升勿令有青處青即熱白即冷
一作桑根皮　豉七合綿裹

右八味切以水九升宿漬藥明旦先煮麻黃令沸掠去
上涕然後幷諸藥煮取一升七合分三服服別相去三
食頃良久覆取汗汗出以粉拭之惡寒多加桂心一兩
忌海藻菘菜等

又療天行病不即差經四五日渴引飲心上急强手不得
近又不得眠荒亂此則是黃不必得待刺黃始服藥凡是

心强氣急不得眠臥服此湯吐即差瓜蒂散方

瓜蒂 僅量一合熬令黃勿令焦 小豆一合小通按小豆量者量人之强弱而加減也

右二味擣篩爲散凡有病如前候及天行病得四五日不歇皆宜服此方以漿飲五合和散一錢匕服之二食久必吐不吐更與半錢匕服吐畢即差中男以上量意斟酌服之

又天行病若大困患人舌燥如鋸極渴不能服藥者宜服乾糞湯一名破棺湯解大熱方

陳久乾人糞一大升

右一味以沸湯一大升沃此糞一食久澄清瀝取一升頓服如渴不止者又依前法更服此宜灸從心厭骨向下一寸半名巨闕取患人中指節爲寸灸三十壯若無心厭骨則以中指節前量橫括心上至歧骨上兩頭築著骨當橫量下以前一寸當中直下則是巨闕也 土弱氏曰

必効療天行一二日者方

麻黃一大兩去節 同身寸以心爲尾下至臍折等

右一味以水四升煮去沫取二升去滓則著米一匙及豉爲稀粥取强一升先作生熟湯浴淋頭百餘椀然後服前粥則厚覆取汗於夜最佳

又療天行病經七日以上熱勢彌固大便澁秘心腹痞滿食飲不下精神昏亂恍惚狂言浪語脈沉細衆狀之中一無可救宜決計服此鼈甲湯方

鼈甲一兩炙　細辛二兩　桂心二兩　白朮二兩
生薑四兩　吳茱萸一兩　白鮮皮二兩　附子二兩半炮
枳實二兩炙　茵蔯三兩　大黃三兩切

右十一味切以水八升煮取二升六合去滓分三服服別相去如人行五里進一服忌生葱生菜蕓菜猪肉桃李雀肉等

又療天行十日以上腹微滿讝語或汗出而不惡寒體重短氣腹滿而喘不大便繞濟痛大便乍難乍易或見鬼者大承氣湯方

大黃四兩　厚朴半斤炙　陳枳實五枚炙　芒消三合

右四味切先以水一斗煮二味取五升去滓內大黃復煮取二升去滓內芒消煎令三兩沸適寒溫分再服得下者止不下更服之（下六字大書一行出第三卷中此張仲景傷寒論方）

古今錄驗八毒大黃丸療天行病三四日身熱目赤四肢不舉產乳後傷寒舌黃白狂言妄語亦療溫病已後飛尸遁尸心腹痛隔上下不通癖飲積聚癰腫苦痛溫中摩痛

上諸毒病方

蔡蘆二分炙　大黃三分　朱砂五分　蜀椒四分
雄黃四分研　巴豆四分去皮熬　桂心四分

右七味擣篩蜜和爲丸如麻子大飲服三丸當下不差更服合時勿令婦人雞犬見之忌生葱野猪肉蘆筍猩肉生血物

又犀馬丸療天行病四五日下部生瘡醫所不能療者方

附子一枚炮　蔡蘆一兩炙　桂心一兩　巴豆一兩去心皮熬

右四味擣篩研巴豆如膏和散蜜丸如梧桐子空腹服二丸熱在膈上不下飲半升熱飲投吐之後下下部瘡自差神良病家常宜備馬買藥因名犀馬丸老小半之以意消息之忌野猪肉生葱猩肉蘆筍等物

又療若六七日熱盛心煩狂言見鬼者方

紋人糞汁飲數合服良大書出第三卷中

近切療天行三日外若忽覺心上妨滿堅硬腳手心熱則變爲黃不療殺人秦艽湯方

秦艽一兩　紫草一兩　白鮮皮一兩　黃芩一兩
梔子一兩

右五味切以水一大升半牛乳一大升煮取七合分爲二服老小以意量之一劑不愈更與一劑試有效

天行病方七首此方兼療傷寒爲題云天行所以入天行部

許仁則云此病方家呼爲傷寒有二種有陰有陽陰傷寒者反於陽是也陽傷寒狀表裏相應心熱則口乾若肝熱則眼赤暈脾熱則穀道稍澀腎熱則耳熱赤肺熱則鼻乾渴胃熱則嘔逆大腸熱則小便秘澀小腸熱則小便赤少皮膚熱則脉洪數身體熱反此者乃陰傷寒夫傷寒者則爲寒所傷也寒生陰陰主殺凡人陰陽調則無病氣既爲寒所傷便致斯疾也

又論陰陽傷寒者則毒氣傷陰陽氣也人身中有陰陽之氣陰陽者則寒熱也本以陰爲毒所傷則不能流行陽熱獨王故天行多熱者也以病於諸病之中最難爲療陰陽二病陰尤可憂耳時聞有此病而多倉卒死者不少或由證候不能精審方藥未達指歸飲食乖宜寒溫失節故致爾自心不全甄別他醫難得精妙與其療也寧可任之但能滋味適寒溫將理中間冷暖守過七日此最爲得計其中事須服藥不可徒然者唯多日大便不通暫須一轉洩耳病經一二日覺身體壯熱頭痛骨肉酸楚背脊强口鼻乾手足微冷小便黃赤此是其候若如是宜先合煮桃柳等三物湯浴之方

桃枝細切　柳葉細切　酢漿水一斗
五斗　五斗

右藥先以水一石煮桃柳枝葉二物取七斗汁去滓內

醋漿水攪帶熱以浴浴訖拭身體令乾以粉摩之勿觸
風則於密處刺頭眼後兩邊及舌下血斷以鹽末厝刺
處則入被臥
又後服解肌乾葛等五物飲微覆取汗如病根輕者因此
或歇方
葛根切五兩　慈白切一升　生薑切一合　豉心一升綿裹
粳米二合研碎
右藥切以水五升煮取豉心以上四味取三升半汁去
滓內粳米屑煮令米爛帶熱頓啜候盡微覆取汗無所
忌

又依前浴等法不覺歇宜更作雞子湯重淘之方
新殼產雞子五枚
右各破頭瀉置一盞中別加一雞子水以筯攪令極渾
別用水一升煮極沸則投雞子於湯中微攪[纔]似熟則
瀉置椀中內少醬清似變腥氣帶熱啜令盡覆使汗出
又依前雞子湯出汗汗洩當歇如不覺退合梔子等六味
散以下之方
梔子三十枚擘　乾葛五兩　豉二合　大黃五兩　芒消五兩　茵蔯二兩　蜀升麻三兩
右藥切合搗爲散以飲服三方寸匕服之須臾當覺轉

則利也如經一兩食頃不利且以熱飲投又不利卽斯須更服一方寸匕還以飲投得利爲度後適寒溫將息更不須服此也

又依前梔子等六味散取利復不覺退加嘔逆食不下口鼻喉舌乾燥宜合生蘆根八味飲子細細服之方

生蘆根切升　生麥門冬二升去心　生薑五兩　人參二兩
知母二兩　烏梅十顆　白蜜一合　竹瀝三合

右藥切以水八升煮取三升去滓內蜜瀝等攪令調細細飲不限遍數冷煖亦不限食前後服此飲子雖不能頓除熱病然於諸候不覺有加體氣安穩心腹不冷意

又欲得此飲任重合但依前服之如熱勢不退心腹妨滿飲食漸少心上痞結則不可重服之

又依前生蘆根等八味飲子飲之諸狀不歇漸不下食心腹結硬不得手近有時觸著痛不可忍既是熱病體氣合熱骨肉疼痛脈合洪數口合苦爽食合嘔逆體氣反涼脈反沈細飯食反下反不知痛惱大小便秘塞心上如石痛不可近視脣急鼻張手眼尋繹狂言妄語此由熱極將息陰冷飲食寢寐唯冷是求熱結在心無因通洩如有此者十不救二三更不可以常途守之當須作成敗計耳此非半夏等十味湯無奈之何其中有諸狀與此無別但加身

體黃眼白睛色如黃蘗此是急黃如有亦不可守常法還宜合後湯救之方

半夏五兩熊州者湯洗去滑汁盡凝熊字乾薑三兩吳茱萸二兩
桂心二兩白朮三兩細辛三兩柴胡三兩
牡丹皮三兩大黃五兩芒消二兩

右藥切以水一斗煮取三升去滓內芒消攪令消盡分溫三服每服如人行十里久若服一服利後須伺候將息勿更進湯藥但研好粟米作汁飲細細與之如覺利傷多可以酢飯止稠酢漿粥亦得忌羊肉餳生葱生菜桃李雀肉胡荽等

又依前成敗計服半夏等十味湯後雖得毒熱勢退利尚不休體力漸弱宜合人參等五味散細細服之方

人參五兩生犀角末二兩
黃連三兩去毛無亦可以龍骨四兩代之烏梅肉三兩熬生薑屑三兩

右藥擣篩爲散以飲服一方寸匕日三服稍加至二匕忌猪肉冷水等吳昇同

天行嘔逆方七首

病源胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後飲水多胃虛冷亦爲嘔也出第九卷中

廣濟療天行惡寒壯熱食則嘔逆前胡湯方

前胡一兩　麥門冬三兩去心　竹茹二兩　橘皮二兩
甘草一兩炙　生薑二兩　生地黃四兩切

右七味切以水七升煮取二升三合絞去滓分温三服
服如人行六七里進一服忌海藻菘菜蕪荑熱麪猪犬
肉油膩出第一卷中

崔氏療天行數日或十許日而表不解心下有水熱毒相
搏遂嘔時復有欬者增損阮氏小青龍湯方

麻黃三兩去節　芍藥二兩　桂心一兩　甘草二兩炙
細辛一兩

右五味切以水六升煮取二升温服七合阮木湯方等

分雖未覺用嫌其太温余增損其分兩以療十餘人皆
愈忌海藻菘菜生葱生菜等出第一卷中

近効療天行壯熱嘔逆不下食橘皮湯方

橘皮三兩　生薑四兩　茯苓三兩

右三味切以水五升煮取一升五合去滓分温五六服
中間任食一日服盡忌大酢蒜麪李虔倹張文仲等並
必効療天行嘔吐不下食方同出第九卷中

取臘月兎頭幷皮毛燒令煙盡擘破作黑灰擣羅之
以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令大耗
無所忌比用頻効出第一卷中

救急療天行後嘔逆不下食食入則出方

取羊子肝如食法作生淡食不過三兩度則止文仲同

又方

以雞子一枚於沸湯中煮三五沸則出水浸之外寒內熱則吞之神効無所忌大書並出第一卷中

集驗療天行後氣膈嘔逆不下食生蘆根湯方

燈心一分　生麥門冬十二分去心　人參四分　生蘆根一大握切

右四味以水一大升煎取入合去滓分溫三服

天行嘔惡方七首

病源伏熱在胃令人胃滿胃滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃氣虛冷亦令致噦也大書出第九卷中

肘後療嘔惡不止橘皮甘草湯方

甘草一兩炙　橘皮三兩

右四味切以水三升煮取一升麻半兩　生薑三兩

忌海藻菘菜文仲大書同出第二卷中

文仲近効療嘔逆麥門冬飲子方

麥門冬去心蘆根　人參各二兩

右三味切以水六升煮取二升七合去滓分溫五服徐

徐服常用有驗

又方

飲生薑汁三二合大良

又方

枇杷葉去毛煮飲之作粥亦佳出第一卷中

又方

研油麻汁煮菜豆令爛取半升許以手掌大猬皮燒作灰篩之內豆中和食出第二卷中

救急療天行乾嘔若噦手足逆冷薤豉粥方

薤白切一升　香豉一升　白米四合

右三味以水一升煮豉一沸漉去滓下薤及米煮爲稀粥進兩碗良

又療天行後噦欲死兼主傷寒小半夏湯方

半夏五兩洗去滑　生薑八兩切令薄細勿令濕經水浸者爲好

右二味各以水三升別煮各取一升半去滓二汁相和一處共煮取二升分三服服相去如人行十里久當令下食其噦不過俄頃則止近二公及任理居中屬續得之明奉御來豪薨秘此方但止煮藥送來豪與方郎中隣居後乃方便得之大良効忌羊肉餳傷寒論同並出在第一卷中

天行喉咽痛方二首

病源陰陽隔絶邪客於足少陰之絡毒氣上熏攻於喉咽故痛或生瘡也出第九卷中

深師療天行毒病或下不止喉咽痛黃連馬通湯方

小豆一升　黃連一兩去毛　馬通汁三升吳茱萸一兩

右四味以馬通汁令煮取一升盡服不差復作有効忌猪肉冷水出大書第十四卷中

古今錄驗青木香湯療春夏忽喉咽痛而腫兼下痢方

青木香二兩　黃連一兩去毛　白頭翁二兩

右三味切以水五升煮取一升半分溫三服小兒若服之一服一合忌猪肉冷水出大書第三卷中

天行衄血方四首

病源天行衄血者五藏熱結所爲心主於血邪熱中於手少陰之經客於足陽明之絡故衄血衄者血從鼻出也出第九卷中

深師療天行毒病鼻衄是熱毒血下數升者方

勿療自差亦無所苦亦可取好松烟墨擣之以雞子白和丸丸如梧桐子大水下一服十丸豈無所忌

又黃土湯療鼻衄去五藏熱氣結所爲或吐血者方

當歸　茸草炙　芍藥　黃芩

芎藭各三兩　桂心一兩　生地黃一斤

土如雞子一枚碎絹裹　青竹皮五兩

右九味切以水一斗三升煮竹皮減三升去滓內諸藥

煮取三升、分四服、忌海藻菘菜生葱、

又方

黃芩四兩

右一味切、以水五升、煮取二升、分三服、亦療婦人漏下血、

又療脈浮大鼻中燥、如此必去血、鼻衄方、

灸兩臂中脈、取止、取臂脈法、以鼻臭臂、點其鼻尖所著處、是穴、兩臂皆爾、出第十四卷中

天行口瘡及口乾苦方四首

病源、發汗下後、表裏俱虛、而毒氣未盡、熏於上焦、故喉口生瘡也、出第九卷中

深師療天行熱盛、口中生瘡、酪酥煎丸、

酪酥三合　蜜三合　大青一兩

右三味合煎三沸、稍稍傳口、以差爲度、

又口瘡方

取蛇莓五升、擣絞取汁、稍稍飲之、並出第十四卷中

集驗療天行熱病口瘡、升麻湯方、

升麻二兩　通草四兩　射干二兩　羚羊角三兩屑

芍藥三兩　生蘆根切、一升

右六味切、以水七升、煮取二升、分爲三服、如人行五里

更服 古今鉤驗同

又療天行熱病口苦下氣除熱喉中鳴石膏蜜煎方

石膏半斤碎 蜜一升

右二味以水三升煮石膏取二升乃內蜜復煎取一升去滓含如棗核許盡更含千金同並出第二卷中

天行欬嗽方五首

病源熱邪氣客於肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故上氣而欬也出第九卷中

廣濟療天行壯熱欬嗽頭痛心悶前胡湯方

前胡 升麻各八分 貝母 紫菀各六分

石膏十二分碎綿裹 麥門冬八分去心 杏人三十枚去尖皮兩人 竹葉切一升 甘草二分炙

右九味切以水八升煮取三升五合絞去滓分溫三服相去如人行六七里進一服不吐利差忌海藻菘菜油腥猪魚等

又療天行肺熱欬嗽喉有瘡地黃湯方

玄參 芍藥 生地黃切一升 升麻 麥門冬去心各八分 貝母六分 竹葉切一升 柴胡

白蜜一合

右九味切以水九升煮取三升絞去滓內蜜再上火煎

三沸合咽其汁勿停中間不妨食不利忌蕪荑熱麪猪
犬肉油膩
又療天行後乍寒乍熱昏昏不省覺脊下痛百節骨痛欬
不能下食兼口舌乾生瘡柴胡湯方
柴胡八分　升麻六分　芍藥六分　黃芩六分
甘草五分　石膏十二分碎綿裹　生麥門冬六分去心　葱白半分
香豉六合綿裹　生薑六分　竹葉切一升洗
右十一味切以水九升煮取二升五合絞去滓分温三
服服別相去如人行六七里進一服不吐不利差忌海
藻菘菜熱麪油膩亦出第一卷中

集驗療天行病上氣欬嗽多唾黏涎日夜不定生薑煎方
生薑三兩去皮切碎豆粒大
右一味以飴半斤和微煎令爛每日無問早晚少少含
仍嚥薑滓一時燕之
必効療天行病後因食酒麪肺中熱擁遂成欬不止方
桑白皮十二分　桔梗十分　肥乾棗二十一枚擘　麻黃六分去節
曹州葶藶子十分熬令紫色令爲膏湯成珠
右五味切先以水四升煮桑白皮等四味可取一升半
去滓下葶藶子膏更煎三五沸去滓分温五服空心食
後服或利勿怪忌猪肉油膩生冷果子等物

天行發斑方三首

病源大熱病在表已發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁譫語此爲表虛裏實熱氣燥於外故身體發斑如錦文凡發斑不可用發表藥令瘡開洩更增斑爛表虛故也出大書第九卷中

肘後比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療劇者數日必死療得差後瘡瘢紫黯殞歲方滅此惡毒之氣也世人云以建武中於南陽擊虜所得仍呼爲虜瘡諸醫參詳作療用之有効方

取好蜜通身摩瘡上亦以蜜煎升麻數數拭之亦佳

又方

以水濃煮升麻漬絹洗之若酒漬煮爾雀但燥痛難忍也出大書第二卷中

文仲陶氏云天行發斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣方

云永徽四年此瘡從西域東流于海內但煮葵菜葉蒜薑啖之則止鮮羊血入口亦止初患急食之少飯下菜亦得出大書第二卷中

天行發瘡斑豆疱瘡方一十一首

病源夫表虛裏實熱毒內盛攻於藏腑餘氣流於肌肉遂

於皮膚毛孔之間結成此瘡重者匝遍其身狀如火瘡芳根赤頭白則毒輕若色紫黑則毒重其瘡形如豌豆亦名豌豆瘡脉洪數者是其候也出大素書第九卷中

千金療人及六畜天行熱氣病豌豆瘡方

濃煮黍穰汁洗之若是稼穰則不差瘡若黑者擣蒜封之又煮乾芸臺汁洗之

又方

眞波斯青黛大如棗水服之差

又熱病後發豌豆瘡方

黃連三兩去毛水二升煮取八合頓服之忌猪肉冷水

又若赤黑發如瘄大者方

煎羊脂摩傅之

又方

青木香二兩水三升煮取一升頓服之効

又方

小豆屑和雞子白傅之

又方

以月布試之

又療豌豆瘡初發覺壯熱者方

煮大黃五兩服之（大書）延年同

又療瘡出頻疼者木香湯方

青木香二兩　薰陸香一兩　白礬一兩

麝香二分

右五味以水四升煮取一升半分再服熱盛者加一兩

生犀角如無犀角以升麻代之如病輕去礬石大神効

又方

瘡上以苦酒和豬膽塗勿動痂落無瘢仍臥黃土末上良此病小便澀有血者中壞瘡皆黑靨不出膿死不療

又內發瘡盛方

醋四合大豬膽一具

右二味煎三沸一服一合日五服良驗（大書）並出第十卷中延年療天行壯熱病後發瘡如豌豆遍身大青湯方

大青三兩　梔子一七枚擘　犀角屑一兩　豉五合

右四味切以水五升煮取二升分三服服之無所忌古今錄驗水解散療天行熱氣則生疱瘡疼痛解肌出汗方（出翟世平）

麻黃一兩去節　黃芩三分　芍藥二分　桂心一分

右四味擣篩煖水解服二方十七覆令出汗日再服差

者減之忌海藻菘菜生葱（延年同出第二卷中一方有下八字大書）

天行虛煩方二首

病源夫天行病陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心腑而煩者則令人悶而欲嘔若其人胃內有燥糞而煩者則謬語時繞臍痛腹滿皆當察其證候也（出第九卷中大書）

文仲療天行表裏虛煩不可攻者但當與竹葉湯方

竹葉二把　石膏碎綿裹　麥門冬去心　半夏半升洗　人參　甘草各二兩

右六味切以水一斗煮取六升去滓內粳米一升煮米熟去之分五服嘔者與橘皮湯湯方在上嘔婉篇中不

愈者重作此宜泰數用甚効若傷寒後虛煩亦宜服此方是仲景方忌羊肉海藻菘菜鯽

又療虛煩不可攻方

青竹茹二升

右一味以水四升煎至三升去滓分溫五服徐徐服之

天行狂語方三首

病源夫病熱盛則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽氣爭而外并於陽四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高而歌熱盛於身故棄衣而走陽盛故妄言罵詈不避親

疎大熱遍身狂言而妄見妄聞也出大書第九卷中

千金水道散療天行病煩熱如火狂言妄語欲走方

白芷一兩　茸遂二兩　熬

右二味擣篩以水服方寸匕須臾令病人飲冷水腹滿則吐之小便當赤也一名濯腹湯此方療大急者出大書第十卷

中文仲
范汪同

又五苓散主天行熱病但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當方

猪苓二分　白朮三分　澤瀉五分　茯苓三分　桂心二分

右五味擣篩爲散水服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈忌大醋生葱桃李雀肉等出大書張仲景論深師同出第九卷中

古今錄驗療天行壯熱狂言謬語五六日者方

雞子三枚　芒消方寸　井花水一杯

右三味合攪盡服之心煩下則愈出大書第三卷中

天行熱毒攻手足方五首

病源熱毒氣從藏腑中出攻於手足則煩熱赤腫疼痛也

八五藏六腑并榮輸皆出於手足指故此毒從內而出攻於手足也出大書第九卷中

肘後療天行病毒熱攻手足疼痛赤腫欲脫方

鹽豉及羊肉一斤以來
右三味以水一斗煮肉熟以汁看冷煖漬手足日三度
差（大書）范汪同

又方
細剉黃蘗五斤許以水三斗煮漬之必効亦治攻陰腫

又方
作坎令深三尺大小容兩足燒坎中令熱以酒灌坎中著屐踞次上衣氈勿令氣泄日再作之

又方

煮羊桃葉汁漬之加少鹽九妤（大書）並出第二卷中

崔氏療天行熱毒攻手足方
猪蹄一具去毛剉碎合葱白一握切以水一斗煮熟去滓內少鹽以漬之（大書）附後同出第一卷中

天行大小便不通脹滿及澁方四首

病源天行大小便不通此由脾胃有熱發汗大過則津液竭津液竭則胃乾燥結熱在內故大便不通又汗後津液虛少其人小腸有伏熱故小便不通（大書）出第九卷中

廣濟療天行熱氣惡寒頭痛壯熱大小便澁柴胡散方
柴胡八分　茵蔯十分　青木香十分　黃芩八分

土瓜根十分 白鮮皮八分 梔子人十分 大黃二十分 芒消十二分

右九味擣爲散平辰空肚以新汲水服五六錢七少時當三兩行微利利後煮薤豉稀粥食之熱如未歇明辰更服四錢匕熱歇停藥忌熱食猪犬肉油膩等

又療天行惡寒壯熱頭痛大小便赤澁不下食飲柴胡湯方

柴胡七分 茵蔯七分 大黃十二分別漬 升麻七分 梔子四枚擘 芒消四分湯成下 黃芩十二分 芒消四分

右八味切以水四升先漬藥少時猛火煮取一升五合

分温三服服別相去如人行六七里吸一服以快利爲度第二服則利更不須服之忌熱食炙肉蒜粘食

近效主天行後兩脅脹滿方

熬鹽熨之如小便澁亦用鹽熨臍下如水腫以穀枝

汁服愈大效

集驗療天行病腹脹滿大小便不通滑石湯方

滑石十四分研 葶藶子一合紙上熬令紫色擣 大黃二分切

右三味以水一大升煎取四合頓服兼擣蔥傳小腹乾

即易之効肘後崔氏同無大黃

天行熱痢及諸痢方四首

病源此由熱氣在腸胃挾毒則下黃赤汁也又熱毒傷於腸胃故下濃血如魚腦或爛肉汁壯熱而腹絞痛此温毒熱氣所爲也出大書第九卷中

深師療天行毒病酷熱下痢七物升麻湯方

升麻　當歸　芍藥　桂心　黃連去毛　甘草炙　黃蘗各半兩

右藥切以水三升煮取一升頓服之忌海藻菘菜猪肉冷水生葱等物

又天行諸下悉主黃連湯方

黃連三兩去毛　黃蘗二兩　當歸二兩

右三味以水六升煮取三升去滓內蜜一合微火煎取二升半分三服良驗忌猪肉冷水並出第十四卷中下七字大書一方有龍骨一兩

范汪療天行熱毒下痢赤白久下膿血及下部毒氣當下細蟲如布絲纏大或長四五寸黑頭銳尾麝香丸方

麝香一分　附子二分炮　雄黃　丹砂　乾薑各二分

右五味各擣下篩訖復更合治之蜜和爲丸如小豆大飲下一丸老少半之効驗忌猪肉生血等出大書第三十三卷中

甲乙方療天行熱病差後病膿血不止方

龍骨一兩

右一味擣研爲末米飲下一錢不計時節日三服隹

天行厭瘡方八首

病源毒熱結在腹內殺氣衰毒氣盛三蟲動作食人五藏多令泄痢下部瘡痒若下唇內生瘡但欲寐者此蟲食下部也重者肚爛見五藏出第九卷中

深師療天行下部瘡爛方

烏梅二七枚去核　大蒜二七枚　屋塵半升篩取細者

右三味擣篩爲散苦酒一升同投於銅器中煎成丸作長挺內下部范汪同出第十四卷中

范汪療人下部中痒方

蒸棗取膏以水銀熟研丸之令相得長二三寸以綿薄裹內大孔中蟲出差

又療穀道中瘡方

以水中荇葉細擣綿裹內下部日三卅後同

又療天行厭蟲食下部生瘡雄黃兌散方

雄黃半兩　青葙子三兩　苦參　黃連各三兩

桃人一兩半去皮尖及兩人熬

右五味合擣篩綿裹如半棗核大內下部亦可米汁服方寸匕日三服忌猪肉冷水及熱麪炙肉蒜等物

又桂枝湯療天行瘧病方

桂心　二兩　小藍　二兩

右二味㕮咀，以水一斗，煮取二升半，內猪肝十兩，去上膜細研，著湯中，和令相得，臨時小溫，若毒悉在腹內，盡服之，在下部者，三分藥中用一分，竹筒內丁部中，服藥一時間，當下細蟲如髮大五六升，小兒半作之，忌生葱、肫、後范汪同出第二卷中

文仲姚氏療天行病瘧下部生瘡方

並出第三十三卷中

濃煮桃皮，煎如糖，以綿合導下部中，若口中生瘡含之

又療天行病膿血下部生瘡青葙子散方

青葙子　一兩　藿蘆　一兩　狼牙　一兩　橘皮　一兩

苦參　三兩

右五味，擣篩，爲散，水飲和服，方寸匕，日三服，未差更服，以差爲度

又療天行病膿血下部生瘡青葙子散方

黃連　三兩末　蠟　一兩　烏梅肉　三兩　熬末

右三味，鎔蠟和蜜，爲丸，如梧子大，空心米飲下三十丸，再服，加至四十丸，差忌猪肉冷水

天行陰陽易方二首

病源天行陰陽易病者是男子婦人天行病新差未平復而與交接得病者名爲陰陽易也其男子病新差未平復而婦人與之交接得病者名爲陽易其婦人新病差未平復男子與之交接得病者名爲陰陽易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽相感動其毒度著於人如換易也其病狀身體熱衝胃頭重不能舉眼中生胺四肢拘急小腹絞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急氣上衝胃頭重不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨髓竭便噓噓吸吸氣力轉少著牀不能搖動起止仰人或歲月方死出第九卷中

深師療丈夫得婦人陰易之病若因房室及諸虛勞少腹堅絞痛陰縮困篤欲死方

灸陰頭一百壯便差可至三百壯皆愈良無比後生子如故無妨范汪同無所忌

又療陰陽易病方

取豚卵二枚溫令熱酒吞之則差出第十四卷中

天行虛羸方二首

病源夫人榮衛先虛復爲邪熱所中發汗吐下之後經絡損傷陰陽竭絕虛邪始散真氣尚少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生衆病焉出第九卷中

崔氏療煩躁而渴不止惡寒仍熱盛者竹葉湯常用亦佳
不徒療天行凡虛羸久病及瘧後胃上痰熱者服之皆妙
方

甘草二兩炙 棗十五枚擘 半夏一兩洗 芍藥三兩
前胡一兩 黃芩一兩 小麥五合 人參二兩
粳米一升 知母二兩 麥門冬四合去心 栝樓一兩
生薑四兩 竹葉一把須以竹篠飲代

右十四味切以竹篠飲一斗五升煮取五升分三服若
非天行而虛羸久病胷生痰熱亦可服之加黃耆二兩
除黃芩減知母一兩除栝樓用之大效忌羊肉海藻菘

菜餚出第十卷中 通按篠乃小竹即箭竹也

千金補虛大病後不足萬病虛勞同此方

取五歲以上七歲以下黃牛新生者乳一升以水四
升煎取一升如人肌稍稍飲之不得過多十日不住
服佳出第十卷中

天行差後禁忌方二首

集驗云凡熱病新差及大病之後食猪肉及腸血肥魚油
臘等必大下痢醫不能療也必至於死若食餅餌粢黍飴
脯鱠炙棗栗諸果及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消
化必更結熱適以藥下之則胃中虛冷大利難禁不下必

死下之復危皆難救也熱病之後多坐此死不可不慎也
病新差但得食糜粥寧可少食令飢慎勿飽不得他有所
食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁兎雉鹿
肉慎不可食猪犬肉也新差後當靜臥慎勿令人梳頭洗
面非但體勞亦不可多言語用心使意勞凡此皆令勞復故
督郵顧子獻得病已差未健詣華專視脈專曰雖差尚虛
未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可御內即死臨死當吐
舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中
間三日發病舌出數寸而死病新差未經百日氣未平復
而以房室者畧無不死也益正疾愈後六十日已能行射

獵以房室則吐涎而死及熱病房室名爲陰陽易之病尤
難療多死近者有士大夫小得傷寒發汗已十餘日能起
馬行來自謂平復故以房室則小腹急痛手足拘拳而死
出第二卷
中千金同

深師說天行病未復殭食黃花菜手足鱠
瘥又食鱖魚必變成
肉結氣不化天行病差飲酒合陰陽復必死天行病損未滿三月日
瘥又食鱖魚必死天行病差食諸菜有花者三年肌膚不充天行病
食鱠鯉肉則復下血食菜合陰陽復必死出第十四卷中千金天
臨死令人四肢不舉天行病差食芥鱠
未好時食生瓜芥三月流腫也天行病差食芥鱠作疽天行病差
行病差後未滿五日食一切肉麪者病更發因天行病差食生魚鮓下
新起飲酒及食蔥菜病更發天行病差食生菜顏

以蒸蒸食者

色絶身不平後天行病新汗解飲冷水者損心包令人虛不復天行病未損食犬肉并葫荽合食之復則死天行病差食生棗及羊肉者膈上作熱蒸天行新差食犬肉羊肉作骨中蒸天行病差食魚肉并爪生菜令人身腫天行病差食蒜膾者病發大熱

天行勞復食復方六首

病源夫病新差血氣尚虛津液未復因卽勞動更成病焉若言語思慮則勞傷於神梳頭澡洗則勞於力未堪勞而強勞之則生熱熱氣既還入經絡復爲病者名曰勞復又病新差脾胃尚虛穀氣未復若食肥肉魚膾餅棗菜之屬則未能消化停積在於腸胃使脹滿結實因更發熱復爲病者名曰食復出第九卷中

廣濟療患天行熱氣差後勞發頭痛如初病者鼠矢湯方

雄鼠屎三七枚熬末湯成下乾葛二兩 梔子十四枚擘 葱白一升 豉八合

右五味切以水三升煮取一升七合去滓內鼠屎末分温二服服別相去如人行六七里微汗內消不利忌如藥法

又療患數日復勞發者枳實湯方

枳實三枚炙 梔子十四枚擘 葱白切一升 香豉半升

鼠屎二七枚

右五味以水一斗煎取二升五合分温三服服別相去

外臺秘要

如人行六七里進一服內消不利忌如藥法 並出第一卷中

深師竹葉湯療天行後虛熱牽勞食復四肢沉重或一臥一起氣力吸吸羸弱方

竹葉一把　小麥一升　芒草一兩　石膏二兩碎

茯苓二兩　半夏一升洗去滑　前胡二兩　知母二兩

黃芩二兩　人參二兩　生薑四兩　大棗二十枚擘

右十二味切以水一斗二升煮竹葉小麥減四升去滓內藥煮取三升分三服忌海藻菘菜醋物羊肉湯等物

備急療勞復方

以粉三升以煖飲和服厚覆取汗又以水和胡粉少

許服之亦佳 出第一卷中

延年葛根飲主熱病勞復身體痛天行壯熱煩悶葛根汁方

葛根一兩　葱白一握　豉半升　米一合

右四味先切葛根以水九升煮取七升則內葱白更煮取四升去葛及葱滓訖則內豉及少許米煮取三沸並濾去米等滓分四服當有汗出即差明旦又更作服忌猪肉蒜等 並出第九卷中

必効療天行勞復鼠矢湯方

雄鼠屎五枚兩頭尖者　豉一升　梔子二十枚擘　實三枚中破

右四味以水五升煮取二升四合分四服相去十里久若覺大便澁加大黃二兩出第一卷中

天行差後勞發方五首

許仁則云此病復發不但起動勞役或因飲食稍多或因言語過分或緣視聽不節或爲動轉不常皆成此復甚者乃至不救劇於初得病時不可以復發而云輕易勞復狀一如傷寒初有如此者宜合葱白等七味先服之漸覆取汗方

葱白連鬚切一升 乾葛切六合 新豉二合綿裹 生薑切二合

生麥門冬去心六合乾地黃六合勞水八升此水以竹瀝之

右藥用勞水煎之三分減二去滓分温三服相去行八九里如覺欲汗漸漸覆之兼主傷寒忌蕪荑

又依前葱白等七味飲服之得可但適寒温將息以取安穩若不覺可宜合萎蕤等五味飲子服之方

萎蕤五兩切 葱白切一升 豉心一升綿裹 粳米三合研碎

雄鼠屎七枚未之

右藥以水七升先煮豉以上取四升汁去滓內粳米屑煮米爛訖內鼠屎未攪調頓服覆被安臥取汗差

又凡天行病差後準常合漸健能行履遂過限不慎起動

體氣虛羸每覺頭痛唇口乾乍寒乍熱發作有時或雖能行動運轉然每作時節有前狀者名天行後不了了有此宜令地骨白皮等五味飲子白薇等十味丸方細細服之

地骨白皮三兩　知母三兩　麥門冬五兩去心　竹瀝一升

白蜜三合

右藥切知母以上和麥門冬煞後以水六升煮取二升去滓內竹瀝蜜攪調分温三服服相去如人行十里久如覺虛不能空腹頓盡欲間食服亦佳兼主傷寒

又若服前地骨白皮等五味飲子不可雖可不能全退宜合白薇等十味丸方

白薇三兩　知母四兩　地骨皮三兩　乾地黃六兩

麥門冬五兩去心　甘草四兩炙　蜀漆三兩　菱蕤三兩

橘皮二兩　人參三兩

右藥細切合擣篩絹羅爲散蜜和丸如梧桐子大初服以飲下十五丸日再服稍加至三十丸服經三數日後自候腹中若覺熱則食前服如不能以空飲下藥宜合烏梅等四味飲下前丸忌菘菜海藻蕪荑等

烏梅飲方

烏梅十枚　菱蕤五兩　生薑五兩　白蜜一合

右藥切以水六升煮三味取二升去滓內白蜜攪調細

細用下前丸多少冷煖以意斟酌縱不下先但覺口乾
渴則飲之吳昇同

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟較
勘


重訂唐王燾先生外臺秘要方第三卷終

重訂唐王燾先生外臺秘方第四卷目録温病及黄疸二十門

温病論病源一首
辟温方二十一首
斷温令不相染方二首
温病噦方四首
温病渴方二首
温病發斑方七首
温病勞復方四首
諸黄方一十三首
急黄方六首

黄疸方一十三首
黄疸遍身方一十一首
瘧黄方三首
黄疸小便不利及腹滿喘方二首
黄汗方三首
女勞疸方四首
黒疸方三首
酒疸方七首
穀疸方三首
許仁則療諸黄方七首

雜黄疸方三首



唐王燾先生外臺秘要方第四卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等　上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

男聖錫爲希賢
仁錫爲賀　父仝校

温病論病源二首

病源經言春氣温和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣氷寒此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃爲傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣中而即病者名爲傷寒不即病者其寒毒藏於肌膚中至春變爲温病至夏變

爲暑病暑病者熱極又重於温也是以辛苦之人春夏多温熱病者皆由冬時觸冒寒氣之所致以上與傷寒論同

此病傷寒而成温病者先夏至日者爲病温後夏至日者爲病暑故曰冬三月早卧晚起必待日光使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就温無泄皮膚使氣亟奪又因於寒欲如運樞故冬傷於寒春必病温也又有冬時傷非節之暖名爲冬温之毒與傷寒大異也有病温者乃天行之病耳其冬月温暖之時人感乖候之氣未遂發病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱温毒始發則肌肉斑爛也經曰虛邪賊風避之有時恬淡虛無眞氣從之

精神內守病安從來故曰人清淨則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害又云四時陰陽者萬物之根本也是以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根也從陰陽則生逆之則死故曰精者身之本藏於精者春不病温也有病温汗出輒復熱而脈躁疾不爲汗衰狂言不能食病名爲何曰病名陰陽交交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉之間而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無神也病而留者其壽可立而傾也汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此

不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三
死不見一生雖愈必死凡膚熱其脈盛躁者病溫也其脈
盛而滑者汗且出也凡溫病人三二日身軀熱脈疾頭痛
食飲如故脈直疾八日死四五日頭痛脈疾喜吐脈來細
十二日死此病不療八九日脈不疾身不痛目不赤色不
變而反利脈來牒牒按不彈手指時大心下硬十七日死
病三四日以下不得汗脈大疾者生脈細小難得者死不
治也下利腹中痛者死不治

辟溫方二十首

附後屠蘇酒椒疫氣令人不染溫病及傷寒歲旦飲之方

時

療甚療

廣濟療

瘡麻酒

病三四日以下不得汗脈大疾者生脈細小難得者死不療也
下利腹中痛甚者死不療也其鍼石湯熨別有正方存神攘辟
今附于後養生方導引法去常以雞鳴時心存念四海神名三
遍辟百邪止鬼令人不病溫

東海神名阿明　南海神名祝融　西海神名巨乘

北海神名禺強

又存念心中氣赤肝氣青肺氣白脾氣黃腎氣黑出周其身又
兼辟邪鬼欲辟衆邪百鬼常存心爲炎火如斗煌煌光明則百
邪不敢干之可以入溫疫之中

又溫病一日太陽受病諸陽主表表謂皮膚也病在皮膚之間
故頭項腰脊痛

又溫病二日陽明受病在於肌肉故肉熱舌乾不得卧故可摩
膏火灸發汗而愈

又温病三日少陽受病其脉循脅絡於耳故耳聾脅痛而耳聾三陽始傳病訖未入於藏故可發汗而愈也
又温病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病訖傳入於陰故毒氣入肖腸之內其病咽乾腹滿故可吐温病大法四日病在肖腸當吐之愈有得一日至二日便心肖煩滿爲毒已入兼有痰實亦宜吐之
又温病五日少陰受病毒氣入腹其病口熱舌乾引飲故可下之而愈也
又温病六日厥陰受病毒氣入腸胃其病煩滿其陰縮故可下而愈
又温病七日法當危此是三陰三陽病終故也今七日病不除者欲作再經病也再經病者經絡重受於病
又温病八日以上不解者或是諸經絡重受於病或經發汗吐下之後毒氣未盡所以病證不罷也
又温病九日以上病不除者或初一經受病則不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於三陰所以致停滯累日病證不罷皆由毒氣未盡表裏受邪經絡損傷腑藏俱病也並出第十卷中

辟温方二十首

廣濟療疫氣令人不染温病及傷寒歲旦嚩癘酒方

大黄十五銖 白朮十銖 桔梗十五銖 蜀椒十五銖汗
烏頭三炮銖 莪蒁十銖 桂心十五銖

右七味㕮咀絳囊盛以十二月晦日日中懸沉井中令至正月朔日平曉出藥置酒中屠蘇之東向戶中飲之屠蘇之飲藥酒三朝還置井中若能仍歲飲可代代無病當家內外井皆悉著藥辟温氣也忌猪肉生葱桃李雀肉等經心録同

千金延年有防風十二銖

又辟温氣太一流金散方

雄黃三兩研 礬石一兩半燒令汁盡 鬼箭羽一兩 雌黃二兩研入 羖羊角燒二兩炙屑

右五味擣篩爲散三角絳囊盛一兩帶心前并門戶上若逢大疫之年月初日青布裹一刀圭中庭燒之温病人亦燒熏之肘後千金并翼延年集驗同並出第一卷中

范汪療天氣不和疾疫流行豫備一物柏枝散方

南向社中柏東南枝暴之令乾擣散酒服方寸匕神良肘後千金同出第十二卷中

刪繁辟温病粉身散常用方

芎藭四兩 藁本四兩 遠志四分 白朮四分 米粉一斗入研

大黃十五銖 桂心七銖 各十五銖 白朮十銖 桔梗十銖 菝葜六銖 蜀椒十銖 汗 防風十銖 房頭各陸銖炮 右八味切絳囊盛以十二月朔日午中懸沉井中令至泥 正月朔旦平曉出藥至酒中煎數沸于東向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒待三朝還澤置井中能仍歲飲可世無病當家內外有井皆悉著藥辟温氣也

又太乙流金散辟温氣方

雄黃三兩研 雌黃二兩研入 羚羊角燒二兩炙屑 礬石一兩半 鬼箭羽一兩半

右五味治下篩三角絳袋盛一兩帶心前并掛門戶上若逢大疫之年以月旦青布裹一刀圭中庭燒之温病人亦燒熏之肘後千金并翼延年集驗同並出第一卷中

又雄黃散辟温氣方

雄黃五兩　朱砂一作赤末　菖蒲　鬼臼各二兩

右四味擣篩末以塗五心額上鼻入中及耳門又斷温疫轉相染著至滅門延及外人無收視者方

赤小豆　鬼箭羽　雄黃各三兩

右四味擣末以蜜和丸如小豆大服一丸可與病人同床范汪療天氣不和疾疫流行豫備一物柏枝散方南向柱中柏東南枝長三尺令乾擣散酒服方寸匕神良肘後千金同出第十二卷中

又辟温粉身散常用方

川芎　蒼朮　零陵香各等分

右五味擣篩爲散和米粉粉身若欲多時加藥增粉用之出第十卷中

千金辟温虎頭殺鬼丸方

虎頭骨五兩炙　朱砂一兩半研　鬼臼一兩　雄黃一兩半研　皂莢一兩炙　雌黃一兩研　蕪荑一兩

右七味擣篩以臘蜜和如彈丸大絳囊盛繫臂男左女右家中置屋四角月朔望夜半中庭燒一丸忌生血物

肘後同

又治癰氣竹茹湯方

青竹茹二升

右一味以水四升煮取三升分三服

又辟温病粉身散方

芎藭　白芷

右三味等分搗下篩內米粉中以粉塗身延年同

又斷温疫朱蜜丸方

白蜜和上等朱砂粉一兩常以太歲日平旦大小勿食向東方立八吞三七丸如麻子大勿令齒近之并

吞赤小豆七枚投井泉水中終身勿忘此法

又治温病不相染方

正旦吞麻子赤小豆各二七枚又以二七枚投井中肘後延年同

又方

新布盛大豆一升內井中一宿出服七枚肘後用小豆

又方

切松葉如粟米酒服方寸匕日三服辟五年温

又方

常以七月七日合家舍赤小豆向日吞二七枚

子　致上空一字

又方

常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆七枚

又方

神仙教人立春後有庚子日溫蕪菁葅汁合家大小並服不限多少

又療溫氣蒜豉湯方

蒜五十子并皮研之豉心一升

右二味以三歲小兒小便二升合煮五六沸頓服出第九卷中

千金翼老君神明白散方

麤　忌猪肉生菜米桃李雀肉等　密

白朮　一兩　桔梗　一兩

烏頭　四兩去黑皮　細辛　一兩　附子　炮　白朮　各一兩

右五味擣篩絳囊盛帶之所居閭里皆無病若有得疫癘者溫酒服一方寸七覆取汗得吐則差若經三四日者以三方寸七內五升水中煮令大沸分三服

又度瘴散方

麻黃　去節　升麻　細辛　防巳　防風　烏頭　炮　蜀椒　出汗去目　桔梗　各二分　乾薑　桂心

右十二味擣篩爲末蜜封貯之山中所在有瘴氣之處

忌猪肉生葱

忌猪肉生菜桃李雀肉等

旦空腹服一錢七覆取汗病重稍加之並出第十卷中

古今録驗許季山所撰于敷散主辟温疫疾惡令不相染

菩氣方肘後作敷于抱朴子作敷于

附子一枚炮　細辛一分　乾薑一分　麻子一分研

栢實一分

右五味擣篩爲散正旦舉家以井華水各服方寸七服

藥一日十年不病二日二十年不病三日三十年不病

受師法但應三日服歲多病三日一服之肘後胡洽延年范注刪繁

同出第二卷中

又殺鬼丸去惡毒方

忌生血物羊肉餳

雄黄五兩研　朱砂五兩研　鬼臼五兩　鬼督郵五兩

雌黄五兩研　馬牀鈴五兩　皂莢五兩炙　虎骨五兩炙

阿魏五兩　甲香一兩　羚羊角一枚屑　桃白皮五兩

白膠香一兩　菖蒲五兩　羖羊角一枚屑　臘蜜八斤煉

石硫黄五兩研

右十七味擣篩十六味臘蜜和之丸如杏子將往辟温

處燒之殺鬼去惡毒氣若大疫家可燒并帶行與朗洽方七味不同出第三卷中

延年秘録辟温方

正旦取東行桑根大如指長七寸以丹塗之懸著門

戶上又令人帶之出第十卷中

辟溫不相染方二首

病源此病皆因歲時不和溫涼失節人感乖候之氣而生病則病氣轉相染易乃至滅門延及外人故須預服藥及爲法術以防之出第十卷中

千金辭溫疫主溫病轉相染著乃至滅門延及外人無收留者赤小豆丸方

赤小豆二兩 鬼白二兩 雄黃二兩研入 鬼箭二兩 丹砂二兩研入

右五味末之以蜜和如小豆大服一丸可與病人同床

傳尸也出第九卷中

延年主辟溫疫疹惡氣令不相染易鼓湯方

豆豉一升 伏龍肝三兩研入 小兒小便三升

右三味用小便煎取一升五合去滓平旦服之令人不著瘴疫天行有瘴之處宜朝朝服出第十卷中

溫病噦方四首

病源伏熱在胃令人胃滿胃滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃中虛冷亦令致噦也並出第十卷中

小品茅根湯療溫病有熱飲水暴冷噦者方

茅根 葛根各切半升

右二味以水四升煮取二升稍温飲之碗止則停
又療温病熱未除重被暴寒寒毒入胃蘊結不散變碗者方
單煮梓皮稍稍飲之佳温病積飲冷冷結胃中熱入腎中變壯熱大碗者服梓皮温碗得止也夫腎中有熱者病差後足心皮喜剥脱去頭髮禿落是其證也
又茅根湯皮湯療春夏天行傷寒温病干胃冷變碗方
白茅根切一升　橘皮三兩　桂心二兩　葛根二兩
右四味切以水六升煮取三升分温服三合數連服之盡復合碗止乃停耳微有熱滅桂一兩文仲古今録驗同出第六卷中

古今録驗療温病有熱飲水暴冷碗枇杷葉飲子方
枇杷葉拭去毛　茅根各半升
右二味切以水四升煮取二升稍稍飲之碗止則停出第三卷中
温病渴方二首
病源熱氣入腎藏腎藏惡燥熱氣盛則腎燥腎燥則渴引飲也出第十卷中
深師療温毒病及吐下後有餘熱渴芍藥湯神方
芍藥五分　黄連四分　甘草二分炙　黄芩二兩　桂心二兩　枯樸二分

忌猪肉冷水海藻菘菜生葱等

右六味切以水五升煮取三升分三服一日令盡出第十四

古今録驗知母解肌湯療温熱病頭痛骨肉煩疼口燥心悶者或是夏月天行毒外寒内熱者或已下之餘熱未盡者或熱病自得病有虚熱煩渴者方

麻黄二兩去節　知母三兩　葛根三兩　石膏三兩碎裹　甘草二兩炙

右五味切以水七升煮取三升分爲三服若已下及自得下虚熱未歇者除麻黄加知母葛根病熱未除因嘉泄者可除麻黄加白薇人參各二兩則止小品同出第二卷中

忌海藻菘菜

温病發斑方七首

病源夫人冬月觸冒寒毒者至春始發病病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又冬月天時温暖人感乖候之氣未即發病至春又被積寒所折毒氣不得泄至夏遇熱其春寒解冬温毒始發出於肌膚斑爛隱瘰如錦文也出第十卷中

肘後療温毒發斑大疫難救黑膏方

生地黄半斤切打碎　好豉一升

右二味以猪膏二斤合露之煎五六沸令三分減一紋去滓末雄黄麝香如大豆者内中攪和盡服之毒便從

皮中出則愈忌蕪荑出第二卷中

小品葛根橘皮湯療冬温未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬温毒始發出肌中斑爛隱瘧如錦文壯熱而煞心悶嘔但吐清汁宜服此湯則靜方大効

葛根二兩　橘皮二兩　杏人二兩去尖皮及兩仁　麻黄二兩去節

知母二兩　黄芩二兩　甘草二兩炙

右七味切以水七升煮取三升分温三服嘔悶吐當先定便且消息古今録驗同大効出第六卷中

刪繁華佗療肺脹藏熱暴氣斑黠香豉湯方

香豉一升綿裹蒸　葱鬚切四兩　石膏八兩碎裹　梔子人三兩擘

生薑八兩　大青二兩　升麻三兩　苦消三兩

右八味切以水六升煮七味取二升五合去滓然後下芒消分三服出第十卷中

備急療温毒發斑赤斑者五死一生黑斑者十死一生大疫難救黑奴丸方

麻黄三兩去節　大黄二兩　苦消一兩別下　黄芩一兩

釜底墨一兩研入　屋梁上塵二兩研入　竈尾墨一兩研入

右七味擣末用蜜和如彈子大新汲水五合研一丸服之若渴但與水須臾當寒寒乃便汗則解日移五丈不覺更服一丸此療六日曾中常大熱口噤名壞病醫所

忌猪肉冷水海藻菜等

不療服此丸多差胡沿小品同一名水解丸又一方加小麥黑豉二兩名爲麥奴丸范汪方同古今録驗黄連橘皮湯療冬温未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬温毒始發出肌中斑爛隱瘾如錦文而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡已自得下痢宜服此方

黄連四兩去毛　橘皮二兩　杏人二兩去皮尖兩人　枳實一兩炙

麻黄二兩去節　葛根二兩　厚朴一兩炙　甘草一兩炙

右八味切以水八升煮取三升分三服令盡旦消息下當先止

又漏蘆橘皮湯療冬温未即病至春被積寒所折不得發

忌心海藻菜等好

至夏熱其春寒解冬温毒始發出肌中斑爛隱瘾如錦文而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡方

漏蘆　橘皮　杏人去皮尖及兩人　黄芩各二兩　甘遂　麻黄去節

右六味切以水九升煮取三升分四服得下爲佳下後餘外證未除更服葛根橘皮湯方在前小品方一方有實白薇升麻大黄甘草爲十二味出第三卷中

又發斑瘡方

黄連切三兩去毛

右一味以水二升煮取八合頓服之忌猪肉冷水

温病勞復方四首

病源温病勞復謂病新差津液未復血氣尚虚因勞動早更生於熱熱氣還入經絡復成病也

又凡得温毒病新差脾胃尚虚穀氣未復若食犬猪羊肉并腸血及肥魚炙脂膩必大下痢下痢則不可復救又食餅餌炙鮹棗栗諸生果難消物則不能消化停積在於腸胃便脹滿結實大小便不通因更發熱復成病也非但雜食梳頭洗浴諸勞事等皆須慎之（如佛李生葱生菜海藻菜雀肉等供在所忌並出第十卷中）

千金論曰凡熱病新差及大病之後食猪肉及腸血肥魚炙臘必大下痢醫所不能療也必至於死若食餅餌粢黍飴脯炙鮹棗栗諸果及堅實難消之物胃氣尚虚弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃虚冷大利難禁不下之必死下之復危皆難救也熱病及大病之後多坐此死不可不慎也病新差後但得食糜粥寧可少食令饑慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁雜兔鹿肉不可食猪狗肉也新差後當靜卧慎勿早起勿令人梳頭澡洗非但體勞亦不可多語言用心使意勞凡此皆令人勞復有人得病已差而未健詣華專視脈曰雖差尚虚未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可御內則

死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死及熱病房室名陰陽易之病皆難療多死古今録驗集驗同

又療重病新差早起勞及飲食多致復欲死方

燒鼈甲末服方寸七忌菹菜時後集驗文仲備急同出第十卷中

深師療温病差愈食復病麻黄散方

麻黄十分去節　大黄十五分炙　附子一分炮　厚朴二分炙
苦參六分　石膏六分碎綿裹　烏頭六分炮

右七味擣篩以酒若米汁和服方寸七日三夜二服忌猪肉冷水

古今録驗療熱病復麻子湯吳正服効方

麻子一升　豉一升綿裹　壯鼠屎一十二枚

右三味以水五升煮取二升半分温三服立愈試之有神驗肘後同

又大黄丸方

大黄一兩蒸之　巴豆五十枚去心皮熬　消石三分熬無者以芒消代之
桂心二分　乾薑二分炮

右五味擣篩四味別擣巴豆令如泥合和以蜜更擣二千杵丸如梧子一丸湯服之但熱在膈上當吐在膈下

當利豫作粥如服他吐下丸法服藥兩食頃不吐下以熱飲動之若不得吐下可更服一丸半能藥壯人可二丸此藥優於他下藥丸故宜大小下多冷粥解之若有癖綿挺如指蜜和一丸塗挺頭旦內瘡中鴨出之不差更作溫病不得大便服之得下佳宿食不消亦服之飛尸遁尸漿服半丸日一應須臾止心腹脹滿痛服一丸瘧者依發日先宿勿食清晨服一丸壯人服二丸得吐下忍飢過發時乃食婦人產後血結冲奔走起上下或絕產無子或月經不調面目青黃服半丸小兒淋瀝寒熱臚脹大腹不欲食食不生肌三四歲者如麻子服

一九日一六七歲兒服二丸比三十日心腹諸病差兒小半之愈大良忌野猪肉蘆笋生葱出第三卷中

諸黃方一十三首

病源黃病者一身盡疼發熱面色洞黃七八日後結熱在裏有血當下去之如狍肝狀甚人小腹滿急若其人眼睛瀝疼鼻準疼兩脾及頂強腰背急則是患黃大便澀但令得小便快則不慮死多則心腹脹不好此由寒濕在表則熱畜於脾胃脇與宿穀相搏鬱蒸不得消則大小便不通故肆體面目皆變黃色凡黃候其寸口近掌無脈口鼻氣冷並不可療之必死出第十二卷中

仲景傷寒論諸黃猪膏髮煎主之方

猪膏八兩　亂髮大如雞子一枚

右二味內髮膏中煎之髮消盡研絞去膏細滓分二服

病從小便去也肘後備急文仲千金古今録驗深師范汪同云大醫校尉史脫家婢再病胃中乾糞下便差神驗出第十四卷中

刪繁療天行毒熱通貫藏腑流註鼓骨髓之間或爲黃疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等疾喘息須臾而絕瓜蒂散方

瓜蒂二七枚　赤小豆三七枚

右二味擣篩爲散取如大豆粒吹於兩鼻之中甚良不差間日復服之千金范汪集驗同

又方

瓜蒂二七枚

右一味以水一升煮取五合作一服之

又方

鹽一升

右一味紙裹漬濕燒之取遍赤內三升水中攪令調手巾漉度爲一服已前二方服訖並吐出黃汁

崔氏療黃貧家無藥者可依此方

取柳枝三大升以水一斗煮取濃汁搦半升一服令盡

又療黃兼主心腹方

蔓菁子 一大合搗令淳

右一味擣碎熟研以水一升更和研濾取汁可得一大盞頓服之少頃自當轉利或亦自吐腹中便寬亦或得汗便愈備急文仲深師同並出第一卷中

延年秘録療黃瓜蒂湯方

瓜蒂 一兩 赤小豆 四十九枚 丁香 二七枚

右三味擣末以水一升煮取四合澄清分爲兩度滴入兩鼻中出第十卷中

救急療三十六種黃方

蛇床子一顆并殼燒作灰研酢一合又温之摠和頓服身體眼睛極黃者不過三顆鼻中蟲出神効

又療諸黃闇黃眼闇及大角赤黑黃先擲手足內黃急心悶五色黃瓜蒂散方

疸黃眼赤黃腎黃小便不通氣急心悶五色黃瓜蒂散方

丁香 瓜蒂 赤小豆 各十枚

右三味細擣篩取煖水一雞子許和服大神驗並出第十七卷

中藏經同

必効療一切黃蔣九處得其父遠使得黃服此極効茵陳湯及丸方

茵陳 四兩 大黃 三兩 黃芩 三兩 梔子 三兩 擘

右四味切以水五升煮取三升分爲三服空肚服之不然搗篩蜜和爲丸飲服二十丸稍稍加至二十五丸量病與之重者作湯勝服九丸日一服忌羊肉酒麵熱物等以差爲限小便黃色及身黃者並主之

又療諸黃眼已黃亦差瓜蒂散方

丁香一分 赤小豆一分 瓜蒂一分 右三味擣末溫水食前頓服使盡則當利并吐黃水不差更服並出第一卷中

千金療黃疸大黃丸方

大黃二兩 葶藶三兩

右二味擣篩爲末蜜和爲丸如梧子大未食服十九日三服病差便止

又大黃丸方

大黃二兩 黃連三兩 黃芩 黃蘗各一兩

瘕衣五合

右五味擣篩爲末蜜和丸如梧子大食前服三丸日三服不知可至五丸忌猪肉冷水並出第十卷中

急黃方六首

病源脾胃有熱穀氣鬱蒸因爲熱毒所加故卒然發黃心滿氣喘命在頃刻故云急黃也有得病即身體面目發黃

者有初不知是黃死後乃身面黃者其候得病但發熱心戰者是急黃也並出第十二卷中

廣濟療急黃身如金色瓜蒂散方

赤小豆二七枚　豉米二七枚　瓜蒂二七枚

麝香　薰陸香等分別研　青布二方寸燒爲灰

右七味擣篩爲散飲服一錢匕則下黃水其黃則定忌生冷熱麵粘食陳臭等一方止三味出第一卷中

必效療急黃疸內等黃大黃湯方

大黃三兩切　芒消二兩

右二味以水二升生漬大黃一宿平旦絞汁一升半內芒消攪服須臾當快利差出第一卷中

延年秘錄療急黃心下堅硬渴欲得水出哭氣息喘麤眼黃但有一候相當即須宜服此瓜蒂散吐則差方

瓜蒂二小合熬　赤小豆二合

右二味擣篩爲散年大人煖漿水五小合和散一服滿一方寸匕一炊久當吐不吐更服五分匕水亦減之若輕病直吹鼻中兩黑豆粒大亦得當鼻中黃水出即歇并宜灸心厭骨下一寸名巨闕灸五七壯以來初小作壯在後漸大仍不得大如梧子

吐訖及灸了計即渴仍服麥門冬飲子方

麥門冬去心四兩　栝樓三兩　竹葉一升　茯苓四兩
升麻二兩　生薑根一升　甘草一兩炙

右七味切以水七升煎取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行八九里久服此飲渴卽止出第十卷中

○急肉麪果子生冷酢物海藻菘菜等

金療急黃熱氣骨蒸兩目赤脈地黃汁湯方

生地黃汁八合大黃六分末　芒消一兩

右三味合和一服五合日二服以利爲度

○急黃

近效療急黃方

取蔓菁子油一盞頓服之臨時無油則以蔓菁子擣取汁水和之喫亦得候顏色黃或牆神急則是此病

○急黃

通按精神急疑是神忘

章絢事試用之有效

黃疸方十三首

病源黃疸之病此由酒食過度藏腑不和水穀相并積於脾胃復爲風濕所搏瘀結不散熱氣鬱蒸故食已如饑令身體面目爪甲及小便盡黃而欲安卧若身脉多赤多黑多青皆見者必寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃此黃疸也疸而渴者其病難療疸而不渴者其病可療發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱出第十二卷中

仲景傷寒論黃瘅麻黃醇酒湯主之方

麻黃一大把去節綿裹

忌大酢桃李雀肉生葱

右一味美清酒五升煮取二升半去滓頓服盡古今方云傷寒熱出表發黃疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良小品古今錄驗張文仲經心錄同

又黃疸茵蔯蒿五苓散主之方

茵蔯蒿末十分　五苓散五分

右二味和先食白飲和方寸匕服之日三深師范汪同

又五苓散利小便治黃疸方

猪苓三分去皮　白朮三分　茯苓三分　澤瀉五分　桂心二分

右五味擣篩和合白飲和服一方寸匕日三多飲暖水以助藥勢汗出便愈千金深師范汪同並出卷十四卷中

忌大酢生葱桃李雀肉等

肘後療黃疸方

燒亂髮服一方寸匕日三秘驗酒飲並得備急文仲同出第一卷中

范汪療黃疸散方

取瓠子白瓤及子熬令黃擣爲末服半錢匕日一服十日愈用瓠子數數有驗療黃疸百藥不差者方出第三十四卷中

集驗療黃疸百藥不差者方

驢頭一枚煮熟以薑韲噉之并隨多少飲汁備急崔氏張文仲古今錄驗同出第二卷中千金

千金療黃疸方

取生小麥苗搗絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈無小麥苗穬麥苗亦得范汪云用小麥勝也備急文仲集驗並同出第十卷中

千金翼療黃疸目黃不除瓜丁散方

瓜丁細末如大豆許內鼻中令病人深吸取入鼻中黃汁出

又黃蒸湯方 通按黃蒸未詳

黃蒸一升 猪屎一升

右三味以水五升漬一宿煮取三升絞去滓頓服一升

覆取汗必效 同出第十八卷中

崔氏療黃疸年六十以上方

茅根一把細切 猪肉一斤

右二味合作羹盡一服愈當灸臍上下兩邊各一寸半一百壯手魚際白肉側各一灸隨年壯 備急范汪同

又療黃疸方

苦胡蘆斸如大棗許

右一物以童子小便二合浸之三兩食頃取兩酸棗許汁分內兩鼻孔中餘節候與上方同比來常用乃勝瓜蒂散

近效療黃疸瓜蒂散方

瓜蒂二七枚 赤小豆七枚 生秫米二七枚 丁香二七枚

右四味擣篩重者取如大豆二枚各著一枚鼻孔中痛縮鼻須臾鼻中瀝清黃水或從口中出升餘則愈病輕者如一小豆則可一與不盡間日復頓用効李暠用之立驗俗人或使人以竹筒極力吹鼻中無不死者愼之又療男子女人黃疸病醫療不愈身目悉黃食飲不消胃中脹熱生黃衣在胃中有乾屎使病爾方

以成煎猪脂一小升温熱頓盡服之日三燥屎下去乃愈 備急崔氏同

黃疸遍身方一十一首

廣濟療黃疸遍身面悉黃小便如濃梔子汁茵陳丸方

茵陳四兩 黃芩三兩 枳實二兩炙 大黃三兩

右四味擣篩蜜丸空腹以米飲服如梧子二十丸日二服漸加至二十五丸微利爲度忌熱麪蒜蕎麥粘食陳臭物一方有升麻三兩出第一卷中

肘後療黃疸者一身面目悉黃如橘柚暴得熱外以冷迫之熱因留胃中生黃衣熱重上所致方

猪脂一升

右一味成煎者温令熱盡服之日三燥屎當下下則稍

愈便止、與前近効方同、備急崔氏同出第三卷中、

小品療黃疸身目皆黃皮膚麴塵出三物茵陳蒿湯方

茵陳蒿一把　梔子二十四枚　石膏一斤完者

右三味、以水八升煮取二升半去滓、以猛火燒石膏令正赤、投湯中、沸定取清汁適寒溫服一升、自覆令汗出周身遍、以溫粉粉之則愈、若不汗更服一升、汗出乃愈也、深師古今録驗千金翼同出第四卷中、

集驗療黃疸身體面目皆黃大黃散方

大黃四兩　黃連四兩　黃芩四兩

右三味擣篩爲散、先食服方寸匕、日三服、亦可爲丸服、

備急文仲千金同出第二卷中、

胴繁療黃疸者通身並黃茵陳湯方

茵陳四兩　柴胡四兩　升麻三兩　龍膽草二兩

黃芩　大黃各三兩

右六味切、以水九升煮取三升、分三服、若身體羸去大黃加梔子人五六丙生地黃切一升、古今録驗千金同出第十卷中、

千金翼論曰凡遇天行熱病多必內瘀者黃但用瓜丁散內鼻中令黃汁出乃愈、即於後不復恐病黃矣、常須用心警候病人四肢身面微似有黃氣則須用瓜丁散不得令散漫失候必大危矣、特忌酒麵犯者死、

又凡人無故忽然振寒便發黃皮膚黃麴塵出小便赤少大便時閉氣力無異食飲不妨已服諸湯餘熱不除久黃者苦參散方

苦參一兩　黃連一兩　葶藶子熬　瓜蒂

黃芩　黃蘗　大黃各一兩

右七味擣爲散飲服方寸匕當大吐者日一服不吐日二亦得下服藥五日知可消息不知更服忌猪肉冷水

古今錄驗千金小品同出第十八卷中

崔氏療黃疸身體面目盡黃茵蔯湯太醫校尉史脫方

茵蔯蒿三兩　黃連二兩　黃芩三兩　梔子十四枚擘

大黃一兩　甘草一兩炙

右七味切以水一斗煮取三升分三服千金同出第一卷中

延年秘錄梔子湯療遍身黃如橘心肋滿急方

梔子人四兩　黃芩三兩　大黃三兩

龍膽草三兩　柴胡四兩　升麻三兩

右八味切以水九升煮取二升八合去滓分溫三服相去四五里進一服出第十卷之

必効黃疸身眼皆如金色但諸黃皆主之方

取東引桃根細切如筯若叙股以下者一握取時勿令見風及婦人并雞犬等見之以水一大升煎取溺

一小升適寒溫空腹頓服服後三五日其黃離離如薄雲散唯眼最後差百日方平復身黃散後可時時飲一盞清酒則眼中易散不則即差忌食麵猪魚等肉此方是張之才家秘方其姪珍藏說密用出第一卷中近効療發黃身面眼悉黃如金色小便濃如煮黃蘗汁者泉醫不能療良驗茵陳湯方

茵陳四兩　黃芩二兩　梔子三兩　升麻三兩
大黃三兩　龍膽草二兩　枳實二兩炙　柴胡四兩

右八味切以水八升煮取二升七合分溫三服若身絶贏加生地黃一升梔子加至七兩去大黃如氣力不羸

依前著大黃取驗忌如法不差更作以差爲限不過三四劑差隔三五日一劑經心録同李尚處得此方神良

瘧黃方三首

病源陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛而不發熱名爲瘧黃也出第十二卷中

廣濟療瘧黃身面眼俱黃小便如赤汁色茵陳散方

茵陳四兩　白鮮皮三分　梔子四分　芍藥三分
枳實三分炙　黃連三分　柴胡三分
大青三分　大黃十分　青木香三分　黃芩三分
紫雪八分　土瓜根三分

右十四味擣篩爲散煮茅根飲待冷平旦空腹以茅根飲服五錢匕一服少間當一兩行微利利後煮稀葱豉粥食之利多以意漸減常取微溲利通一兩行爲度差止忌猪肉冷水魚蒜粘膩及諸熱食出第一卷中

必効療癰黃眼睛黃汗染衣漸嚼黃方

好黃蒸二大升

右一味每夜以水二大升浸一宿煖令熱勿令沸銅器中平旦絞取汁半升飲之餘汁須臾則飲冬日微煖服夏冷飲每夜則浸依前服之亦得每夜小便中浸白帛片取色淨爲驗兩方並極効忌麵羊肉猪魚

又療癰黃汗染衣漸嚼黃者方

取蔓菁子擣細末平旦以井花水和一大匙服之日再漸加至兩匙以知爲度每夜小便裹浸少許帛各書記日色漸退白則差不過服五升以來必差李潤州傳極効備急肘後張文仲深師同出第一卷中

黃疸小便不利及腹滿喘方二首

仲景傷寒論黃家腹滿小便不利而赤身洗黃者表和裹實也宜下之大黃蒸四分黃蘗四兩梔子十五枚擘消石四兩

右四味切以水六升煮三物得二升半去滓內消石更

洗之　出　著

煎取一升先食頓服盡小品千金翼深師范汪並同
又黃疸小便色不變欲自利腹滿而喘者不可除其熱熱
除必嘔嘔者小半夏湯主之方
半夏五兩炮　生薑八兩切
右二味以水六升煮取一升半去滓分温三服忌羊肉
餅范汪同並第十四卷中

黃汗方三首

病源黃汗之爲病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗
染衣色正黃如蘗汁脉自沉此由脾胃有熱汗出而入
水中若浴水入汗孔得之出第十二卷中

著　苦　著　咀嚼

仲景傷寒論師曰黃汗爲病身體腫發熱汗出而渴狀
如風水汗沾衣色正黃如蘗汁脉自沉也問曰從何得之師
曰以汗出水入汗孔水從外入而得之宜黃耆芍藥桂心
酒湯主之方
黃耆五兩　芍藥三兩　桂心三兩
右三味切以苦酒一升水七升和煮取三升去滓温服
一升正當心煩也至六七日稍稍自除其心煩不止者
以苦酒咀故也咀一作阻一方用美清醯代酒忌生葱備急張文仲千金古今録驗深師范汪經心録同
又凡黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已則汗

出又身常夜卧盜汗出者此勞氣也若汗出即發熱者久
久身必甲錯也發熱不止者必生惡瘡也若身重汗出已
輕輕者久久必身腘胴則身中痛又從腰以上必汗出下
無汗腰髖弛痛如蟲在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁
小便不利者名曰黄汗桂枝湯加黄耆五兩主之方

桂心三兩　芍藥三兩　甘草三兩　生薑三兩
大棗十二枚擘　黄耆五兩去皮

右六味切以水八升煮取三升去滓溫服一升覆
取微汗須臾間不汗者食稀熱粥一升餘以助湯力若
不汗者更服湯也忌海藻菘菜生葱古今録驗泡汪同
出第十四卷中

療黄疸身腫發熱汗出而渴狀如風水汗出著衣皆黄黄
汗其藍湯方

吳藍六分　芍藥　麥門冬去心　桑白皮
漢防已　白鮮皮　山梔子各六分

右七味各細切以水二升煎取八合去滓空腹分二服
未効再合服此方未詳所出

女勞疸方四首

病源女勞疸之狀身目皆黄發熱惡寒少腹滿急小便難
因大勞大熱而房室房室畢入水所致也出第十二卷中
仲景傷寒論黄家日晡發熱而反惡寒此爲女勞得之膀

胱急小腹滿身體盡黃額上及黑足下熱因作黑瘴大便必黑腹臚脹滿如水狀大便黑溏者此女勞之病非水也腹滿者難療消石礬石散主之方

消石熬黃　礬石燒令汁盡

右二味等分擣絹篩以大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取汗病隨大小便去小便正黃大便正黑也大麥則須是無皮麥者千金方云消石二分熬令燥礬石一分蒸令燥故注之肘後小品崔氏文仲千金范汪深師並同出第十四卷中

千金翼療黃疸之爲病日晡所發熱惡寒小腹急體黃額黑大便黑溏足下熱此爲女勞也腹滿者難療方

滑石五兩研　石膏五兩研

右二味爲散以大麥粥汁服方寸匕日三小便極利則差小品千金備急文仲並同出第十八卷中

近效女勞疸黃家日晡發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急小腹滿身體盡黃額上及黑足下熱因作黑疸其大便必黑腹臚脹滿如水狀大便黑溏此女勞之病非水也療與黑疸同救疸食則眩心忪怫鬱不安久久發黃爲穀疸並以前茵蔯湯主之方在遍身黃部中

必效女勞之黃氣短聲沉者宜服此方

取婦女月經布和血衣燒作灰以酒空腹服方寸七

日再服不過三日必差

黑疸方三首

病源黑疸之狀苦小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是也夫黃疸酒疸女勞疸久久變成黑疸出第十二卷中

肘後療黃疸變成黑疸者多死急治之方

取土瓜根汁服一小升平旦服至食時病從小便去則愈不忌先須量病人氣力不得多服力衰則起不得千金并翼文仲集驗崔氏刪繁泡汙並同出第一卷中

深師療黑疸身體及大便正黑赤小豆茯苓湯方

赤小豆三十枚 茯苓六銖 瓜蒂四銖 雄黃三銖

甘草半兩炙 女萎四銖

右六味切以水三升煮小豆茯苓取八合汁擣後四藥爲散取前汁調半錢匕適寒溫服之須臾當吐吐則愈一方云療久黃疸忌大醋海藻菘菜千金方名赤茯苓散千金翼同出第二十卷中

千金翼茵陳丸主黑疸身體閤黑小便澀體重方

茯苓四分 茵陳一兩 枳實五分炙 白朮五分土炒黃 赤芍藥去

半夏三兩洗 甘遂一分 杏人三分去尖皮 蜀椒二升汗

當歸二分 葶藶子四分蒸 大黃三分煞勿令焦 乾薑四分

右十二味擣篩蜜和丸如梧子空肚飲服三九日三服

忌羊肉餳酢桃李雀肉等出第十八卷中

酒疸方七首

病源夫虛勞之人若飲酒多進穀少者則胃內生熱因大醉當風入水則身目發黃心中懊憹足脛滿小便黃面發赤斑斑如蚤咬狀亦斑若下之久久變爲黑疸目青面黑心中如噉蒜薤狀大便正黑皮膚抓之不仁其脈浮弱故知之酒疸心中熱欲嘔者當吐之卽愈小便不利其候當心中熱足下熱是其證明也若腹滿欲吐鼻躁其脈浮者先吐之沉弦者先下之出第十二卷中

仲景傷寒論酒癉者心中懊憹熱痛梔子枳實豉大黃

湯主之方

梔子七枚擘　枳實五枚破水漬炙　香豉一升綿裹　大黃一兩

右四味切以水六升煮取二升去滓溫服七合日三服

肘後療酒疸者心中懊痛足脛滿小便黃飲酒面發赤斑黃黑由大醉當風入水所致黃者散方

黃耆二兩　木蘭皮一兩

右二味爲散酒服方寸七日三備急文仲同

深師酒疸艾湯方

生艾葉一把麻黃二兩去節　大黃六分　大豆一升

無生用乾者半把

右四味切清酒五升煮取二升分爲三服
千金茵陳湯主黃疸酒疸酒癖身體面目盡黃方太醫校
尉史脫處

茵陳三兩　大黃二兩一方一兩　梔子二七枚擘　黃芩三兩一方用一兩
人參半兩一方用一兩　黃連三兩一方用一兩　甘草一兩炙

右七味切以水一斗煮取三升分爲三服忌猪肉冷水
海藻菘菜文仲范汪同
又夫人病疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐酒疸心中熱
欲嘔吐之卽愈方
出千金翼苦參散吐良在上通身黃部中七味者是

也
又肉疸飲少小便多白如泔色得之從酒寒水石散方
寒水石五分　白石脂五分　栝樓五分　菟絲子三分酒漬
知母三分　桂心三分

右六味擣篩麥粥服五分匕日三服五日知忌生葱古今
錄驗深師等並同
古今錄驗療酒癖及飲黃疸散方
芫花　椒目各等分

右二味擣下篩爲散平旦服一錢匕老少半服之藥攻
兩脅則下便愈開一日復服使小減如前又與之使盡

根源深師同出第二十七卷中

穀疸方三首

病源穀疸之狀食畢頭眩心忪懵不安而發黃由失饑大食胃氣衝熏所致陽明病脉遲食難用飽飽則發煩頭眩者必小便難此欲爲穀疸雖下之其腹必滿以其脉遲故也出第十二卷中

范汪療穀疸茵陳湯方

茵陳四兩切以水一斗煮取六升以汁煎大黃二兩梔子七枚得二升分爲三服黃從小便去病出立愈肘後同出第十四卷中

集驗療勞疸穀疸九方

苦參三兩 龍膽草一兩

右二味下篩牛膽汁和丸先食以麥粥飲服如梧子大五丸日三不知稍增千金同出第二卷中

刪繁療勞疸穀疸苦參丸方勞疸者因勞爲名也穀疸者因食而勞故曰穀疸

苦參三兩 龍膽草二兩 梔子人三七枚

右三味擣篩爲散若病甚取猪膽和爲丸如梧子大一服五丸日三四服以飲汁下之

許仁則療諸黃方七首

許仁則療急黃病此病始得與前天行病不多異五六日

但加身體黃甚者淚音夷竟也下同液淚汗嚏小便如藥色眼白睛正黃其更重狀與天行病候最重者無別如至此困自須依前救天行最重半夏等分十味湯救之若未至是者宜依後法急黃狀始得大類天行病經三兩日宜合麻黃等五味湯服之發汗以洩黃勢方

麻黃三兩去節　乾葛五兩　石膏八兩研裹　生薑六兩
茵陳二兩

右藥切以水八升煮取二升七合去滓分溫三服服相去十里久服訖當欲汗則覆被微取汗以散之

又依前麻黃等五味湯服之取汗汗出後未歇經三五日

又合梔子等五味湯以取利方

梔子二十枚擘　柴胡三兩　黃芩三兩　茵陳三兩
芒消六兩

右藥切以水八升煮四味取二升六合去滓內芒消攪令消分溫三服如人行十里久更服之效

又依前梔子等五味湯服之取利利後病勢不歇經六七日又合泰芫牛乳二味湯服之方

泰芫六兩　牛乳二升

右藥切泰芫以牛乳煮之可三分減一去滓帶煖頓服令盡極驗文仲必劫同西域法也

又依前泰艽等二味湯藥服後不覺病退漸加困篤勢如前天行最重狀則不可更服諸冷物冷物在心唯是痞速宜同前天行用半夏等十味湯以救之亦可合瓜蒂等三味散吹鼻孔中并與之服方

瓜蒂七枚　丁香七枚　赤小豆七枚

右藥擣篩末取如大豆分吹兩鼻孔中須臾當出黃水正如煮藥汁及出黃蟲亦可以新汲水和一方寸匕與患人服或利或吐吐利所出亦如煮黃藥汁天行用此療亦與崔氏同

又論云此病俗間亦有單煮瓜蒂汁灌鼻孔中者亦有單

服生麻油者

又療黃疸病此病與前急黃不同自外狀與平常無別但舉體正黃甚者眼色如藥漸延淺小便及汗悉如藥汁食消多於尋常稍覺瘦悴乏力此病不甚殺人亦有經年累歲不療而差者此由飲酒多亦是積虛熱所致黃疸初得稍覺心中煩熱滿身黃色眼白睛黃小便如此者宜合白鮮皮等七味湯以洩之黃連十味丸以壓之

白鮮皮三兩　乾葛五兩　黃芩三兩　鬱金三兩

豉五兩綿裹　梔子十枚擘手　芒消六兩

右藥切以水八升煮取二升半去滓內芒消分溫三服

服相去如人行二十里久更服此湯當得利後將息一二日則合後黃連等十味丸服之

又黃連丸方

黃連五兩　黃芩五兩　苦參六兩　沙參五兩　乾地黃六兩　乾葛六兩　梔子人三兩　麥門冬一升去心　地骨白皮五兩　茯苓五兩

右十味擣篩爲末蜜和爲丸以米飲下初服十九日三服稍加至三十丸如梧子大黃疸亦有單服猪脂得差者忌猪肉冷水大酢蕪荑等物是昇阿

雜黃疸方三首

千金濕疸之爲病始得之一身盡疼發熱面色黃黑七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如猪肝狀其小腹滿者急下之亦一身盡黃目黃腹滿小便不利礬石散方

礬石五兩　滑石五兩

右二味爲散大麥粥汁服方寸匕日三服當先食服便利如血者當汗出差（深師古今録驗並同出第十卷中古今録驗）九疸秦王散方

胃癉食多喜飲梔子人主之

心癉煩心心中熱葛根主之

腎癉其人唇乾葶藶子主之熬

脾癉溺赤出少心惕惕若恐栝樓主之
肺癉飲少小便多秦椒汗瓜蒂主之一云膏疸
舌癉渴而數便石鍾乳主之
肉癉其人小便白凝水石主之研入
髓癉日眶深多嗜臥牡蠣澤瀉主之
肝癉胃熱飲多水激肝白朮主之
右十一味名秦王散各等分隨病所在加二分擣合下
篩飲服五分七日三稍加至方寸匕忌桃李雀肉等
膏癉飲少小便多秦椒散方
秦椒一分汗瓜蒂二分

右二味擣下篩水服方寸匕七日三服深師千金同出第二十七卷中

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子
孟較勘

行唐王燾先生外臺秘要方第四卷終