


医學入门

五上



1m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

門
號
卷
617
11

編註醫學入門外集卷之五

婦人門

經候

經病百端血滯枯。

婦人以血為主。天真氣降，壬癸水合。腎

月盈則虧。故日月經行與產後一般。若其時餘血一
未淨。或外被風寒。及溫冷暑熱邪氣。或內傷生冷。七情勞
結為痰。為瘀。凝積於中。曰血滯。或經止後。用力太過。入房
太甚。反服食燥熱。以致火動。邪氣盛而津血衰。曰血枯。良
方云。經後被驚。則血氣錯亂。妄行。逆於上。則從口鼻而出。
逆於身。則水血相搏。變為水腫。恚怒。則氣血逆於腰腿。心
腹皆脇手足之間。重痛。經行則發。過期則止。怒極傷肝。則
有眩暉。嘔血。癥瘕。血風瘡瘍等病。加之經血滲漏。於其間
遂成瘻穴。生瘡淋瀝。不衛濕熱。相搏。遂為崩帶。血結於內。
成爲徵瘕。凡此變症。百出。不過血滯與枯而已。但血滯亦

有虛熱血枯亦有虛熱故重則經閉不同以滯宜破血枯滯枯分言輕則經水不調止言虛與熱而已。補虛直須大黃乾漆之類椎陳致新俾舊血消而新血生火濕熱尤宜清之涼之每以肉桂為佐者熱則血行也但不可純服峻藥以虧陰道至於耗氣益血之說雖女斜要法但血為氣配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣行則行氣滯則滯如果鬱火氣盛於血者方可單香附丸散抑氣散常加木香檳榔枳壳以開鬱行氣若氣亂則繼繼叔和論所肺二脉則宜肝旺於肺其實氣血平和有孕故亦潤豈可專耗其氣耶論者多泥叔和血旺氣衰不知登時不起故香附為女人仙藥經曰實正氣奪則虛兩腋通和但婦人見偏性鄙婢妾志不得伸鬱怒無氣盛則實正氣奪則虛可不慎諸。一、**滯因外感傷冷鬱**經登廁風寒入內以致凝滯者小溫經湯經行適來續得寒熟就開不通或寒或暑俱謂之熱入血室小柴胡湯加生

排或黃芩芍藥湯加生地經行遇食生令或外被冷濕以致瘀血癥結者五積散去麻黃加牡丹皮紅花○七情心氣鬱結不行者分心氣飲去羌活半夏桑皮青皮加川芎當歸香附莪术玄胡索有火者更加黃芩或小調經散草丸或燒存性紅枯傷勞食或作泄內傷飲食勞倦損傷肝花當歸煎湯下枯傷勞食或作泄胃氣弱體倦發熱腹痛腸鳴飲食減少而不生血者補中益氣湯加川芎主之。关花粉有腸鳴月水不來者病在胃胃虛不生血氣宜畢朴五錢空心水煎或單蒼朮膏水泄少食者升陽益胃無泄少食者二陳湯加白术黃芪便製香附當歸芍藥散敷輕者小柴胡湯合四物湯去人參半夏加天花粉○善用皮麥門冬山楂麥芽因濕痰胃熱分肝耀海地柏枝用敷食積者更加莪术枳壳厚薄痰結者羹糊四物湯合調胃承氣湯名主癟散再合京膈散名三和散輕者小柴胡湯合四物湯去人參半夏加天花粉○善

羸形瘦口燥善食厚味鬱為寒火有潮者道逆散加姜之季無薄荷四物湯加桃仁紅花或加味養榮丸。大槩肥人氣弱有濕痰瘦火脫血入房胞氣竭少年大崩血或醉後入人多血怯有火火脫血入房胞氣竭房氣竭肝腸月事衰者虛丸或多產育過勞劬墮胎及多產育傷血或設服膏肓十全大不通大槩只如此虛熱瘀氣四症而已不謂亦大補湯。相同竇症調治飲食調和自然血氣流通更有凝滯然後可用紅花當歸散紫葳散通經丸藥經丸之類虛者只用當歸散以通之通後又須養血充益陰使津液流通苟不務氣血充和而惟以毒藥攻逼憂求千金於乞丐必死而後已。○以上言經水不通以下言經水不調不調前後色何如以期言之對期者性和而足易挾不調之心主血陰從陽故以色紅後期三正雖不對期而色正者易調後期來少而不足後期三為血虛四物湯加參芪白朮陳皮牛膝瘦人只是血少。四物湯倍歸地少加桃仁紅花肥人多瘀二味湯加南星菖蒲

木滑石芩歸香附。來少色和者四物湯點滴欲閉潮煩附九內寒血漸來少或日少五六日以上者四物湯加桃仁紅花牡丹皮葵花先期三五日者為血熱。四物湯加芩連肥人加瘀藥先十數日者血氣俱熱也。四物湯加黃芩柴胡香附肥人清海苔莎丸加黃連白朮。來多或日夕五六日以上者內熱先期三五日者為血熱。四物湯加芩連肥人加瘀藥先十數日者血氣俱熱也。四物湯加芩連肥人清海苔莎丸加黃連白朮瘦人有火者同經丸肥人多瘀者清海苔莎丸或前或後氣血亂至或一月再至當歸散調經散單冊淋瀝不斷邪未疎時行時止淋瀝不斷腹中作痛乃參散淋瀝不斷寒熱邪氣客於胞中稍帶血海外腹痛也如有積下利不定有所去則愈。脾下逆氣上攻胸膈欲嘔者桃仁散或用當歸四錢乾漆二錢蜜丸服如腰臍外徑來寒熱者先服小柴胡湯加地黃後以四物湯和之有月事頻數者四物湯倍芍藥加黃芪有經行不止者四物湯加地榆阿膠荆芥熟者倍黃芩或不固經丸風熱

色紫甚則黑淡因瘀滯濕模糊淡白者風也黑者熱甚也以混之也。如烟塵水。如屋漏水。如豆汁。或帶黃混濁。或黑者溫痰也。成塊作片。色不變者氣滯也。或風冷乘之也。色變紫黑者血熱也。○大緊紫者四物湯加防風白芷荆芥黑者四物湯加芩連香附淡白者古芍歸湯加參芪白芍附香附有瘀者一陳湯加芎歸如烟塵者二陳湯加秦艽防風蒼术。如豆汁者四物湯加芩連成塊者四物湯加香附琥珀調經丸百子附歸丸墨附丸。

外症潮熱內腹痛

水月循環纖病不作而有子。若兼潮疼重則加之亥。血升幅或濶有潮汗則血愈消耗有咳幅則氣往上升濶則津偏於後疼則積結於中。是以必先去病而後可以滋血調經。就中朝熱疼痛尤為婦女常病。蓋血滯積於骨髓便為骨蒸血滯積痰於中與日生新血相搏則為疼痛。而枯不能滋養百骸則蒸熱於外。血枯胞絡火盛。或挾痰氣食積寒冷之外邪則為疼痛。○潮熱有時為內。仍為虛。無時為外。感外實虛者大溫經湯。熱者四物湯加柴芩。經閉者滋血湯。骨

蒸者大胡連丸。大烏鵲丸。五心潮熱。四物湯加黃連胡黃連無汗者茯苓補心湯。有汗者逍遙散。經前潮者血虛有滯逍遙散加牡丹皮桃仁玄胡索。經後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡。換地骨皮。加生地。便以黃芩此方能加減退熱聖藥。有咳加桑白皮。貝母桔梗。知母麥門冬。咳血加生地山梔牡丹皮。嘔吐加陳皮半夏。止嗽覆花。嘈雜加姜炒黃連。或六連二陳湯。尋常潮熱者。腎氣丸。大造丸。或四物湯料。加便炒黃芩各一兩。四製二升附一斤。蜜丸服。

痛滯經前虛後呼

此言腹痛也。經事欲行。脅腹絞痛者。為血滯一兩。痛甚者。萬痛丸。經水臨行時。痛者為氣滯。烏藥湯。氣滯血瘀者。玄胡索散。或四物湯加桃仁紅花。義木。玄胡索四物湯加玄胡索木香。黃連香附。眼腹痛者。內補當歸丸。溫經水將行。被風冷相搏。繞脅痛者。乃寒氣客於血室。大胡索牡丹皮甘草。○經後痛者。為血虛。大物湯加陳皮。玄胡索年血寒積結胞門。嘔吐延暉。脅腹痛者。內補當歸丸。

而痛者。酒煮當歸丸。大溫經湯。通用九水腫經前血腫後
交加地黃丸。滋陰百補丸。七製香附丸。經水斷而後腫名曰血分。乃瘀血化水。閉塞胞門。比水腫
更難治。但能調其經。則水自消。小調經散草歸丸。先浮腫
而後經水不通。名曰水分。乃脾不能制血。與水并浮肌肉
為之虛腫。紅礬丸。通用腎氣丸。水分君澤鴻加防已草
木通。血分君壯丹皮。如牛膝。血風身痛。皮膚血風。乃氣
紅花。有經閉。脚腫者。桑皮散。血虛而襲
經風冷。身體懸節痛者。大芎窮散。艱棘湯。加蒼耳白芍經先期者。蒼朮
甘草水煎頭服。間用蒼朮丸。虛濕熱甚也。四物湯。加蒼耳白芍經後期者。逍遙散。皮膚搔
丸。加蒼耳白芍龜板金毛狗脊。經後期者。逍遙散。皮膚搔
痒者。四物湯加荆芥。或古烏荆丸。加肉鴉頭。烏頭丸。上
攻頭目暈倒者。單蒼耳散。頭項脊痛者。紫胡調經湯。頭身
痛寒熱咳嗽恆悸一切雜症。人參。荆芥散。素
虛者。友金丹史國公浸酒方。胎前產後皆同。養胃通心真
要法。經曰。二陽之病。發心脾。蓋衝爲血海。任主胞胎。二陰
起於胞內。爲經絡之源。手太陽小腸。手少陰心。爲

表裏生上爲乳汁。下爲月水。月水乃經絡之餘衝任氣枯
則血依時而下。憂思耗傷心血。以致火炎。血不歸肝而出
納之用已竭。毋令子虛。脾亦不磨而食少。食少則肺金失
養。水絕生化之源。而經閉不調治者。須知心爲氣血之主。
心氣鬱結者。宜調心血。通心經而血自行。脾胃爲氣血之
運。飲食勞倦。損其中心氣。以血少不行。或行之間斷者。只宜
平胃散。四君子湯之類。補養脾胃而氣平。女子十四衝任盛而月事下。必近二十方可匹配。可見陰
氣之難成也。或恣食鹹酸。煎炒熟燉。以致氣血壅不通
者。紅朮當歸散。紫歲散。單大黃膏。如逾年未嫁。或年未及
分難治。宜四物湯。加黃芩。柴胡。或逍遙散。加山梔。芩連。以
養血涼血。降火。或督氣丸。如子芩。紅花。養陰柏子丸。亦好。
因怒逆者。四製香附丸。加黃芩。生地。因驚者。抱膽丸。經絕
不通者。尾松散。或真婦藥。問言端。或暴夫不能頓忘。或門
戶不能支持。或望子孫昌盛。心火熱時。不起。加之飲食厚
味。遂成瘀火。其瘡惡風。體倦。氣寒。乍熱。面赤心煩。或時自

汗升脉弦長當抑肝之陰氣柴胡柳附湯抑陰地黃丸越
蠅丸如貧苦淡食者西製香附丸主之。有每日上午神思
昏憤怕見明處惡聞人語至午後方可。友頭昏腰痛驚場
稍涉勞動與月經來時真虛丸劇此不得遂志之故也宜
清神養榮四物湯加人參桂附陳皮紫胡羌活甘草香附
有與鬼交通者中神不守舍或時還等或泣脈遲伏或如
雀啄不知度數顏色不變者宜救神羌活蔓荆子防風
薏苡仁黃芪五味子麥門冬石菖蒲黃芩甘草木煎服。

崩漏

崩漏有虛亦有熱。熱則流通虛溜泄。

血熱則流虛則溜。凡非時血行淋瀝不已

虛多房勞挾火邪

經行犯房及勞

謂之崩下忽然暴下若山崩然後過度損傷衝任氣血俱虛不能制約經血忽然暴下宜大補氣血大溫經湯氣虛者四物湯加參芪血虛者四物湯加膠艾炒乾姜久不止者百子附蠅丸墨附丸虛寒腎暖冷痛者伏龍肝散一切虛症內多散虛火歸血地黃湯

生地外連湯補陰丸久者熱上飲食不調節有因膏梁厚當歸節骨丸大小烏雞丸熱上飲食不調節有因膏梁厚當歸節骨丸。下淤於腎與相火合為濕熱。血經下漏其色紫黑屬暴宜解毒四物湯涼血地黃湯膠艾四物湯加黃芩或單芩心丸四物坎離丸固經丸。有因飲食失節火乘脾胃下咽領容似無病者外見脾困倦煩熱不卧等症經水不時暴至或適來適斷只宜舉養脾胃加以鎮墜心火之藥補陰漏陽自止升陽調經湯升陽舉經湯或因四氣苦相侵子宮為四氣相搏則血亦難停大柴風冷搏動者苦宮桂或四物湯加荆芥寒冷所乘及年老久崩者伏龍肝散加附子鹿茸阿膠蒲黃糯米糊丸服。暑月卑岑霜心丸或益元散加百草或爲悲憂心痛切絕胞絡氣內動發則心下崩數溲血也宜倫金散西製香附丸烏藥湯古橘歸丸。憂鬱因先富後貧先順後逆心事不足黃芪人參各五分升麻二分甚者加棕櫚灰酒調服。心

醫學大成 卷之五

痛甚者名殺血。心痛小產後血過多。心痛勢急湏宜止且行。經曰。陰搏陽謂之崩。言屬熱者多也。崩乃經血錯亂不行循故道。淖溢妄行。遽止便有積瘀凝成窠臼。不止又恣用昏暈。必先服五靈脂末一錢。其性能行能止。然後分虛熱如更不止。烏紗帽散。十灰散。古黑坤散。單養胃安心還舊夏枯草膏。有火者固經丸。虛者女金丹。血崩止後宜四物湯加炒乾姜調之。氣弱加參芪。有鬱血加香附。挾火加芩連少許。更服二宜丸。四物湯以還舊血。免致孤陽。防其再發。如脾胃氣弱者補中益氣湯。心神不安者寧神膏。滋陰寧神湯。肝疾有心血不足者。有心火亢甚者。若不早治。變為白濁。自淫。血枯。發熱。不可治矣。

帶下

帶下赤白皆濕熱。帶腹痛其濕熱結。

細白如膠穿熱雙出

鄭

以下故曰帶下赤白屬血。白屬氣。其症頭昏目眩口苦舌乾。大便或閉或溏。小便澀。皆熱症也。如赤白痢濁。一般但不痛耳。間有痛者。溫熱怫鬱甚。則肚腹引痛。婦人服食燥熱性行。垂戾以致肝旺脾虧而生湿熱。上則流通。古人有用導水丸下之。繼以淡劑滲之。或苦練丸。大玄胡索散。及元柏榔。濕勝肥黃痰竹孽。肥人多溫身。故脾緩陰戶如水。瘦人多熱脉數外。症潮煩乃陰虛火盛也。芩柏樗皮丸。帶溫經湯。補經固真湯。龜柏姜梔丸。是也。熟多瘦婦必潮煩。調之如脐腹痛者。暫以辛溫開導。如大柴胡散。真丹。溫痰流下。滲入膀胱。宜二陳湯加二木升麻柴胡。或芩柏樗榔皮丸。如結癥白帶淋瀉不已者。先以小胃丹半劑。散合四物湯。或單樗白皮丸。為末酒糊丸。血虛加四物。

湯氣虛加參木陳皮火動加黃柏滑久加龍骨赤石脂性燥加黃連腹痛加乾姜

間有虛寒帶真

脾陰中冷痛何魯歟

虛因月水淋瀝不已或崩中暴下或不升經脉凝泣衛氣下陷精氣累滯非下焦蘊積而成白

練丸久不止腰腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者補經固真湯大烏鵲丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯

有火加黃柏有寒加桂附。寒始因亡血復亡其陽七氣虛極帶下腥臭多悲不樂附桂湯腹痛陰冷者四物湯加桂附常用酒者當歸丸小烏

桂丸姁斯丸琥珀調經丸

外感風邪傳各經

風邪入於

經脉流傳臟腑若傷肝經青如泥色心經赤如紅津肺經白形如涕脾經黃如爛瓜腎經黑如鈍血宜胃風湯或五

積散去麻黃主之

一種白淫思慮切

思想無窮所賴不得

通用單地榆散發為筋癢又為白淫謂白物淫如白精之狀不可誤作白

帶過服熟藥又有日夜而津如清米泔或如膾膠者謂之

室女胎產法

自服與白淫同多憂思過度所致誠難治療宜平補金鎖正元丹小兒絲子丸威喜丸疏參丸

食者沉香降氣湯因勞傷腎氣心腎不交者

相同室女經水初下一時驚悸或浴以冷水或當風取涼

全是溫熱宜芩木樗皮丸。平時陰陽過多及產後亡血

下虛風邪乘虛入於胞絡宜緩宮丸加姜附吳更或黃芪

建中湯去桂加當歸水煎吞苦棟丸補衛調脾循故轍

凡崩中帶下或用升

用收澀如伏龍肝散白芷散然暫止而終不止者蓋衛司

俱虛則血液無所約制是以古方有用桂枝湯加附子以固衛氣者四君子湯加草薢丁香木香以燥水健脾者或

用理中湯加陳皮半夏或单半夏丸用辛歸煎湯下或補中益氣湯平胃散皆補羸厚脾使氣血自循故讌而不專於收澀以妍奪之也

癥瘕血氣積聚條參看

癥瘕冷熱都是瘀或因食積或鬱怒

癥者堅而不柔。瘕者軟而能移。七癥入癰經亦不詳。雖有蛇蠍蠶肉髮虱米等名。偶因食物相感。血而形成耳。瘕比癥稍輕。其為病所以異於男子者。皆曰

癥發及經水行時。或飲食生冷以致脾虛與臟氣相結。或七情氣鬱生痰。皆必扶寒血而後成形。要知癥瘕痃癖。有瘕腸覃。食癥。血癥。食痕。血痕。種七不一。盡皆宿塊之異名耳。經云大腸移熱於小腸。小腸移熱於大腸。兩熱相搏。則血溢。而為伏痕。月事不利。以手推之。癥瘕皆有熱者。盖凡熱者。皆魄也。連羅丸。外貼三聖膏。神外阿魏散。久不愈者。諸肝丸。辰砂一泣丸。神聖代針散。瘕虛冷者。內灸散。魄丸。溫白丸。汗出甚者。加蜀椒根入。亥明粉下之。桂枝桃仁湯。外以韭菜搗餅。熨痛處。或萬痛丸。桃奴散。食積三棱煎。保和丸。紅丸。子虛者。日木膚補中益氣湯。然者。大承氣湯。加枳壳。桔梗。痰癥。食積者。白芥丸。海石丸。腹痛經閉如懷胎。

面黃寒熱夢無數。引四肢疼痛。月事不調。如懷胎之狀。邪氣甚盛。令人恍惚。夜多異夢。寒熱往來。四肢不舉。陰中生瘡。甚者小便淋瀝。或兼帶下。小腹重痛。面色黃黑。入芒硝遙散。通經丸。古矣玄丸選用。○血與氣併心腹痛。連腰脇。背脅甚則搐搦。經候不調。謂之血氣。玄胡索散。手拈散。失笑散。單乾添丸。數症因痰癥。氣積者。與上諸方通用。

癰病治頗相同。疾者在腹內近脅。左右各有一條筋。脉急在兩肋之間。有時而痛。名曰癰。皆陰陽不和。飲食停滯。冷氣相搏而成。亦得冷則發。腹脹不食。亦可

懼。紅丸子。猪肝丸。小烏鵲丸。葱白散。腸覃可按血自通。腸覃乃寒氣客於大腸。與胃相搏。大

陽為肺傳送肺主氣氣得熱則行得冷則凝。七則清氣散而濁氣結而為瘕覃。延日久不已。瘦肉乃生。始如鷄卵。久如懷胎。按之堅。惟之後月事時下。或多或少。氣病而血未病也。宜二陳湯加香附以開之。或香粉丸。石疝塞胞經無路。損瘀血結成。久則堅硬如石。寒枚子門大如懷胎。月事不下。乃先感寒氣而後血壅不流所致。血瘕石癰之。或通經丸。氣血痕散聚湯。瘕痕麝香丹。古硝黃膏石瘕見呪丹。主加紅花丸。妙血蠱氣蠱堅如石。水蠱腫滿俱難治。蠱者。三結食血之象。即癥瘕之甚者。肚腹急硬如石。腫滿如水。乃癥丸。或產後為米與血搏通用四香散。千金桃仁煎。內消散。蝦蟆煮肚法。抱甕丸。黃米丸。單腹鹽脹者。大腹皮飲救之。詳男科腫脹類。調氣破血漸消除施。以傷元氣。寧扶脾正氣。待其自化。卽開鬚正元散之。由名也。愈後宜大小烏鵲丸。八珍湯。或加散瘀丸。地黃丸。調之。或云待塊消盡而後補養。則月氣之存也。妙希。

胎前

胎前清熱與養血。婦人無病月事時下。乃能受孕氣。血充不充。偶然受孕氣血不足。榮養其胎。宜預服八珍湯。補養氣血以防之。免其墜墮。或原有熱。而後受孕。或孕後挾熱及七情勞役。動火輕則胎動不安。重則遇三五七陽月必墮火能消物故也。宜安胎丸常服。以清其熱。七清則血循經而不妄行。所以養胎也。謬云。胎前不宜熱良有以哉。不調則胎孕不安。依經調之。免墮胎患大忌。男女交合。血室方開。父之精潮適至。陰氣既翕。如布袋絞紐。而精血乘冲氣自然旋轉不息。如蟻蟻之渙糞。吞啖含受成一團圓。璇璣丸。日一急。不停然。後陰陽大定。玄黃相包外似繩絲。焉。其中自然虛成一竅。空洞虛圓。與鷄子黃中一穴。

胎前

相似而圓之外氣自凝結為胞衣初薄漸厚如彼米
豆漿面上自結一皮中竅日生從無入有精血日化從有
入無九日之後次九又九凡二十七日即成一月之數
自然凝成一粒如露珠然乃太極動而生陽天一生水謂竅有
之胚足厥陰脉所主也此月經閉無潮無痛飲食稍異平
日不可觸犯及輕率服藥。又三九二十七日即二月數
火謂之暉足少陽脉所主也此月腹中或動或不動猶可
此露珠變成赤色如桃花瓣子乃大極靜而生陰地二生
狐疑若此逆思酸名曰惡阻有孕明矣或偏嗜一物乃一
臟之虛如愛酸物乃肝臟止能養胎而虛也二三箇月間
忽心腹痛不安者用當歸三錢阿膠其草各二錢葱四莖煎服。
三四胞絡三焦訣又三九二十七日即二月數百日間變成男女形影如清與涕中有白絨

相似以成人形臭與雌雄二器先就分其諸全體隱然
可悉斯謂之胎乃太極之乾道成男坤道成女手厥陰脉
相火所主胎最易動古芩木湯或為丸頻服最妙如無惡

阻等症胎有可疑者用驗胎法以川芎為末一錢瓦更艾

湯調服服後腹中不覺動者則為經病如覺微動者則為

胎有孕或因驚恐墜墮胎氣不和轉動不能騎腹疼痛者溫

酒調下二錢加當歸尤妙如胎不安及腰背痛不可忍者

古杜續丸。四月男友已分始受水精以成血脉形像具

六腑順成手少陽脉所主多心腹膨脹飲食難消甚者用

平胃散換白朮加香附烏桑大腹皮如因驚恐動胎下墜

小腹痛引腰脇小便疼痛下血者安胎當歸湯四五箇月

忽心腹疼痛者用大棗十四枚炒黑鹽一錢燒赤為末取一撮酒調服之立愈

五月始受火精以成陰陽之氣筋骨四肢已成毛髮始生

足太陰脉所主。五六月胎不安者安胎飲固胎飲選用。七月

明脉所主如胎氣不安常處者八手陽明成竅穴精以成皮膚

始受水精以成骨皮毛已成遊其竊能動左手手陽明脉所主如陽明脉亦名四病宜旋覆花散

形骸漸長九竅皆成遊其竊能動右手手陽明脉所主如胎肥大者束胎九

入九箇月內不可多服。九腎十膀神氣完以成皮毛百節精

音學人月卷之五

畢備三轉其身足少陰脉所主。十月受氣足。五臟六腑惟手少陰太陽經無所專主者以君王之宮無為而已。此兩月素難產者產生散素肥盛及奉養安逸太过者枳耳散素怯弱者益氣救生散。

半產湏防三七月

半產多在三五箇月及七箇月內若前次三箇月而墮則下次必如期復然。凡半產後湏多服養氣血固胎元之藥以補其虛。下次有胎先長兩箇月半後即服清熱安胎藥數貼以防三月之墮至四箇半月後再服入九貼以防五月又至六箇半月後再服五七貼以防七月及至九箇月可保無虞。

間有感傷并雜症

妊娠傷寒詳見三卷。尋常風咳嗽頭痛發熱參蘿飲

去半夏熱服令肌體微潤而已。風熱甚者雙解散去硝黃石羔。感寒胸痛欲嘔苦腹滿痛大便清者大正氣散去半夏加吳萸阿膠。感暑眩冒煩渴尿赤驚惕暎睛丁舌急者香薷散合古今水湯或上味香薷散。虛濕腹脹身重者平胃散泄者三白湯加砂仁厚朴蒼朮內加黃芩。內傷七情氣滯不行者紫蘆飲。內傷勞役以後者。

攻小腹常墜甚刺子宮墜出者氣陷也。補中益氣湯如因房勞者八物湯加酒炒黃芪為君。防風升麻為使。內傷飲食胸膈滿痛者平胃散換白朮。加山楂麥芽黃連。內傷姜椒熱酒腥澀炙燙以散。內傷生冷冰米中病即止。因感傷以致胎冷不轉脐腹絞痛腸鳴泄瀉者宜米從權以理中湯之劑治之。泄甚加木香調子陳皮白芍粟米仲腫臍不寧熱者勝金丹截之。胎痢熱者古芩木湯黃芩湯虛者天癸未行屬少陽。天癸已行屬厥陰者胃久胎洪阿粟以下者胃利小便是也。利小便則胎氣及上二焦為三禁不可汗下則傷脾利小便則亡津不可汗以下者。

治湏知三禁法

婦人天癸未行屬少陽。天癸已行屬厥陰者胃利小便是也。利小便則胎氣及上二焦為三禁不可汗下則傷脾利小便則亡津不可汗以下者。

四物湯為主如傷寒各經加減法例莫若外感時氣從四物湯合小柴胡湯。陰症四物湯合理中湯古芩木湯傷寒最妙雜病四物湯四君子湯二陳湯加減間有服毒藥而不致胎動者乃病邪重胎元實也豈可視為常法且陰陽和而後有胎凡胎家有病亦不必太攻也經曰婦人重身服藥餌三五月前一毫辛散滑利禁用七八月間倘有秘結乃敢滑利又當審其素情墮胎及難產而斟酌之

胎動心腹腰作疼甚則下血如經行或因七情氣不順或

因外感風寒癥

胎不堅或因驚恐或因喜怒不常或因安胎而毋自定。胎動因七情氣逆心腹脹滿疼痛者紫

苓攻入陰戶以致胎動而孕心腹作痛甚則腰痛下血當

安胎飲因外感發熱頭痛嘔逆胸脇脹滿者安胎飲加柴胡

癩飲因外感發熱頭痛嘔逆胸脇脹滿者安胎飲加柴胡

大腹皮氣血虛自安胎飲倍參术服熟者固胎飲。腹痛

服安胎藥不止首湊辨寒熱虛實寒者理中湯加砂仁香附

熱者黃芩湯血虛胎痛者四物湯或平胃散加蘆薈煎

艾葉小茴川練等分空心水煎或草宜蔻丸熱者二陳湯

去半夏加山梔黃芩○心腹痛素有冷氣腹痛衝心如刀

刺者四物湯去地黃加茯苓厚朴人參吳萸桔梗枳壳

酒少許煮汁飲之不飲酒者用鯉魚和粳米姜葱煮粥十

日一食善能護胎長胎○腰痛最為緊急酸痛者必欲產

草水煎服心腹大痛氣欲絕者古芎歸湯加茯苓厚朴等

錢為末胡桃肉一箇研勻空心酒調服素虛痛者青娥丸

腰痛如折不能轉側者用鹿角五錢火煅酒淬再煅再淬十

錢以碎為度研末酒調服○胎動下血者膠艾芎歸湯或下

黃芩如漆如豆汁者用野苧根金銀花根各五錢水酒或

各半盞煎服下血產門痛者用單黃連末一錢酒調服或

因母病或壓墜安矣如母有宿疾而胎不旺者長胎白朮

凡有羸瘦��痰氣血枯竭胎終不可保者用牛膝四分木香桂心蟹爪各二分為末空心溫酒調服下之免害其分娩又用紅酒麯五兩漬酒十盞煎二沸去渣分五服隔宿四服次早再服其子如糜令毋肥盛無疾或參芪神麯煎服尋常古芳歸湯最妙○孕婦或從高墮下重物所壓致動胎元心腹痛甚下血者用砂仁畧炒勿焦為末熟酒鹽湯文湯皆可調服覺腹中熱其胎即安胎家無所鍼血總安寧通用古次木湯加阿膠風邪加生姜豆豉寒加項強加葱白溫熱腹痛加白芍腹脹加厚朴下血加艾葉地榆腰痛加桂仲薑桂加黃連煩渴加麥門冬烏梅思慮過加茯神棗梔加旋覆花半夏麵勞後加黃芪氣喘去木加香附便燥加麻子仁素慣難產加枳壳蘿蔔素慣產胎加杜仲素血虛加芎歸此安胎之聖藥也凡卒有所下急則一日三五服緩則五七十日一服常服安胎易產所生男女又無胎毒蓋姪孕脾上連化遲滯則生溫上則生熱故用黃芩清熱以養血白朮健脾以燥濕安服丸金匱

當歸散加味養榮丸
皆此方而推之也

胎漏下血腹不痛心腹痛而下血者為胎漏血多為熱少為虛
胎動不痛者為胎漏
熱者下血必多內熱作渴者必物湯加白朮芩連益母草或金匱當歸散加味養榮丸血黑成片者三補丸加耆附白芍○血虛來少者古膠艾湯或合四物湯長胎白水丸下血欲墜者四君子湯加黃芩阿膠因勞役感寒以致氣虛子毋俱損者用熟地炒乾姜各二錢為末米飲調服惟有犯房難救止胎漏亦有肥盛婦人月水當來者或因登廁風攻陰戶者雖不服藥亦或無恙但作胎漏乃真漏胎也入物湯加膠艾救之遽用蒼藥治之反墮惟犯房下血者偶然尿血真模糊尿自尿門下血胎漏自人門下血姪娠尿血屬胞熱者多四物湯加山梔髮灰單苦賣菜飲亦妙因暑者益元散加升麻煎湯下稍虛者膠艾四物湯久者用龍骨一錢蒲黃五錢為末酒調服

醫學大成 卷之五 胎前

七十四

四

五

六

七

八

惡心阻食名惡阻

或大吐或時吐清水惡聞食臭由子宮經絡七於胃口故逢食氣引動精氣衝

上必食吐盡而後精氣乃安亦有悞交合而子宮穢盛者過百日則愈

者左脉必

怒者單黃連九秋苓煎湯下亦有無陰井氣弱者無陰則嘔
湯加竹茹生姜熟加芩連因弱頭疼全不入食者入物湯合二陳湯加枳梗氣弱者四君子湯加陳皮麥門冬厚朴竹茹日久水漿不入口吐清水者並加丁香惡聞食氣多卧少起者旋覆花散

胎動不安或兼腰腹疼痛者保胎飲兼瘡痢口中無味及曾傷風冷者醒脾飲子兼傷食者二陳湯加砂仁香附或

單白朮為丸或單砂仁為末米飲下甚者紅丸子極効

子煩燥悶亂心神火盛尅肺好生嗔

孕心煩燥悶謂之子煩多受胎四五箇月間相火用事或應天令五六月間君火大行俱能乘肺

以致煩燥胎動不安大抵相火盛者單知明為未審九蒸

者單黃連丸心神不安者硃砂安神丸煩甚恐傷胎者單

胎散功不可

以虛煩藥治或有停瘀胸膈滯亦令煩燥不宜人

或有停

滯於胸膈之間亦令煩燥胎動不安者用茯苓防

風麥門冬黃芩等分竹葉減半水煎入竹瀝調服

子懸心腹脹滿痛胎氣壅心相火閼

相火養胎以致胎熱妊娠四五箇月以來

氣逆壅心胸膈脹滿疼痛謂之子懸宜紫蘆飲有鬱心腹

脹滿甚者加義木及丁香少許不食者古芩木湯倍白朮

加弓葉甚則悶絕欲傷人火盛極一時心氣悶絕

而死紫蘆飲連進救之誤棄子死

不能動寒手指唇爪俱青全以舌為症驗古芩歸湯救之

胎水遍身虛腫浮妊娠經血閉以養胎胎中挾水濕與血太過或泄瀉損傷脾胃肺腫不能制水血化為水所制宜

醫學大成 卷之五 胎前

十五

五皮散倍加白术為君。氣喘小便不利者防已散。濕熱盛者單山梔炒為末。米飲調服或單山梔丸服大異常亦堪憂。妊娠五六箇月腹大異常高過心胸氣逆不安形體殘疾或生下則死。子毋難保宜鯉魚湯又有脚腫或

服至肺消水散為度。仍常煮鮮魚粥食之。出水胞漿大盛故下流。妊娠七八箇月以來兩脚浮腫頭自脚面腫至膝腿端悶妨食甚至足指間有黃水出者謂之子氣宜天仙藤散如脚腰腫者腎著湯手腳腫者用赤小豆桑白皮等分水煎服重者加商陸。

妊娠中風名子癟。因體薄受風寒發則口喎痰涎壅有

時昏暈胎難安

脉虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相搏發則口噤舌強痰延壅盛昏暈不識人時醒時作謂之鬼暈。又曰子癟又曰痓甚則角引反張

小續命湯意重者異羊角湯輕者四物湯加葛根牡丹皮

散如中風寒犯觸身休盡疼乍寒乍熱胎不安常苦頭眩痛遂脣下寒時時小便白如水泄或青黃寒棟腰苦冷痛目視眩暎者四君子湯去茯苓加當帰厚朴桂白姜煎風

酒調服。不醒人事者單荆芥散

子淋溺溢膀胱熱

妊娠飲食積熱膀胱以致小便閉澀。又謂之子滿宜古方歸脾湯加木通麥門冬

人參甘草橘心臨月加滑石為君熱甚者五淋散。原因房勞內傷胞門衝住虛者四物湯合六君子湯或腎氣丸

甚則大小便閉結

臍瓣積熱大便不通者用赤茯苓枳壳等分。大腹皮甘草減半葱白煎服或四

物湯加黃芩厚朴枳壳。胞熱小便不通身重寒頑眩者用冬葵子赤茯苓等分為末。米飲調服轉脬溺

閉痛難當

性急厚味者有之。妊娠脬為胎壓。展在一邊

脾系轉戾但升舉其胎。脬轉水道自通宜四物湯合六君子湯去茯苓抹吐以提之。無孕老亦同不可專用滑參之

藥。有素肥盛忽瘦兩尺脉絕者，明虛也。腎氣尤主之甚者，冬葵子赤茯苓赤芍等分水煎入髮灰少許。有熱者古芩木湯合益元散服之。一法將妊娠倒堅起其胎，不墮其溺自出。產後有脅轉或脅出者，搗葱白於脇上灸之立効。如欲服藥，與肝前大同。

遺尿赤白宜分別

妊娠遺尿。古方用白薇

酒調服。然亦有虛有熱。赤者屬熱。古芩木湯加山茱萸五味子少許。白者屬虛。安胎飲或鷄腥腫散。

子癟腹鳴自笑悲

妊娠三五箇月以來，忽失音不語者，胞瘤。分娩後即自能言。

腹中作鐘鳴或哭者多年空房下漏穴中土為末，酒下。或乾噙之即止。

腹中兒啼者黃連煎濃汁呷之。或青黛丸好。

有自哭自笑者，紅棗燒有性米飲調服麥耳草棗煎服。

有自哭自笑者，紅棗燒有性米飲調服。

發痘動胎命必絕

胎前患痘用峻藥動胎去血泄氣必死。詳痘疹。

諸症濕痰風熱

虛去邪保胎真口訣。

孕婦脾土不運而生湿。濕生痰，痰生肉令子無聲。鮑鯉同鷄子食。令子生寸白虫。食大

辨餌瘡食兔肉。令子缺唇食羊肝。令子多石食鱉肉。令子

項短縮頭鴨子同桑椹食。令子倒生心寒。鮮魚同田鷄食。

令子瘡癰，雀肉同豆醬食。令子生雀子班食。食霍華食。食

姜芽。令子多指食水漿。令絕產。食雀肉飲酒。令子多淫。無

耻。食茨茹消胎氣。食驥馬肉過月難產。豆醬合霍華食。食

胎。食山羊肉。令子多病。食鱉鮮無鱗魚難產。食諸賸齒生

子驚風而天。食雀腦。令子患雀目。勿妄服湯藥。勿妄用針灸。勿過飲酒。染勿舉重登高陟陰。心有大驚。子必頭痛。勿

多睡卧。湏時時少步動。和血脉。勿勞力過傷。使督氣不長。人知此意。恐不信者。令待鷄抱熟。及時取藥。置篋

內。每斧置孕婦床席下。懸弓矢於壁。蓋弓矢方正。事子事也。

人知此意。恐不信者。令待鷄抱熟。及時取藥。置篋

之。

轉女求男皆古設

古法於胎成二月

醫學入門卷之五

王書是雄鷄故胎教常令王公大人亦甚言志竟佩護黃一二兩於孕婦身左或萱花亦可三法皆靈一可也。又後有月日時遊胎移雖不可泥然四定麻竈實不可輕易移動求嗣者尤宜慎之

臨產

臨產切不可匆忙

十月氣足胎元壯健者

之效喜服單益毋膏免產後之患中間有體弱性急者

腹痛或作或止名弄痛漿水淋瀝來少名試水雖臍腹俱痛

或作或止名弄痛漿水淋瀝來少名試水雖臍腹俱痛

已下橫逆橫生露手逆露足徐徐推上任洗娘

橫者。兒先露手。原因側碍等法。

腹痛兒身未轉產母用力一逼遂至橫來。當令產母安然仰卧。洗母輕手徐徐推兒稍上。漸漸以中指摩其肩。又攀其耳而正之。服芳歸黑神散固血生血。須待兒身正直且順臨門。服阿膠滑石葵子為末。溫酒入蜜覺匀服之。然後方可用力送下。通者先露其足。因母氣乏閑健不然。用太早致兒逆來。當令產母安然仰卧。洗母徐徐推牢。若經久不生却令洗母輕緩用手推足令就一邊直上。

臂高攀手

坐者先露其臂當高處牢繫手巾一條。令產母轉門路正當然後用三退散調服。方可用力送下。

坐產露

巽面貼項救盤腸

盤腸者小腸先出。急用熱水浸軟舊布蓋住其腸不可包托。外用醋半盞新汲木七分疎調停巽產用面每一匙冷一縮三瓣三縮當权盡為度。又以如聖膏貼產母頭項中心。陽止即拭去內兼

照舌子稿參良大補之藥。加升麻防風以提之。未有不收者。又有久而為風吹亂不能收者。用磨刀水少許火上溫過以潤其腸。後用好磁石煎湯一盞服之。其腸自收。

碍產兒肩脣帶絆

番轉脣帶絆者。因兒身仍湏候兒身正順方可用力送下。

兒頭偏墜左腿忽偏墜右腿或露左額角或露右額角。兒近上徐上引手以中指托起兒頭下其脣帶。服固血藥。推

露額側來墜腿尾

側者因兒方轉身。被

後骨偏墜穀道即令兒只露額當令洗母以綿衣炙令溫藥。後即令產母用力送下。此非洗母輕手巧妙不能傷產。蓋皆倉惶用力太早之道。或因子欲生時兒枕先破敗血裹住。宜鹽豉一兩以青布包了燒存性。入麝香一錢為末。

用杵錘燒紅淬酒調服一盞。含卒只以新汲木磨京墨服之。墨水裹兒身出或芳歸益母草葵心皆能逐瘀以開產路。○有坐草之時。蓦然口翻口噤吐沫者。麝靈丹。○有矮石女子。交骨不開。難產者。龜壳散。或古善歸湯。○通用無憂散來甦。胎死母舌黑非常。外症指甲青黑。脹悶不食。口散。鬼腦丸。錢水酒煎服。其胎化成血水而下。便閉。脉實者。大黃備急丸。或單鹿角為末。葱豉煎湯調服。昏沉脉微者。養正丹。濃煎乳香湯。下一百廿九。血乾或有寒者。四物湯。下古桂香丸。氣弱者。催生五積散。加麝一厘。○雙胎一死一活者。用蟹底一盡。其草二兩。東流水十盞。煎至三盞。去渣入阿膠三分。二三次頓服。能令生者安。死者出。○通用麝靈丹奪命丸。外用如聖膏貼足心。仍胞衣不下。因血脹消瘀和服。催生藥及通閑散吹鼻。即下胞衣停三兩。分二三次頓服。能令生者安。死者出。○通用麝靈丹。皆因用力太早。產下不能更用力。送出胞衣停外冷所乘。則血澁脹胞而不止。腹滿衝胞氣信古方。久被外冷所乘。則血澁脹胞而不止。腹滿衝胞。喘急疼痛者危。急將脐帶以少物繫墜。然後截斷。不然則胞上抱心而死。只要產母心安。不可輕信洗母用手。宜內胞上抱心而死。只要產母心安。不可輕信洗母用手。宜內

產後

產後必須先逐瘀

正產陰虛實無病。不藥可也。但難產氣衰。

歸湯加童便一半服之。如無童便。以淡醋磨墨一小盞。入前湯藥亦好。服藥後且閉目少坐。然後上床仰卧。不得側卧。宜立膝不可伸足。高枕厚蓐。四肢無風。時以人為從心。亦不可太熱。或燒乾漆與舊漆器以防血迷血量。夏月房中不可太熱。亦不可太冷。人多氣盛。以致熱過。則氣耗散而不能送血。又不可脫衣洗浴。強起離床。太早以致外感。身強角弓反。張名曰尊風。如交合陰陽。令下部終身虛疾。將息百日以過。乃可湏知。產後百病皆血虛火盛。瘀血妄行而已矣。間有瘀消然。

後堪補助

瘀消後方可行補如左脉弱加補氣藥如不逐瘀遽服參芪其美停滯之劑

有瘀血攻心即死者食肉太早亦然

瘀衝眩暉腹心疼

去血過多眼花頭眩昏悶煩燥或見頭汗

者古有歸湯入童便甚者加炒乾姜人參汗多加黃芪或八味黑神散單五靈脂散返菟丹○胃弱血虛發厥倉公散白薇湯○臨產用力勞心氣虛而暉者用人參一兩蘇木五錢水煎入童便調服○氣血俱虛痰火泛上作暉者八物湯合二陳湯去白芍○火載血上昏暉或挾風邪者清菟散○被驚者抱膽丸○腹心疼痛全是由虛寒心痛者桂心湯感寒者理中湯○七情心痛者木橘湯○食滯寒熱心腹痛者熟料五積散加莪术○小腹痛者名鬼枕痛單五靈脂散或加桃仁醋糊為丸氣虛四君子湯下血虛四物湯下○產門脐下虛痛者大溫經湯羊肉湯○通用女金用加味益母丸○

血虛火動

寒熱互產後血虛發熱氣虛惡寒氣血俱虛發熱惡寒切不可發表○陰虛血弱者四物湯小熱加茯苓為

君熱

甚加炒乾姜為佐去血過多外熱內煩短氣悶亂者

人參當歸散蒸乳發熱者四物湯加參芪白朮天花粉發

熱書靜夜劇者四物湯去芍藥量加柴胡氣血俱虛

人參

宜十全大補湯去芍藥量加柴胡氣血俱虛

不消時有咳嗽頭目昏痛發渴盜汗寒熱如瘡臂膊

拘急宜前末二錢葱三十烏梅半箇荆芥五穗寄生桃仁

煎空心服○身痛寒熱者當歸羊內湯擾了湯食滯脾家

人參

鴻且吐凡寒熱有腹痛者為瘀血如腹痛胸滿嘔瀉必兼

加肉豆蔻○挾寒腹痛腸鳴小便清白不渴者四君子湯

加肉豆蔻○挾寒腹痛腸鳴附人參泄鴻不止脅腹痛者理中丸

加肉豆蔻○挾寒腹痛腸鳴小便清白不渴者四君子湯

人參

合五苓散加肉豆蔻炒白芍○挾熱腸垢便澀痛一陣鴻

一陣口渴者四君子湯合四苓散加酒炒黃連及木通少

許或益元散○挾溫身重腹脹者胃苓湯○嘔吐因敗血

乘虛入胃脹滿者六君子湯加澤蘭葉赤芍乾生姜腹脹

人參

胃氣不和者桔梗午夏陳皮等分姜煎服。脾脈弦者三白湯加乾姜陳皮黃芪滑石甘草飲食成積痞者內炙散服。

膈丸。霍亂吐瀉煩渴肢冷者理中湯加陳皮麥門冬姜煎服。冷者加附子。渴者五苓散轉筋者水莫散。

寒熱無時停補中帶表無過度

產後外感離床太早或換衣襲風冷入於下部令人

寒熱似瘡頭疼不歇血虛者古芍歸湯加人參紫蘿乾菖血氣虛者補虛湯加陳皮乾姜寒熱甚者熟料五積散熱不止者黃龍湯主之如體盛發熱寒及瘡痢者小柴胡湯合四君子四物湯加大黃芒硝暫服即調補之產後傷寒詳二卷法。曾誤服熱藥過多熱症大見久而便閉者柴胡破瘀湯或四物湯加大黃芒硝暫服即調補之產後傷寒詳二卷。

身痛筋攣虛渴煩脉急引或手足拘攣遍身肢節作痛者五積散

大麻黃加入參香附小茴桃仁木香等分姜煎服。產後諸風癆筋痙攣無力者血風丸或煎服。

煩渴氣虛者生脉散血虛者四物湯加天花粉麥門冬氣血俱虛作渴消。

服荆羽飲食無味者用人參二錢麥門冬一錢半熟地七分天花粉三錢甘草五分糯米姜枣煎服。虛煩者用人參麥門冬小麥茯苓各一錢竹茹一彈丸半熟地七分夏八分甘草五分姜煎服心虛驚悸者亦宜汗多大便偏

閉固

產後發熱自汗者古歸芪湯汗甚加白朮防風牡蠣

者用猪腰子一枚糯米半合葱白二莖煮米熟取清汁一盞入人參當歸各一錢煎服。大便閉者古芍歸湯加防

風枳壳甘草閉澁者麻子仁丸或蘿蔔粥蓋產後去血通利麥門冬大便則多汗多汗則大便閉皆血虛也。鬱冒即血

暉。小便不通腹脹滿者用鹽填臍中葱白一束切作一指厚放鹽上以艾炷灸之熱氣入腹即通熱者當歸羊角湯。

六一散加檳榔枳壳木通麻子仁葵子水煎服。不語敗血使然者熟料五積散六君子湯。瘧熱迷心不語者葛根湯或瘧氣鬱滯閉目不語者用生白芍末一錢熟水調服。

濕痰迷

產後敗血停蓄上干於心心氣閉滯舌強不能言語者七珍散四味散。有臨產服湯葉過多胃溫

湯或瘧氣鬱滯閉目不語者用生白芍末一錢熟水調服。

乍見鬼神非邪忤

產後乍見鬼神者由血虛勞動肝心數見祟也宜小調經散加龍膽少許或妙香散加當歸地黃連

去芍藥加琥珀柏子仁遠志硃砂金銀煎服甚者黑龍丹。產後血少怔忡睡時不寧者十味溫膽湯或寧神膏定志。

志又有惡露常淋漓或因脬拘尤難住

產後王淋白茅湯敗血淋瀝不斷者烏金散淋久不止四肢乏力沉困者牡蠣散。有生產時被洗毋誤損尿脬以致日夜淋瀝者四君子湯加黃芪陳

皮桃仁用猪屎脬煮清汁煎溫服血虛者加芎歸牙開緊急手足瘻癰及血暉強直築心眼倒吐鴻飲死者

單荆芥散古刺歸湯血虛勞碌太早風邪乘虛而入者小續命湯羌活愈風湯如口噤反張漸潮多者交加散或大

黑豆半升㕮咀令細起以酒二盞次之入磁器內每用酒半碗入獨活五錢同煎溫服。產後汗多風搏成瘡者難治

產後敗血停蓄化水通經入四肢浮腫者小調經散

任是疾風井腫浮

產後中風名曰蓐風口噤

補榮衛不愈丹溪云大補榮衛為主雖有雜病以未治之常兼補兼逐瘀則病無是也假如月裏病喚男子一同但常兼補兼逐瘀經後血滯作痢一同四物湯加桃仁黃連木香主之裏急甚者

通玄二八丹。咳嗽多是瘀血入肺古二母散加桂枝加芍藥攻利一切雜症

角地黃發喘聲高難救護主獨聚於肺喘急孤陽絕陰氣無治之症單人參茯苓水煎其餘以意會之可也

衄黑如煤起乃變臭衄皆因產後虛熱所致胃絕肺敗腎者用血竭沒藥等分為末酒入水調服兼用奪命丹

陰門腫突腸不收產後陰肉兩旁腫痛手足不能舒伸者用四季葱入乳香末同搗成餅安於陰戶兩傍良久即愈。因產用力過多陰門突出者四物湯加龍骨末少許連進二服外用首脉子搗爛貼頸少收即

去草麻。產後生腸不收。入物湯加防風升麻湏用酒炒黃芪為君。外以荆芥藿香檬皮煎湯薰洗。

膜休羞惡

產後下一物如合鉢狀有二歧者。子宮也。補中益氣湯去柴胡連進二貼即收。

子宮脂

四物湯加人參調理。產後下一物如柏約重斤餘者。因臨產勞役或肝癥所致。有枯席不得上者。乃脂膜無妨。補中益氣湯去柴胡連進二貼即收。臨產驚動用力太過。以致育膜有傷垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛。却用熟絹五尺撮作數層。方令穩重。婦人輕小盛起肉線傳在肉線上薰之。覺姜冷又用熨斗火熨熱常使有姜氣。如姜氣已過。又用新姜如此薰熨一日一夜。其肉線已縮人一半。可用前法越兩日肉線盡入。却再服失笑散。溫古善歸湯調理。不可使肉線斷作兩截。則不可治矣。乳汁不通血氣虛氣滯塞者。戒鬱怒。產後氣血虛弱。乳房少者。用鍾乳粉二錢。漏蘆煎濃湯調服。即止。

不通血氣虛氣滯塞者戒鬱怒

產後氣血虛弱。乳房少者。用鍾乳粉二錢。漏蘆煎濃

湯調服。或用錦懸蹄一隻。通草五兩。煮汁食。或鰣魚木通者。汁食亦好。氣滯乳少者。漏蘆散氣塞乳。少者。湧泉故止。○丸。乳母但覓小水短少。即是病生。便湧服藥調理。脾胃多憂忿怒。憂思過則氣結而血亦結。忿怒過則氣逆。而血亦逆。甚則乳硬。脇痛煩熱。要之女病皆因氣血鬪結所致。亦逆甚。則乳硬。脇痛煩熱。要之女病皆因氣血鬪結所致。以古方多用香附砂仁木香欖榔青皮枳壳者行氣故也。怪疾乳長尺有餘。先賢治法仍詳具。產後來血。上攻忽直。乳伸長細小。如腸直腸。水過小。腹痛不可忍。名曰乳懸。危症。用川芎當歸各一斤。水煎濃湯。不時溫服。再用二斤逐旋燒烟。安在病人面前。桌子下。令病人曲身低頭。將口鼻及病乳常吸煙氣。未甚縮。再用一料。則瘀血消而乳頭自復矣。若更不復舊。用草麻子搗爛貼項上。片時收即洗去。

附胎殺禁忌

九胎後所在不宜修整。雖隣家興動孕婦當避。縱不墮胎。令兒破形色青。体瘦。竅塞天頃。

胎殺所在

正月在房床二月在廁戶三月在門堂四月在

在廁戶五月在身床六月在床倉七月在碓磨八月

在床房子丑日在中堂寅卯辰酉日在竈巳午日在門

申日在籬下戌亥日在房已上禁忌總要全不修理為高

房中遊神

癸巳甲午巳未丙申丁酉日在房內比癸卯

戊午巳日在房內酉甲辰乙巳丙午丁未日在房內東

遊神所在忌安床換帳致重物於床中必主墮胎

生子所向方

子午卯酉日宜西南寅申巳亥口西北辰戌

藏胎衣方

宜生氣方上正月子方二月丑三寅四卯五辰

如生氣方有不便依曆日藏於奏書博士月德方

上忌月空三殺太歲方上俗多置之河中者非

婦人終

小兒門

立秋申處暑白露

酉

秋分寒露

戌

霜降

亥

小雪

子

大雪

丑

小寒

寅

大寒

夏至未

立秋申

處暑

白露

秋分

寒露

霜降

亥

小雪

子

大雪

丑

小寒

寅

大寒

卯

立春

雨水

驚蟄

雷

雨

水

芒種

立夏

小滿

芒

夏至

未

大暑

立秋

申

處暑

白露

秋分

寒露

霜降

亥

小雪

子

大雪

丑

小寒

寅

大寒

卯

立春

雨水

驚蟄

雷

雨

水

觀形

察兇氣色

肝青心赤脾黃肺白腎黑九病而無先分部位

黃色不治春白夏黑秋赤冬黃者逆

先分部位

左頰青龍屬肝

應春青為有餘

右頰白虎屬肺

應秋白為不足

天庭額高

而離陽

應夏色

心火

紅主大熱青乃肝風印堂青者人驚頭紅者三焦積熱印堂至山根紅者心熱小便赤澁山根至鼻柱紅者水火驚紅者脾胃熱印堂連準

而坎陰

應夏色白腎虛

腎水

承漿色青食時驚或煩燥夜啼黃多吐逆紅者腎中氣病兩頤亦者肺熱

莫在面中

應四季準頭

脾應唇際

紅主渴蛔虫咬心頭者唇必反人中候小腸喜

深長惡平滿黑者鴻病死凡五岳亦者皆熱淡白者皆虛陳氏五臟驚積冷熱詩曰肝驚起髮際肝積在食倉肝

脾熱穴太陽肺驚髮際赤肺積髮際當肺冷人中見肺熱

陽位心熱而頰裝脾驚正髮際脾積唇應黃脾冷眉中岳

口角難醫

驚

掩

太陽不治

左太陽青驚輕紅色傷寒鼻塞蒸壯熱黑青乳積右太

青皆脾虛吐利亦有熱者

白乃肺

為寒肺氣不利

紫為熱熾者死青瘡

青蛇

狂

掩

太陽不治

文武臺

陽青驚重紅色風抽眼日黑者死紅至太陰者

內外有熱

連文臺者熱拯連武臺者漸生變症

年壽赤光

青蛇

多生膿血山根青黑瘡見灾危

必死黑色吐鴟因陰黃陽青驚重紅色風抽眼日黑者死紅至太陰者

青色霍亂紅色夜

朱雀貫於雙瞳火入水鄉

黑色吐鴟因陰黃陽青驚重紅色風抽眼日黑者死紅至太陰者

青蛇遶於四白肝乘肺部

青為肝風青乃食積

鴟而帶陽須防咳

而目竄視火紅光焰焰外感風寒金黃氣浮浮中藏積滯

青者傷寒危症

黑色吐鴟因陰黃陽青驚重紅色風抽眼日黑者死紅至太陰者

乍黃乍白痺積連綿又赤又青風邪痰瘧氣乏顛門成坑

紅色驚熱夜啼紅腫驚風瘧熱前額虛軟毋氣血弱後顛不堅父精不實血裏頭毛作穗焦槁者腑熱肉折皮枯者死

肝氣眼生眵淚脾冷涎流滯頤

正口紅色為平乾燥脾熱

白主失血青黃面目虛浮定腹脹而上喘眉毛頻蹙必腹驚積青黑者死

痛而多啼久病兩眉紅者夜啼紫色風池紅有風瘧將欲發橘氣也紅傷風有熱入裏

為不宜

風池紅有風瘧將欲發橘氣也紅傷風有熱入裏

左右兩頰似青黛箭為

客忤黃色瘀實紅主驚風赤者傷寒

風門黑主痴而青為驚

紅主驚

方廣光

滑舌而昏黯凶中庭天庭司空印堂額角方廣皆命門部位青黑驚風惡疾亦忌損陷

手如

數物兮肝風將發將手抱頭者死

面若塗硯兮心火似炙坐則愛

煙風寒之入。伸縮就冷煩熱之攻莊大脚小脾欲困而成

痲。目瞪口張勢似危而必斃噫五體以頭為尊一面惟神

可恃小兒諸病但見兩眼無精光黑睛無轉運日瞑無鋒芒如魚描眼狀或兩眼閉而黑睛朦朧者死或外若

昏困而神藏於內不脫者生黑珠滿輪晴明者少病眼白多睛珠或黃或小者稟弱多病目症內赤者心熱淡紅者

心虛熱青者肝熱淺淡者肝虛黃者

脾熱無精光者腎虛白而混者肺熱况乎聲有輕重之不

同聲急者神驚聲塞者痰聲戰者寒聲噎者氣不順喘者沉靜者齒積如生來不大喘哭聲啾唧者天啼有乾濕之

頓異沉靜者齒積如生來不大喘哭聲啾唧者天啼有乾濕之是驚楚煎聲煩燥者難愈燥促聲音者感寒而赤者風熱面青者驚風同黃

初作必先呵欠肝所主也面赤者風熱面青者驚風同黃者脾虛多睡者內熱心神不安者氣熱蒸

毫者，火之大發，忽然驚叫，乃火動氣虛必死，夜半發燒風，火之大發，忽然驚叫，乃火動氣虛必死，夜半發燒風，

不同枯膏梁，常布自殊於綺綯，雖由外以識中，勿刻舟而求劍。相見壽夭歌。身軟陽痿頭凹破脣小齊高肉不翫，萎縮色脆短聲啼遍體青筋俱不壽。尻腫臍骨若不能能踞能行能立死。臍深色老。

性尊持方是人家長命子。

察脉

小兒初生至半歲看額脉，週歲以上看虎口。三關，男子五歲，女人六歲，以大指土下滾轉分取

三部診寸

口三部脉

額脉三指熱感寒。額前眉上髮際下。以無名指中指食指三指按之，如俱熱感寒邪，鼻塞聲粗。

但冷。肺吐瀉脈不安。食指若熱，胸中滿，無名熱者，乳消難

上熱下冷。食中熱。食指為上。名指為下。若

指熱則七熱下冷來驚名中指詳

看皆與名中指熱

食指風氣命三關。

男左女右以左陽右陰故也。然陰陽男女均有兩手，亦當驗左應心肝右應

肺脾。於此變通消息可也。故有以左手紅紋似線者，發熱驚驚。右手紅紋似線者，脾積。兼驚三叉者，肺熱風痰夜啼。

風閉無脉，則無病。有脉，病輕氣閉，病重命關。脉紋短小，而色紅黃，外症又輕，則無妨。若直射三關，青黑外症又重者，死。

五色惟有紅黃安。

五色紅黃紫青黑，由其病盛色能加變。如紅黃之色，紫青黑之色，至於淡紅寒熱。

青驚積。

深青色或大小曲者，四足筋肉赤色，大小曲者水在表，火飛禽驚紅色，大小曲者人驚青帶黃者雷驚。

或紅或青如線一直者，是毋傷食所致。紫絲青絲或黑絲，隱七相雜以出，不出主慢脾風。深紅疹痘，是傷寒。

赤紅傷寒，痘疹空紅泄瀉。錢氏歌紫風紅傷寒，青驚白色，齊黑睛，因中惡黃即困脾端。○紋繩

停食紋細腹痛

多啼乳食不消紋多則主氣不和紋亂者病久紋曲者風熱盛

○終龜黑

射驚風頑

紋龜直射指甲必主驚風惡候紋黑如墨因重難治

○魚刺

又樣刺青色風開驚風

勞艱四水字

風關人驚多傳慢

○懸針青黑

風氣驚風盡

屬肝圓曲重

肝病或驚風或

○痙積

氣或驚風或

○大腸穢

風胃氣閉

○痙積

如環○流珠

紅點

○膈熱三焦

霍亂吐瀉陽鳴自

○長珠寒熱

腹痛夾積團

○來蛇乾嘔

○臓腑滯

為肝病左手則

○去蛇昏睡鴻

潺潺口反裏形感寒熱

頭目昏重心神驚悸倦怠四肢稍冷小便赤色

○反外

心神恍惚間

夾驚夾食風癇候

紋勢勢彎曲入裏者病

其有三閑紋如流珠流

米三五點相連或形於面或形於身危症尤甚

○氣痔向

外而順循可用力若紋勢弓反出外堅硬

裏風痔向外○斜左傷風斜右寒

○雙鈎三曲傷冷硬

○脉亂如虫痔蛔攢○鎗形痰熱驚風搐

○雙字食毒驚

○積難

孩兒三歲至五歲一指三關定其息浮洪

浮緩傷風洪緊

○傷寒人迎緊盛

○寒氣口氣盛傷食風盛數多驚急

虛驚虛冷沉遲

○實有積脉緊如索

弦索者緊者

是風癟沉緩湧知乳化難

○腹疼緊弦牢實大秘沉而

數者骨中寒弦長多是膈干風

弦索者緊者

是風癟沉緩湧知乳化難

○腹疼緊弦牢實大秘沉而

浮洪胃口似火燒卑細痔勞洪重嚙虛濡有氣和更兼驚

○浮洪胃口似火燒卑細痔勞洪重嚙虛濡有氣和更兼驚

○浮洪胃口似火燒卑細痔勞洪重嚙虛濡有氣和更兼驚

神不守舍。脉芤多痢大便血變蒸脉亦隨時移伏遲寒嘔無潮熱。伏結為前大後小童脉順前小後大必氣咽。大小不均物聚。

前大後小童脉順前小後大必氣咽者鬼祟。

四至洪來苦煩滿沉細腹中疼迫切滑主露濕冷所傷弦長客忤分明說五至夜甚浮大晝六至夜細浮晝別純陽六至號平和。五至虛。四至病三至脫。七至入至死。此是聖人傳妙訣。脈過寸口入魚際主遺尿驚搐。脉浮數身溫順沉大身溫順。沉細身冷逆。脾勞脉緊數臟實順沉細脾泄逆。虫痛脉眩滑身溫順浮大唇青逆。餘病順逆同大臥。

五臟形症虛實相乘

肝風

氣熱為外傷風。氣溫為內生風。

目直

熱則兩目俱緊不轉。凡自直無青者必發驚咬牙甚者亦發驚。

虛則咬牙呵欠。

當補腎治肝。腎氣丸如心乘肝實邪壯

熱而搐利驚九涼驚丸肺乘肝賦邪氣盛呵欠微搐法當

以腎氣丸補肝。瀉白散瀉肺脾乘肝微邪多睡身重發搐。

光以瀉青丸定搐然後隨所見症調治。

腎乘肝虛邪增寒可欠發搐。羌活膏所謂乘者猶乘車之乘。五臟相乘莫測

如肝病必先治肺補腎然後審

肝臟虛實而調之。餘臟倣此。

心驚

搐難言合面卧上竇煩熱舌強欲言不能叶哭。胸熱故歎合卧

既涼卑湯心湯導赤散小生耳散。

虛則困卧驚悸添驚

丸肺乘心喘而壯熱。瀉白散肝乘心風熱。大羌活湯下瀉

青丸脾乘心身熱瀉黃散腎乘心恐怖惡寒。硃砂安神丸

脾困倦身熱渴不食

實則困睡不露睛。身熱渴欲飲水或閉或泄。黃赤色瀉黃散。

虛則

吐瀉風生痰

虛則吐腥泄瀉白色多睡露睛。四肢漸次生風或有痰錢氏白木散異攻散理中丸。肝氣

醫學入門卷之五

五歲形症

三十

脾風泄而嘔。

二陳湯加黃芩。

心乘脾壯熱。

体重而瀉。羌活

黃芩蒼木草湯主之。

肺乘脾能食不大便而嘔。

散之。手搘眉目鼻面者。

耳桔湯主之。肺只瀉寒則不胸

躁脾惡寒而泄理中丸。

肺燥喘。

鼻乾手搘目盛或渴。

或白散大青膏主之。

散潤之。手搘眉目鼻面者。

耳桔湯主之。肺只瀉寒則不胸

病肺熱復有風冷胸滿短氣喘嗽。

瀉白散大青膏主之。

虛則唇白。

少氣喘無厭。

氣哽長出少氣先服益黃散而後

丸次真赤散。

阿膠散肝乘肺惡風眩冒喘嗽人參羌活散

腎乘肺增寒嗽清利百部丸脾乘肺体重痰嗽泄瀉四君

子湯加薑香乾

菖木香甘草。

腎寒畏明顱自解。

則黑陷小兒腎虛由胎

氣不充則神不足日多白睛畏明顱自開

火欲炎。

下竄者骨重惟欲墜下而縮身也足熱不喜衣裳

心火下於腎部腎氣九或正氣湯心乘腎內熱不

可更瀉。

又肺病重見肝虛症易治見肝熱症難治蓋肺病

寒瀉大抵五臟各至本位即氣盛不可更補到初愈位不

久則虛冷肝強實而反勝也經曰受所制而不能制謂之

真強法當先補肺而後瀉肝。

肺勝者當補肝瀉肺然數

久虛羸不可服瀉白散宜腎氣丸。

又肝病見秋肝勝肺也

宜補肺瀉肝輕者病退重者唇白如枯骨者死肺病見春

肺勝肝也心病見冬心勝腎也腎病見夏腎勝心也脾病

見四肢順者易治逆者難治五臟病機不離五行生剋制

化之理所以有臟腑虛實乘勝之病世俗不審此理往往

率指為外感內傷而用藥枉死此錢氏繫古之功大矣哉

死症

眼上赤脉下貫瞳人水火顚門腫起並發作坑

心鼻乾黑

燥肺肚大青筋脾絕氣

目多直視五臟俱絕

觀不轉睛止指甲

醫學入門卷之五

死症

三十一

黑色 肝絕 忽作啞聲 氣有出無入脈絕也 虛舌出口 心絕 嘺齒咬人 腎絕魚
口氣急 口如魚呷水之狀 是氣急肺絕 **啼不作聲** 肺絕 呕血既出 消食至是皆出來 必是死形 痰泄手足寒雖已。手足溫易已。凡病困汗乾目皮反口中氣冷手足四隅其卧如縛掌中冷者死。

乳子調護

養子須調護。看承莫縱馳。乳多終損胃。食壅即傷脾。被厚非為益。衣单正所宜。無風頻見日。寒暑順天時。初生三五令臥房堅頭抱出。六箇月方可與稀粥。亦不可將乳同喫五歲方可與葷腥。○養子十法。一要背暖。二要肚暖。三要足暖。四要頭涼。五要心肺涼。六要勿見異物。七脾胃當要溫。八啼未定勿便飲乳。九勿服輕粉硃砂。十少洗浴。

小兒病機

大半胎毒。小半內傷乳食。十分之一外感風寒。大半屬脾與肝。多因脾胃嬌嫩。乳食傷精則生心火。獨炎故肺金受制。肝常有餘。脾腎不足。

胎毒類急驚

天鈞。內鈞。撒口。繫口。噤口。慢脾。馬脾。癰瘍。夜啼。變蒸。龜胸。

初生

初生

初生何故便需醫

生下啼聲未出急用綿裹手指蘸生甘草汁。夏月和黃連汁拭口去其惡穢。稍定更以蜜調硃砂末一字抹入口中。鎮心安神解毒。○延生方。初生臍帶落後。取置新瓦上。用炭火四圍燒存性。若臍帶有五分。入飛過辰砂二分半。為末用生地當歸煎濃汁。調勻抹兒上。脣間及乳母乳頭上。一日至晚服盡為度。次日遺下穢濁之物。終身無痕。疹諸疾。十分妙法。胎熱。胎寒。胎瘦。肥。胎熱因母食。胎寒因母食。

感寒或傷生冷。胎瘦怯弱。黃白睛多。喜哭。身羸少薄。大便色白。屬肺宜預服長生丸。柏榔枳壳各一兩。木香五錢。砂仁半錢。丁香肉豆蔻全殼各二錢。甘草為末。每丸十九乳汁下。寬上實下。補脾化瘀止瀉。胎肥墮下肌膚血紅。五心煩熱。大便難。宜用浴牀法。白芷青黛烏梢蛇各一錢半。天麻五分。蠅稍硃砂各二分。半麝香一字。飛枝

一握。水煎十沸溫熱浴之。勿洗皆胎瘦者亦宜。胎寒身冷多瀉利。盤腸內釣痛無時。生後身冷口氣亦冷。腸鳴瀉利青黑。盤腸內釣心腹絞痛。不乳者。木香勾氣散。或白姜散。白姜木香官桂。樟皮。檳榔。桔梗。各等分。僵加木瓜丁香。面青肢冷去。或不眠而或腎縮。有生下不能啼者必因難產冒寒所致。急以綿絮包抱懷中。未可遽斷脐帶且將胞衣置灰火中燒之。仍作大油紙燃點燈於脐帶上。往來遍帶燎之。蓋帶連見脣得火氣由腑而入。更以熱醋湯澆洗。脐帶湧臾氣回。啼哭如常。方可浴洗。并斷脐帶。有腎縮者。乃初生受寒。用硫黃吳萸各五錢為末。研大蒜汁。盞腹上。仍以蛇膽

薰燒烟
生泡遍身或無皮。生下遍身如魚泡。如水晶碎則蜜陀螺為末。擦之仍服蘿合香。力。生下遍身無皮俱是紅肉者。乃脾氣不足也。用早米粉撲之。候生皮方止。胎熱懸離落地死。有泡以手指摘破。用帛拭血令淨。若血入喉即死。即

穀道無孔事亦奇

初生門急用金銀玉簪看其端的處刺穿或用火針刺不可深以密囊法套住緊急只以油紙擦套住內服四順清涼飲免其再合

因不乳甚。則手足常搐。眼常邪視。身常掣跳。宜連翹飲。五福化毒丹。梨棗飲。有不能飲乳者。用黃連枳壳赤茯苓。等分。蜜丸乳汁下。有生下而赤眼閉。二便不通。或有血水者。釀乳方。澤瀉五分。生地四分。猪苓赤茯苓。天花粉茵陳耳草各二分。水煎令乳母搘去宿乳服之。良久乳兒此。釀乳法餘皆倣此。有大小便不通者。乃心氣積熱。併於小腸急。用生地龍數條。蜜少許研匀敷陰莖上。內用蠶退燒。

灰入硃砂、船麝少許為末。入門冬燈心煎湯調服。有

不乳小便難者用乳汁四合、葱白一寸煎三沸灌之。

若兼腹脹難支持大便不通腹脹欲絕者令婦人以溫水漱

吸嘔三五次以紅

赤為度便即自通生赤如丹生黃疸

有生下身如丹塗者
散欒金桔梗甘草

天花粉葛根等分為末薄荷煎湯入蜜調服五分後用

藍葉浮萍木荳同研絞汁調朴硝生硃塗赤處○有生下

草天花粉葛根等分為末薄荷煎湯入蜜調服五分後用

肌肉紅白二膚後遍身面目小便皆黃大便不通謂之血

疽因母受溫熱或衣被大煖所致宜四物湯加天花粉等

分水煎服兼以鵝口口瘡急拭之

白滑滿舌如鵝之口者
心脾熱也用髮纏指頭

蘸薄荷自然汁拭淨如不能用保命散枯欒硃砂各一錢

馬牙硝五錢為末每一字取白鵝糞搗水調塗舌上及頸

頰內○口瘡者心臟積熱也用淡醋調南星末貼兩脚心

乳母服洗心散輕者用黃連或細茶為末少加甘草蜜調

敷之甚者用黃柏青黛片膾為末竹鹽調敷或前保命散

去鵝糞尤妙如滿口生瘡糜爛者用黃柏細辛青鹽為末

巴豆二粒入硃砂或黃丹土殊少許同搗爛剝開小兒二

巴貼之如四邊起粟米包急用溫水

洗去恐成瘡用菖蒲煎湯洗之立効重舌木舌齦曰重

心脾熱盛附舌根而重生一物如舌短小而腫曰重舌有

頰裏及上脣曰重脣著齒齦曰重齒當刺出血。月生耳刺

不爾則脹滿塞口。有妨乳食宜青黛散黃連黃柏各一錢

青黛牙硝辰砂各一分雄黃牛黃硼砂各一分片腦二釐

為末先用薄荷汁拭口後以藥末少許掺之咽瘡脣塞者亦宜。木舌心脾熱壅腫硬不和漸口塞滿口中亦能害人。用黃柏為末以竹瀝調點舌上甚者加朴硝白僵二症通用白草霜硝滑石為末酒調敷之。又弄舌舌絡微繫。時時脣出亦脾熱也。不可外薰當與鴉黃散漸服之。面黃肌瘦五心煩熱者胡連丸大病後弄舌者凶。有物生舌下生膜如石榴子連於舌根令兒聲不能發急摘齒之。面微有血以髮灰移之。有口內井牙齦生白點者名馬牙不能食或鵝口不同少緩不能救急以針挑出並用京墨磨薄荷汁以毋油髮裹手指蘸墨遍口擦之勿得發乳參

兒癆一時醒後與乳。再易擦之即愈。盡皆母熱遺於兒。

撮口

三四

撮口聚面氣喘急。胎家熱毒入心脾。

撮口風面目黃赤氣喘啼聲不出。胎熱流

毒。心脾則舌強唇青。撮口聚面。飲乳有妨。用姜鑪二枚。畧炒為末。蜜調敷唇中。或大利驚丸。或蝎稍散。蝎稍四十九箇。每箇用生薄荷葉捲定以綿扎之。砂鍋內炙炒。薄荷乾酥為度。再入姜鑪四十九箇。腦麝少許為末。用紫雄鷄肝

二片煎湯調服治一切胎風及百日內撮口。脣風如胎虛冷者。加川烏。蟻者另用辰砂膏。有初生七日患此者。急看兒齒齦之上有小泡如粟米狀急以青軟布裹

手指蘸溫水轉上擦破即閉口便安不用服藥。亦有脾肺虛寒者。撮口氣不和也。肺主氣口屬脾。虛不能

撮口氣急。保命用益黃散主之。口沫

腋冷不可為

口出白沫。四肢水冷最易惡候。一七見之必死。

噤口

噤口不乳不能啼。胎熱復為風搏之。噤口風眼閉啼聲清狀。吮乳不得。口吐白沫。二便皆通。由胎中受熱毒流心脾故形見於喉舌。或生下復為風邪搏之所致。宜瀉黃散。珠銀丸。○有初生口禁不開。不取乳者。用金頭赤足蜈蚣一條炙焦為末。每五分以猪乳汁二合和匀。外三四次灌之。或用竹沥調牛黃末一字。此症皆因裏氣鬱。吐痰利驚。最

灌之。更以猪乳汁點口中。此症皆因裏氣鬱。吐痰利驚。最得宜。噤口撮口躰風。三者一種。同因裏氣鬱閉。宜先用控香散。許為末。每一字茶清調服。或甘草煎湯探吐尤穩。却以猪膽汁點入口中。即瘥。次用人參養胃湯去蒼术半夏。新加木香。蘿子。乳母服。吹鼻。噴嚏還可治。吹鼻法。蜈蚣一隻。七箇。搘麥五分。為末。每一字吹入。鼻。再用辰砂膏利驚。即愈。吹鼻。搘麥。一隻。噴嚏可治。仍用薄荷煎湯調服。七朝見此十分危。胡

見此症者危。百日內見此症手足踰者亦不治。

躄風 附胎風

躄風風冷濕氣流

躄風因斷躄後為尿乳水濕

躄腫腹脹

四肢柔

其症躄腫突腹脹滿

或多啼搐防撮噤

若日夜多啼不能飲乳甚則發搐撮口噤

是為內搐不治丸躄邊青黑爪甲黑者俱死古方大利驚丸主之或用噤口條吹鼻法有嚏可治甚者金烏散金頭蜈蚣牛條川烏尖三箇生麝香少許爲末每半字金銀煎湯調服或外科審命丹一捻金妙如風搐稍定多啼煩

燥者大溫驚丸亦有熱在胸堂伸引努氣亦令

洗躄腫法用荆芥煎湯洗淨後以葱葉火上炙過候冷指

甲刮薄貼腫處次日便消

方服通心飲木通連翹瞿麥山楂黃芩各三分燈心麥門冬各少許水煎服通心氣

利小便退潮熱分水蕊兼治施蝶眼風如春月加防風蟬

頭髮燒灰皆可敷之○灸肚筋法兒生七朝處此者必自

發出青筋一道行至肚必生兩岔待行至心不治知者常

視其青筋初發速照青筋頭上灸三炷或行至生兩岔處

亦照兩岔頭上截灸六炷青筋自消兒必活矣○燻躄法

藥方見第一卷凡初生下時用綿裹躄帶離肚三十處以

線札住却於線外將躄帶剪斷片時去線待血流盡看近

肚處有兩小孔一大孔用鶯毛管送煉躄藥一二分入

大孔內以手指輕輕揉散艾灸躄頭三炷結作紓繒軟帛

腰裹切不可時常揭看待躄落去自無風矣又法落胎之

時視其躄軟者不須治如躄硬直者定有躄風急用銀簪

於躄根傍刺破一二處入麝香末少許艾灸三炷極妙

胎風癥症多嘔吐生者紅色注眉頭胎驚癪風乃孕婦嗜

風邪傷胎子乘母氣生下即病嘔吐搐掣口眼喝斜驚啼

疊短腮繩鱗開或頰赤或面青噤口咬牙眼合潮潤筋骨

拘攣。身腰強直。躄腫腫起。與噤撮同症。但胎風合眼與慢脾異。不可妄用溫藥。視其眉間氣色紅赤者碧者生青黯黑者死。治法解散風和利驚化涎。調氣安砂膏最妙。太乙散。天漿子。南星白附子。天麻。防風。茯苓各二錢。全蝎。砂各一錢。麝香火許。為末。每五分乳汁化下。治胎驚。

胎驚夜啼

上夜驚啼多疾熱。仰身有汗赤面頰。

月內夜啼驚惕抽掣者乃胎中受驚所致

宜猪乳膏。琥珀防風各一錢。砂五分。為末。用猪乳汁調一字抹兒口。或保命丹。金箔鎮心丸。驚有痰者抱龍丸。驚有熱者涼驚丸。龍腦安神丸。尋常邪熱夜啼者用燈花三顆為末。燈心煎湯調抹兒口中。以乳汁送下日二服。大糲有痰熱者。多上半夜。仰身有汗而啼。下夜曲腰必虛寒。

其則內釣手足掣。

夜啼氣虛者。四君子湯加山藥扁豆。挾熱加黃連竹葉並虛焦啼者用當歸為

末。乳汗調服。氣血俱虛。腹痛夜啼者。用黃芪當歸赤芍。本香草等分。為末。每桃少許。着乳頭上。使吮乳服之。有因胎寒及衣被過涼以致。臟寒盤腸內釣肚。腹脹痛。啼則眼目上視。手足搐掣。蓋夜則陰盛。寒則作痛。甚則陰盛。則驚受風邪。而啼面白。青白。腹覺冷。必冒寒。腹痛也。有因夜曲腰而啼。面白。青白。門腹覺冷。必冒寒。腹痛也。有因黃芩草各一分水煎服。或加南星為末。蜜調可貼額門。亦有傷乳食作痛。而客忤中惡哭黃昏。前後尤甚者。乃客忤中惡治詳。後客忤條。飲乳方。啼爛口舌。有欲飲乳到口便啼。身額皆熱者。看其口若無瘡。必候舌。熟者吞其口。若無瘡。必候舌。熱胎毒。胎驚得散。且無奇疾。要知類浴。東腹便成臍風。不忌生人異物。則為客忤禁口。驚啼乳食重服。則吐瀉。瘀逆過緩。則口舌瘡痍。過涼。則臟寒。釣氣調理之法。適中而已。

諸驚

神驚痰聚發風搐或因內熱風生肝

小兒元氣未充神竟未定或見生人異物

或聞厲聲響器驚入心之胞絡火炎舍空而聚痰生熱熟生風心肝脾病也又有心內積熱而驚惕肝內生風而

發搐痰延壅盛風熱併作所以暴烈緊急心肝病也蓋心主熱脾主痰肝主風相因而發謂之驚風痰熱可也謂之

驚熱風痰亦可也大要驚熱者殊少安神丸熱甚者涼驚丸虛者溫驚丸痰盛者辰砂化痰丸抱龍丸痰熱者滚痰丸驚風痰熱全者天麻防風丸古柴石丸。又有驚積者

熱睡中覺腹內有物跳動泻下如白脂辰砂是也治法量與辰砂膏疎導仍與調氣和胃而愈

內外夾驚成假搐不比真搐閉牙閑

其有搐攏友張斜視而牙閑不

內傷飲食夾驚而成謂之假搐非真搐內生驚癇也。內傷飲食壅熱或因食後遇驚謂之傷食夾驚身熱溫桂或

吐不思食大便酸臭先用人參羌活散加青皮紫蘇取表清積次用鴻青丸加辰砂麝硝桂枝鹽驚食睡挾驚熱者

寬熱飲痰積者白玉餅。驚食兩至四服橘樹淡壅盛者先與利驚丸消導次服啓脾散調脾。外感因驚虛風邪乘入心肝二經或內有積熱外又感風俱謂之傷風夾驚

神困昏憊頭疼口中氣龜而熱先用惺惺散參蘿飲人參羌活散或大青膏選用微表次與天麻防風丸。通用蕷赤散五福化毒丹濁青丸腎氣丸驚風用水銀輕粉巴

山梔枳壳大黃之類以代銀粉巴浦通利蓋濁青丸治肝細辛羌活青皮乾姜荆芥之類以代腦麝發散獨活柴胡

山梔枳壳大黃之類以代銀粉巴浦通利蓋濁青丸治肝熱尋衣直視或搐或不搐或臟腑發泄諸藥不止等症如驚熱出於心肺者宜桑白皮葶藶亦茯苓車前子山梔甘草姜棗煎服從小便利之藥赤散能濁肝風降心火最利

驚熱或加山梔羌活大黃又有驚癇驚癇挾一切雜症者又當以意會之參搐有虛實者逆順驚風痰熱四症輕者用各門藥可也

牙關緊急搖頭竄視張口出舌角反張身體掣顫手足搐搐四肢跳掣局方謂之入喉丸形之際印堂青筋三閑竈

口穀紅紫青皆驚風之候實熱為急驚屬肝木風邪有營陽症虛熱為慢驚屬脾土中氣不足陰症慢驚本無熱所以熱者虛使然耳故曰熱分虛實。男搐左視左眼上窓女搐右視右眼下窓男握手大指出外女握手大指入裏五指交如姜把者死男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此皆順反之則逆亦有先搐左而後雙搐者但搐順則無聲搐逆則有聲其指紋形勢彎弓入裏者

顛出外者逆出入相半者難痊故曰症別逆順

治分先

後與易難治瘧先於截風治風先於利驚治驚先於豁瘞

非瘧火併其間俱青眼窓入肺則面色淡黃嘔吐不食體一或有遺必生他症故曰治有先後雖然五臟多傳變無

火動則進於肺瘧火交作則為急驚或成喉痺瘧火結滯

汗多晡入肺則面色淡白喘息氣乏入腎則面黑齒齦乳交

牙。寅卯辰時搐者心火旺也當以益黃散補脾。未酉戌時搐者肺金旺也當以腎氣丸補腎。午未時搐者心火旺也當以腎氣丸補肝。子丑時搐者肝水旺也當以腎氣丸補腎。

水虛不挺確上旺也當以益黃散補脾。導赤散涼驚丸

心要知五臟傳變皆瘧為患。蓋瘧乃風苗水靜則伏於深

火動則進於肺。瘧火交作則為急驚或成喉痺。瘧火結滯

則為癇。或為咳嗽。瘧火來大則為驚。青皆由脾濕而來

所以驚風忌純用風藥。不問急慢當以養血藥為使。古方

保元湯加白芍

為慢驚羨劑也。

驚驚發搐牙關緊潮熱渴壅痰涎

驚入候俱全加以

口中有氣亦熱作渴引飲大便秘小便赤脉浮數洪緊原因內有實熱外挾風邪。風熱併作氣固壅塞所以百脉凝滯

開竅不通。發時暴烈。發過如故。百日內見此症二三發不止者亦死。

先與和氣通關竅痰因

氣鬱氣順則痰化而搐自止矣。先宜蘿合香丸薄荷煎湯入姜汁化下順氣下痰通竅或星香散開關用前吹鼻法。

或用天南星一錢片腦少許為末。生姜汁調蘸藥於左右大牙齦上擦之。牙熱即開

次截風搐清心

田 珠砂全蝎各一錢。蘭香少許為末。蜜丸梧子大。每丸薄荷煎湯化下。治驚風痰搐。定搐散。蜈蚣一條。麻黃南星白附。姜蠶羌活代赭石。蝎稍姜黃珠砂各一錢。麝香五分。為末。每一字荆芥葉蕪煎湯下治急驚。定搐。如搐不止。加烏蛇肉。牛黃清心丸。

退下之只用抱龍丸

(膽星一兩。天竺黃五錢。辰砂雄黃各二錢半。麝香一錢為末。蜜丸芡實大。其草薄荷煎湯化下一丸。痰壅嗽甚。姜湯下心虛湯。人參琥珀煎湯下。蓋抱者保也。龍者肝也。肝應東方青龍。主蟲癰。冤安則驚。自定理小兒諸驚。四時感冒瘟疫濕痰和熱。以致煩燥不寧。痰嗽氣急。瘡疹出發。搐常服祛風化痰。鎮驚解熱。和脾胃益精神。又治蠶毒中暑及室女白帶。用鹽少許。細麝一二丸。新汲水下。牛黃抱龍丸。膽星八錢。雄黃人參茯苓各一錢半。辰砂一錢二分。姜蠶三分。鈎藤一兩半。天竺黃二錢半。黃二分。麝香五分為末。用其草四兩煎膏和丸。芡實大金鎖為衣。陰乾藏之勿泄氣。每近微火邊。每服九丸。或半丸。薄荷煎湯磨服。治一切急慢驚。

利後瀉膽

利後瀉膽

及諸熱藥。○僵仆不醒者。用初生條浴法。安神丸。芩遠志砂。天麻菖蒲。天門冬。酸棗仁。甘草各等分。為末。蜜丸如豆子大。砂為衣。每一丸。燈心薄荷煎湯化下。治驚風已退。神冤。膽志未定者。定冕丸。人參琥珀。蒺藜。桑白皮。酸棗仁。甘草各等分。為末。微火邊。每服一丸。或半丸。薄荷煎湯磨服。治一切急慢驚。

醒脾防癲

醒脾防癲

慢驚。天麻木香各五分。全蝎二分半。姜棗煎溫服。或為丸服。治小兒脾困昏沉。默不食。吐瀉不止。痰作驚風。

慢驚吐瀉。涎喘鳴。神緩眼開。睡露睛。搐搦乍靜。又乍發身熱。或冷面黃青。眼半閉半合。似睡不睡。十指或開或合。似沉身。或涼或熱。或吐或瀉。或不食。或食乳。或不乳。各半陰半陽合病。即如傷寒半表半裏也。陰症自陽。

宜細認。陰症慢驚。自陽症急驚。傳來。經吐瀉便是慢隨。驚。男子以瀉得之為重。女子以吐得之為重。

班生胃截風形 因吐瀉得者理中湯加木香或五苓散。脾
味木附湯附子白朮各一兩內豆蔻一箇木香甘草各五
錢每二錢姜棗煎服治吐瀉後脾虛變成慢驚身弓髮直
吐乳。貪睡汗多宜此溫寒燥濕行氣健脾。因下積取轉
得者先與木香勾氣散。因外感寒邪得者先與桂枝解肌
湯輩因夏月脾胃伏熱大吐瀉得者當解暑熱不可專一
回陽其他久嗽久痢傷寒變陰過服涼藥之類可以類推
尚有陽症蟬蝎散初傳尚有八候陽症在者但於生胃氣
中加以截風定搐如全蝎花蛇姜蠶草二錢半每五分姜棗煎服
白附子干麻南星輩可冷可熱均平陰陽不必專一回陽
○方傳楊鷺者蟬蝎散全蝎七箇退十箇南星一箇甘草
人事者保命丹吐瀉痰壅者來復用慢驚外無入候但吐瀉不止者烏蝎散人參白朮茯苓甘草川烏
各一分姜棗煎服如再服即去川烏
○方傳楊鷺者蟬蝎散全蝎七箇熟硫黃一錢為末生姜汁為丸。量百大每十
厥冷回陽硫附進流附丸生附子尖二箇蝎稍七箇熟硫黃一錢為末生姜汁為丸。量百大每十

若是純陰烏蝎星

傳

左水飲下兼治慢脾風散冷或蝎稍餅一金波丹膏砂丹或四君子湯加附子助胃回陽身緩礞石與
五靈錢入砂鍋內炭火煅紅候冷為水蒸餅丸菉豆大每二丸急驚薄荷荆芥煎湯下慢驚慢脾木香煎湯下但礞
硝雖能利瘀非胃家所好故以木香佐之能裹痰隨大便出而無糞來不動藏腑始知藥妙。痰搐忌下者靈脂
五靈脂白附子木香姜蠶各一分全蝎半分珠砂一錢南星五錢為末醋煮生半夏糊丸麻子大每三丸姜湯下
安神散全蝎四箇塘水浸一宿用南星一箇開一竅入蝎
取出去南星用全蝎為末每一字磨力水調服亦治搐諸
星五錢為末。一字磨力水調服亦治搐諸星五錢為末
任內以南星末蓋口麪包火腿赤色埋土中一宿去盡
取出去南星用全蝎為末。一字磨力水調服亦治搐諸
星五錢為末。一字磨力水調服亦治搐諸星五錢為末
但脾間痰涎虛熱往來眼合者脾因神迷痰涎亦有不
延凝滯難療亦有不由急慢風傳次而至者頭低搖睡顎
慢脾 風 微搐眼全閉由慢驚後吐瀉損脾已極故曰脾風
延殊砂涼心皆為純陽實熱者設虛者全要斟酌用之
延凝滯難療亦有不由急慢風傳次而至者頭低搖睡顎

汗多舌短或吐頻頻嘔口噤咬牙身冷不和以手摸人聲又小生胃回陽奈若何初傳慢脾陽氣未甚胎者白姜姜附子各一錢爲末煮半夏麌爲糊丸如麻子大每五丸姜湯下風盛四肢厥冷者黑附湯附子三分木香一分半白附子一分甘草半分姜煎服得手足溫竊省爲度次以四君子湯加附子或異功散以溫中正氣脾困不食者附子散吐瀉者加味木附湯飭附丸重者來復丹金液丹

馬脾風因肺寒甚咳嗽齁喘症最危

寒邪停留肺俞寒化爲熱亦生瘧喘覶逆

上氣肺脹齁喘俗云馬脾風若不速治立危宜抱丸丸或馬脾風散辰砂二錢半輕粉五分甘遂一錢半爲末每一字用溫鹽少許上滴香油一點抄藥在油花上沉下却大糴水灌之神妙

先宜惺惺散參蘿故人參卷活散次服保

蘿保命便能痊命丹全蝎十四個防風南星僵蚕姜桂各一錢麝香五分有熱加牛黃片腦一方加羌活爲末粳米飯搗丸皂子大金箔十片爲衣初生兒半丸乳汁化下十歲已上兒二丸鈎藤燈心煎湯或薄荷金銀煎湯化下治初生臍風撮口夜啼胎驚內鈎肚腹堅硬自竄上視手足搐掣角弓反張痰涎壅盛一切急驚及慢驚尚有陽症常服安神化痰如天鈎加犀角天槳子雄猪膽汁爲丸井水調化一丸入鼻內冷頭次以鈎藤煎湯調服凡外感夾驚亦宜此法防之

癇症

驚風三發則爲癇症病關五臟似驚風心癇面白赤目澄吐鎮心丸或鎮心丸遠志雄黃鐵粉琥珀各二錢辰砂二錢射香五分棗肉丸黃豆大金銀箔甘片爲衣每一丸麥門冬煎湯化下肝癇面白青上竄手足拳抽掣反折散風丹膽星二錢羌活獨活防風天麻人參荆芥川芎細辛紫蘇葉各一錢爲末蜜丸梧子大每二丸大者三四丸紫蘇煎湯化下亦治剛症脾癇面白黃直視腹滿自利奴聖丹代赭

石雄黃蝎霜辰砂杏仁各二錢。輕粉麝香各一字。巴豆二粒。爲末。棗肉丸梧子大。每一丸。杏仁煎湯下。○肺癟。面白反視驚掣。吐沫潮涎。天星丸。膽星全蝎退各二錢半。防風白附子天麻姜蠶各一錢半。麝香五分。爲末。棗肉丸。菜豆大。每三丸。荆芥生姜煎湯下。○腎癟。面黑晦。極目視人口吐清沫。如尸不動。腎癟湯獨活麻黃川芎大黃甘草各六分。姜體柔時醒與症別。風驚食癟治不同。○小兒血氣未

煎服。煎服。爲風邪所傷者。名風癟。屈指如數。有熱生痰。宜先疎風。然後清痰散熱。安神定搐。散風丹。因驚者。名驚癟。駭怖積驚啼叫。恍惚。宜先治驚。然後清三焦。去熱化痰。紫石散。或定魄丸。用青黛一錢。爲衣。金銀薄荷川芎煎湯化下。○因驚食者。名食癟。或食時遇驚。停乳。大便酸臭。或結痞。先寒後熱。宜先消積。然後治癟。又有痰火作癟者。宜止痰。泻火。安驚紫霜丸。用蝎稍煎湯下之。或醒脾散。爲丸服。○諸癟通用荆芥穗二兩。白芷一兩。半生半枯。爲末。糊丸。黍米六硃砂。爲衣。每日丸。姜湯下。○急驚三癟丹。蜈蚣一條。南星二錢。全蝎。防風。遠志。白附子。蘆薈。玄胡索。辰砂各一錢。麝

香一字。金銀箔各三片。爲末。糊丸梧子大。每一丸。紫砂菖蒲煎湯下。○慢驚來復丹。薄荷泡湯化下一二丸。得利即愈。凡驚風對症。用藥已効。若覺未甚。蘿省可再服。數丸。凡癟症方。前起耳後高骨間。必有青紋。紛紛如線。見之急恐。爲瓜破湏令血出。啼叫尤得氣通。凡澣洗兇衣。不可夜露。常見人羞怕。其色變易。不常。見人羞怕。○陽癟身熱陰癟冷。○陽癟身熱。仙掣。啼叫。仰卧。瘡身冷。不掣。不啼。伏卧。面黯脈沉。病在臟。難治。○陽癟忌涼藥。古方治陰陽癟。用代赭石。火煅。醋淬。爲末。每箇用薄荷葉裹湯泡一時炙黃。爲末。竹罐丸。黑豆太。言者。用南屋濕紙煨香。爲末。每一字雄猪膽。升調服。効。○癟愈後復作者。斷癟丹。○久癟氣血不足者。活虎丹。○久癟氣血不足者。活虎丹。能審乎心。未溫陰卧。

一身強硬為症。症終日不醒。分剛柔。

先

語

而發者名剛。發者名剛。

症當解。凡柔症理中剛麻葛。

柔症理中湯

症當發

汗先肢冷而

熱。先肢冷而

熱。

症當發汗先肢冷而

癆續命投。

斷癆丹

小續命湯

通用斷

癆續命投。

詳難病及傷寒門

客忤

客忤異物暴觸驚。心氣不足遇人客或異物。則狀若癆風眼不竄。吐沫癲癰。喘腹疼。雄麝千金龍膽灌。

雄麝散。雄黃分。麝香一字。為末。每一字刺鷄冠血調灌之。仍以毋衣覆身。即愈。或釣藤散。千金龍膽湯。保命用。外用龜心土。蚯蚓等分。為末。醋調為丸。摩兒頭及五心。詳前夜帝條。○有申馬汗氣臭忤。或馬鳴驚忤者。用馬尾燒烟。頻薰兒面。以瘥為度。或先用姜湯調下。蘿合香丸。次用豆豉水濕搗丸。鵝子大摩兒頭七。及足心。各五六遍。次摩脐心。及上。下。良久。

天鈞

天風外觸內熱痰。痰因乳母愛酸鹹。

天鈞屬陽。由乳母酒食煎炒鹹酸過度。毒氣入乳。遂令芽兒心肺生熱。痰鬱氣滯。加之外感。

風觸動。卒然目直身強。如魚上鉤之狀。故曰天鈞。

搐熱

眼翻如邪祟。

非熱驚搐。手足抽掣。眼目翻騰。或啼或笑。喜怒不常。如邪祟狀。甚者爪甲亦

青藍通用釣藤并保命。

釣藤散。人參犀角各五分。全蝎。天麻各二分。其草一分。水煎溫服。

風熱勝者保命丹。痰盛者抱龍丸。熱痰者滾痰丸。腹內跳動。宜寬熱飲。泄下惡臭。然後與調和脾胃之藥治之。此等不可誤作驚風。

內鈞

內釣內臟抽掣痛。即釣暘氣原因胎驚胎風動。胎中風氣壅眼有紅筋血點身反張唇黑偃啼外腎腫吐瀉方子外搐來內外垂攏實可恐誰知至寶釣藤膏調氣鎮驚疎風內外共

驚風內釣腹中極痛偃啼向青皮冷屎如米泔者釣藤膏乳香沒藥各三錢木香姜黃各四錢木鱉肉十箇爲末蜜調成劑收砂罐內量兒大小加減釣藤煎湯或四磨湯化下次服五味木香散川練肉七箇用巴豆卅五粒去皮同炒豆黃去巴豆木香史君子玄胡索茴香各一錢爲末量兌大小加減米飲調下○內釣冷痛者古方歸湯加乾姜肉桂等分丁香沉香青皮小茴減半水煎服○痛甚者魏末散義术五錢阿魏一錢先用溫水化阿魏浸義术書夜焙乾爲末每一字紫蘿煎湯或米飲調下○內釣腹痛驚啼者乳香九乳香五分沒藥沉香各一錢蝎梢十四箇檳榔一錢半爲末蜜丸梧子大每一二九菖蒲釣藤煎湯化下○內釣陰腫便祕者歸牛散○以上皆調氣疎風

定巢丸以鎮之
荆芥散者宜盤腸腰曲重嘔攻盤腸痛因寒熱亦腹痛多喘與之相似但痛則曲腰乾帝額汗爲異古方用白荳蔻砂皮陳皮香附義术甘草等分爲末紫蘿煎湯下○重與內釣相似但重痛久心斗哭合眼嘔吐涎沫清水龐瘦面青黃或寒或熱沉默不知病處發作有時爲重丸主之○一切積痛盤腸重痛者通用沉乳感應丸香乳香杏仁木香丁香各一錢肉豆蔻一箇百草霜一巴豆十四粒爲末酒煮過黃蠟和丸菉豆大每四丸姜湯或釣藤煎湯下痢疾亦宜中風不語爲異治種盤腸重症中風三種俱似內釣但中風不語爲異治大人一同小兒有中風後瘡不能言者用木香陳皮草煎湯吞肥兒丸內有黃連能去心竅惡血故也○有風喘促延潮寢視者用阿膠紫蘿鳴梅人參煎服並阿能育神驚風後眼中瞳子不正者最宜

疝氣

疝氣亦因胎患得

有因父服熱藥以致氣滯於下者有因地而得者孕婦傷寒啼哭冷氣入胎中而成此疾者

又有木腎有腎腫有腎癰有偏墜有癩疝有奔豚有疝瘕與大科同

面青吐沫陰囊腫

甚則小便

淋泄陰囊腫痛者用甘草汁調地龍糞塗之○風熱外腎掀赤腫痛日夜啼叫不數日退皮如鷄卵壳愈而復作者

用老杉木燒灰入膩粉清油調敷神妙

小腹痛連腰背傾

諸疝皆因腎虛寒

膀胱之經留而不散故陰核腫硬沉墜治法先宜疏利次用逐寒溫臟之藥按穴灸之惟木腎腎癰瘡毒之氣入於

腎經久則成膿治法外用拔毒之藥敷貼內服消散癰毒排膿利水道等藥

先宜疎道歸牛散

肉桂牽牛各五錢當歸大黃桃仁各二錢半全蝎一錢每

錢入蜜煎服利後以青皮陳皮枳苓木香砂仁甘草生姜煎服和胃吞青者死治疝氣

次與和胃羨金鈴散

金鈴散一兩

外腎鈎上陰囊偏大通用鈎藤膏魏木散

變蒸

變則氣升蒸則熟。變者變生五臟蒸者蒸養六八蒸十變

長氣血

小兒初生形體雖其臟腑氣血尚未成就而精神志意魂魄俱未生全故三十二日一變六十四日

一蒸尤遇一變即覺性情有異於前上唇中心有一點白者是也初生至三十二日一變生癸水屬足少陰腎主精至六十四日一蒸二變生壬水屬足太陽膀胱其發耳與尻冷至九十六日三變生下火屬手少陰心主藏神其性為喜至一百二十八日二蒸四變生丙火屬手太陽小腸其發汗出而微驚至一百六十四日五變生乙木屬足厥陰肝主藏主藏魄喜笑至一百九十二日三蒸六變生甲木屬足厥陰肝主藏其發兩日不閉而赤至二百二十四日七變生辛

金。屬手太陰肺。主藏龜生聲。至二百五十六日。四蒸入生庚金。屬手陽明六腸。其發膚熱而汗或不汗。至二百入十八日。九變生巳土。屬足太陰脾。主藏意與智。至三百入十日。五蒸十變生戊土。屬足陽明胃。其發不食腸痛而吐乳。又手厥陰心胞絡與手少陽三焦二經俱無形狀。故不能言語。知喜怒。故天始全也。十一變後六十四日為一大蒸。計三百八十四日。養其經脉。手足故手受血而能持物。足受血而能行立。又六十四日為二大蒸。計四百四十八日。則言語意志有異於前。又六十四日為三大蒸。計五百一十二日。變蒸既畢。學語倚立扶步能食。而脉筋骨皆牢。稟氣盛者。暗合而無外病。稟氣弱者。乃有蒸病。

潮汗微似驚。似驚五日乃解重則壯熱。吐且渴。重則壯熱。脉亂而數或吐或汗。或煩啼燥渴。七八日始解。與傷寒相似。亦有蒸之後續感寒邪者。如蒸於肝。則目昏微赤。蒸於肺。則癰腫。或蒸於四肢。則四肢微發其汗。若吐二

軟毛聾。隨症調治。

治貴平和汗下微者。微止之。不可妄治。宜于水

飲子。白茯苓一錢半。人参。甘草各五分。升麻二分。稟受。附子。加白术一錢。水煎服。變蒸前後三日。各進一服。可免百病。及百口。內亦宜。

● 吐瀉不乳。多啼者。和氣散。木香。香附。厚朴。人參。陳皮。藿香。甘草各等分。姜棗煎服。宿乳者。梨。桑附草各二分。龍膽草。防風各一分。水煎服。

● 有寒無熱者。當歸湯。當歸四分。木香。辣椒。桂。人參。甘草各二分。姜棗煎服。

● 热寒甚者。紫陽黑散。積熱寒。熟如瘡者。梨漿飲。

龜胸龜背

附解顱頸填頸陷滯頤

龜胸肺熱百合丹

雄孕及乳子時。多食五辛炙燙。淹癰生

受熱也。行動喘乏。但遇風寒。或多食。則痰嗽氣急。喘。肺經體瘦。久而不治。將成瘠勞之疾。百合丹主之。大黃三分。天門冬。杏仁。百合。木通。桑白皮。荳蔻。石薺。各五錢。為末。蜜丸。如豆大。勿服。一十五丸。食後臨卧。熟水吞下。

醫學入門卷之五

龜胸

四七

醫學卷之三

四十七

龜背客風松藥驗

嬰兒生下不能護背。客風吹背入於骨髓所致。或小兒坐早僵後背高如龜多

或瘡疾間有灸肺俞膈俞炷粟米大艾三五壯收功。內服松藥丹松花枳壳防風獨活各一兩麻黃前胡大黃桂心各五錢為末煉蜜丸如黍米大。每服十九。或三十九。粥飲下。量兒大小加減用之。或外以烏龜屎點脊骨縫中。效。

解顱原是腎家虛

小兒年大頭篋開解而不合。腎主髓腦

髓欠少如木無根不過十日終成廢人。宜腎氣丸。或八物湯加酒炒參連外用南星白欵為末。醋調搘紅帛上烘熱貼之。或顱頭骨燒灰。油調敷縫中。外作頭布遮護其父母宜服腎氣丸。虎潛丸。俾精血充足。後育子女無是患也。

風熱顱填脾虧陷

顱填者。顱門腫起也。脾主肌肉乳哺不

不調其氣上衝填脹。顱高而突。毛髮短黃。自汗若寒氣上衝。則牢鄆宜溫之。熱氣上衝。則柔軟。宜涼之。劑量輕重。薰與調氣。又有肝盛風熱交攻。以致顱填突起者。鴉青丸。如因驚熱者。驚風即至。○顱陷者。顱門成坑也。始因臘月

濡顧熱者胃火炎冷涎胃弱不收飲

滯清。挾顱間也。○熱涎

稠粘者乃胃火炎上也。宜通心飲或潤自流者。乃胃虛不能收約也。宜木香半

香各五錢。白姜白术青皮陳皮各二錢。蒸餅丸。麻子大。一歲十九。二歲倍之。米湯灌下。

五軟五硬

五軟皆因稟受虧行遲語遲齒髮遲

脚

軟者項項軟手軟

弱者直補脾。胃有傷寒不及發表咸著桂心熟地。防風甘草各等分為末。每大黃丸。防風三錢。人參赤茯苓各一錢半。桂心熟地。防風甘草各等分為末。每大黃知母各一兩。為末蜜丸。菉豆大量。兒大小食後茶清

下。兼治痘後目赤腫痛。○有風氣入眼。
柱丸。蛇含石一塊。火煅醋淬七次。薑金
飯丸。龍眼核大。每一丸。荆芥煎湯或金
星等分。散木鱉子六箇。草麻子六十箇。俱去壳
摩項上。令熱後。用津液調勻貼之。勿
動也。所受肝氣。兩手筋縮不能舒伸。蓋
秦艽酸棗仁附風羌活各一兩。為末。蜜
至二丸。麝香荆芥煎湯化下。○脚軟行
血不充。筋弱不能束骨。宜腎氣丸。加牛
膝各五錢。桂心防風當歸黃芪各二錢。
大。每一丸。或三丸。溫酒化下。三歲不能
行者。用五加皮。牛膝。五加皮。鹿茸五
兩。牛膝木瓜各五錢。為末。每二錢。米飲
有脚指。縮無力。不能展伸者。海桐散
歸熟地片。膝各二分。山茱萸。桑白皮。當
鶴膝風。俗云誠樅風。乃腎虛精髓內耗。
不榮。日漸枯瘁。如鶴腳之節。宜腎氣丸。
加五加皮。鹿首牛膝。各一錢。為末。蜜丸。
不藥。日漸枯瘁。如鶴腳之節。宜腎氣丸。
九遍身筋軟者。鹿茸四斤。加當歸青
藤。○身軟肉少。皮膚自離。飲食不為肌
神不足。舌本不通。四五歲猶不能言。菖
蒲丸。石菖蒲。人參。各一錢。為末。蜜丸。
語遲。嬰兒在胎。母卒有驚怖。驚氣乘胞
九。麥門冬。遠志。川芎。當歸。各二錢。乳香。珠
九。麻子大。每十九米飲下。○諸病後不
能語者。鶴頭一箇。鳴蟬三箇。俱炙焦。大黃。川芎。
木通。各五錢。當歸。黃芪。遠志。麥門冬。各
豆大。每五丸。空心米飲下。久服取効。
則蘆不能充骨。宜腎氣丸。或十全大補
用當歸。川芎。芍藥。山藥。沉香。甘草。各等分。
至廿一日。當生。髮遲。乃血氣不能上榮。
川芎當歸。芍藥。熟地。各等分。胡粉。減鹽
水。或因吐瀉後致者。可以濡助。膏囊。其
法以成無棄篤疾。

五硬強直本風症若薰腹硬蒸積醫五硬者頭項四肢強也。宜小續命湯。烏藥順氣散主之。腹大骨痛不寬者。五積散加烏藥姜蠶殼消氣散治愈。若心腹俱硬面青者死。

丹毒 附胎瘡

丹毒遊行走遍身。病因濕熱逼心君。用名不一。皆由毋食或不甚乾即着濕熱侵淫。心火驟盛。以致毒物而搏而風乘之。所以赤腫遊走遍身不定。其始發於手足或頭面胸背令人煩悶腹脹。其熱如火。痛不拔毒涼肌審起處。治法可言。若入小腹陰囊如青傷者死。針泛去血。外用拔毒涼肌之藥敷。從頭項上起。用葱白然汁塗。○從頭項上紅腫痛。川赤小豆為末。鷄子清調塗。○從面赤腫。呂龜心土末。鷄子清調塗。○從背起。用桑白皮末。羊脂調塗。○從惡背赤腫黃色柳木燒灰水調塗。○從兩脇虛腫。明生鐵剉末。入猪糞水調塗。○從脣上腫起。用檳榔為末。醋調塗。○從兩脚亦腫起。用乳香為末。

羊脂調塗。○從兩脚赤白點起。用猪槽下土為末。滑油調塗。○從陰上起。用屋漏處土為末。羊脂調塗。○錢氏通用朴硝土研為末。藍葉浮萍水苔同研絞汁調塗。或用朴硝一兩。大黃五錢為末。新汲水調時時塗。○九丹毒交易非輕。如經三日不入裏內。消可救人。毒氣入裏腹脹則死。治。投入臍腑即死。○當歸片或茄蒂亦好。其草羌活黃芩各五錢麝香五分。為末。每二錢生地黃煎湯調服。○通用五福化毒丹。犀角消毒飲。四順清涼飲。人參敗毒散。加紫草。或升麻葛根湯。加白木茯苓木香枳壳。大抵以清心火去濕熱為主。勿令毒酒。有不可服。京藥者。惺惺散妙。歲生瘡遍身。先服五福化毒丹。或犀角消毒飲。外用父小便鵝糞蘸刷。濕者青黛末。乾者蜜蠻。更與丹毒通用條參看。

內傷乳食類

吐瀉

腹脹

腹脹

腹脹

腹脹

腹痛

吐瀉

吐瀉初生怎可當

脾虛則瀉胃虛則吐。脾胃俱虛吐瀉不下。但嘔黃斗者。木瓜丸。木瓜膾粉木香檳榔。初生惡物未

為末。麪糊丸。小豆大。每一二丸。甘草煎湯下。初生吐瀉不止者。殊砂丸。殊砂南星巴霜各等分。為末糊丸。黍米大。每二丸。薄荷煎湯灌服下之。後以殊沉煎調之。殊砂二錢。

藿香三錢。滑石五錢。丁香十四粒。為末用新汲水一盞。麻油滴成花。抄藥五分在上。湏臾墜下。澄去水。別用溫水下。

○初生吐瀉壯熱不思乳食。大便色白或不通者停乳也。先宜於霜丸下之。後用香橘餅。木香橘皮青皮各二錢半。

厚朴神曲麥芽炒仁各五錢。為末蜜丸。芡實大。每一丸。紫蘿煎湯。米湯任化下。或加肉豆蔻。诃子。一切令積泄瀉俱

効治者先分身熱涼寒。吐腥臊瀉青白熱。吐酸臭瀉色黃。

○內傷熱食或外感暑熱。古方吐瀉身涼者觀冒散。○吐瀉身熱亦渴者。錢氏白朮散。○吐瀉身溫或衣寒衣熱不

忍乳合或食乳難化。大便青白。此上實下虛也。先宜益黃散。後宜四君子湯。隨王臟見症。辨減如吐瀉肢厥。顛倒。加

藿香丁香。脾虛生風。多因加半夏。陳皮。厚朴。傷風加川

許。驚啼。瘧疾。睡卧不安。加全蝎。鈎藤。白附子。赤白痢。歸芍。粟米。白痢加乾姜。粟。酒瀉加陳皮。厚朴。傷風加川

芩。防風。羌活。細辛。發渴加乾葛。桃杷葉及木瓜少許。挾風

必定增寒熱。增寒壯熱時有頭疼咳嗽氣促。大槩熱者。官先服大青膏。或釣藤散。發散後服益黃散。補脾土故也。外症必

益黃散。補脾。後服大青膏。或釣藤散。發散如吐瀉。風冷者。先服

穀者。乃陽風也。大半湯。瀉作渴溺澁者。五苓散。○壯熱體重。吐酸瀉寒。

多腹痛急渴。寒月止瀉白色不渴者。益黃散。腹痛者。利平胃散主之。虛者異攻散。○瀉作渴溺澁者。五苓散。○壯熱體重。吐酸瀉寒。

獨者。濕熱也。羌活黃芩。蒼朮。甘草等分。水煎溫服。

中丸。肢冷加附子。○久不止者。沒石子丸。

沒石子一箇。白豆蔻五箇。訶子二箇。木香黃連各一錢。爲末。飯丸。麻子大。每十五丸。米飲下。兼治癆瘍釀瀉。○暑月。吐瀉色黃引飲者。誘行丸。或玉露丸。石羔寒水石各一兩。甘草五錢。爲末糊丸。黃豆大。每一丸冷水下。吐不止。姜湯下。○久不正者。古連柏丸。黃連黃柏各一兩。爲末入猪膽汁內。煮丸。菉豆大。每廿丸。米飲下。○指論二症多見於夏秋。如立夏前後濕熱時。行暴吐瀉者。蘿蔔湯夏至後此瀉身熱。或傷乳食瀉深黃者。益元散合四苓散加蒼朮。爲末溫水調服。大暑後吐瀉身溫。或傷乳食瀉黃白者。食前服益黃散。食後服益元散。立秋後吐瀉身涼不食。多睡多歲。不渴者。頻服益黃散少服益元散。秋分後。吐瀉身冷不食。瀉青褐色水者。益黃散。瀉臭嘔乳食必傷內傷乳食不化。面黃腹脹。瀉如抱壞鷄卵者。消乳食丹。丁香木香青皮肉豆蔻三核。義水各等分。爲末糊丸。麻子大。每五丸。米飲下。○小便不清者。胃苓湯加肉豆蔻爲丸。乾姜。○腹痛吐乳者。平胃散合蘿合香丸。蜜調米飲下。

米飲下。○腰痛吐乳者。平胃散合蘿合香丸。蜜調米飲下。

○挾瘀者。一陳湯。加山楂麥芽白朮烏梅。熟加黃連。寒加乾姜。○危甚者。燒針丸。黃用一兩。或加桔梗等分。爲末。

或散。虛渴者。白朮散。但食即吐先除積。內傷乳食。面色青白。發熱。四肢逆冷。腹脹常先用消

乳食。再取積消導寬利。胸膈如嘔甚者。只用白豆蔻砂仁等分。甘草減半。爲末。乾糝芽兒口中。凡喫乳喫物。飲水不下者。宜或燒針丸亦效。○冷氣入胃。嘔不已者。四君子湯加白豆蔻砂仁。肉豆蔻山藥爲末。或。蜜丸。每錢木瓜飲。紫蘿蔔煎湯下。○脾胃虛弱。逆痰含哭。飲乳食。停滯不散。腹滿嘔吐。覘乳者。四君子湯加南星。砂仁。丁香藿香。冬瓜子。姜煎服。或。杏仁。白朮。白芍。大溫驚丸。○吐而湯水不納者。五苓散。○吐涎痰熱者。白玉餅。下之。今若溫之。有吐沫或白綠水者。胃苓也。理中。

肉丸。芡實大。每服一丸。用針挑於燈焰上燒存性。乳汁或米泔冷水任化下。此藥清鎮專主吐逆及瀉大人亦宜。內虛失音。爲腎怯。吐瀉久不正者。乃腎氣。肾氣丸。主之。丸人病後失音者同。食少進四肢無力。升陽益胃湯。主之。或異攻散。虛渴者。白朮散。但食即吐先除積。內傷乳食。面色青白。發熱。四肢逆冷。腹脹常先用消

乳食。再取積消導寬利。胸膈如嘔甚者。只用白豆蔻砂仁等分。甘草減半。爲末。乾糝芽兒口中。凡喫乳喫物。飲水不下者。宜或燒針丸亦效。○冷氣入胃。嘔不已者。四君子湯加白豆蔻砂仁。肉豆蔻山藥爲末。或。蜜丸。每錢木瓜飲。紫蘿蔔煎湯下。○脾胃虛弱。逆痰含哭。飲乳食。停滯不散。腹滿嘔吐。覘乳者。四君子湯加南星。砂仁。丁香藿香。冬瓜子。姜煎服。或。杏仁。白朮。白芍。大溫驚丸。○吐而湯水不納者。五苓散。○吐涎痰熱者。白玉餅。下之。今若溫之。有吐沫或白綠水者。胃苓也。理中。

醫學全書卷之五

土馬

五十一

先或半夏陳一不米等分姜煎服。○吐調延及血者肺熱也。火則肺虛阿膠散加減。○吐沫者後必重痛安重丸乾棗二分雄黃一霜各一錢為末糊丸黍米大每五七丸或廿丸。發時取宋行石榴根前湯痛甚苦練根或蕪荑煎湯下。○僵兒大小服之。○經年吐乳眼慢糞穢有筋膜者乃父母交感時喫一丸所致宜益黃散。五痔保童丸。○兒喫因積因氣滯內外感與治吐一。○瀉滑青者慢驚防。滑者或出不知或直射○瀉流或穀食不化或下選用。○瀉青已者乃夾驚木丸土也。益黃散大溫驚丸主困急用附子生中湯或肢冷口鼻氣亦冷欲作慢驚慢脾之有初起黃芩青或瀉藥均直過者丸為寒瀉三五次即生姜米飲調生。○多服乃効候胃氣已生手足漸煖痰消在者却用金瓜丹合青川白丸子等分服之兼用異攻散理中丸鈎藤散轉驚丸。○調理雖至危者往往死中得生。○金液丹真小兒止瀉之妙劑也。○蓋小兒吐瀉皆當溫補若已瀉止病作無疑。○若患瘡瀉青乃毒去無害不必服藥。

五痔

五痔由積而生成

二十歲以下曰痔二十歲以上曰瘻

者乾也瘦痔少血也五痔病閼五臟因乳食太過大早。○肥甘不節而成間有傷寒病後久吐久瀉久渴宿積疹痘雜症妄施吐下內亡津液而生成者要皆脾胃虛弱血氣枯滯生精生熱生痰乘臟氣之虛傳入為痔間有熱者亦虛熱耳。○治熱不可妄表。○過涼治虛不可峻溫驟補。○內熱中滿病初萌肥令人內熟數食甘令人中滿言病之始也。○允嬰兒乳食停滯稍飽滿內煩不安虛者必湏扶胃而兼消導實者必先疎利而後和胃不可因循以致積久成痔又有熱滿深甚便施薑胡連龍膽苦寒傷胃反致痔者。○內痔痞結漸黃瘦外臤赤爛瘡痍生。○痔症初患中滿久則結痞初患

或耳鼻生瘡。或遍身生瘡。愛喫泥炭土米鹹酸，饅果食不消化。小便不清。大便反利。大槩熱癥多見外症。冷癥多見內症。○癥。鼻頭有瘡不着痂。漸癢耳生瘡。宜用白芨。輕粉各二分。烏賊魚骨三分為末。先以漿水洗拭乾。或鼻下赤爛自掾者。用蘭香葉燒灰二分。銅青半分。輕粉少許。為末乾。○癥。遍體生瘡不歇。乃虫內耗。精髓外蝕。皮膚宜連肚丸。黃連七兩。水溫透納。雄猪肚內用線緊縫。飯上蒸十分爛。取出和少蒸飯搗丸。小豆大。每二十丸。米飲下。仍以川芎生地。茯苓。茯神。調血清心。或蘆薈丸肥兒丸。生犀散。選用。間服。并以大腹皮苦參白芨煎湯洗後。却用荳子帶皮核燒灰入麝香輕粉少許。為末敷之。自幼小以至弱冠皆同。○熟。熟。身熱。大便秘。便秘。濕者為熱。宜胡連丸。胡黃連川黃連各五錢。辰砂一錢。半為未。入猪膽內繫定。虛懸於銚內。用淡漿煮一炊飯。久取出。入蘆薈末二錢。麝香少許。粳米飯丸。麻子大。每五七丸。茶清下。一方有青黛。煅灰各二錢。○熟。黃連雀目。遇夜不見。或生瘡者。五福化毒丹。陳粟米飲下。

不見或生瘡者。五福化毒丹。陳粟米飲下。

冷

寒身亦鴻不停。癥病久則目腫面黧。體瘦煩渴多汗。腹脹。滑鴻無常。或青或白。或如垢。膩者為冷。○癥。至聖丸。丁香丁皮各一錢。木香厚朴。史君子各一錢。白芷。甘草。各二錢。為末。神麌糊丸。麻子大。每七丸。米飲下。

冷

熱相兼泄且秘。或時便血或潮蒸。冷熱二症交豆。非新非舊。連川黃連。無美史君子各一兩。麝香五分為末。用蝦蟆五齒。搗碎。酒炙成膏。和丸。麻子大。每五七丸。或二十丸。八參煎湯下。常服錢氏白朮散。以生津液。蓋癥本溫熱。又則虛。濕全在驚。癥而赤盜汗渴。安神退熱滋衛榮。驚癥即心虛。時會意。○驚。原因心虛血弱。神不守舍。更加乳食不調。心臟積熱所致。外症臉赤唇紅。口舌生瘡。胸膈煩悶。小便赤澁。五心皆熱。盜汗發錢。遠志。用黑豆水煮去骨。鈎藤皮。蝦蟆灰各二錢。菖蒲一錢。麝香少許。為末。粟米糊丸。麻子大。每十九。八時。荷煎湯下。輕者。砂安神丸。大溫驚丸。○風。癥涼血舉。

順氣搖頭揉目便多青。

風痀即肝痀。多因胎風。更加乳食。

邪氣未散。還與乳兒所致。外症。搖頭揉目。自膜遮睛。或赤

腫脹。淚瀉。翳癰。滋癟。痒。雀目。昏暗。甚至經月眼合。名曰痀眼。并

酒合。

面而卧。面色青黃。髮立筋青。腦熱羸瘦。宜生熟地黃。

丸。加當歸煎服。或黃連肥兒丸。山梔煎湯下。

痀眼壯熱。

熱瘍。脇疼。便青。一切肝症。風痀丸。青黛黃連天麻五灵脂。

夜明砂。川芎蘆薈各二錢。龍膽草防風。蟬退各一錢半。全

蝎二枚。乾蟾頭三錢。為末。猪膽汁浸。糕丸。麻子大。

每十九薄荷煎湯下。如脇硬眼角見黑氣者。難治。

食痀痞。

冷肥膩。或酒飯後。即與乳兒。則變為乳癖。腹脇結塊。各

日乳癖外症。黃瘦。腹脹。氣促。瀉臭。口唾食減。吃沉。宜益黃

散。消乳食丸。或肥兒丸。加莪水。青皮。陳皮。

○肺大青筋者。小胡連丸。胡黃連五分。去果積。同魏一錢半。去肉積。神麌

去食積。黃連去熱積各二錢。麝香一粒。為末。

去食積。黃連去熱積各二錢。麝香一粒。為末。

食痀痞。

傷肺氣孤弱。或乳母恣食生

豬膽汁。和丸。黍米大。每咗丸。白术煎湯下。

未氣。痀咳血。或

脹多溏泄。磨積退黃脾漸寧。

食痀即脾痀。用乳食傷而復

勞復。更加乳食不調。以致肺氣受

所流屬。隨即成瘡。名曰。痀囊。不時咳嗽。氣逆寒熱。咽紅腫

癰。多啼。搗鼻咬甲。與癆症大同。宜先服清肺湯。黃芩當歸

麥門冬。連翹。防風。赤茯苓。桔梗。生地紫蘿。甘草。前胡。各五

分。桑白皮一錢。水煎服。次服化瘡丸。蕪荑。薑。薈。青黛。川芎

白芷。胡黃連。川黃連。煅灰。各等分。為末。猪膽汁浸。糕丸。

麻子仁。每咗丸。食後。臨卧。杏仁煎湯下。其真常。用熊膽泡

湯。小草蘸洗。俟前藥各進數服。再用青黛。當歸。赤小豆。瓜

蒂。地榆。黃連。蕪薈。各等分。雄黃少許。為末。入真。飲。瘡。

喉不能發声。者。用黃連肥兒丸十五粒。藕合香丸一粒。殊

殊。蒲煎湯。乘熱調服。

腎痀耳焦。天柱倒齒。脫手足冷。如

水。

腎痀。又名急癧。言五痀。惟腎為最急也。多因痘後。餘毒

未净。更加乳食不調。耳味入脾而生虫。狀似傷寒。狐惑。

上。齒齦則口唇出血。臭氣甚。則齒齦潰爛。齒黑脫落。頸

有穴者。名曰走馬痀。言陽明熱氣上奔。如馬然。下。衄。腸胃

有穴者。名曰走馬痀。言陽明熱氣上奔。如馬然。下。衄。腸胃

則下痢肛瀉即後痔外症。臍熱肌削手足如冰瓦黑面
黎身多瘡疥寒熱待作甚者天柱骨倒俱宜腎氣丸加史
君子川練肉。走馬揖并痘毒牙痛者溺白散或用白芷
五錢馬牙硝一錢銅青五分麝香一字為末乾敷口角及

擦齒

又有諸般難治症

曰

無事辨丁奚痒嘔露痒皆五痒

死症所以然者五臟俱病故也

辨舌

乾多帝

肝痒乾

帝眼不轉睛。脾痒搭口癰眼口乾作渴。肺痒声焦

皮燥大便乾

結腫身熱肢冷。小便乾澀古方通用連膽丸。

黃連五錢

豬膽汁浸瓜萎根烏梅蓮肉杏仁各二錢為

朱牛膽汁

浸糕丸麻子大每下五丸烏梅姜蜜煎湯下如

五乾俱見身七栗

生色故黑者必死。辨渴遇夜還稍止。辨渴臟下宿有痒氣

潮汗咳渴成

痺瘍骨蒸五心潮熱盜汗咳嗽泄瀉如銀斷不可治古方入物湯去白木

加黃芪柴胡陳皮半夏史君子蝦蟆灰鱉甲各等分

前服或連膽丸否連猪肚丸加蝦蟆灰救之如氣損者即

死辨

瘍瘍額上青紋見泄下糟粕忌用熱藥止之宜香蔻丸

黃連三錢木香肉豆蔻訶子砂仁茯苓各一錢為末

大棗米大每五丸米飲下如滑瀉脫肚飴逆者死速

瘍瘍五色濕邪紫

以致痢下五色裏急後重宜香砂丸黃連砂仁各二錢訶子一錢為末粳飯

丸麻子大每十五丸姜艾煎湯下如人中平滿者必死

瘍瘍腫中虛毒氣併。故令肚腹緊脹由是脾復受溫故令頭

面手足浮腫宜退黃丸肥兒丸

○張甚者褐丸子蘿蔔子一兩陳皮青皮橘核黑丑五靈脂赤茯苓義木各五錢木

香二錢半易末麵糊丸菜豆大每十五丸桑白皮紫草煎

湯或蘿蔔煎湯于治小兒乳食不消心腹脹滿嘔逆氣急

秘或利頭面浮腫無苔

五疳八痢扒瘦慢大者如神一方

有胡椒黃連三稜苦練根各二錢半。○癥脹腹皮紫者回大異香散加五靈脂為末。紫蘋煎湯下少。吞紫霜丸。

癥出難為情。癥化為蟲。虫多啼嘔沫腹痛唇紫腸頭及齒痒。蛔雖食虫却不可動。上從口鼻出者難治。凡疳甜積久莫不有虫形状不一。黄白赤者可醫。青黑者死。

癰腫髮作穗。

產犯房

以致滿頭餅瘡。膚熱如火髮結作穗。

頸腫頸高遍身多汗。宜龍膽丸。龍膽草升麻苦練根防風赤茯苓蘆薈油髮灰青黛黃連各等分為末。猪膽汁浸作丸。麻子大每廿丸。薄荷紫蘋煎湯下食後仍以蘆薈末入鼻。

癥腫餌脊鋸齒形脊

蟲

膏

如錦齒拍背如敲鳴十指皆生瘡。

無

蟲

腦項邊有核轉動軟而不疼。中有

因烏羽古方評。蟲如米粉不速破之。則虫隨熱氣流散沿

餌膩膩以致肢休癱瘓便利。膿血壯熱羸瘦頭露骨高

烏

初

起可用針破膏藥貼之。或因浣兒衣時夜露沾下易雌。

取糞蛆一枚入內。任蛆食一日。夜取出以布袋繫於急流

水中浸一夜。瓦上焙乾入麝香一字為末。飯丸。麻子大每

舟丸。米飲下一服。虛煩退再服渴止。三服鴻住亦治諸癥。

丁奚腹大手足小。○丁手足與

什也奚腹大也甚者尻高肉削。脐甫露翻食骨稜層。甫露

突號哭胸膈或生穀癥變喫生米。○嘴露翻食骨稜層。甫露

熱往未頭骨分開翻食吐。煩渴嘔噦。不能消化。水穀。以致榮衛

死。蓋丁奚。哺露皆因脾胃久虛。不能消化。水穀。以致榮衛

氣弱。肌肉消瘦。腎氣不足。復為風冷所傷。形體瘦露亦有

胎中受毒。臟腑少。○所致盡皆無事種類如難治。宜十全丹。

救之保童消食堪通用

五痔保童丸。鰐頭蟾頭熊膽麝香夜明砂。天槳子黃連。龍膽草青皮五

倍子苦練根。雄黃青黛蘆薈胡黃連各等分為末。糯米飼丸。麻子大每十九米飲下治五臟乾癥。

君子麥芽陳皮蕪荑神曲草蔻。龍膽草青皮五

陳米飯丸。黍米大每十九米飲下消癥。發虫退熱磨積。進

食蘆薈肥兒羹且靈

蘆薈丸胡黃連雷丸蘆薈蕪荑木香青黛鶴虱黃連各一兩

木香一錢為末。猪膽汁浸糕丸麻子大每廿丸米飲下消脾

殺虫和胃止瀉。肥兒丸黃連神曲各一兩麥芽肉豆蔻

史君子各五錢檳榔木香各二錢為末。猪膽汁浸糕丸麻子大每三四十丸米飲下治身黃肚急症塊泄瀉瘦弱一

切癰症。一方去檳榔豆蔻木香加蕪荑

青皮名黃連肥兒丸治諸癰及癰眼。

瘻症十全與布袋

十全丹陳皮青皮莪术川芎五靈脂白蔻檳榔蘆薈各五錢木香史君子蝦蟆灰各二錢為末。猪膽汁浸糕丸麻子大每廿丸米飲下熱者薄荷煎湯下治丁奚哺露無毒

木香芩草各五錢為末。湯浸蒸餅丸薄子大每十九用綃袋盛之次用精猪肉二兩同煮候肉爛熟撈起棄去風前陰乾只用肉和汁與兒食之次日依前煮服藥盡

為度治諸癰瘻大頭小面黃疸痛飲食不為肌膚

風服

單方羨夜明。單夜明砂炒為末入諸食中服之治諸

癰瘻病者。因孕婦被酒崇瘻其腹中令

貼下利寒熱去來毛髮不澤或因婦人自見水能行時復有孕使兒飲乳亦成此疾宜于金龍膽湯仍以紅紗袋夜明砂與兒佩之

諸積

諸積湧分虛與實虛者熱微實熱多

諸積腹脹腹痛甚結

八病等症。總皆積之為害。虛者渾身微熱或夜間有熱。少食神倦。抱起如睡實者壯熱肚熱尤甚。便閉。頭腫喉塞。涎鳴壅盛。熱毒發瘡俱宜木香丸主之。虛者少用。實者倍服。其或變症。面黑濁黑。久渴氣促。手心生瘡。瘦軟者不治。為乳積。氣積蟹渤叫啼過。乳停滯不化得之。雖未典故而有瘡。是氣乘衛不和。淹延日久。得之。是為氣積。

食積面黃肚腹硬。腹痛。氣促。利如蟹渤。或發熱肚膨

體瘦。飲食不為肌膚。片由觸忤其

醫學卷之五

言

三

無度食殘過飽後即睡得之是為食積

行氣消乳食自磨。行氣丸。木香檳榔

丁香枳壳共松吏

五錢

君子神麌麥芽各二錢半三稜莪术青皮陳皮香附各五錢胡黃連一錢為末蒸餅丸黍米大每廿九未敍下治氣積如有汗者去青皮或五味木香散亦好。○消乳食丸砂仁陳皮三稜莪术神麌麥芽各五錢香附一兩為末糊丸

麻子大每廿九紫蘇煎湯下治乳積食

積甚者消積丸感應丸紅丸子下之。

要知小兒腸胃軟

切戒猛峻傷元和

小兒有積腸胃脆軟。忌用毒藥攻擊。久

則脾虛食少或吐或利發生他症取積

之法調脾和胃緩急次序攻之切勿傷其胃氣。

有因下積傷脾反生潮熱變為慢驚者有之

久瘡多

藏在隱僻脇腹疼

呻吟腹隱辟之處時時作痛

有之

行氣消乳食自磨。行氣丸。木香檳榔

丁香枳壳共松吏

五錢

君子神麌麥芽各二錢半三稜莪术青皮陳皮香附各五錢胡黃連一錢為末蒸餅丸黍米大每廿九未敍下治氣

積如有汗者去青皮或五味木香散亦好。○消乳食丸砂

仁陳皮三稜莪术神麌麥芽各五錢香附一兩為末糊丸

麻子大每廿九紫蘇煎湯下治乳積食

積甚者消積丸感應丸紅丸子下之。

要知小兒腸胃軟

切戒猛峻傷元和

小兒有積腸胃脆軟。忌用毒藥攻擊。久

則脾虛食少或吐或利發生他症取積

之法調脾和胃緩急次序攻之切勿傷其胃氣。

有因下積傷脾反生潮熱變為慢驚者有之

久瘡多

藏在隱僻脇腹疼

呻吟腹隱辟之處時時作痛

有之

行氣消乳食自磨。行氣丸。木香檳榔

丁香枳壳共松吏

五錢

君子神麌麥芽各二錢半三稜莪术青皮陳皮香附各五錢胡黃連一錢為末蒸餅丸黍米大每廿九未敍下治氣

積如有汗者去青皮或五味木香散亦好。○消乳食丸砂

仁陳皮三稜莪术神麌麥芽各五錢香附一兩為末糊丸

麻子大每廿九紫蘇煎湯下治乳積食

積甚者消積丸感應丸紅丸子下之。

要知小兒腸胃軟

切戒猛峻傷元和

小兒有積腸胃脆軟。忌用毒藥攻擊。久

則脾虛食少或吐或利發生他症取積

之法調脾和胃緩急次序攻之切勿傷其胃氣。

有因下積傷脾反生潮熱變為慢驚者有之

久瘡多

藏在隱僻脇腹疼

呻吟腹隱辟之處時時作痛

有之

行氣消乳食自磨。行氣丸。木香檳榔

丁香枳壳共松吏

五錢

君子神麌麥芽各二錢半三稜莪术青皮陳皮香附各五錢胡黃連一錢為末蒸餅丸黍米大每廿九未敍下治氣

積如有汗者去青皮或五味木香散亦好。○消乳食丸砂

仁陳皮三稜莪术神麌麥芽各五錢香附一兩為末糊丸

麻子大每廿九紫蘇煎湯下治乳積食

積甚者消積丸感應丸紅丸子下之。

要知小兒腸胃軟

切戒猛峻傷元和

小兒有積腸胃脆軟。忌用毒藥攻擊。久

則脾虛食少或吐或利發生他症取積

之法調脾和胃緩急次序攻之切勿傷其胃氣。

有因下積傷脾反生潮熱變為慢驚者有之

久瘡多

藏在隱僻脇腹疼

呻吟腹隱辟之處時時作痛

有之

行氣消乳食自磨。行氣丸。木香檳榔

丁香枳壳共松吏

五錢

君子神麌麥芽各二錢半三稜莪术青皮陳皮香附各五錢胡黃連一錢為末蒸餅丸黍米大每廿九未敍下治氣

積如有汗者去青皮或五味木香散亦好。○消乳食丸砂

仁陳皮三稜莪术神麌麥芽各五錢香附一兩為末糊丸

麻子大每廿九紫蘇煎湯下治乳積食

積甚者消積丸感應丸紅丸子下之。

要知小兒腸胃軟

切戒猛峻傷元和

小兒有積腸胃脆軟。忌用毒藥攻擊。久

則脾虛食少或吐或利發生他症取積

之法調脾和胃緩急次序攻之切勿傷其胃氣。

有因下積傷脾反生潮熱變為慢驚者有之

久瘡多

藏在隱僻脇腹疼

呻吟腹隱辟之處時時作痛

有之

行氣消乳食自磨。行氣丸。木香檳榔

丁香枳壳共松吏

五錢

君子神麌麥芽各二錢半三稜莪术青皮陳皮香附各五錢胡黃連一錢為末蒸餅丸黍米大每廿九未敍下治氣

積如有汗者去青皮或五味木香散亦好。○消乳食丸砂

仁陳皮三稜莪术神麌麥芽各五錢香附一兩為末糊丸

麻子大每廿九紫蘇煎湯下治乳積食

積甚者消積丸感應丸紅丸子下之。

要知小兒腸胃軟

切戒猛峻傷元和

小兒有積腸胃脆軟。忌用毒藥攻擊。久

則脾虛食少或吐或利發生他症取積

之法調脾和胃緩急次序攻之切勿傷其胃氣。

有因下積傷脾反生潮熱變為慢驚者有之

久瘡多

藏在隱僻脇腹疼

呻吟腹隱辟之處時時作痛

有之

行氣消乳食自磨。行氣丸。木香檳榔

丁香枳壳共松吏

五錢

君子神麌麥芽各二錢半三稜莪术青皮陳皮香附各五錢胡黃連一錢為末蒸餅丸黍米大每廿九未敍下治氣

積如有汗者去青皮或五味木香散亦好。○消乳食丸砂

仁陳皮三稜莪术神麌麥芽各五錢香附一兩為末糊丸

麻子大每廿九紫蘇煎湯下治乳積食

積甚者消積丸感應丸紅丸子下之。

要知小兒腸胃軟

切戒猛峻傷元和

小兒有積腸胃脆軟。忌用毒藥攻擊。久

則脾虛食少或吐或利發生他症取積

之法調脾和胃緩急次序攻之切勿傷其胃氣。

有因下積傷脾反生潮熱變為慢驚者有之

久瘡多

藏在隱僻脇腹疼

呻吟腹隱辟之處時時作痛

有之

行氣消乳食自磨。行氣丸。木香檳榔

丁香枳壳共松吏

五錢

君子神麌麥芽各二錢半三稜莪术青皮陳皮香附各五錢胡黃連一錢為末蒸餅丸黍米大每廿九未敍下治氣

積如有汗者去青皮或五味木香散亦好。○消乳食丸砂

仁陳皮三稜莪术神麌麥芽各五錢香附一兩為末糊丸

麻子大每廿九紫蘇煎湯下治乳積食

積甚者消積丸感應丸紅丸子下之。

要知小兒腸胃軟

切戒猛峻傷元和

小兒有積腸胃脆軟。忌用毒藥攻擊。久

則脾虛食少或吐或利發生他症取積

之法調脾和胃緩急次序攻之切勿傷其胃氣。

有因下積傷脾反生潮熱變為慢驚者有之

久瘡多

藏在隱僻脇腹疼

呻吟腹隱辟之處時時作痛

有之

行氣消乳食自磨。行氣丸。木香檳榔

丁香枳壳共松吏

五錢

君子神麌麥芽各二錢半三稜莪术青皮陳皮香附各五錢胡黃連一錢為末蒸餅丸黍米大每廿九未敍下治氣

積如有汗者去青皮或五味木香散亦好。○消乳食丸砂

仁陳皮三稜莪术神麌麥芽各五錢香附一兩為末糊丸

麻子大每廿九紫蘇煎湯下治乳積食

積甚者消積丸感應丸紅丸子下之。

要知小兒腸胃軟

切戒猛峻傷元和

小兒有積腸胃脆軟。忌用毒藥攻擊。久

則脾虛食少或吐或利發生他症取積

之法調脾和胃緩急次序攻之切勿傷其胃氣。

有因下積傷脾反生潮熱變為慢驚者有之

久瘡多

藏在隱僻脇腹疼

呻吟腹隱辟之處時時作痛

有之

行氣消乳食自磨。行氣丸。木香檳榔

丁香枳壳共

醫學卷之五
州別用用
三十九
揭成膏角布難開肺瘡塊上。再用湯瓶熨手。
柏勒之。三日後揭起。肉黑如墨。是其効也。

腹脹由中虛氣作。有積實者喘氣惡。有積悶亂喘滿為實宜紫霜丸。白玉解消

積丸。褐丸子選用以利其積。若氣無積。不喘虛宜溫煎。積短喘急者。分氣紫蘿飲。換蘿子。為虛。可以溫散。六君子湯加白芍乾姜厚朴。或大異香散加五靈脂為末。紫蘿煎湯下。或五苓散。俾上下分消。其氣不可妄下。仍誤下面腫及手脚。誤下脾氣內陷虛氣附肺外行肺主而日胞頤脾主四肢。故腫腫脹通用湯氣丸。胡椒一兩。桂稍五錢。為末。麪糊。腹大。加蘿蔔子。大喘氣籠腎氣索。腎虛水氣乘肺。大喘者危。益黃散。湯氣丸。救之。陰腫多

因地氣抽。或啼怒傷小腸絡。陰核氣結腫大。釣痛謂之癩地風濕傷之。俱宜五苓散。有風熱囊腫便閉者。三白散。有因寒吐不止。致冷陰氣下結。水竇不行。或孕婦啼瀉過。

後腫痛有稀軟者。有木硬者。宜行心氣。逐腎邪。利二便。更無補法。宜桃仁丸。桃仁三錢。辣桂。大黃。牽牛。蒺藜。桂。皮各二錢。為末。蜜丸。麻子大。每五七丸。葱白不通。青皮入鹽煎湯下。或煎疏氣飲子。下青木杏丸。外治腎囊腫大。並物通明。用桂蠅為末。先以津唾塗腫處。次用乾粉。坐地被風。及玉蟻吹着囊腫。用蟬退煎湯頻洗。或葱地蠅糞。地黃為末。先以葱椒煎湯。於避風處洗。半次用津唾調敷。外腎熱者。鷄子清調敷。或加桂蠅少許。餘詳大科疝氣。張久不通。瘡塞胸參連枳梗當斟酌。瘡結因熱聚。腹不揭則痛。時發壯熱。宜芩連枳梗湯。枳壳、桔梗各五分。半夏黃芩瓜萎仁。黃連各三分。生姜、麥門冬。煎服。利去黃涎。即安。熟甚。加大黃少許。○虛氣瘡塞胸膈。留飲聚於腹脹。或加張。病手不可近檢。實理中丸去芩。渴加瓜萎根。鷄矢加桂蠅。張久虛濕熱生黃。深黃為熱淡黃。胃弱熱。熟生黃。名曰養。

瘧。治與大人一同。有熱者。小柴胡湯加麥芽枳實。山梔。陳胃弱者。四君子湯或理中湯加茵陳。通用萬金丸。蒼术二兩。陳皮厚朴。夜明砂各一兩。為末。用綠礬二兩。化水入醋少許。煮麪糊。或煮棗肉搗九蒸豆大。每五十丸。米飯下磨積去黃。一方加史君子一兩。枳實黃連。阿子各五錢。用巴豆十粒同炒令紫色。去巴豆不用。再入蝦蟆灰五錢。香櫞根皮二錢半。為丸。治瘧。

消癰進食止瀉和胃追虫

腹痛面黃只是積。腹痛面黃口中氣溫多睡畏食大便臭。氏白朮散和胃。尋常輕者只用平胃散加山楂。麥芽。炒仁青皮甘草為末。每一錢米飲下。熟加黃芩寒加吳萸桂調蘿合香丸。冷熱不調多嘔逆。宜枳壳。橘梗。葛根。陳皮。當歸。草各等分。木香。砂半。姜煎服。

心腹俱痛面㿠白。光口中吐沫更攻的

亟動心痛與瘧約相似但目不斜而手不搖耳也

重丸主之

八痢本與大科同。惟有驚痢屬幼童。八痢冷痢白積熱痢赤白痢黃白積或見五色下無時度驚痢青積下臭赤息痢糞黑如魚腸愈而復作。釀痢停積又來。腹脹便臭肛痛蠱毒痢下紫黑如猪肝。白苓埃積溫脾胃。紳白者積冷毒也。宜咸參苓白朮散之。類溫和脾胃。胃虛熱毒也。宜導滯湯。或赤或白冷熱不調。腹痛後重。腸二兩阿膠三兩為末。醋糊丸。黍米大。每廿丸。米飲下。大人亦宜。久不止及釀痢者。沒石子丸。鷄子煎。妾下腫脹渴隨至。脾虛有積。積化成瘻。瘀下。脾胃重誤補脫肛。

醫學卷之五

卷之五

一

色

掀紅

熱者黃連

阿膠

丸薄荷煎

○有服京藥過度或久

湯○有病頻脫肝

黑色生壳者用巴豆壳燒灰

色蕉自然

汁煮入朴硝少許洗軟用清油點三滴放三角白礮煅過

龍骨少許為末乾

膠丸頭用芭蕉葉

托上勿令便去出入令大兒抱定

乳嗽

百日內不宜戀膈損胃肺孤危

或因

喘叫未定

或飲乳過度以致停

蓄胸膈胃口干於肺故發咳嗽

飯

逆肺胃俱病百日內見者為惡候

其

四時感冒者當用參蘆飲惺惺

散之類微表

虛者阿膠

如挾熱暴嗽面赤壯熱便閉者宜葶牛九下之

散可醫阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰恶心散可醫阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰恶心

散可醫阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰恶心

散可醫阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰恶心

散可醫阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰恶心

散可醫阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰恶心

散可醫阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰恶心

散可醫阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰恶心

散可醫阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰恶心

散可醫阿膠七分半白茯苓馬兜鈴糯米各二分半杏仁十粒甘草二分水煎治久嗽肺虛氣促有痰恶心

二三歲時欲斷乳夜靜用藥畫兒眉

少許為末

清油調勻候兒睡着濃沫畫兒兩

眉上醒來自不喫乳未妙月書仍墨搽乳頭

