

Centimetres

KODAK Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2000

Kodak
LICENSED PRODUCT

3/Color
Black

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

Black

苦方便覽

乾

武
663
/



武
663
1-2

嘉永再板

東洞吉益先生校閱

門人

六角重任筆記

古方便覽

浪華書肆

松敬堂

積玉圃

讀扁鵲傳

明治四十二年十月廿五
十葉亦魯一
氏寄贈

余嘗讀扁鵲傳。久之始知鑿法古今異也。乃歎曰。嗚呼。至焉哉。扁鵲之為鑿也。宜哉。為後世所稱焉。愈益誦之。蓋論虢太子之病也。中庶子之所言。皆陰陽鑿之理也。非疾鑿家之論矣。是以扁鵲則不取。從扁鵲仰天歎曰。

古方便覽

卷一

至當溫也。是扁鵲之所見。而疾鑿之
龜鑿也。所謂聞病之陽。論得其陰者。
陰陽猶內外也。譬如聞外讖語。論知
內有燥屎。聞內絞痛。論知外拘急也。
病應見於大表者。隨見證施治。方之
謂也。後世先病因。後其證候。可謂失
古醫法矣。扁鵲既治虢太子之病。名

譽大顯。世皆曰扁鵲能生死人也。扁
鵲曰。越人非能生死人也。此自當生
者。能使之起耳。嗚呼。知言哉。嗚呼。知
言哉。夫死生有命。自天爲之。醫安能
死生之。唯能治其疾病已。後世眩惑
死生。疾病不能治之。是豈可謂醫乎。
嗚呼。扁鵲其鑿聖乎。不然奚能治後

世鑿人沉痾。使之立於疾鑿之正路。哉。扁鵲之爲方也。於邯鄲也。爲帶下鑿。過雒陽也。爲耳目鑿。入咸陽也。爲小兒鑿。從其俗變之。夫萬病唯一毒也。能解其毒。則何病不治。今世別建之科。不亦淺乎。若夫長桑君章。趙簡子章。齊桓公章。則虛誕妖妄。不可信。

矣。蓋當時流言也。其以脈終始者。太史公之文藻。而害扁鵲之意。是審全篇而後可知已。使聖人預知微至重難治也。亦唯太史公因桓公之事。警戒之辭也。不可不別矣。孟子曰。盡信書不如無書也。今如此傳。直記世傳也。是傳之法也。若雖欲擇之。太史公

非鑿曷知疾鑿之正路而擇之。故鑿者不擇而取之。安知扁鵲之為扁鵲。又安覺鑿法古今異哉。

吉益為則公言甫撰

右東洞先生三著法扁鵲傳一篇在身。西手書而按之雖篇本屬子稿未及刪潤。卓然復古之淺。實謂能醫之模範矣。查任嘗述先師之善。去方後。以授查。查以為某氏請將款鑿布。願所已致。未由。乃是正。你得此稿乎。遂笥中。淨寫而揭。事以竊以代序云。六角重任拜書。

為老幼公之方法也。聖子如詩以得。固是也。然一至此。如突矢子。以股小。人所視乎。以曰。以痛。發熱汗出。急風去。桂枝湯。全之。又曰。名其人。脈浮。緊。發熱。汗不出。者。亦之也。當以淺法。勿之。誤。是桂枝湯麻。

黃芩其證其方各有自其所以
 是法方治一是一病應見於大
 表之診不可誤之得聖為家
 說其如破其如矢不六日從平強
 然百病之危多端診不難守
 其或不之也也夫何難之

東洞先生於方治其子以
 履不六日平且其五友六角
 毅夫亦出盡象便覽以國
 字西著其方便覽急傳急
 司且明也疾望其功
 固是采其策乎

三 明紀元之子丑仲冬

之之庵新崎國村撰



古方便覽上冊目次

- 桂枝湯
- 桂枝加芍藥湯
- 桂枝加葛根湯
- 桂枝加黃耆湯
- 桂枝加厚朴杏仁湯^三
- 桂枝加附子湯^四
- 桂枝附子去桂加朮湯^五
- 桂薑棗草黃辛附湯
- 桂枝加龍骨牡蠣湯
- 桂枝加芍藥生薑人參湯
- 桂枝加桂湯
- 桂枝去芍藥湯
- 桂枝去芍藥加黃耆湯
- 桂枝去芍藥加麻黃一湯^八
- 桂枝加芍藥湯
- 桂枝去桂加苓朮湯^六
- 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯^七
- 烏頭桂枝湯
- 桂枝附子湯
- 桂枝去桂加芍藥湯
- 括萎桂枝湯

桂枝二越婢一湯

桂枝麻黃各半湯

小建中湯

黃耆建中湯九

黃耆桂枝五物湯

黃耆桂枝苦酒湯十

桂枝甘草湯

半夏散并湯

桂枝甘草附子湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯十

桂枝人蔘湯

人蔘湯

茯苓甘草湯十一

茯苓杏仁甘草湯

茯苓戎鹽湯

葵子茯苓散

苓薑朮甘湯

苓桂朮甘湯十二

苓桂甘棗湯十三

苓桂五味甘草湯

苓甘五味薑辛湯

苓甘薑味辛夏湯

苓甘薑味辛夏仁湯十五

苓甘薑味辛夏仁黃湯

茯苓澤瀉湯

澤瀉湯

五苓散

茵陳五苓散十六

猪苓湯

猪苓散

牡蠣澤瀉散

八味丸十七

括萎瞿麥丸十八

麻黃湯

麻黃加朮湯

麻黃甘草湯

麻黃附子甘草湯

麻黃附子細辛湯

麻黃杏仁甘草石膏湯十九

麻黃杏仁薏苡甘草湯

牡蠣湯

麻黃醇酒湯二十

半夏麻黃丸

小青龍湯

大青龍湯_{廿一}

越婢湯

越婢加半夏湯_{廿二}

葛根加半夏湯_{廿三}

小柴胡湯_{廿四}

苈胡去半夏加栝蒌湯

苈胡桂枝乾薑湯

白虎湯_{廿五}

白虎加桂枝湯

厚朴七物湯

大黃黃連瀉心湯_{廿六}

文蛤湯

越婢加朮附湯

葛根湯

葛根黃連黃芩湯

苈胡加芒硝湯_{廿六}

苈胡桂枝湯

大苈胡湯_{廿七}

白虎加人參湯_{廿八}

小承氣湯

大承氣湯

瀉心湯

附子瀉心湯_{廿九}

大黃甘遂湯

橘皮大黃朴消湯_{卅一}

大黃牡丹皮湯

調胃承氣湯

土瓜根散

大黃附子湯

抵當湯

大黃硝石湯

大黃甘草湯_{卅五}

下瘀血湯

古方便覽下冊目次

桃核承氣湯一

桔梗湯

芍藥甘草湯三

芍藥甘草附子湯

甘草粉蜜湯四

甘草乾薑湯

四逆加人參湯五

附子粳米湯

薏苡附子敗漿散

烏頭湯六

甘草湯二

排膿湯

甘遂半夏湯

甘麥大棗湯

生薑甘草湯

四逆湯

茯苓四逆湯

薏苡附子散

大烏頭煎

赤丸

真武湯

天雄散九

梔子甘草豉湯

梔子大黃湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

小陷胸湯十

栝蒌薤白半夏湯十一

文蛤散

小半夏湯十二

小半夏加茯苓湯

附子湯七

梔子豉湯

梔子生薑豉湯

茵陳蒿湯十

梔子蘘皮湯

大陷胸湯

栝蒌薤白白酒湯

瓜蒂散

大半夏湯

生薑半夏湯

半夏苦酒湯

半夏厚朴湯

乾薑人蔘半夏丸

生薑瀉心湯十五 附甘
草瀉心湯

厚朴生薑半夏甘草
人蔘湯

乾薑黃連黃芩人蔘湯

黃連阿膠湯

黃芩加半夏生薑湯十七

三物黃芩湯

白頭翁加甘草阿膠湯

木防已去石膏加茯苓芒硝湯

防已黃耆湯

半夏乾薑散十四

半夏瀉心湯

吳茱萸湯

黃連湯

大建中湯十六

黃芩湯

六物黃芩湯

白頭翁湯

木防已湯

防已茯苓湯十八

枳實芍藥散

枳朮湯

桂枝生薑枳實湯

橘皮枳實生薑湯

橘皮竹茹湯二十

桂枝茯苓丸廿一

旋覆花代赭石湯

桃花湯

酸棗仁湯

麻仁丸

蜀漆散廿三

桔梗白散

排膿散十九

枳實薤白桂枝湯

茯苓飲

橘皮湯

芍歸膠艾湯

赤石脂禹餘糧湯廿二

蜜煎導

葶藶大棗湯

已椒薑黃丸

十棗湯

走馬湯


備急圓

礬石湯

礬石丸

蛇牀子散

附錄腹候之圖



古方便覽上冊

東洞吉益先生校閱

河内六角 重任 毅夫筆記



桂枝湯

桂枝

芍藥

生姜

大棗

甘草

五分

右五味以水一盞四分煮取六分氣上衝汗出治之或

惡寒汗出脈弱治之世二風邪或濕邪或寒邪ニアタ

ルト云テ發熱惡寒或ハ清淨ヲ出シ或ハ頭痛或ハ腰脚ダ

ルク或ハ骨節微痛ス等ノ症ニ用テヨシ或ハ氣上逆或ハ自

汗出ルナドニヨクヨシ○傷寒感冒或ハ持病ニモ瀉下ノ丸

散ヲ考ヘ兼用スルハ其病速ニ愈テ後再ヒ發セズ

桂枝加桂湯

於桂枝湯方内更加桂五分○本方ノ証ニテ

上衝ノ甚シキヲ治スルノ方ナリ○奔豚氣トテ塊物少腹ヨ

急ニ起テ心下へ衝カケイキダハシク或ハ刺ガ如ク痛ヨシ
持病ニ積氣アルモノニ此症アリ三黄丸或ハ消石大圓等ヲ
考テ兼用スベシ一男子年六十積聚ヲ患ル一數年癆作時
アリテ奔豚氣上テ心ヲ冲キ息スル一ア多ハス氣力カヒナク後
仰ス一ヲ得ズ飲食ヲ思サルニ此方ニ三黄丸ヲ兼用シテ
愈テ後ニ再ビ發セス

桂枝加芍藥湯 桂枝 大棗各六分 芍藥一分 甘草四分
生姜六分 右五味以水一盞四分煮取六分○桂枝湯ノ
証ニシテ腹ノ拘攣シ時々痛ヲ治ス○腹中ヒツハリ或ハ痛
或ハ腰へヒキツリ屈伸シガタク積氣又ハ疝氣ナドイヘル症ニ三
黄丸或ハ平水丸ヲ兼用スベキナリ

桂枝去芍藥湯 桂枝 大棗各九分 甘草六分 生姜九分
右四味以水一盞四分煮取六分○桂枝湯ノ症ノ逆シテ
胸滿スルモノヲ治スルナリ

桂枝加葛根湯 桂枝 芍藥各六分 甘草四分 葛根八分
大棗 生姜各六分 右六味以水二盞煮取六分○コレ
モヤリ桂枝湯ノ症ニシテ項背ノ強急スルヲ治ス方ナリ○項背
背ハタルツカヘ肩重クモツハリ首ノマハラザルニヨシ此症世ニ所謂風
邪寒邪ニ多シ上部ノ病ニ芍藥黃散ヲ兼用スベシ

括蕒桂枝湯 括蕒根四分 桂枝 芍藥 大棗各六分
甘草四分 生姜六分 右六味以水一盞八分煮取六分
○コレモ桂枝湯ノ症ニテ渴シ或ハ身體強ルモノヲ治ス○欬嗽口燥

短氣ナルモノニ、滾痰丸或ハ紫圓ヲ擇ミ兼用シテ大ニ効アリ

桂枝加黄耆湯 桂枝 芍藥 生姜 大棗各六分

甘草 黄耆各四分 右六味以水一盞六分煮取六分

○コレモ桂枝湯ノ症ニシテ黄汗ヲ発シ或ハ自汗盜汗アルヲ治ス○面部手足ニ浮腫ヲ発シ常ニ風ヲ惡ミ自汗盜汗アルニヨシ身重ク痛小便不利スルニ効アリ

桂枝加芍藥大黄湯 桂枝 生姜 大棗各六分

芍藥一分 大黄二分 甘草四分 右六味以水一盞四分煮取六分○コレハ桂枝加芍藥湯ノ症ニシテ實スイ甚ラ治スルノ方ナリ○腹皮スチハリ滿シテ痛或ハ大便通セス又ハ宿食アルニヨシ○世ニ所謂中湿中暑ナトノ下利チメシブリハラ裏急

後重スルニ効アリ○或ハ痢病ノ治法ヲ問フ東洞先生曰

別ニ治法アルニアラズ唯証ニシタガヒテ方ヲ處スベシ便ニ膿血アルハ久年ノ病毒外邪ニ因テウケキ立テ自ヲ拔出トスルモノニテコレホド幸ナルハナシ只下劑ヲ以テ其毒ヲ攻去ラハ必ズ病根ヲ絶ベシ然ルラ世医ニタリニ止薬ノ劑ヲ用ルハ賊ヲ府庫ノ内ニ留テ射ヲソコナハシガ如シ疾医ノ輩察諸

桂枝加厚朴杏仁湯 桂枝 芍藥 大棗

生姜各六分 甘草 厚朴 杏仁各四分 右七味以水一

盞四分煮取六分○コレモ桂枝湯ノ証ニテ胸滿微喘スルヲ治スルナリ○胸ニ痰涎アリテセリクトキコエスタキ咳出ルニヨシ又世ニ所謂風邪感冒ノ類ニ此症多シ○喘咳ノ持病

又ハ水腫ニテ喘ズルニヨシ。或ハ痰痰丸ヲ兼用スベシ。○一
男子年七十久病テ上氣ツヨク喘急甚シク手ノ背足ノ
跗上^{カフ}浮腫シ食ス^{フシユ}マズ起^{キタ}臥スル^{キタ}アタハス衆医已ニ必死ト
イヘルニ此方ヲアタヘテ一劑ニシテ喘急ユルマリ浮腫モ日々
減ジテ全効ヲ收タリ又一老人同症ニシテ浮腫ナク久シク
病テ空ク斃ントスルニモ亦此方ヲアタヘテ功ヲ得タリ

烏頭桂枝湯

烏頭ニ莖

右以水六勺煮取二勺去滓内

蜜四勺煎取四勺作桂枝湯ニ勺合服之○此方腹中拘
痛シ手足逆冷或ハ不仁又ハ身疼痛スルヲ治スルナリ○此
方ヨク背脊ニ中ル時ハ水ヲ二三升モ吐出シ氣絶スル^{キゼツ}ア
リヨク其症ヲ審ニシテ用ル寸ハ病根ヲ除カスト云^{イキタ}ナシ○一

男子年四十三數年疝氣ヲウヘ腰冷テ水中ニ坐スルガ如
シ大抵毎旬必ず一發ス發スル寸ハ臍腹大ニ痛手足ヒツ
リ屈伸スル^{クシ}アタヘテ此方ヲアタヘテ二十劑ニシテ病者大ニ水
ヲ吐シ病大半ヲ減ズ更ニ控涎丹ニテ下シテ全ク愈タリ
○一男子年五十左半身不遂口眼^{ヒタリ}カ^{ヒタリ}三言語^{ゲンキヨ}ガ^{ゲンキヨ}リ手足フ
ル^{ヒタリ}リ余此方ヲアタヘテ水ヲ吐キ大ニ困倦又家人驚駭ス余曰
畏^{オソ}ヒカ^{オソ}ス是藥ノ瞑眩スルナリト後諸症悉ク除テ全効ヲ
收ム

桂枝加附子湯

桂枝

芍藥

大棗

生姜各七分半

甘草五分

附子三分

右六味以水一盞四分煮取六分

○桂枝湯ノ症ニシテ汗出^{ヤカ}多ク惡寒^{ヤカ}シ^{ヤカ}更微^{ヤカ}急^{ヤカ}小便^{ヤカ}ヲ治ス控涎

丹或ハ平水丸十束湯ノ類ヲエラミテ兼用スベシ○一婦人
年五十背膊強直ニシテ痛ミ時々氣上衝ス愈_イテ五年此
方ニ平水丸ヲ兼用シ又時々控涎丹ニテ下シテ諸症日ニ
退キ後ニ礬石湯ニ浴セシメテ全愈○一男子瘡疾ヲ病_{オコリ}
百餘日余診スルニ惡寒殊ニ甚シ此方ヲアタフル_ニ劑ニシテ
大ニ水ヲ吐テ全ク治セリ

桂枝附子湯

桂枝 大棗

生姜 各七分

甘草_{五分} 附子_{一分} 右五味以水一盞四分煮取六分
○發熱上衝シ身軀疼痛煩シテ轉側スル_テアタハサルヲ治ス此
世ニ所謂中風痿躄痛風白虎痛鶴膝風ノ類ニ平水丸或
ハ控涎丹十束湯ナドヲエラミテ兼用スベシ若_{モシ}痼疾動カサルニ

ハ七寶丸ヲ兼用スベシ○**蠱毒**ノ骨痛ニ此方ニ芍黃散平
水丸ヲエラミ兼用シ梅肉散ニテ三四日下シテ後ニ七寶丸ヲ
アタフベシ或此方ヲ用テ反テ痛ツヨクナル_トモアルベシトカク
下シサヘスレバ治ス_ト意得ベシ○痰飲或ハ腹鳴ノ証アラハ
小半夏湯ヲ合方シ小便不利ニ桂枝加苓朮湯ヲ合方ス
ベシ吾門仲景ノ方ヲ合方ス_トハアレ_ト加減ス_ルハセサル
ナリ○右ノ諸症ニ桂枝加朮附湯越婢加朮附湯麻黃加
朮湯ノ條下參考スベシ又證變スル寸ハ直ニ方ヲ易ベシ證ノ變
ゼザル間_ミイツ_テモ其方ヲ用ルナリ故ニ常ニ證ヲ知テ方ヲ處シ
藥カノ徹スルヲ待ベシ日々ニ方ヲ易テ効ノ速カナラン_トヲ欲
スルハ粗_ソ工_ノ為_ト知_レ○仲景ノ方ニ烏頭附子天雄ト

アルヲ東洞先生スベテ烏頭ヲ用ラル、一ハ三物モト一物ニテ。烏頭尤カアレバナリ。コレヲ濃煎スル寸ハ緩シテ反テ能徹ス淡クサツト煎スレハ急ニ瞑眩ハスレ其効鮮シコレ無理ニ此方ヨリ瞑眩サセントスルハ無益ノ一ナリ。ヨク其病毒ニ徹シテ瞑眩スレハ必起廢ノ効アリ。此毒ニ中ルニ輕キモノハ口ヒリツキテ山椒ヲカミタルガ如ク或ハ微ニ身レビル、ヤウニ覺ユルナリ。又強ク中タルハ水ヲ吐キ或ハ身麻木シテ動クアタハズ或ハ口ユガミ卒倒シテ手足厥冷スルアリ。驚クベカラズ捨置ベシ其毒半時カ一時ノ間ニ醒ルナリ

桂枝附子去桂加朮湯

大朮 生薑 各六分 右五味以水一盞八分煮取六分

○是金匱ノ白朮附子湯ナリ。今古名ニ從フ。此方小便不利大便多ク或ハ小便自利シ身腫或ハ痛ヨシ。又水腫病所謂鼓脹ノ類ニ用ヒテ効アリ。三黃平水浮石等ノ丸藥ヲエラニテ兼用スヘシ。○一男子鼓脹ヲ患痛瘦骨立喘息迫塞シ飲食已ニ絶ス。余此方ヲタヘ別ニ水銀黑鉛二味ノ薰方ヲ作テ嗅シムル。第四日ニ至テ小便快利シ脹日ニ除三十日ニシテ全ク愈タリ

桂枝去桂加苓朮湯

芍藥 甘草 大朮 朮 茯苓 生薑 各六分 右六味以水一盞四分煮取六分

○ヤハリ桂枝湯ノ証ニシテ心下悸シ小便不利上逆ノ無ヲ治ス

桂姜枣草黄辛附湯

桂枝

生姜

大枣 各六分

甘草

麻黄

细辛 各四分

附子 三分

右七味以水一

盞四分煮取六分逆滿ギキレテ心下堅ク板ノ様ニナリテ

惡寒甚シキモノヲ治スルノ方ナリ友人某喘哮数年愈オカレゼンカウサ

ルニ滾痰丸紫圓ヲ兼用シテコレヲ攻テバク奇功ヲ得タリシ

桂枝去芍藥加皂莢湯

桂枝

生姜

大枣 各七分半

甘草

皂莢 各五分

右五味以水一盞四分煮取六分

○桂枝去芍藥湯ノ證ニシテ蜀黍涎沫ヲ吐シ或ハ痰ニテ咽痛ヲ治ス

桂枝加龍骨牡蠣湯

桂枝

芍藥

生姜

大枣

龍骨

牡蠣 各六分

甘草 四分

右七味以水

一盞四分煮取六分○上衝レテ胸腹動氣アリ少腹イタム目

眩髮落夜イ子ラレズ遺精スルヨレ滾痰丸又ハ三黄丸ヲエラ

ニテ兼用スベシ堅塊ニハ消石大圓ヲ兼用スベシ○此方ト建

中湯ト外證ハ同シナレ建中湯ハ腹皮拘急ヲ主治ス此

方ハ胸腹臍下ノ動ヲ準據トスベシ世医此等ノ証ヲ火動

或虚勞ト云テ妄ニ滋潤ノ劑ヲ用ルヲ誤ナリスベテ藏府ノ

虚シ又衰フナド云フハナキナリモシ実ニ虚衰セバトウシテ

カ茶石ニテ治スヲ得シ殊不知皆病毒ノ所為ニシテ各証ニ

随テ其毒ヲ抜去フヲ世ニ所謂虚衰ト云モ本ニ復シテ

精氣サカンニナルナリ○病人灸後ニ發熱シ或ハ氣ムツカシ

ク何ニヨラス灸後ノ不快ニ效アリ又湯火傷ノ甚シキニ服

シテ妙ナリ。又瀉下ノ丸散ヲ兼用スベシ。凡湯火傷ニ牡蠣ノ末一味麻油ニ調ヘ傳テ即効アリ。○此方モノニ驚テ發狂スルニ用テヨシ。又遺精ヲ治ス。

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯

桂枝

大棗

生姜

蜀漆各六分

牡蠣一枚

龍骨八分

甘草四分

右七

味以水二盞四分煮取六分。○コレハ桂枝去芍藥湯ノ症ニ

胸腹ノ動甚レキヲ治スルノ方ナリ

桂枝加芍藥生姜人參湯

桂枝

大棗

人參各六分

生姜

芍藥各八分

甘草四分

右六味以水二盞四分煮

取六分。○コレハ桂枝加芍藥湯ノ証ニシテ心下痞鞭

又ハ嘔スルヲ治スルノ方ナリ

桂枝二麻黃一湯

桂枝八分

芍藥四分

大棗

生姜各六分

甘草五分

麻黃一分

杏仁各三分

右七味以水一盞半

煮取六分。○桂枝湯ノ症多クシテ麻黃湯ノ症少キモノ

ヲ治ス

桂枝二越婢一湯

桂枝

芍藥

甘草

麻黃各四分

大棗

石膏各六分

生姜七分

右七味以水一盞半

煎取六分。○桂枝湯ノ証多クシテ越婢湯ノ証少キモノ

ヲ治ス。○一老女仲春ヨリ惡寒發熱シテ頭痛ヲ患フ諸

医コレニ與ルニ柴胡湯或ハ桂附或ハ補中益氣ノ類ヲ

用レ尺寸功ヲ奏セス。葶苈トノ盛夏ニ至リ病日ニ篤ク

惡寒殊ニ甚シク衣ヲ重被ヲ襲テ蹠卧ス。余脉ヲ診スル

ニ浮大ニシテ數ニ古上印腦アリテ口渴ケリ。即此方ヲ
三劑アタヘテ蒸々ト發熱シテ煩燥スル。三時許ニシ
汗大ニ流出テ衣被ヲ浸シ病大半ヲ減ズ。明日又アタヘ
テ發熱煩悶シテ汗出三日ニ至テ諸症皆退キ。三十日ニ
シテ全ク愈

桂枝麻黃各半湯

桂枝五分芍藥

生姜

甘草

麻黃各五分大棗

杏仁各三分

右七味以水一盞六分煎取六

分。○桂枝湯ト麻黃湯ト二方又証ノ相半スルモノヲ治

ス

小建中湯

芍藥二分

桂枝

甘草

大棗

生姜

各六分膠飴四分

右五味以水一盞四分煎取六分去渣

内飴令消。○裏急ニシテ腹中拘急シ。或ハ急痛スルモノ
ヲ治ス。拘急ト云ハ腹中ニ竹ヲトテ突立ガ如クニ覺エ
或ハ弓ノ弦ヲ張タルヤウニヒツバルキミラ云。愚案ス
ルニ此方ヲ千金方ニ芍藥湯ト名ツケタルゾ古名ナル
ベシ。○此方心中煩悸シ。或ハ衄血又ハ腹中手足等痛ミ
煩熱シテ夜寢ラレズ。オソロシキ夢ナドヲ見。或ハ遺精
ナドノ患アルニヨシ。○積聚腹痛ノ持病ニコレヲ診シ
テ腹皮拘急スルニ用フベシ。又小柴胡湯ト外証ハ同ジ
ナレ氏其腹ヲ診シテ胸脇苦滿スルヲ並胡湯ノ証ト
知ルベシ。滾痰丸三黃丸紫圓ノ類ヲ擇テ兼服スベシ。○
一男子年五十有餘腹痛ヲ患フ。形羸食減ジテ起臥人ヲ

侍三、薦上ニ伏フ巴ニ三月所發スル時ハ、反復顛倒シテ
手モ近ツクベカラス、余診スルニ、腹皮癢急ス、乃此方ヲ
アタフルニ、一劑ニシテ知リ、二劑ニシテ諸症漸退キ、二
十劑ニシテ歩シテ門ヲ出ツ、又診スルニ心下痞シテ食
ノ味美ナラサルヨシ、即茯苓杏仁甘草湯ヲ作テアタフ
ル、五、六劑ニシテ全ク愈タリ

黄耆建中湯

於本方加黄耆三分、○小建中湯ノ証ニシ
テ盜汗或ハ自汗出ルモノヲ治ス

黄耆桂枝五物湯

黄耆 芍薬 桂枝
大枣 各七分 生姜 一分 右五味以水一盞八分煮取六分、○桂
枝湯ノ証ニシテ嘔シ身躰不仁レ急迫ナラザルヲ治ス

黄耆桂枝苦酒湯

黄耆 芍薬 桂枝 各七分 右三
味以苦酒二分水一盞四分煮取六分、○身躰發熱シ汗出
テ衣ヲ沾ス、其色黄テ茶汁リ如クナルモノヲ治ス

桂枝甘草湯

桂枝 甘草 各一分 右二味以水一盞八分
煮取六分、○上衝シテ急迫ナルモノヲ治ス、芍黄散ヲ兼
用スベシ

半夏散并湯

半夏 桂枝 甘草 各一分 右三味搗篩
以水一盞煮七沸、内散更煎三沸、令小、冷少々嚥之、○咽喉
痛上衝シテ痰アルモノヲ治ス

桂枝甘草附子湯

甘草 芍药 附子 桂枝 各一分
右四味以水一盞二分煮取六分、○上衝急迫身痛甚ニ手

近カラス骨節煩疼シ小便利セザルモノヲ治ス○一士人
 官ヲ辞シテ後世ニ所謂軍書講談ナルモノヲ以テ業ト
 ス冬月新宅ノ其壁イマダ乾カズ戸牖モ塞カス寒キ所
 ニ坐シテ講談ス一日忽然トシテ人事ヲシラス口眼喎
 斜シテ言語スルコトアタハズ半身不遂諸医並ニ功ナク
 已ニ三ヶ月ニ至レリ余診スルニ上冲シテ面赤ク手足
 清冷ニシテ動舉スルコトヲ得ズ小便自利シテ禁セス乃
 此方ヲアタフルコト三十劑ニシテ自利漸止テ手足温ヲ
 生スレカルニ忽大便下利スルコト日ニ六七行七八日ヲ
 経テ手足運動シテ起居スルコトヲ得テ四十餘日ニシテ
 諸症咸退テ常ニ復セリ我故先生恒ニ謂ク汗吐下ハ我

ヨリ為ニアラズ彼ヨリ自ラ至ルモノナリト方ヨク其
 病ニ中レバ病毒ノ伏匿ル所ナクシテ逃去ルト知ル
 ベシ

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 桂枝 甘草 牡蠣

龍骨各八分 右四味以水一盞二分煮取六分○胸腹ニ動氣
 アリテ煩躁スルモノヲ治ス

桂枝人蔘湯 桂枝 甘草各八分 人蔘 朮

乾姜各六分 右五味以水一盞八分煮取一盞內桂者取六分
 ○人蔘湯ノ證ニシテ上冲シ急迫スルコトノ甚シキモノ
 ヲ治ス

人蔘湯 人蔘 甘草 朮 乾姜各七分 右四味以

水一盞六分煮取六分○心下痞鞭シテ吐下小便不利或ハ急痛シ或ハ胸中痹スルモノヲ治ス心下痞鞭トハ心下ニ薄キ板ナドヲ按ガゴトキモノノベツタリトカタマリタルヲ痞鞭ト知ルベシ○積聚ニテ或ハ痛ニ或ハ食ス、マズ又ハ胸膈ノ急痛スルニヨシ○諸病急ニ心下ヘサシコミテ息ダハシキニヨシ○浮腫ノ症ニ心下ヘ水氣アツマリテイキダハシキニ用フ○心下フサガリテ下利スル症ニヨシ又此方キ三黄丸滾痰丸紫圓ノ類ヲ擇テ其症ニ隨ヒ兼用スベシ○一男子一身悉ク腫テ小便通ゼズ心下痞鞭レ鬱々トシテ飲食ヲ欲セザルニ此方ニ三黄丸ヲ兼用シテ二十劑ニシテ愈

茯苓甘草湯

茯苓

桂枝

生姜

甘草

右四味以水一盞二分煮取六分○心下悸シ上衝シテ嘔スルモノヲ治ス○一婦人年四十許平生ニ上衝シテ頭痛シ時々嘔噦ヲ発ス愈ザルヲ凡五六年諸医效ナシ余診スルニ心下悸シテ少腹ニ塊アリ即此湯及ヒ消石大圓ヲアタヘテ諸症全ク愈

茯苓杏仁甘草湯

茯苓

杏仁

甘草

右三味

以水一盞二分煮取六分○胸フサガリ鳩尾ニツカヘ悸痛三イキダハシク或ハ水ヲ吐キ怔忡スルニヨシ

茯苓戎鹽湯

茯苓

鹽

右三味以水一盞

四分煮取六分去渣内鹽令消○心下悸シテ小便利セザ

ルモノヲ治ス

葵子茯苓散

葵子十六兩

茯苓三兩

右二味為散飲服方寸

匕日三〇小便利セズ心悸身重腫滿スルモノヲ治ス

苓薑朮甘湯

茯苓

干姜各八分

甘草各四分 右四

味以水一盞二分煮取六分〇心下悸シテ小便自利シ腰

中冷痛腰ノ重ク五千錢ヲ帶ガコトクシテ形水狀

ノ如クナルモノヲ治ス〇小便頻數或ハ淋瀝或ハ腰髌

季脇ノアタリ一處ツヨク凝結シテ痛ムニヨシスベテ

婦人ニ此症ノモノ多シ〇老人身微腫シ手足重ク腰脚

タルクシテ力ナク所謂中風ノ症ヲ發セントスルガ如

キニ平水丸控涎丹或ハ十束湯ノ類ヲ擇ミ兼用シテ時

時攻ムベシ〇此方水瀉ニ効アリ〇友人某淋瀝ノ症ヲ

患ル一多年腰脚冷テ夜寢ラレズ心下悸アリ此方ヲア

タヘテ諸症全ク愈〇一婦人平生上衝甚シウシテ心悸

ノ症アリ故先生コレニ苓桂朮甘湯ヲノマシム一夜大

ニ腹痛シテ苦楚スル一語ベカラス先生往テ診スルニ

疼痛ノ狀腰ニアツマレルヲ見テ此方一劑ヲアタヘテ

頓ニ瘥タリ〇一士人年七十平生小便頻數腰冷テ水中

ニ坐スルガ如ク夜ヲ厚シテ蓋ヒ坐スル時ハ精液自ラ

洩テ禁レズ諸治並ニ効ナシ如此ナル一已二十餘年ナ

リト余診スルニ心下悸アリ即此方ヲアタヘテ全ク愈

苓桂朮甘湯

茯苓

桂枝七分

朮

甘草各五分

右四

方々復覽上二

三

味以水一盞二分煮取六分○上衝心下逆滿三悸起時
ハ頭眩シ小便利セザルノ症ヲ治ス一應悸ト云ハ動ヨ
リハ小クシテビククト手ニアタルヲ云フ或ハ心下或
ハ腹背或ハ面部手足ニテビククト動クアリ又手足
時々引シヤクルアリ所謂肉瞤筋惕ナルモノ是ナリ
○上気ツヨク目ニヒスル持病ニ芎黃散ヲ兼用スベシ
○眼病ニ此症多シ内障外障或ハ白翳或ハ星ヲ生ジ又
ハ血出ル等ニ芎黃散或ハ紫圓ヲ兼用シテ下スベシ又
桂枝加桂湯竹葉石膏湯ノ証ヲ参考スベシ又眼病ノ治
シガタキモノニ七寶丸ヲ強ク用レハ奇効アリ○一婦
人年三十許平生小便淋瀝シテ氣上衝シ心下悸アリ目

眩々トシテ物ヲ見ルヲ羅ヲ隔タルガ如シト余此方及
ヒ芎黃散ヲアタヘテ諸症全ク愈○一婦人年四十素脚
疾ヲ患テ步履セザルヲ三年夏月忽大ニ膿血ヲ下シ諸
症雜出ツ頭眩上逆シテ水ヲ吐スルヲ數日人皆必死ト
ス其夫治ラ我東洞先生ニ請フ先生診シテ此方及ヒ三
黃丸ヲ作リアタヘテ飲シムルヲ二三劑ニシテ諸症稍
退ク服スルヲ數日先生復ビ診スルニ腰脚冷テ結痛シ
心下悸ス更テ苓姜朮甘湯及ヒ平水丸ヲ投ルヲ百餘日
脚疾日ニ除テ健歩スルヲ得タリ

苓桂甘棗湯 茯苓一分 甘草四分 大棗 桂枝各六分
右四味以水二盞煮取六分○臍下悸シテ上衝奔豚ニ發ル

モノヲ治ス。芍黄散或ハ三黄丸ヲ兼用シテ時々紫圓ニテ攻ムベシ

苓桂五味甘草湯

茯苓

桂枝

各八分

甘草六分

五味一分右四味以水一盞六分煮取六分。○心下悸。上衝シテ咳嗽甚シキモノヲ治ス

苓甘五味薑辛湯

茯苓

甘草

干姜

細辛各四分五味九分右五味以水一盞六分煮取六分。○前方ノ證ニシテ上衝セズ。痰飲満スルモノヲ治ス。滾痰丸ヲ兼用スベシ

苓甘薑味辛夏湯

茯苓

甘草

干姜

細辛各三分五味子九分右六味以水一盞六分煮

取六分。○前方ノ証ニシテ嘔アルモノヲ治ス

苓甘薑味辛夏仁湯

茯苓

甘草

干姜

細辛各三分五味子九分杏仁各六分右七味以水二盞煮取六分。○前方ノ證ニシテ微レク浮腫スルモノヲ治ス

苓甘薑味辛夏仁黃湯

茯苓

干姜

甘草

細辛各三分半夏五分五味子九分杏仁各六分大黃三分右八味以水二盞煮取六分。○前方ノ症ニシテ大便秘結スルモノヲ治ス

茯苓澤瀉湯

茯苓

澤瀉

甘草

桂枝

水四分生姜六分右六味以水二盞四分煮五味取八分内

澤瀉更煮取六分。○心下悸レテ小便利セズ。上衝及嘔吐
レ渴テ水ヲ飲ント欲スルモノヲ治ス

澤瀉湯 澤瀉ニモ 朮一 右二味以水一盞二分煮取六

分。○胃眩レテクルレシ。小便利セザルモノヲ治ス

五苓散 澤瀉一 茯苓 猪苓 朮各六分 桂枝四分

右五味為散以白飲和服方寸匕煎法倣桂朮各甘法。○暑ニ中煩渴

身熱頭痛下利スルモノヲ治ス。○水瀉ニ用テ効アリ。○

消渴小便利セズ或ハ渴レテ水ヲ飲ント欲レ水ヲ飲バ

即吐スルモノヲ治ス。○淋病ニヨレ。○水ヲ吐スルモノ

ニハ散藥ニレテ用フベレ。○熱物ヲ飲ント欲スルモノ

ノニヨレ。○一病人口渴レテ心下悸レ腹大ニ痛テ席ニ

着ズ東洞先生コレヲ診レテ云此五苓散ノ證ナリ愈ヤ

ル前ニ診スベシト門人等ヲ徃シム門人等或ハ其証ノ

臭ラザルヲ疑フ病人服茶シテ腹痛頓ニ退ケ死更ニ小

便利セズレテ口渴クヲ猶甚シ然レ死此方ヲ續服セシ

メテ全ク愈タリ是等ニテ先生ノ腹候ニ精ナルヲ思

フベシ

茵陳五苓散 茵陳蒿末十分 五苓散五分 右二物和服方

寸匕。○所謂黄疸ノ病ナドスベテ發黄スルモノニ五苓

散ノ症ヲ兼ルモノヲ治ス

猪苓湯 猪苓 茯苓 阿膠 滑石

澤瀉各六分 右五味以水一盞二分煮取六分內膠令消。○

癸熱小便利セズ或ハ淋瀝又ハ渴テ水ヲ飲ント欲スルモノ
 ヲ治ス○淋病ニ登黄散ヲ兼用シ或ハ蟹霜一味ノ末ヲ
 酒ニテ服ス若久シク愈サルニハ七寶丸一二分ツ、毎
 日兼用スベシ○下利シブリハラ或ハ膿血ヲ下スニヨ
 シ○一男子血淋ヲ患ル一ニ三年一日血大ニ出其痛忍
 ベカラズ已ニ二三升ニ至リテ目眩テ人事ヲ知ラズ余
 即此方ヲアタヘテ漸ニ効ヲ収テ再ヒ発スルコナシ
 猪苓散 茯苓 朮 猪苓各等分 右三味為散服方寸
 ヒヨニ三〇湯シテ心下悸シ小便利セザルモノヲ治ス
 牡蠣澤瀉散 牡蠣 澤瀉 括萐根 蜀漆
 葶藶 商陸根 海藻各等分 右七味搗篩白飲和服方

寸匕日三服○腰以下水腫シテ腹中ニ動アリテ口中乾キ小便
 利セザルモノヲ治ス

八味丸 乾地黄兩八 山茱萸 薯蕷各四兩 澤瀉

茯苓 牡丹皮各二兩 桂枝 附子各一兩 右八味末之

煉蜜和丸○臍下不仁小便利セズ或ハ腰脚タルウシテ

カナク痛シ或ハ小便自利シ或ハ消渴シテ小便反テ多

ク飲一升ナレバ小便スルモ亦一升ナルガ如キノ症

ニヨレ○小兒ノ遺尿ニアタヘテ徃々功アリ○一婦人

陰中刺痛シ小便スル毎ニ大ニ痛ム半時許モ止ズ如

此ナルコト數年ナルニ此方ヲアタヘテ後ニ紫圓ヲ兼用

シテ全ク愈タリ凡大人小兒凡ニ此證アリスベテ此方

用テ屢効アリ○一男子二十餘歲夏月下疝瘡ヲ患フ
 一夜卒倒シテ人事ヲ知ラズ半身不遂余診スルニ心下
 鞭滿ス乃紫圓蜜丸三錢ヲ用テ吐下セズ明早又診スル
 ニ心下ヨリ臍上マテ陷下シテ物ナキガ如シ其少腹ヲ
 サグレバ鞭滿ニシテ瓢單ノ狀ニ似テ小便淋漓テ自利
 ス余乃八味丸料ヲ作テ飲シメ十七八劑ニシテ小便通
 長ス又紫圓ヲ以テコレヲ攻テ手足運動スルヲ得テ
 四十餘日ニシテ諸症全ク愈○一士人熱病ヲ患テ後口
 渴テ茶又ハ湯ヲ飲ム毎三四升小便スル一晝夜五
 六十度其外少モ苦ム一ナシ諸匠効ヲ奏セズ余即八味
 丸料ヲ作テ飲シメ諸症頓退○一婦人淋ヲ患ル一數年

陰中冷痛シテ刀錐ニテ刺ガ如ク後小便不通一身腫脹
 煩渴飲ヲ引余診スルニ少腹不仁ス即此方ヲ與テ小便
 即利シテ諸証稍退ク後七寶丸一二分ヅ兼服シテ淋
 痛再發セズ

栝萹瞿麥丸 栝萹根二兩 茯苓 薯蕷各三兩 附子一兩半

瞿麥一兩 右五味末之煉蜜丸梧子大○惡寒アリテ渴シ
 小便利セズ心下悸スルモノヲ治ス

麻黃湯 麻黃一分 桂枝二分 杏仁一分 甘草一分 右四味

以水二盞四分煮取六分○頭痛發熱惡寒シテ身躰疼キ
 喘シテ汗ナキ症ヲ治ス

麻黃加朮湯 麻黃七分 桂枝五分 杏仁八分 朮一分 甘草五分

右五味以水二盞二分者取六分○麻黃湯ノ証ニシテ小便利セサルモノヲ治ス

麻黃甘草湯 甘草一分 麻黃二分 右二味以水一盞煮取

六分○喘息急迫額上汗出總身ニ汗セサルモノヲ治ス

麻黃附子甘草湯 麻黃 甘草各一分 附子七分 右三味

以水一盞四分者取六分○麻黃甘草湯ノ証ニシテ惡寒

シ或ハ身微痛ムモノヲ治ス○一儒生傷寒ヲ患フ身軀

疼痛シテ轉側スルヲ得ズ惡寒發熱煩渴シテ腮腫刀

ニテ刺ガ如ク痛飲食スルヲアタハズ余乃此方ヲ作テ

飲シメ病全ク愈

麻黃附子細辛湯 麻黃 細辛各一分 附子七分 右三味

以水二盞煮取六分○麻黃附子甘草湯ノ証ニシテ惡寒

甚シク痰飲ノ變アルモノヲ治ス

麻黃杏仁甘草石膏湯 麻黃一分 杏仁四分 甘草六分

石膏四分 右四味以水一盞煮取六分○麻黃甘草湯ノ証

ニシテ咳喘シ或煩渴スモノヲ治ス○一婦人年二十三姪

娠七八月ヨリ身洪腫ス分後咳嗽喘急甚シク絶食

シテ日々危篤ニ至ル分医初ヨリ所謂温補ノ劑ヲ與ヘテ

病勢分ニス分加フ更ニ參附ノ類ヲ加倍シ用ヒテ遂ニ四

肢厥冷シテ冷汗オビタシク出テ面色土ノ如ク唇白

ク喘氣甚クシテ人ヲ射テ寒ル分氷ニ觸ルガ如キ分ヲ

覺ユ左脉已ニ絶シテ右脉絶ザレ氏蜘蛛絲ノ如ク口渴

テ飲ラ欲ス。余此湯ヲ作テ與ル^ル三劑ニシテ身温リ喘
減ズ。又三劑ヲ飲シメテ稀粥^{キジユク}ヲス^{ウスキカユ}、リ三日ニシテ脉復
シ。三十餘日ニシテ諸症全ク愈。○一^{ナク}小兒十歲許身體腫
脹煩渴喘急スル^{ナク}十餘日。已ニ死ニ垂ントス。衆医治ス
ル^{ナク}アタハズ。余乃此方ヲ與ル^ル三日。喘渴イマ^ヤ夕止ズ。
更ニ紫圓ニ分ヲ以テコレヲ攻メ。大ニ下利スル^{ナク}五六
行。前方ヲ續ク服セシメテ全功ヲ收ム。

麻黄杏仁薏苡甘草湯 薏苡仁^{分五} 甘草^{一分} 杏仁
麻黄^{各五分} 右四味以水一盞半煮取^{六分}。○麻黄杏仁甘草
石膏湯ノ証ニシテ渴セ^ル身煩疼水氣アルモノヲ治ス

牡蠣湯 牡蠣^{各一分} 麻黄^{各一分} 甘草^{五分} 蜀漆^{七分} 右四味

以水二盞四分^ラ先煮蜀漆麻黄得^{一盞}八分内^ニ二味煮取^六
分○喘急迫息ノ証ニシテ胸中ニ動アルモノヲ治ス

麻黄醇酒湯 麻黄^{一分} 右一味以清酒一盞二分^ラ煮取^六
分頓服○喘シテ黄ヲ^分發シ或ハ身疼ムモノヲ治ス

半夏麻黄丸 半夏 麻黄^{各等分} 右二味末之煉蜜和丸
小豆大飲服^{三丸}日^三○喘シテ嘔スルモノヲ治ス

小青龍湯 麻黄 芍薬 甘草 桂枝
干姜 細辛^{各三分} 半夏 五味子^{各六分} 右八味以水二

盞煮取^{六分}○喘咳倚息上衝發熱惡風^レ乾嘔スルモノ
ヲ治ス○咳嗽喘急寒暑ニ至レバ必ス發シ喉中ナリス
タキ痰沫ヲ吐テ卧ス^アアタハズ或ハ一月ニ二三度或

ハ四五度モ発スル持病ニヨシ。大人小兒氏ニ。毎日滾痰丸ヲ五分。或七分ツ、用ヒ。時々紫圓。或ハ白散。又ハ走馬湯等ヲ擇ヒ用テ下シ。久シク服シテ病根ヲ拔ベシ。○世所謂勞效ノ症ニ。大小青龍ニ方ノ証アリ。東洞先生モ滾痰丸紫圓ヲ兼用セシメテ。功ヲ得ラレタルコト多シ。固ヨリ勞效トテ別ニ治方アルニアラス。唯毒ノ深重ナルモノナレバ。症ヲ逐テ病毒ヲ除キ去ルベシ。○咳逆甚クシテ小便利セズ。腫滿トナルモノアリ。此方ニ滾痰丸。或ハ平水丸ヲ兼用シテ効アリ。猶大青龍湯。越婢加朮附湯ノ條下ヲ互考スベシ。○女子十四歳生ナガラニシテ。喉吼ヲ患フ。其形短小ニシテ。八九歳ノ兒ノ如シ。發スル時

ハ喘促シテ痰ヲ吐シ。効シテ息スルコトヲ得ズ。坐シテ臥シ。アタハズ。余此方及ビ滾痰丸ヲ作テアタヘ。時々紫圓ニテコレヲ攻ルナド。出入スルコト一年所ニシテ。其疾愈テ再ヒ発セズ。其形盛大ニナリテ。漸ク常人ト異ナラス。

大青龍湯 麻黄一分 桂枝 甘草各四分 杏仁二分
石膏一分 生姜 大枣各六分 右七味以水一盞八分煮取六分。○喘シテ咳嗽シ。渴シテ水ヲ飲ント欲シ。上衝發熱。或ハ身痛。三不汗出シテ煩躁ルヲ治ス。○効嗽喘急久シク愈サルニ。滾痰丸ヲ兼用シ。時々控涎丹。十枣湯。或ハ走馬湯等時宜ニ随テコレヲ攻ムベシ。

文蛤湯 文蛤 麻黄 甘草 生姜

大棗各六分 石膏一分 杏仁五分 右七味以水一盞八分煮取

六分〇煩渴之飲飲之咳急ナルモノヲ治ス

越婢湯 麻黃一分 石膏一分 生姜六分 大棗八分 甘草四分

右五味以水一盞二分煮取六分〇水腫發熱惡風之渴之或

喘之渴セサルモノヲ治ス〇喘渴甚シク或一身之尽グ腫

テ小便利セサルニ平水丸或ハ控涎丹ヲ兼用シ時々備

急圓又ハ紫圓ニテ下スベシ〇脚腫疼痛スルニヨシ〇

一男子年五十餘脚腫テ疼痛忍ブベカラズ日夜叫號ス

ル一五六日諸治効ナシ余此方ヲアタヘテ病頓ニ退シ

越婢加朮附湯 麻黃九分 石膏一分 甘草三分 朮六分

附子二分 生姜四分 大棗六分 右七味以水一盞二分煮取

六分〇越婢湯ノ証ニシテ手足痛ニ或惡寒小便利セザ

ルモノヲ治ス〇乃謂脚氣腫滿ノ症ニハ平水丸或ハ紫

圓ニテ攻ムベシ〇一男子年五十枕ニ伏ス一三月許遍

身之洪腫シテ小便利セズ飲食スマズ痰喘急迫シテ心

中煩悶氣息絶ナントス諸医手ヲ束子其家モ亦救フベ

カフズトス余先飲シムルニ控涎丹三錢ヲ以テス間ア

リテ水數升ヲ下シ心腹頓ニ安シ又此方及ヒ平水丸ヲ

作テ互ニ進ム小便利シ腫脹日ニ退キ四十餘日ニシ

テ全ク愈

越婢加半夏湯 麻黃九分 石膏一分 甘草三分 生姜四分

大棗六分 半夏七分 右六味以水一盞二分煮取六分〇越

婢湯ノ証ニシテ嘔逆スルモノヲ治ス

葛根湯 葛根分ハ 麻黄 生姜 大枣各六分 桂枝

芍薬 甘草各四分 右七味以水二盞煮取六分分○項背強

或ハ發熱惡風或ハ喘シ或ハ下利スルモノヲ治ス○所謂

感冒或ハ傷寒ノ初發ニ用フ發熱下利スルニヨレ○手

足シビレ痿タルニヨレ○肩背高クハリスクス首ハ

ラズ癭ノ如クナルニ芍薬散或ハ滾痰丸ヲ兼用シ更ニ

紫圓或ハ十棗湯控涎丹ノ類ヲ擇ビテ時々コレ攻ムベ

シ又大陷胸湯ノ証ト宜宜互考○痘瘡麻疹ノ初發ニ此方

ヲ用ヒテ紫圓ニテ大ニ下スベシ○東洞先生ハ方内大

黄ヲ加テ頭瘡小瘡癰毒便毒及ヒ諸瘡毒腫ニ用ヒラレ

タリ又梅肉散或ハ紫圓ノ類ヲ兼用シテ瀉下スル可

ナリ其毒深キモノハ七寶丸ヲ與フベシ○一婦人産後

百餘日忽然トシテ舌縮リテ言フアタハズ背膈病急

シテ手脚強直シテ椽ノ如ク幾ド死ニ至ントス余乃桂

枝加朮附湯ヲアタフルス四五劑ニシテ諸症稍減スト

イヘ氏全効ヲ奏セザルニ因テ紫圓ヲ以テコレヲ攻ル

ト三十日許猶自若タリヨツテ東洞先生ニ問先生ノ曰

此葛根湯ノ症ナリト余即コレヲ與フルニ諸症随テ退

ク後十棗湯ヲ作テアタフルニ下利數十行ニシテ全ク

愈タリ爾後或ハ此症ニアヘハ此方ヲアタヘテ屢功ヲ

得タリ○一男子面部ニ腫毒ヲ發シ漸々ニ両目ヲサガ

リ。或ハ破テ膿汁シダ、リ。狀癩瘡ノ如クニシテ。臭穢近
ツクベカラス。余此方ニ梅肉散ヲ兼用シテ即愈。○一男
子小瘡ヲ患フ。其股脛陰囊腫潰テ膿水シダ、リテ。衣衾
ヲ浸シ。楚痛忍フベカラス。余此方ニ大黃ヲ加テ飲シメ。
時々梅肉散ニテコレヲ攻テ全ク愈タリ

葛根加半夏湯

葛根分六

麻黄

生姜

大朮

分半 各四

桂枝

甘草

芍薬

分各三

半夏

分九

右八味

以水二盞

煮取六分

○葛根湯ノ症ニシテ嘔スルモノヲ治ス

葛根黃連黃芩湯

葛根一分

黃芩一分

甘草

分各四

黃連

分六

右四味以水二盞四分煮取六分。○項背強急シテ。心悸下

利スルモノヲ治ス

小柴胡湯

柴胡分八

人蔘

甘草

黃芩

大朮

生姜分各三

半夏分六

右七味以水三盞煮取一盞半。去滓再

煎取六分

○胸脇苦滿シ。寒熱往來。或ハ嘔シ。腹中痛ヲ治

ス。○傷寒雜病ニ拘ラス。舌上ニ白胎。又ハ黃胎黑胎アリ

テ。心下脇腹滿シ。或ハ痛シ。或ハ不食シ。又ハ氣ムツカシ

ク。勞效氣ノ方ナドイヘル症ニ。三黃丸。或ハ滾痰丸ヲ兼

用シテ。時々紫圓ニテ下スベシ。○表熱散シテ後ニ氣ム

ツカシク。不食シ。ツカヘルニヨシ。○小兒驚風。或ハモノ

ニオソレテ夜寐ザルニヨシ。○疳証ニテ下利發熱シ。脇

腹滿スルニ紫圓ヲ兼用シテヨシ。○婦人産後ニ寒熱ア

リテ。狂ノ如ナルニ。此方ノ証アリ。白虎湯。三黃瀉心湯半

夏瀉心湯ノ証ヲ参考スベシ。狂疾癩症ニモ四方ノ條下考ベシ。○瘧疾ニ其腹証ニ隨テ考ヘ用フベシ。古今小莖胡湯ハ瘧疾ノ方ノヤウニオボエテ一概ニ用シテ治セザルヲ多キハ寒熱ヲ準據トシテ腹証ヲ知ラザルニヨレリ。東洞先生ハ腹診ヲ主トシテ弟子ニ教フモレ腹診ニ精カラサレハ疾病ヲ治スルコトアタハスト知ルベシ。○水腫ニ胸脇苦満シ小便不利モノアリ。三黄丸平水丸ヲ兼用スベシ。○一男子年四十餘初時腎ニ毒腫ヲ發シ愈テ後ニ一日忽然トシテ惡寒煩熱シ一身面目浮腫シ小便通ゼズ。余診スルニ心下痞鞭シ胸脇妨脹ス。乃此方及ヒ平水丸ヲ雜進テ小便快利シテ全ク愈。○一婦人發

黄シテ心中煩熱シテ口燥キ胸脇苦満シテ食スルコトアタハズ。數日ノ後兩目盲シテモノヲ見ルコトヲ得ス。余乃此湯及ヒ芎黃散ヲ作り與フルニ目遂ニ明ニ復シ。一月餘ニシテ諸症全ク愈。○一男子吐血スルヲ數日止ズ。日ニ益劇シ。余其腹ヲ診スルニ胸脇妨脹シテ痛ム。乃此方ヲ作テアタフルコト二三劑ニシテ効ヲ奏ス。○一男子年三十。傷寒ヲ患フ。四肢逆冷。攣急シテ惡寒ス。其脉沈ニシテ微ニ。已ニ斃ントス。諸医淺附ノ劑ヲ投ズルニ効アルコトナシ。余コレヲ診スルニ胸脇苦満ス。乃此方ヲ與ル。二劑ニシテ應シ。其脉復ス。續ケ服セシムルコト二十餘劑ニシテ全ク愈。○一男子年五十餘。一病ヲ得タリ。常ニ鬱

鬱トシテ樂マズ。獨リ戸ヲ閉牖ヲ塞テ處リ。惕然トシテ
ハトリイマ 鶏犬ノ声ヲオソレ。上衝シテ目昏。三寢臥安カラズ。睡レ
 バ夢ヲ見。或ハ遺瀝漏精シテ。飲食味ヒナク。百治應セス。
綿延スル 綿延スル。一三年バカリ。余診視スルニ。胸脇苦満ス。乃莖
テモヒク 胡加桂湯及ヒ三黄丸ヲノマシメ。時々紫圓ヲ以テコレ
 ヲ攻ム。三月ニシテ病全ク愈。一女子年十八。咳嗽痰ヲ
 吐シ。氣上衝シテ頭目昏眩。四肢倦怠。心志夕ノシマス。寒
 熱往来。飲食味ヒナク。日ニ羸瘦シ。愈サル。一十年所。衆医
ラレカシ 皆勞瘵トス。余コレヲ診スルニ。脇肋妨脹ス。乃小莖胡加
 桂湯及ヒ滾痰丸ヲアタヘテ。服セシムル。一三月許ニシ
ヲハ テ全効ヲ収ム。

莖胡加苾硝湯

於前方内加苾硝九分。○小莖胡湯ノ証
 ニシテ。苦満解セサルモノヲ治ス。

莖胡太半夏加括萋湯

莖胡分ハ 括萋根分四 人蔘
 黄芩 大枣 甘草 生姜各三 右七味以水二盞
 四分煮取一盞二分。太滓再煎取六分。○小莖胡湯ノ証ニ
 シテ。渴シテ嘔セサルモノヲ治ス。

莖胡桂枝湯

桂枝 芍薬 黄芩 人蔘

生姜

大枣

甘草各三

半夏分六

莖胡分ハ

右九味

以水二盞四分煮取一盞二分。去滓再煮取六分。○小莖胡
 湯ト桂枝湯ト。一方ノ証ヲ兼ルモノヲ治ス。

莖胡桂枝乾姜湯

莖胡分ハ

桂枝

乾姜

黄芩

牡蠣各三分 枯婁根分 甘草分二 右七味以水二盞四分煮
 減半去滓煮取六分○前証ニシテ嘔セズ痞セズ上衝シ
 テ渴シ腹中ニ動アルモノヲ治ス○積聚腹痛ノ持病動
 氣アリ物ニオソレ驚キムナサワギシ氣力カヒナキニ
 此方ニ硝石大圓夷則丸或ハ紫圓ノ類ヲ証ニ随テ用フ
 へレ又苓桂朮甘湯桂枝加龍骨湯ノ類ヲ參考シテ用フ
 へレ○一婦人平生月經調ラズ氣上衝シ兩脇急縮シテ
 腰痛忍ベカラス其經行ントスル時ハ臍腹痛シテ下
 ス豆汁ノ如ク或米泔水ノ如シ經水練ニ一日或ハ半
 日ニレテ止如此モノ十二三年ナリト余診スルニ胸脇
 苦満シテ臍上動氣甚シ乃此方及ヒ硝石大圓ヲ作テ雜

進△時々赤黑膿血ヲ泄ス服スル日數月ニシテ前症全
 ク愈レヨヲ得タリ

大莖胡湯 莖胡分八 黃芩 芍藥 大棗各三分

大黃分二 枳實分四 半夏分六 生姜分五 右八味以水三盞

煮減半去滓再者取六分○小莖胡湯ノ證ニシテ心下急
 微煩シ腹滿拘攣シ或ハ嘔スルモノヲ治ス○傷寒十餘
 日往來寒熱譫語シ大便通ゼズ腹滿拘攣スルニヨレ○
 積聚ノ腹痛ニヨレ○小兒熱出テ腹滿スルニヨレ○一
 男子年四十餘卒倒レテ人事ヲシラズ醒テ後半身不遂
 舌強テ語ルヲ得ズ諸医効ナレ余コレヲ診スルニ胸
 脇痞鞭シ腹滿甚シクシテ拘攣スコレヲ按バ手足ニ徹

七
 七

セリ乃此方ヲ作テ飲シムルヲ十二三日ニシテ身躰略
 ヨク舉動ス又時々紫圓ニテ攻ルヲ二十日許全ク愈ル
 一ヲ得〇一酒客年五十餘久シク左脇下鞭滿シテ大甘
 盤ノ如ク腹皮擰急シテ痛三時々発シ煩熱喘逆シテ卧
 ス一アタハズ面色痿黄シ身體羸瘦ス丙申ノ春潮熱ヲ
 発シ火ナドニテヤクガ如クオボエテ愈サルヲ五十餘
 日余乃此方ヲ作テ飲シムルヲ凡五十餘劑ニシテ其熱
 稍退又時々紫圓ヲ以テコレヲ攻ム病者信ジテ前方ヲ
 服スルヲ一年許ニシテ舊病尽ク除〇一婦人年三十四
 五熱病ヲ患ルヲ十八九日譫語煩躁レテ安カラズ熱減
 ゼズ飲食スルヲアタハズ諸医必死トス余診スルニ胸

肋妨脹腹滿シテ拘攣ス乃此方ヲアタヘ六七日ニシテ
 腹滿去テ食スミ出入二十日許ニシテ全効ヲ収ム

白虎湯

石膏ニ匙四分 知母九分 粳米六分 甘草三分 右四味

以水二盞煮取一盞二分去滓内粳米煮取六分〇大渴煩
 燥引飲或斃モノヲ治ス〇傷寒渴シテ水ヲ飲ント欲シ
 狂ノ如クニシテ譫語スルニヨシ〇熱盛ニシテ赤斑ヲ
 発スルニヨシ〇狂人煩燥シテ渴スルニハ滾痰丸紫圓
 備急圓等ヲ参考シテ兼用スベシ〇暑ニ中リテ大熱煩
 渴シ吐瀉シテ昏冒スルモノニヨシ〇瘧疾ニ咽渴キ口
 乾ニヨシ〇頭痛破ルガ如クナルニヨシ又舌上黒或ハ
 黄ナルヲ見ルベシ〇一男子年二十熱病二十日許大熱

煩渴シテ水數升ヲ飲ント欲シ頭痛破ルガ如ク。婦人狂
 呼シテ衣ヲ棄テ走ントス。余此方三劑ヲ與ヘテ汗出熱
 去リテ病者^細倦スル^{コシ}死狀ノ如シ。因テ復診スルニ前
 証皆除テ但胸脇苦滿シテ上衝尤甚シ。更ニ莖胡桂枝湯
 及ヒ芍黃散ヲ服セシメテ愈テ復常マ。○一男子年五十
 忽發狂^多罵詈スル^ハ親疎ヲ避ス。高二登テ歌ヒ衣ヲ棄
 テ走り遍身燥熱シテ煩渴引飲ス。余此方ヲ與ヘ又^暴風
 霜一錢巴豆八分胡椒五分右三味ヲ丸シ二錢ヲアタヘ
 テコレヲ攻レバ^セ蛇ヲ出ス^ル數升ニシテ疾頓ニ退キ二
 十日ニシテ全愈。○一女子四歲腹滿甚クシテ下利日ニ
 數十行口渴シテ冷水ヲ飲^レ好^シ恣ニ瓜果生冷ノ物
 ヲ食^テ肌肉黃瘦シテ愈ザル^{コト}半年^ヲ余乃白虎湯及ヒ紫
 圓ヲアタヘノ^シムル^{コト}凡^ソ五十劑ニシテ諸症全愈。

白虎加人蔘湯 於本方加人蔘四分。○本方ノ証ニシテ
 心下痞鞣スルモノヲ治ス

白虎加桂枝湯 石膏一分 知母一分 粳米四分 桂枝三分
 甘草二分 右五味以水二盞煮取一盞二分去滓內粳米再
 煮取六分。○白虎湯ノ証ニシテ上衝身煩疼スルヲ治ス
 小承氣湯 大黃一分 厚朴一分 枳實九分 右三味以水二
 盞煮取六分。○腹滿シテ大便カタクモノヲ治ス

厚朴七物湯 厚朴一分 甘草一分 大黃四分 桂枝二分
 枳實七分 大棗四分 生姜七分 右七味以水一盞半煮取六

分○腹滿發熱或ハ上衝嘔吐レ或ハ夏月下痢レ裏急後重ニヨシ○腹滿甚クシテ所謂鼓脹ノ症ナルモノヲ治ス
大承氣湯 大黃分八 厚朴一分 枳實一分 芒硝一分 右四味以水三盞煮二物取一盞半去滓內大黃煮取六分內芒硝令消○腹堅滿シ若ハ下利臭穢若ハ燥屎アルモノヲ治ス○傷寒大便不通腹堅滿譫語レテ狂ノ如クナルニヨシ又白虎湯ノ証ニ似タレ凡白虎ハ煩渴ヲ主トシ承氣ハ腹堅滿ヲ準據トスベシ○痢病ニ毒ノ淺深ハアレ氏先大承氣ヲ以テ惡物ヲ下ス肝要ナリ又痢病愈テ後ニ毎年其時節ニ至テ発スルモノアリコレハ毒ノ尽ツケサル故ナリ此方ニテ下スベシ○卒ニ腹滿シテ痛煩悶

レテ口噤シ死セントスルニヨシ○小兒ノ時ヨリ腹脹滿シテ痛ム持病ニヨシ○食傷吐下セズ腹滿シテ石ノ如クナルニヨシ○病人癰狀ノ如ク日晡ニ發熱シテ大便通ゼザルモノニヨシ○瘕病腹滿口噤シテ席ニ着ス脚掌急シ齒ヲカムモノニヨシ又大陷胸湯ノ証ヲ参考スベシ又東洞先生曰此方ヲ用テ大便一二度通ズル凡茶ヲ止ベカラス其証ノ尽ルヲ度トスベシ証ヲ尽クサマシテ茶ヲ止レバ病復発ス其時復用テ復止死後終ニ救フアタハザルニ至ルト心得ベシ○小兒生テ五日許卒然ト啼声ヲ出サズ目ヲ見ツメ煩悶シテ驚風ノ証ニ似タリ紫圓ヲ用ルヲ三日ニシテ治セズ其腹ヲ按

二堅満シテ石ノ如シ。即大承氣ヲ用ヒテ愈タリ。○一男
子年五十餘。胸痛スル。三四日。偶上巳ノ日ニアタリ。大
二酔テ。忽然トシテ。口言フ。アタハス。心中煩悶シテ。反覆
顛倒ス。腹痛ノ状アリ。余診スルニ。腹中堅満ス。乃備急圓
三錢ヲアタヘテ愈サル。三時許。後ニハ。其人伏シテ動
カズ。肩息シテ吐セント欲シテ吐セサルノ態アリ。手足
冷。衣ヲ循牀ヲ摸リ。將ニ死セントス。又真武湯三劑ヲ與
ヘテ諸症稍退ク。後一日アリテ。言語スルヲ得タリ。六
七日ニシテ全ク治セリ。余謂ク。治ハ則治ス。恐クハコレ
偶中ナラント。乃先生ニ問フ。先生ノ曰。其治ニアラス。始
ニ大承氣湯ヲ用ル時ハ。此ニ至ラズト。後半歳ニシテ。其

人復前証ヲ發ス。余即大承氣三劑ヲアタヘテ。疾立ドコ
ロニ愈テ再ヒ發セズ。於是乃知先生ノ用方ニ察ナル。ウ
ニク長沙氏ノ室ニ入ルヲ○一賈人年六十。熱病ヲ患
フ。諸藥雜投シテ。日ニ増劇シ。十七八日ニシテ。耳聾目瞑
シテ人ヲ知ラズ。唇焦舌黑。譫妄燥渴。唯冷水ヲモトム。水
入ル時ハ。嘔熾ス。手ヲ揚ゲ足ヲ舞ス。病勢危キ。甚シ家
人只斃ヲ待ノ外ナシ。余其腹ヲ按セバ。鞭満シテ疼痛ノ
状アリ。乃大承氣湯三劑ヲ作テ飲シム。其夜燥屎五六枚
ヲ下ス。明早目明ニ耳聞クヲ得。始テ人事ヲ知ル。然レ
口渴イマダ止ス。猶冷水ヲ飲ント欲ス。余禁セズ許シテ
飲シムルニ。三日ニ至テ復飲ヲ欲セズ。前方ヲアタヘ

服セシムル十餘劑ニシテ諸症日ニ除復診スルニ心
下痞鞭シ腹中雷鳴ス更テ半夏瀉心湯及ビ三黃丸ヲ作
テコレヲ飲シメテ病全ク瘳○男子年四十有餘熱病十
八九日口言フ能ハズ目視ル正ク得ズ身體動カス手
足清冷ナリ諸医陰症トナシテ葭附ノ輩ヲアタフルニ
寸効ヲ得ス余診スルニ兩脉蜘蛛絲ノ如ク將ニ絶ント
ス其腹ヲ候ニ臍下物アリテ磊砢タリ乃大承氣湯ヲ作
テ飲シメ燥屎五六枚ヲ通ジテ諸症頓ニ退○一婦人傷
寒ヲ患テ謔語狂笑シテ清水ヲ下利スル一日ニ數十行
諸医療スルヲアタハズ余診スルニ腹鞭滿ニシテ按セ
バ痛ムヲ甚シ乃此方ヲ作テ連ニ進ル三劑ニシテ利

即止テ諸症並ニ除ク○一老人偏頭痛ヲ患フ其痛刀ニ
テ割ガ如ク治セザルヲ四十餘日諸医療スルヲ得ズ
余診スルニ腹鞭滿シテ大便通セザルヲ十四日舌上黃
胎面目黧黑乃此方五劑ヲアタヘテ下利スルヲ五六行
諸症頓ニ退キ六七日ニシテ全ク治シタリユレヨリ腹
滿シテ偏頭痛スルモノニアヘバ此方ヲアタヘテ功ヲ
得スト云フナシ○一男子年五十腹堅滿ニシテ切痛ス
時正ニ嚴冬ナリ医寒中トナシテ四逆湯ヲ用ルニ功ナ
シ余此方ヲアタフルニ一飲シテ其痛即止再飲シテ病
全ク愈

大黃黃連瀉心湯

大黃

黃連

右二味以麻沸湯

六分漬之須更絞去滓温服○心煩心下痞コレヲ按シテ濡ナルモノヲ治ス

瀉心湯 大黃一分 黃連 黃芩各六分 右三味以府漿湯

六分漬之去滓頓服○心中煩亂心下痞コレヲ按シテ濡

ナルモノヲ治ス○吐血衄血ニヨシ○心中煩燥シテ痛

或ハ積聚或ハ腹痛ニヨシ○眼目赤腫頭項腫痛口舌ニ

瘡ヲ生シ心胸煩躁飲食美ナラズ小便赤クシブリ大便

秘結癰瘡瘡腫ヲ生シ痔疾肛門腫痛鮮血ヲ下スヲ治ス

○一男子年三十餘熱病ヲ患ヒ愈サルヲ三十日許背惡

寒殊ニ甚シク皮膚層燥熱シテ飲食スルヲアタハズ余診

スルニ腹内濡ニシテ唯心下滿スコレヲ按セバ痞セズ

即此方ヲアタヘテ汗大ニ出テ諸症頓ニ退キ十五六日ニシテ全愈

附子瀉心湯 大黃一分 黃連 黃芩各五分 附子七分

右四味以水九分先煮附子取六分去滓令沸内三味漬之

須更絞去滓服○瀉心湯ノ證ニシテ惡寒スル者ヲ治ス

大黃附子湯 大黃九分 附子一分半 細辛六分 右三味以水

一盞半煮取六分○胸下偏痛ニ惡寒スルモノヲ治ス○一

男子年五十餘腹痛スルヲ數年ナリ余診スルニ心下痞

鞭腹中雷鳴ス乃半夏瀉心湯ヲ作テ飲シメイマダ効ヲ

奏セズ一日忽然トシテ大ニ惡寒戰慄シテ絞痛スルヲ

常二三倍ス於是更ニ大黃附子湯ヲ作テ飲シメ痛頓ニ

止續ケ服スルヲ數日ニシテ病再ビ發セズ

大黃甘遂湯 大黃一分 甘遂一分 阿膠各六分 右三味以水一

盞八分煮取六分○少腹滿スルヲ數數音對用器名ナリ狀ノ如

小便少難ク或ハ經水調サルモノヲ治ス○一僧年二十

八淋瀝ヲ患ルヲ數年時ニ膿血ヲ出シ或ハ米泔水ノ如

ク大便下利シ時ニ秘閉ス若下利スル時ハ淋瀝スルヲ

稱安ク秘閉スレバ甚シ余診スレバ少腹滿シテ腫狀ノ

如ク按セバ莖中ニ引痛ト乃此方ヲ作テ飲シメ大ニ下

利シテ病頓ニ退キ數日ニシテ全愈

抵當湯 水蛭七箇 蟪各十箇 大黃二分 桃仁七分 右四味

為末以水一盞煮取六分○少腹鞭滿シテ經水不利シ或

ハ不腹滿其以我ハ滿スト云モノヲ治ス○傷寒其以狂

ノ如ク小便自利スルモノニヨシ○婦人經水不調或ハ

赤白帶下不止或ハ臭穢近クベカラザルニヨシ○一婦

人年三十癩疾ヲ患ルヲ三年眉毛脱落シ鼻梁腫大ニ一

身腫テ赤斑雲ノ如ク手足麻痺シテ月經通セズ余乃抵

當丸ヲ作テ飲シムルヲ日ニ三錢コレヲ服スルヲ三十

日血下ルヲ數升後一百日ニシテ治ス

橘皮大黃朴消湯 橘皮六分 大黃一分 芒硝各一分 右三

味以水一盞二分煮取六分○心胸ノ間ニ宿滯アリテ結

スルモノヲ治ス

大黃硝石湯 大黃 黃礬 硝石各八分 梔子四分

右四味以水一盞二分煮取六分去滓内硝石令消○發黃
腹滿小便通せず汗自出治ス

大黃牡丹皮湯 大黃_{分八} 牡丹_{分六} 桃仁_{分四} 瓜子_{一枚}

芒硝_{二分} 右五味以水三盞煮取六分去滓内硝石令消○臍
下ニ堅塊アリコレヲ按セバ痛三或ハ便膿血スルモノ
ヲ治ス○腸癰癰疔便毒或ハ風熱腫或ハ乳岩ノ類ニ伯
州散ヲ兼用シ梅肉散ニテ下スベシ○一男子風毒腫ヲ
病愈テ後二三年瘡口未_タ収_ラ水ヲ出ス後脚_シ攣_キ急_シテ疼痛
忍フベカラズ余此方ヲ用テ痛除キ瘡口モ亦全ク治ス
○一女子十四歳初左腿_モ毒腫ヲ発シ潰テ後餘毒消セズ
膿汁_シ淋瀝_シテ癢ス脚強直シテ棒ノ如ク廁_カニ登ル_ルア

タハズ巳ニ六年ニ及フ諸医療スル_ルヲ得ス余ニ治ヲ
求ム即此方ヲ作テ飲シメ時々虎_ノ黛_丸ニテコレヲ攻_テ西
月餘ニシテ全ク愈タリ○一男子熱病ヲ患ヘ大半愈テ
後一日腹大ニ滿シ臍_カ傍_キ痛テ刺ガ如クナルニ此方ヲ與
フル_ルニ劑ニシテ愈

大黃甘草湯 大黃_二 甘草_五 右二味以水一盞八分
煮取六分○大便秘結_シ或ハ水ヲ吐_シ食ヲ吐_スルモノ
ヲ治ス

調胃承氣湯 大黃_一 甘草_五 芒硝_二 右三味以水一
盞八分煮取六分内芒硝令消○大黃甘草湯ノ証ニシテ
實ナルモノヲ治ス○友人某所謂消渴ノ症ニ此方ヲ用

テ功ヲ得タリト考ベシ

下瘀血湯

大黄二兩

桃仁

蟬蟲

各十枚

右三味末ス

蜜和為四丸以酒八分煎一丸取六分服○臍下毒痛及ヒ

經水利セザルモノヲ治ス此方古名大黃蟬蟲丸ト云本

草ニ見エタリ蟬蟲和産ナレ或ハ有ト云フモノ詳ナラズ舩来ノモノ功アレト多ク得ガタレ

土瓜根散

土瓜根

芍薬

人挂枝

蟬蟲各三

右四味為散酒服方寸匕○少腹滿痛シ經水利セヌ或ハ

白物ヲ下スモノヲ治ス右下瘀血湯及ヒ此方當ニ桃枝承氣湯ノ次ニ列スヘキヲ冊ヲ

分テ割紙アルヲ以テコニ載ス覽ニ入次茅ノ差ヘルヲ尤一勿レ

古方便覽上冊終

