醫案類語

七至九

十武9
6 7 7
4

醫案類語離部第五

目次病候門第五變機類

疼痛瘙痒　疼痛　痒
結核腫脹　結核　腫滿　毒腫
寒熱發作　微熱　壯熱　熱勢　蒸熱
　處　熱煩　發熱　留熱
　寒　惡風　寒熱　惡
積塊瘕癥積結　積動　積消　雜載
痘疹發斑　見黑　起脹　灌膿　結靨　雜
　載　疹　斑　雜載
瘡瘍痙癰癤瘍　瘡瘍　疔　癌瘤　癮瘤
　塊　雜瘡
雜載　雜載

鄭田氏藏記

姙孕出娩　姙娠　臨産　難産　産後
墮胎

小兒諸候

病候門第六内景類

臟腑諸候　臟　腑
經絡筋髓　經絡　筋　脉　髓　榮衛　附
骨節屈伸　骨露　骨痛　骨軟　骨出　雜載
脉候虛實　左右不均　左右均　輕重不同
三部不齊　脉至　脉狀
三部同言　脉出伏　脉微雜載

平安淇園先生譯定　浪華　葛西　欽
門人　阿波　櫻木公恩纂輯
太和　藤本正之
薩摩　鮫島尚目校補

病候門第五變機類

疼痛　疼痛煩痒

疼痛　○分裂則痛痛(スレバ)則痒(メバ)痒則神歸之(クバ)神歸之(クバ)則熱熱極○物中無覺胸腹稍痛明日漸加攪刺(クイクイ)夷堅志○瘡痛煩發

毒氣入裡(儒門)○熱痛如火(同)○月餘成塊狀若覆杯大痛不住(同)○經脉斷閉腹如刀劃(同)○身如刀刮而痛類案○痛無休止如此者五六日不可按(同)○歷節痛如鎚鍛(良方)○二月後遍身作痛陰雨益甚(同)○兩額大陽抽痛異常(玉衡)○大腹脹痛亦僅微疼(同)○腹脹板痛不能屈伸(同)○心胸痛身重難移(同)○臍下疠痛(方事)○兩腿酸痛(薛)○筋骨軟痛(同)○痛逆極中之極呼吸將絕(喻氏)○一人遍身疼每作殆不可忍類案

痒

○一人面腫色變黑燥痒眉髮脫落(類案)○瘤生頭間痒不可忍每以火烘則股間一點奇痒已而舉體皆然(同)○脚心發熱作痒搔摇滾水浸潰而出水(同)○夜半痒處發痛止(儒門)○初病疥疕搔纔成腫(同)○發痒時心搔湯火俱不解痒定黃赤水流痛不可忍(同)○渾身燥痒(同)○血鰲而痒也(經驗要方)○作痒而悶亂煩燥語之不聽禁之不止摇頭擔頸手亂足亂者凶(同)○八朝清漿未半而痒沸禁止不定面幾破碎眼將露縫(救)○體

蟣虱發痒成疙瘩（シラミ）

結核腫脹

結核 ○瘤氣結核皆屬火熱（素問）○結核在項在脅在身（二丹溪）○結核瘤癧腫硬（ガンレキカリテキ）統醫

腫滿 ○水起臍（テ）以下至少腹腫（ヲ）脘然（ソク）上至胃脘（ヲ）死不治（セ）（靈樞）○溲（小便）溺滿（ニ）器腫脹漸消（レ）薛（クツレ）○病水腫面光如胞（ホウ）腹大如箕（ミ）脚腫如槌（ツチ）汪（アーキトヨボンキトヨガクルメテオナンフトサニカタ類案）○一足發腫如瓠（ヒサゴ）自腰以下鉅細通爲（ル）一律（ト本）一事○至曉（テ）大腫眉目耳鼻渾然（トメ）無別（ヒツニテ）○頭面肢體腫脹指按（ヤス）成窟（ヲ同）○腹脹如鼓（ヒヂオヒバ）以上堅硬皮膚欲裂（ニ同）○頭項偏連（一）目狀若半寐（ウチカラハレテイツホウクメニハレツキカヒヒヤタアハンブンニクヤ）○兩足皆腫按之陷（レ）而復起行則濯濯（タクタク）有聲（ニテ）○偶得水腫四肢不舉（カラ同）○飲水過多漸成腫滿（テ同）○水行之狀如蛇走（ユク）隧（ミチ）如線牽（ヒクガゴトシ）四肢森然（ソク）涼寒會於臍（ニ）下而出（同）○腫立消作胡桃紋（クルミニタテヨコノシワ）反細於不傷之肘（ヒヂ同）○飲食稍進即爲食傷（メシアタリテ）而復腫（赤）水○脹裂崩塌（ハリサケ）而出（同）○身面四肢浮腫漸（ニ）而入腹（ニ）腹大不可言（フ同）○眼胞腫而無縫（同）○光腫（同）（ギガリハレ）○腫益加（同）○水腫○氣腫○手（テ）足俱腫（ニ）將逮於腹（ニ）（玉衡）○病鼓脹（ヲ）大如箕（ミ）（ルー）如囊（汪）

○腹大如娠青脉露路同○掌聞腹病臍突不治同
色蒼黑而腹大形如鼓狀丹溪○胸膈脹赤水○身忽
浮腫如吹氣毬溫疫○腹滿○洪腫外臺

毒腫

○勿破破之死須以手緩柔之乃破鬼遺方○其
發而黑攣者不堪同○生腫毒隱隱見一物類瘡
形類案○腹脹生赤疹如霞片同○腫勢約七寸許痛
甚同○肋下忽腫起如瘤狀頃之大如盌夷堅○患
附骨癰畏針不開法○腰生一瘭作痒同○外踝腫
起熱痛如火儒門○遍身突腫狀似蕃花筋攣骨疼痛

夜尤甚法○兩腿一臂各潰二寸許膿水淋漓同○
紅紫脹痛水○煩腫痒痛時出黃水同

寒熱發作

微熱

○肌常有微熱類案○四肢按之殊無大熱此內
傷寒也同○微覺身熱汗

壯熱

○熱如燔火本事○熱痛如火儒門○熱如火燎
捫之烙手赤水○熱如湯火灰中救○熱如焚同
偏○口內如爐同○乾熱如紅爐之炙同○大熱如炮
更熾同○火迸咽喉焦燥不時煙焰上騰晝夜不休

温疫〇捫其身烙手辨〇熱熾汗多汪〇熱炎不止外臺

熱勢〇熱轉增劇赤水〇熱勢綿綿無休歇經驗要方〇熱勢頓減按偏

蒸熱〇内蒸熱氣膸膸上騰肌削骨立赤水〇骨蒸病源脉蒸〇皮蒸〇肉蒸〇盡蒸同〇心中煩熱惟欲露體良〇五心煩熱自汗〇手足心皆熱赤水〇兩足心如火烙似氷折之作偏辟

熱處〇額顱手心皆熱赤水〇發熱晝輕夜重同〇邪熱減大半惟僅潮熱而已渴甚同〇熱將發時四肢先痲兩足膝皆戰掉同〇身若燔炭申酉刻熱潮更甚同〇須臾一陳熱事〇得熱疾日出氣暄則熱夜及涼雨則否倪〇夜間發熱早辰退五心煩熱無休止時〇時或遍身發熱熱退四肢冷如氷喜效

熱煩〇煩燥面赤揭衣臥地類〇煩燥不休日夜手握鐵器或浸冷水中程仁甫

發熱〇日晡潮熱傷寒〇日晡發作赤水〇發熱晝輕夜

留熱 ○發汗過度熱留胸中煩燥不止水○此餘熱未盡徹故也 同

惡寒 ○欲得被覆向火金匱○洒洒然毛聳 同 ○兩足惡寒經五六月間猶綿脛靴足腰膝皮膚少有跣露則冷風襲之流入經絡其痛轉劇 同 ○入仗空無人處居之室忽覺心動背寒凜凜遂成勞瘵之疾 醫說○寒慄鼓頷 素問○惡寒見風輒仆臥密室以衾蒙其首熾炭助之 項彦章 ○惡寒戰慄不自禁持滿○雖夏月足寒如氷 薛

惡風 ○表虛惡風如洒氷雪類○盛暑中宜帷幕周密 同 ○浙浙惡風傷寒

寒熱 ○惡寒發熱○先發寒戰徐熱至五鼓微汗而脇疼寒熱悉減赤水○寒熱交作嘔噦煩懊同○洒浙惡寒急劇發熱 同 ○外寒而束內熱前後心脘四肢腫痛 同 ○若有骨蒸內熱之病時發外寒過內熱附骨蒸盛之時四肢微腫足趺腫 醫說○戰慄鼓掉片時許發燥熱身如火焚 虞

積塊痕癥

積結　○食飲積冒穢濁蒸宿結則隆隆而熱類○因怒意乳房下帖肋骨結一塊漸長同○一繼伯好茶成癖積在左脇儒門○食旦衰積日盛同○小腹當中有一氣塊初如栗漸如盞脘滿重取却有按之痛甚捫之高半寸丹溪○痛如小腹塊如鷄卵同

積動　○上至鳩尾傍至兩脇及臍下但發時按之如水聲心腹結硬手不可近日發五七次甚則欲死儒門○當心如碗石每發痛不可忍同○臍下一塊大如杯不旬日如椀大發則不可忍本事○食積脇痛必有一條扛起沙篆

積消　○舊塊輪郭尚在類○經宿塊軟再宿則塊近下一寸同○塊消一暈止藥丹溪

雜載　○有沈積數年儒門○一人遍身俱是塊塊即痰也類案○得病塊乾硬如石文理有五色同

痘疹發斑

見點　○紅點簇簇痘科鍵○見點稠密形不大緊同○稀少○紅活○明潤○青斑○藍斑○紫斑○黯淡同○根窠同○如蚊迹同○瘡疱周匝密而不容瘡同

○根量盡散者死同○夾疔同○紅影出于肌膚同
○如蚕殼蚊皮經驗要方○如虱之斑如蚊之迹同○稠
密瑣碎同○三兩成叢出同○串連成一片同○三
寸一粒同○痘常帶艷而赤其後多痒塌同○磊落
同○若芥子碎蜜者此次之○痘如橘色同○蒙
頭鎖項同○見點宇肌肉之間隱隱若痲乾紅晦滯
方彿乎逆拔○放標數點磊落分明同○
兩頬不分界地同○見痘不紅不紫如珊色椒皮同
○紅活光壯經驗○明潤而鮮同○次日痘即一齊漫
出細若針頭自頭至足渾然無隙地同○匀淨圓尖
而凸周淨而鬆痘科○宛然一顆痘景色偏○三日
内即報痘候○痘色紫而不顯明同○痘發不透掩
露後骨節痛類案○出痘根脚密同

起脹

○峻發赦偏○綻突如珠同○焦疱影撞色赤滋
潤同○頂陷糞薄同○自朝至暮絶無起勢同○痘
甚磊落第熱尚如烙盤量赤膿糞大半爲烈火燔
灼而焦宛若螺螄同○痒塌痘科○平塌同○起發
○小脹○假脹○眞爛○外剥○白陷○紅陷○灰

陷○焦枯○紫陷○黑陷○色蒼臞○頂陷○眼封
○瘡疱黑陷腹內悶同○起發不透經驗○皮溶溶易
破不成顆粒大片潰爛同○瘡出已齊或起或發或
收靨同○天瘡○珍珠瘡○茱萸瘡○乾枯陷伏之
變同○沿眶補空翻生疽子同○其瘡靨旋出干
瘡空之間始雖疎而終漸密同○瘡攢攏塌數日作
瀉類○出瘡破者未破者次白色又雜間同○瘡色
即變紫同○正視驗間見其勃然攏起如人被驚之
狀予因悟曰此子瘡雖出齊而稠密已甚其血氣內

虛亦效

灌膿○養漿之時經驗○養膿○起漿同○成漿瘡科○
注漿同○空倉無膿同○膿貴渾濁同○膿水漏出
堆聚乾結經驗○浮囊空殼如蚕殼如麩皮同○漏漿
瘡科

結靨○落痂瘡科○結痂○成痂○先靨○後靨同○
倒靨○遲靨同○癜痕同○癜薄無痂同○出瘡脫
痂光潔玉衡○一少年瘡痊靨謝後忽口噤不開類案
瘡雜載○吸門腫塞水入則嗆經驗○瘡回同○黃糜

讓同○口氣腥臭沖人同○遍身作痒抓爬不寧同○解獻同○水喉證候科○痛止色復審類案○順候○逆候○險候○痘疹還元候統醫○邪毒在中未發縱是正氣充完終爲之累同

疹○疹證早晨微熱午後亦大甚眼白珠赤色而不黃手足冷而吐逆統醫○疹子出於肺故在皮膚之下而出皮膚之上其形如麻一出而沒俗名曰麻同

疹○至半夜遍身發紅丹如癮疹片時遂沒而大汗虛○隱隱紅斑見於皮膚間○見紅斑四肢尤甚汪

○濕熱鬱於皮膚久而不散發而爲斑黑皆相連遍身花漾統醫○風痒癮疹同

雜載○一女子赤暈如霞作痒類案○遍身疹點皆活動流注兩腿衡○臥即復流動遍散於身仍作稀痧同

痧點同

瘡瘍痙癰

瘍瘡○疽發背大如盂頭如蜂巢類案○婦人發房鬼遺方○癰疽已有瘡眼未出膿痛不可忍事○瘡瘕內陷凹一韭葉許心○既而痛止寒戰根未散門○夕

肉盡去好肉長平止法○紝於瘡上摻追蝕之藥待其
熟可紝同○剝起者即當用破頭代鍼之劑同○瘡
頭如粟許腫硬木悶肉色不變同○瘡頭破時出血
水○一夕決潰膿欲殆焦氏

疔○一人脚面生疔形僅如粟其毒甚大統醫○右耳
下天容穴間一疔其頭黑靨四邊泡起黃水時流渾
身麻木發熱譫語同○一人感風毒面生疔十餘枚
同○掌後患疔紅絲至腕類案

雜瘡○患瘡成漏日出膿汁法○背項常有痤癰愈而
復生儒門○外腫作瘡數年不已膿血常淌淌然同

瘡差○一夕而枷乾儒門○日傅之則易差而無痕汗漫
錄○脇下紅成一小癤以解毒早堤潰消大毒不成
也赤水

瘢癜○因刮穿頸額間瘢癜流出皆汗也玉衡○聽時
即發遍身水晶瘢癜同○左脇下紅堤大如鷄子傍
有小菩薩作疼類案

癭瘤○項癭○病頸癭始生如堤近三年
如盆同○額角患瘤醫爲剖之同○初若鷄卵漸巨

如升太平廣記○瘢疾頻愈同

贅疣 ○治贅疣目以綢絲線作除根繫之一宿自落外科精義○蜘蛛網纏贅疣七日消爛焦氏○左脇腫贅如赤桃類案○鼻端生贅如拳石綴鼻根蒂如筋同

妊孕出娩

妊娠 ○婦人重身者精義○孕兩月嘔吐頭眩類案○經注三月漏○至十月求易產藥同○年方十五孕慮其難產薛氏○一婦年三十餘或經注或成形未具其胎必墮丹溪○妊娠三箇月因閃挫傷胎腰痛類案○懼胎墮不敢投涼劑同○孕八九月漏胎不止胎比前時稍寬收小血色微紫有塊澀丹○其娠追下小腹痛楚難禁救○因事築磕著胎或子死腹中事○忽然胎上沖心而痛坐卧不安類案

臨產 ○占房西遊記○產聲甫近類○一婦盛暑月中產訖○一婦將臨月兩目忽然失明類案○一婦將產七日而子不下百治不效同○服前藥劑即時產同○每產則子腸先出然後產子產後其腸不收同○母子皆全同○令其家人以湯溫其腰腹自爲上下

拊摩孕者覺腸胃微痛呻吟間生一男子同○至十貼而胎乃下同○坐月旣○滑胎湯藥○產帳○產室同○兒逼產門方可坐草同○騐胎褚氏遺書○品胎產甚快澌○因奴生者不謹損破尿胞而致淋瀝不禁同○一孕婦將坐草患小便不通辭○召穩婆二人其一媼極抽婦之臂其一媼頭抵婦之腹更以兩手拔其腰極力爲之胎死于腹良久乃下兒亦如血乃穩媼殺之也門儒一婦人臨產召村媼數人侍焉先產一臂出媼不測輕重拽之臂爲之斷子死于腹同○兒已出胞而一手誤執毋腸不復能脫故非符藥所能爲吾聞腹摺兒手所在鍼其虎口既痛即縮手所以遽生無他術也髀

難產

○兒頂後骨偏柱穀道額露汾○下血甚多產門不開兩日未生類案○數日不產下體已冷無藥甚窘同○產不利已斂同○累日產不下服催生藥不効龐曰此必坐草太早心下懷懼氣結而不行同○常患橫生逆產七八胎兔子皆不育汪○輕手推正汾溪○急取秤鉤續以壯繩以膏塗其鉤令其毋分兩

足向外偃坐左右各一人脚上立足次以約其兩膝命一壯力婦人倒身搜出死胎下敗血五七升儒門○

產後 ○一婦產後血風四肢痺癢丹溪○惡露脫衣並下同○惡露上行同○敗血停滯同○惡血甚多同○敗血不盡同○胞衣不出同○半夜生產侵晨暈厥同○產後餘血奔心煩悶同○產後血暈同○惡露未盡因起抹身寒氣客于經絡同○一產婦陰戶一物如柏垂下或有角或一岐俗名產顛同○氣血驟長其脬即完同○產婦陰戶下一物如合鉢狀有一岐此子宮也同○後覺一嚮而收入同○胎衣未下同○一婦初產四日冷物所傷類案○寒氣入產門膀胱脹滿于不敢犯同○陰門不閉薛○子宮腫大一日方入損落一片殊類豬肝狀○用綿兜起肉線屈曲于水道遏以前薰之冷則縮之一日夜縮其大半一日即盡入類案

死胎 ○夜半果下一死胎類案○腰腹陣疼復一死胎墮下病亦愈同○腫消脹去方得分娩死胎儒門○驗之胎死已久服下死胎藥不能逼同

墮胎○積日而不墮類案○常患墮胎已七八見矣丹溪○懷子而不乳史記○慼產誤服打胎藥下血如崩漏旬餘腹痛一陣即行類案

小兒諸候

○斷臍帶丹溪○生雙胎先下地者三朝便生盡倉救急○小兒初生之時腸胃綿脫類案○初生小兒腸胃脫窄藥難區處○一小兒周歲從卓上仆地良久後甦同○乳媪抱之懷間往觀春戲時風寒甚切及回即啼不乳同○所以知兒病者時當酷暑著雜褓裹

熱內伏而然也同○喜蓋覆恐倚懷中經驗○服藥之後漆喜笑蘭室

病候門第六內景類

臟腑諸候

肺○肺痿○肺癰○肺熱葉焦則皮毛虛弱問○毒氣壅於肺道以至音聲不出秘錄○肺有伏火汪○肺受火邪同○氣耗而肺傷同○肺寒素問○肺氣壅遏不能下行丹溪

心○心虛而神不安汪○令人心懸如病饑素問

肝○肝氣逆面青多怒（聖濟）○肝脹○此肝乘脾土之症（薛）○肝鬱○肝虛○肝木實

脾○脾虛○此脾氣下陷（薛）○脾胃萎弱○中氣虛寒脾不能攝血歸經（江）○醫以爲脾寒實弱（滑）○人身脾氣每喜燥而惡濕（喻氏）

腎○腎虛多睡（聖濟）○腎水既虛相火無制（江）○腎氣不足○腎消○腎經虛熱

膽○膽虛○膽實○膽虛不眠○膽熱多睡○膽癉口苦（聖濟）○膽泄口苦（素問）

胃○食飲積胃蘊蒸宿結則隆隆狀類○瀉脫胃氣赤水（喻）○始得胃舍稍安（喻氏）○脾胃健（薛）

大腸○大腸與肛門痛不堪任類○濕熱在大腸內所爲（同）○大腸膹閉（温疫）○大腸閉澁水○大腸病者腸中切痛而濯濯○傍含噴之瘡腸自上漸漸入鬼遺○一人大腸頭出寸餘候乾自退落又出名截腸病（薛）

小腸○小腸下墜似欲去後（良）○發作之時小腸抑之聲如青蛙狀如桃李木瓜（統醫）

腸胃○寸白蟲嚙腸胃間五雜○小兒腸胃脫窄類案
○平日持齋腸胃素枯喻氏○一人舉手攀高轉其腸
疼痛不能伸腰醫統

膀胱○胞轉○膀胱腫硬醫統

經絡筋髓

經絡○經氣○經血○經脉○邪風干忤經絡金匱○
胃之大絡貫膈絡肺漱問○孫絡同○大經空虛同○
脉充大而血氣亂同○脉寒則縮蹉縮蹉則脉絀急
絀急則外引小絡故卒然痛同

筋○膝下筋脉抽掣疼痛水○右肩筋蘊腫痛夜尤
甚次日痛連胛下出腋入曲池同○筋皆暴起肌肉
上生紅點子同○挈重傷筋篆○宗筋○病則大筋
短縮即舌筋亦短蹇于言氏喻○小筋弛長同○筋惕
肉瞤○轉筋○青筋

髓○因遇大暑腦髓爍瞲○齒者骨之所終髓之所
養病源

脉○若曾前有青脉出者以針刺看血色外臺○左右
虎口脉青色灰指頭痧二十八鍼王衡

榮衛　○榮氣虛衛氣實也膿○皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也同○衛氣一日一夜大會於風府同○腠理開榮衛通同○病久入深榮衛之行濇同

骨節屈伸

骨露　○骨瘦如柴類○骨立

骨痛　○關節疼痛外臺○遍身骨節痛甚有如刀刺奇效○陰氣勝則骨寒而痛膿問

骨軟　○骨節柔軟不復腫硬類案○肢節皆舒同

骨出　○偶遭一跌環跳脫出不能復入竟日類案○依方注藥創中少頃朽骨連兩牙潰出類

雜載　○先一手摩股良久設藥少許骨格有聲遂相屬池北偶談○腰之高骨壞而不用兩膀似折類案○大骨枯槁大肉陷下膿○致胃氣弱而骨無榮養正宗

脉候虛實

左右不均　○右關浮於左關一倍類案○左脉近大而快右畧斂少帶弦而駛同○右寸關俱無左雖有微而似絕薛

左右均　○脉弦而澁似數且稍長喜不浮大兩手相

等類案

輕重不同

○兩手寸脈細緊按之洪大無力類案○六脉浮大弦滑重按豁然右大於左一倍同○脉皆微弦重似濇同○脉緩而洪弦中之下得之按之牢虛同○六脉如絲尋之則有稍輕則無温疫○按之隱隱然指下二類案○脉濇重取弦大溪丹○視脉在肌肉下且甚微而弱滑○脉浮沈皆有不足意丹溪

三部不齊

○脉之關尺上濇而滑按之沈而有力滑○六脉俱長三部九候往來有力兩手寸尺特盛至數類案○切其脉三部皆弦直上下行而左寸口尤浮滑同○切其六部沈實不似有病之脉惟兩寸略顯微數之脉醫通○脉雖浮數而無力尺以下進而弱本事方

三部同言

○診脉濡弱近駃類案○診之脉濡細而近駃曰此得之色慾也同○脉洪散參春汪○診其脉沈細濡弱而緩同

脉至

○予診其脉動而中止有時自還乃結脉也湯液○其脉參伍不調或一動三止而復來此結脉也温疫

○診其兩手脉皆如組繩有力一息六七至(儒)門○脉虛豁三至一止(江)○診脉皆微弱似有似無或一二至一止或三五至一止乃陽氣大虛也類案○脉歇至於卯酉時(同)○余疾不常時有歇指(汪衡)

脉微

○診其脉浮緩而弱不任尋按類案○脉濡弱不任尋按(同)○診脉無根蒂處(薛)○診得脉弦而微不見類案○脉之沈伏如無同

脉狀

○脉有如芒刺(向)無如蛛絲(類)如蛛絲類案○診循其少陰脉如刀刃之切手(同)○脉來綿綿不知度數而顏色不變(沙)○其氣來如彈石(素問)○脾脉來如雞踐地(同)

脉出伏

○次早脉稍出按之無根類案○夜間脉復脫(薛)○脉氣漸續而利亦止(温疫)○復請異診脉之弦大虛乱改革六脉浮洪重類案

雜載

○診其脉與證皆異而難明主療類案○脉當沈緊有力(汪衡)○脉大則病進(陳)○脉無胃氣者死(同)○

師持脉病人次者無病也傷寒

醫案類語離部病候門第六終

醫案類語震部

目次請療門

妄認誤治 作妄認遷延不諳誤治不效復不治 技窮閣藥咎誤

病家情僞 料症議醫疑惑專信諸阻 見忌諱問卜祈禱議藥雜載

敬請懇敦 敬請 告候

往診詢究 往診 詢究 度思 謝絶 代會醫

醫案類語震部

平安浪華葛西欽

門人 阿波櫻木公思纂輯

大和藤本正之

柳川淡輪秉校補

請療門

妄認誤治

妄認 ○諸醫環視議作風痰(トリマワシミサウダンニテ)類案 ○自以爲年衰多病故疾後作以告醫氏(ルヲツゲテイシヤ)儒門 ○病輒改易進退低昂(カワリ)心迷(サヾマドヒ)

意惑動失紀綱(ヲ)(ヲ)(ヲ)○市中凡有名者(ヲ)(ヲ)(ヲ)同(ヲ)(ヲ)(ヲ)捌治(ヲ)(ヲ)(ヲ)自秋
歷冬(ヲ)(ヲ)(ヲ)越月不瘳(ヲ)(ヲ)(ヲ)赤水○醫之來者一日風二日風三
四五六皆曰風即十數輩又莫不皆曰風竭技盡方
(ヲ)(ヲ)(ヲ)無一應(ヲ)(ヲ)(ヲ)同○彼已厭藥以小愈爲全安(ヲ)(ヲ)(ヲ)同

不諳

○更歷數醫皆不諳其疾(ヲ)(ヲ)(ヲ)傳○竟不知爲何疾
也赤水○諸說紛紛百治不效群然指爲惟疾(ヲ)(ヲ)(ヲ)同○此
亦目之稀覯(ヲ)(ヲ)(ヲ)不識爲何疾書無所考(ヲ)(ヲ)(ヲ)同○病者莫
測其致病之因而醫者亦莫知其受病之源(ヲ)(ヲ)(ヲ)尚
效

誤治

○醫者不察加鍼於膀胱(ヲ)(ヲ)(ヲ)又以毒藥救療
(ヲ)(ヲ)(ヲ)車(ヲ)(ヲ)(ヲ)車腹痛食減形羸已在牀枕(ヲ)(ヲ)(ヲ)儒門○有一盜醫過見
之曰我有妙藥可愈而爲膿不如此何時而愈說紝
毒藥痛不可忍(ヲ)(ヲ)(ヲ)同○醫泥方惟以補氣血投之益
甚(ヲ)(ヲ)(ヲ)五雜俎○凡醫妄以爲有孕爾於是作劑飲之(ヲ)(ヲ)(ヲ)東垣調
志
○延他醫服傷風痰嗽之藥四劑心中益脹(ヲ)(ヲ)(ヲ)校偏○彼
知醫自用四物黃柏知母之劑反頭眩目赤(ヲ)(ヲ)(ヲ)辨已○方
書雖列積藥如山疾益甚(ヲ)(ヲ)(ヲ)類○偶感風邪纔食麪餅
時師不察竟以參朮投之即大熱譫語(ヲ)(ヲ)(ヲ)赤水○醫者以
藥下之默默而死(ヲ)(ヲ)(ヲ)儒門○醫者令灸肝俞遂轉不見物

本事○一女醫用和解散發之閉戸塞牖覆以重衾以致苦熱不勝煩遂發狂言譫○公欲速効決意吐之諸郎君不能阻一吐而煩躁猶曰吐不快耳須大吐始可耳再吐而神昏悪悸汗出如雨立時就廃可歎赤○醫妄以涼藥通治類○一醫以北法治之即死於溺器上同○延十不韻者以是殆似梅毒異大人梅毒同治救偏○補塞藥多榮衛不行類案

不効

○衆醫聚首處藥幾半歳尚罔効儒○衆醫聚煎散治之不効類案○服後其病不増不減尚○延中始事之友極其升發四朝晝無起勢救○原當汗下遷延五六日脉證不改疲○温○三吳名家遍延而治寒熱温涼藥味備嘗竟無一効赤○謾試諸方一年餘不効傳○屢易醫罔効類案○病全不減同○窮其術不能療漸至羸憊危在旦夕○外○市中諸友調治無驗赤○諸醫更作偏風治之不効同○如是者半月諸通利清熱之劑靡不遍嘗不應同○十餘劑終無寸効同○自用藥不効奇○更十醫不改類案○藥之不効同○治半年不驗赤○

○百治不應同○良醫殫技莫能治類案○以爲旬日可奏効也及調治月餘毫無影响赤○多方治之不効有灸之者有以膏藥貼之者種種施之全然不應同○延及一年百藥不効王中陽

後作

○一人瘧疾更二醫不可復一醫投以附湯可而復作類案○遍訪名醫及海上方服之少有驗間或中病止得月餘復作本事○一婦患痰熱治者多以寒涼獨得小愈三四年屢進屢退於是元氣消爍類案○將理稍爲失宜諸病仍作薛○會計前後服藥七十餘劑去二病又生二病

遷延

○醫者不曉雜治經旬類案○證本應下耽閣失治或爲緩藥轟運溫疫○五臟亦以爲必須用峻藥攻擊奈諸醫昏謂恐傷元氣不敢主張是以延綿至此

技窮

○一小兒誤吞一錢在咽中不下諸醫皆不能取亦不能下儒門○衆醫治者皆無藥術矣同○衆醫技窮類案○稍服涼藥則泄注氣羸粥食愈減服溫平藥則病不知將期歲醫且術窮待斃而已同○衆醫

拱手（讀記）○與其坐以待斃莫如合藥而亡或有回生於萬一者（渡）○京中名醫用藥皆不効令則束手待斃（奇效）○束手無能爲計皆辭去且歸處子長橋上拆屋致止堂不利（赤）○市醫技窮延告急於予（同）○皆束手無措（同）○醫爲其汗爲其下醫技不能起屍寢者已浹旬（同）○諸醫皆以爲瘵盡慢菜手項

閱藥　○予因取其不効方藥來看多用清熱化痰行氣之劑（奇效）○又查其屢年所服未效藥方或以風治或以血熱治多用黄連芩藥（同）○因取初處迄今諸醫所用藥方觀之（同）○公出予發劑示盛盛大叫稱謬（赤水）○問服何劑光禄公曰不識而有藥在予視之偶失言曰左矣（同）○問其所服藥取視皆陰病藥也（孫北）

咎誤　○若再服涼藥不可救矣急令勿服前藥（奇效）○既而病者自言胸膈緊則知用胃苓乾薑者誤也（同）○此病原不難治所以久不愈而病日增者諸醫藥不對症也（同）○投劑之差由生平守常套而不知因人因症隨俗爲變也（赤水）○此非受病重藥能重病

耳孫北○胃有新邪故脈促宜引之上達今反奪之誤矣類○在法當補補而元氣完邪必自潰醫不知此泄以苦寒劑下虛不收濁氣干上故愈泄病愈熾同○當調補自養豈可攻賊發○內傷復用寒藥非其治也同○予曰此虛極而悞服涼藥大汗不止命在須臾更矣奇效○病屬氣虛醫顧下之下多傷陰是謂誅罰無過也汪○症非死候為用藥者誤耳赤水○補劑大驟同○今之見一病輒有一藥橫於胸中與夫執成方奉為靈秘者大率誤人者也喻氏

不治

○悉以為不治棄去赤水○束手無能為計皆辭去同○醫各縛手辭謝同○諸醫見之遠走不敢措劑謂其年高不宜此病讚勸回家同○不處一法而去門儒○道中一逢而去者不一矣救偏

病家情偽

料症

○人咸意其不起朴○父母及傍人皆以為必死不必服藥矣奇效○水漿不入口者七日自分死矣汪○至午刻病者又覺煩燥自心慌亂以為服藥既效而又變症病必不可為矣同○衆醫束手舉家亦

墮淚而已赤水○自身與妻俱哭泣以爲必死矣奇效○主人以爲必斃置之若棄矣救偏○自察必死來求治格致○延至十數日諸醫束手其家自謂必不可救矣奇效○胗畢顧金兄猶泪流盻畢予撫其背曰毋泪尚可生也赤水

議醫 ○須臾親舊集議非録事巻田馬騎不能本事○傾産求醫至破其家而病益堅儒門○非俞山人不能療也趣使召之類案○公劾不急予曰引領盛到可刈秸劃朽也赤水○婦道間有議予非幼科專門今更請夏氏同○予知大守公方篤信沈隨以温語慰渠曰沈公名士也可使彼展盡底蘊同○里有開化余雲谷者自謂眼科捷手同○詢諸鄰人云惟馬行術山根李家可看治即與之往醫說

疑惑 ○此友欲求速効即欲用此醫之藥諸友中有疑其不可用者持此藥來請正於予予効○緣不信多纏綿一日五衡○予欲對之彼家不信辭後自灸証○球泉疑信相半而諸醫聞之皆咲云赤水○渠宅不以予言爲然同○宋公聞言尼迺拂其意貌佰不恭予

見其貌即辭出同○又惑於衆論幾至不救薛○彼以余言爲迂同○但彼忽畏之言執意不欲予辭弗藥九朝而斃而胎卒墮偏救○

專信

○遂一意專服悉屏他藥類○信先生不爲動服之浹旬盡劑而止諸疾遂已薛○盡棄舊藥悉聽孫言神孫景○高見正與鄙意合請任意治之可也奇效

○常州張氏荊溪縉紳大家恃爲鎖鑰者赤○初亦以吐爲懼僅至是豁然稱快同○始以予言爲不謬也

同○吳醫王启山者有時名吳人最所篤信延治五日不瘳同○信往弗貳偏救○因委命以聽焉氏喻

諸門

○戒其家必不可用補至日晡其兄又來說不敢服藥之意予曰汝家有疑且將其藥煎熟姑少飲試之效○一老嫗諸曰痘子惟恐脾胃不實反用大黄宣他今痘根俱泄出矣相公當自有主意果惑于其言遂中止兩日救偏○陳恐予奪功私謁之曰孫君之藥雖善但非外科所急亦○初定方合藥時有一醫在旁見之心甚驚駭面不敢言退而語人曰毒盛

發狂而又服此就藥今日必燥熱而死此子命在須臾矣効○瘍醫不解已阻爲不可用喻氏

忌諱 ○今人以勞爲惡疾而惡聞之親戚朋友共爲隱諱見其疾狀莫敢呼之著楪者釋菜曰易象可不占而決之著楪者釋菜曰易象可不占而決之著楪者釋菜曰易象可不占而決

不止溫○證在表當汗發以赤豸難之且圖溫補類
○翁曰神甚善奈生平不能服參何赤水○衆猶持議
曰如發服此劑亦當棟去貝母山杏鄭公聽其減去
至夜予始聞隨語往峰曰減去二味恐七八日後不
能無他症同○衆醫乃繼
勉辭去項○舉家忙亂
之藥矣余適見而駭之姑俟診畢再三歸其差謬喻
○曰此一病藥入口中出生入死關係重大吾與丈
各立誓言承倘至用藥差誤責有所歸同

雜載○予知渠宅素喜速效赤水○予欲有所開放徒
家堅執弗阻竟○若聽信不專參以旁議則吾不敢
與聞也
敬請貌敦

敬請○東宮以上命醫也導之惟謹類案○以危急求
治同○名醫盈座最後延鄉醫吳至同○禮致子厚
診療○禮予診之水赤○乃敦訪予治○因逆予治
因免予治○命予診之○命予藥之同○馳書邑大
夫吳公徵予治同○曰雅聞先生高手願一診以決

之同○乃命戴人同○其夫叩
門○儒者同○以瘧求方於予予以久
瘧方與之同○親就予診脉同○適予自京回來
請予治同○時夜參半請羅視之羅○羅以死決之
子玉兄弟跣泣曰病危篤君盡心救之則死而無
恨同○予辭弗藥主人哀懇甚切情不容卻故○其
人祈哀強予藥傳曰○不肯赴請病者扶攜以就求藥
同○榜于市曰有治之者當以千萬爲謝同○延參
治之衡○其病太險欲辭不治彼哀益客途欲得生

返再三求治寔○速予投劑薛○就治敝止同○請
治同○舉家悉胎有動延予診視赤水○強恳用藥喻氏
○名醫陸在二百里外與我之及門婦已死焦氏筆乘

告候

○直至乙卯春夏覺前方頗有不効者陳公父
子不遠數千里差人來我家詳述其近日病症將前
方求爲加減效○其時予偶出二千里外遽發人來
報事急先請一醫看病同○語未竟內報病者醒而
索粥予曰與之赤○明日巳刻二公鼓掌來言夜來
痢減半汗止半無脉亦斂矣同○云未服藥時胸膈

覺凝滯而不甚作痛服藥後其痛稍增而亦不覺開
朗奇效○次日五鼓時病者精神便覺恍惚扣門請救
喻氏○其夫來寓中詳述其證求發補劑歸服同

往診詢究

往診

○予更後始至因廝僕不能診脈細詢之自女
落地惡露絕無水○適予爲趙公延至即過爲一診
○聞予在茗邑而急予治予無程而往至則蜡之念一
日也○今下午恐診之未準俟明早細察而再定方
同○余到診之脈格致○診時不言所以醫

詢究

○究其所由起謂失足墜樓也水○扣其由乃
知服玄明粉所致也同○詢知三日前曾憂遺續得
痢疾陰虛明矣同○予究病所由起渠謂過客衆厨
間燥熱食瓜菓菱藕過多同○予診其脈數詢其骨
節極痛知其瀉因濕熱而非虛滑也奇效○予細察詳
問知其病因於受暑氣也同○詢之因厚味所致因

○名孫公往鳥飛診之乃留治之翌日尹妳故北○
言之情甚懇切予不得已便道至姑蘇爲之診視奇效
○乘快舡兼程而進水○再四求余往視診其脈氏喻

悟此必食積也 類案

慶思 ○予思之而恍然悟又語之曰此症尿竅不對也水○予方殫思謂此廼注夏病同○予時聞之沈吟不已如此何以得生不忍棄治正宗○予倪思若色若脉皆非死候胡治而益劇也此必腸癉赤水○余曰此兒受症何至此極主人及客俱請稍遠待吾二人獨坐靜籌其故良久曰得之矣 喻氏

謝絶 ○予洋弗藥傷○曰當尋元醫者余不能治儒門○此先富後貧願不得又爲失榮症也辭不可治

正宗○此病尤險欲辭不治同○屯曰殺人之謗非吾所能任也醫說

代診 ○居麗海時曾令門人往候脉息私商善後之策喻氏○子充偶不在舍吾弟張揮爲診之既歸則稟子充以婦人六脉所受之患并所與之藥子充曰如吾弟所與藥當退矣傳署

會醫 ○予訊問之見醫者治大黄朴硝等欲下之軟○醫者人人異見項○維時婣嫉至商以肩輿送余臨寓余斷欲進藥衆勸云且暫回寓或者明日再

請其意中必懼吾之面折（醫輩耳）喻氏○陸重厚長者所請亦精聞予言當下了然即與予商確用藥（赤醫ノ姓）水○至次早未及服藥復請前醫參酌眾醫交口極沮渠家并後二劑不肯服矣（ヨホトカランヲタヒトテニアクルカサヲ　ソーマヽツキリトカテニレ　ソウダンシテ　サウタンシ　ソノヽヲヽヲトクンセヌ　ノムニヲトクンセヌ　レカヴセント）喻氏○因與老醫饒姓者商之渠以爲然（ト尚）效○因與先大人訂方用磨痞丸藥攻之同○雖延余至家其實主者在他醫也（クスリヲサタ）喻氏○一醫卻謂昌前所議四君子湯今始可用（リヨウチンテンテハ　スタリイレヤニモノ）同

醫案類語震部　論療門終

醫案類語異部

目次定案門

因症酌量　因症　酌量
引據徵證　引古　發明
斷症決候　決症　推幽　原始　預後　保
處方投劑　處方　端　斷死　勸飲　援議　勿藥　兩
用治進退　出處　留方　雜載
告戒慰諭　告飭　戒慎

定案門

因症酌量

○予竊謂血既ク下ル且當益其氣而升提之ヲ以探其症赤ニ水ニ○乳下嬰孩臟腑薄脆不可カラ亂攻亂補ス同○腹

醫案類語 巻之一
平安淇園先生譔定
浪華 葛西 欽
阿波 櫻木公思纂輯
大和 藤本正之
伊豫 井出 庸校補

皮寬縱已定非藥可斂也惟宜安心寡慾以保命耳
類案○惟虛憊而神氣弱非大補不能也赤水○余診畢
云此症雖危然因悞藥所致甫隔一晚尚可以藥速
追急喻氏○曰非此痢疾之症乃悞治之症也今但安
其胃不必治痢而痢自止同○予曰昨因內虛而用
補得安今又感寒補之不可發之不可將奈之何沈
思者久之因設一法效○雖得其病情尚未融通一
治法因沈思之不覺行至橋赤水○竊揆衆醫用藥於
病無逮何至罔効心慊然未決滑○一病兩症難於

投劑赤水
引據徵證
引據○當始傷時猶在上焦法當用吐素問云在上
者因而越之是也赤水○東垣治例腰痛以芍藥爲君
效此法則治當萬全矣同○法當下衆灸以妊難之
予曰經云有故無殞亦無殞也同○若作毒治而用
寒涼速其死爾內經云壯者氣行則愈怯者着而成
病惟大補庶可萬全同○陰既已亡心火獨旺故心
胸躁熱煩亂不安經曰獨陽不生獨陰不長夫之由

也羅○曰此火證也盖素勞心勞形所致因檢玉機微義示之韓飛霞○余見其羸亦不敢便投寒涼之劑乃取內經刺瘧論詳之水

發明○麻木爲風皆以爲然細校之則有區別耳夕坐亦有麻木喻如繩縛之人釋之覺麻良久自已以此驗非風邪乃氣不行也陳垣○經候雖調從未孕育令僕定方而施轉移化機之藥雖從古醫書所未載然可得言也喻氏○余以怒甚則血菀於上而氣不返於下者名曰厥巔疾厥者逆也巔者高也氣與血俱逆於高巔故動輒眩暈也同

斷症

斷症失候

○予曰此陽明少陰合病邪熱壅於上然也非禹食赤○此必腸澼左脚莫能舉是其徵也同○忽乳頭黑且汁恐孕也朱曰潘脈無孕丹溪○此氣血爲熱毒雍遏不得申其領載之權以故墮而不起非寒凝不透尤非氣虛不收也救偏○至晚身復壯熱嘯不甚安是後來餘毒之漸也同○此皆濕熱壅滯於脾無疑矣赤○行至後堂內中人出而止曰病者卒矣

升騰故渴而多飲以飲多小便亦多也赤○予俛思若色若脉皆非死候胡治而益劇也此必腸癉同○予知其脾胃極虛則陽氣無所依而欲外散是以身熱面赤脾胃極虛則津液內枯是以口渴歟○據脉多思而氣不暢赤○以毒火潛伏日久藥與鏖戰以故不寧歟偏○曰此病係積滯無疑矣而服行滯前劑不效者此其中必伏有積塊前劑徒能推動之不能滌除之是以增損而不得也王中陽○內真寒而外假熱也薛己

不勞進者予曰此必痛厥非長逝也烏可不進一着同○迫後十餘日腹中大痛口吐涎沫此又因穢氣所觸而復瘀也王○虛寒而隆於逆者也叔偏○喜熱物慰之內寒明矣堜○此腎臟風虛致浮毒上攻未易以常法治也醫說○總由上焦熱盛而然赤○余思之曰遊風為患必是父母徼瘡毒氣所遺秘錄

聞幽　○依附腸胃而薄曲折所以為棲治之窠臼格致○曰隱蔽委細之事了不于脬腎小腸之事薛己○曰此症確有邪祟附入臟腑喻氏○病由下元不足無氣

原始　○予知其昔患楊梅瘡餘毒尚伏經絡適因瘡後氣血不足舊毒感動故痛而暴也赤○形雖實而面黃稍白必平昔過飽胃傷所致○究其因乳子之父曾患此症是遺毒外吹秘錄○傍見一婢頸項瘡疕紫黑余知其婢所傳也同○壯年必犯湏瘡便毒同

預後　○予曰病從此日減矣夫癸憂赤○即可徹幸圖安亦不過千日養耳同○不惟淹纏日後必變生異證疫温○以此藥與之服畢當酣寢勿驚動傳○但恐其根未除日後復發姑誌之以例其餘証○問目可使得愈乎文伯曰使差甚易正恐二年後不治耳

類案

保命　○曰令弟之症雖易見功然非百日不能斷根赤水○十日便可以其根伯恐不能盡吾劑奈何同○彼心甚恐予曰無傷易與耳同○胸滿脹者蓋由子懸而然此一劑可瘳也同○邀安時往視之纔見即連呼不死類案○余喜曰白沫下行可無恐矣喻氏

決死　○法當三日死今尚能粥當過期史○因斷其越三日為念五戌時當棄人間赤○急請予診脉亂

無倫診畢渠語近侍欲大解予曰此死徵也陰陽離矣離而出　同○邀予相視其人臥於堂帛覆瘡上昏聵不進一三步即退人曰何也予曰敗氣滿前死期遠矣何必視瘡急備後事恐不及矣　同○曰令舅不久當殞於痢薛已急備後事　同○曰此婢不可療滑○不出二日當殂徐可豫○項曰真臟脈見法當踰月死項○決在急期記○非藥能濟汪○醫者斷其逾月而死滑

處方投劑

處方○治當消瘀血勿食解其暑氣猶可圖生勿遽棄也赤○但爲清肺利肺咳可立止同○予曰此脾腎泄也當用六君加薑桂送四神丸薛已○以益氣湯與六味丸兼服同○此非痢也宜作瘀血治之以桃仁乳香沒藥滑石佐以檀梔木香神麴爲丸米飲下百餘粒洪○疏方用仲景麻黃各仁甘草石膏湯四味喻氏○不肖姑不言其非但於渠方中去槐角地榆等而加鹿角霜一味喻云也又○吾今用治法則無治當於仲景之外別施手服同○用歸脾湯兼服化毒丙寄

丸錄○仍以前方加參三分助脾運化外以山查三
兩煎湯代水(一按)偏○前方去大黃赤芍丹皮減石膏滑
石及半加玄參花粉黃芩金銀花(同)○予設法治之
用清熱消積等藥綴綴用茶匙挑灌之(一奇效)○又製補
血氣丸藥令貧與煎藥相兼服(同)○治法外用馬齒
莧熬膏攻之速破內用保元湯托之盡出仍以痘癰
門藥爲治即日自當痊愈(一喻氏)○此由冀在下焦宜亟
攻其下毋攻其上(一滑)○用補中益氣加山梔釣藤又
以逍遙散加川芎貝母而愈(一薛已)○理宜補中行濕可

免後患(一汪)○進蘄蛇長松等湯凡復佐以雄黃大楓
子油作膏摩之(一呂滄洲)○夫水自高而趨下宜先絕其
上源乃漸痰水(一二升門儒)○以本部行經藥爲引用
爲使以大甘油膩之藥潤其枯燥而滋益津液(一堙)○
荷防風佐以薑桂芳歸之屬(一醫通)○出而疏方皆破血
之劑也(類案)

勸飲○勸前藥頓以進(類案)○自爲煮桂枝湯一椀曰
姑飲之(一醫說)○余持前藥一盞勉令服之(一喻氏)○藥必親

調始與服之同

擬議 ○予曰但得瀉止即可望甦效○惟大補其血氣則血氣自能逐毒出外而狂譫自定矣同○曰服此藥血病不加則可治也同○今必須燥濕流動之劑疎決一番庶經絡通暢水○大健其脾則胞壑而小便自通矣以白朮二兩加砂仁數錢別加二二輔佐之藥服一劑醉○以參朮厚爲外廓俾疾曾閒知有參朮不知有薑桂附子庶送達於積塊之所猛烈始露廢幾堅者削而棄盡空也喻氏○當補脾肺滋腎水則風自息熱自退痰自清薛○得泄火益陰之藥其火散走於陰器之竅疾可瘳矣門○曰脉浮無力此乃虛陽若用涼劑不久危矣吳炎○今補其氣血使氣壯而行健血盛而流通又何腫之不散結之不行注○吾以獨參及附子理中駟馬之力追之尚在半返未返之界喻氏○神既外揚必須內守方可逆挽同

勿藥 ○曰病與脉應無慮也不勞以藥惟宜飼以米飲注○此蓋以血養血令勝余后草木之藥也類案○

已消二半累求藥不與待其自消○曰再用湯藥腸胃若熟而反見化於藥矣服之何益注

兩端　○又看其兒神氣困倦疑其未必熟也戒之曰此藥煎熟姑用酒盃少與半杯若服不相宜即止勿服速來換藥效○與二五貼脉稍虛諮知藥峻矣止前藥與四物湯加川芎○此法勿疑偶中後屢用皆效同

出處　○此對症之藥法出王海藏醫壘元戎中西血飲是也特諸君檢閱不徧即檢閱亦不知為胎產之治余何能不過讀書前人之法用之而不膠焉耳赤水

○謾試諸方一年餘不效偶檢奇效良方聚香飲子一七而豁然如失類案○閱旬日復至云醫徧古今方書無與對病者維乃為處一方服同○求其法乃出千金方也同

留方　○戴人慮其舉家月路遠艾處數方使歸以自備云儒門○觀宇去城二里徐居在城內留藥而歸說○曰敢徵一料隨按法措劑畀之而去赤水○拜謝并求善後之方同

雜載　○侯徐去即買成藥兩貼付童使煎醫說○今

進參湯不可捷得（喻氏○轉方同）用治進退

○喘爲本而腫爲標治當清金降氣爲主而行水次之（類案○頻服茯苓補心湯數十貼以杜將來保養半年復舊○服之十日後以沈香海金砂丸再利之又令服塌氣丸如此互換至月餘（同）○不可遽止汗而使邪無出路（赤水○法當先驅中焦痰火積熱然後以地黃補血等劑收功斯不失先後著也○不急治即無救矣○先當止漏安氣後理霍亂可免死也遲則誤事矣○新病勢熾宜當速去所謂急則治其標也○曰足下之疾在經絡顧今天令嚴寒幸寧耐以俟春和爲足下拔去病根（同）○若不先補雖愈未免瘦憊（婦人良方○早以人味丸晚用蠟礬丸相兼無服之（正宗○奪其氣於未成也救偏○咳止吐痰亦無紅忽然大便下血予曰血在下焦爲順姑勿遽止之（奇效○吾見其來勢太急不得已而取快於一時（喻氏○二發間未宜遽截癒已（同）

告戒慰喻

告飭 ○煎服且喻之曰初服要緩久則寛矣 汪○予因諭以病根已除盡此九即止勿服 尤效○予戒之曰公能任吾意用藥勿參己見則聲可立出若欲自用則不敢與聞 同○又諭以病去後如覺體虛須服補氣血藥如八物湯之類 同○於此耐煩數日膿潰自安 汪

戒愼 ○急宜戒怒却厚味斷房室 汪 深

醫案類語畢部 終