

瘍科秘録

七

十武9
727
8



武
727
8



瘍科秘錄目錄

卷七

腎癰

懸癰

囊癰

乳癰

癰疽

甲疽

牛程蹇

瘍科秘錄

卷七 目次

自隼亭藏

リテ渴シ終夜少シモ寐ラレヌ程ニ疼ミテ後微ク減
 スルハ必ス膿ニ成タルノ候ナリ膿ニナリテモ發背
 ノ如ク自ラ潰テ蓮子蜂窠ノ形ヲナシテ自ラ膿ノ出
 ルモノニ非ス流注ノ膿ニ成ルト同様ニテ鍼ヲ刺サ
 ザレバナラヌモノナリ刺シテ膿ヲ出セバ腫痛共ニ
 從テ退ケ凡膿ハ久シク止ミカ子ルモノナリ皮ノ厚
 キ處ユヘ一旦膿ヲ成シテ肉ト皮ト分離スル寸ハ皮
 愈硬クナリ肉ハ益軟ニナリ皮肉相附着セズ其間隙
 へ餘毒瘀滯スルユヘ膿水ノ止ミ難キナリ遂ニ瘻ニ
 ナルモノ多シ一嬰兒臀上漫腫シテ堅硬ニナリ痛ミ

甚シク二便ノ始末ナトニ手觸寸ハ極テ啼泣シ發熱
 シテ但寐ルトヲ嗜ミ乳ヲ哺スニ三日ヲ經テ瘡頭掌
 ノ大サ許リ黒色ニ變シテ乾燥シ其狀死シタル狗ノ
 風雨ニ晒シ毛ノ脱テ黒ク乾キタルニ似タリ色ノ變
 リタル分ハ匡郭テ微ク陷リ好肉ノ際ヨリ自カラ潰
 テ臭水ヲ流シ遂ニ一片ノ腐肉トナリテ脱落セリ迹
 ノ深サ幾六七分許リ膿水乍ニ盡キ新肉怒生シ粒立
 テ榴房ノ垢タル如クニナリ日ナラスシテ口ヲ歛メ
 リ此モ亦臀癰ニ屬スベシ○治法初發ハ葛根湯ヲ與
 へ緩和煎ヲ施シ先鋒ヲ貼スベシ但硬ク腫レ紫暗色

ニ變シテ膿氣ノ無キモノハ大黃牡丹皮湯ニ宜シ若
 シ愈膿氣ヲ催サハ葛根新加防風反鼻湯ヲ與フベシ
 潰テ後ハ托裏消毒飲ナリ膿ニナリテモ皮ノ厚キ處
 ヲ自ラ潰ヌモノナリ宜ク針ヲ刺スヘシ針ヲ刺ス
 ノ法ハ流注ノ刺法ト同シ一ニテ成丈針口ノ濶大ヲ
 佳トス若針口狭キ寸ハ膿汁瘀滯シテ縱意ニ出ス若
 腫大ニ膿ノ深キ證ニハ先ツ左邊ヲ刺シ針ヲ抜クニ
 從ヒ左ノ大拇指ヲ以テ直ニ針口ヲ塞キ再ヒ右邊ヲ
 刺スヘシ針口ニツニナル寸ハ膿水快ク出テ、盡キ
 易シ譬ハ水滴ノ如シ孔ニツナレハ水快ク出テ一孔

ヲ閉レハ水秘澁シテ出カ子ルモノナリ若シ是ニテ
 モ膿水ノ盡カ子ルモノハ彎測子ヲ甲口ヨリ入レ乙
 口ヘ貫キ絹線美濃紙ヲ燃リ付テ太サ水引ノ如ク球
 子ニ結ヒ付彎測子ヲ引戻シ絹線ヲ乙口ヘ通シ彎測
 子ヲ去リ絹線ノ兩端ヲ瘡上ニテ合セ膝結ニスルナ
 リ甲乙ノ瘡口ヘハ破敵メイチヤヲ挿入ス二三日ヲ
 經テ甲乙ノ瘡口ヨリ切レ込ミ瘡口ノ間近クナル寸
 ハ絹線ヲ去リ痔漏刀ニテ斷截スベシ斷截シタル跡
 へハ破敵ヲ綿片ヘ攤テ瘡中一杯ニ填ベシ瘡口兔角
 ニ内へ卷キ込ムヤウニナルモノナレハ外へ反ルヤ

ウニ鹽梅シテ膏藥ヲ貼スベシ

腎癰主治方

葛根湯 葛根新加防風及鼻湯 大黃牡丹皮湯
托裏消毒飲 緩和煎 先鋒 破敵

懸癰

懸癰ハ會陰ニ發スル癰ナリ會陰ハ穀道ト陰囊トノ
間ニテ和名ヲアリノトハタリト云フ初發ハ硬ク凝
テ蓮子梅核ノ如ク漸大ニナリ色紅活或ハ紫暗ニ變
シ小患ニシテハ寒熱至テ強ク疼痛モ亦甚シク日夜
安眠ノナラヌ程ノモノナリ六七日ニシテ膿ニ化シ
自ラ潰ヘルモノナリ若シ潰サルモノハ鍼ヲ刺シテ
膿ヲ出スベシ膿ハ蒼蠟色ニテ他ノ瘡瘍ヨリモ臭穢
甚シク鼻持ノナラヌモノナリ膿出テ、後瘡頭色ノ
變リタル分ハ自ラ腐リ貫テ瘡口潤大ナリ腫痛從テ

消シ好肉新ニ生シ數日ニシテ愈ルモノナリ之ヲ常式ノ懸癰ト為ス或ハ患處一面ニ紫黑色ニ變シ大ニ腐敗シテ陰囊及ヒ肛門ノ際マテ腐敗シ臭水淋漓トシテ流レ尿道モ敗テ小便ノ漏ル、様ニナルモノアリ是ハ淋漏ト同様ニテ治シ難キモノナリ正宗ニ此病ノ漏トナリテ勞瘵ニ為ルモノアリト云ヘタルハ恐ラクハ痔漏ヲ見誤リタルナルヘシ痔漏モ流注シテ此ニ發スルヲアリ其形狀焮熱腫痛シテ微モ懸癰ニ異ラズ潰テ後虛證ナレハ瘡口濶大シテ斂マラス稀膿淋漓トシテ出テ脈細數ニナリ欬嗽盜汗等並起

テ勞瘵ニナルモノアレ^{マカリナク}疔瘡測子ヲ瘡口ヘ入レテ試ルニ必ス肛門ノ内ヘ貫テアルモノナリ決シテ懸癰ニ非サルヲ明ニ知ルベシ淋漏ノ初發モ此處ヘ腫レ出シテ懸癰ニ疑似モノナレハ得ト病因ヲ探リテ誤ルヲナカレ又此處ヲ打撲スル寸ハ腫痛焮熱シテ小便ヲ閉チ懸癰ノ如クニナルモノアリ會陰打撲ノ門ニ詳ニス○治法初發寒熱ノ強キニハ葛根湯ヲ與フベシ小便澀滯スルニハ龍膽瀉肝湯ニ宜シ瘡色紫黒ニシテ便秘スルニハ大黃牡丹皮湯ニ宜シ膿ノ多ク出ルモノハ托裏消毒飲ナリ膏ハ未タ潰サル前ハ先

鋒ヲ貼シ潰テ後ハ破敵ヲ貼ス刺法ハ中行ヲ避テ左
カ右カニ偏^{カクヨリ}テ刺スベシ若シ誤テ尿道ヲ刺ス寸ハ小
便瘡口ヨリ漏レテ淋漏ノ如クニナル^ナアリ謹慎シ
テ刺スベシ瘡口狭窄^セモノニハ破敵^メイチヤヲ挿入
シ^シ潤大^モノニハ綿片^ハ攤一杯ニ填^ベシ

懸癰主治方

葛根湯 龍膽瀉肝湯 大黃牡丹皮湯 先鋒 破敵

囊癰

囊癰ハ陰囊ノ癰ナリ腫痛スル寸ハ必ス少腹へ引テ
拘急シ或ハ急痛ス故ニ世醫皆疝ト為シテ論スレ凡
大ナル誤ナリ予數人屍ヲ解剖シテ内景ヲ觀ルニ少
腹ヨリ罽丸マテ絡脈連續シテ左右二條^スアリ和蘭家
者流ノ所謂精動血脈。精靜血脈ト云フモノナリ是ニ
由テ觀レハ罽丸ノ腫レテ少腹へ引キツル^一理ナリ
初發ハ罽丸腫レテ王瓜^{カラスカリ}茄子^{ナスビ}ナトノ如ク左右共ニ腫
ルモアリ或ハ偏腫^{カク}ルモアリ毒ノ増進スル寸ハ陰囊
一體ニ腫痛焮熱ヲ發シ色赤クナリ惡寒發熱スル^一

傷寒ノ如ク或ハ口舌乾燥腹滿譫語等ノ證出ルニア
リ數日ニシテ膿ヲ成シ自ラ潰ルモアリ若シ潰サル
モノハ刺シテ膿ヲ出スベシ膿ハ一旦ニ出テ、盡キ
易ク新肉モ亦長シ易キモノナリ一箇所ヨリ膿ノ出
タルニテハ腫消シカ子又他ニ一箇所モ二箇所モ腫
レ出シテ膿ヲ成スニアリ復刺シテ膿ヲ出ス寸ハ全
愈スルナリ是ヲ囊癰ノ常式トス或ハ卒ニ腫テ大サ
甜瓜ノ如クニナリテモ亦自ラ消散スルニアリ又一
種陰囊大ニ腫テ疼痛スル一刺スカ如ク熱スル一燒
カ如ク乍純黑色ニ變シ盡腐敗シテ臭水ヲ流シ脈浮

數煩渴引飲譫語黑胎等ノ諸證見ハル、モノハ陰囊
卒ニ腐敗脱落シテ死スルモノナリ徽毒ノ陰囊ニ結
フモノモ亦能囊癰ノ形状ヲ成スモノナリ陰囊結毒
ト名ク其說徽瘡ノ門ニ詳ナレハ参考シテ治法ヲ誤
ルベカラズ○治法初發寒熱如疫モノニハ葛根湯ヲ
與ヘ緩和煎ヲ施スベシ焮熱腫痛スルニハ潰ルト潰
サルトヲ論セス清肝滲濕湯ニ宜シ又龍膽瀉肝湯モ
奇驗アリ膿ノ續テ大ニ出ルモノハ托裏消毒飲ニ宜
シ裏熱強ク舌上黑胎ニナリ瘡頂紫暗色ニ變スルモ
ノニハ大黃牡丹皮湯ヲ與フヘシ膿出テ後腫塊ノ消

セスニ稀膿滴瀝トシテ止サルモノハ甲字加大黃薏
苡仁湯ニ宜シ膏ハ膿ニ成サル前ハ先鋒ヲ貼ス潰テ
後ハ破敵ナリ瘡口ノ狭キ者ニハ破敵ヲメイチヤニ
塗テ挿入シ瘡口ノ濶モノニハ綿片ヘ攤テ貼スヘシ
膿成リテ鍼ヲスル寸ハ随分針口ヲ濶スルヲ佳トス
世ニ陰囊ハ至極ノ要所ユヘ針ヲ深クスルハナラ
ヌヤウニ心得タルモノアレ疝實ニ臆病ノ沙汰ナリ
陰囊ヘモ縦意ニ刀鍼ヲ施シテ害ナキ一巳ニ金創ノ
門ニ詳ナリ但畢丸ノミ微ク腫レテ少腹ヘ引キ釣リ
疼痛スルモノハ桂枝加苓朮附湯ニ宜シ

囊癰主治方

清肝滲濕湯 正宗 治囊癰肝經濕熱結腫小便不利發熱

焮痛者

川芎 當歸 白芍 生苳 柴胡

龍膽 山梔 花粉 黃芩 各一兩 澤瀉

木通 甘草 各五分

右十二味水二鍾燈心二十根煎八分食前服

葛根湯 大黃牡丹皮湯 龍膽瀉肝湯 托裏消毒飲

甲字加薏苡大黃湯 桂枝加茯苓附湯 緩和煎

先鋒 破敵

ザルユヘ血液乳汁共ニ瘀滯シテ癰ト成ナリ初發ハ
乳房ノ中へ腫塊ヲ生シ漸々ニ大ニナリ焮熱腫痛シ
テ赤色ニ變シ惡寒發熱スルヲ疫ノ如ク項背強ハリ
或ハ惡心シテ嘔セント欲シ七八日ニ至レバ膿ニ成
ルモノナリ皮ノ薄キ處ユヘ大抵ハ自ラ潰ユルモノ
多シ膿出ル寸ハ赤肉急ニ長シ淺クナルモノナリ一
箇所膿ニ成タルニテハ腫塊消シ盡サス又他ノ處へ
潰テ膿管ノ三四箇所モ生スルモノナリ其膿ニナリ
テ潰タル形状ハ囊癰ニ似タリ二三十日程モ過レハ
全愈スルナリ死生ニ關ル病ニハ非サレ氏誤治スル

寸ハ愈テ後乳汁不足ニナリ又乳漏ニナリテ久シク
愈サルモノアリ皆醫者ノ不功者ヨリ致ス所ナレバ
能ク念ヲ入レテ療治スベシ不圖乳中へ核ヲ結ブ
五六枚累々トシテ運轉シ久シク消散セス他ノ患ナ
キモノ有リ乳癰ト名ク又乳房へ大ニ核ヲ結ビ久シ
ク消散セズ撮ミミルニ微痛スルノミニテ他ノ患ナ
キモノアリ産後ナレバ乳癰ノ輕證ナリ老婦ナトニ
モ鍼線ヲ勤ムル寸ハ核ヲ結フアリ又乳癰ノ一旦
消散シテ微シク核ノ残り因循トシテ久シク愈ヌ
アリ皆乳核ト名ク乳岩ニ疑似キモノナレハ乳岩ノ

門ヲ参考シテ診察ヲ詳ニスベシ男子ニ三十歳ノ頃
乳頭ノ際ニ核ヲ結フ一アリ平塌ニシテ碁子ノ如シ
撮ムニ微痛アリ捨置テモ自ラ愈ルモノナリ是モ乳
核ト云テヨシ○治法但焮腫シテ未夕膿ニナラサル
前ハ外ヨリ緩和煎ヲ施シ中黄ヲ貼シ葛根加桔梗石
膏湯ヲ多ク用フル寸ハ消散スル一アリ又他ノ小兒
ヲ倩テ乳ヲ吸ハシメテ後輕マニ乳房ヲ揉ミ柔クル
寸ハ消散スル一アリ妊娠中ハ消散シ易ク分娩ノ後
ハ消散シ難シ愈膿ヲ催スナラバ葛根加反鼻湯ニ宜
シ伯州散ヲ兼用ニスル一モアリ潰テ後ハ托裏消毒

飲後括萋橘皮湯柴胡去半夏加括萋新加橘皮連翹湯。
等ヲ撰用スベシ潰ザル前ハ先鋒ヲ貼シ潰テ後ハ破
敵ヲ貼スベシ瘡口ノ狭キハメイチヤヲ用ヒ潤キハ
綿片ヲ用フベシ乳漏ハ甲字加薏苡仁湯ニ宜シ微ニ
寒熱ノアルモノハ柴胡去半夏加括萋新加橘皮連翹
湯ニ宜シ瘡口ノ二ツニナリ相通シテアルモノハ絲
ニテ緊扎シ痔漏カニテ斷截スベシ若シ瘡口一ツニ
テ深ク彎測子ヲ入テ試ミルニ肉厚クシテ外へ貫カ
子ルモノハ鍼ニテ膿管ヲ割開シ瘡口ヲ濶大シ破敵
ヲ綿片ニ攤テ貼スベシ乳核乳癰ハ柴胡加石膏湯神

驗アリ外用ハ先ツ緩和煎ニテ蒸シ神水膏ヲ摩擦ス
ベシ乳癰ノ膿ニモナラス消散モセズ核ニナリテ因
循トシテ日ヲ延クモノハ外用ハ前法ヲ施シ柴胡去
半夏加括萎新加橘皮連翹湯奇効アリ小兒乳頭へ齒
ヲ立テ、裂テ輝ノ如クニナリ腐爛スルモノアリ乳
疔ト云フ又乳頭破裂トモ云フ乳ヲ吸ハシムル寸ハ
愈タ、レテ愈カ子ルナリ吸ハシメサル寸ハ乳汁充
滿シテ痛ヲ發シ乳癰ニ變スル一アリ小瘡ナレモ至
テ治シ難キモノナリ中黄ヲ綿片へ攤テ貼スベシ乳
ヲ吸ハシムル寸ハ爛レタル處へ遊奕ヲ貼シ瘡口へ

齒ノ當ラヌヤウニ又沾濕ヌヤウニ保護スベシ凡ソ
乳病鍼線ニテ肩ヲ使フ一ヲ第一ノ禁忌トス

乳癰主治方

後括萎橘皮湯 春林 治乳癰已潰者

瓜蒌根 橘皮 甘草 當歸 黃芪

芎藭 人參 芍藥 金銀花

右九味水煎

托裏消毒飲 葛根加桔梗石膏 葛根加反鼻湯

柴胡去半夏加括萎新加橘皮連翹湯 柴胡加石膏湯

伯州散 緩和煎 神水膏 赤汞丹 先鋒 中黃

左突 破敵

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

癩疽

癩疽ノ癩ハ燦ヲ本字トス病源ニハ巳ニ燦ニ作レリ
史記相如傳ニ雷動燦至ト見ユ燦ハ火ノ飛貌ナリ迅
速ノ病ユヘ燦疽ト名ツケタルナリ 本邦ニテハ指
ニ限リテ發スルモノ、ヤウニ云傳ヘテアレ氏四支
胸背ヘモ亦發スルヲアリ病源千金外臺等ノ論ヲ讀
テ知ルヘシ然レ氏先ツ指ニ發スルヲ多ク他ヘ發ス
ルヲハ少シ故ニ指ニ限ルヤウニ心得タルナルベシ
今ニテハ指病ノ總名トナレリ鹵莽ト云フベシ愚按
スルニ指病ノ名稱多ク諸方書ニ載セタレ氏約スル

ニ癰疽。天蛇毒。甲疽ノ三病ニ過キス癰疽一名ハ蛇瘡
 其證指頭ニ一點ノ小紫泡ヲ發シ根脚硬ク腫レテ漸
 大ニナリ黑靨ニ變シ疼痛スルヲ鍼刺刀截ノ如ク熾
 熱スルヲ湯潑火燒ノ如ク日夜顛倒シテ暫モ安眠ス
 ルヲ得ス如何程ノ武夫ニテモ泣カサル者少シ惡
 寒發熱。舌上黃胎。飲食少思。頗疲勞スルモノナリ六七
 日ニ至テ漸ク膿ニ化シ病勢微ク緩ミ肉腐リ筋爛レ
 臭膿腥水流レ出テ或ハ黑色ニ變シ指節ヨリ脱落ス
 ルモノナリ或ハ一節落テ止ルヲモアリ或ハ二三節
 モ脱落スルヲアリ愈テ後患指ハ勿論他ノ指モ削瘦

シテ細クナリ屈シテ伸又モノナリ天蛇毒ハ古名ヲ
 代指ト云フ乃チ肘后方ニ出ツ又天蛇頭。蛇頭疔等ノ
 別名アリ其病略癰疽ト同シ様ナレ氏初メ小泡ヲ發
 セス指頭但大ニ腫レテ蛇頭ノ如ク赤腫熾熱シテ疼
 痛甚シク寒熱交起リ爪甲ノ際ヨリ膿ヲ釀シ多クハ
 爪甲脱落スルモノナリ毒ノ深キハ筋肉糜爛シテ指
 節ノ脱落スルモノアリ此病ハ一指ニテ止マス必ス
 次指ヘ傳深ス次第ニ移リテ十指共ニ患フルモノア
 リ故ニ代指ノ名アリ指ハ至極ノ要處ニテ微ノ損傷
 ニテモ腫痛ヲ發シ易シ鍼線ノ時誤テ刺シ或ハ竹木

刺或ハ打撲損傷等ヨリ腫痛焮熱ヲ發シ遂ニ膿ヲ成
 スモノハ其因ハ異レモ病狀ハ癰疽ニ同シ甲疽ハ本
 條ニ詳ナレバ此ニ贅セズ總シテ指病ハ他ノ瘡瘍ニ
 較レハ熱痛甚シク苦惱ニ堪カ子ルハ狹窄シテ地步
 ノナキ處ユヘ毒指一箇所ニ凝結シテ他ノ處ヘ蔓延
 スル丁能ハザルユヘナリ○治法癰疽天蛇毒共ニ一
 手段ニテ治スルナリ内服ハ五物大黃湯五物解毒湯
 ヲ撰用スベシ初ハ先鋒ヲ糊入ノ紙ニ攤テ貼スベシ
 膿ニナラハ鍼ヲ刺シテ膿ヲ出スベシ鍼ヲ刺スノ法
 至テ大切ナリ若シ誤テ未タ膿ニ成ラザル前ニ鍼ヲ

刺シ少々血ノミ出テ、膿出サル寸ハ却テ腫痛ヲ加
 ヘルモノナリ假令膿ニナリテモ鍼尖誤テ新肉ニ觸
 ル、寸ハ又害アリ先ツ披鍼ヲ横ニシテ瘡頭ヘ付纔
 ニ刺シテ皮ヲ挑起シ再ヒ刺シテ皮ヲ切ル寸ハ痛ナ
 クシテ膿盡ク出ツ膿已ニ成ル寸ハ皮ト肉ト自ラ離
 レテアルモノナリ唯皮ヲ刺シテ肉ヲ刺スベカラス
 鍼口ヘ彎測子ヲ入テ皮ヲ挑起シ小反鉸ヲ以テ切廻
 シ浮タル皮ヲ盡ク去リ左突ヲ綿片ヘ攤テ貼スベシ
 腐肉綿ノ如クニナリ或ハ黑色ニ變シ臭穢甚シキモ
 ノハ破敵ニ宜シ腐肉除キ軟肉ノ出ルモノハ消疣水

ヲ點シ後衝ヲ貼スベシ軟肉ノ消シタル迹ハ白雲ニ
宜シ或ハ乳香ノ末ヲ加ヘテ早ク收斂スルモヨシ千
金方ニ南方人得之斬去其指ト云ヘリ面白キ言ナリ
若シ遂ニハ必ス指節ノ脱落スル證ト預知ラハ初二
指頭ヲ斷截スル寸ハ必ス大患ニナラスシテ愈ベシ
予數此法ヲ指病ノ者ニ諭セ凡遂ニ用フルモノナシ
頗遺憾トス

癩疽主治方

五物大黃湯 本朝經驗 治指腫而腐爛熱痛者

大黃 川芎 桂枝 甘草 地黃

右五味水煎

五物解毒湯 消疣水 白雲 破敵 後衝

難シ愈テモ數痛ヲ發シ或ハ指ノ屈シテ不自由ニナルモノアリ○治法癰疽ノ門ヲ參考シテ療治ヲ施スベシ初發焮熱腫痛スルニハ中黃ヲ貼スベシ潰テ後ハ白雲ニ宜シ贅肉ノ突起スルモノハ後衝ヲ貼スベシ後衝ニテ消シカ子ルモノハ消疣水ヲ點スベシ又赤汞丹ヲ敷キテモ消スルモノナリ贅肉ノ除キタル迹ハ白雲ニ宜シ

甲疽主治方

赤汞丹 消疣水 白雲 後衝 中黃

牛程蹇

牛程蹇ハ和名ヲソコマメト云フ其證ニ緩急ノ二ツアリ緩發ノ者ハ重ク急發ノ者ハ輕シ緩發ト云フハ卑賤者常ニ多ク足ヲ勞シ足心ノ地ニ當ル處初ハ皮厚クナリ漸クニ堅硬ニナリ營衛共ニ通セス津液枯燥シテ知覺ヲ失シ別ニ一箇ノ頑肉トナリ頑肉ニテ好肉ヲ支へ遂ニ疼痛ヲ發シ跣上マテモ赤腫焮熱シ好肉ト頑肉トノ間痛膿ヲ釀スナリ但皮厚ク頑肉ニナリテ膿ニナラサルモノヲ本邦ニテタコト云フ史記ニ禹手足胼胝ト云へ漢書ニ申重齒以存荆師古曰齒

足下傷起如繭也ト云フ類ハ「タコ」ノ「ナ」ルベシ脚ノ外踝ノ皮厚ク硬クシテ頑肉ニナルモノヲ「タコ」ニ「タコ」ト云フ漸大ニナル寸ハ自カラ焮熱腫痛ヲ發シテ膿ヲ成スナリ或ハ但膨脹シテ水ヲ蓄ヘ瘤ノ如クニナリ坐スルニ邪魔ニナリ時ニ消長スルモノアリ是モ牛程蹇ノ一證ナリ但坐スルヨリ起ルト歩スルヨリ發スルトノ差別アルノミ急發ト云フハ出馴ヌモノ、適旅ニ出テ強歩兼行スル寸ハ足心必ス腫痛シテ水泡ニナリ大サ蠶豆ノ如クニナルモノナリ是ハ至テ治シ易シ緩急ニ證共ニ足ニ發スルノミニ非ス手掌ニモ

亦發スルナリ○治法但腫痛シテ未タ膿ニ成ラサル前ハ先鋒ヲ貼シ緩和煎ヲ施スベシ膿ニ成ト思ハバ披鍼ニテ徐々ト頑肉ヲ削リ去リ膿ノ透キテ見ユル所ニ至テ鍼尖ヲ横ニ刺テ皮ヲ挑ケ起シ好肉ニ觸ヌヤウニ進退スベシ膿出テ後ハ彎測子ヲ鍼口ヘ刺テ又皮ヲ挑ケ起シ剪刀ヲ入レ浮タル皮ヲ剪ミ去リ白雲ヲ綿片ヘ攤テ貼スベシ脚背ノ焮腫ヘハ中黃ヲ紙ニ攤テ貼スベシ急發ノ者ハ水泡ニナルユヘ直ニ刺シテ水ヲ取タキヤウナレ疔水ヲ早ク取ル寸ハ却テ痛ヲ發シ火燒ナドノ如クチリク痛ムモノナリ其儘

ニ置テ白雲ヲ貼スベシ旅行ニテ藥ノナキ寸ニ煙草
燼ヲ續飯ニ和シ紙ニ攤テ貼スベシ民間ノ方ナレ
第一ノ妙藥ニテ一夜ニシテ水泡皴ニナリ痛ニ脱然
トシテ去ルモノナリタ、ミタコノ炊腫シテ膿ニナ
ルモノハ牛程蹇緩發ノ治法ヲ用フベシ但水ヲ蓄ヒ
膨脹シテ膿ニナラス瘤ノ如キモノハ神水膏ヲ永ク
摩擦ハ自ラ消散スルナリ

牛程蹇主治方

緩和煎 神水膏 先鋒 白雲 中黃

癩科秘録卷之七終

