

西醫方選

乾

9武十

730

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

武
730
1-2

文政十一新年新鐫

普山藤林先生著

西醫方選

玉川堂藏版 文集堂發兌



西醫方撰引

和蘭之醫書傳于我於七八十年外
萬里矣域之文字象音既傳之稍觀
勢弗按苗索強名乃失當即強然也世
於士送真西醫東和此學大振譯書其已
慮數十家之強形道以誘後進惜之相
競唯力是視今也漢方者是不係指於此
板起死肉骨殊救不少雅則殊救不少
之不能無其矣也善唱業之有其才

西醫方撰

學之既歸之神強若使其人馳騁乎
賜九折何擇焉以康莊坦途乎成其拙
工執鞭敗績厭覆足怪何暇其妙豈
得之如馬之可馴服者同日而論之乎
用此其造之伎良之術得於手必心而
後不終也今竊以此學老頑鈍推魯完
二三洋書極安投窳人憊以蓋乃又
生於以為地黃出在亦異之產必不馴
才土斷然棄而不取當問者尸祝之者

亦衣冠其務而不能用之私自
才不過宜席款狗矣悲哉夫才亦彼
土最慎也為按古哲君臣之配氣味之
別或學而透富成台亦力隊伍者法
失之毫釐而深致千里豈非載斗
量者所能乎故私自製才與安投窳
人自慕之死其間不能以寸也均是死斯
以之矣邪非乎夫騏驎之難治豈
之死乎要之在治者之熟與不熟而已


然則波才之難用也誰道於我普定
 生刀圭之味涉穠華書數百部獲牙
 萬餘批沙簡金淘法甚於選者窮
 奇強者一千五百餘方各名病門方下
 揭主治名曰西醫方換益之意謂方之
 難用不難也其不難取之不廣也苟取之
 廣則學其始舍其難誠用其易月就
 手將日慣手熟則如難用也終能用之
 而不見難處矣余以蓋畫病之類手

故初書取方不得不應也夫廣是初後進
 易習熟也先生久於公之于世以惠後學
 精清矣無資於上梓去依其志不承今
 秋漫等多才相濠送浦德附之劑劑於
 學者苟求才於此則於濟之取道於王
 已造父鞭駮多而旦轉於熟路也周游
 八極萬里一瞬不為難矣回生起死豈
 患無術哉初畫為秘稱醫家不盡
 於壁也先生為人浩然世味無他好唯

嗜耽此學刻苦三十餘年有積為之儲
云文政甲申七月望黃燕馬來溫謹
題於平安旭水堂



天籟化家書



西醫方選序

醫於兵也。人皆有病。則必治之。國之有
兵。亦必治之。雖平時之用。不可不備也。
夫兵之得也。久矣。其所以用之法。不出
於三。曰正。曰奇。曰攻。曰守。曰其未
矣。其德。兵在。不講之法。而法得其未。
豈得盡其利。而求。二法。雖已滿。而求

魯山孫林紀之識



[Faint, illegible handwritten text in vertical columns, possibly bleed-through from the reverse side.]

西醫方選

凡例

一是編也。就下喝蘭紀元一千七百年至一千八百二十五年。中間百二十五年。諸名醫所選著之籍四十餘部。芟蕪掇英。吟挈洮汰。獲方凡千有五百。堆稿等身。殺青甫就。迺使後學。知於彼治術。躍如有常儀的焉。從事於斯。則緩急應機。庶幾莫失之毫末。免夫妄發之戾矣。斯土彼方。尚古敦樸。文教世啓。瘠者精。拙者巧。自星歷輿墜之學。及他機械之製。猶白堊之與黑漆。莫復用知也。醫

西醫方選

凡例

術何獨不然。故此書不求之遠古而取乎輒近。非必軒
輕於時世亦唯為是而已。若夫眼吃耳食。素無定識。於
古人所論。以康瓠為寶鼎。今人所說。以沈瀝為粗獷。遂
膠柱鼓琴。將倍偏枯之藥。以起死人者。何其陋也。學者
斷然棄先習。祛舊染。以窺先生寓意。一斑則可。

一篇中所載之方。莫一不據原書。原書間有先輩既譯而
行於世者。唯好尚如面。不無小異。故先生一切不取
之。必就原書者。非敢銜其宏博。亦慎於事也。世有腹無
一丁字。目未涉原書。蒐掠一二。譯書彙集成卷。上之梨

棗而脅羣。蠅營役々。以作名利媒者。誣已欺人。甚為
可惡矣。雖然。要之芻狗土竜。設令時為帝。亦奚足深慮
哉。

一西洋之書。多以撰者姓稱之。如戰國諸子然。但其姓煩
長。每方下不可全舉。故節之而揭其頭字。猶所引伊百
乙氏者。記以伊字。吳爾德兒者。記以吳字。覽者認其符
字。則知其所出。又有其書原不傳撰者。或殘缺而亡。撰
者則取其主旨。假命之名。以便檢閱。如卒病論類是也。
或有其人。無著書。唯論說方法散見諸書者。亦畧揭其

姓以符之。雖如與引全書者。淄澗難辨。閱左所揭書目。則渾是瞭然。

一篇中之方。原書無方名者。十居八九。會有其名者。存之無之者。或取名於其功。或取之於其藥。非固有深意。唯欲便搜索而已。覽者無以其名拘泥。則為可。

一西醫所用之藥物。出於製煉者過半。雖則過半。彼邦有局而官管之。購極其廣。製盡其精。是以至珍絕奇。山淮不啻矣。故醫家無製煉之勞。隨求即得。猶我邦輕粉鉛丹給之。日用而无所匱也。今也我邦雖斯學方行。

人尚苦其藥難得。然邇來互市漸饒。募而求之。亦何不備之有。但窮鄉遐陬。一旦會缺。則醫家不可不自製以用也。故先生嘗有西醫今日方之選。就而求焉。則得其製法之詳矣。

一各國古今度量異製。彼西洋一傑列應者。今譯之為一。黍約當我邦六十分錢之一。比之漢土之黍為異。彼一傑列應者。本以麥粒之重名之。猶以黍之重為黍也。私窳兒百兩者。便譯之為銖。當我三分錢之一。又與漢土之銖不同。其譯一兩者則我八錢。一斤則九十六錢。

畢竟皆以相似假字譯之而已。其說具載。先生所著遠西度量考。

一篇中稱一升者即我邦四百錢。以是推之。其他可知也。乃如一盃一茶鐘一哥喜鐘皆以十六錢準之。一小
卵匙一小匙一茶匙則共是八分。一滴者一黍一匙者
四錢一撮者一錢一握者四錢一麥酒盃者一合一玻
璃瓶者五合是。先生所折衷諸書而定之。毫無加臆
度欲知其詳亦可就遠西度量考而攻焉。

一篇中煎法。徃々有曰煮取若干。而不載所煮之量者。由
我觀之。雖如無定準。在彼則是陳套熟格。大抵其湯液
以煮減半為常。其所煮之量。輒倍其所取。故如曰取二
合四勺。則煮之以四合八勺也。已。此其俗日常所慣用
不必章說條論而知之也。

一丸物不得齊。譬猶父子雖一。辨而分。各異性稟也。我之
於西洋相距。逖遠眇藐。各所出藥物。雖種類相同。細論
性功。亦未可得全齊。蓋物之不齊。物之情也。徒以形似
代補。以枳。則不爽臭味者。幾希矣。榛齋字子。嘗以為與
其代用。彷彿疑似者。不如且俟。後日來貢於我。為是以

只稱原名而不議代用其見可謂卓也。但悉俟舶來則今所歎甚矣。且也新齋物稀價貴唯鉅富得之而為窮袖乎故先生姑從先輩之說其有功能同者代而充之無之則闕如。若先輩所充用未充當者質諸彼書或徵諸其物必俟相符契而後代用之其它一仍舊貫豈好樹異幟而抗衡先進也哉不得已也。

文政丁亥重九

門人松江上田良悅謹識

藥品畧說

此書所載藥物當今不易得者頗多則為一大闕事。故今據西說擇其功相類

可互代者數十品而備其闕以醫家無滯急閣起之憾焉。如其露水膏精油鹽蜜。并汗銻石浮酒石。涌酒石類一切係製煉者別載西醫今日方。

○海葱

和產木詳西醫春別見。常以我。邦。狸。狸。者。為此一種。又邦俗治。水腫。用。狸。狸。者。而考之。二物雖不為伯仲。

○酸角

原名。峇。麻。林。度。此。樹。花。後。結。角。極。酸。故。譯。為。酸。

○洋葵

原名。過。兒。託。亞。標。為。葵。之一。種。性。功。與。○依蘭。苔。近。歲。醫。家。多。採。所。產。出。

○乙百葛

今。界。為。乙。百。葛。安。那。其。種。諸。州。山。中。皆。有。之。伊。曰。艾。

○牛蒡

邦。俗。稱。耶。麻。忽。屈。微。即。錄。曰。以。杜。衡。五。分。比。其。一。

○依蘭苔

近。歲。醫。家。多。採。所。產。出。其。種。諸。州。山。中。皆。有。之。伊。曰。艾。

○乙百葛

今。界。為。乙。百。葛。安。那。其。種。諸。州。山。中。皆。有。之。伊。曰。艾。

○牛蒡

邦。俗。稱。耶。麻。忽。屈。微。即。錄。曰。以。杜。衡。五。分。比。其。一。

○依蘭苔

近。歲。醫。家。多。採。所。產。出。其。種。諸。州。山。中。皆。有。之。伊。曰。艾。

○乙百葛

今。界。為。乙。百。葛。安。那。其。種。諸。州。山。中。皆。有。之。伊。曰。艾。

○牛蒡

邦。俗。稱。耶。麻。忽。屈。微。即。錄。曰。以。杜。衡。五。分。比。其。一。

○依蘭苔

近。歲。醫。家。多。採。所。產。出。其。種。諸。州。山。中。皆。有。之。伊。曰。艾。

○乙百葛

今。界。為。乙。百。葛。安。那。其。種。諸。州。山。中。皆。有。之。伊。曰。艾。

西醫考選

藥品畧說

是也。今種養固或而與蔬菜。○粘魚鬚產江之伊吹山者。頗佳。功與土茯苓。

為伍者。氣味甚薄。不中藥用。○牛蒡我輩及西醫。樹勃兒。度氏。並以一三種。頗有。

同。○薩撒弗刺斯鳥藥。充之。案三。極烏藥。雖共。一種。頗有。

迥。疑。是。○葛縷即防風。漢種者。性功與苗香同。

本。草。鈞。樟。○小苗香與苗香同。性功與苗香同。

苗。香。同。○小苗香與苗香同。性功與苗香同。

○苗香藥舖稱小。苗香者。是。○亞

○亞與苗香同。性功與苗香同。

○刺殺斯根獨性功與獨活同。○匾挑仁有。甘。苦。二種。甘者。功

○龍腦薄荷即水蘊。功以薄荷。較。故。○橙皮。枸橼皮。並性功與柑

○橙汁。枸橼汁。宜母子汁。並性功與柑。汁。橘。汁。類。

○紫茉莉西。洋。稱。紛。刺。巴。種。類。不。一。花。或。大。或。長。其。色。或。紫。或。黃。或。白。或。淡。紅。而。船。所。齋。者。能。瀉。下。和。產。則。無。效。畢。竟。風。土。之

不同而已。若廣索諸州所產與其種異。○蘇合香功類。紫

鋪。稱。花。○亞麻仁子。功與葵

○迷迭香。墨栗。薩。萊。沃。刺。那。刺

賢。淫。兒。底。護。並功與伊吹。麝香。草。相。類。

○食而便。答。利。画。功。近。哥。乃。古。草。

○別

○馬鞭草可代用。

○亞燕洋。并。

○葛兩儒微。今。畧。云。雨。微。爾。屈

○烏白烏而識。案。烏。私。乃。幾。一。種。阿。都。幾。我。失。幾

○非阿斯舍画護功與黃。后。○阿波巴那西察伊。沒。尼。同

○撒瓦百奴護可代用。功。○幾腦膠伊。日。百。藥。煎。血

牙皂樹膠原稱。刺。地。画。護。其。樹。全。與。猪。牙。○達刺侃

○格碌波尼画此。所。煎。餾。的。列。並。那

○格碌波尼画油。之。渣。脚。煮。煉。的。列。並。那

西醫西藥

藥品畧說

底那者亦稱
拾碌波尼亞
○山羊脂代用
○質汗沒扭護旋花別種

花根汁曬乾
者代之亦驗
○葛私多僕護用阿魏或安沒
○葛私多僕

謨丁伊曰世用
若阿魏丁代之並良
○芸香露荷露共可代用
○有利藥舖稱

密列花伊曰功比
萬花較劣
○珊薦里福曰性功
○府利花肉豆

者葛
○栗覺斯功與覆金
○加斯加栗刺伊曰功與
○合謨

比東性功黃一種
○作列布鴿子草根恐即
○萬兩面室

刺拳參可
○撒爾非亞或藿菜
○亞麻仁國用藥
○亞私

百兩弟種我邦幾細
○魯斯空加邦俗稱法那以

○失格列乙公與蒲
○斯哥而宿業刺按黃花菜屬壽伊

○罷傑兒擲換篤子
按竊衣子
○阿利襪油藥肆稱油

○重鉛精性功同
○瓦爾拔奴護沒藥
○計爾歌兒以并

○地惹太利私或用苦瓠代之物
○的斯答設牡蠣

底羅仙石蒜可
○珊篤里當藥可
○薰陸今藥肆稱薰陸

狀者須用乳香代之
以上

裴	寡	湖	歇	穢	扶	藿	花	壽
裴仙	寡鱗	湖川	歇乙刺窠	穢歇蘭土	扶古撒護	藿兒窠	花魯	壽穢田
內科書	熱病并 嗽腫治療書	同	腐敗熱治療書	神經熱治療書	熱病論	海上治療書	同註	內科書

輟	翟	歌	回	外回	外輟	西	利	宿
輟兒別德	翟却兒獲	歌園勃兒孤	回蕪德兒	同	輟兒別德	西電法護	利孫壽	宿魯孟
同	同註	內外治療書	內科書	外科書	外科書	內科書	同	內科袖珍書

列書目

波	業	叔	應	輪	珊	底	孟	普
波樂的業兒	業乙蘭土	叔墨兒	應獨	輪度	珊地福兒土	底電	孟魯	普林傑列
外科書	本草書	百家工藝韻府書	內科書	南方諸病治療書	水腫論註	內外治療書	水腫論 <small>并諸書 散見者</small>	內科書

福	伊	筆	別	布	羅	蓬	傑	白
福烏的	伊百乙	筆遮力兒	別傑兒	布連機	羅仙壽丁	蓬瓦兒陀	傑浙兒	白亞東
藥性要畧	藥性辨	藥方配合書	帶下治療書	癩瘡治療書	嬰兒諸病治療書	麻疹編	同	同

西醫方選 列書目 三

依園業兒

涌酒石治驗書

畫墨兒

藥物製煉集成書

跋太亞勝亞局方

同

亞護斯的爾達護局方

同

龍動局方

同

卒病論

備急治療書

雜病治療書

原本殘缺者

公私勅律

內科書

越電勃兩孤局方

藥劑製煉集成書

以上

西醫方選卷一目錄

熾盛熱

浮磐酒石散

接骨錦葵飲

洋葵清燥湯

錦葵導

大麥湯

橙乳清

大麥苦菜飲

匾挑盧子乳

大麥宜母飲

麥角甘草湯

大麥清涼飲

三物葡萄湯

四物葡萄湯

大麥清熱飲

蒸餹清熱飲

酸模清熱飲

清熱漿

酸消清熱飲

緩和導

清解湯

大清涼飲

匾挑醬 六

清涼和解飲 七

加味接花飲 同

旃那拘攪飲 同

硫堇醬 同

酸消甘露飲 同

三聖飲 八

加密列飲 同

百葛霸王散 同

加味白帛散 九

二仙散 同

擦膈飲 同

白帛酒 同

旃那大黃飲 同

旃那酸桂飲 十

三物飲 同

霸王飲 同

酸泥子 同

降氣泥 同

芸香硝砂醋 土

加味梅肉湯 同

加味梅肉膏 同

加味酸角湯 同

三物洋葵湯 土

蜩蛄消石散 同

消石粟接飲 同

加味大麥湯 同

洋葵消石湯 土

接骨清涼飲 同

滑腸導 同

接骨錦葵飲 同

撒雨非亞飲 同

加味幾那湯 十四

芸薩香草飲 同

加味芸香飲 同

五物羌活飲 十五

壯元飲 同

芸香開壅飲 同

龍腦蜩蛄散 同

四味龍腦飲 同

龍腦瓜子乳 六

幾那芸香飲 同

防腐芸香飲 同

龍腦安神飲 同

龍膠飲 十七

幾那飲 同

四物導痰圓 十八

五物導痰飲 同

天灸膏 三方

二物大黃散 十九

神經熱

葛^乙安那酒^{十九}

獨聖散^同

旃那甘露飲^{二十}

橙汁飲^同

乳水導^同

壯元解熱散^同

大麥壯元湯^{二十}

壯元解熱酒^同

加味復方解毒子散^同

壯神飲^同

桂皮鎮定飲^{二十}

揮發益氣飲^同

回春飲^同

芥子乳清飲^同

薄荷回生飲^{二十}

壯神消毒丹^同

壯神消毒散^同

壯神解毒飲^同

壯神解毒子膏^{四十}

幾龍散^同

強心飲^同

麝香散^同

龍麝角鹽丹^{五十}

強壯酒^同

冷服麝香飲^同

幾那散^同

幾那酒^{六十}

壯神幾那飲^同

幾那解毒飲^同

幾那回生飲^同

揮發幾那飲^{七十}

復方幾那酒^同

幾那撒法郎飲^同

及本飲^{八十}

補真飲^同

三物壯元飲^同

腐敗熱

大麥酒石飲^{九十}

里木那埕^同

大麥硫董飲^{三十}

幾那加密列飲^同

白帛散^同

玄武餅^同

鎔石酒^{二十}

加味葛^乙安那酒^同

乙百酒石飲^同

薔薇酒石飲^{二十}

大麥白帛飲^同

加味解熱散^同

酒石散^同

酸角旃那飲^{三十}

酸角湯^同

神仙健胃散 同

寒水湯 四十

大黃甘露湯 同

消黃散 同

旃那導 同

消龍散 同

中和散 三十

健胃祛敗酒 同

大麥麩精飲 三十

防腐乳清飲 同

幾那湯 同

防腐幾那飲 同

幾那薄荷膏 七十

四物幾那飲 同

幾那石鹽飲 同

三物幾那飲 同

乳清酒 同

避邪散 三十

二物幾那湯 同

奇効丹 同

加奇効丹 同

食而便答飲 九十

預防膏子 同

解肌散 四十

大和精 同

酒石大黃散 同

化斑飲 同

舉斑龍腦飲 一

幾那麩精飲 同

幾挂酒 同

定吐飲 同

角鹽飲 二十

加味的里亞加 同

酸玫瑰清涼飲 同

健胃飲 三十

亞爾護的里亞加 同

龍膽玫瑰酒 同

預防幾那酒 同

通而愈。或四日，夜汗出。或大便通。或鼻衄而解。若過其期者，至七日或十一日而解。此方治之。

浮酒石

礬酒石 各五分

右二味為末。每服一劑。接骨錦葵飲下。且暮用之。至愈。接骨錦葵飲 同治前症。

接骨木花

錦葵葉

劉各一握半

右二味湯泡溫服。

洋葵清燥湯 同治前症。

洋葵根 錢八

洋葵葉 錢二

洋葵葉 錢二

消石 錢一

屋失蔑兒 錢十六

右以水先煮洋葵根葉。取三合半。去滓。內餘藥。烱盡。每二時溫服一茶鍾。

錦葵導微 熾盛熱。脉堅實者。宜先放血。至其脉軟。乃用此方導大便。

錦葵葉

二握。若無。則代洋葵。或蜀葵。或葛苴。

蜂蜜 錢八

右以沸湯四合。先泡錦葵。濾去滓。內蜜攪令相得。以積筒射注肛門。日二三次。兼行湯腳法。日二次。

大麥湯

治熾盛熱。血液稠粘。或酷厲而蒸氣難發。小便不利。脉絡緊張。大效。

治諸般熱病。潤燥止渴。開壅。

精大麥八錢

右以水五合煮取二合半温服以為常飲

橙乳清蒲治前症

橙或枸櫞

右以水乳煮熟取清服之若無橙則以醋二匙或酒石少許代之

大麥苦菜飲微治前症

大麥煎汁升一 苦菜汁白六

右二汁和勻以代常飲

匾桃盧子乳同治前症

匾桃仁四二錢 蒲盧子或甜瓜子八錢

右二味入臼內擣爛徐徐下水四合以布絞汁如是兩

三四乳液盡為度以代常飲如砂糖或橙花露二三匙亦佳

大麥宜母飲歌治熾盛熱煩渴引飲者

大麥煎汁二百四十錢 宜母子汁十六錢

右二物調勻和砂糖適宜飲之

麥角甘草湯同治前症

精大麥 鹿角屑各十錢 甘草剉四錢

右三味以雨水二升煮取一升二合濾去滓和食鹽適宜飲之。

清涼宜腸飲 吳熱病元運大過者身體壯熱脉強數氣息急促或謔言妄語也此方主之。

旃那

錢二

酸角

錢四

消石

分五

右三味以水一合二勺徐煮去滓温服謔妄者兼服催睡藥少許為妙。

六麥清涼飲 病人惡寒發熱頭痛身疼脉實數鼻涕不出口乾舌燥小便赤者屬熾盛熱不可發汗誤發汗則

變為重症也此方主之。

六麥

錢八

酸角

錢四

消石

分五

右三味水煎温服。

清熱散 治熾盛熱脉洪大時時膽汁大渴引飲食不進。

蝟蛄石

銖二

消石

銖一

浮酒石

分五

右三味為末白湯送下一頓盡劑立時奏效。

三物葡萄湯 治熾盛熱大便秘結煩渴引飲者。

乾葡萄

錢十六

酸角

錢八

無花果

個二

右三味以水九合四勺煮取二合半每時服二茶碗。

四物葡萄湯同 治前症

大麥 乾葡萄 無花果各十錢 甘草四錢

右四味以水六合四勺先煮大麥至熟內餘藥再煮取三合二勺溫服或加消石二三錢功益到

大麥清熱飲吳 熱病元運大過者身體大熱煩渴引飲譫語也此方主之

精大麥八錢 蜂蜜十二錢 醋八錢

右三味以水三合煮至麥熟濾去滓頻々溫服

蒸餹清熱飲同 治前症

蒸餹再燒者三十二錢 酸角十二錢 浮酒石四錢

右三味以水三合煮去滓溫服

酸模清熱飲同 治前症

酸模根 蒸餹再燒者各十六錢 消石一錢

右三味以水五合煮去滓溫服加拘櫟汁砂糖少許令味美服之尤佳衰弱者加列應酒少許下利者加玫瑰花一握

清熱漿壽 治熾盛熱脈強壯熱如焚頭痛舌燥呼吸促迫煩渴引飲小便赤濁者

蜂蜜去沫二百 醱醋九十

右二味攪和每二勺調大麥煎汁二合四勺代常飲服

之按與大麥清熱飲同方異製而已

酸消清熱飲 同治前症并狂妄熱不得睡者

酸角二十錢 消石一錢 蜂蜜十六錢

右三味以水先煮酸角取七合二勺內餘藥和勻一時

服一茶碗兼施緩和導

緩和導 同治前症

加密列花

洋葵根各二分

胡盧巴

亞麻仁各一分 五種緩和草八錢

右水煎片時取二合四勺去滓更加屋失蔑兒十六錢

淨消石一錢焯消向肛門射之日二次五種緩和草載西醫今日方故

不註

清解湯 同前症熱漸減將解者宜此方

酸模根三十錢 大麥六錢八分 鹿角屑一錢七分

斯哥而宿業刺根三錢四分二厘 代用蒲公英根

枸櫞皮各八分

右六味細剉水煎取九合七勺去滓溫服

大清凉飲蒲治熾盛熱劇如焚者

甘綠礬精滴四十 玫瑰露錢八 水錢十六

舍利別四錢代洋糖

右攪勻熱劇則一二時服盡熱減則二三時服之

匾挑醬菘治熾盛熱煩燥而不睡三四日及虛弱而驚搐

痲症者並効

匾挑仁十二錢 白罌粟舍利別八錢

右先取匾挑加水研爛如乳汁濾去滓次內白罌粟舍

利別勻一時服一匙

清凉和解飲伊治熾盛做衝熱

純精酒石英二銖 砂糖八錢 拘櫞皮油四銖

右先取砂糖和拘櫞油次下酒石英勻沸湯五合點服

加味接花飲同治熾盛熱大發汗

接骨木花露二十四錢 接骨木子醬五錢

明埵列利精十二錢

右三味調勻一刻服盡

旃那拘櫞飲同治熾盛熱及膽汁熱

旃那二分錢 拘櫞皮新者去白一錢一銖

右以枸橀汁二錢。沸湯一合二勺。浸出藥氣去滓。更加覆盆子舍利別五錢。調勻。半時服一茶鐘。

硫黃微治熾盛熱。放血後。熱勢益劇者。

硫黃精錢八 薑菜蜜四十錢

右攪和半時服一盃。及熱勢減。則一時半服一盃。至熱解。

酸消甘露飲同熾盛熱。脉軟頭痛稍減。小便多利。而不熱。九日至十四日。大便快通。小便清白。有微赤塗。自汗出口。鼻潤。舌胎脫。食進。渴減。精神了々。寤寐如常。氣力稍。

旺者勿用峻劑攻之。以方主之。

酸角錢八 消石五分 甘露蜜錢十六

右三味以水八勺。先煮酸角消石片時。次內甘露和勻。濾去滓。溫服。

三聖飲同熾盛熱。已差。病人精力稍復。要微利者。以方主之。

酸角錢八 旃那錢一 甘露蜜錢八

右三味以水三合二勺。先煮酸角旃那少時。內甘露和勻。濾去滓。半時服一茶碗。

加密列飲蒲治熾盛熱欲吐不吐者

加密列花

右一味湯泡多服取吐

百葛霸王散發熾盛熱温々欲吐不吐口苦心下痞滿頭暈目眩煩悶者以飲食停滯之所致也初起宜先放血急與以藥令吐又熾盛熱發疹適因飲食不慎而其毒內攻呼吸短促心下鞭滿惡心欲吐者以方主之吐後宜用霸王飲三物飲或施下導方

霸王鹽半銖 乙百葛五分

右二味為末用白湯頓服凡服吐劑後宜多飲微温湯令其吐穢物

加味白虎散同主治同前

涌酒石五銖 白糖十銖

右二味為末用白湯頓服

二仙散同主治同前

乙百葛一銖 涌酒石一銖

右二味為末頓服

擦膈飲同主治同前

涌酒石一分

屋矢蔑兒

錢八

右以新汲水一合二勺先溶解酒石次內屋失蔑見和
勻半時服二匙至吐盡

白虎酒歌熱病温々欲吐者宜以酒令吐出胃中粘液

涌酒石五 白葡萄酒十六

右攪和服

梅那大黃飲同熱病刺絡清凉涌吐之後宜與以湯以和

氣血

梅那二 大黃一 小茴香五

右三味以新汲水一合四勺慢火養半時或一時濾去

滓加砂糖一頓温服又必更煎陳茶宜時飲下

梅菜酸桂飲同主治同前

梅那二 紫茉莉一 酸角四 桂一

右四味以新汲水一合四勺煎前浸之濾去滓温服

三物飲獲熾盛熱心下痞重腹滿口糜食不進者腸中有

穢積也此方主之下對更煎去且不飲知者

梅那四 甘露蜜十二 浮酒石一

右三味以温湯一合二勺浸半時濾去滓頓服

霸王飲同主治同前

王霸王鹽 三錢

右以_二亞加刺撒_一微法六合一_一磨頓服用_生淳礬酒石散

見二物大黃散見亦可

酸泥子_同治熾盛熱下後頭痛未止且不得眠者

蒸餹心_{白芥子末}等

右以好醋搜和如泥攤棉布敷足心

降氣泥_同治熾盛熱頭痛眼瞪者

蒸餹母_{九十}食鹽_{六錢}白芥子末_{各十}

右三味以酒為泥敷足心頭痛劇者宜朝夕湯脚施下

導方大效

芸香礮砂醋_同治前症

芸香露_{百四十}礮砂_三芸香醋_{十六}

右攪和塗額上

熾盛熱眼目焮赤頭熱如焚耳鳴目眩者於水蛭一尾於

耳後令吮血大驗

加味梅肉湯_同熾盛熱諸症稍減而疲勞甚者宜以湯或

施下導方亦佳

乾梅肉_{十六}生大麥_{十二}淳酒石_二

百發方是

消石錢一 栗斃斯舍利別錢十二

右以水六合先煮梅肉大麥酒石半時取三合五勺濾去滓
太滓內餘藥和勻二時服一茶鐘

加味梅肉膏同治前症

梅肉 接骨木子醬各錢十 浮酒石錢二

右三味調勻服一匙日三四次

加味酸角湯同治前症

酸角錢十六 洋葵根錢八 消石錢五分 甘露蜜錢十二

小蘗舍利別錢八

右以水六合先煮酸角洋葵半時取三合五勺濾去滓
內餘藥和勻一二時服一盃

三物洋葵湯同治前症

洋葵根錢八 甘露蜜錢十六 霸王鹽錢三

右以水六合先煮洋葵半時取三合五勺去滓內餘藥
烱盡二時服一盃

刺蛄消石散同熾盛熱腸胃無穢積之候但大熱煩渴脉
弦者以多因脉絡緊張血液稠厚而然也此方主之又
治熾盛熱斐栗疹觸事而內陷更加壯熱煩渴脉弦實

呼吸促迫等症者宜先刺絡而後清解之若投熱劑即死

刺蛄石二十 好消石十

右二味為末頓服

消石粟接飲同治前症

好消石錢一 粟釐斯舍利別錢八 接骨木花露四十

右三物攪和二時服二匙

加味大麥湯同治前症

大麥二十 消石錢一 屋失蔑兒若蜜十

右以清水九合六勺先煮大麥半時濾去滓內餘藥消解頓服

洋葵消石湯同治前症

洋葵根錢八 洋葵葉二 消石錢一

粟釐斯舍利別錢十六

右以水先煮上二品二刻取三合五勺濾去滓內餘藥

和勻微溫一時服一茶鐘失蔑兒洋葵清燥湯去屋

接骨清涼飲同治前症

消石錢一 接骨木子醬錢十六 小藥舍利別錢八

接骨木花露

六十錢

右四物攪勻。二時服二匙。

滑腸導

同

治前症二三日大便不通者。

水

六十錢

亞麻油

蜂蜜

各十錢

消石

一錢

右攪和微溫向肛射之。

接骨錦葵飲

同

熾盛熱邪毒已潰自汗出而覺快者邪欲

去也。用此方徐徐助其發越。只避風寒而慎勿令溫覆。

又治發粟疹冒寒而內陷者。前方見

撒爾非亞飲

同

治熾盛熱自汗出而不解。身體日衰者。又

發疹後精神不爽快者。用此調理之。

撒爾非亞

一握半

右一味沸湯浸一刻。濾去滓和撒爾非亞合利別十二

錢。一時半服一盃。

加味幾那湯 同 治前方無効者。

幾那

十二錢

白糖

桂露

各十錢

右以水先煮幾那半時。取一合二勺去滓內餘藥調勻。

半時或一時溫服一盃。

芸薩香草飲

同

治熾盛熱發粟疹冒寒而內陷者。

熾盛熱

芸香

墨栗薩

伊吹麝香草

各一握

右三味湯泡温服

加味芸香飲

同

熾盛熱發粟疹隱々不振鬱伏皮下而煩

悶者正氣不能逐邪毒令悉發越也此方主之又治發

粟疹冒寒而內陷用接骨錦葵飲芸薩香草飲無効者

芸香

斯哥爾需謨

各一握

綠礬精

二十滴

解毒子舍利別

十六錢白薇功同
解毒子可代用

右四味用温湯先泡過上一味取五合濾去滓下餘藥

和勻一時服一茶鍾

五物羌活飲 同治前症

羌活

刺菝斯根

墨栗薩

各一握

覆盆子舍利別

十二錢

忽弗滿

止痛液十滴

右上一三味温湯泡過取三合半去滓下餘藥和勻一時

服一茶鍾加好葡萄酒効益多

壯元飲 同治前症

加乃可草根

二錢

橙皮舍利別

十二錢

右以温湯先泡過加乃可草取三合半去滓內橙皮舍

利別勻一時服一茶鍾加好葡萄酒効益多

芸香開壅飲 同治前症

芸香露 四錢 五種開壅根合利別 錢十二

解毒子 二錢代用白薇

右三物攪勻一時服一匙加好葡萄酒効益多

龍腦螭蛭散 同治前症筋惕肉瞤者

龍腦 一錢 螭蛭石 一錢

右為末每一時以芸香草飲送下

四味龍腦飲 同治前症

龍腦 七錢 皂樹膠水 二錢 栗殼斯合利別 錢十二

墨栗薩露 八錢

右先取龍腦膠水入乳鉢同研下餘藥和勻半時或一時服二匙

時服二匙

龍腦瓜子乳 同治前症

龍腦 八錢 匾桃仁 甜瓜子 各八錢

右三味以新汲水同搗爛如乳汁濾去滓更加白糖八

錢和勻半時服一茶鍾

幾那芸香飲 同治前症

幾那末 八錢 芸香露 八錢 好葡萄酒 四錢

白...

鐵...

...

龍腦薄荷舍利別錢十六

右四物攪和半時或一時服二匙

防癘芸香飲同主治同前

芸香露六十錢 亞路馬地加醋十二錢

橙皮舍利別十六錢

右三物攪勻半時或一時服二匙亞路馬地加醋製法詳于藥性辨卷七

芸薩香草飲同主治同前見上

龍腦安神飲同治熾盛熱發粟疹因憂鬱悲哀忿怒等內

陷者大効

匾桃 甜瓜子各八錢 龍腦七錢

右三味以水同研如乳汁絞去滓取三合六勺更加白

罌粟舍利別十二錢和勻一時服一盃

粟疹無故俄然內陷心煩苦悶氣息欲絕四肢厥冷者宜

以濕布摩四肢隨而刺絡即奏効

粟疹內陷其毒侵入頭腦發頭痛如割謔言妄語精神昏

聩不省人事四肢拘攣等症者以散毒之藥薰蒸頭射

刺戟導於肛兼服輕葦解表之劑或施蟻針於耳後或

角筒子於頭或敷酸泥子於足心並佳

龍膠飲 伊嫩衝熱。々已退其人虛憊者以此方主之。若脉堅實者必勿與之。

龍腦 錢一
皂樹膠 錢二
白砂糖 錢六

右三味研末。和蒸餹錯二合三勺。半時服一二匙。

幾那飲 蒲治熾盛熱。餘焰不解。胃弱。飲食難化者。

幾那

右一味。浸冷水服之。

百葛霸王散 獲熾盛熱。病毒已潰。俄然心下痞悶。温々欲吐。不吐者。以多初起。失吐下之所致也。宜以此方。

四物導痰圓 獲治熾盛熱。胸中煩熱。短氣咳逆。痰難出者。

消石 汗銛石 各一錢
屋失蔑兒

麗春花舍利別 各十錢

右四物調勻。一時服。二匙。接骨錦葵飲送下。

五物導痰飲 同治前症。

消石 五分
汗銛石 五分
海葱蜜 錢十六

麗春花舍利別 錢八
茴香露 錢四十

右五物調勻。一時服。二匙。照接骨錦葵飲下之。

天灸膏 一名荒菁。治熾盛熱。病人謔言妄語。精神昏瓚。筋

傷肉。臍空。摸床者。宜傳之。腓腸。而其症猶不退者。傳之。肱股。大効。又治胸中煩熱。短氣。咳逆者。

黃蠟 六十錢

松脂

諸 各三十錢

家豬脂 二十錢

芫菁末 六十錢

右先取豬脂已上。四味。上火。熔化。次下芫菁末。不住手攪和。為膏。

又方

越沒里膏 四十錢

芫菁末 八十錢

右先取膏。上文火。烱化。下芫菁末。煉和。越沒里膏。取 四十

錢。白蠟。十六錢。上火。煉和。為膏者。

又方

拔細栗膏 九十錢

芫菁末 六十錢

右先將拔細栗膏。烱化。下芫菁末。煉和。為膏。

降氣泥。菴。治前症。

二物。大黃散。治熾盛熱解後。舌胎不去。心下痞悶。不思食者。

大黃

霸王鹽

各二錢

右為末。每服一劑。且暮用之。

神經熱

漢人房謂陰症

乙百葛格安那酒吐治神經熱及赤痢宜初起用此方取

乙百葛二銖

右一味浸白葡萄酒十二錢出藥味去滓頓服

獨聖散蕭神經熱初起心下痞滿胃痛惡心者當取輕吐

此方主之

乙百葛

右一味為末每服二分五厘至一銖若有欬衝之候則

禁之

旃那甘露飲同前在嫌忌吐方者宜與之取微利慎勿峻

下

旃那

甘露蜜

右二味湯泡溫服大黃劑亦得

余嘗療神經熱脉伏難診妄語不絕四肢厥冷及死証悉

具者輒令日服一切常飲和釀葡萄酒一小玻璃瓶往

徃收効同

橙汁飲同治神經熱奇効

神經熱

葡萄酒

橙汁或枸橼

右調勻代常飲與之

天灸膏 同治神經熱首尾並貼之特治神志恍惚妄言獨

語者效見熾盛熱

乳水導 同治神經熱大便不通者

乳汁大 清水大 砂糖小

右三味攪勻隔日射肛若無驗加食鹽一匙

壯元解熱散 吳熱病元運不及者身體熱少脉遲弱氣息虛乏也此方主之

解毒子

野艾蒿鹽

鹿角燒灰各一錢

右三味分作十二貼二三時服一貼白湯送下

大麥壯元湯 同主治同前

大麥煎汁六十錢 解毒子一錢 的里亞加二錢

汗銻石 野艾蒿鹽各一錢 砂糖四錢

右六味調和一時服一匙

壯元解熱酒 同主治同前

龍腦 獨活各八錢 葛爾儒 野艾蒿各一握

右四味以葡萄酒六合浸出藥味去滓每一時或二三

時服一盃

加味複方解毒子散 扶治神經熱煩燥不得眠者用此方
疏表發汗則氣血鎮定。睡眠得所也。勿誤用猛烈阿芙蓉劑大害

解毒子 五十錢

蜥蜴石

蟹爪 各三錢

右三味為末加葛私多儂謨及撒法郎少許和勻用之
的里亞加同主治同前宜與少許

壯神散 同治前症精神昏聩者

瓦爾拔奴謨 大

龍腦 少許

右二味為末白湯送下

挂皮鎮定飲 伊治神經熱腐敗熱並嘔吐者

挂皮末 錢二

蘇哇拂兒越的兒 錢二

鹿角鹽 錢一

橙皮舍利別 錢四

右以葡萄酒先浸挂取八勺去滓下餘藥和勻一時服
一食匙

揮發益氣飲 同治神經熱惡性熱並脈弱無倫衰憊甚者

挂露 三十錢

蘇哇拂兒越的兒

挂皮丁

含油揮發精 各一錢

右四味調勻。二刻服一匙。

回春飲 同治前症神效。

蘇哇拂兒越的兒 一銖

麝香 二銖

桂露 四錢

右三味攪勻頓服。

芥子乳清飲 泥治神經熱。或聖京健。卒中水腫等溫補身。

體分泌諸液。

白芥子末 十二錢

右一味以乳水各三合二勺煮片時。下葡萄酒二三匙。至脂清相別濾去滓以代常飲大效。

薄荷回生飲 伊治神經熱及腐敗熱。哀憊尤甚。無死者。

龍腦薄荷露 四十錢 橙皮舍利別 八錢

食而便答利亞丁 八錢 含油揮發精 原本脫分

蘓哇拂兒越的兒 一錢

右五味調和半時服一二匙。

壯神消毒丹 泥治前症。

食而便答利亞 解毒子 各十

葛私多儂謨 五銖

右三味為末調撒法即舍利別每二時或二時半一頓。

服。

壯神消毒散 同治前症。

加乃可草一銖 撒法即 葛松多 儂護 各四

右三味為末作一服用白湯一盃送下日三服。

壯神解毒飲 治神經熱煩燥苦悶精神錯亂呼吸促迫。

如牛喘壯熱漏汗胸中鬱悶其狀如肺焮腫脈虛數無

倫小便清澄如水者宜此方。

鹿角鹽十銖 宜母子汁三錢 解毒液十二錢

刺賢堊兒精 撒法即舍利別五分 錢

右先以上三味調勻候沸騰止內餘藥和勻一二時服

一劑兼用強心飲稍獨活葉各一斤已上三味入蒸

罐內洗水上火蒸餾取滴露也。

壯神解毒子膏 同治同前

複方解毒子散二分五厘 撒法即五厘

昆歇屈篤刺列瓦那一銖

右以撒法即舍利別和勻頓服筋惕肉顫掉痰癢甚者去複方解毒子散加麝香半銖神效。

幾龍散 主治同前

食而便谷利亞

解毒子

幾那各十

龍腦各四

右四味為末。二時服。一劑。

強心飲蒲

挂露三十

丁子露十六

刺賢各十 堙兒精

香竈精各二

橙皮舍利別八

右調和每服二匙。日三四次。

麝香散

治神經熱纏延不差。呃逆肉瞤筋惕癱瘓。衆醫

技窮者

麝香

右一味為末。每服一銖。日三四服。

龍麝角鹽丹同治前症。兼發越蒸氣。通利小便。

麝香

五分

龍腦

五分

鹿角鹽

一分

右三味舍利別調。照前服。

一。醬代鹿角鹽舍利別。以砂糖少許為散用之。

強壯泥同治前症

白芥子末

蒸餛母

或作麵粉。各等分。

右醋調如泥。敷足心。或項上衰弱甚者。貼天灸膏。

治病入漏汗不止。且下利甚者。服阿芙蓉液三滴。至五滴。

為妙。

冷服麝香飲 蒲壽治神經熱及宮痛。呃逆筋傷肉腫。拘急瘕

癥。精神不了。鬱憂悲悶等症。神效。

麝香 錢一 砂糖 錢十六 酒蒸桂露 二錢

清水 錢八十

右先取麝香砂糖同研。徐徐下清水內。桂露調時服。

三匙 蒲氏作麝香五分。砂糖四錢。桂露薄荷露各十六錢。全由樟葉精。二錢。

幾那散 蒲治神經熱。往來寒熱。大汗出。而虛脫甚者。

幾那 錢一五分至

右一味為末。赤葡萄酒一盃。下日四五次。

幾那酒 同治前症。

幾那 錢八

右一味。以赤葡萄酒。一小玻璃瓶。淹二三日。濾去滓時

服一盃。

壯神幾那飲 混治前症。

幾那 錢八 橙皮 錢四 食而便答利亞 二錢。代用。加乃可草。

撒法即 錢一

右四味為末。以好燒酒三合。二勺。淹三四日。濾過。每服

二卯匙。點葡萄酒一杯。服日三四次。

幾那解毒飲雜治神經熱及腐敗熱虛憊甚者用此方強

壯纖維防遏腐敗幾越蒸氣

幾那錢十六 橙皮錢十二 食而便答利垂 錢三

撒法即 泰四

右四味以燒酒四合淹三四日。濾去滓每服四錢。點綠

礬漿二十滴調葡萄酒每二時飲之。

幾那回生飲伊治一切熱病虛極甚者神效。

幾那尋常者 赤幾那各十 加乃可草根錢六

橙皮舍利別四錢 龍腦二錢 樹膠水

蘘哇拂兒越的兒二錢

右上二味水煎去滓浸加乃可草根候藥氣出取四合。

內餘藥和勻半時服一茶鐘。

揮幾幾那飲同治神經熱綿延不差者驗。

幾那錢十六 酒石鹽錢二 墨栗薩精錢十六

含油揮幾精錢三 阿魏丁錢一 橙皮舍利別錢十六

右上二味水煎取二合去滓和餘藥服一茶鐘日四次。

或去阿魏丁加葛私多僕護丁効益到。

複方幾那酒 蒲 治神經熱腐敗熱進退者殊效

幾那 錢十六 橙皮 桂 各搗爛

右三味同末入玻璃瓶內。次燒酒四合八勺密封之。淹五六日。瀝去滓。二三時服一錢至四錢。

神經熱發粟疹而汗大出。虛憊甚者。宜與赤葡萄酒速止汗。復元氣消散疹神驗。

幾那撒法郎飲 扶 治神經熱漏汗。虛極熱進退者。

幾那 錢十六 橙皮 伊斯把泥亞產

食而便答利亞 錢三 撒法郎 諸入利亞產者。四銖

哥攝尼兒 銖二

右五味以燒酒四合淹三四日。瀝去滓。每服一錢至四錢。臨服和綠礬漿 加應用 十滴至二十滴。或水酒每二

三時用之。時宜與大黃少許以攻腸中鬱積。

反本飲 伊 治神經熱及腐敗熱虛極者。

福斯福露 秘二 乳液合利別 錢八

忽弗滿止痛液 三十滴

右先取福斯福露。以皂樹膠水同研。加熱湯一合二勺。如乳汁。內餘藥和勻。一時與一食匙。

補真飲

孔同

主治同前

蘓哇拂兒越的兒

錢一

福斯福露私

黍三

右二物調勻水點一時服十滴

諸般熱病八九日胸中苦悶甚者必發疹之候也與緩

和強心劑以助元氣之發出

三物壯元飲

藏

神經熱

一種有初下利寒熱往來肢節疼

痛殆如聖京健肢體勞倦神思疲憊頭痛如割肌熱逐

漸而發脈數無倫小便稠濁尋發謔言妄語筋惕肉瞤

羞明喜暗物聲易徹等症甚則下利益甚重墜努責或

發斑鼻紅下血大便失禁舌燥而黑二便汗唾皆惡臭

至其極精神昏聩撮空摸床昏睡呃逆粘汗出而死者

治之要在初起未謔妄之際速止下利以方主之

加乃可草根

錢四

明埕列利精

錢八

忽弗滿止痛液

錢一

右以沸湯一合二勺先浸加乃可草一刻濾去滓放冷

和餘藥一時服一匙下利猶甚者去明埕列利精謔語

者增止痛液或加食而便答利亞發腐敗之候及危險

之證者加龍腦麝香越的兒亞爾筒兒硝砂阿芙蓉桂

露等少許

腐敗熱

別名惡性熱。或氣壯熱。或腸胃熱。或歐羅巴疫。微氏謂邪毒在胃腸曰腐敗熱。在血

液曰惡性熱。亦是同一病耳。蓋漢人所謂溫疫是也。

大麥酒石飲

微治腐敗熱

大麥

錢十六 浮酒石 錢二

右以水二升煮濾去滓溫服

里木那垵微治腐敗熱

枸橼汁若醋水 砂糖

右攪勻代常飲用之

大麥硫董飲微治惡性熱

大麥酒石飲或里木那垵 一小玻璃瓶

硫董醬一錢 見熾盛熱

右攪勻代常飲用之禁刺絡

加密列飲蒲人若覺懼於以病則宜速用以方取吐猶不

愈者經二日後復與之

幾那加密列飲同與前方取吐後須用以為常飲

幾那 加密列花

右二味湯泡溫服臨卧更與好葡萄酒一二杯余屢用

以方得殊効

獨聖散 壽 腐敗熱。口苦而臭。舌黃帶綠。胸膈痞滿。温々欲

吐。或惡心嘔逆。或腹痛。或噯氣者。以此穢物留於胃中。也

宜以藥吐之。每服一銖。至五分。微温湯或砂糖湯下。 壽

治腐敗熱初起。心下痞悶。腹中緊張。身體衰憊者。 見神

熱經

白虎散 後 主治同前

通酒石 分一

右一味為末。微温湯下。

玄武飢 吳 熱病胸膈滿悶。嘔逆。噯氣如敗卵。不思飲食者。

此為敗物留胃。宜以此方通之。

通酒石 厘五

右三味調勻頓服。

銻石酒 同 主治同前

默他兒撒法郎 錢一

右入玻璃瓶內。灌葡萄酒二合。四勺。上微火養二三日。

時振蕩。瀉去滓。頓服八錢。

加味乙百葛格安那酒 同 主治同前

乙百葛 銖一

葡萄酒 錢八 薄荷油 滴一

右攪勻一頓服。

百葛霸王散

獲主治同前

方見熾盛熱

加味白虎散

同主治同前

全

二仙散

同主治同前

全

擦膈飲

同

主治同前

全

乙百酒石飲

四

治腸胃熱。胃中有敗物者。并發斑疹者。大

效。

乙百葛

一銖至五分

右與礬酒石同磨。下接骨木花露二十四錢。和勻一刻。

服一二匙。

薔薇酒石飲

伊

治膽汁熱煩渴者。

涌酒石

五銖

薔薇露

五十六錢

覆盆子舍利別

八錢

右攪勻。一刻服。二匙至吐。

大麥白虎飲

同

主治同前

涌酒石

五銖

大麥煎汁

六合

右攪勻。每服一麥酒盃。

加味解熱散

藿

腐敗熱吐後。宜用此方以驅逐餘毒。

解熱散

銖一

綠礬漿

甘消石精

各三十滴

白虎散

藿敗熱

薄荷油 四滴以砂糖少許研勻

右攪勻以水半杯送下一時半服之服四劑畢而後去

甘汞 散中 痙癇者倍加薄荷油謔語者加阿芙蓉液十

滴至十二滴貼天灸膏亦佳

大麥酒石飲 微 腐敗熱吐後宜用之 前方見

硫堇醬 同 治吐後熱尚存大便臭穢小便短少者 方見熾盛熱

天灸膏 同 治吐後熱尚不愈頭痛如割精神錯亂謔言妄

語者

酒石散 同 病人不能服吐方宜以方下膽汁抑熱勢

浮酒石 錢八

右為末分作八服

酸角旃那飲 吳 熱病大便秘閉腹脹覺重者是敗穢在腸

也宜以方下之

旃那 錢二 酸角 錢四 葛縷子 錢一 凝水石 錢五分

右以水一合六勺浸出藥味去滓頓服隔二日更作以

方再服

二物大黃散 蘇 腐敗熱無可吐之候者宜以方蕩滌腸中

方見熾盛熱

淳礬酒石散 同主治同前 全

霸王飲 同主治同前 全

三物飲 同主治同前 全

酸角湯 微治惡性熱大便不通者

酸角 二十錢

右以温湯四合煮片時。濾去滓。每朝服之。

神仙健胃散 回腸胃熱當下者。并呃逆不止者。宜此方。

盧會 九錢

杜衡

桂皮

撒法郎

乳香

甘松

黃檀

各十錢

右七味為末。每服一二錢。白湯送下。

寒水湯 回主治同前

凝水石 八錢

右水煎温服。

大黃甘露湯 同主治同前

大黃 甘露蜜

右水煎温服。

消黃散 同主治同前。腐敗熱吐後。宜用此方。驅逐餘毒。

氏歌

大黃分五 消石半

右二味為末白湯送下

緩和導壽同前症病人虛弱不堪下劑者宜用之氏回治腐敗

熱大便秘結者壽氏

梅旗導回治腸胃熱頭痛甚面赤充盈謔言妄語者氏

梅肉 旃那

右水煎加消石二錢烱盡射肝

天灸膏同治前症宜貼之見熾盛熱

消龍散同治腸胃熱呃逆發於胃喉腫者上

消石錢二 龍腦錢二

右為末白湯下數服

中和散吳腸胃熱理當吐下而熱便解而依然不愈者是

邪毒傳血中之所致也此方主之

沒藥錢一 蘆會分五 解毒子コニツラエハ 野艾蒿鹽各一

右為末分作十二貼服一貼日三次

健胃祛敗酒同治前症

龍膽 獨活各八 葛爾儒 野艾蒿各一

橙皮 凝水石各四

右用葡萄酒。或麥酒。或水酒。浸之。出藥味。服半杯。日三四次。

加味芸香飲 獲腐敗熱。用吐下劑。蕩滌腸胃。汚物盡。而後

用。以方。盛熱。方見喘。

加味羗活飲 同治前症 全

壯元飲 同治前症 全

芸香開壅飲 同治前症 全

龍腦喇姑散 同治前症 全

加味龍腦飲 同治前症 全

龍匾瓜子乳 同治前症 全

二便汚濁惡臭。噫氣如敗卵。脉虛弱者。血液稀薄。解之候也。宜就。已上七方。更加綠礬精。用之。同

大麥礬精飲 同治前症

大麥煎汁 二介 綠礬精 一錢五分

覆盆子舍利別 十六錢

右三物攪和。時服。一茶鐘。

防腐乳清飲 同治前症

乳汁 新鮮者 四介 葡萄酒 酸潘者。六十四錢

右二味調勻。一二沸加卵白攪澄取清以為常飲。

防腐芸香飲同治前方無驗惡症加者方見熾盛熱

幾那芸香飲同治前症全

幾那湯同治前症

幾那

右水煎溫服若不能服之者宜向肛門射之。

防腐幾那飲同治前症

幾那

白糖

桂露各十錢

右以水先煮幾那一時取二合四勺去滓下餘藥和勻。

一時服一盃

幾那薄荷膏同治前症

幾那末錢八

右龍腦薄荷舍利別調服。

四物幾那飲同治前症

幾那末錢八 五種開蕪根舍利別錢十六

墨栗薩露 加密列花各十錢

右攪勻服

幾那石鹽飲同治前症

幾那錢十六 酒石鹽銖一

右以水煮一時取二合四勺去滓更下加密列花舍利
別十六錢和勻服

三物幾那飲同 治前症

幾那煎膏錢四 加密列花舍利錢十六

加密列花露六十錢

右攪勻服

乳清酒壽 治腐敗熱

甘乳清二斤 白葡萄酒四兩

右二味調和服

避邪散同 治惡性熱神効

食而便答利魚

解毒子各半 幾那五分

龍腦四銖

右四味為末每三時舍利別調服或葡萄酒送下隨飲
乳清酒或清解湯加葡萄酒

二物幾那湯底 治惡性熱脉弱語言無力精神恍惚而無
謔言者奇効底 腸胃熱用吐下劑蕩滌腸胃穢滯已盡

舌胎脫本者宜以方底

幾那

食而便答利亞錢各三

右二味為粗末以水三合二勺煮取一合六勺去滓和

香竈露十二錢服

奇効丹微治惡性熱衰憊虛煩者

食而便答利亞分五 龍腦十

右二味為末接骨木花醬調如膏子白湯送下

加味奇効丹同治前症下利甚者

奇効丹劑一 的里亞加錄一

右調勻服

食而便答壽治惡性熱脉遲弱肢體倦怠煩躁不得安

寐者活血解毒開壅大効

食而便答利亞錢三 阿芙蓉液清三十

含油揮發精錢一 橙皮舍利別錢四

右以水二合五勺許先煮食而便答減半去滓下餘藥

和勻一時服二三匙

預防膏子同焮銜熟性々有變為惡性熱而脉沉如退潮

肢體拘攣者宜以此方温補之

複方解毒子散錢十六 食而便答利亞錢八

右橙皮舍利別調如膏。一二時服五分以冷服發汗飲

三四匙送下之。神效。冷服發汗飲方。水二升。酸解毒精。六兩。橙皮舍利別三兩。右攪勻。

天灸膏同治病人不能服前方。衰憊甚麻痺者宜貼之。腓

腸及項上。此治惡性熱。發斑俄然消散。發脈弱。謔妄等。

症。此治惡性熱。其毒衝逆頭腦。發頭痛。面色赤盈。謔言妄。

語等症者。宜貼此膏於腓腸。此腐敗熱已取吐而諸症

未減者。宜貼之項。此湯腳法。見熾盛熱。

治腸胃熱下利甚烈。津液虛耗而發精力衰憊。四肢厥冷。

等症。取若斯哥而需護一錢。桂露一盃。調下。此

解肌散微治惡性熱。下利甚。皮膚枯燥者。宜以此方止下利。

發蒸氣中上

乙百葛錢一 浮酒石錢三

右為末分作六貼。每朝服一貼。服後一時用後方。

大和精同治前症

小和精錢八 綠礬精錢四

右調勻。三時服二卵匙。小和精方。的里亞加錫布羅精。四十錢。揮發酒石精。二十四錢。

綠礬精八錢 右調勻。

酒石大黃散微治惡性熱。邪毒畧盡而未至全愈者。宜瀉

敗毒預防血之欲腐以方下蛔或吐下積穢固腸應下
則下不應下則不實萬全之方也微腐敗熱吐後宜用
以方驅逐餘毒氏散

大黃

浮酒石

各二銖

右二味為末每日或隔日服之

化斑飲

蒲

腐敗熱皮膚發紫黑斑者最危險也此方主之

幾那末

一兩

宜母子舍利別

二兩

至三兩

綠礬精

少許

右先取幾那下清水赤葡萄酒各八勺隨入宜母子舍

利別綠礬精調勻一時服二匙若惡幾那末者浸酒飲

之

舉斑龍腦飲

壽

治腐敗熱發斑疹虛脫甚中氣不振斑疹

消散或內陷而煩悶癢癢欲死者速與此方

龍腦

錢一

燒酒

二十滴

砂糖

十六錢

釀醋

八十錢

右四味先以腦酒入乳鉢研次下糖醋和勻半時服一
匙而後服乳清酒或清解湯加葡萄酒連進至斑疹復
出

幾那礬精飲

蒲

治腐敗熱一身不掉處生膿瘍其色淺綠

如敗疽而屍臭不可近

幾那

右一味浸葡萄酒加綠礬精和勻服

幾那散 治惡性熱發斑者及已發而欲陷沒者早以葡

萄酒日服二三錢方見神經熱

幾挂酒 治惡性熱下利甚者

幾那 大 桂皮 小

右二味以赤葡萄酒煮去滓點綠礬漿少許服之

定吐飲 治腐敗熱嘔吐者

野艾蒿鹽 錢一 拘櫟汁 錢十二 桂露 錢八

砂糖 許少

右以拘櫟汁先烱消蒿鹽次內露糖和勻服之

角鹽飲 腐敗熱當發汗者宜以方

鹿角鹽 五分 好醋 錢十二

右二味調勻一時呷之至汗出

加味的里亞加 治腐敗熱

的里亞加 錢一 鹿角鹽 錢半

右二味調和服吐方之夜與之隨飲乳清酒一合二勺

無乳清酒則清解湯二合四勺加葡萄酒四勺以代之
 酸瑰清涼飲 吳盛夏溽暑之候有濕氣盛行則得一種熱
 病其証熱氣淹留不解時々壯熱固無定期或吐或下
 共無寸驗温覆則大汗淋漓若遇涼氣則煩悶不思食
 身體羸瘦虛憊者此乃壞液之所致也宜此方

玫瑰花半握

酸模根錢八

大麥錢四

右三味以水二合煮至麥熟濾過加香椽一個汁或栗
 殼斯醬少許服之若熱盛者加消石不大便者加酸角
 幾那散微惡性熱頗解舌胎脫去敗穢已盡而微熱未往

者。是熱已解而力未復者取一錢分為八貼日服四貼
 數日但微熱來往者宜於其間服之左方亦做之
 健胃飲同前方無効者宜此方

葛茂埕利斯

珊篤里

野艾蒿

加密列花

各一握

右四味灌温湯一升至冷布濾去滓服四杯
 亞爾謨的里亞加同治熱已解而力未復者

青木香末

土木香末

沒藥末

杜松實醬

各等分

右橙皮舍利別調為膏子。

龍膽玫瑰酒湖預防腐敗熱神驗。

龍膽

斤三

解毒子

兩八

芸香

野艾蒿鹽

各十兩

玫瑰花

斤一

沒藥

兩九

右八味細剉以杜松酒一斗二升八勺弱淹之候藥味

出瀝去滓每一升調燒酒二升每服一小麥酒盃於夜

半及昧且。

預防幾那酒同主治同前

幾那

右一味以燒酒或杜松酒淹之出藥味濾去滓服一盃
日二三次。

西醫方選卷一終

百發方選

腐敗熱

幾那酒^八

加味幾那酒^同

幾那丸^同

三物幾那湯^同

幾那消石飲^同

幾那膏子^九

雙幾那散^同

幾那湯^同

闕午飲^十

加味菖蒲酒^同

換幾散^{十一}

奇驗飲^同

鐵鑄漿^同

加味健胃圓^同

荷蒿湯^{十二}

解熱定吐湯^同

清熱定吐飲^同

加味大力湯^{十三}

破結石酸丸^同

解凝石酸丸

四物開壅飲^{十四}

三亞兒尼加飲^同

清胃飲^{十五}

中軍醬^同

酒石散^同

加味酒石散^同

加味酸消飲^同

清熱酒石散^{十六}

解凝排毒飲^同

芙蓉金硫散^同

加味芙蓉金硫散^同

鴛鴦煎膏散^{十七}

二根一花湯^同

安神飲^同

加味汗鉅散^同

健胃飲^{十八}

的里加艾蒿醬^同

化痰飲^同

律比丸^{十九}

洋葵甘草湯^同

洋葵甘草飲^同

萸宕散^同

加味萸宕散^{二十}

萸宕煎^同

消石散^同

肉豆蔻散^同

截瘡泥^同

加味扑窰福烏萬湯^同

發表解肌散^{二十一}

預防瘡疾方^同

感冒

加味接骨飲 廿

大麥消石湯 廿

甘酸大麥湯 同

甘露湯 同

加味亞麻仁飲 同

清熱乳 廿三

葭散將 同

解肌丹 同

解熱散 同

撒爾非亞木壽 同

撒爾非亞飲 廿四

解肌飲 同

葭汗飲子 同

清肺飲子 同

國老膏飲 廿五

白糖飲 同

桂酒舍利別 同

砂糖油 廿六

寧肺硫黃舍利別 同

硫糖煎 同

神驗湯 同

消黃散 同

清涼石鹽飲 廿七

加味動植煎 同

消石散 同

麗春飲 同

玫瑰飲 同

加味解熱飲 廿八

蘓合香丸 同

的里加接骨醬 同

聖京健 同

緩和麻仁導 廿九

乳製酒石清 同

大力消石湯 同

葵花湯 同

軍將散 卅一

三物龍腦散 同

清解飲 卅二

鎮痛止痛飲 同

鎮痛壯神飲 同

陰陽散 同

四物紫莖飲 卅三

四物接骨飲 同

二物化痰散 同

五物清肺飲 卅四

四根飲 同

大蓼飲 同

碎木山蒼膏子 同

乳酪飲 卅五

幾那非亞膏子 同

四物魚鬚湯 同

大力瓦刺蘓湯 卅六

和胸湯 同

乳麥飲 同

寧神飲 同

三檀飲 廿

一物石酸丸 同

散鬱蒸 同

宣腸旗那飲 廿

石膠散 同

揮殺扑窠丁 卅九

聖京丹 同

和血湯 同

三物石酸丸 同

白芥子散 卅

睡菜飲 同

神驗膏 同

羌菁丁 卅

灰蜜膏 同

止痛膏 同

白蜜驗方 卅三

鎮痛慰 同

定痛油 同

毛姜湯 同

逐痰水 卅四

聖京健丸 同

樟腦洗 同

解凝醬子 卅四

逐痰丸 同

石酸鈎吻丸 同

味加石酸鈎吻丸 同

瓦刺微阿刺酒 同

瓦刺微阿刺散 卅五

三物丸 同

定痛排毒丸 同

的列並丸 卅六

解凝定痛膏 同

丁子木香圓 同

散毒熨 同

甘汞茉莉散 卅七

鉛丹醋 同

勃烏連膏 同

托歇爾私散 卅八

西醫方選卷二

平安 普山藤林紀元泰介 譯輯

伊勢 片岡維周順益

門人 出雲 上田謙卿良悅 參校

瘧疾

大力甘草飲 瘧疾惡寒時用此方溫身體。發蒸氣又其
發熱時熱不甚者亦用此飲至汗止。

牛旁根 四錢 甘草 八錢

右二味湯泡溫服。已煖覆以助藥力。

四味健胃飲 同 主治同前

珊瑚里

葛爾儒

加密列花 各一握

甘草 八錢

右湯泡温服

接骨錦葵飲 同

主治同前

方見熾盛熱

瓦刺蘘酸摸湯 同

瘡疾發熱時其熱甚者宜選用此方或

刺蛄消石散消石栗接飲加味大力湯洋葵清燥湯接

骨清涼飲浮蓉酒石散

共見熾盛熱

輩以清解之

瓦刺蘘根 十六錢

酸摸根 四錢

消石 一錢

粟斃斯舍利別

十六錢

右以水先煮瓦酸二味半時取五合去滓內餘藥和勻

二時服一茶鍾

治瘡疾發時嘔吐者多飲微温湯以令快吐蘘

獨聖散 微瀟 春秋瘡疾口苦舌黃心下痞滿不思穀食噫

氣嘔逆頭暈目眩或惡心欲吐不吐者以膽汁留胃也

當吐之宜此方發前一二時以白湯下五分俟惡心更

多與微温湯或加密列飲 見熾盛熱 以令快吐 蒲曰加大黃

下大便益佳又曰取一錢調海葱蜜一匙與之治膽汁

毒凝滯腸胃者殊效壽曰春瘡則一吐停後服秋瘡則

再三與之。又曰。虛弱者。用此方。久見神經熱。

白虎散

壽

主治同前

壽曰。壯實者。用此方。

涌酒石

五

右一味為末。頓服。

杜衡酒 主治同前

杜衡汁

錢三

葡萄酒

十六

右二味調勻服之。

銛石酒 主治同前

赫篤綸安質沒扭

五

右一味以葡萄酒四勺淹一宿。濾去滓服之。

加味獨聖散 治瘧疾。

乙百葛

銖一

砂糖

塊一

右攪和當惡寒之初。清水一茶鍾。煎服。隨多與。微溫湯。

取快吐而後用。陰陽散

下方見

百葛霸王散 瘧疾惡心嘔逆。口苦而糜者。穢物在胃也。

當吐之。宜此方。加味白虎散。加味白虎水。二仙散。輩亦。

可選用

四方共見

去積飲 治春秋瘧吐後。粘液猶留着。腸胃者。

大麥煎汁 三十錢

葡萄酒 十六錢

乙百葛末 一銖

白蜜 四錢

右攪勻。半時服。一二匙。以吐敗膽汁為度。

陰陽散 霍瘧疾吐後宜用之。

解熱散 五分 甘汞 一分 綠礬漿 六七分

薄荷油 四滴調砂糖一小塊

右調勻。以水半茶鍾送下之。

浮礬酒石散 治瘧疾胃中無穢積之候。而不可投吐劑者。或吐下後。腸胃穢積已盡者。宜選用此方。或酒石末

莉散。霸王散。三物飲。二物大黃散。輩以開壅疏鬱。

接骨錦葵飲 同與前方兼服。已上六方見熾盛熱

三物開壅飲 同主治同前

霸王鹽 三錢 五種開壅根合利別 十六錢

龍腦薄荷露 六十四錢

右三物調勻。一時服。二匙。

霸王散 同治瘧疾吐下後。腸胃無污滯者。宜以此方。又治秋瘧輕者。并春瘧。

霸王鹽

右為末一時半服一錢

三物開墜飲同 主治同前。又治瘡痂已差粘液鬱滯腸中

者上方見

解凝醬子同 治前在

霸王鹽三錢

紫堇醬

碎米薺醬各十錢

右調勻一二時服一小匙

四味健胃飲同 治前症見上

接骨清涼飲同 治前症見熱

導水飲同 治瘡痂已差稠粘液鬱滯腸中小便短少四肢

浮腫者宜前方用之

喇蛄石

底羅仙醋各三錢

洋葵舍利別十二錢

茴香露

五十錢

葉片酒石二錢

甘消石精二十滴

右六物攪勻半時服二匙至尿利腫消

分消飲同 治前症

亞蔽根

亞松百爾象根

茴香根

洋芥根

魯斯空根

葉片酒石液

各三錢

茴香舍利別

十六錢

右以溫湯浸五根片時取四合八勺去滓內餘藥和勻

一二時温服一盃。

折熱膏子同治用前方之際熱再發或發黃或心下痞塞

者

霸王鹽三錢 解熱膏十二錢

右調勻一時服一小匙隨服四味健胃飲一盃

定痛飲壽治春瘧吐後半時乃與之發後三時再與之

舍電法護阿芙蓉液十五滴 若格實温四錢

大麥煎汁八錢

右三物攪勻服

格爾那失斯散同治三日瘧。并春瘧腰痛腹脹雷鳴者宜

用以方取下

質汗沒扭護十錢黃硫者 汗銆石六錢 浮酒石十六錢

右三味為末發前四時與二銖更越二時用定痛飲

瘧疾吐下後發作如故或甚於前者以為邪實於胃中也

宜再吐下之發

清熱飲壽治春瘧用吐下藥蕩滌腸胃穢物已盡者及間

日不得睡者又治秋瘧用吐下等藥熱已減間久者并

宜以方

霸王鹽錢二 礬酒石錢十六 大麥煎汁八四

五種開墜根舍利別錢十六

右攪勻用吐下藥蕩滌腸胃之後候病間每一時以加
密列飲一盃下一匙必勿發時用之

清解湯同治春瘧發熱時宜與以湯稀薄血液又秋瘧不

令吐之日每二合四勺加屋失蔑兒八錢和勻令多服

之見熾盛熱

幾那散壽微春瘧七八發不解發作益甚衣被則大汗淋

瀉者以衰弱之候也此方以八錢主之秋瘧吐下之熱

已退而精力脫或三日瘧八發未解虛憊甚者亦宜以

方每一時半以赤葡萄酒或大麥煎汁一盃或宜母子

汁少許調六分五厘貼即一服之若欲取微利加凝水石

一錢義曰穢積未盡之間勿用幾那蒲日治瘧疾須先

瘧一時半服一點三日瘧二刻用一點壽日秋瘧眼黃

心下苦悶小便黃者雖衰憊甚勿用之花日瘧疾用幾

那劑已愈後必當第八日及第十四日復用一劑

服量約三三劑為度否則不免再發方見神經熱

幾那湯治瘧疾不能服幾那散者宜用以湯

幾那錢八

右以水蒲日四煮取三合去滓加舍利別一二兩蒲無

別用後綠茶和勻半時服一茶鍾

加味幾那湯蒲 主治同前

幾那錢八 食兩便答利亞 錢二 野艾蒿鹽錢一

右三味水煎取一合六勺去滓時服一盃

幾那亞兒尼加煎 同 主治同前

幾那錢十二 亞兒尼加花 錢四

右以水先煮幾那片時去滓下亞兒尼加候藥味出取三合二勺去滓更加洋葵舍利別十六錢和勻半時服一茶鍾

幾那酒蒲 主治同前

幾那末錢八

右一味浸白葡萄酒一小玻璃瓶淹四五日時盪搖澄

清取清去滓與一盃日三次

加味幾那酒同 治一切瘡疾

墨栗薩露錢八十 幾那末八 覆盆子舍利別錢十

燒酒錢八

右攪勻病間平時服一匙

幾那丸同 主治同前

西醫方選 卷二
幾那末 錢八

右以接骨木子醬調。每一錢為二十九。大約得二百八十九丸。甘草末。滾日服盡。

三物幾那湯 泥 治老人及粘液家。因胃雨濕。叢瘡疾。頑固不愈。宜此方。

幾那 錢十六 食而便 答利亞 錢四 生姜 錢二

右三味水煎。溫服。若有嗽衝之候。去食而便。答。生姜加野艾蒿鹽。或酒石鹽四錢。

幾那消石飲 壽 治瘡疾延纏不愈。逐成壞症者。或金刃創

傷。死肌敗疽。

幾那 錢十六 消石 錢四

右二味以水七合二勺。煮減半。濾去滓。溫服。法先與獨聖散四分。取吐。次與此方。必有良驗。若服之下利。則無効。宜取阿芙蓉液十滴。點白湯服之。以止其利。

幾那膏子 壽 治瘡疾。并天行疫熱。有奇効。

幾那末 錢二十

右以橙皮舍利別和勻。法宜先蕩滌腸胃。而後用之。病間一時。或一時半。服一錢。至一錢五分。加食而便。答利。

画八錢功益強

雙幾那散 伊凡瘡者易截而難防再發若欲防之莫如赤幾那然服之動輒發眩暈痞悶等症故作此方用之

赤幾那

黃幾那

各十錢

霸王鹽

四錢

右三味為散末分作二十五貼一時白湯下一貼

幾那湯

日發瘡

即被症三日瘡

發春夏其證前發將退後發

續之休作相逐無有間斷初起選用浮礬酒石散霸王散三物開壅飲四味健胃飲解凝醬子治之諸症應愈今反衰憊者宜用以湯至其險者精神虛脫錯語不絕

昏睡鼾聲如卒中風或頭暈目眩大汗淋漓呼吸促迫

煩悶殊甚宜速與此湯兼用芸香防腐飲幾那芸香飲

輩又治春瘡吐下無驗發作反劇身體虛衰惡症加者

幾那錢

右水煎發後服盡於病間若不能者射其餘於肛門

那劑必先瀉滌腸胃穢物已盡而後用之為法也

幾那石鹽湯 同瘡疾不能服幾那者宜將以湯八勺射注

肛門見腐敗熱

小兒多惡幾那宜加蒸餾水舍利別綠礬精和勻與之或

作導劑射肛門蒲

蘭牛飲泥治小兒瘡疾不能服幾那者宜久服之大効

野艾蒿鹽或酒石 柳椽汁二錢

薄荷露或桂 舍利別各十錢

右先取柳椽汁烱消蒿鹽次下餘藥和勻服二匙日三

次。

加味菖蒲酒微 古無輸幾那於我邦常以此酒治瘡大効

泥菖根 土木香根各十錢 鐵粉十六錢

右以陳白葡萄酒二升半浸之濾去滓飲服

加密列飲伊 幾那之未傳我邦時用以為治瘡之要藥

換幾散翟 治瘡疾疫熱惡性熱代幾那用之有驗

扑蜜福烏篤 秦皮各一錢 龍膽煎膏

獨活煎膏 汗銛石 礪砂各一錢

沒藥二錢

右為末分作八服白湯送下

奇驗飲同 治瘡疾不問隔日一發或三日一發或四日一

發荏苒數十日不愈者

葛雨儒露十六錢 的里亞加露二錢 野艾蒿鹽五分

礪砂精十 麗春花舍利別三

右攪勻。一下後與之。不盡二三劑而愈。余嘗所經驗也。

鐵鏽漿九 治瘡疾要在健經絡。波血液。世醫皆用幾那。

治之。然失其機則有大害。於是余作此方治之。功勝於

幾那。

鐵鏽不拘

右入磁鉢內。灌醞醋。淹至鐵氣出。見赭黑色。濾去滓。一

時半服一匙。

加味健胃圓同 治前方無驗者。宜此方。

健胃散二 肉豆蔻末一 明礬末五分

薄荷油二十滴 甘汞半銖

右五物。用蜂蜜八錢調勻。二三時服。肉豆蔻大以鐵鏽

漿下之。

茛蒿湯。花春秋瘡吐下之。或七發未愈。當用幾那者。用此

湯治之。尤妙。

茛蒿花八錢 酒石鹽二錢

右二味以水九合六勺。煮取三合餘。間時服。一合許。日

三四次。幾那無驗者。用此方。往往奏奇效。或入舍利別

和調用之亦佳。

解熱定吐湯 瘧疾胃虛。惡心嘔吐。或幾那無効者。並神

驗。

野艾蒿鹽 錢六

解毒精

製法。取龍腦薄荷百四十四錢。野艾蒿獨活葉各九十六

錢。用燒酒蒸。鹽之聽用。

白糖 各二十錢

右以水七合二勺。先煮蒿鹽。掠去泡沫。徐徐滴入。綠礬精。適宜。俟冷。下餘藥。和勻。頻々服。一匙。每吐後服之。最良。

清熱定吐飲 同 主治同前

野艾蒿鹽 錢二

宜母子汁 錢十

酒蒸桂露 錢八

清水 錢十

橙皮舍利別 錢六

右攪勻。二三時服。二三匙。

加味大力湯 瘧疾有幾那刺症。而已失其治。一身浮腫。

或腹中結塊者。宜先用補劑。令食滋味。而後疏滌腸胃。

次選用此方。或分消飲。霸王散。三物開壅飲。四味健胃

飲。

牛旁根 錢十六

茴香根 錢八

葉片酒石 錢三

右以水先煮牛旁片時。下茴香根。淹去滓。內酒石和勻。

一時服一盃。腹中結塊者，兼施擦藥。

破結石鹼丸 同主治同前

石鹼 勿搗茶者

安沒尼亞加膠 各二錢

律比丸料 二錢

沒藥 一錢

右為末，入琥珀丁，調每一錢作二十九丸，服三丸，日三次。

解凝石鹼丸 同主治同前

石鹼 勿搗茶產

安沒尼亞加膠

并葉鈎吻煎膏 各一錢

右以越栗失兒刺，祿布利，坦室，秘調，每一錢作二十九丸。

服三丸，日三次。

四物開壅飲 同主治同前

瓦刺蕪根 四錢

失格列乙根

霸王鹽 三錢

五種開壅根合利別 十六錢

右以水先煮瓦失二根，片時取三合六勺，濾去滓內餘藥，和勻。一時或一時半服一盃。

三物重兒尼加飲 同主治同前

西兒尼加煎膏 二錢

苗香露 六錢

龍腦薄荷舍利別 十六錢

右攪勻。一時半服。二匙。

解凝醬子同九秋瘧。初起輕。而漸重。温々惡心。胸膈苦悶。

大便秘閉。腹肚滿脹。面色黧慘。叢斑微黃。或赭黑。肢體

衰憊。多兼骨節疼痛。治法先用吐下劑。蕩滌腸胃。次與

此方。大有効。見上

加味芸香飲同秋瘧之於春瘧。虛憊殊甚。宜兼前方用之。

或用五物加味羌活飲。壯元飲。芸薩香草飲。共見熾盛熱輩

亦可。

大麥酒石飲微治秋瘧發時。頭痛甚。面色赤。脉堅實。或咳

嗽者。又治發後脉仍堅實。口乾舌燥。小便如灼者。見腐敗熱

清胃飲伊治秋瘧虛弱者。并粘液瘧。宜此方。

墨栗薩露錢四十葡萄酒拂即察症十六錢

覆盆子舍利別錢六乙百葛末五分

右攪勻。半時服。一二匙。

中軍醬毒治三日瘧。宜二發後間時與之。

霸王鹽錢一礬酒石錢一小的里亞加四錢

右以五種開糞根舍利別和勻。如泥。二時服。肉豆蔻大

酒石散微治春秋瘧疾。大麥酒石飲之證。宜與二三貼於

間日又治弱人吐後穢物尚在腸中。

浮酒石錢八

右一味為末分作八服。

加味酒石散同

治瘧疾間日口中不爽。温々惡心。腰膝疼

痛不可堪。至發日夜而諸症退者。又治強人吐後穢物

未盡者。

浮酒石分五

熟茱萸分五

右為末服之。

加味酸消飲同

治前症。

酸角錢八

消石分五

甘露蜜錢十六

右以水八勺。畧煮酸消二味。去滓。下甘露蜜和勻。温服。

清熱酒石散壽

治秋瘧。一二吐後。宜用此方。

酒石英

霸王鹽各二

右二味為末。每二時與之。

解凝排毒飲

秋瘧有用幾那。隨治隨作。身體羸瘦。荏苒不愈者。以此粘液之所致。非幾那之所能治也。宜與涌酒石。或乙百葛。令促惡心。以衝動諸器。稀釋粘液。吐之大効。或用此方。有神驗。

接骨木花露 四十錢

珊篤里煎膏 五錢

礪砂錢 一 舍利別 八錢

右四味攪勻半時服一匙

芙蓉金硫散 伊治久瘡發作有時者進以藥以變其期則散

金硫黃 各二 阿芙蓉 各二 砂糖 一

右三味為末分作二貼發前半時與一貼經二時再與一貼期變則速轉用幾那劑

加味芙蓉金硫散 同切勝於前方

金硫黃 十六 阿芙蓉 三 加密列花

黃幾那 各八 亞路馬地加散 即桂姜益智各等分為細末者四錢

右為末分作十六貼病間每一時用白湯服一貼久瘡用三四劑必效

鴛鴦煎膏散 治瘡疫痼者

鴛鴦菊煎膏 半茶至 砂糖 半

右二味為末每服一劑日二三服

二根一花湯 同治前症

亞兒尼加根 三錢 亞兒尼加花 八錢 甘草 八錢

古以水先煮亞兒尼加根花片時內甘草浸又片時取
二勺去滓一時服二三匙

安神飲 同治前症

若格實溫錢四 麗春花露錢十六 硫黃精分五

右攪勻。發前一刻頓服。

加味汗銻散 同治前症

食而便答利亞 汗銻石各十

右為末。發前一刻頓服。已上二方並勿與肺弱嫩者

接骨錦葵飲 治老瘡及四日瘡。汗不出而休歇安神飲

加味汗銻散。幾那湯。輩無寸効者。須惡寒時以薰樟布。
即用樟腦所魚之布 摩背且覆之。隨發服此方。發汗有神効。四味
健胃飲。分消飲。共見上亦可。

健胃飲 治瘡疾胃虛者

龍膽 泥菖 橙皮各八錢 加密列花三四握

胡荽子一握

右五味搗爛。每一握將熱湯三合二勺。或葡萄酒一玻
璃瓶泡之。服一盃。日三四次。

的里亞。加艾蒿醬。壽預防秋瘡。再發。

小的里西加

野艾蒿膏

各十錢

右二味和勻。秋瘧已愈而後十四日間。服肉豆蔻大日三次。慎勿冒冷氣。恐必再發。

化痰飲 壽 秋瘧已愈。面目萎黃。胸腹苦悶。小便黃者。此方主之。誤用。幾那劑。則陷不治也。假令衰憊甚。必勿用之。

海葱蜜 錢十六

霸王鹽 錢二

礬酒石 錢一

龍腦薄荷精 錢四

水 六錢

右攪勻。一時半服。二匙。至諸症愈。葱白適宜。加溫醋一

蓋搗爛。布過。內蜂

前症熱再發者。取硝砂精一二錢。點越粟。失兒剝。祿布利。

但室 秘 服。有良効。花

律比丸 壽 秋瘧已愈。經一月後。每八日空心服五分。但用。

幾那劑。愈者勿與之。與則却再發。

蘆會 錢十六

沒藥

撒法郎 各四錢

右三味為末。舍利別丸。

洋葵甘草湯 蕪瘧者。但熱不寒。或熱多寒少。口渴引飲。

胸煩無咳。頭痛如破。發後間時。體倦氣短。咳少吐痰。不思食也。切勿用幾那劑。若誤用。諸症加煩。悶甚。當豁痰。

宜以湯。

洋葵根八錢

洋葵葉一握

洋葵花半一握

甘草八錢

右以水先煮根葉片時。內餘藥。浸須臾。乃取四合。八分。去滓。一時服。一盃。當夕用。催睡藥。

洋葵甘草飲同治前症

洋葵根二十錢

洋葵葉二握

甘草八錢

右湯泡。溫服。或用洋葵清燥湯。四物導痰圓輩。

葇菈散伊治瘧疾神效

葇菈葉八黍 白糖二銖

右二味為末。分作四貼。隔日且夕。以白湯下。一貼。加味葇菈散同治前症

葇菈葉十六黍 麝香 龍腦各二銖

右三味為末。分作八貼。服一貼。日三次。

葇菈煎同治前症

葇菈葉一銖半

右一味以水煮。二時。取二合。去滓。每朝服。二匙。

消石散劫截瘧

消石

錢四

桂

生姜

各二錢

右三味為末分作四貼發前服一貼發汗

肉豆蔻散 同主治同前

肉豆蔻

錢二

白礬

燒鹽

各一錢

右三味為末分作六貼野艾蒿酒雙服

截瘡泥 同主治同前

烟膏

錢十六

白芥子末

葱子末

各二錢

右三味以燒酒為泥貼動脈上

加味朴蜜福烏篤湯 治瘡後足跗浮腫欲成水腫者

朴蜜

福烏篤

錢二十

朴蜜

福烏篤皮

錢四

亞蔽根

洋芥根

刺菱斯根

各六錢

杜松實

老利兒實

各十錢

葛爾儒舍利別

錢十六

礪砂精

錢一

的里亞

加露

錢十六

右上七味以雨水七合二勺煮瀝去滓內餘藥和勻每服一口日三次

發表解肌散 同治前症當夜用之

汗銛石

礪砂

野艾蒿

各十錢

右三味為末服。

預防瘧疾方蒲

幾那八錢 食而便答利亞

橙皮各四錢

右三味將燒酒或杜松酒或葡萄酒淹五六日。取上清服一盃日三四次。

感冒

加味接骨飲微 感冒頭痛咳嗽。脈強實者為血實也。宜先放血而後與之。

接骨木花握一 蜂蜜十六錢 好醋十二錢

右三味內磁器灌熱湯七勺以匙畧攪而蓋閉之候冷澆太滓臨卧服之。

大麥消石湯同 主治同前

大麥十六錢 消石五錢 蜂蜜十二錢 好醋八錢

右以水二升先煮麥消至麥可食為度布漉內餘藥和勻臨卧多服之。

桃盧乳同 主治服法同前方 盛熱

治感冒口渴者宜大麥湯或接骨飲加乳汁三四分一飲之。

甘酸大麥湯蒲治感冒頭痛鼻塞胸中煩悶肢體疲倦不汗出者宜此湯

大麥 酸角 甘草

右三味水煎溫服

甘露湯同治前症

即大麥湯或蒸餹湯中加蜂蜜或砂糖或舍利別

加味麻仁飲同治前症

亞麻仁

右湯泡去滓加橙汁和勻溫服

清熱乳

泥

治感冒用熱藥而欲為燉衝病者

乳汁水

接骨木子醬消石

右先煎乳水乘溫內餘藥烺化溫服

發散將

吳

治感冒頭痛額重鼻塞流涕香臭不聞或耳聾

或微熱或睡眠或噴嚏咳嗽目赤而淚出鼻孔赤而爛

者

白罌粟舍利別錢八 撒法即 汗銛石一

右三味調勻臨卧溫酒下溫覆以助藥力

解肌丹同治前症

百發百中

一感冒

二二

接骨木子醬

錢八

撒法郎

錢半

阿芙蓉液

滴十

右三味調勻數夕連進至邪盡

解熱散 霍感冒 脈強數 頭痛項強 壯熱惡寒 鼻塞流涕 香臭不聞 口失五味 而食不進者 為血實也 宜先放血 而後與之發汗

淨消石

錢四十

蜩蛄石

修製者三錢

鉛石朱

錢十六

甘汞

錢一

右四味為末 每服一銖 至五分 隨多服 墨栗薩飲 栗方見

撒爾非亞本壽 同感冒無熱者 屬粘液也 代墨栗薩飲用

之 又治感冒咳嗽

撒爾非亞

撮一

砂糖

陳燒酒

各適宜

右以熱湯一合六勺先泡撒爾非亞 太滓下餘藥 勻温服

服

撒爾非亞飲 同主治同前

撒爾非亞

右一味湯泡温服

解肌飲 伊治感冒咳嗽 聖京健痛 及痘瘡難出

接骨木花

握

加密列花

各一握

麗春花

半握

薩撒拂錢四 撒法郎五

右五味湯泡温服

發汗飲子蒲 治感冒 聖京健痛有良効。

明埵列利精錢八 鹿角鹽五 桂露

嬰粟舍利別錢各四

右攪勻服兼用麥麥湯以助藥力

清肺飲子伊 治感冒咳嗽

洋葵根 甘草各一 點失刺護葉一

依促布 麗春花各半 嬰粟殼二

右六味湯泡温服有飲腫症去嬰粟

國老膏飲蒲 治感冒初起咳嗽及胸肺壅塞者

國老膏錢八 酒石鹽錢三

右二味以温湯六合四勺淹一宿去滓更內嬰粟舍利

別十二錢和勻服一茶鐘日三四次

白糖飲叔 治感冒發於暑者

砂糖錢八

右以温湯一合六勺烱消臨卧服之温覆以助藥力

桂酒舍利別同 治感冒發於寒者

燒酒 九錢

砂糖 三錢

桂 二錢

右為舍利別

砂糖油 同治感冒發於寒者每夕臨卧服一匙許製法用

勻。碎消。砂糖。適宜。入。磁。罈。內。上。火。熬。入。綿。絮。點。火。燒。之。不。住。手。攪。至。心。滅。試。更。點。火。至。不。燬。乃。化。為。油。又。法。取。物。擦。切。一。為。絞。去。汁。填。滿。砂。糖。入。之。小。罈。內。上。炭。火。煮。片。時。糖。化。為。油。又。法。取。大。拘。櫟。一。個。去。殼。填。滿。水。糖。末。放。上。罈。中。安。之。磁。罈。上。乃。得。油。治。感。冒。聖。藥。寧。肺。喘。息。胸。膈。諸。病。并。胃。虛。心。痛。有。奇。效。

寧肺硫黃舍利別 同治感冒咳嗽喘急及胸膈諸病

燒酒 三錢

砂糖 四錢

硫黃華 八錢

右三味攪勻入壺點火以銀匙攪拌之至不燃為度傾

盆內收貯朝夕服一匙

硫糖煎 同治前症

硫黃華

二阿爾爾罐。各五至通用。

冰糖 四分

右二味綿布包之以水三合二勺煮減半時服三四滴

神驗湯 同治前症

麗春花葉

撮二

洗淨大麥

握一

洋葵根

握二

右三味以水九合六勺煮至八分一臨服和砂糖

消黃散 薄感冒但行湯脚法溫覆衣被服清稀飲料則愈若無效荏苒彌日則或變作脇痛肺癆勞瘵熾盛熱也

已有脉堅數。身熱肌燥。頭痛胸煩等症。則宜先放血。而後與此方。

消石 銖一 大黃 黍五

右二味為散末。一二時服。一劑至下利。

清涼石鹽飲。同前症下後貼。天冬膏於背上。而與之。大效。

又發汗。止惡心嘔吐。解飲衝熱。殊效。

酒石鹽 錢二 拘掇汁 四錢 龍腦薄荷露

清水 各十錢 舍利別 錢八

右先取拘掇汁。烺化酒石鹽。候沸騰。止下。餘藥和勻。冷

服。

加味動植煎。治感冒咳嗽。功勝於諸藥。

蜂蜜 或舍利別。宜母子汁 四錢。或代綠 錢二

阿利襪油 錢八

右三味攪勻。一刻服。半茶匙。

消石散 微。治感冒不得睡。

消石 錢八

右為末。分作十六服。湯脚亦大效。

麗春飲 同。治前症。

麗春花

右湯泡服一二盃。

玫瑰飲 壽治感冒鼻塞流涕。或熱病羸弱。或下血崩漏等症。健補腸胃。定惡心及嘔吐。

玫瑰花 錢六

右一味以新汲水七合二勺。浸一時半。濾去滓。和綠蓉油五分。服一麥酒杯。日三四次。

加味獨聖散 藿感冒惡心欲吐者。以水一盃。送下之。俟更發一段。惡心頻與微溫湯。或菊花飲。令快吐。々盡則使

穩卧用解熱散。見或加味解熱飲。

加味解熱飲 同發汗健胃。令人安眠。

解熱散

一銖見上

洋糖

一小塊。和薄荷油三滴。

阿芙蓉液

八滴

甘消石精 三十滴

右先取解熱散。和清水。或浸墨栗薩水。半茶碗。而后投餘藥。每一時半服之。得眠去。阿芙蓉液。胃中無風氣。去洋糖。有渴。加枸櫞一片。

藜合香丸 同治感冒已解。咳嗽不寐猶在者。

藜合香 三四

右為丸當夜先行湯脚法而後服之汗出者一宿即愈

若用之早則有害

的里亞加接骨膏 同主治同前

的里亞加錢 接骨木子膏 錢四

右二物調勻夕服

幾那散 同治感冒荏苒不愈者見神經熱

聖京健 元伊偃篤按孟魯曰西電法護於聖京健始分寒熱二症後拂即察醫校

魯魯斯亦於伊偃篤分寒熱而曰熱伊偃篤即熱聖京健也雖其說不及寒伊偃篤據此即是寒聖京健也已又獲篤見孤併錄伊偃篤聖京健曰二病雖名異而其因同則治法亦無二轍其有効

於伊偃篤者亦可治聖京健也蓋二病其因相同惟症有小異耳但單稱聖京健者謂疼痛游走伊偃篤者謂疼痛留着也其義自別然伊偃篤與聖京健等字者互相通言也故今併錄之

錦葵導 微聖京健惡寒發熱頭痛脈堅一二日骨節疼痛

不可屈伸二三日或自肘走肩項腰膝或自膝注肘腕

跨跗至是痛熱始減夜重晝輕延纏引日者是為熱症

原名血夜聖京健或血夜伊偃篤或失結兩百聖京健或拂里健伊偃篤漢人所謂歷節痛風即是也

也治法當先作坎方射之肛門經半時放血九十六錢

方見熾盛熱

喇站消石散 治熱聖京健寒熱疼痛不劇者宜以接骨

錦葵飲。洋葵清燥湯。以上三方見熾盛熱洋葵甘草湯。加味大力

湯。大力甘草飲。分消飲。以上四方見瘧疾輩送下之。慎避風寒。

不妨發汗。二三日乃愈。

大麥消石湯。微治熱聖京健痛。宜多服。此湯。方見感冒

桃蘆乳。同主治同前。方見熾盛熱

若遇缺則甘乳清加蜂蜜少許代之。

緩和麻仁導。蒲熱聖京健。其初肢體疲倦。煩渴引飲。次之

骨節疼痛。游走無定。少有舉動則痛益加。漸攢於關節

而焮腫。放血視之。宛如於股痛。宜作此方射之。肛門以

導大便。

亞麻仁湯。乳汁各十錢。

右調勻聽用。

乳製酒石清。同治前症。

淳酒石。乳汁。

右二味同煮。取清去滓。溫服。或與酸角湯。見膏亦可。

大力消石湯。壽治熱聖京健。以方發汗。通大便。

牛蒡濃煎汁。二百八錢。消石。四錢至六錢。

蜂蜜。若接骨木子醬。三錢。

右三物攪勻半時或一時溫服一茶鍾

酒石散微熱聖京健疼痛劇甚起卧不隨不可射導方者

當用下劑宜每朝夕服以此散一貼方見瘧疾

加味酸消飲同治熱聖京健微熱脉不堅者用此方取下

五六行痛乃減全

聖京健下之後令病人浴湯殊効或用綿布護溫湯敷痛

處亦得浴後切禁冒風寒蒲

聖京健疼痛劇而不能上廁者宜熏患處於溫湯大効微

葵花湯同治熱聖京健用此湯熨痛處半時乃良驗然必

勿先刺下行之

錦葵花若蜀葵花一握

右以大麥煎汁四合煮去滓聽用

加味接骨飲同熱聖京健其痛或從大小便解或從汗散

也故用此方取汗亦得但初起忌發汗方見感冒

天灸膏同治熱聖京健因稀厲液者宜先取下次貼之速

効脉堅者勿貼方見熾盛熱

軍將散微治前症最効

結爾蔑斯密涅刺列末一

痛藥宜此方。見喘熱

鎮痛止痛飲 同治前症每朝與此飲至痛止禁夕與之

茶連刺侃篤弗利礙度散 錢二 若格實溫 錢十二

麗春花露 三十 二錢

右三物攪勻。平時或一時服三匙。

鎮痛壯神飲 同主治同前

消石 二 若格實溫 錢十二 菩提樹花露 二十 六錢

右三物攪勻。平時服二匙。

陰陽散 同服前方痛熱俱不忒者宜兼用之

鴛鴦菊煎膏 消石 參十 刺蝟石 錢一

右三味為末。每服一劑。日二三服。

鴛鴦煎散 同服前方熱已忒而痛未止者宜兼用此方。見

疾瘥

壯元飲 同治前症熱勢已衰而腫痛未止或熱痛已退遍

身發疹而無餘證。精力不脫者。或肢體浮腫者。皆宜連

進之。方見瘥

四物茶蘆飲 同主治同前

紫葢舍利別 二錢 山蒼菜露 錢十六

接骨木花露

六錢

葉片酒石液

五錢

右攪勻。一時服二匙。

四物接骨飲 同 主治同前

接骨木花露

八錢

山萸菜精

四錢

枸橀汁

十六錢

茶堇舍利別

二十錢

右攪勻。一時半服。二匙。或用解凝醬子。共見亦好。

二物化痰散 同 治聖京健。咳嗽。痰涎壅盛。難咯出者。

結爾茂斯密涅刺列 一匙 砂糖 十

右二味為末服之於一二時。

五物清肺飲 同 治前症

安沒尾 五加膠 原書脫

雞子黃 二錢

海葱蜜 十六錢

霸王鹽 一錢

苗香露 六錢

右五味攪和。一時服二匙。或與三物導痰飲。洋葵清燥

湯亦佳。

四根飲 同 治熱聖京健。疼痛已止。而疲勞不復。動作不隨

羸弱。日加着。

苗香根 西松百爾第根 洋芥根

甘草 各八錢

右四味湯泡溫服。

大蓼飲 同治前症。

大蓼 甘草各八錢

右二味湯泡溫服。

碎米山萸膏子 治前症。

浮酒石 三錢 碎米薺醬

山萸菜醬 各十錢

右三味調勻。一時午服。一小匙。或選用四物接骨飲。見

壯元飲。龍匾瓜子乳。匾挑醬。三方見四物茶薑飲。分消

飲。大力甘草飲。解凝石鯨丸。三物通爾尼加飲。鴛鴦煎

散。解薺醬。加味健胃飲。以上八方亦好。

酒石粟接飲 同而症。脉晝平夜數。血蒸肌熱口渴引飲。食

不進者。宜選用以方。或洋葵清燥湯。蝟蛄消石散。以上三方

見洋葵甘草湯。洋葵甘草飲。以上二方輩。鎮定血熱。

乳清飲 同治前症。殊效。

乳清

右一味。半時或一時服。一盃。

幾那撒爾非亞膏子 同前症服酒石粟接飲輩後。諸症稍

退。而精力未復者。宜久服之。

幾那末錢四 撒爾非亞醬錢十二

右二味和撒爾非亞合利別一時服一茶匙或用防膏

幾那飲三物幾那飲二方亦好藏盛熱

四物魚鱗湯薄治聖京健或瘡疹發於血液腐敗又治癩

毒肢體羸弱者

粘兔鬚錢二十 扑蜜福烏篤錢八 薩撒弗刺斯錢四

甘草錢三

右四味以水一升九合二勺先煮上二味至六合四勺

內餘藥一沸去滓溫服日盡劑

大力瓦刺蘊湯伊治伊屈篤聖京健肩背痛腰膝痛年氣脚氣頑癬惡瘡

牛旁根 瓦刺蘊根各四十

右二味水煎取一升二合濾過更加接骨木子醬四十

四錢礬酒石四錢和勻服

和胸湯壽聖京健初起惡寒發熱煩渴一二日遍身骨節

走注疼痛而赤腫者宜先刺尺澤放血八十錢次與以

湯

大棗錢七分 無漏子錢四分 原名達埤連按和

曰。麻。蘇。察。及。淋。雨。杜。瓦。爾。皆。謂。之。苦。常。藥。又。李。時。珍。曰。無。漏。子。香。名。苦。魯。麻。東。且。其。所。說。形。狀。性。功。亦。與。違。埋。連。相。符。契。故。今。斷。充。以。

無花果 乾葡萄

精大麥 各三錢 甘草 一錢 石長生 九分

右七味以水一升煮取七合二勺。瀝去滓。溫服。無用散

薺蕪見下熨痛處

乳麥飲同 主治同前

甘乳汁不拘 大麥煎汁四分

右調勻服

寧神飲同 治熱聖京健寒熱往來。骨節疼痛。不得睡

消石 一錢 蜚蛄石 二錢 洋葵舍利別 八錢

大麥煎汁 八錢

右四味攪勻。一時服。二匙。隨服。三擅飲。一盃。翌日。每施。

緩和尊。見熾。成熱

三擅飲同 治前症

薩撒弗刺斯 十六錢 白擅 赤擅

黃擅 各二錢 甘草 八錢

右細剉。湯泡。溫服。二茶鍾。日三。

一物石鹼丸同 治熱聖京健寒熱已止。疼痛仍游走者。

石鹼

右一味為丸服五分隨服三椀飲二盃

散鬱蒸同熱聖京健越三日而寒熱疼痛未止者宜放血

更用以藥熨之

加密列花

洋葵各三錢

五種緩和草十二錢

胡盧巴

亞麻仁各二錢

石鹼十六錢

右以水煮四味取九合六勺下石鹼煇消蘸綿布熨痛

處

宜腸旃那飲同治熱聖京健宜當四日停寧神飲三椀飲

而用以飲子取下

旃那六錢

別篤尼加重寡微加葉二錢

落葉松寄生錢

酸角四錢

右四味水煎一刻取四勺濾去滓更加莎乙結列伊舍

利別四錢和勻頓服當夜用定痛飲見瘡

洋葵膏同治聖京健毒留而不移關節木梗者宜先以温

湯熨其部而後徐徐擦以膏見方

熱聖京健痛紅腫不消散者宜蜈針同

聖京丹 同治寒聖京健痲瘋者有良効。

玫瑰醬

錢十六

鈔石朱

錢十二

扑蜜福烏篤膠末

錢八

右三味生姜合利別調之與一茶匙日二次。

和血湯 微治寒聖京健宜以方清稀血液甘和酷厲。

牛旁根

若數冬根 二十四錢

消石 五分

右以水一升先煮牛旁一刻下消石煇盡去滓温服。

加味酒石散 同服前方四五日用以方取大効方見瘡疾

三物石鹼丸 同寒聖京健痛諸藥無驗經久不愈者宜以

方方越越蒸蒸氣氣

石鹼

錢六

蒲公英煎膏

錢一分

安沒尼

重加膠

五分

右三味石長生舍利別調之每一錢作二十九丸接骨木

花飲送下太良。

芥子乳清飲 蒲治寒聖京健痛調砂糖少許服之方見神經熱

白芥子散 同治前症。

白芥子

右一味為末每服一匙稀葡萄酒或水一盃雙服日二

三次

睡菜飲 同治前症

睡菜

右泡葡萄酒或麥酒飲之

軍將散 微聖京健療之血質復故寒熱已去胃機健運大

便自調肌膚潤澤患處無熱而疼痛仍不解者宜服以

方臨卧以葛兩隔飲一二盃服的里亞加肉豆蔻大以

助發汗又將綿布蘸五味錦葵飲敷痛處良效方見前

神驗膏 蒲治聖京健其痛重者不移者

趨謨膏 錢八

天冬膏 錢二

右二膏上文火俟溶化以柔革攤之貼患處溼青膏亦佳。

芫菁丁 同療聖京健痛百治不驗者

芫菁末 錢十六

右一味以燒酒百二十八錢淹二三日瀝去滓塗患處角筒子亦有驗。

溫泉水 同治聖京健痛頑固不愈內服外用並神効灌海水或河水亦得。

膝痛痲瘋不愈者。宜角筒子。於患處。余膏治膝痛經久。百方不効者。角筒子七八次。不日全愈。

天灸膏。聖京健痛。固看腰膝肩背等者。宜貼之。痛處。俟

發泡刺破出水。隨敷官粉膏。愈瘡口。如此數回。至痛全

止。

灰蜜膏。治膝痛神効。

石灰 蜂蜜

右二味搜和成硬膏。貼患處。塗卵油亦良。

止痛膏。花治膝痛甚妙。

醋十六 龍骨木脂二 的列並底那 勿搗茶產 適宜

右煉為膏貼患處。

白蜜驗方。福治膝痛深重者。

白蜜八 的列並底那精二

右二味攪勻。朝夕服二卯匙。

鎮痛熨。吳治聖京健毒留神經之支別而疼痛者。

的列並底那油二 燒酒四

急製礪砂精一

右攪勻。用綿布蘸之。敷患處。發赤色。痛乃止。

定痛油 微治前症

拔兩撒摩非他 屈里跋安油

右二味調勻塗痛處日二三次

毛薑湯 微治寒聖京健痛難愈者神效

石毛薑 山慈姑 牛旁根

粘魚鬚 各三十錢 朴窟福烏篤 八錢

右細剉以水三升五合葡萄酒一升二合淹一宿以慢火煎一時平瀝過取滓和水二升四合葡萄酒八合煎之又取滓依前煎之去滓俟初煎二煎溫服之外塗定

痛油殊效

逐瘀水 伊治聖京健痛久不愈者其他諸病發於惡液而

其治宜發汗者皆用此方

接骨木花露 九十錢 接骨木子醬 十二錢

朴窟福烏篤膠 四錢 牙皂樹膠水 適宜○四味調勻 朝夕服二三匙

聖京丸 伊治聖京健痛經久不差者

朴窟福烏篤膠 一錢 白石鹼 四錢

右為末滴水勻之每一錢作二十九丸甘草末若銀箔為

衣服六丸至八丸日二三次

樟腦洗伊治聖京健痛及拍挫打撲損傷麻痺不遂

樟腦精錢八 琥珀油錢 加牙布德油各二錢

硝砂加石灰精錢四

右調勻洗患處日二三次

加味大力湯蘇伊恆篤及聖京健痛初起不劇且無熱者
病人無所太苦不敢為意調治失機遂至疼痛劇甚毒
氣凝結而舉動艱難積年不愈以委因于胃寒或飲未
熟酒或固有酷厲液也內外皆勿用熱藥宜委服此湯
或大力甘草飲今消飲四味健胃飲等朝夕以溫布摩

患處隨傳石酸膏以上四方見瘡疾

酒石茉莉散同用前方數日後宜屢與此方或二物大黃

散霸王飲三物飲等下之以上四方見熾盛熱

解凝醬子同治前症併服四味健胃飲殊效又治脘痛久

劇者委不須他藥愈

霸王鹽錢三 紫茉莉錢五分

紫堇醬各二錢 碎米薺醬各十錢

右四物加五種閱壅根舍利別和勻一時半服一茶匙

逐痰丸同前症諸藥不驗者久服之必效

芥葉鉤吻煎膏

錢四

加篤兒丸料

錢一

右二味調勻。每一錢作二十丸。服三九。日三次。

石鹼鉤吻丸 同主治同前

勿搗茶石鹼

芥葉鉤吻煎膏

錢各四

右二味調勻。每一錢作二十丸。服三九。日三次。

加味石鹼鉤吻丸 同主治同前

即石鹼鉤吻丸加大黃二錢。用茶堇舍利別調之。每一

錢作二十丸。服三四九。日三次。與鴛鴦煎散亦佳。

瓦刺微阿刺酒 同寒粘液家患前症者。此方最效。

瓦刺微阿刺批

錢二

右搗爛葡萄酒淹一時。取九十六錢。去滓。一時服一盃。

瓦刺微阿刺散 同主治同前

瓦刺微阿刺根

分五

右為末。頓服。若無效。停之。唯貼天冬膏治之。

定痛排毒丸 吳伊偃篤之為病。其痛着於四肢。而多不在

關節。皮色不變。無寒熱。且不如熱。聖京健脚跟痛之觸

之。輒加其痛。患處漸枯細。起止乏力。痛不移處。或游走

不定。或已差而復發。無時。要之。多發於濕冷之候。若歷

年不愈則潛攻藏府令人死治法宜防過神經液敗腐而漸從蒸氣排泄之以方主之

的列並底那

石鹼勿搗茶產各二錢

乳香

蘇合香各二錢

良姜末錢一

按爾撒摩字露錢一

右先取的列並和石鹼徐煮至粘凝內錄藥和勻每錢作十五丸若軟不可丸和鹿角灰作丸加薩撒油數滴以橙皮末為衣尤佳服三四丸日三四次久而疼痛漸消身體始健然後仍服此方可半年則莫有殘毒再

崩之患矣

的列並丸 裴伊偃篤者酷厲液之所致初起紫發大趾留著膝膝足跗或手盤疼痛不可堪甚者腫焮結核中實石灰狀物及歷年按破而其物自出治之假令似有少差蒸氣過閉小水不利則必復發宜用此方

的列並底那勿搗茶產

右一味丸如黎豆大且暮服二三丸

解凝定痛膏同 療伊偃篤腫痛不可忍

鉛丹

官粉

石鹼各八錢

阿利襪油

錢十六

家猪脂 阿芙蓉 各一錢

右煉成膏貼患處。

丁子木香圓 同治伊屈篤痛有良効。

丁子 木香 生姜 胡瓜子 各一錢

山慈姑 質汗沒奴護 各二錢

右六味為細末入蕃薇蜜和勻朝夕服肉豆蔻大至汗

叢大便下。

散毒慰 同治伊屈篤痛因稠厚液者。

樟腦精 九錢 阿利襪油 二錢

右攪勻為慰藥。

治伊屈篤宜用綿布蘸石鹼水敷之痛處無遺手脚強急之患妙。同

伊屈篤患處軟漫腫破者宜用綿布蘸葡萄酒敷之。同

甘汞茉莉散 伊屈篤者肢節疼痛紅腫累々結核其叢

不必定期其在手謂之手氣在跗謂之跗痛在脗謂之

脗痛此之熱聖京健以其痛留而不移為異也宜當叢

時用此方取下。

甘汞 半錢 紫茉莉脂 一分 礪砂 五分

西醫西藥 聖京健 伊屈篤

丁子油滴四

右細末

鉛丹醋同治伊屈篤疼痛不可堪。

鉛丹二錢 醋百九十錢

右攪勻敷痛處。

搗烏連勃爾孤膏同療伊屈篤疼痛如獸咬者。

阿利襪油二百四十錢 石鹼勿搗茶產三十二錢

官粉各九十錢 樟腦四十錢

右煉為膏貼患處。

酒乳清蒲治伊屈篤發時宜用之飲血熱徐々發汗或取

含油揮發鹽若鹿角精一茶匙酒乳清變服日二次亦佳。

治伊屈篤疼痛甚不能睡者當夕與阿芙蓉液三四十滴同

托歇爾私散孟伊治伊屈篤熱聖京健腰膝痛積年不痊者

下後與之此治熱聖京健寒熱已太疼痛久不已孟

乙百葛 阿芙蓉各一 礬酒石若芒浦一分五厘

右三味末之臨臥白湯少許點服此方大發汗故或名托歇爾私發汗散須

臨期製之久久
貯功力脫

洋葵清燥湯 同 聖京健毒內陷腹中大痛熱持久者治法

同焮腫熱若痛熱甚者宜與此湯或接骨錦葵飲洋葵

甘草飲大力甘草飲輩稀解其毒而發於汗或利於小

便兼施中緩和導上便秘者最應又宜當毒之所著處中行

氣泥或貼天灸膏引其毒又治伊偃篤毒侵肺氣急息

迫者心是也按脚氣衝

加味大力湯 同 主治同前又聖京健痛肢節腫起倏忽消

散呼吸促迫或昏睡不省者多死宜急貼天灸膏於項

腸敷行導法且服此湯分消飲導水飲三方共見瘡疾亦可

聖京健痛肢節腫起忽退氣急息迫昏睡不省人事者不

可救也若更轉處發一腫按之濯々者內有黃粘水也

宜速用披針當頭熨破出毒水以綿撒絲扎住四五日

更蘸芥葉鉤吻煎汁如前日四次至水盡瘡口愈以法

甚良勿擔閣不施恐內攻焉

西醫方選卷二 終

西醫方選卷三目錄

痘瘡

加味接骨飲

乳餅泥

乳水湯

墨粟薩飲

加味大麥飲

加味扁桃乳

加味里木那堊

加味燕餅湯

酸消甘露湯

乳清導

清爽飲

加味硫堇醬

大黃桂露飲

幾那煎

消石酸汁飲

定吐飲

大黃漿

芙蓉楹葶膏

拘櫟飲

水酒各半飲

皂樹膠飲

西醫方選

卷二

四十九

芥子泥九

清明水同

龍消散同

加味墨栗薩飲十

加味乳清飲同

大麥加醋湯十一

大麥加酒湯同

乳蜜導同

潤腸飲同

清涼含嗽水十二

阿芙蓉液同

酸角排膿湯十三

清濁水同

接骨蓄薇水十四

淨穢水同

神驗幾那飲同

三物接花飲十五

舍乃我魯蕪丸同

鎮痛三物飲同

鎮痛壯神丸十六

加味麗春花飲同

四物鎮痛飲同

乳煎皂膠飲十七

利毒飲十八

排膿飲同

梅肉加黃糖湯十九

幾那散同

蒸餅泥同

白頭翁散二十

鉤吻煎丸同

逐痰丸止

麻疹

白散止

魚鬚甘葵湯同

走馬圓廿二

獨神散同

桃油卵黃圓同

鎮痛芙蓉飲廿三

作列布湯同

麥挑卵黃圓同

二物飲同

羊乳苾苳水廿四

鯨腦散同

桃油糖同

龍桃乳同

麝香散廿五

百合湯同

寬胸飲廿六

單將散廿七

芙蓉油同

清肺圓 廿

導痰飲 廿

薑蘘乳 同

玉睛膏 三

賊骨糖 同

黃消散 同

鹿角魚鬚湯 廿一

薑餅湯 同

墨栗薩飲 同

寧神飲 同

酪水導 同

丹毒 附火丹纏腰丹

消石接骨圓

大黃消石散

加味大麥煎

茅苡飲

五味林擒飲

宜母薑蘘飲

三味蜜陀水

薑蘘飲

石鹼布

梅肉酒石湯

芳草囊

空青膏 廿七

空青散 同

散毒囊 同

鈎吻漿 廿八

四味接骨飲 同

三味質汗散 廿九

酒石碎菴醬 同

蜜陀水 同

雙粉囊 四十

石脂樟腦散 同

解肌湯 同

熾盛 瓦刺 獲酸 模湯 見 羣 必勿 厚覆 衣被 以溫 蒸之 若 熱壯者 須從 熾盛熱 治法

加味接骨飲 微 痘瘡初熱之時 宜數行 湯脚 引降血氣 而 與 坎方 或大麥消石湯 區挑蘆子乳 輩殊效

接骨木花飲

乳汁 各等

右二味調勻溫服 或代接骨木花 以菩提樹花 亦佳

痘瘡發熱之初 必當行 湯脚 能使 痘易發 而不 多於 頭面 微

乳餅泥 扶 痘瘡 壯熱不解 或發難透 其毒攻 頭腦 胸肺

者 宜作 溫湯 浸身 片子時 次敷 以泥 於足心

乳汁 燕餅

右二物和勻 如泥 聽用

初熱時 頭疼重 不已者 宜敷 酸泥子 於足心 朝暮行 湯脚

法 以至 見點 獲

乳水湯 同 痘瘡發熱 一身如 炮越 五六日 點未形 見者

急作 坎湯 盛以 浴斛 使病人 沒至 胸下 迺有 良効 此余

屢所 歷驗 行之 勿疑 扶 起脹貫 膿之期 頭面 肢體 腫痛

或眼封 不能 開者 便取 海綿 蘸以 湯一 二時 以慰 患處

氏養小兒脆弱。初熱之時。小水熱而少者。宜內服。此率

乳汁 温湯

右二物調勻。乘温用之。

墨粟薩飲蒲初熱時須與清凉劑。此方主之。

墨粟薩

右一味湯泡温服。

加味大麥飲卒痘瘡初熱。其人素血實者。宜用此代平飲。

大麥煎汁

枸椽汁若浮酒石

蜂蜜許少

右三物調勻。酸甘適口為度。

加味扁挑乳同初熱時。兒體虛弱者。宜此方。

稀扁挑乳大

桂露許少

右調勻服。

加味里母那垵同主治同前

里母那垵大

葡萄酒許少

右調勻服。

加味蒸餅湯同主治同前

蒸餅湯

酸柘榴舍利別

右調勻服。

酸消甘露湯 同治初熱如烙煩悶不得眠驚搐發瘰大便不通或放點而顆粒稠密身體燔熱口渴煩躁或貫膿而疱色橘黃脈洪大血實者

酸角 八錢

消石 五分

甘露蜜 十六錢

右二味以水八勺煮片時和甘露布過兒二歲以下與二匙以上與三匙一時不知再與之其最穉弱不可服本方者止與甘露蜜少許或施導方

痘出熱解者為順不必藥也如熱劇者不問其兒強弱宜與酸消甘露湯見上或清葵飲見下并施乳清導同

乳清導

同

治初熱壯盛驚搐不已者頻々施之兼角筒子

又見熨前後腰疼脊痛肚腹疼痛者宜刺絡而施以兼以微溫湯浸脚或以溫乳汁熨腰並良驗

乳清

脫分量

蜂蜜 一匙

阿利襪油

二匙

食鹽 撮

右先取乳清與蜜同煮和餘藥日用之

清葵飲 卒 痘前及放點前後烈熱如熾或鼻紅咳血氣息促急者並宜以此方爽神清氣又痘膿內陷侵頭腦謔言錯語眼目蒙昧血液涌沸發搐者宜刺絡而貼芫菁膏

於腓腸隨與此藥每一時行乳清導見前又腹內攻胸肺氣急急迫心中懊懣脉堅實者先刺絡與酸消甘露湯施下導法而用此飲第一時與屋失蔑兒一二茶匙且溫醋和水令吸其氣至胸中覺快而足心貼芥子泥時貼芫菁膏皆妙。

大麥煎汁

董茅舍利別

各四十錢

硫黃精

二錢至四錢

右三物攪勻每半時與一小盃

緩下導蒲痘疹初熱時發搐者勿怖多屬順症也宜此方

導大便且施湯脚發搐久不已者貼天冬膏於肩背殊

効

初熱時頭痛惡心嘔逆便秘者宜下導方蘇微

初熱之時頭痛如破久不止或膿熱壯盛脉堅實精神昏

積呼吸不利者宜傳酸泥子見熾盛熱於足心朝夕施湯脚

法以五痘出

大麥消石湯微治初熱甚脉堅頭疼腰痛宜放血次與匾

挑蓋子乳方見熾盛熱越一時又施導方而後仍施之日二

三次以湯又治膿熱

加味疏薑膏 同初熱甚前方無効者宜以此方又治膿熱壯烈者

疏薑膏 一匙方見 熾盛熱 大麥煎汁 一盃

右攪勻每半時或一時服之痘出熱減則減服量

清涼宜腸飲 吳病者不問長幼其質強實初熱放點之際

謔言妄語者以此元運太過腦宮為是擾亂也急宜放血

而與此方或大麥清熱飲酸撲清熱飲 以上三方並効 見熾盛熱

若謔妄發於貫膿時者其毒上攻腦之所致非刺下所

宜也須隨機救之

蒸餅清熱飲 吳痘瘡其人元運太過者宜早圖之殺其勢

以防後害若大便秘結或腸胃有積穢者宜速刺絡而

與此方或清涼宜腸飲 見熾盛熱 輩下之若大便自可腸

胃無穢積者本方去下藥與之

壯元解熱散 同痘瘡不得逐次發過因其元運不及致之

者宜以此方及大麥壯元湯 方見熾盛熱

大黃桂露飲 卒痘瘡小兒虛弱腸中有痰滯者或大便不

通腹堅滿者宜與此方或大黃舍利別 射幾那煎於

肛門

大黃漿

下見

桂露各半

右二物調勻用。

幾那煎同治前症並驚癇拘急不寐。

幾那四錢

右一味乳清或乳汁煎向肚門射之。

消石酸汁飲同治初熱小便不利莖中熱痛者。

消石

酸汁

即枸櫞汁

右攪勻服。

大麥馨清飲獲序熱一身如烙脉弦實者宜放血而與以

方見商或加味梅肉湯見熾取微利又治膿熱如炙脉

弦實呼吸不利神思恍惚謔言錯語者放血行湯脚敷

酸泥子見熾於足心而與以併有奇驗。

加味白帛散同初熱時胃中有停滯者此方吐之又胃中

有宿食瘡攻于内心下痞懣欲吐者急促之躡攔失機

必陷惡症此方主之二仙散乙百葛霸王散擦腦飲並

熾盛亦宜或用加蜜列飲見腹微溫湯等促之亦可

定吐飲辛治初熱時嘔逆者

野艾蒿鹽二錢

井泉水四錢

酒蒸桂露八錢

橙皮舍利別錢十二

右四味先取野艾蒿鹽稍々滴之枸櫞汁至泡沸止為度更下餘藥和勻服一食匙

大黃漿同治初熱時嘔吐不止者又放點前熱壯下利甚者宜以此方但微利者服之却害又大便不通者與此方或酸消甘露湯或菊施乳清導見上方

大黃

右一味水浸出藥味嘔吐輒用二茶匙調龍腦薄荷露一食匙野艾蒿鹽一刀尖服之

芙蓉搗持醬同序熱兒體虛弱大便不通腹堅滿者宜與

大黃舍利別大黃漿輩或施乳清導下之下之反衰憊下利不止者與幾那煎膏不効便用此方

西電法護阿芙蓉液七八 搗持舍利別一茶匙

右二物調勻三四時一服或與皂樹膠飲見施乳灰導

枸櫞飲同序熱時鼻衄者有大害按病人血實而當刺之症偶自衄者由此獲免血熱之猖狂吉而非凶也而以此日有大害者蓋就弱人而謂焉耳急作此方與之

枸櫞汁 井泉水 砂糖

右三物攪勻服。衄甚者，搭蘸醋布于額頂及陰處。或作

銘醋布法銘糖八錢醋四十八錢搭胸上。挿入落葉松

寄生。或礬卵挺子即取礬石末卵白調塗之於鼻中。

霸王飲。初熱時腸有積穢者，當下之。不下必生後患。宜

此方或浮礬酒石散。三物開壅飲元見熾盛熱輩。

水酒各半飲。同治見點時脉沉。意思膠臙。氣力虛脫者。

水 葡萄酒各等分

右調勻溫服。速効。但忌過用。

解肌丹。凡痘由中達外，專輸水液於肌膚。故大便必秘

浚若作泄瀉者，不由風寒外襲，則是毒內攻也。其泄瀉

在貫臙時，寢為凶候。速作此方見感與之。

皂樹膠飲。卒放熨前熱壯，而下利不甚者，止用此方調之。

牙皂樹膠

右一味，沸湯烱消溫服。

芥子泥。同序熱時咽喉腫痛者，先行導法，施熨劑於頸項

隨與清涼劑。敷此泥於足心，頻々漱蜜醋水即取蜜醋和清水者。

奇功。

蒸餅母 芥子末 食鹽

右三味搜和作泥用。見血實者刺絡而後如法。
清明水 同 痘瘡發熱。眼目焮痛者。不問兒強弱用。以此得良
効。

蓄薇露 乳汁

右二物攪勻。數漏眼目。血實者放血。後施之。
龍消散 同 痘瘡熱壯。血實而難發者。以此方主之。

龍腦 五消石 分

右二味與砂糖同研末。每二時。淹茶送下。刺絡貼天灸
膏。頂及肘脚。而後用之。

起脹貫膿之時不能眠者。當取嬰粟舍利別。每二三時與
之。小兒一茶匙。大人一常匙。蒲

加味墨粟薩飲 痘瘡脈微弱。面顏蒼白。精力虛脫。或昏
悶譫妄。次致疱色淡白。或卒然陷沒。肌膚寬軟。四肢厥
冷者。當以此方內托之。但禁溫覆服。以痘復漸起。脈得浮
強乃停後服。

墨粟薩露 八錢 十 挂舍利別 八錢

忽弗滿止痛液 一錢

右三味調勻服。撰用加味芸香飲。加味羌活飲。芸香開

瘰飲。龍腦。喇。蛄。散。四味。龍腦。飲。龍。匾。瓜。子。乳。並見熾亦

佳。
加味乳清飲。同。痘不全。起脹。其色。赭黑。隙地。淺綠。而。縐。萎。

者。或。痘。忽。然。倒。陷。色。或。黑。或。深。墨。小。便。帶。黑。或。如。血。漿。

或。惡。臭。撲。鼻。者。速。撰。用。此。方。及。幾。那。石。鹽。湯。大。麥。礬。精。

飲。三。物。幾。那。飲。四。物。幾。那。飲。乳。清。酒。五方見防。腐。芸。香。

飲。幾。那。芸。香。飲。二方見熾。助。元。氣。過。敗。腐。

乳清 百九十錢 綠礬精 若格實溫 二十錢

右三物攪勻。半時服。半盃。如元氣虛脫者。貼天灸膏。

大麥加醋湯 同 治前症

大麥煎汁 二百四十錢 醋 十六錢 砂糖 八錢

右攪勻。時服。一茶鐘。

大麥加酒湯 同 治前症。

大麥煎汁 二百四十錢 葡萄酒 二十錢

右調勻。時服。一茶鐘。

乳蜜導 微 痘瘡。八九日。大便不通。鬱蓄腸中。則漸變惡厲。

其氣侵入血中。而發之。焮熱。以疊出惡症也。但速以此方

導大便。

牛乳汁

蜂蜜

食鹽

油

右四物攪勻。每三四日向肛門射之。

潤腸飲 同治前症及痘面部半已乾。年未乾者。宜以此方順利大便。

甘露蜜

十六錢

凝水石

四錢

右二味。調沸湯八勺。瀝過分服之。若無甘露蜜。即用旃那二錢。消石五分代之。

痘瘡。小便淋瀝隆閉者。令病人從容步履為佳。若不痊。取甘消石精一茶匙。和常飲服之。必效。

清涼含嗽水 同治痘瘡。口舌乾燥。有胎者。

清水

蜜 各

醋 少

右調勻。頻々嗽之。

貫膿時熱壯血實者。宜酸消甘露湯。見服之。其熱減則用。

清爽飲。見送下。幾那煎膏。大佳。

阿芙蓉液。痘灌膿而發熱者。名曰膿熱。當以此時。必勿刺。

下之。如誤犯之。害不旋踵。只須與以液。以和氣血。安睡。

眠。

阿芙蓉

純粹者不拘多少

右一味用燒酒量必八倍烱盡之阿芙蓉每一時或一時半大

麥煎汁送下一滴至四滴或用白罌粟舍利別亦可

膿熱已止疮劇痛而不能眠者朝夕與阿芙蓉劑少許或

刺絡與清下劑且用之各有速効卒

大麥海葱飲同痘瘡塌陷而面腫消者為膿入血中危症

也須急貼天灸膏於肘脚以引膿水且用乳汁煮緩和

藥麥亞類敷之足心次與此飲利其小便兼射乳清導

於肛門印大交湯如

膿熱時其脉實數肌熱如火呼吸促迫及有胸焮腫之諸

候者必可刺絡

酸角排膿湯 卒痘瘡稠密膿侵入脉絡則必發壯熱如熱

越二日未解即令臟腑血液生敗壞設令其熱似暫歇

至收靨初勢必復振更逞肆虐肌膚如燔夜卧不寧煩

燥苦悶肢體困倦精力虛脫四肢顫掉筋肉惕憊神識

昏憤或發赤疹大便臭穢不可當其毒漸蝕爛臟腑或

鼻衄或吐血或尿血遍體冷汗發搐痲癢者難救也但

須排膿托裏過劑以期生於萬一焉若面頰焮熱腫脹

口流涎唾者以佳兆也速射幾那煎於肛中或與鉅硫

散利大便以得熱減便多服幾那膏第取大麥湯加浮
 酒石與之至十一二月面頰嫩腫退腕手隨熱脹者益
 佳調治得所則幸獲活路若反之腕手不啻不熱脹未
 曾毫灌膿加之發腐敗熱而呼吸短促煩悶不能眠者
 不可保其不死也宜急放血而與此方下之

酸角

甘露蜜

浮酒石

右三物水煎溫服。

清濁水同 痘瘡。唾涎稠粘膠着咽喉者。此方治之。

蘿蔔汁大

蜂蜜

消石錠小

右三物調勻頻々嗽之神驗。

接骨薔薇水薔 治貫膿時涎唾稠粘難咯出者。

接骨木花露

百四十

薔薇蜜

董菜舍利別

各十

右四物攪勻屢含嗽之甚佳。

淨穢水同 治痘瘡涎唾惡厲蝕爛口內或生細瘡者最效。

接骨木花露

百四十

薔薇蜜

桑椹舍利別

各十

岩蓮華汁

三十

右四物調勻漱之。

痘瘡其人稠粘液堆着於口舌咽喉漸々厚硬遂作痂狀
鼻窒呼吸不利飲食難下者宜作乳水湯漱之或喻入
湯氣於口鼻竝太佳

酸泥子微痘瘡面腫頰脹最甚者敷此泥於足心方見熾盛

神驗幾那飲蒲治痘瘡其膿稀淡作水疱或平塌內含清
漿者及隙地紫黑或內陷發諸險症者竝有奇驗

幾那末二

桂露錢八

橙汁舍利別

若拘櫟舍利別十六錢

右先取幾那調水八勺次下桂露舍利別更加綠礬精
少許和勻服小兒每半時一匙大人三四匙兼取葡萄
酒加綠礬精若醋若拘櫟汁時與之効如神

天冬膏同痘瘡未行漿倏忽內陷者多為初起用熱藥急
發之或厚覆以蘊蒸之所誤也宜傳以膏於踝上內服
強心劑又治膿熱精神昏冒痘暴變脫白四肢厥冷者
蘇氏又痘膿潛逆於腦者貼之脚內服麝香糖即取麝香
和白糖適
宜者悉有連驗亦其兼筋惕肉瞤者用之殊妙辛

三物接花飲微治痘暴內陷者兼貼芫菁膏於腓腸尤佳

接骨木花握一 依促布握半 蜂蜜四錢

右先以沸湯八合泡過二味即入蜜和勻溫服。

芙蓉蜘蛛散蘇 痘家睡寐不寧者不拘日期用此方即效。

舍乃我魯蘘丸同 治前症最妙。

沒藥六錢 薰陸若乳香五錢 舍乃我魯蘘根四錢

非阿斯合亞 護子 阿芙蓉各四錢

撒法耶葛私 篤樓 護各一分 錢

右七味末用蘘搗易多 舍利別每 一錢作二十九夕 服

之區桃 將曾 亦可。

鎮痛三物飲同 方貫膿時晝夜煩燥不能眠腹中急痛或

發搐搦脉不弦不堅血液妄行者須對症製藥必兼以

飲用之。

若格實溫八錢 麗春花露三錢 阿芙蓉液十滴

右三物攪勻不問晝夜半時服一匙 凡催睡藥者法宜

機不可抹守常格以失其 故只不問晝夜而已

鎮痲壯神丸同 主治同前

消石二錢 若格實溫十二錢 菩提樹花露五錢

右三物攪勻半時服二匙

加味麗春花飲 同 主治同前

麗春花露

六十四錢

若格實溫

十二錢

綠蓉精

十五滴

右三物攪勻。半時服二匙。

四物鎮癩飲 同 痘瘡八九日。其色深墨。隙地寬軟而澹白。

或帶淺綠。脉微弱。面色乍赤乍青。手足且溫且冷。肢體

痠癢者。此方定妙。

墨栗薩露

二十四錢

桂露

若格實溫

各八錢

阿芙蓉液

四十滴

右四味攪勻。一時或一時半服二匙。阿芙蓉液。鎮癩壯

神飲。鎮瘰三物飲。亦可撰用。或加味麗春花飲。加阿芙蓉

液八九滴。以與之。並有良効。若服此輩。而諸症解嚴。精

力微振。日奏善兆者。晝間停服。唯夕與之。或撰用。匾挑

醬。舍乃我魯蘊丸。芙蓉刺蝟散。並見輩。以策全愈。凡壯

輩咸於神經。易觸覺者。固為不可缺之要藥。然服之。以

致煩燥。悶亂。血液湧騰。一身瘙痒。不可堪等症。間亦有

之。預察諸未萌。而勿妄投。以開禍端。

凡痘瘡。由恐駭念憂等。俄然內陷。熱壯。脉弦。症漸于危殆。

者須與稀血之飲劑即加味梅肉湯且納新氣於室中能使其痘復發起如無驗者即刺絡行導法必應切禁熱藥及溫覆

乳煎皂膠飲平治膿傳腹中下利甚者先與阿芙蓉液十滴許貼天冬膏於腓腸而用此

牙皂樹膠

右一味乳汁煎溫服

兒體脫弱貫膿時咳嗽甚或膿陷腹中而下利者阿芙蓉液乳汁並妙

加味大麥湯穰叔屬時發熱如焚而見毒飲治表傳裏之

候者宜急放血而女服此湯見熾撰用瓦刺藜酸摸湯

見洋葵清燥湯接骨清涼飲三物洋葵湯加味梅肉湯

共見熾加味乳清飲見大麥黎精飲見膏酒石散見聖

亦得隔一二日兼用霸王飲三物關蠶飲並見熾輩或

行下導方

痘毒衝攻頭腦謬妄搖掣者宜貼天冬膏於臑膊數更換

之或傳降氣泥前於足心以洩其毒

利毒飲同叔屬時熱壯尿脚如膿汁者正氣欲祛其毒也

宜撰用此方。及導水飲。分消飲。二方見癰利其小水扶正逐邪

墨栗薩露 四十錢

紫堇舍利別 二十錢

葉片酒石 二錢

右三味調勻。一時服。一盃。

排膿飲 同主治同前

喇蛄石

醋 各四錢

洋葵舍利別

若格實溫 各八錢

茴香露 四十錢

葉片酒石液 二錢

甘消石精 二分五厘

右七味攪和。一時服。二匙。

收屬時。咳嗽吐痰者。與洋葵清燥湯。四物導痰圓。五物導

痰飲。

共見熾盛熱

二物化痰飲。

是聖京健

輩治之。

收屬時。頑咳不已者。先與鈷硫乳。疎決一番。次取洋葵舍

利別。和阿芙蓉液。二三滴。與之用。嬰粟舍利別。三四錢。

亦宜。一二日。後停之。復與鈷硫乳。如此數回。甚效。卒

梅肉加黃糖湯。蒲凡痘已脫。痂者。當緩下之。宜此方。

梅肉 大

大黃

洋糖 各小

旃那 大

右四味。水煎。溫服。一法。夕與將軍散。次早用茉莉散。並

味作未者 各白湯送下。八黍至二十黍。

幾那散 平 収 屬 時 膿 傳 血 中 以 侵 肺 遂 變 勞 瘵 者 徃 々 有 之 當 此 方 非 膿 逐 痰 。

幾那末

右一味。乳汁送下。時々停此。與銻硫乳見下之點服綠 礬精於平飲則益佳。

痘後咳嗽短氣。係陷勞瘵者。宜驢乳汁。余屢用之。獲神驗。
蒲

燕銻泥 平 治 痘 瘡 眼 目 焮 痛 者 。

白燕餅

右將乳汁煮如泥。敷眼上。或滴入温乳汁亦妙。

洋葵甘草湯 藥 痘毒攢於關節而焮腫。指力不脫。脉弦者。

或毒上攻眼目。焮赤腫痛者。並宜刺下之。而與此方見

以平厲。屢屢乳清飲。見聖 加味大力湯。大力甘草飲。見

疾亦可簡採。各有主功。

接骨木子醬 同 治前症最驗。取四五兩。適宜分服之。以取

微利。六七日乃愈。製法見今日方

白頭翁散 同 痘後眼痛久不差。或生翳膜者。宜此方。與洋

葵甘草飲

見癩

加味大麥湯

見癩

乳清飲

見聖

輩相間服

久々必效

白頭翁煎膏

錢一

麻屈擲失亞尼篤利

錢六

右二味作末服一刀尖日三次

鉤吻煎丸

同治

痘後餘毒攢着關節或發惡瘡或發腐骨

疽或脚足疼痛者

芥葉鉤吻煎膏

錢四

右一味每一錢作二十九丸服三九日三四次

大蓼飲

同治

前症

方見聖

逐癩丸 同治前症

麻疹附丹疹粟疹

接骨錦葵飲 接骨初熱不劇胸煩不甚者順症也宜作

此飲

見癩

或洋葵甘草湯

見癩

頻々與之

喇咕消石散 同治 麻疹初熱劇渴甚服接骨錦葵飲輩無驗

者宜以散及消石粟接飲浮蓉酒石散接骨清涼飲四

物導痰圓加味大麥湯洋葵清燥湯

方見

瓦剌酸

摸湯

見癩

白散 蓬 麻疹初起不可妄下之若下之蒸氣不能表達也

宜此方發之

汗鉅石

右一味白湯送下。

魚鬚甘葵湯

治麻疹宜代平飲。

粘魚鬚

洋葵

甘草

右三味湯泡溫服。接骨木花飲亦好。

酸消甘露湯

麻疹初熱如烙其人強壯者當放血而用

此方見瘡下之治疹乾白者有良驗。

麻疹初熱時數瀆肘脚微溫湯能令發疹不作痒妙。

消石散

同麻疹初熱壯盛每用平飲一盃送下以散見感

一刀尖或取清爽湯見瘡減硫黃精用之亦可。

走馬圓 同麻疹初熱至幾見胃中有停滯者口射入幾那

煎見於肛中隔日用此方吐之。

乙百葛

洋葵舍利別

右二味調勻加密列飲見熾一二口送下。

獨神散 蒲羅麻疹初熱時溫々飲吐口苦舌苔頭暈目眩者。

宜多服微溫湯或加密列飲促之不應者急作此方與

乙百葛五厘

右一味沙糖三分調勻分作三貼先試與一貼俟一刻不知乃復與一貼至三貼莫不効

麻疹初熱劇氣急急迫痰不出者宜刺絡行湯脚能挫熱孰且令疹易出蒲

挑油卵黃圓蕪麻疹未發或已發喉中如刺乾咳不得眠虛憊甚者宜與對症藥兼用以

匾桃油四錢 卵黃一個

右二物入乳鉢內研勻更和若格實溫十二錢數服之

鎮癩芙蓉飲同 主治同前

阿芙蓉一黍 菩提樹花露三十錢

麗春花舍利別八錢

右三物先取花露磨阿芙蓉次下舍利別和勻半時或一時服二七

作列布湯同 主治同前

作列布二錢

右一味搗爛以水多少煮片時取三合六勺更加若格實溫十二錢和勻一時或一時半服一盃鎮癩止痛飲

見聖亦效
京健

麥挑卵黃圓羅治麻疹初熱時咳嗽甚者

卵黃個一 匾挑油 大麥煎汁各十
六錢

洋葵舍利別錢八

右四物先取卵油調了乃下餘藥和勻如乳汁頻々服

一二匙良效取阿芙蓉液六七滴或罌粟舍利別四錢

至八錢和常飲用之亦可

二物飲同微治前症良驗

泡接骨木花湯或泡菩提樹
湯不拘多少 乳汁五
分一

右二味調勻代常飲

麻疹咽喉刺痛喉熱氣息欲窒塞者宜服石榴舍利別一

茶匙傳芥子泥於頸卒

羊乳茶苾水同療前症殊效

山羊乳 茶苾露

右二味調勻頻々嗽之

鯨腦散叔治麻疹咽喉乾燥呼吸不利咳嗽甚者

鯨腦許少 冰糖宜適

右二物和勻服

桃油糖 同 主治同前

匾挑油 匙一小 冰糖 許少

右二物和服

麻疹發血大便秘閉下利嘔吐譫妄不寐拘急等諸症

者治法皆同痘瘡

龍消散 羅痘瘡麻疹熱壯至三四日難發見或已出而忽

沒或夾亦黑斑者並宜此方 見痘瘡

龍挑乳 同 麻疹三四日未出或已出而變灰白者或七日

以後蒸氣難發越者共此方主之

龍腦 分五 匾挑仁 個六 烏兒瑪利亞露 八四 錢 十

沙糖 錢四

右四味研和如乳汁一二時服一茶鐘

麝香散 同 前症用龍挑乳不應者宜此方

麝香 二茶匙 砂糖 一茶匙

右二味研和服一方取海葱蜜二茶匙和常飲爰用之

魚貼天冬膏或芥子泥於脚足當夜與嬰粟含利別八

錢或阿芙蓉液六七滴益妙

麻疹間有俄然攻于內以致危險治法一同熾盛熟篇所

舉粟疹內陷者蘇

麻疹紫黑肌膚緹寬氣息促急煩燥苦悶展側不寧筋惕肉瞤精力虛脫者危險也宜參攷痘瘡及腐敗熱治法急救之同

神驗幾那飲蒲治麻疹色紫黑者宜先取綠蓉精點飲料

與之若腐敗之候益加者與此方見痘瘡

大麥酒石飲微麻疹熱壯脈堅呼吸促迫及其它諸症劇

者宜放血而與以湯見痘瘡或二物飲前

百合湯蓬治麻疹咽喉酸疼乾咳者

牛旁根錢八

粘魚鬚錢四

百合根分五

點失刺護握一

麗春花撮二

白罌粟殼個一

右六味以水一升六合煮取八合去滓加麗春花舍利

別和勻每服一茶鐘

麻疹夜不能眠或下利或咳嗽甚者時與罌粟舍利別二茶匙有奇驗

洋葵清燥湯蘇麻疹已發神志反不爽熱劇呼吸促迫胸

憑喉痛連咳痰不出口渴引飲者以毒侵肺為喉腫之

白雲膏方選

卷三 麻疹

二十一

消石散消石栗接飲並見熾盛熱瓦刺蘇酸模湯見瘡輩與之

或施導方如魚効。謔言妄語者不速料理之。動輒成肺

癭宜貼天冬膏於肺。最有驗。

寬胸飲蓬治麻疹其毒停蓄胸中侵肺以致咳嗽。經久已

愈者妙。

粘魚鬚十六錢

點失刺護葉一握

石長生半握

麗春花二握

右四味以水一升二合。煮取四合。瀉過更和麗春花含

利別八錢。綠礬精五六滴。溫服一小盃。日三四。

單將散本麻疹咳嗽不得眠。下利甚者。法當與嬰粟舍利

別服之。下利仍不止者。朝服此方。夕用催睡藥即嬰粟舍利

阿芙蓉液類而景况依然者。必可放血。立即効。

大黃不拘多少

右一味作末。料病人長幼強弱與之。

芙蓉油蘊麻疹出齊。夜卧不安。咳嗽甚者。宜此方。

阿芙蓉一黍匾挑油若亞麻油八錢

右二味臨卧頓服。與若格實溫八錢。或芙蓉喇蛄散見瘡

挑油卵黃飲上見亦得

加味酸消飲微 麻疹變反白者急用此治之

麻疹微然消散或內陷者速內服葡萄酒或他強心劑外

敷天灸膏于肘脚且用麻布摩擦遍身殊效叔

四物導痰圓蘇 麻疹依期而結痂呼吸利痰易咯熱減者

順症也如痰膠固難咯出者宜選用此方及五物導痰

飲英見 一物化痰飲見聖 輩太佳

浮礬酒石散同 麻疹脫痂則宜與此方取一下越八日而

復下之霸王飲加味梅肉湯三物飲加味酸角湯亦可

選用五方見

加味大麥湯同 麻疹落痂時咳嗽劇胸中如焚氣急息迫

脉堅實身大熱口渴甚者宜先放血而撰用此方及洋

葵清燥湯接骨清涼飲共見熾 洋葵甘草湯洋葵甘草

飲瓦刺 蘊酸模湯共見 瘰癧服之數日熱勢漸減則加本方

以乳汁三分一與之有驗

梅肉加大黃湯蒲 麻疹已落脫則當緩下之宜此方見若

自下利者朝與單將散見夕 與阿芙蓉劑如無效者必

可刺絡

凡麻疹流行之時不問已罹之與不須貼天灸膏以引洩

其毒以法良而無有害。一取白瑞香皮一片每旦貼肘脚亦妙。泥

防膏幾那飲 獲 麻疹後吐膿久不已。日晡潮熱汗出而乃退。每且睡起則疲倦殊甚者。以方加乳汁等分。每半時服半茶鐘。或從肺癰治法處之。

麻疹毒着于肺。乾咳綿延不止。或吐稀痰者。宜撰接骨清涼飲。洋葵清燥湯。輩加乳汁用之。咳極劇者。兼服止痛劑。同方見熾盛熱

清肺圓 平 治麻疹落痂後咳嗽者。

匾桃油

董菜舍利別

各十錢

右二味攪和加水糖少許服一茶匙日數次

幾那散

微

治麻疹餘毒侵肺變為勞瘵若肺癰氣急咳嗽

下利者

服

乳汁亦效

微

麻疹後勞咳不止久吐膿日晡

所潮熱胸膈急迫聲音嘶啞一身虛羸或兼瀉泄者宜

取以散

每一時清水送下太妙

神方見

麻疹後氣急咳嗽喘哮及勞狀具者宜飲鹽乳汁時放血

少許

清。羅氏曰人乳為最驢乳次之

乳水湯 微 疹後乾咳不止舌乾肌燥身熱如燔者法宜令

其人浴溫湯且吸取其氣而服此湯見痘

導痰飲同疹後咳嗽久不止其兒資稟屬粘液質而面白

體豐者宜與此方兼貼天灸膏於腓腸

海葱蜜八錢 泡接骨木花湯四十錢

右二物攪勻服

薔薇乳蓬 治麻疹雙睛嫩赤者

薔薇露 乳汁

右二味調勻微溫以洗眼中且放水蛭於顛顛及眼下
吮血或貼天灸膏於顛顛與下藥竝甚佳

玉睛膏 同 治麻疹三四日熱已解面部落痂但眼中嫩赤

刺痛者

茶苡汁數滴

右和卵白點眼中日二三

賊骨糖 同 治疹後眼中生星翳遮明者

烏賊骨 砂糖各等分

右二物先取烏賊骨稍々滴薔薇露同研末和砂糖點
眼中日二三次

丹疹之為病初候率類麻疹三四日而渾身發疹無數彌

延攢合。幾無有餘地。其疱比麻疹差大而高起。其色如
 猩紅。亦似用赤酒染之。至六七日乃消散。其皮悉做皴
 糠或魚鱗樣。以剥脫也。凡以病之行。雖不別四時。大抵
 於夏晚最居。治法全與麻疹同。但初起易發咽喉
 焮腫。往往有陷咽喉腐爛者。當須彈思救之。以防其變。
 又有。一種發熱三四日。肢體發細疹。其狀如以蕁麻撲
 之。而焮熱癢痒不可堪者。是名蕁麻疹。按此所治法亦
 同麻疹。蕁

黃消散蒲治丹疹熱劇盛者。

消石一

錄

大黃

五

右二味細末。日三服。施緩下導亦宜。

丹疹初起。精神恍惚。或發搐者。先行湯腳法。貼天灸膏於
 項當。夕與嬰粟舍利別。至諸症退。同

丹疹其熱已解者。取下日一二行。有良驗。同

鹿角魚鬚湯蒲粟疹多發於痘瘡。麻疹諸般熱病。婦人產
 後等。或有天行者。治法要徐々發之。必勿用熱藥厚衣
 被。以急發之。平

鹿角屑

粘魚鬚

各十

右二味以水一升三合，煮去滓，加砂糖少許，和勻代常飲用之。

蒸餅湯 同 主治同前

蒸餅

右一味，水煎溫服。

墨栗薩飲 同 主治同前

墨栗薩

右一味，湯泡溫服。

天灸膏 同 粟疹，精力虛脫而不快發者，宜內飲葡萄酒外

貼以膏，又治性質虛弱而隨發隨消者，或疹陷沒而攻

頭腦者，貼以股脚內側。

寧神飲 泥 紀元一千七百三十六年。當我延享元年，粟疹大行，其

證初戰慄，欠伸背痛，神倦，次發壯熱，身體虛脫，不思飲

食，八九日發疹如發斑，煩燥不能臥，謔言錯語，時為放

血所誤，而歸重泉者，比肩隨踵，會有一婦人，膽病頗解

整理，乃製此方與之，兼施酪水導，立得奇効，爾後賴此

以得免鬼簿者，不止數十百人。

井泉水 六合 葡萄酒 醇厚者一合六勺

拘椽汁一個 洋糖四錢

右攪勻。累煎飲之。

酪水導同

牛酪魚鹽者 兩水

右攪勻。向肛門射之。

化斑飲同 粟疹間有敗壞血液者。此方治之。見腐敗熱

丹毒附火丹。纏腰丹。

加味大麥湯。蕪丹毒有初起。憎寒振慄。胸膈苦悶。惡心嘔逆。頭痛不斷。心下絞痛。如刺。次遍身發熱。熇々如焚。大

渴引飲。脉堅實而弦。謔言錯語。呼吸不利。越三四日而

發之者已。發而謔妄止。呼吸利。餘證漸衰者。順也。若諸

症仍滯留不退者。宜多服此湯。或接骨錦葵飲。洋葵清

燥湯。三方見熾盛熱 瓦刺。蘘酸。摸湯。洋葵甘草湯。三方見瘡 輦其脉

堅實而弦者。宜放血。施清涼導。且數行。湯脚法。傳降氣

泥。見熾盛熱 於足心。又丹毒已腫脹。謔語不止。呼吸促迫。而

脉不弱。精力不脫者。亦宜多服之。傳降氣泥於足心。不

驗者。貼天灸膏。二方見熾盛熱 於臍或項。

消石接骨圓同 治丹毒已發。險症漸退。謔妄止。呼吸利者。

宜選用此方及接骨清涼飲。加味梅肉膏。二方見

消石 一錢五分 接骨木子醬 二錢四分

右二味調勻。每服一匙。日四次。接骨錦葵飲一盃送下。

接骨錦葵飲 同治丹毒發數處而無餘症者。服此飲一盃。

日數次。兼接骨木花囊。即取接骨木花囊。或樟腦布。以綿

微樟腦者於患上。不日乃痊。方見

蝮蛇消石散 同治丹毒初起。血液湧沸。不定者。與此方或

接骨清涼飲。日二三。二方見

消石散 微治丹毒寒熱往來。其症輕者。又治其內陷者。用

泡接骨木花湯。送下此散。日三錢。方見

大麥消石湯 同治丹毒熱劇。脉堅弦者。宜先刺絡。施導方。而

多服。以湯。以至熱減。

大黃消石散 蒲治丹毒寒熱。焮痛共劇者。

消石 五分 大黃 一分

右二味細末。白湯送下。

加味大麥煎 卒治丹毒寒熱往來。其症重者。宜先放血。施

緩下導。次用此。

大麥煎汁 浮酒石

右二味攪勻服。

酸消甘露湯 同前症寒熱已解者宜以方取一下次日午

前與浮酒石一錢方見痘瘡

白虎散 微治丹毒延纏不愈温々惡心口舌污穢寒熱不

甚絕無焮腫之候者宜用此方見腐或獨聖散經熱痛

之

硫董膏 同治丹毒吐下後熱仍壯者一時服一匙見熾盛熱

浮蓉酒石散 癩丹毒已解者宜撰用此毒或酒石茉莉散

二物大黃散霸王飲三物飲以上五方見熾盛熱緩下之

解凝石鹼丸 同丹毒輕慢失治或冒風濕而黯赤頑腫者

宜外貼零陵香膏或烏菱泥膏二膏見今日方內用大力甘草

飲見瘡或接骨錦葵飲見熾盛熱下此丸子尤良。

大力甘草飲 同丹毒游走不定者宜先與此飲或接骨錦

葵飲而每三四日用緩下劑其人虛弱者施導方或朝

夕與浮蓉酒石散見熾盛熱順利大便。

柴苡飲 裴治丹毒

柴苡露 四錢 薔薇露 十六錢

宜母子汁

董菜舍利別 各八錢

右攪勻一二時冷服一茶鐘

五味林擒飲外吳主治同前

林擒汁三十錢宜母子汁四十錢

薔薇露十六錢

柘榴汁八錢砂糖四十錢

右五物攪勻服二三兩日數次

宜母薔薇飲同主治同前

薔薇露 宜母子汁各三十錢井泉水九十錢

右三物攪勻和砂糖服之

三味蜜陀水同主治同前

蜜陀僧醋十六錢燒酒拂郎寮

接骨木花露各九十錢

右調勻洗患處

薔薇飲裴主治同前

大麥煎汁百九十錢薔薇露

薔薇舍利別各十錢

右三味攪勻服

石鹼布同主治同前

石鹼勿搗茶產者一塊

右一味塗綿布敷患上。或用綿布蘸葡萄酒拂印或赤葡萄酒敷之亦佳。

梅肉酒石湯蕪丹毒腸胃有厲膽汁或宿食者宜用此方或加味酸角湯。加味梅肉湯。三物洋葵湯三方見熾盛熱輩緩

下之。又治丹毒焮脹甚者當每四五日用此取一下。乾梅肉四錢 浮酒石三錢

右二味水煎片時。取四合八勺半時或一時服一盃。芳草囊同治丹毒其色紫黑而水疱反多錄地腫脹甚精

力虛脫脉弱小。謔語不已。呼吸不利。或變敗疽者。宜先

搗以囊患上。次取防癆幾那飲與乳清酒二方見或大

麥加酒湯見每半時連服之。野艾蒿 斯格爾需護 馬爾魯啟

亞爾尼加各二 右四草。細剉盛囊。用葡萄酒煮之供用。

丹毒發頭面者。宜先行湯脚法。而傳酸泥子於足心方見熾盛

治丹毒法。便取洋芹為細末。摻綿布敷之。其焮脹甚者用

綿布蘸接骨木花濃煎汁。乘溫敷之。

空青膏微凡治丹毒慎勿用一切脂油膏子特宜以膏

官粉錢十六

白蠟錢六

空青錢二

右先將蠟烱化乃下餘藥不住手攪至冷定攤之綿布

敷患上俾功。

空青散同治丹毒疱破水出殊良。

加密列花

接骨木花各粗末

麵粉若麥粉二

官粉

空青各四

右五物調勻搽患處。

散毒囊蕪丹毒其根深而兼焮腫者宜用此方。

錦葵葉

草零陵香花

接骨木花

芥葉鈎吻葉

亞雨尼加葉

右五物盛囊水煮身溫敷之冷則更換。

逐瘀丸同丹毒難痊變為結核狀者宜撰用此丸或石鹼

鈎丸

二方見聖

鈎吻煎丸

見兼用

接骨錦葵飲見熾盛熱乳清

飲

見聖

大力甘草飲

見瘡殊効

鈎吻漿同治前症變思瘡者用以漿洗淨之日二次且蘸

綿撒絲敷之。

芥葉鈎吻

接骨木花

右二味以沸湯浸之片時濾去滓取三合六勺加蜂蜜十二錢和勻聽用。

分消飲 蘇人有年々發丹毒由是排除宿毒輒得奕健血氣已衰不復得發之毒鬱于內形神不舒暢者治之屢施打膿術發泄其毒或下之或與此方利小便方見瘡

四味接骨飲 同丹毒一種有其證或寒熱劇作或無寒熱身體處々黯赤形如雲片焮痛如焚瘙痒不可耐細疱攢簇實惡液者以此症大率初發於胸若半面或被於背或及於腹皮膚必不脹起也是名火丹其纏腰腹而狀

如帶者名曰纏腰丹並宜內服此飲或消石接骨圓見上加味梅肉膏接骨清涼飲共見熾盛熱輦外用蜜陀水洗之

接骨木花三握 甘草錢 消石錢一

接骨木子醬二錢

右四味先取花草湯泡片時取三合六勺入餘藥煇盡半時服一杯

三味質汗散 同前症用四味接骨飲輦無效者宜此方與接骨錦葵飲見熾盛熱大力甘草飲見瘡輦俟服之効如神

質汗沒扭護錢一 礞黃花

瑪屈涅失亞尼篤利錢各四

右三味作末服一小匙日二次

酒石碎菴醬同主治同前

浮酒石錢三 碎禾薺醬

山菴菜醬各十錢

右三物調勻一時半服一小匙用鴛鴦煎散見亦得

窠陀水同治而症及其水疱大者法宜以銳鍼排開之出

毒液先以此水洗淨次敷雙粉囊或搽石脂樟腦散良

效又治丹毒嫩脹減癢痒不可忍者便微溫以此水以蘸

海綿每一時半洗患處拭乾而用接骨木花囊見上覆之

窠陀僧醋一錢五分 井泉水九十六錢

右調勻洗患處

雙粉囊同治前症

稷麥粉 蠶豆粉各 樟腦小

右三味調勻盛囊敷患處

石脂樟腦散同治前症

白石脂二十錢 樟腦五分

右二味為末搽患處

乳水湯同前症瘡已為痂堅厚黑乾者宜以此方見蘸之

丹毒內陷，侵頭腦，精神錯亂者，當與峻下劑，貼發疱膏於

項，傳降氣泥。見熾盛熱於足心。

丹毒喉腫不消，欲潰爛者，宜作琵琶布，加撒法，即敷之，或用

熨劑，膜熱之。

丹毒黑而有腐爛之候者，每一時服幾那散一錢，用藥布

敷患處，或泡幾那蒸之亦良。

藥布同法取綿布蘸溫燒酒，或樟腦精敷之，患處更換數

次。

解肌湯泥治丹毒，其人屬失苟兒，陪屈質者，先與緩下劑。

俟其熾熱解，此方發汗。

剝原福烏篤 二十錢 乾葡萄 十六錢

薩撒弗剝斯 八錢 甘草 四錢

右四味以水一升七合，煮上二味，減半，次下餘藥，一沸。

瀝去滓，日服三合二勺。

四物接骨飲蘇丹毒內攻，而侵肺臟，則必胸中煩悶，氣急

咳嗽也，宜速貼天灸膏於項腦，或刺絡而灸，服此飲，見

汗大出，煩悶隨減，三四日而吐膿痰者，佳。長將此至全

愈，若不吐膿痰者，用五物導痰飲，見熾熱輩導而出之。

西醫方選卷三

西醫方選卷四目錄

失苟兒陪苦

沙蘿蔔湯

涼解乳清飲

清爽酸枸湯

麥牙飲

二味麥牙湯

加味浮菴酒石散

清熱葡萄圓

清斂酸柳湯

酸模乳清飲

酒石乳清飲

酸模菴菜飲

梅那苗香飲

沙蘿蔔酢漿飲

羊蹄毛姜飲

加味菴精飲

加味麗春飲

蘿蔔神効酒

壯元臉菜酒

解凝菴菜酒

香窠解凝飲

山菴菜舍利別

菴菜酒 同

加味菴菜酒 同

四物酒 八

清涼旃那飲 同

大黃酒石散

茉莉酒石散 同

蜀羊山茶酒 九

質汗酒石散 同

質汗酒石錠 同

菴菜飲 同

沙蘿蔔酒 同

蘿蔔泥菴酒 十

青龍水 十一

海葱山茶醬 同

碎采菴菜醬 同

鈎吻煎丸 同

薄荷飲 同

菱表喇蛄散 十二

花葉子泥 同

化斑消毒水 同

海葱蜜 同

神驗漿 十三

銅綠酒 同

雙礬水 同

百瑰水 十四

殺毒水 同

加味石榴酒 同

逐痰酒 同

歸正水 十五

消毒水 同

加味紫錫水 同

分消水 同

硝鹼水 同

水腫

香露硝精飲 十六

幾錢酒 同

幾錢醬 同

七物酒 十七

解結水 同

壺盧盧會丸 同

加味七物圓 同

茉莉散 十八

斯筆那丹 同

質汗茉莉散 同

茉莉苗香圓 同

杜松實飲 十九

香膏丸 同

熏珀布 同

加味茉莉沃刺那飲 二十

苗葱酒 同

麗婦丸 同

底羅仙蜜 同

西醫方集

卷四

二

杜松洋葵飲同

葱葛泥二十

宣腸糖同

石鹼藤黃丸同

解凝驅水酒二十

瀉水丸同

壯運瀉水飲同

壯元利水飲二十

食而便答利亞湯同

龍腦芙蓉糖同

乳酒鹿角飲同

一方二十

利水飲同

海葱酒同

神功圓同

峻下飲同

蘭草酒二十

補虛利水酒同

驅水熨二十

驅水布同

熏香布同

芙蓉驅水丸同

消石洋葵飲二十

接骨洋葵飲同

接藿膏子同

雙精飲同

加味洋葵膏二十

萬安水同

四草散同

蘭草湯二十

珊瑚里杜松酒同

蒿灰酒同

黑金酒同

四物痢結散同

四物汗銻石散三十

導水禹功丸同

黃疸

硫黃圓三十

硫黃散同

硫硝煎同

驗將丸三十

石鹼解凝膏同

化痰醬同

麻酸乳三十

蚯蚓煎同

瀉膽散同

瓦刺蕨湯同

宣腸散三十

石鹼盧會丸同

匾挑卵黃飲同

黑金幾那圓同

驅風飲同

鎮瘻芸香飲三十

麻仁酒七十

洋葵加樟腦膏同

解凝膩八十

盧沒解凝散同

轉石丸同

西醫方選卷四

平安 普山藤林紀元恭介 譯輯

備前 馬木温 謙介

門人

越前 竹内幹

玄同

參校

失苟兒陪苦

又名失銀幾兒西幾的或蒲斯

銀幾兒者取義於賊腐蒲斯取之青斑也但失苟兒陪苦則未詳其義一西書以為松格爾勃微加之音轉亦不曰為何謂故姑附後考或為裂

沙蘿蔔湯 失苟兒陪苦其症身熱口渴脉浮而弦唇熱

燥或牙齦嫩赤腐爛唇舌生瘡或咽喉嫩痛者發於稀

厲毒也。是為熱症。當清熱和厲。從二便祛之。宜以醬。

沙蘿蔔 連皮四錢 桑椹舍利別 十二錢

右以水先煮蘿蔔片時。取三合六勺。下餘藥和勻。一

時服一茶鍾。奇驗。或選用瓦刺蘘酸摸湯。加味大力湯。

二方 見瘡酒石碎菴醬 見丹毒 加味梅肉湯。加味酸角湯。接骨

清涼飲 三方見熾盛熱 四物紫葢飲。乳酪飲 二方見聖京健 亦得。

大麥蓉精飲 同 治前症。又治熱毒劇甚。敗壞血液。發惡瘡。

而四邊燉熱。精力虛脫者 見腐敗熱

涼解乳清飲 吳人於夏月遇濕雨或在炎熱之地得失苟

兒陪苦。從二便腠理。多泄粘穢。口內膠粘。惡臭難近。身

體虛憊。烈熱如燔者。是與稠粘熱壞液合併也。治之當

清熱解凝。以方主之。

乳清 百二十錢 酸角 四錢 浮酒石 一錢

右攪勻。日盡劑。

清爽酸拍湯 同 前症與涼解乳清飲而下利甚者。宜此湯。

生酸摸葉 四握 枸櫞 二顆

右二味以水二玻璃瓶許。煮去滓。更加沙糖少許。和勻。

服一酒盃。日數次。虛脫甚者。加列應酒少許。若無乳清

生酸摸而不可作上二方則用栗殼斯膏或桑椹膏或櫻子膏調和飲液用之

律比丸壽治失苟兒陪苦腸胃有積穢者早且與七丸取

下越七日再服之方見

麥牙飲泥治失苟兒陪苦又服以預防之並良

麥牙錢八

右一味或加乾葡萄以溫湯九合浸二時濾去滓服少

許漸々加量否必澹若澹甚加綠礬漿數滴或當夜與

阿芙蓉液十五滴

二味麥牙湯葷治失苟兒陪苦

麥牙末握三

薩撒弗刺斯握一小

右二味以水一升九合煮半時去滓溫服

加味浮礬酒石散勃治熱失苟兒陪苦

紫茉莉脂二分五厘

浮酒石錢一

礬酒石半錢

右三物為末服按歌氏有類方只無礬酒石耳

清熱葡萄圓同主治同前

乾葡萄二十錢

浮酒石八錢

沙糖四十錢

甘露蜜 十二錢

紫茉莉脂 五錢

右以水少許先煮葡萄至熟搗爛下餘藥和勻服四錢至八錢。

清飲酸柳湯 吳失苟兒陪苦發血蒸勞熱多泄稀屬液寒熱未往者是與稀涼熱屬液合併也此方主之。

酸模根

羊蹄根 澤生者各十六錢

玫瑰花

一握

檉柳皮 二錢

右四味以水二玻璃瓶煮之滓服一盃日數次隨症加赤葡萄酒少許良驗。

酸模乳清飲

泥

治失苟兒陪苦殊效。

酸模

不拘多少

右以甘乳清或酪餘煮至脂清分界布過作常飲酒石乳清飲 同 主治同前

浮酒石

四錢

右以乳汁二百五十六錢煮二刻下火布過作常飲酸模菴菜飲 同 主治同前

酸模汁

山菴菜汁 各等分

右二味調和服一哥喜鍾日二。

旃那苗香飲 應主治同前

旃那 錢八

小茴香 錢二

酸模 握六

山萹菜 握三

酸角 錢十三

大黃舍利別 錢十四

右以水漬上二味置煖處一宿次早煮之內酸模以下
三味候藥味出瀝去滓和大黃舍利別朝夕服一麥酒

盃

沙蘿蔔酢漿飲 蒲主治同前

沙蘿蔔 兩四

乾酢漿草 兩二三

橙皮 兩一

右三味沸湯二升淹一伏時瀝去滓服一茶鍾日三四

羊蹄毛姜飲 壽治失苟兒陪苦脉數大渴引飲氣息臭惡

齒艱腐爛時出血肢體疼痛舉動不隨先取微利而後

服之久々必效

羊蹄根

石毛姜 錢各四

酒石英 錢三

右三味以甘乳汁七合二勺煮二刻瀝去滓更加蜂蜜
十三錢和勻服之日二三次

綠礬漿 花治前症用葡萄酒一盃點二三十滴服之日四

次或鬻水服且屢漱之亦佳

加味菴精飲 壽治前症服羊蹄毛姜飲而未全愈者

山萸菜精十六錢

剝祿布利坦室私漿八錢

右二味調勻以酒水各半服五十滴日三次

加味麗春飲蕪熟失苟兒陪苦其毒惡厲敗壞血液以發

細瘡而即腐爛身體虛憊者當防其敗壞此方主之

麗春花露十六錢

若格實溫十二錢

綠蓉精十五滴

右三物攪和一時服一匙大麥加酒湯見痘加味芸香飲

加味羌活飲四味龍腦飲龍匾瓜子乳幾那芸香飲六方

見熾盛熱大麥蓉精飲防膚幾那飲乳清酒三方亦可選用

竝効

匾桃醬同治前在夜卧不寧者見熾盛熱

四物接骨飲同失苟兒陪苦口内咽喉生惡瘡者須照喉

風治之其瘡已差脈平氣力漸復神情爽朗但肢體大

痛者宜撰用此方見聖京健酒石碎菴醬見丹乳清酒見羣

蘿蔔神効酒泥壽治失苟兒陪苦其人虛寒而無渴面色蒼

白足浮腫者最妙

生沙蘿蔔根三十錢

生山萸菜葉

鹽菜葉各二握

撒雨非亞葉一握

右四味細剉。以白葡萄酒一升四合四勺浸之。置煖處。

一伏時。漉去滓。服四勺。日三次。泥氏曰去
睡菜亦可

壯元睡菜酒 具 失苟兒陪苦。身體羸瘦。肢節冷痛。游走不

定。多泄稀厲液者。是與稀涼寒壞液合併也。此方治之。

睡菜 三握 枸椽皮 各八錢

右三味浸葡萄酒二玻璃瓶。出藥味。漉去滓。服半盃。日

三次。漸加服量。

解凝菴菜酒 同 失苟兒陪苦。肢節癢然浮腫。冷痺疼重者。

是與稠粘寒壞液合併也。宜以此方。

生山菴菜葉 三握 生沙蘿蔔根 八錢

橙皮 四錢

右三味。以白葡萄酒 拂即 二玻璃瓶浸之。候藥味出。去

滓。服一盃。日二三次。且從病人於溫燥之地。常按撫肢

體。時々令步履為妙。

香窠解凝飲 同 遇前劑缺。即用此飲。

山菴菜精 十六錢 迷迭香精 八錢

橙皮油 十滴 沒藥丁 一錢

右四味調勻。取四十滴許。點葡萄酒少許。服日數次。

山萸菜舍利別効治寒失苟兒陪苦。

山萸菜精

右一物以洋糖和勻為舍利別。

萸菜酒較治失苟兒陪苦。

山萸菜

右一味搗爛灌麥酒出藥味瀝去滓服日三四次。

加味萸菜酒主治同前。

生沙蘿蔔

山萸菜

乾葡萄

橙子

顆半

錢一

錢十二

顆六

右四味浸麥酒四合八勺出藥味作常飲。

四物酒 同 主治同前

沙蘿蔔根

山萸菜子

各四錢

山萸菜葉

握二

橙瓢

顆一

右四味入臼內注白葡萄酒一合二勺研爛絞去滓作

常飲。

清凉旃那飲裴治失苟兒陪苦神情困倦四肢乏力者。

旃那

錢八

酸模

錢十六

山萸菜

握四

酸模葉

握六

小茴香

葛縷子

錢各一

大黃舍利別錢十六

右以大麥煎汁七合二勺先煎六味去滓下大黃舍利別和勻朝夕服一盃

大黃酒石散同失苟兒陪苦欲取微利者宜以此方

大黃錢各一浮酒石錢各一

右為末用哥喜或麥酒一盃調平且服之

茉莉酒石散同失苟兒陪苦當下者以此方主之

紫茉莉末二錢若浮酒石錢一

右二味每二三日服之如以此二三回乃止殊效

蜀羊山萸酒同失苟兒陪苦用大黃酒石散茉莉酒石散

共見輩下之後當與此

蜀羊泉錢十六山萸菜二乾葡萄一

橙皮若宜母子

右五物內玻璃瓶注稀麥酒三四斤關定之置煖處一二日取上清適宜分服之

質汗酒石散治寒失苟兒陪苦

質汗沒扭護五分礬酒石五分丁子油二

右三物為末服

質汗酒石錠 同治前症

質汗沒扭護者五分 薰硫黃

礬酒石錢三

浮酒石錢三 礪砂精

桂精各五分

沙糖錢十六

右六味搜和為錠子服二錢日二三

蒼茶飲泥壽治失苟兒陪苦漸差而餘症未退者

山蒼茶精錢十六

剥祿布利恒室私漿錢八

右調勻服五十滴日三次

沙蘿蔔酒斐治失苟兒陪苦腿脚若遍身發紫黑斑余膏

用此獲功甚廣

沙蘿蔔根

右扁切浸麥酒

若乳清列應酒各半

候藥味出瀝去滓飲之日三

四

一男子年三十餘患失苟兒陪苦四肢不和能步室內
余以乳清煮沙蘿蔔二十四錢取四合八勺去滓令温
服之六七日全愈

四物接骨飲 失苟兒陪苦 無熱不渴而身體困倦脉邊
或無倫齒齦帶青或水脹口內發細瘡色黯赤而嫩痛

或狀如豬脂手足若餘處浮腫發斑或青或深墨而不
熱者是為寒症也宜用以飲或解凝醬子至全痊

蘿蔔泥葛酒 同 前症若淹纏不瘥諸症漸重呼吸不利脚

足若全身浮腫者宜先用解凝醬子探之不應迺與以

方治之又治其痲癩而百方不驗

沙蘿蔔根 二十錢

泥葛根 八錢

紫堇 十六錢

甘草 十二錢

右四味同搗爛以白葡萄酒淹一宿取九合六勺一時

半與四勺四物接骨飲見聖亦有效

青龍水 同 主治同前

碎米薺汁

山薺菜汁

蔑加開瓦汁

各十錢

右三味調勻空心服半劑越一時半盡劑

海葱山薺醬 同 治前症或發斑或發潰瘍立變敗疽者

海葱蜜 二十錢

山薺菜精 八錢

撒爾非亞露 六十錢

亞爾尼加煎膏 一錢五分

右四味攪勻一時與二匙兼用乳清酒見腐殊妙

碎米薺菜醬 同 治前症

碎米薺醬

山薺菜醬

栗殼斯舍利別各八錢

綠礬精錢二

右四物攪勻服

解凝醬子同前在拉其殺惡疹細瘡經久不差者宜久服

此醬見解凝散醬見青龍水見亦佳兼與乳清飲

見聖效

鉤吻煎丸同治前症諸藥無寸驗者

芥葉鉤吻煎膏錢四

右每一錢作二十九丸與二丸日二次漸次增之

薄荷飲同治失苟兒陪苦不思食者

龍腦薄荷露六十錢 桂露十六錢

剥祿布利但室私漿 綠礬精宜適

右四物攪勻時服二匙

發表蝻姑散歌治失苟兒陪苦四肢筋骨疼痛良效

蝻姑石錄一 汗銛石 消石錠各半

純精阿芙蓉二

右四味作末點茴香露少許一頓服

花葉子泥翠治失苟兒陪苦手足疼痛者最驗

加密列花 接骨木花 碎米薺菜各一

杜松實 半握

右四味以鹽牛酪煮如泥敷痛處。

化斑消毒水 翬 治失苟兒陪苦發斑者。

縷斗菜花丁 各四錢

桂末 一錢 硃砂精 五分

右四味攪勻葡萄酒或麥酒燉服。

一富人肘脚發淺綠斑次漫腫而生疱請治於余乃與之

以硃砂精不半旬而痊。

海葱蜜 應 治失苟兒陪苦呼吸促迫痰涎壅盛者。

海葱酢 六錢 蜂蜜 百九十二錢

右二物攪和入磁罐內上文火煎之至稀稠如蜜服之

每十二時八錢至十二錢或以水二合調之一時半服

一茶鐘至妙。

神驗漿 泥 失苟兒陪苦餘毒客於口舌唇齦者即發細瘡

而侵蝕滿口甚則脫齒穿腮其初必發白斑或黃疱而

四邊焮赤劇痛唾涎臭惡不可近也方是時當速治之

以方有奇効。

海鹽精 一錢 玫瑰蜜 十三錢 水 四十錢

右三物攪勻。蘸綿撒絲。頻塗患處。或推入頰齦間。數換之。腐爛者。增海鹽精。

銅綠酒 應治失音見陪苦。牙齦腐爛者。

銅綠 錢八

右一味。將葡萄酒一玻璃瓶。淹二三日。布過。漱之日。二三。惡其氣味者。加砂糖用之。

雙礬爪 裴治失音見陪苦。及走馬疳。口中腐爛急劇者。神

驗。

明礬水 錢十六

綠礬精 錢一

玫瑰蜜 宜適

右三物攪勻。漱之日三四次。

百瑰水 伊 主治同前。尤妙。

玫瑰蜜 錢六

沒藥丁 若百藥煎丁。二錢

緩海鹽精 二十滴至六十滴

右三物攪勻。漱口日三四次。

殺毒水 歌 主治同前

消石錠 錢八

枯礬 錢十二

食鹽 錢十六

右三物。以水一升六合。煮減半。含漱之。

加味石榴酒 同 主治同前

石榴皮末 錢二

枯礬

綠青 各一錢

白蜜 錢十六

右四味以白葡萄酒四合煮減半作漱劑

逐痰酒 同 主治同前

白葡萄酒 三十錢

宜母子汁 十六錢

綠礬精 宜適

右三物調勻含漱之

歸正水 同 主治同前

燒酒 四十錢

山萸菜精 錢八

宜母子汁 十六錢

硫黃精 宜適

右四物攪勻漱之

消毒水 同 主治同前

宜母子汁 三十錢

枯礬 一錢

海鹽精 宜適

右攪勻含漱

加味紫釰水 治失苟兒陪苦。齒齲腫爛痒痛者

紫釰丁 八錢

縷斗菜花丁 一錢

山萸菜精 二錢

右三物調勻作漱劑

分消水 治失苟兒陪苦。足浮腫者

海鹽一 杜松實精二

右以水先化海鹽次調精洗患處且蘸布敷之

礪鹼水應治失苟兒陪苦青斑紫斑等

綠石鹼二 礪砂四 樟腦十六

燒酒八

右四物攪勻取二三匙摩擦之日二三次甚佳

水腫

加味芸香飲藥 人受寒濕肢體痠然浮腫帶光亮呼吸反平寢食如常無餘症者當汗而發之宜先用龍腦喇蛄

散一劑隨服以湯或加味羌活飲壯元飲以上方共加

味大力湯分消飲見方 輩二益日三次隨證兼用下劑

香露礪精飲同 治水腫發於因汗吐下或失血或熱病或

瘡疾而織維緩者

芸香露四 礪砂精三 芸香醋宜

五種開壅根舍利別錢

右先攪勻上三味次下舍利別調之一時與二匙或選

用加味羌活飲壯元飲熾盛熱導水飲分消飲見瘡

物紫堇飲見亦佳

幾鐵酒 同 水腫用前方腫已消而纖維仍緩弱者易復發

宜以此方收固之

鐵粉錢四 幾那錢六 桂枝 印的蘭皮各三錢

山奈一分錢五分

右五味細末沃葡萄酒八合放置二宿濾去滓一時半

與二三匙或用幾那芸香飲見熾盛熱幾那撒爾非亞膏子

見聖亦得

幾鐵膏 同 主治同前

鐵粉 幾那各四錢 沒藥一錢

龍腦薄荷膏錢十六

右四物用龍腦薄荷合劑別和勻一時半取肉豆蔻大

調芸蘆香草飲見熾盛熱服之大便秘者兼施下導方

七物酒 專治瘡後肢體浮腫者宜以此酒

野艾蒿錢十六 泥菖 龍膽 羌活各八錢

老里兒錢十二 杜松實錢二十 羅傑兒錢八 淫蘆錢八 篤子錢八

右七味搗爛入磁盆內灌葡萄酒一升二合八勺密封

之置煖處一晝夜濾去滓每服四勺空心服日三次

解結水 專治花水腫因瘡疾者多兼肝脾大幾里爾之閉塞及

葦黃也。宜以方解凝利尿。

野艾蒿

或加密列
花六錢

野艾蒿鹽

或酒石鹽
五六分

杜松實精

十六錢

右先以水浸野艾蒿取二合去滓下餘藥和勻日三服

壺盧蓋會丸 同前症當下者宜此方。

質汗沒扭謨

蓋薈 各十
六錢

小匾胡盧瓢 錢八

右舍利別丸每四五日與五分

加味七物圓 同前症差減者宜與之。

七物酒料

一劑
見前

右細末以蜂蜜或舍利別三四斤搜和每二三兩加鐵粉半兩調服四錢日四次

酒石茉莉散

蕪

水腫按之陷而乍起身體不冷腹中無癥

結精力未衰者其水必稀淡而流移也宜選用此方或

霸王飲三物飲二物大黃散

以上四方
見熾盛熱下之又治腹水

茉莉散 同治前症用前方不效者

紫茉莉錢

右細末一頓服

斯筆那丹 同 主治同前

斯筆那塞爾非舍利別 錢十六

霸王鹽 一錢五分

右攪和 一頓服

質汗茉莉散 同 主治同前

質汗沒担謨

紫茉莉脂 各二分

沙糖 十泰

右細末 一頓服

茉莉苗香圓 同 治前症

紫茉莉脂 二分五厘

苗香舍利別 錢四

右以杜松實精先煇盡茉莉脂加苗香舍利別和勻頓服

杜松實飲 同 治前症內與以方外以熏珀布見摩之殊効

杜松實 錢十六 甘草 錢八

右二味湯泡溫服一二盃日二次服四根飲見聖亦驗

香膏丸 同 主治同前

薰陸 乳香 各一錢 國老膏 錢四

右三味調的列並底那每一錢為十五丸一時半與二

丸加味龍牙飲見吐送下

真珀布同治前症

琥珀錢四 杜松實錢八

右粗末熏綿布摩之

四物紫堇飲同前症下之而衰憊者宜用此方利小便又

治腹水方見聖

香露硝精飲同水腫按之難陷陷則難起皮膚覺冷者其

水必為粘凝也當選用此方上見或解凝膏子導水飲見

瘰癧解凝散瘰癧膏五物清肺飲二方見輩稀渙之徐自二

便利之又治前症

加味萊沃刺那飲同治前症

萊沃刺那露六錢 底羅仙蜜四錢

葉片酒石液 山薺菜精各二錢

右四物攪勻一時半與一匙

苗葱酒同治前症

生海葱錢六 茴香錢四

右二味入磁罐內灌好葡萄酒三合六勺密封之置溫

灰上十二時瀝去滓一時半與一匙

鼠婦丸同治前症

鼠婦末錢四

右一味的列並底那調之每一錢作二十九一時半服

三丸接骨清涼飲見熾盛熱一盃送下

底羅仙蜜同治前症

底埤羅仙醋九十錢 蜂蜜煎煉去沫者百九十二錢

右二味調勻煎煉稀稠如蜜服半匙日四次

杜松洋葵飲同治前症

杜松實露六十錢 洋葵舍利別十二錢

酒石油二錢

右三味攪和一時與二匙漸加服量

洋葵甘草湯同前症用利尿藥即指前劑而小便淋瀝尿道焮

熱口渴引飲者當急治之若猶豫失治則尿道益焮熱

而波及腎臟以致危險也宜以湯或洋葵甘草飲二方見瘡

匾挑醬見熾盛熱輩

葱葛泥蒲人青年體素強實卒然發水腫者宜先與此取

吐

乙百葛五分 海葱舍利別八錢

右二味攪勻以加密列飲二盃調下隨症每三四日與

之

宣腸糖 同前症不用吐藥之日。每以此方下之。

紫茉莉末 分五 浮酒石末 錢二

加羅葳兒末 分一

右三味。玫瑰舍利別調。早天用之。服後若腹痛者。噉雞羹一盃為佳。

石鹼藤黃丸 伊 治水腫屬粘液者。又治寸白蟲及諸蟲證。

石鹼 勿搗茶 產三錢 藤黃 海葱蜜 各一

右三味。每一錢為二十九。甘草末為衣。每服五丸。日四。

解凝驅水酒 吳 治粘液腫。

野艾蒿 握二 珊篤里 握一 杜松實 錢八

酒石鹽 錢二

右四味。以葡萄酒一玻璃瓶半。浸之。候藥味出。服二盃。日四次。

玄武餅 同水腫用前方治之。腫不速消者。以水液瀰漫一身。而生機不能導泄之也。若稠飲充塞胃中。或發惡心嘔吐者。與此方或銻石酒。加味乙百葛。搭安那酒。見熾熱吐之。有大効。

瀉水丸 同治前症。

瓦兩拔奴護錢一 質汗浹扭護 酒石鹽各一

紫茉莉脂分五 葛縷子油滴五

右調勻。每一錢為二十九丸。與三九。日三次。服此。以上圍。

壯運瀉水飲 同治前症。病人虛憊者。宜此方。鼓振生機。通

利大便。

獨活根 水揚梅根各八 龍腦薄荷二

旗那乘錢四 酒石鹽錢二

右用葡萄酒一玻璃瓶。浸之。候藥味出去。滓服一盃。日

三次。若去旗那。用之。則比本方最穩。唯能利小水。令病人不衰。加桂。益佳。

壯元利水飲 蒲治水腫。晝日與之。利小便。夜分與後方。發

微汗。奇驗。

杜松實 白芥子 沙蘿蔔根各四

血乙灰八錢

右四味。用列應酒或釀麥酒六合。四勺。淹二三日。瀝去滓。二

時。或二時。平服一盃。

食而便。答利亞湯 同治水腫。發汗。通小便。不能服前方者。

西醫方選

卷四 水腫

三十三

宜以湯。

食而便答利五錢

右以水四合八勺煎取三合二勺去滓溫服。

龍腦芙蓉糖同治水腫夜分與之。

龍腦五厘 阿芙蓉二厘

右二味研末橙皮舍利別調如泥臨卧與之隨用後方令其汗似續。

乳酒鹿角飲同

乳酒清一盃 鹿角精一茶匙

右二味調勻時服一盃。

酒石散微治水腫能通泄二便久服之必效方見

一方蒲治水腫。

海葱末一分 消石錄

右二味為末點泡肉桂湯一盃服之日三次。

利水飲泥治水腫良驗。

山奈錢二 乾海葱 大黃 杜松實搗爛各一錢

桂末錢三 野艾蒿鹽錢五分

右六味以列應酒陳久者四合八勺淹之臨用慮過服。

益日三四次。

海葱酒 壽水腫不因瘰癧者當利小便宜以此方。

海葱 新生者 四錢

右浸葡萄酒四合八勺。出藥味。瀝去滓。朝服。平匙至一

匙。

神功圓 望 治水腫利小便。

海葱蜜 三十錢 鹵酒石 三錢

右二味攪勻。二三時服。半食匙。

峻下飲 伊 治水腫。

接骨木皮 去粗皮 六錢

接骨木子醬

海葱蜜 各八錢

右先用水淹木皮去滓取二合四勺和餘藥二時服二

茶鐘。

蘭草酒 伊 捷補諸藏治水腫及黃疸胃中有酸液者。

蘭草 十六錢 加斯加栗刺皮 二十錢

橙皮舍利別 十六錢 酒石鹽 一錢

右以白葡萄酒徐煮上二味減半去滓取二合八勺和

餘藥一時服一小茶鐘。

補虛利水酒 吳九人。體子裡有_レ些空隙處。輒_レ必有_レ港露形。如淡水。每有_レ喻尿管者。以_レ受其水氣。而分輸於水血。二脈是為常道也。如有_レ故失其常。或水氣稠粘。則無_レ與滲利之為。是停滯。以致_レ腫脹也。以_レ方治之。又其因_レ稠粘液。發者。用_レ鮮凝驅水酒。而腫仍不消。則其液充溢。遍身也。亦_レ宜_レ以_レ方。又治_レ水腫因_レ血脉虛衰者。

水楊梅根 錢八 良姜根 小者 四錢 杜松實 錢八

刺藜斯子 錢四 龍腦薄荷 握二

右五味。以赤葡萄酒一玻璃瓶。平浸出藥味。去滓。每服

一小盃。日四服。

驅水熨 同 治_レ水腫因_レ尿管失_レ常度。

龍腦薄荷 野艾蒿 各一握 玫瑰花 握二

桂皮 乳香 各錢

右五味。調_レ蒸_レ鮫_レ心。及_レ葡萄酒。如_レ糊。乘_レ溫_レ敷_レ患_レ處。更_レ換_レ之。日二次。

驅水布 同 治_レ前症。

乳香 錢二 格魯波尼亞 錢四 結麗土 錢十六

玫瑰花 錢四

右四味為末取綿布熱于火上摻敷其末襯患處更換之日數次。

真香布 同治水腫因血脉之機轉虛衰

乳香 合若獲香

右一味撒炭火以薰綿布摩擦患處

芙蓉驅水丸 伊治水腫用之小水潰決腫立消

阿芙蓉 純粹者二分 芫菁 未一分

右二味十二丸銀箔為衣朝夕與一丸漸加半丸至小

水利若發痛小便反不通者速停之 用芫菁丁亦好

洋葵清燥湯 蕪水腫發熱燥渴者當清熱利水必勿用熱

藥宜以湯或接骨清涼飲加味梅肉湯五物導痰飲加

味酸角湯 以上五方見熾盛熱 加味大力湯 見瘡加味瑪沃刺那飲

上酒石散 見聖輩

消石洋葵飲 同治前症

消石錢 四錢 洋葵舍利別 十六錢 蒸餾水 六錢

忽弗滿止痛液 十五滴

右攪和半時服一二匙

接骨洋葵飲 同治前症

接骨木花露 六十錢

洋葵舍利別 十六錢

綠礬精 二錢

右攪勻。半時服。一二匙。

接藿膏子 同治前症。

接骨木子醬

葫蘆醬

斯筆那食兒比醬 各八錢

右攪勻。一時半服。一匙。

大麥礬精飲 同治水腫燥渴者。見腐敗。

雙精二鹽飲 治水腫。小便不利。煩渴引飲者。

甘海鹽精 三錢

甘消石精 一錢

葛兩偶鹽

私微布法。拔兒鹽 各一錢

右攪勻。每服十滴。至二十滴。點麥酒。日二服。

芙蓉刺姑散 蕪水腫服。峻下劑。腹反脹。煩燥苦悶者。以藥

力衝動神經。發之。寧急故也。此方治之。即効。鎮瘕三物

飲。舍乃我曹。蕪丸 三方見瘡。鎮瘕芙蓉飲。見麻亦好。

瓦刺微阿刺酒 同水腫百治不効者。并血中及藏府有粘

液者。宜與此方。或瓦刺微阿刺散 若連進之。數日而身體虛憊。或苦悶者。宜

隔三四日。用之。二方共見。聖京傳。

加味洋葵膏同治諸般水腫及腹水皮膚差冷痺者宜塗之 驅粘疏鬱

樟腦一錢 燒酒一錢

洋葵膏

亞雨答泥篤膏

右煉和

萬安水伊治水腫勞瘵久咳吐血

計兩飲兒汁

二十四錢至三十二錢

消石

一分至十黍

右三味調勻

四草散同治水腫若面部若手足軟漫或光腫者

茉沃刺那

迷迭香

伊吹麝香草

底護

各八錢

右為細末裹綿布溫敷患處用炒蠶豆粉加樟腦少許者或燒鹽如此亦佳

蘭草湯同治手足水腫而堅實者

蘭草

三十二錢

右一味水煎取一升四合許去滓乘溫慰患處

珊篤里杜松酒同治水腫已愈肢體緩弱者

珊篤里

野艾蒿

杜松實

搗碎者各八錢

右入器內灌葡萄酒出藥味取九合六勺一時半與一

盃

蒿灰酒 治水肿

野艾蒿灰 二錢

白葡萄酒 百六

右攪勻 每服 三十二錢

黑金酒 蒲 水腫雖愈 喜再發 故方預防之

鐵粉 十六

桂

府利 各二

右三味 以列應酒六合 四勺 淹三四週 濾去滓 服半盃

日二三次 用浸幾那酒亦得

四物 刺蛄散 同 驅逐脉絡 痰液 治水肿

刺蛄石 錄一

汗銻石 錄半

葛爾儒鹽 分一

杜松實油 滴三

右四味 為散 不用下劑之朝 以葡萄酒下之

四物 汗銻石散 同 主治同前

汗銻石 錄一

消石錠 錄半

撒法郎 分一

琥珀油 滴六

右為散 哭前服之

霸王散 獲一切水腫 及腹水 初起腹裏有塊 結者 當與以方 解凝 疏鬱 久之 小便大利 腫脹及塊 結稍減者 欲差

也。須連進也。每服一錢。或用加味大力湯。三物開壅飲。

解凝散。薊膏。解凝石鹼丸。四物開壅飲。三物亞爾尼加

飲。解凝醬子。以上見瘡杜松洋葵飲。見輩亦得。

導水禹功丸。同治前症殊效。

芹葉鉤吻煎膏。四錢海葱末

加篤兒丸料。各一錢

右調勻。每一錢為二十九丸。服三丸。日三次。杜松甘草飲。

見或四根飲。見聖送下。

逐瘕丸。同前症用。前劑塊不化者。為惡徵也。然間有用利

尿藥。奏功者。若無效者。宜用此方。見聖或鉤吻煎丸。見瘡

破結石鹼丸。解凝石鹼丸。四物開壅飲。三方見瘡輩治之而

小便利少。恐再發者。當兼用導水禹功丸。見上

黃疸

酒石茉莉散。黃疸。胃中重冷。右肋下緊脹。温々惡心吐

稠飲者。是因粘液壅塞膽管也。用此方。或霸王飲。或二

物大黃散。下之。以上三方見瘡盛熱

硫黃圓。裴九。黃疸經久不差。則徃々變黑疸也。宜此方速

治之。

硫黃華錢四 薔薇舍利別錢八

右調勻服甚妙。

硫黃散 同主治同前

硫黃華 砂糖各四

右細末分為十一貼。

硫磺煎 同主治同前

硫黃華 硝石各四

右二味水煎取四合許太滓更加宜母子汁或就刺非
溫羅撒論十六錢和勻服。

鹼將丸 伊治黃疸發於稠粘液或臧府壅塞者。

大黃 石鹼各五分

查波牙刺筆奴私五分

右三物每一錢二十丸銀箔為衣每服三丸日三服

石鹼解凝膏 吳治前症

護失刺及尼蒲私膏 石鹼膏各八錢

右二味調勻攤軟革更刷却按兩撒摩寧露貼之患處
若不具用一膏亦可。

獨聖散 蒲黃疸病人少壯血實肝痛者先放血次與此功

勝諸藥不兼喉腫者殊良見神經熱

百葛霸王散 藜前症。胃中有稠飲。欲吐者。當促其吐。宜此

方。或加味白虎散。二仙散。擦膈飲。四方見熾盛熱

化痰膏同前症取吐之翌。宜選用此方。或浮磬酒石散。見熾

盛加味大力湯。三物閉壅飲。四物閉壅飲。令消飲。化痰

飲。解凝膏子。五方見瘧疾利毒飲。見瘧疾若服此輩。稍覺快爽。則連

進。至全愈。若病勢不衰。大便秘者。每三四日。兼用酒石

茉莉散霸王飲。二物大黃散。三方見熾盛熱等必效。

剝利瓦兒根末 幾那末各四錢

右二味。以寬胸蜜煉和。一時服一匙。哥喜匙。

酒石散蒲治黃疸有奇効。每服一錢。朝夕茶一盃調服不

下則加其量。方見瘧疾

麻酸乳勃治黃疸取下而後服之

麻仁錢十六 石酸錢二

右二味。以牛乳汁五合煎至四合。去滓溫服。

蛭蚘煎同主治同前

蛭蚘錢十六

右以乳汁五合煎取四合。去滓更泡。撒法郎一銖溫服。

瀉膽散壽治黃疸或瘧後發黃。心下痞滿。小水黃者。

海葱蜜錢十六

霸王鹽錢二

礬酒石錢一

水六十錢

龍腦薄荷精錢四

右五味攪勻。一時半服。一二匙至三四匙。隨服。瓦刺蘊

蒲公英湯。

瓦刺蘊蒲公英湯同治前症。

瓦刺蘊根八錢

蒲公英三十錢

右二味水煎。二刻。取四合。八勺。和蜜二十四錢。瀉膽散

後。一時半。隨服。以湯。朝夕。第一服。一物石鹼丸。

一物石鹼丸同治前症。朝夕服五分。越六日。大便不快通

者。停服。與律比丸五分。次日復與本方。方見聖

宣腸散花黃疽。舌上有胎者。腸胃有穢積也。此方主之。

大黃五分 乙百葛一分或二分

右細末

清涼宣腸飲吳治熱病發黃者。蒸饑清熱飲亦可。共見熾

石鹼蘆薈丸蒲治黃疽。且以方順利。大便神效。

石鹼勿擲茶

蘆薈沙哥牙

茶茉莉煎膏各一錢。煎膏作蘆薈會。大黃各二錢。

右三味以合利別作丸服五六丸日二三以_上列日二三行為度且浴溫湯沒至胸下兼服獨聖散或白帛散尤佳

洋葵清燥湯 前症黃促期屢發勢轉增劇者元氣欲排其毒戾之於腸中而不得逞故也宜和蜜溫湯以與之兼服洋葵甘草湯洋葵甘草飲此方見熾盛熱以促嘔吐

匾挑卵黃飲 同主治同前

匾挑油 新生者十六錢

印黃 一個

洋葵合利別錢十六

菩提樹花露

四十八錢

右先取油卵內乳鉢內搗勻下餘藥一時服二匙

鎮瘧三物飲 同前症漸進危險飲食下咽即吐肝部疼痛

苦悶難堪者此方見主之第一二時施亞麻油道見腐

匾挑醬 同前症脉弦實有熱狀者先刺絡而後與此方見熾

熱或鎮癩杜神飲見聖至痛止諸證退乃用浮蓉酒石

散見熾利毒飲見等以防再發

石鹼鈎吻丸 同黃疸服解凝劑按謂乳清飲加味大力湯

發胃中冷痛者當停之用四味健胃飲見一盃送下

此丸或加味石鹼鈎吻丸二方見或解凝石鹼丸見必

効

黑金幾那圓同前症。多服。解凝劑。諸患已退。而精力虛脫者。宜以此方。徒補之。

鐵粉 幾那末各四錢

的里亞加茶的薩論十六錢

右以龍腦薄荷舍利別和勻。一時半服。一匙。用幾錢酒。

珊篤里杜松酒二方見水腫亦好。

驅風飲。黃疸時發時歇者。因宮痛或憂苦。膽管學急。膽

汁逆流血中之所致也。宜驅風劑。以此方主之。

龍腦薄荷露六十錢 的里亞加半一錢

沒藥丁二錢 橙皮油五滴

阿芙蓉液十五滴 急製礮砂精一錢

白罌粟舍利別八錢

右七物調勻。一刻若半時服。一匙。

二物大黃散。獲黃疸。由忿怒恐驚悲憂。膽管抽縮得之者。

以方下之。或施導法。當夕與匾枕膏。若一下。不解。心下

苦痞。惡心嘔逆者。復與以此方。或浮礬酒石散。日三服。方

共見熾盛熱

西醫方集

三日黃疸

三六

西醫方集

卷四

三十五

加味大力湯 同前症 肝臟壅結。右肋下緊急者。與前方不

効。當選用此方。見或分消飲。破結石酸丸。見上利毒飲。

凡 痘 輩

鎮瘧芸香飲 同 治前症。服下變急。疼痛苦悶。眩暈。嘔逆。小

便清者。

芸香露 二十錢 龍腦薄荷舍利別錢

葛私交儂護丁 二十滴 阿芙蓉液 十四滴

右攪勻。一匙。與一二匙。或與鎮瘧三物飲。亦得。疼痛苦

悶止。復與前方。

乳酪飲 黃疸 四五月。或一二年。居然不增不減。別無所

患。飲食如常者。宜此方。疏鬱去痰利尿。方見聖

加味乳清飲 同 黃疸往々有發。腐敗熱者。極危。以其毒凶

猛。敗壞血液之所致也。急作此方。見或龍腦瓜子乳。多

服之。以至病勢衰。間服幾那芸香飲。方見熾熱。則効更多。

麻仁酒 蕭 治黃疸膠固。久々不差者。奇驗。

麻仁 三十錢

右一味。以麥酒一升。二合。八勺。煎和洋糖。每且取一合

六勺。服八九日。

加味石鹼鈎吻丸 獲治黃疸其人粘液凝固體中而久不

愈者五物清肺飲 聖方見亦可

鈎吻煎丸 同黃疸右肋下有堅塊者是發於肝藏癥結也

宜此方 或石鹼鈎吻丸加味石鹼鈎吻丸 聖方見輩

解凝醬子 同瘰癧失治而發黃疸者此方神驗 見用鈎吻

煎丸 見瘰癧亦效

洋葵加樟腦膏 同治前症

洋葵膏 適樟腦錢一

右二味別取非阿合亞謨私油先同龍腦研勻次和洋

葵膏且暮塗塊上用片葉鈎吻膏 見方蓋之尤效

解凝慰吳黃疸由肝藏癥結及壅塞發者險也治之先用

的列並底那油摩擦肝部而敷以藥

蒲里阿尼亞根錢 野艾蒿 接骨木花

胡蘆巴末 錢十六

右四味以水酒各半煮如泥乘溫貼肝部更換日二次

蘆沒解凝散 同治前症

蘆會 沒藥 酒石鹽 乳香

右四味為末十二分夕之服其一月二三

轉石丸 同治黃疸發於細石充塞膽管。

瓦兩拔奴護

石鹼 勿搗茶症各二錢

酒石鹽

大黃末

各一銖

右四味調剝祿布利怛室私漿。每一錢作十五丸。服四

丸。日三四次。

分消飲 獲黃疸有定期發作者。其初右肋下緊重微痛。心
下牽引。隨即胸中苦悶。惡心嘔吐。小便溷濁。或赭黑。白
睛漸黃。遂及全軀。是因於膽汁稠厚。或膽中結砂石也。
宜速選此方。或加味大力湯。解凝醬子。四物開壅飲。四方

見三物洋葵湯。利毒飲。見熾乳清飲。見聖輩長將之。

西醫方選卷四終

西醫方選

卷四

三十八

西醫方選卷五目錄

痲症

龍腦丸_一

順氣水_二

霸王茉莉膏_同

發揮膏_三

芥子酒_同

二神飲_同

三物發揮飲_同

順氣飲_四

麝香丸_同

散痲油_五

卒中風

鹽油導_五

旃那導_同

寒水導_同

宣腸導_六

清涼霸王飲_同

鹼鹽導_七

鹽酸導八

煙草導同

乾白揮菱鹽同

誘嚏散同

汞葉散九

加味汞葉散同

葛兩儒飲十

加味麗春飲同

大黃乙百散十一

宣腸散同

卒厥并眩暈

回生水十二

酒石大黃散同

幾鍊散十三

橙葉散同

加味止痛液十四

墨栗薩橙皮飲同

黑液病脾痛神經疾。

宜腸乳清飲十五

龍消散同

麝香膏十六

烏龍尾精同

鍊粉舍利別同

石礬散

三物盧會丸十七

鍊粉沒藥散同

四神散十八

折衝丸同

鍊粉沒藥酒同

寬胸折衝散同

幾那健胃飲十九

大黃旃那飲同

加味綠礬漿二十

腦焮腫

清腦水二十一

四物芥子泥同

坐肛藥同

加味匾挑乳二十二

癲狂

地惹太利斯散二十三

黃岩散同

黃岩湯同

扶^レ飲^レ藥^レ玉^レ酒^レ 廿五

蔓陀羅膏 同

杜衡散 同

四味酒石散 同

紫堇飲 廿五

癩瘰

四物安神飲 廿五

橙葉飲 廿五

橙葉散 同

固形丸 同

阿魏角油丸 同

五物壯元散 廿七

羅沃露私散 同

一味鎮癩湯 同

格密的薩見篤散 同

朱雀散 廿六

鎮神散 同

平癩飲 同

定癩丸 同

鉛華散 同

鎮癩幾那膏子 同

福烏篤湯 廿九

寄生散 同

壺盧瓢散 三十

鎮瘰飲 同

鎮瘰除壞丸 同

龍腦丸 卅一

殺喪健胃丸 卅一

白蘚醬子 同

探珠醬 同

三席丸 同

亞鉛蝟蝟散 同

三製薄荷飲 卅三

頭痛

清腦丸 卅四

誘嚏清腦散 卅五

盧會丸 同

壺盧酒 同

罌即發汗圓 同

解^サ撒^フ法^フ郎^フ醬^フ子 卅六

灌頭精 同

定痛酒 卅七

魚鬚葡萄湯 同

魚鬚奇糧湯 同

鎮瘰水 同

定癩水 卅八

眼目

清明膏 廿八

明目膏 廿九

寒水飲 同

清下散 同

散鬱泥 卅

密陀薔薇水 同

重鉛礬水 同

清明水 同

羅獨密蕒雨 卅一

礬鹽水 同

定痛泥 同

清眼水 同

礬石明目膏 同

薔薇乳 卅二

散鬱膏 同

蔗餹泥 同

清華水 同

神驗明目膏 同

三物蔗餹泥 卅三

匾挑龍腦水 同

一方

樟腦苗香水 卅四

卵白膏 同

消熱泥 同

甘露飲 同

三消散 同

酸梅湯 卅五

幾那消痰湯 同

桃花水 同

神効水 同

退翳散 卅六

硃砂水 同

外汞水 同

磨翳散 卅七

天然水 同

明眼水 同

明目膏 卅八

薔薇加汞膏 同

點兩捏兒蠟膏 卅九

排膿熨 同

消毒丸 卅九

一方 同

二味幾那湯 五十

耳病

霸礬凝糖散 五十

加味乳清飲 同

旗消導 同

甘麥葡萄飲 五十

酸模泥 同

雙油膏 同

董萊慰同

薔薇卵黃膏同

樟腦精五十

玫瑰酒同

乳沒酒同

薔薇筒同

潤燥油五十

衄血酒。酒。鼓鼻。鼻痔。

加味消石散五十

大麥芒消飲五十

玫瑰礬精飲同

重鉛礬水同

礬々散同

寄生散同

治酒鼓鼻方五十

拈痔水同

礬水同又

齒牙

三物茉莉散五十

遺根湯同

連錢迷迭醋同

三和液五十

丁香止痛油同

芙蓉樟腦錠同

水楊煎同

固齒藥五十

咽喉

石鹼泥五十

緩和熨同

加味和胸湯同

奇應油同

清涼導同

北水湯六十

三物茉莉散六十

接花消石湯

接瑰消石湯同

散毒筒同

錦葵化毒泥同

清咽膏子二方

酸涼水同

金鎖泥同

神効導六十

清咽奠同

大麥加乳汁湯同

榮養乳同

雞肉煎同

燕麥煎六十

緩和湯同

大麥瑰石湯同

經驗含漱湯同

則蘭地俗治喉風散藥三方六十五

閃閃湯同

無花果湯同

玫瑰龍牙湯同

大加薔薇蜜湯六十

六四物芸香漿同

鈎吻接骨漿同

玫瑰加鹽精蜜六十

七接桑鹽精漿

甘和湯同

薔薇核汁蜜六十

硫黃含漱水同

佛甲蜜同

神仙水六十

燕窩泥七十

乳香錠同

散寒湯同

杜松實飲同

逐寒酒七十

桂皮海葱酒同

茉莉酒同

樟腦導七十

薔薇薈菜蜜同

西醫方選卷五

平安 普山藤林紀元泰介 譯輯

伊勢 片岡維周 順益

門人

出雲 上田謙卿 良悅

參校

痲症

加味酸角湯蕪 痲症。脈強實者。血實故也。當放血而與涼

藥。宜此方。及加味梅肉湯。洋葵清燥湯。接骨清涼飲。四方

見熾瓦刺蕪酸摸湯。見羣服之。久而患處覺酸痒。較得

舉動者。應也。更連進之。且朝夕用綿布摩患處。莫不効。

浮礬酒石散 同前症服 加味酸角湯 輩而大便不快通者

宜以散或霸王飲三物飲 三方見熾盛熱 酒石散 見聖輩

龍腦丸 同前症 用加味酸角湯 輩治之久而不驗 脉緩弱

者宜刺動輕竅之劑以方主之

龍腦 三錢

右每一錢用燒酒為二十丸服二丸日三次 撰用壯元

鎮瘧丸 海葱山菴醬 共見失苟兒陪苦 香露礪精飲 見水三物

西爾尼加飲 鴛鴦煎膏散 解凝石酸丸 四方亦佳兼用

加味羌活飲 芸薩香草飲 壯元飲 三方見熾盛熱 等一盃日數

次且用順氣水 摩患處二次益妙

順氣水 同治前症

茉莉刺那露 八十錢 山菴菜精 八錢

的列並底那 二錢

右三物調勻聽用

洋葵清燥湯 同前症 用刺動輕竅之劑 及病人心煩內熱

按其脉如血有沸狀者 宜選用此方 見熾盛熱 及洋葵甘草

湯 見乳清飲 白頭翁散 見聖輩

霸王茉莉膏 同前症 其入素虛寒肢體膨脹者 屬粘液也

宜內服。以方外用。熨布。蓋熨掉布之類摩之。若無効者。與壯元

鎮痙丸。解凝石鹼丸。三物。而兩尼加飲。駕膏煎膏散。海

葱山菴醬。龍腦丸。六方所出共見上等相間服。

霸王鹽 紫茉莉末 加乃可草根 各一錢

海葱蜜 三十錢

右四物攪勻。服一匙。日四次。用解凝散。壽膏。見聖馮石

碎菴醬。見丹毒輩亦驗。

治麻症。法常使病人浴溫泉。有硫黃氣者或用閃光機衝動之。

並効同

天冬膏。老人罹麻症者。多因于纖維縱寬。精力虛脫也。

貼此間有良驗。見職感熱

發揮膏。滋。薄麻症不可貼。天冬膏者。宜用以治其發於

神經縱弛。氣力虛脫。又治喉風。

阿利襪油 八錢 鹿角精 四錢

右攪勻用。或二物等分製之。功益別。

芥子酒。蒲治麻症舌痿不能言者。奇功。

芥子末 二錢

右一味。淹燒酒。出藥氣。去滓。頻々漱之。一方刺賢。垣兒

精和砂糖含漱亦佳。

二神飲 同治前症。

加乃可草根

撒兩非魚花

右二味湯泡溫服或取加乃可草根末五分用燒酒一盃送下效。

三物發揮飲 同 痲症不能服加乃可草者用此治之。

含油揮發鹽

刺賢堙兒精

葛私多縷護了 各四錢

右三物攪勻每服四五十滴葡萄酒一盃點服日三四

次時服芥子一匙亦可。

順氣飲 同 治痲症大振胸臆筋絡之弛弱能利小便為溫

煖衝動之良方又治卒中風。

山薺菜根

白芥子末

各三十四錢

橙皮 去白八錢

右三味以沸湯二升浸之一晝夜瀝去滓服一茶鍾日三四次服後溫覆發蒸氣。

麝香丸 伊泥 治痲症莫麝香之如以方有神驗。

麝香 錢一

右一味用幾那煎膏二錢調之每一錢作二十丸服五

丸日四次漸如其量。○一婦人年六十六卒然罹痲症。調治百端曾無寸驗。余治之先取麝香少許以幾那煎膏作丸稍々加量與之不半旬而收全功。氏泥

五物導痰飲 痲在一處而咳嗽者痰飲留於肺也。宜以方。洋萎清燥湯。四物導痰圓。并見熾熱二物化痰散。見聖京健亦可選用。

鹿角精蒲一身不問處神經壅遏而不知寒熱痛痒者宜下之而與此精外擦。硃砂精或以生薑麻撲患處或塗含油揮發鹽或貼芫菁膏並效。

散痲油叔治痲症殊效。

胡桃油半一介 芸香 野艾蒿各一握

的列並底那勿擲茶產二十四錢 肉豆蔻三個

右五味以厚葡萄酒煮上三味布過內餘藥和勻塗脊推。

卒中風

鹽油導微暴卒中風精神昏塞呼吸短促。齟聲勦々聞于舍外面赤頸脹肢體不動。但嘔者是血壓塞腦官也。宜速刺尺澤放血九十六錢至百二十錢而用此方導中大

便

阿利機油 錢十六 食鹽 錢四

右二物攪勻。每一時向肛門射之。

旃那導 吳主治同前

旃那 錢六 消石 錢二 蜂蜜 錢八

右三味。以水五合六勺。煮取二合四勺。乘溫射入肛中。

寒水導 蘇 卒中風。顏面焮赤。充盈脈強實者。是為血實也。

當急刺委中。放血。至脈勢減。面色退。迺施導方。此方尤效。

凝水石 錢六 甘露蜜 錢十六 清水 錢八十

右三物調勻。射之肛中。

宜鴈導 蕭 治卒中風。因血實。若粘液發者。並良驗。又治癱

症。

乳汁 錢八 清水 各四十 阿利機油 牛酪

紫糖 各十 錢六

右五物攪和。每一時射于肛門。加芒硝。若食鹽八錢。功

益峻。

降氣泥 蘇 治血實卒中風。敷之足心。見熾盛熱。

消石散 微 前在水漿下咽者宜用此散每一錢調水四合。

類灌 口中方見

清涼霸王飲 獲 前在放血後與此方下之。

霸王鹽 八錢

甘露蜜

拘椽汁 各二十錢

甘消石精 一錢

右四味以井泉水三合先消鹽蜜內餘藥和勻半時服

一盃至大便快通用加味酸角湯三物洋葵湯 二方見

酒石散 見聖 消石接骨飲 見丹 亦得。

清涼宜腸飲 吳 前在病人醒復即與此方及大麥清熱飲。

酸模清熱飲 方見熾

加味酸消飲 微 前在至脉力衰顏色稍和與此飲 見

天灸膏 獲 卒中風不問血實粘液宜速貼以膏於肩背腓

腸又血實卒中風刺下之無寸驗或假令得驗隨復發

神志昏塞氣息不利等症者須再貼之而剃髮敷清解

藥灌面以冷水且放水蛭於耳後頭上角筒子於頭肩

膈膊病人水漿下咽者與加味酸角湯酒石散 所出並

輦 見前

加味羌活飲 同 血實卒中風生機已衰脉小弱者宜選此

飲。及三物洋萎湯。龍匾瓜子乳。壯元飲。四方見香露硝

精飲。見水用之。

酒石散微防。血實卒中風。再發。以方見聖特功。宜常每二

三日取一劑。調水一盃。平且空心服。盡且間服。加味酸

消飲。見上一年二三次。

鹼鹽導同暴卒中風。脉虛弱。面色蒼青。氣息之少。涎唾壅

盛者。粘液之所致也。宜以方導大便。

食鹽一匙石鹼一小匙

右二味。以溫湯消盡。射入肛中。日二三次。

鹽鹼導獲卒中風。面色青悴。脉弱無倫。或結代。呼吸不利。

者。發於粘液也。宜施以方。

食鹽各四錢石鹼各四錢蜂蜜十六錢

右三味。以井泉水二合四勺。先消鹽鹼。下蜜和勻。射入

肛門。

煙草導同主治同前。功峻於前方。

煙草四錢梅那六錢蜂蜜十六錢

右三味。先以水煎二味片時。取二合四勺。去滓。下蜜和

勻。向肛門射之。

乾白揮發鹽吳人頭上軟然腫起常覺冷重而痺漸嗜睡
眠者以此粘液使然也。不急治之則恐陷昏睡或成卒中
風。此方實驗。

礪砂

生石灰

蝟蛄石

各二錢

右三味各為末內玻璃瓶搖蕩之更加迷迭香油若橙
皮油數滴和勻。嗅鼻令氣達腦。

誘嚏散同治前症當使病人用此數嚏以奮起腦機稀渙
粘液而從鼻中導泄之。

龍腦薄荷

芫荽刺那

墨栗薩各一錢

龍骨木脂

半錢

右四味細末取少許嗅鼻中。

加味酒石散微粘液卒中風治之外貼天冬膏內用此見

哮喘腸中以墨栗薩飲代平飲防其再發亦宜此散

瀉水丸吳治前症當導泄頭中粘液宜選用此方及壯運

瀉水丸解凝驅水酒方見

汞菜散蘇主治同前

紫茉莉

末二錢

甘草

五錢

右一味細末一頓服兼用西路馬地加醋摩擦鼻顛

加味承氣散 同主治同前

質汗沒扭護

十五

紫茉莉

五

甘汞

三

白糖

一

右四味細末。一頓服。三物飲。

見熾盛熱

解凝散

見聖藥

莉散。斯筆那丹。質汗茉莉散。

水腫見

清涼霸王散。

見上等亦

各有効。宜選用。

四物龍腦飲 同前症下之後。宜選用此方。或加味羌活飲。

龍腦瓜子乳。壯元飲。

四方見熾盛熱

香露礪精飲。加味茉莉刺

那飲。

水腫見

輩數貼。天冬膏。於頭上。漸覺快者。復下之。

葛兩傷飲 前症。自汗出者。佳兆也。宜以此方促發之。

乾葛兩傷藥

八錢。會缺。即用大菊。

右一味。以冷水三合。二勺。浸之。出藥味。紙過。溫服。

接骨清涼飲 時氣應熱燥。反暴濕寒。人中其氣。得熱卒

中風者。其證初。惡寒振慄。四肢倦怠。胸中懊懣。氣急息

迫。頭痛目眩。或四肢。或半身。麻痺不遂。次頭痛目眩。轉

增劇。脈實而弦。呼吸不利。人事昏塞也。治之要在放血。

行導方。而選用此飲。及洋葵清燥湯。加味大麥湯。加味

梅肉湯。加味酸角湯。

五方見熾盛熱

與洋葵甘草湯。或瓦刺

蘇酸橫湯並見瘧亦佳。

加味麗春飲同前症咳嗽而吐稠痰脉有熱狀者宜前

方用以豁痰。

屋失茂兒錢十六麗春花露五十

右二味攪勻一時服二匙用四物導痰圓輩亦得。

分消飲同前症咳已止熱減脉和者宜此飲或加味大力

湯二方見瘧輩咳仍不止熱不減者不可與之。

接骨錦葵飲同時令不正人觸暴寒蒸氣過鬱頭腦為之

所侵昏睡卒倒不知人事呼吸反如常脉不浮而數者

宜行導方而服此飲服已溫覆以助藥力發汗洋葵清

燥湯見熾分消飲見瘧亦並良。

龍腦心子乳同前症誤用溫藥必有大害但粘液家則與

此方或加味羌活飲或壯元飲三方見熾以表發之如無

効者貼天灸膏于脚頻行導方。

大黃乙百散卒人飽食後面色蒼青頭暈目眩呃逆乾嘔

隨人事昏塞肢體強直如死呼吸仍存心下膨滿脉微

者是為卒中風發於停食也當須吐之此方主之。

大黃 乙百葛各八黍

百散方選 卒中風

飲亦効。

白帛散 微 人有停食而腹不痛。脉微細。心下滿。煩悶欲吐。

頭眩。冷汗出。卒倒不覺人事。顏色青悴。或呃逆者。非卒

中風。是為食厥也。急吐之。宜作以散。以水三盃。下半劑。

片時無効。乃與半劑。氣射入鹽鹵導。見卒於肛中。

加密列飲 微 治食厥得水漿下咽者。宜急服此方。或泡接

骨木花湯。泡葛兩儒湯等。吐之。或用微温湯促吐亦可。

酒石大黃散 同 食厥吐之。醒覺後。與此方數日。以疎滌腸

胃。挽回精力。

玄武餅 吳 眩暈因胃有穢積者。宜此方。或銛石酒。加味乙

百葛格安那酒 輩 三方見 熾盛熱湧之

健胃散 同 前症吐之後。用此方。或健胃酒。或健胃丸。調理

之 三方並 見虛勞

幾那散 卒 治眩暈久不已者。神良。

幾那 分五 鐵粉 十

右二味細末。冷水送下。日二三。

橙葉散 同 治眩暈因于停食。而久不瘥者。

橙葉

右一味細末。每服一茶匙。或和之。宜腸散。見卒用之。

越謨回生丸。吳治血液敗壞而生。稀屬寒液。浸淫眼底。以

致眩暈者。

酸瑰清涼飲。同卒厥發於熱疾者。中暑者。宜移其人於涼

處。而和醋冷水。以灌面上。醒覺即與此飲。見傷敗熱

卒厥眩暈。由產後崩漏。及一切脫血。或腹水施。決水術後。

精力虛憊。或天稟虛弱。發之者。當使其人仰臥。卑首。而

用綿布緊縛其腰。取腕子摩擦肢體。且撰迷迭香精。拘

櫟皮油。硃砂精。墨栗薩精。鹿角精。輩啗真中。或塗之。顛

顛。或內服之。或溫燒酒蘸布。以敷中腕。或搽顛顛。

卒厥從七情妄動得之者。宜急用醋。或迷迭香精。拘櫟皮

油。礪砂精等。滴入鼻中。或搽之。顛顛放血。亦佳。稍至可

藥。則取里母那垓一二盃。頻々與之。吳微

加味止痛液。徵人有火憤怒後。精氣暴虛。心痛。口苦。溫々

惡心。次發眩暈。或卒厥者。須急以醋。噴鼻。獲復。乃溫服。

以藥一二盃。且施錦葵導。見熾盛熱若惡心。心痛久不差者。

與加味酸消飲。或酒石散。二方有良驗。

勿弗滿止痛液。三錢。琥珀丁錢一。

右二物調勻。點水一匙。取一卵匙。灌口。隨與墨栗薩橙皮飲。下見

墨栗薩橙皮飲 同 主治同前

墨栗薩 大 橙皮 小

右二味。湯泡溫服。

婦人卒然暈倒者。多是宮癩瘕瘰之所致也。用礪砂精。迷迭香精。刺陵埴兒精。墨栗薩精。鹿角鹽。琥珀鹽。葛秘。多縷。漢丁。乾白揮發鹽等。蘸布以接鼻下。或搽顛顛。延良効。省復而後。從本病治法處之。防其再發。六

人蟻。要一壺。則間有中所相呼吸之氣。以卒倒者。治之。宜

先移其人於外。取醋若燒酒。搽之。顛顛。以揮發精或鹽。噴鼻。且使仰臥。而灌口。以葡萄酒。若他強心劑。少許。滿

黑液病。脾癩。神經疾。漢所謂心疾。鬱在等皆屬于此。

宜腸乳清飲。其人善鬱憂悲悶。神識不朗。泣事疑惑。思慮迷亂。服下痞懣。而覺冷重。好獨居者。是為黑液病也。以方治之。

甘乳清 若大麥煎汁 凝水石 少許

右二味調勻。連進數日。而大便不利者。以飲泡。旃那與

之欲兼清涼加酸角少許

酒石散 蒲 黑液病其症恐々然神志不寧惡喧訛厭應接
只愛靜以無大無小事々挂懷狐疑由與過慮勞思或
時吝而妄貪或時侈而好施脉遲而緩面色蒼青腹肚
膨滿小便淡而少大便必秘澁或謂身已死或為已變
生獸畜或視身如假水精不能舉動也治之宜作以散
大麥煎汁送下數旬乃有效方見

龍腦消石散 同治前症

龍腦 分二 消石 分五

右二味研末日二三服惡其味者調阿魏若甚私君倭
護作丸與之

麝香 同治前症

麝香 一銖或一銖五黍

右一味調蜂蜜日二三服

烏龍尾精 劫黑液病者志意不定悲憂抑鬱驚恐怕怖疑
惑迷惘或妄言狂語或自謂有鬼崇諸症若綿延不已
若時發時止也宜先吐下之而與此方調氣血

烏龍尾 不拘

烏龍尾 不拘 黑液病

右一味。入列篤兒。約十分七。延上火。取精露用之。良驗。一與鹿角精二三滴亦好。

鍊粉舍利別同主治同前。又治脾癰並良。

鍊粉三十錢

右一味。以白葡萄酒三合六勺。淹之。候鐵化。布過加砂

糖上火為舍利別時服一二匙。

石礬散同前症此方下之亦效。

浮酒石二錢

綠礬

紫茉莉脂各五分

右三味末。和丁子油三滴。分作三服。

三湯盧會丸。勃脾癰者。其腹急脹。而雷鳴。唾涎多。出飢而食則無味。悸動怔忡。呼吸不安。頭目眩暈。驚悸恐怖。思念不。斷。眼目時暗。居常怕死。或悲憂鬱悶。神志錯亂。五心煩熱。肢節拘攣。酸痛。是脾閉塞之所致也。當吐下之。下之宜此方。

盧會三錢

安沒尼画加膠

四錢

礬酒石

半錢

右三味為丸。每服一銖。至一錢。加篤兒丸見方亦妙。吐下之後。宜選鹿角精。烏龍尾精。見礬砂精輩。和少許。於

平飲與之。而每月取吐一二次。

越謨回生丸 吳長病已差。或諸失血。及產後鬱憂慘憾。思
 慮惑迷。精神錯越者。不中刺下之也。宜久服。以方。凡虛
 鐵粉沒藥散 裝 脾痛。其證腹緊急。左脇下最甚。鬱憂恐怖
 或惡明。好暗。或喜靜居。觸事易驚。胃氣衰弱。食即滿悶
 或惡心嘔逆。或吐清水。而覺爽快。或心腹悸動。食前食
 後。及空心。多吐涎唾。或四肢倦重。業作懶惰。情思疲困。
 總有舉動。就氣急如涉險。或者眩。或不寐。大便或秘。或
 或下利。或身痔。或頭痛耳鳴。或眼目昏暗。身或發黃斑。
 若紫斑。若黑斑也。此方主之。

錢粉 修製者 四錢

沒藥

沙糖 各二錢

右三味細末。朝夕服。二三皮指。白湯送下。

四神散 同治前症上冲甚者。

錢粉 修製者 四錢

沒藥

琥珀 各二錢

葛私多僕 護 一錢

右四味細末。朝夕服。二三皮指。白湯下之。

折衝丸 同主治同前

安沒尼 西加膠

錢粉

沒藥 末

葛私多僕 護 五分

右四物先取安沒尼亞加消之燒酒乃和餘藥調琥珀油半銖作三十九金箔為衣朝夕服二三九

錢粉沒藥酒同 主治同前

錢粉四兩至六兩 沒藥一兩

右二味以葡萄酒一升一合淹之漚過本滓每服一盃日二三次

寬胸折衝散同 前症膽汁汎溢血中或兼勞瘵狀者以此方

神驗

硫黃華 錢粉修製者各四錢 沒藥 甘草各二錢

右四味細末每服一刀尖日二次白湯送下

幾那健胃飲泥 神經疾腸胃拘急而膨脹或食不進而難

化或頻欲食々即消或酸敗胃中喜吐清水若稠粘液

若赭黑液腹中雷鳴繞臍刺痛大便秘澀或會微利小便

便清而時少時多氣急息迫或時心悸或俄然發熱漸

浙惡寒肘脚走痛背腹疼痛如於結石腎痛脉狀無常

或遲或數或乍笑乍哭時々欠伸或太息或呃逆呼吸

或欲窒咽中如有炙癢若彈丸睡寐不寧屢苦覺夢病

漸進則頭痛甚肢體拘攣一身不問處發箇疼痛眼目

朦朧如在霧裡而時痛且乾耳鳴或聾不久而耳目復
故若復發之緣遇細故易感激七情相干大惱精神
妄思癡想慮慮不定或善忘常深恐死有所少患不能
耐之每輒延醫亦不肯委之更彼轉以須臾不得安也
若其人胃弱飲食難消化者宜以方

幾那錢八

龍膽

橙皮

胡安子

各四錢

右四味入臼內搗爛以燒酒一玻璃瓶醃之五六日瀝

本滓取一匙點水一盃服日三次泥泡幾那湯亦效泥

大黃旗那飲同神經疾大便秘澁者以方下之慎勿用峻

下藥

大黃 旗那

右二味湯泡溫服

酸礬漿蒲神經疾脾瀉宮瀉胃腸虛弱飲食不化風氣鬱

閉不得泄者並宜以漿

丁子丁

百二十
八錢

綠礬油

二十
四錢

右二味稍々調勻紙過取十五滴至二十滴點水一盃

服日二三次

治神經疾莫優於使其人灌冷水當秋夏行之為妙弱人

百文

神經疾

柴一週三四次。但有肝脾壅塞之候者。禁之。

腦燉腫

加味梅肉湯。腦燉腫。其症。頭痛如割。身體嗜熱。肌膚乾燥。口渴引飲。面目燉赤。羞明喜暗。筋肉湯。閉夜而不能睡。二便秘閉。耳鳴如蟬。狂言妄語。罵詈叫喚者。名發狂熱。遂至煩燥。脫衣摸床。撮空。狀如捕蠅。狂躁。唾人。諸症。退則喃喃。獨語。斷齒。闔牙。二便不知。或吐綠水也。宜速放血。而與以利大便。加味酸角湯。三物洋菜湯。三方見亦驗。兼朝夕行湯。脚法敷。降氣泥。見熾於足心最妙。熾熱

宜賜清涼飲。吳腦膜燉腫。撓擾腦髓。以作發狂。熱身體如

灼。頭脈築動。頭痛如破。精神昏冒者。急刺絡。敷頭以蘸

醋布。即用布蘸而以此方下之。見熾

酸角湯。微治腦燉腫。空心服。以痘與區桃盧子乳。見熾里

沒那垓。敗見腐亦宜。若無驗。病勢反加。則當隨頭痛。發於

粟疹內陷者。治法。見熾

清腦水。普微治前症甚佳。

醋。微氏用水。各等分。蒲

右二味調勻。蘸綿布敷之。頭額

四物芥子泥 壽治前症偉効。

芥子末 錢八

虫麻仁 末十錢

蠶豆 末八錢

食鹽 錢二

右四味調醋如泥。先行湯脚日二次。當夜敷。以附痰。至朝去之。

腦焮腫。用諸藥而無影响者。須貼天灸膏滿頭。奇驗。蒲

坐肛藥 蒲 腦焮腫。因痔血過閉發之者。當放水蛭於痔脉

吮痰血。或裏肛門於温湯氣。而取以藥。拈入穀道中。

蓋會

蜂蜜

光明鹽

會缺便用海鹽

右三味調和用。

酸消湯 壽 發狂熱。不得睡者。每平時與以湯一茶鍾。煎

服清解湯。朝夕施。緩和導。並見熾

加味匾挑乳 同 治腦焮腫。熱勢熾妄語止。但不得睡者。

匾挑乳 劑一

白罌粟舍利別 錢十二

右二物攪勻。當夕分服之。病未衰者。切勿與之。

腦焮腫。已膿潰。而雖寒熱退。謔妄減。膿熱相搏。變作苛厲

液。浸淫於四邊。因發頭痛。眩暈。不寐。煩悶。人事昏塞。麻

痺不遂。癩癩。失志。善忘等症。其膿或從眼中泄。或從鼻

耳出若膿流注于頸者必發瘡瘍其攢于眼者必失明也其從耳泄者或蟬鳴或劇痛淹纏難瘥或全聾治之當用緩和分利之藥其早上以令膿易出獲

腦焮腫膿潰而流注肢體以發疼痛者為流注毒也當漏其毒急作降氣泥見熾盛熱敷之間有良驗同

匾挑膏同腦焮腫用對症藥而諸患全退但不得睡者每夕與此方有焮熱之候者必勿用之見熾盛熱

龍匾瓜栗乳同腦焮腫全愈氣力未復時妄語者宜久服之不應者與防癆幾那飲二方見腐敗熱

癩狂

宜腸清涼飲吳癩狂因飲酒無度或服蔓陀羅華等發之狂躁甚者刺絡而選用此飲及大麥清熱飲酸模清熱

飲三方見熾盛熱

地惹利斯散伊治癩狂癩症並濕癬細瘡水腫胸水腹水肺癆肺焮腫肺癰吐血下血等有良効

乾地惹利斯葉未一沙糖二十錢

右二味調和分作二十貼朝夕服一貼羸人半之強人漸加之服之吐瀉甚者加阿芙蓉少許

黃岩散 同 治癩狂。黑液病。黑障眼。神驗。

黃岩葉 十六

麝香

龍腦 各二

沙糖 四

右細末。分作八貼。日服三貼。時間服。大黃末少許。快通。

大便凡服本方者。至天明。乾目眩。而見火。骨狀。為度。如快。必驗。其不及者。服量加三分。已甚者。隨宜減之。

且與乳汁少許。

黃岩湯 同 主治同前

黃岩葉 半銖至一銖

右一味。水煎。取二合。每朝服二匙。

扶歇蘭杜蔓陀羅華酒 同 治癩狂。癩病。黑液病等。

蔓陀羅華實 末二兩

右一味。以葡萄酒八兩。燒酒一兩。淹之。數日。漉去滓。服

十滴。至二十滴。

蔓陀羅膏 治產後癩狂。失性。并癩病。黑液病等。

蔓陀羅華葉 不拘

右一味。搗爛。內囊絞取汁。上艾火。徐徐煎熬。下火。俟冷

更和葉末四分。為膏。聽用。

癩狂。其人素有憂鬱。悲悶等症。而後發之者。宜阿芙蓉劑。

神効脉強實。狂躁甚者。禁用之。

杜衡散。効癩狂者。無熱而謔言妄罵。叫躁。不得寐。去放人。事而無所畏。故慚醜也。宜放血。而以此方吐之。

杜衡根錢末一 浮酒石錢一

右二味細末。一頓服。

四味酒石散。同前症當下者。宜以此散。

紫茉莉脂錢一 礬酒石錢半 浮酒石錢二

龍腦錢四

右四味細末服。

紫葢飲。同前症吐下後。與此方。防其猖狂。

紫葢露百六 麗春花舍利別二十

消石錠錢二

右三味攪勻冷服。

癩并瘰

加味酸角湯。癩病者。卒時顛仆。不省人事。口吐涎沫。肢體搖擗。食頃乃醒。是也。其因於血液稠實。或膽汁鬱滯。或粘液壅塞于腸者。宜選用此湯。及加味梅肉膏。三物洋葵湯。三方見 熾盛熱。乳清飲。清解飲。二方見 聖京健。四物開壅飲。見瘰

白皮... 癩瘰

消石接骨圓。梅肉酒石湯。丹毒

解凝醬子同。痢病腹堅硬拘急者。是稠粘液壅塞于腸之

候也。宜以方。及三物霸王飲。三物亞爾尼加飲。見酒石

碎箭醬見丹毒。輩各驗。

破結石鹼丸同。痢病其人素患脾痢宮痢而肝脾有癥結

者。宜以服此丸。解凝石鹼丸。壯元鎮瘕丸。並見亦效。

四物安神飲同。前症無癥結。但因神經妄擾發者。以方治

之。

非阿斯舍亞護煎膏八。芸香露六十四錢

龍腦薄荷舍利別八錢。葛秘委僕護丁五分

右四物攪勻。一時半服二匙。

橙葉飲同。主治同前。

橙葉八錢

右一味。湯泡溫服。

橙葉散同。主治同前。

橙葉一錢五分

右一味細末。服五分。日三次。

固形丸同。治痢瘕發於身體縱弱。有殊效。亦治其因痢疾

由來

痢瘕

諸失血。漏汗等。身體衰憊。津液涸燥。以發者。法宜先用
乳汁。與肥厚。以補之。而至津液已調。但衰憊未復。服以
丸。強固之。必勿先津液未調。與以

鍊粉錢三 幾那煎膏錢二 安沒尼亞加膠

沒藥 各一

右四味細末。調的列並底那。每一錢作二十九。一時半
服三丸。墨栗薩飲送下。防腐幾那飲。見腐幾鐵酒。幾鍊
膏。並見水腫亦可換用。

阿魏角油丸 伊 治癩癩。官痛。心悸。怔忡。拘攣。搗掣等神驗。

阿魏 錢一 鹿角油 錢二

右二味。調龍膽末。每一錢作二十九。滾刺蝟石末。平時
服三四丸。

五物壯元散 同 治癩癩。官痛。舞踏病。黑障眼。偏頭痛。粘液
卒中。麻痺不遂。眩暈。寒疝等。皆有偉功。

加乃可草根 錢一 橙葉 槲寄生 各半

亞鉛華 五厘 礬砂 二厘

右五味細末。白湯送下。日四服。

羅沃露秘散 同 治癩癩。

加乃可草根分五

麻屈涅失亞

礪砂各五

右三味細末。和加牙布德油。服日六七次。

一味鎮痛湯同治癩癩

加乃可草根錢八

右一味。以水一合二勺至一合六勺。煮去滓。溫服。

曼陀羅膏同治癩病。及產後失心。異液病等。如中肯綮。立

時有効。見癩狂

格密的薩見篤散畫治癩癩。瘰癧。疫熱。痘疹。又能健胃解

諸毒。發汗。退敗腐。制克酸液。發散惡液。防穢氣之上衝。

螭蛄石錢二

解毒子コタラユル

反鼻

酢答

珍珠錢十雙瓜錢十琥珀錢十珊瑚錢十

右九物。細末分服。

朱雀散李治癩癩。

辰砂錢四珊瑚

珍珠各二

撒法即金箔十五

右五物細末。服六黍至一銖。白湯下。以翟氏曰。代辰砂。妙。

鎮神散裴主治同前

辰砂錢二 珊瑚錢一 珍珠半 蜆蚌石錢一

金箔錢三

右五物為散。白湯送下。日二三。

麝香丸 伊 治癰痛。脾痛。宮痛等。並妙。方見非症

鉛華散 同 治前症。

亞鉛華末

右一味。服五黍。日二次。漸加至十二黍。

鎮痛幾那膏子 注 治癰病。發神經虛弱。易觸覺者。又治少

女。舞蹈病。

幾那 二十錢 食而便。答利亞根 若如乃可

右二味作末。調芍藥。舍利別。且夕服。肉豆蔻。大。可三四

月。而後朔望前。服。以四五月。至數月。必效。不須疑。

福烏篤湯 注 治前症。甚良。

朴蜜福烏篤 乾葡萄 各八錢

右二味。以水一升二合八勺。煮至五合四勺。漉過澄清。

每服一盃。

寄生散 治癰痛。每奏良效。猶幾那之於瘰也。

柵寄生 段氏論曰。凡寄生。在柵之與於。其性功莫異也。今古以為治瘰之要藥。而其能專

西醫方選

瘰症

在皮葉必
母太之

右一味細末。每服五分。泡寄生湯下之。日四次。須久服之。真有效。

一婦人患癩。固先天之餘殃。而雖衆醫竭技治之。未嘗見寸驗。乃託之于予。於是取拊寄生末。以麥酒少許。每朝送下一錢。經數旬。遂收全效。

加味白帝散。癩病發前。腸胃有積穢。心下殊苦。慙食不進。温々欲吐者。必吐下之。吐之宜以方下之。宜二仙散。酒石茉莉散。霸王飲。三物飲。二物大黃散。輩方見熾盛熱

壺盧瓢散。癩癩。粘液卒中。昏睡。麻痺不遂。頑癬。久頭痛。

眩暈。喘息。及一切痼疾。並宜此方下之。

小匾壺盧瓢末分一 砂糖錢三

右二味調勻。分作十八服。一時平一服。按此方治所謂陰寒症之諸病。

若用之。陽熱者則其為害也甚。不可令誤也。

鎮痙飲。人因觸事情。易感擾。或掃厲液。侵刺神經。發痙。

痙。不省人事者。宜用綿條布。緊縛胸腹間。嚙揮發鹽。

鹽類迷迭香精。墨栗薩精。乾白揮發鹽。輩於鼻中。若不

失神識。但發搐久不休者。用此方治之。

墨粟薩露 八錢 迷迭香精 錢二 琥珀精 錢二

含油揮發精 五滴 白罌粟舍利別 四錢

阿芙蓉液 十五滴

右六物調勻。每一刻服一匙。至見在退。兩後一二日。開半時。若一時與一匙。

鎮瘧除壞丸 同治前症宜服此方。或燻護回生丸。見歷制厲液。

厲液。

瓦爾拔奴護 錢三 乳香 末 琥珀 一錢

拔爾撒摩亭露 錢半 阿芙蓉 五厘 拍椽皮油 六滴

右五味。調幾那末。每一錢作十五丸。服二丸。日數次。

宜賜清涼飲 同 痢瘧發於血實者。宜先放血。而與此。見歷熱。

痢瘧因脫血暴瀉等發者。宜緊縛腹部。令血潮。心臟 同

如味酸角湯 藥 痢病發前數日。見頭痛。眩暈。頭熱。目赤。脉

弦實。等証者。當放血。而下之。宜用此方。見熾及乳清飲。

清解飲 見聖 四物開壅飲。三物洋萎湯。見瘧消石接骨飲。

梅肉酒石湯 輩 兼行湯脚法。令血氣不上衝。

痢病將發。身中一處作痛。而覺有物衝逆於頭。隨即顛倒。

不覺人專者。用綿條布縛。或以角乾筒子。或貼天灸膏。

或灸之治之同

酒石茉莉散同 癩病其人面色青盈頭頑麻而覺重善嗜
睡眠有醋厲液之候而血氣不上衝者宜貼天灸膏於
項敷酸泥子腓腸以此方見職或永某散加味永某散
並見 辛中等峻下之且行湯脚法月二三次。

龍腦丸同 癩病間時若發前診之無甚異症防發後患難
決何藥之可應者便與以丸子或搗桑散上見探之但非
久服之莫以知應否也。

龍腦錢三

右一味研末調燒酒每一錢作二十九服二九日三次。
殺喪健胃丸同 主治同前

阿魏 加乃可草煎膏各一 蓋會五

右三味以葛私豆儂護丁調之每一錢作二十九取三
凡泡太那食通湯送下日三次。

白蘚醬子同 主治同前

白蘚根錢末八

右一味調芍藥舍利別一時半服一匙

擦珠醬同 主治同前

加乃可草根

拊寄生

幾那各末
四錢

右三味。解毒子舍利別調。一時半服。一匙。

三帛丸 同 主治同前

芥柔鈎吻煎膏 錢一 鴛鴦菊煎膏

結兩蔑斯密涅刺列 各一錢
五分

右三味調勻。每一錢作二十丸。每服二三丸。泡芸香湯
二盃下之日三次。

垂鉛蜥散 同 主治同前

垂鉛華 黍一 蜥蜴石 半
錢

右二味細末。泡迷迭香湯一盃送下。日二三劑。或用五
物瓦爾拔尼丸。非阿斯舍亞護煎丸。見探之亦佳。
五物瓦爾拔尼丸 同 癩病。其人常患異液病。脾癩。宮癩等。
偶因思慮過制。若心氣虛怯得之。神識錯亂。如邪祟者。
此方最好。

瓦爾拔尼膠 安沒尼亞加膠

非阿斯舍亞護煎膏 各一錢
龍腦

葛松多僕護 各二分
五厘

右五味。以琥珀丁調之。每一錢作二十丸。每服三丸。以

泡加密列湯一盃送下。

非阿斯舍亞護煎丸 同主治同前

非阿斯舍亞護煎膏 錢一

右每一錢為六十九丸。一時半服一丸。日一至一錢。或用四

物安神丸。見西魯瑪地加醋中風等並可。

亞魯瑪地加醋 同 痢病發則投卧於清涼之處。數灌冷

水於面。或取此醋中見卒擦鼻額及額顙甚妙。其人虛弱

者。畜鹿角精於鼻中。或搽之額顙。或點三四滴於水一

匙灌口內。如因脾痢。官痢發之者。加葛私多僕護。若阿

熱

龍匾瓜粟乳 同 痢發少頃自醒人事。言語稍復。但拘攣久

不止者。宜以方。見瘡及鎮症甚香飲。見黃四物安神飲。見上

輩。

三製薄荷飲 同 癩痢復甦而虛脫甚者。宜用以。

龍腦薄荷露 五十錢 龍腦薄荷合利別 十二錢

龍腦薄荷精 六錢

右三味搜和。一時或一時半服二匙。三味墨粟薩飲 見方

水亦良。

九、癩發於諸瘡毒內攻。經閉等者。當治其本病。本已治。癩自愈。同。

壯元鎮症丸 同人 有聞動物或植物之氣。乃發搐已。其神識昏塞者。必勿忽之。恐成癩病。此方主之。凡失苟選用。幾鏡酒。幾鏡醬。並見水腫亦佳。

頭痛

清腦丸 吳 頭重痛。而無休歇。曠日彌久。淹纏不愈者。惡液潛於腦中也。宜以此方下之。又治其因。胃中有惡液者。並佳。

安沒尼亞加膠 錢一

藜合香 分五

質汗沒扭護 錢一

酒石鹽 錢十

迷迭香油 滴五

右五味。每一錢。作二十九。朝夕服六丸。料下利。增減之。以令上。廁日二三行。

誘嚏清腦散 同 治前症。能導泄惡液。

萊沃刺那

龍腦薄荷

墨栗薩 各一錢

龍骨木脂 十

右四味細末。稍々嗜。鼻內日數次。

蘆會丸 晝治頭痛及頭瘡。累歲不差者。

琥珀 乳香 各二錢
盧會 五錢

落葉松寄生 一錢五分
青木香 五分

右五味細末。別篤尼加舍利別調作丸。

壺蘆酒 伊治頭痛及齒痛。發於粘液若生機失常者。

小匱壺蘆 十二錢
八角茴香 八錢

右二味淹燒酒四合。候藥味出。濾去滓。每服十五滴。白

湯熨服。日四次。至大便瀉。

嬰即發汗。圓吳治頭痛。因聖京健者。

白嬰粟舍利別 八錢
撒法郎 半錢

汗銘石 一錢

右三味調勻。臨卧以温葡萄酒少許下之。

解肌撒法郎醬子 同 治前症。

接骨木子醬 八錢
撒法郎 半錢
阿芙蓉液 十滴

右三味調勻。每夕服一劑。至屬液悉解。

灌頭精 同 療前症。

迷迭香精 八錢
急製礪砂精 一錢

右二物調勻。淨洗其頭。或剃髮灌之。

玄武餅 其人 不思食 則難化 噫氣臭敗 次養頭痛者 胃

中有穢積也 宜以方或鉅石酒 加味乙百葛裕安那酒

三方見 等涌之 而與健胃丸 方見 輩調理之 且間服清

腦丸 上見 令大便不秘為妙

宜腸清涼飲 吳 頭痛發於血液上衝者 數放血而與此飲

見熾 下之 第敷蘸醋布於頭

頭痛不可忍 發不寐 諸語等 証者 宜先施導方 或緩下之

而取阿芙蓉液二十滴 用泡加乃可 草一盃 送下 塗定

痛酒 下見 於頭有速効

定痛酒 同 療前症

白石酸 錢八 阿芙蓉液 錢三 醱燒酒 錢七十

忘三物調勻 置冷煖處三日 瀝去滓 和龍腦三錢 蘸布

敷頭

定痛排毒丸 同 治頭痛因伊屈篤毒者 宜服此丸 見伊屈篤

貼天灸膏 見熾 於四肢 蒲氏製諸

魚鬚葡萄湯 蒲 頭痛發於疥癬癩毒等者 宜以方發越蒸

氣和解厲液

粘臭鬚 錢二十 乾葡萄 錢八 甘草 錢四

右三味以水一升九合二勺煮取六合四勺濾去滓服三合二勺久久必效

臭鬚奇根湯 治頭痛膠固而難愈者

粘臭鬚 土茯苓 各十錢 甘草 八錢

右三味以水一升六合煮去滓温服

鎮瘥水 伊 偏頭痛及一點頭痛者多發於宮癩也此方治

獲哇弗兒越的兒 加乃可草 各二錢

非阿斯舍亞謨煎膏 一錢

右三物調和料病之輕重與六七滴至十五滴

定癩水 治頭痛不寐黑液病癩狂並有異效

醃醋 十六錢 舍利別 四錢 酒石鹽 一錢

忽弗為止痛液 二錢 温湯 三十錢

右五物攪和平時服一匙

眼目

清明膏 煨腫眼 所謂者煨赤刺痛乾涸无潤羞明喜暗

脉有熱狀也若由痘疹疥癬癩瘡失苟兒陪苦伊僣篤

等毒得之者放血而此方下之

紫茉莉末二錢

浮酒石三錢

梅肉

接骨木子醬

各十錢

右四物調勻一時服一小匙至大便瀉酒石茉莉散霸

王飲并見熾汞菜散加味汞菜散並見亦可撰用弟取

消散藥以水酒各半煮罨眼上絕勿敷貼收瀉之藥

加味大麥飲同前症下之後宜多服以方或瓦刺獲酸模

湯洋葵清燥湯三方見熾洋葵甘草湯乳清飲並見輩徐

解其毒

天灸膏同前症淹纏已愈者或屢發之涕淚多出視不明

者並貼以膏於耳根若項日換更之洩其粘汁一法先

皮切之方五分浸醋十二時乃傳先膏於手肘至

殺爛搗去敷之瑞香皮以大蓼葉蓋之用綿條布縛之

明目膏同前症用天灸膏等療之焮痛已止紅赤曇暗仍

存者與白頭翁散見或逐痰丸見聖熈以膏於目中

牛酪新鮮者 亞鉛精一錢 過關石即

丹礬分 赤汞一錢 五黍

右四物調勻如膏聽用

浮礬酒石散同焮腫眼疼痛寒熱等劇者宜放血行湯脚

每三四日。用以方。或與霸王飲。三物飲。加味梅肉湯。加味酸角湯。三物洋葵湯。六方見藏盛熱葷通大便。或施下導方。並良。

寒水飲吳外治眼目焮赤腫痛。

凝水石四錢 乳清百九十錢

右二物攪勻。平且服之。

清下散蒲治焮腫眼。先放血。而每二三日與之。

芒消 酒石

右二物細末。服用消黃散。若酸角湯亦好。兼作大麥湯。

加蒲桃酒少許。每夕臨卧服之。發越蒸氣。兼行湯腳法。以水灌頂。若不應。貼天灸膏於額。若項。若耳根。必愈。散鬱泥。兼治眼。焮腫赤痛。乾涸甚者。及其勢稍衰。疼痛不劇者。並妙。

林檎肉 蒸餅心各二十錢 接骨木花二握

龍腦半錢 撒法即錄一

右五味以水。煮上三味。如泥。內餘藥。和勻。溫敷眼上。冷即換之。

蜜陀蓄覆水同 前症。疼痛寒熱共止。而眼中纖維縱緩。淚

汪々出者宜以此方收固之。

蜜陀僧醋

分二

薔薇露

八錢

右二物攪和熨目中。

亞鉛礬水

同

主治同前。又治淚眼。

亞鉛礬

一分或作亞鉛華五分

薔薇露

八錢

右二物攪和熨眼中。

筆氏用亞鉛華一錢半。薔薇露三錢。消清水二合。作之。至大同小異。不足別提併錄於此以備簡採。

清明水

同

主治同前。

玫瑰露

四錢

搥揅核乳

八錢

右二味攪和熨目中。

匾桃醬

同

煖腫眼。放血清下之。其症已解仍不得眠者。每夕與此。見熾盛熱。

羅獨定萬兩

發領

治煖腫眼。發於纖維地弱。

蜜陀僧醋

四錢

燒酒

十六錢

蒸餾水

百九十二錢

右三物調勻。玻璃瓶內收貯。聽用。

確鉛水

蒲 主治同前。

鉛糖

確砂 各四

右以清水一合六勺消之。聽用。隨症加阿芙蓉液四五

十滴

定痛泥治 焮腫眼疼痛甚者

黃麥粉 洋糖分等

右二味同卵黃研和如泥和樟腦精少許塗布覆眼上

清眼水同 主治同前

明礬一銖 洋糖二銖 樟腦精十滴

清水六勺

右四味內玻璃瓶振盪和勻澄清時點目中

礬石明目膏同 主治同前不堪樟腦者宜此方

明礬五分 卵白一個

右二味研勻如泥塗布覆眼上每一二時換之

薔薇乳波 主治同前

薔薇露四錢 卵白一個 人乳少許

右三物調勻點眼中

散鬱膏同 治焮腫眼熱痛刺者

亞鉛精修製者一錢 龍腦一銖

右二物以薔薇露胡蘆巴汁各半和勻點目中一取茶

苾汁護布覆眼上並佳

蒸餅泥同 主治同前

白蒸餅心 薔薇露

右二味同搗爛如泥。登眼。

清華水同治 焮腫眼。疼痛已止。癢痒難忍。視物不清者。

鯀膠 五銖精修製者 盧會 沒藥各五分

砂糖一錢 銅綠五茶

右六物用薔薇露。茴香露。各十二錢。白葡萄酒。十六錢。

煮至三分一。布過朝夕。熨眼中。

神驗明目膏同 治天行赤眼。一名聖京健眼 焮痛甚。淚多出者。如

神

五銖精修製者 珊瑚修製者 珍珠修製者

尼比爾二錢 亞兒二錢 龍腦半錢 家豬脂三錢

右六物內乳鉢研勻。臨卧取胡荽子大熨目中。

三物蒸餅泥蒲治 眼目熱痛甚者。

蒸餅 乳汁 阿利襪油若牛酪

右三味調和。每夕夾之。綿布敷眼上。至朝以乳水湯見

洗眼。如不得寐者。每夕與阿芙蓉液十五滴。至二十滴。

匾挑龍腦水伊治 焮腫眼淚多。流出有奇驗。

龍腦五 匾桃仁六 亞鉛華極末半錢

西電法護阿芙蓉液十二滴

右四味先取龍腦匾桃仁研和徐徐加水至如乳汁約

取二十四錢和餘藥點目中

一方同 焮腫眼疼痛已解或未解者並用此

匾桃仁二 龍腦五 鉛糖七

西電法護阿芙蓉液四十滴 亞鉛華一錢

右五味先以水研調仁龍二味如乳汁取二十四錢下

餘藥和勻釀之置布卷眼上

掉腦茴香水筆 眼目損傷生血斑焮熱不劇者點此散凝

血

茴香露四錢 掉腦精二錢

右二味調勻聽用隨症減掉腦精

卵白膏鋪眼目焮痛由打撲發者急刺絡而點此膏

薔薇露 卵白 鉛糖少許

右三物搜和釀之撒絲卷眼上乾則更換以方宜於初

起若歷日焮腫甚者以大麥湯見熾盛熱 輩清下之以疎閉

藥蒸患處或清水加燒酒十分一溫之釀布以覆之

消熱泥外治眼腫

馬齒莧汁

佛甲草汁

石胡荽汁各十錢

右三物調麵粉如泥覆眼上

甘露飲同主治同前

甘露蜜二兩

乳清二斤

宜母子汁少許

右三味調勻分服之

三消散同主治同前

霸王鹽

礬酒石各一錢

凝水石二錢

白糖一錢

墨栗薩油四滴

消熱泥外治眼腫

馬齒莧汁

佛甲草汁

石胡荽汁各十錢

右三物調麵粉如泥覆眼上

甘露飲同主治同前

甘露蜜二兩

乳清二斤

宜母子汁少許

右三味調勻分服之

三消散同主治同前

霸王鹽

礬酒石各一錢

凝水石二錢

白糖一錢

墨栗薩油四滴

右五味調勻服二錢至半錢日三

酸梅湯同主治同前

酸角八錢

梅肉二十錢

乾大葡萄十六錢

乾小葡萄

蒲公英

苦菜花各八錢

斯格爾斯業刺根三十錢

霸王鹽八錢

失格列加大黃舍利別

右先取上六味水煎一刻取八合下餘藥和勻半時服

十六錢至大便瀉

幾那消焮湯蒲眼目焮腫因于幾里兒腫脹者不易治也

西醫大選

卷五

四十四

此方奇驗

幾那末八

印的蘭皮 錢一

甘草 錢四

右三味以水六合四勺煮上二味減半下甘草候藥味出瀝去滓服二三匙日三四次

桃花水 泥治焮腫眼良効

桃花石 末

冰糖 各二十 錢四

亞鉛礬 錢十二

右三味研細入玻璃瓶內灌清水放置三四日瀝去滓沃眼日二三次或蘸綿布罨眼

神効水 同治焮腫眼愈後顯星翳者

神効石

末一錢。製法。明礬。消石。丹礬。龍腦。各等分。同為細末。文火使煇解。下火。旋冷。乾之。內

封收貯。

蓄薇露 錢八

右二物攪勻。點目中。日數次。効極神。

退翳散 外翳眼目從內外皆。或上下臉生一片白膜漸延長。

而蓋烏睛者。是名翳障。宜用以散治之。初起。

確砂

烏賊骨 各一 錢

冰糖 五 分

右三味研末吹入目中。

確砂水 同主治同前

確砂 錢一

蓄薇露 二十 錢四

白屈菜汁 八 錢

右三物盛銅鉢放置一日餘。熨目中。

翳膜軟而不厚者。取白屈菜汁少許。熨之目中。甚妙。同○

與極峻烈。宜下其量。與之多用。則有大害。

焮腫眼。天行赤眼。暈暗。星翳。皆宜阿芙蓉液。即取二三滴。

點眼中。日三次。良驗。但焮腫甚者。加水少許。用之。設令

痛。加勿驚之。淚出痛乃止。雜

升汞水同。治焮腫眼。經久不差。或眼眶赤爛。角膜星翳。努

肉。簾障。皆佳。

升汞一

茶

右用蒸餾水八勺。消之。熨患上。或加阿芙蓉少許。作三方

若目睫成紐。眵糊封着。不得開者。蘸以綿布敷之。

磨翳散治眼目星翳

麋膠 烏賊骨 白糖

右三物細末。先用錦葵。胡蘆巴等煎汁。熨眼目。而點以

散。

天然水同。主治同前。

芸香汁 茴香汁各等分

右二汁和勻。加水糖少許。點眼。日二次。

切潰瘍。

阿利磯油九十錢

黃蠟

礬甘石修製者各四十八錢

右三物先烱化油蠟次和礬甘石冷定敷患上加甘汞少許用之則効益速。

排膿熨波治內翳初起所見狀如煙霧或如蚊蠅或如毛

髮或如蛛絲或如火輪者。

加密列花二握

錦葵葉

洋葵葉各一握半

亞森仁

胡蘆巴各四錢

右五物水煎柔溫蘸綿布熨眼。

消毒丸蒲視物曖昧或失明者是為昏朦眼其由神經虛

弱及麻痺者不治也若水液過塞神經而使然者疏

利之乃愈此方主之又治內翳未經歲月者。

水銀

蜂蜜各四錢

石鹼勿搗茶產二錢

大黃末十錢

右四味研和舍利別丸服且貼天灸膏於頭頂耳根等令瘡久不愈為妙。

升汞酒同前症服消毒丸貼天灸膏而居然無効者與此

引涎。

升汞 十二

右一味為細末調燒酒三合二勺每服一匙日二次隨服粘兔髮煎一合六勺

一方鋪內鬚發於血液稠粘未經久者宜以

鼠婦 生新者二十個

右入臼內下葡萄酒同搗爛絞取汁平且服之數旬乃奏效

黃宕湯 伊 治異內障百日咳痰瘰頑癬癩瘡

初服一分五厘次二分五厘至三分五厘乃驗用黃宕

散亦得 癩方見

二味幾那湯 布治雀目晝盲

幾那 加乃可草

右二味水煎溫服法先下之後用此湯

耳病

霸蒼凝糖散 外治耳病因吹腫者并膿血充塞鼓空而聲

妙

霸王鹽

礬酒石 各一錢

凝水石 二錢

白糖 一錢五分

右四味為末和墨栗薩油四滴每服五六分日三服
加味乳清飲同治前症

凝水石或霸王鹽 乳清九十

右二味調勻朝服之

旃消導同治前症

旃那四錢 旃那舍利別八錢 消石二錢

右三物先水煎旃那取二合六勺下餘藥和勻向肛門射之

甘麥葡萄飲蒲 耳竅焮熱腫痛者須刺尺澤或以筒子角

於項或以錦葵花湯用加蜜列熨耳上時行湯脚法作

大黃消石散與之見丹毒用此飲代常飲

大麥 甘草 乾葡萄或以無花果代之

右三味水煎溫服蘇氏曰耳焮腫者治法與腦焮腫同

蒸餅泥同前症施前件方法而不解者宜溫此泥塔之耳

上令膿潰用煨葱亦驗見症

酸模外吳療前症

生酸模三錢 瓦爾拔奴四錢 黃溶解之

牛酪八錢 亞麻仁粉宜適

右四味先水煮熟。如泥。下餘藥和調。乘溫敷患上。

雙油膏同治前症痛劇者。

胡菀油 洋葵油各十錢 黃蠟八錢

右三物煉和敷患上。

董萊熨同主治同前。

董萊葉 非阿斯舍亞護葉各二握

右二物以甘乳汁煮去滓。蘸綿布熨患上。

薔薇卵黃膏同耳痛因臭瘡發者。取此膏。綿入之。而以乳沒酒下洗之。

薔薇油八錢 的列並底那二錢 卵黃一個

右三物煉和用。

樟腦精藥治耳痛因虛寒發。或取醇乾酒者。又治打撲損傷。骨傷。脫臼。等。悉良。

樟腦十六錢

右以燒酒四合九勺。消化。蘸綿撒絲。綿入耳內。

耳痛因聖京健毒者。取阿芙蓉丁。蘸綿絮。綿入耳中。

玫瑰酒外膿從耳裏出者。多發腫。傷於耳邊之所致也。宜用此防其侵蝕。

玫瑰花一握

右一味。淹赤葡萄酒一合六勺。温射耳中。

乳没酒同前症膿稠而臭惡者。用此洗耳竅。

乳香各二錢 没藥各二錢

右二物。入玻璃瓶內。沃燒酒。薔薇露各四勺。密封。温用。

之。

薔薇筒同耳聾因打睥膿血凝結而充塞耳竅。或侵蝕鼓膜者。用此。

薔薇蜜八錢 大麥煎汁四十錢

右二味調勻。微温射入耳中。洗之。或加的列並底那四錢。雞子黃一個。燒酒八錢。用之亦妙。

耳聾因頭寒。發者。宜緩下之。臨卧行湯脚。其因打睥乾涸。

充塞耳內者。滴入阿利襪油。射注乳水湯。方見瘡蒲。

潤燥油同治耳中乾燥而聾者。

匾挑油各四錢 浸阿魏酒各四錢

右二味攪勻。每夕臨卧。雙三四滴于耳內。以綿撚子塞之。令油不漏出。

耳聾因于濕液者。當乾涸之。施打膿法。於耳根有殊效。同

耳聾難痊者。取鱧鱘膽。調燒酒。滴之。耳竅。或用麝香一二黍。畏綿肉之。同。

衄血。酒皸鼻。鼻痔。

加味消石飲。微衄血。發於喉腫諸病。或血實者。勿妄止之。是正氣欲排患害也。但衄甚。菽脈微弱。顏唇慘青。惡心暈倒等症。即可止之。宜此飲。

消石 六黍至八黍

醋 一匙

右二味。調一盃水。一刻服盡。兼縛肘脚。或以溫湯浸膝下。蒲氏曰。服水醋各半。亦好。

大麥芒消飲 蒲 主治同前

大麥煎汁 四兩五

芒消

甘露蜜 各半兩

右三味調勻。一頓服。

玫瑰蓉精飲 同治衄血。効太奇。

玫瑰丁 一茶匙

緩綠蓉精 二三十滴

右二味調勻。每半時服之。

大麥消石湯 微治衄血。方見 最佳。匾挑盧子乳。見熾 亦効。

西鉛蓉水 同治衄血。

西鉛蓉 錢一

右一味以水二匙消之。蘸綿撒絲入鼻中。不應者即代以芴弗滿止痛液。或頭燒酒和醋三分之一者共良。二簪散蕭治衄血

枯礬

亞鉛礬

砂糖

各等分

右三味研末。別將卵白濕綿布乃滾。此推入鼻中。或冷水漬陰莖良久。極效。

寄生散

微治衄血不止

落葉松寄生

右一味細末吹入鼻中。或維入之神驗。取醃燒酒射注。

鼻孔或蘸綿撒絲入之亦宜。

酒石散

微衄止後必當朝服此散夕服消石散
並見瘡

幾那酒蕭治血液稀涼而衄者宜久服此
瘡見

衄血灸湧泉乃止。
露作

鼻中水液過溢不聞香臭者取小茴香油調麩粉或樟腦

和匾菹油插入鼻中。並即效。蕭

鼻涕乾涸不聞香臭者取亞鉛礬煨過一分調之。菜沃刺

那露四勺布過。膏鼻中。同

神經壅塞而香臭不聞者取枝兩撒摩字露調龍涎香油

少許擦之額上同

治酒皸鼻方

外効

白石脂八錢

官粉四錢

硫黃二錢

升汞十錢

右四味作末調燒酒塗之患上或以石灰水洗之或取

卵白十六錢明礬二錢攪和敷之亦効

枯痔水

外吳治鼻痔及息肉

鉛糖或綠礬或銅綠一錢

薔薇露八錢

右攪勻以羽塗之日二三次雖入之亦可

礬汞水同主治同前

枯礬四錢 升汞四錢

右二味研末調茶苴露一合二勻塗患處

又方外効主治同前

升汞一錢五分 綠礬油一分六厘 鏡漿四錢

右三物攪勻塗之日二三次

齒牙

三物茉莉散從齒痛其脉不強數無頰腫口熱等症而經

久不差者支聖京健毒之所致也此方下之

紫茉莉 旃那 浮酒石各五分

右三味細末服之。

遺根湯 治前症用三物茉莉散下之後與此湯。

土茯苓

粘兔鬚 各十錢

薩撒弗刺斯

朴憲福烏篤 各八錢

右四味細剉以沸湯二鉢煮半時去滓溫服與蘇合香

丸。見感冒的里亞加亦佳身貼天灸膏於項尤良。

前症取烟草少許令啣之或夏之痛處或含礬石引涎吐

妙。同

連錢迷迭醋 本治前症。

迷迭香

連錢草

等分

右二物以水醋各半煮去滓微溫食之。

三和液 治齒痛。

樟腦油 一錢

阿芙蓉液 十錢

燒酒 二十錢

四錢

右三物調勻屢食之。

壺盧酒 治齒痛頭痛發於冒寒毒而經久依然者。方見

丁香止痛油 治齒痛因齩。

丁香油

阿芙蓉丁

若樟腦油 各等分

右二物調勻蘸綿實之齩齒或用忽弗滿止痛液共驗。

芙蓉樟腦錠波蒲治前症。

阿芙蓉波氏用 樟腦分

右二物和勻作小挺子實于鵝隙。

水楊煎波治齒痛。

水楊葉半握 雞兒頭根四錢 無食子二錢

右三物水煎食之。

消石散微 齒痛夾面赤脉強頭痛發熱等症。齒齦嫩腫或膿潰或頰腫而其痛減或居然者為因熱發也。宜放血與此藥見感冒切禁酒肉熱藥。

幾那散同 齒痛發歇有時者。多因胃虛寒也。必勿用涼藥。

犯之痛轉加也。此方主之。方見麻疹

齒痛發於胃中有穢積者吐下之後飲燒酒一匙數則愈。本

固齒藥波 治齒牙搖動。

石榴皮 礬石各四錢

右二味以水四合煮類々令軟。

咽喉

接骨錦葵飲蘇 喉風初起俄然惡寒次發熱四肢倦怠飲

食難下脉強數者宜多服此方見熾熱或洋葵甘草湯洋

葵甘草飲並見瘧疾朝夕服蜷蛄消石散見熾熱反微汗神效

霸王飲同治喉風寒熱甚腫痛而飲食難下者宜先刺絡

量強弱而選用此飲或酒石茉莉散三物飲加味酸角

湯三物洋葵湯輩若不能多服之施導方瀉之至腫減

連服洋葵甘草湯洋葵清燥湯加味大麥湯以上方見熾盛熱

輩亦佳

洋葵甘草湯同喉風乾燥腫痛者宜用此湯頻々含漱又

引溫湯氣蒸咽中若痰涎纏之漱以洋葵清燥湯而腫

減水漿稍得下咽乃服此湯見瘧或加味大麥湯見熾熱至愈

愈

石鹼同治前症前方不効腫痛反加飲食不下

異石鹼

右一味水調如泥敷頸良効若過三時不應更貼天灸

膏

緩和熨壽咽喉腫閉氣息難通聲啞不出者最危或死在

頃刻也宜急灸放血角乾筒子於頸合和胸湯見聖於

口用此熨頸神効

緩和湯 見下料八錢

右以水煮熟加芥子末八錢搜和如泥。乘溫敷頸冷則更換晝夜勿止。

加味和胃湯 同 喉風得水漿下咽者宜作此湯與之。

即和胸湯 見聖九十六錢消消石一錢者。

奇應油 善治喉風功效甚廣。壽氏曰：頭胸現赤者善微也可治。

阿利襪油 分二鹿角精一分

右二物調勻。蘸綿布一刺。後纏之。頸每二時更換之。

清涼導 真喉風初起惡寒振慄恰如熱病次咽喉腫痛。

呼吸不利。飲食難下。而頸或腫或不腫。法當先刺。終熱勢仍不減。速再刺之。遲緩則咽喉腫閉。而氣息窒塞也。而用此以導大便。

精大麥 酸角 各八錢 旗那 三錢 蜂蜜 八錢

右以水三合二勺。先煮上三味。取二合四勺。下餘藥和勻。向肚門射之。水漿得下。則以宣腸清涼飲。盛熱下之。此水湯同療前症。

玫瑰花 接骨木花 各半 蜂蜜 八錢

硫黃精 適宜。若無則用醋。或枸橼汁代之。

右四味先以水二合煮上二味去滓和餘藥含而潤咽
 喉取蒸餅母或酥滓魚則以醋與水代之與亞麻仁末搜和如泥
 繞頸敷之水漿得下者大麥湯加拘櫟汁消石錠少許
 飲之

積熱咽喉腫痛者先放血五六次而後角筒子於頸大驗
 徵

大麥酒石飲同治咽喉腫痛甚者多服此方見舊或匾桃
 盧子乳見熾盛熱若水漿不下則每一時半施錦葵導見熾盛熱
 導大便或頻々行湯脚法甚良

瓜子匾桃乳寡治喉風

甜瓜子 匾桃仁各八錢 消石五錢 砂糖適宜

右四味先以水與上二味同研如乳汁取百四十四錢
 下餘藥和勻服之

接花消石湯壽喉風不得眠者宜與此湯每二三日服宜
 腸滿那飲見聖健取下以至腫消

接骨木花八錢 接骨木子膏十二錢 消石二錢

右以水先畧煎接花取四合八勺次和餘藥半時服二
 杯頻々含接瑰消石湯見下

接瑰消石湯同 主治同前

接骨木花

玫瑰花各八錢

消石一錢

右三味合每取三撮泡湯含之

散毒筒同 治喉風喉腫甚湯液不下者

海水八兩

白蜜三兩

阿利襪油宜適

右攪勻溫向咽射之

錦葵化毒泥微 治喉風元

錦葵花

寡氏用錦葵花末半斤接骨木花十二錢

右用水或乳汁煮爛如泥敷頭

天灸膏蕪 喉風咽痛水漿不下強飲則從鼻出氣息難通

頃刻面變紫赤目突出口吐舌者宜急刺絡施導方敷

消散藥以溫湯熏咽中角乾筒子於頭若過三時不應

乃敷此膏滿頭間奏效而水漿得下者速選接骨錦葵

飲霸王飲見熾盛熱 洋葵甘草湯見瘡輩服之

清明膏子伊 治喉風腫痛甚放血而腫反大者尤效

紫茉莉脂十六

接骨木花露

洋葵舍利別各二錢

右先取雞子黃適宜與茉莉脂同研和餘藥一頓服

又方同主治同前

紫茉莉脂十六

燒酒二

董菜舍利別三

右三味攪和一頓服

酸涼水灌治喉風喉熱腫痛呼吸不利聲音嘶啞漿粥不下或冒寒喉癢聲啞者

醋水各三十二錢

明礬末四錢

蜂蜜一匙

右四物攪勻微溫含漱日二三又治急喉風先放血次此方加樟腦精漱之且取燕麥粉三匙蜂蜜一匙以水煮煉如泥和阿利被油一匙乘溫敷頸

神効導同前症大便不通者宜用此導其毒

芒硝十二錢

蜂蜜一匙

溫湯九十六錢

右攪和射肛門

清咽裏灌治喉風腫塞氣不通水漿不下奇効

水六合

醋二合

蜜二匙

右三味攪勻入罐內燒石令通赤投其中倒覆漏斗令所吐氣熏入咽門

大麥加乳汁湯壽喉風腫塞飲食不下者射此湯於肛充食以至腫潰食下

甘乳汁九十錢 大麥煎汁四十錢

右二味攪勻。寡氏代大麥煎汁以卵黃二個。

榮養乳藎 主治同前

挂一錢 沙糖十二錢 薄荷油六滴和沙糖少許

右三味以乳汁清水各二合四勺先煎挂瀝去滓下餘

藥和勻供用。

雞肉煎同 主治同前

雞一隻 沙糖十二錢 薄荷油六滴和沙糖少許

右先取雞連骨肉搗爛以水七合二勺煮熟瀝去滓和

餘藥從肛門射之病人虛弱者與熱者加白葡萄酒一茶鐘。

燕麥煎同 主治同前

燕麥粉二匙 麥藥一匙 挂二錢 沙糖四十錢

薄荷油二三滴 葡萄酒一茶鐘

右六味以水九合六勺先煮上三物減半瀝過和餘藥

射注肛門。

緩和湯同 喉風將瀆者速合以促之。

加蜜列花 洋葵根各十錢 五種緩和草四十錢

胡蘆巴 麻仁各八錢

右件合和取三十二錢水煎二刻取七勺太滓棄溫類含漱之或用積筒徐徐射咽門且取此滓加亞麻仁末亞麻油各十六錢和勻如泥晝夜溫之熨頸

大麥瑰石湯 治咽喉諸症

大麥煎汁 四錢 玫瑰蜜 八錢 消石 二錢

右三味調勻微溫含漱之

經驗含漱湯 治喉風未潰或已潰者

玫瑰花煎汁 若覆春花 煎汁四合 醋 四錢 蜜 十六錢

右攪和溫含之不能者用積筒射患處疼涎出立効
則蘭地名國俗治喉風散藥

白礬

右一味細末以管吹患處或以亞鉛礬礪砂明礬作之

又方 同

礪砂 煨乾者

右一味細末以管吹患處

又方 同

礪砂 八錢 亞鉛礬 二錢 明礬 二錢五分 消石 錠一錢

右四味細末。以管吹患處。慎勿吹入氣管。令噴。開關湯同治喉風。

無花果煎汁若乳汁大 礞砂精少許

右二味調勻。數含。口甚良。

無花果湯伊 治喉風。

無花果

右一味。以乳汁及水煎。滴入礞砂精少許。含漱之。

玫瑰龍牙湯壽 治喉風已潰者。

玫瑰花二撮 龍牙草一握

右二味細剉。泡湯去滓。和蜂蜜少許。頻含漱之。瘡口速愈。

大麥加薔薇蜜湯昆蕪 療喉風已潰。膿水不惡。厲者。

大麥煎汁百四十錢 薔薇蜜八錢

右二物攪勻。頻々含漱。

四物芸香漿同 療喉風已潰。膿水惡厲。臭氣衝鼻。四邊紫

是。腐爛甚者。

芸香 斯格爾各一握 薔薇蜜十二錢

沒藥丁二錢

右四物以溫湯先浸上二物片時。取三合六勺。去滓下。餘藥和勻。頻々射咽洗之。

鈎吻接骨漿同療前症。

芥葉鈎吻葉

接骨木花

各一握

蜂蜜

十二錢

右以沸湯浸上二物片時。取三合六勺。下蜜和勻。射咽洗之。

鈎吻煎丸同前症侵蝕甚。欲穿頸及食道氣管者。難治也。

急射注鈎吻接骨漿上見洗之內服此丸。或大蓼飲。見聖

京間有良驗。

玫瑰加鹽精密壽治咽喉腐爛。惡臭不可近。或其色紫黑者。

者。

玫瑰蜜

八錢

海鹽精

二十滴

右二味攪勻。用筆塗患處。日六次。腐爛轉甚者。增海鹽精。內以接骨木花泡湯服。一二茶鍾。日四尤佳。

二味幾那飲藥咽喉微腫。作燥痛。頭緒線或異斑。脉近平。

而四肢倦怠。微渴。頭重。或滿喉青異。小疱發生。漸腐蝕。

四邊。膈內煩熱。口臭不可近者。是敗液之所致也。當防。

過之。宜服此方或三物幾那飲。幾那石鹽湯。輩取淨穢水或接骨蓄薇水二方見痘漱之。

接桑鹽精漿蕪治前症腐爛。狀色如猪脂。或生息肉。如海

綿和者名者

接骨木花露 百四十錢

桑椹舍利別 十六錢

海鹽精 五分

右三物攪勻。含漱之。或用玫瑰加鹽精蜜見上亦得。

甘和湯同前症用前方。輩不堪其刺戟者。宜用此湯漱之。

大麥煎汁 百四十錢

搵椹核汁 十六錢

若格寶溫八錢

右攪勻。

蓄薇核汁蜜同主治同前

蓄薇蜜 搵椹核汁 各八錢

右二物調勻塗之

硫黃含漱水昆春時濕熱之候。有生一種喉瘡者。初起微寒熱。無幾自解。次咽喉覺痛。發白疱。四邊赤。而痛甚。若失治。則至咽喉蝕爛。臭氣不可近。急用此方治之。

硫黃精 不約 清水 居 接骨木子醬

搨皮八錢

明礬一錢

玫瑰蜜八錢

紫釰丁四錢

醋十六錢

右以水六合先煮搨皮去滓和餘藥合漱之隨取錢片燒紅揆之朱砂一錢裏咽門

加味羌活飲同咽喉發寒液腫者無熱不渴而飲食難下

也宜選以方或壯元飲菩薩香草飲以上見熾盛熱導水飲分

消飲元見承葉飲見卒中風清熱瀉心丹見眼目三物飲酒石

茉莉散霸王飲以上見熾盛熱輩治之用菩薩香草飲撒兩比

亞飲見熾盛熱漱之取蠶豆粉接骨木花樟腦盛囊鏡頸若

不應則貼天冬膏

燕窩泥吳咽喉發寒液腫者無熱而腫閉妨呼吸飲食也

以泥治之

燕窩菜大

加密列花少許

右搗爛如泥鏡頸敷之貼天冬膏亦得

乳香錠同治前症齧以錠泄寒粘液

蠟大乳香少許

右二味煉和作挺子

散寒湯寡咽喉生寒液腫者則令飲食難下呼吸不利也

宜用此湯。

扑蜜福烏篤皮八錢 薩撒弗刺斯 黃檀各四錢

角茴香二錢

右四物以水七合二勺先煮福烏篤皮至二合四勺內
餘藥候藥味出下火去滓温服若氣息欲窒塞者以針
刺其腫上令水液漏出

杜松實飲同 主治同前

杜松實十六錢 杜松實醬十六錢 海葱蜜十二錢

右三物以杜松實露四合八勺淹杜松實置煖處一時

半漉去滓下餘藥和勻服之

逐寒酒同 主治同前

野艾蒿稍十錢 泥菖根 龍膽 羌活各八錢

老里兒子十二錢 罷傑兒搗子八錢 藜蘆子八錢

杜松實二十四錢

右七味淹好葡萄酒一升九合二勺十二時漉去滓服

桂皮海葱酒同 主治同前

桂八錢 海葱四錢

右二味淹好葡萄酒四合八勺出藥味去滓服

茉莉酒 同主治同前

紫茉莉脂 十一 泰

右一味消葡萄酒和砂糖服之。

人有因痙攣咽喉喉塞欲死者一刺即治然易復發

預用平痢飲或鎮痙丸見痢防之 吳

鉤吻接骨漿種喉風已差有扁桃肉或頸幾里爾尚留腫

硬而飲食難下者宜用此漿頻含漱久服逐痙丸大薊

飲見聖必勿用 辛熱化腐藥

壯元鎮痙丸 同痙痙家往往有覺咽喉縮結狀如有灸齧

妨吞嚥呼吸者以羽角蹄類奠之或以阿魏鹿角精葛

私多僕護揮發精類喘鼻則變而其患速解然易復發

宜用此丸子防之其因神經虛弱者久服幾鐵酒或幾

鐵膏水腫 尤佳

樟腦導 食道麻痺而噎飲食者甚危也其人血實者刺

絡不血實者射以方或雙花飲於肛門疏滌腸又射入

肉羹米飲類於肛中以充食貼天灸膏於頭

樟腦 一 牙皂樹膠水 錢四

右二味入乳鉢內研調更下加密列露一合二勺扣勻

蕎麥芥菜蜜同治前症

蕎麥蜜八錢

山芥菜精三錢

右二物調勻。濕口舌咽喉。日數次。

芸香開壅飲同前症。湯液得下。咽則一時與此飲。或壯元

飲。加味羌活飲。四味龍腦飲。龍腦瓜子乳。見熾盛熱一二匙

若至全不妨飲。食用壯元鎮痲丸。見失苟兒陪苦治之衰弱甚

則用幾錢酒及醬。見水腫補之

西醫方選卷五終

普山先生著述目錄

和蘭語汰解

既刻

和蘭藥性辨

初篇

既刻

西醫今日方

近刻

西醫方選

既刻

西域本草

嗣出

物理源本

嗣出

生理真原

嗣出

病理真原

嗣出

訂和蘭語法解

遠西度量考

太西水腫纂要

嗣出

嗣出

嗣出

