

西醫方選

坤

武 9
730
2 止



文政二十二年新年鑄

普山藤林先生著

西醫方選

玉川堂藏版 文集堂發兌



西醫方選卷六目錄

咳嗽

寬胃湯^一

安沒泥^二加乳^二

海葱飲^全

三物舍利別^全

洋葵麗春飲^全

定痛漿^三

酒石國老膏飲^全

瀝青膏^全

叢越膏子^全

加撒爾非亞^四飲

清喉漿^全

神仙健胃酒^全

健胃飲^全

七味石鹼丸^五

加味匾桃油^全

百日咳

三物清肺飲^六

六物清肺飲^全

經驗魏薄飲^全

武 730 止

西醫方選

卷六目錄

大黃蝮蛇散 六

獨聖飲 七

大黃飲 七

旃那梅肉飲

蝸牛乳 八

鼠婦酒 全

大蒜膏 全

加味非阿斯舍重護飲 九

加味鈎吻飲 全

幾那那護散 十

芙蓉墨栗薩飲 全

接嬰飲 全

喘息氣急

芸香定喘飲 十一

海葱桂露飲 全

阿魏安沒丸 全

定喘飲 全

壯肺利胃丸 十二

乳香薰 全

定喘丸 全

撒法即救喘水 十三

加密列導 全

雙花導 全

腦膠導 全

乳沒丸 十四

五物薄荷飲 十五

胸水

導水膏子 十七

導水薄荷飲 全

導水醬 全

導水杜松酒 全

導水健神酒 全

導水健胃飲 六

導水石鹼膏子 全

海葱散 全

地惹多太利斯飲 全

海葱石鹽酒 全

海葱酒 十九

心悸

吐血

舍護比東湯 全

桃花飲 全

加味桃花飲 全

三物礬石飲 廿

調血飲 全

礬竭丸 全

甘藜

舍護
比東飲 廿

屋失蔑兒醬 全

蘭苔甘草飲 全

三物連錢膏子 廿

龍牙飲 全

胸臑痛類胸臑痛。膈膜焮腫。

洋葵導

廿六

清熱涼膈飲 全

麗春消石飲 廿七

化痰膏子 全

轉行飲 全

角甘麥葡湯 全

和胃定痛飲 廿

緩和定痛慰 全

發揮止痛油 廿九

溫和泥 全

嬰粟鯨腦膏 全

豁痰舍利別 全

銛石蠅蛭散 廿

遠志根湯 全

涼腸飲 卅一

軟堅慰 全

桃油薑菜膏子 全

解毒匾桃乳 卅二

蔓菁飲 全

乳麥湯 卅三

沒藥蠅蛭散 全

肺焮腫。肺癰。類肺焮腫。

五物清肺漿 卅五

瓦刺蕪洋葵湯 全

葵花煎 卅六

苗香甘草飲 全

清肺醬 全

洋葵寬胸乳 卅七

四物角精飲 卅八

苗香飲 全

苗香甘露水石飲 卅九

清肺過腐飲 全

接花加蜂蜜飲 卅

連接香花飲 卅十

排膿祛壞湯 全

豁痰利尿丸 全

豁痰利尿散 卅十一

五物撒摩丸 全

蘭苔龍牙湯 卅二

四物甘草丸 全

鉀肺蜜 全
蘿蔔連翹湯 四十
乳清蜂蜜飲 全

鮮結石鹼丸 五十
六味大力湯 全
三物解煩飲 六十

味安沒尼亞丸 全
一物硝石湯 七十

勞瘵虛損。

蘭苔湯 全
蘭苔甘草湯 八十
六味蘭苔飲 全

幾那蘭苔湯 全
挽回湯 全
連錢飲 九十

連錢甘草飲 全
海葱膏 全
枸櫞舍利別 全

甘舍謨比東飲 五十
潤肺湯 全
麥乳湯 全

瑰葵膏子 五十
水揚湯 全
三味大麥飲 全

加味匾挑乳 五十
疏肺飲 全
沒藥丸 全

錦葵湯 全
藎謨回生丸 三十
酸礬漿 全

剗鐵酒 全
健胃散 四十
健胃酒 全

健胃丸 全
發疹膏 全

以湯良効接骨錦葵飲。二方見熾盛熱洋葵甘草湯輩亦佳。

和胸湯膏治咳嗽或加之甘乳汁四分之一。殊妙。方見聖京健

寬胸湯吳治咳嗽由熱毒發者宜從其本病而處的劑兼

用此。

黥失刺護葉

錦葵葉各一握

洋葵根

甘草各八錢

右四味以水六合煮。瀉去滓溫服。日數次。每服一大麥

酒盃。

安沒尼亞加乳蒲咳無熱痰涎稠粘者此方主之。

安沒尼亞加膠二錢

石薄荷露二十四錢至三十二錢

右二味先入安沒尼亞加於臼內搗末別取大麥煎汁

三合二勺稍々注之至膠融化和石薄荷露服二匙日

三四。

海葱飲蒲主治同前

海葱醋 浸桂水各十錢 清水

緩和藥舍利別各一錢

右四味攪和服二匙日三四次。

三物舍利別同主治同前

西醫本草

拘椽汁

蜂蜜

冰糖各等分

右三味攪勻煮作舍利別頓服一匙

芙蓉刺姑散

咳嗽甚不得睡者與此散見或芙蓉油見

疹

五物導痰飲同咳嗽胸中呷々有聲痰稠粘不易咯出者

此方主之見熾盛熱二物化痰散亦宜見聖京健

洋芙蓉春飲蒲咳嗽其痰稀厲者此方治之神驗

洋葵根

麗春花

右二味湯泡時服一盃

定痛漿同治前症及百日咳能利呼吸定疼痛

安息香華錢四 阿芙蓉錢二

右二味將香竈揮發精九十六錢淹四五日瀝去滓取

一小茶匙常飲熨服日二次

酒石國老膏飲同治前症又治感冒咳嗽肺葳壅塞並良

驗

酒石鹽錢二 撒法即五分 國老膏錢八

右三味以沸湯六合四勺浸之置暖處一伏時瀝過服

一茶鍾日三四次一方去撒法即加罌粟舍利

國老膏 同治 酷屬液侵刺喉中而咳嗽者見今日方

瀝青膏 同治 聖京健毒犯肺咳嗽淹纏不已者神驗

番瀝青 肉豆蔻大泥氏加蠟少許

右攤革作掌大貼之肩背三四日一換若貼以膏瘙痒不可堪則揭去

以綿布摩拭而乳水湯洗之

發越膏子 吳胃寒咳嗽者用此方發汗驅邪

的里亞加或罌粟合利別一錢 汗銻石一錢 撒法郎半錢

藜合香五錢

右四味煉和每夕酒下

加味撒爾非亞藜 治前症

撒爾非亞一撮

右一味湯泡更和砂糖陳燒酒味適口為度服已溫覆

取汗

清喉醬 同治 前症宜先與前方發汗而用此方解咽喉嫩

腫必效

蜂蜜 若舍利別十六錢 宜母子汁 四錢若綠攀漿二錢

阿利襪油 八錢

右三味攪勻每一刻服半茶匙

神仙健胃酒 蒲泥咳嗽由胃中痰液發者是名胃咳宜先燙

之而用此方疏滌之

蘆薈 沙哥多刺產者三十二錢

食而便容利 亞根

乾姜 各四錢

右三味為末每八錢以白葡萄酒三合二勺醱之一二

日。漉去滓服二匙日二三次。

健胃飲 吳不問大人小兒食已過乾咳者為積穢在胃也

宜以飲

龍腦薄荷露 八錢

蘆薈 末五分

沒藥 末

酒石鹽 良姜 末各二錢

右五味攪和服一匙日四次小兒加砂糖少許減量與

之

七味石酸丸 同 主治同前

石酸 勿搗茶一錢五分

拔爾撒摩 字露

蘆薈 各一錢

沒藥 一錢 酒石鹽 一錢 良姜末 適宜

龍腦薄荷油 五滴

右七味研勻每一錢作十五丸橙皮末為衣服二丸日

二次。

幾那散 蕭 咳嗽發於胃弱者取此散和健胃劑服之良效

見神經熱

咳嗽由神經急者臨卧服阿芙蓉液十滴至二十滴為

妙。漬手足於温湯亦得。同

加味匾桃油 伊 治咳嗽發一切癩瘡蛔虫者神效。

匾桃油 八錢 卵黃 二個 茴香油 四十錢

鹿角鹽 二十錢 洋葵舍利別 六錢

右五味和勻大人時與一匙小兒一粥匙。

百日咳

三物清肺飲 蘇 百日咳呼吸促迫喉中喘鳴痰涎壅盛者

是稠痰實于肺也當疏涎導痰此方主之

墨栗薩露 四十錢 橙汁舍利別 八錢

越默微加舍利別 二錢

右三物攪和每一時服二匙服之或嘔吐亦無害選用

洋葵清燥湯 見熾盛熱 四物導痰圓五物導痰飲二物化痰

散 三方見聖京健亦佳

六物清肺飲 同 主治同前

洋葵葉 各一握 麗春花 各一握 甘草 八錢

八角茴香

乙百葛 各二錢

剝利瓦兒根 四錢

右六味湯泡溫服

經驗魏薄飲 微百日咳初起用此即驗

阿魏 一錢五分 至二錢

石薄荷露 四十八錢至六十四錢

右二味調和分服

大黃 蝮蛇散 同治百日咳常々用此僅效

大黃 蝮蛇石 各一錢

右二味細末分作六貼調冷水或乳汁或洋葵舍利別朝夕服一貼一代蝮蛇石以麻俚涅失亞和結兩蔑斯

密涅刺列或金硫黃者亦佳

獨聖飲 蒲百日咳之發常於小兒為多發之欲吐者急促

之宜此方

乙百葛 末一銖 至五分

右一味以沸湯一合六勺泡之去滓和砂糖乳汁各少許一刻服一小茶鐘以至吐

酒石茉莉散 蕪治百日咳其人痰涎出自喉便應吐反吞

下或稠飲聚畜胃腸而咳益劇者大人與此方或霸王飲三物飲二物大黃飲輩小兒用百葛霸王散加味白

帛散二仙散 方悉見 蠟熾盛熱 輩一

大黃飲滿 百日咳大便秘 宜此方取下

大黃

右一味湯泡溫服二茶匙日二三大黃舍利別亦妙

旃那梅肉飲同 前症不能服大黃劑者宜此飲

旃那 梅肉

右二味湯泡去滓和甘露蜜或沙糖或蜂蜜與之

鎮痛芙蓉鈔蘇 百日咳每夕增劇睡卧不寧竝咳發於神

經變急而痰少者與此方見麻 或鎮症三物飲見

百日咳病人血實呼吸促迫心痛者放血少許妙微

蝸牛乳同 治百日咳神良

蝸牛生十八個若二十四個 會缺 便用 蝸牛舍利別方

右一味搗潰以甘乳汁煮片子時和砂糖少許多服〇

余膏療一 小兒百日咳製此乳使乳母服之咳乃止其

妙可知也

消石栗接飲同 治百日咳發於血實者或選加味大麥湯

洋萎清燥湯四物導痰圓五物導痰飲五方悉見 用之

亦驗

鼠婦酒蕭治百日咳極妙。

鼠婦十六錢

右一味入乳鉢內搗末用白葡萄酒三合二勺淹一宿布過去滓服一起日三四。

大蒜同諸厄里亞北境之方治百日咳及一切咳嗽久不止奇效。

大蒜 家猪脂各等分

右二物入臼內杵合為膏傳之足心換日二三次有熱者禁之。

治百日咳宜貼瀝青膏見於肩背每二三日行湯脚若咳

劇者代以天灸膏見熾盛熱貼之而令瘡不愈為佳同

洋葵甘草飲蘇百日咳嗽而痰不出喉中疼而水雞殼其人不血實亦無粘液之候者宜選用此飲及洋葵甘草

湯二方見瘡匾挑膏見熾盛熱卵黃圓作列布湯並見麻疹

加味非阿斯舍亞謨飲蘇治百日咳衆治與驗氣息欲絕神妙。

非阿斯舍亞謨煎膏五厘菩提樹花露二十錢

石長生舍利別八錢

右三味先取花露燂盡煎膏調長生舍利別服一起日

數次。

加味鉤吻飲 同 主治同前。又治其因龜胸龜背。或毒有結核發之者皆良。

芥葉鉤吻煎膏 五

菩提樹花露 二十

四錢

紫堇舍利別 十六

葉片酒石液 五

分

右先以花露煇盡煎膏次和餘藥一二時服一匙。

幾那湯 微 治百日咳。病人虛弱而肺無壅塞之候。或吐下後。舌胎脫身羸瘦寒熱如瘧狀者。並以此方神驗。三物幾飲亦宜。 二方見

腐敗熱

防齋幾那飲 養 治百日咳。發歇有期。發前戰慄。發後濁尿

者 見腐

百日咳。無熱而淹纏不差者。宜幾那湯輩。 蒲

幾那葛 私 護散 同 主治同前。

幾那 二分

葛 私 護 七八

黍

右二味細末。白湯點服。小兒六七歲者。服之日三四次。長幼可酌酌加減。

芙蓉墨栗薩飲 微 治百日咳。連嗽不得眠。精力虛憊者。

西電法護阿芙蓉液 八十

墨栗薩露 二十

右二味攪勻。稍々服之。

接嬰飲 同 主治同前

白嬰果舍利別 十六錢

接骨木花露 十六錢。會缺。代以雨水。

右二物攪勻分服。

喘促。氣急。

化痰膏 蕪濕喘者。血中粘液。停滯于肺。氣急息迫。咳嗽痰多。經久不愈也。宜用此方。方見稀釋粘液。從痰及二便除之。或撰用五物清肺飲。解凝散鬱膏。見聖藥。霸王散。加味萊沃刺那飲。亦得。

芸香定喘飲 同 前症與化痰膏。雖似少差。隨發呼吸促迫。喉中聲如雞鳴。甚則氣息欲絕。等症者。宜令病人緘

清氣而服此方。或鎮痙芸香飲。黃見大佳。

芸香露 六十四錢 龍腦薄荷舍利別 十二錢

硝砂加苗香精 二十滴 阿芙蓉液 十五滴

右四物攪勻。一二時服。二匙。服之。久而其在不定者。魚

貼天灸膏於腓腸。而令瘡口久不愈。且數施刺。衛之。導劑。諸証稍減。延復連進。化痰膏。霸王散等。至全愈。

幾鏡酒 同 前症差後。病人虛憊甚。稍動則心悸。呼吸促迫。

者。宜與此方。或幾錢膏。見水

海葱桂露飲。喘急。痰涎壅盛者。名曰濕喘。宜此方導痰。

海葱蜜 桂露 各一匙

右二味攪勻服。或與海葱舍利別。日三四次。兼每夕與

阿魏安沒丸。

阿魏安沒丸 目治前症。

阿魏 安沒尼亞加膠 等分

右二味作丸。每夕臨卧服四五丸。

定喘飲 花治乾喘良効。法放血貼天灸膏後與之。

海葱蜜 十六錢 井泉水 三十錢 酒蒸桂露 十六錢

右三物攪勻服。二匙。日三四次。此方妙開豁胸肺。所以

稀釋稠痰。之着肺脉。而利呼吸。

壯肺利胃丸 喘急。肺氣不振。痰涎壅盛者。是為濕喘。宜

此方強肺化痰。

安沒尼亞加膠 二錢 拔爾撒摩字露

藜合香 各五分 橙皮末 適宜

右四味調勻。每一錢作十五丸。半時以葡萄酒送下。一

丸。痰膠粘者。加酒石鹽少許。

乳香裏同主治同前

乳香

右一味。投炭火以烟熏喉中。

定喘丸花治喘急。黃疸。水腫。及一切壅塞因稠液者。

安沒尼亞加膠二 海葱若乙百葛 石鹼三

右三味。舍利別調。每二錢作十九朝夕服三丸。

定痛漿蒲喘急痰涎不出者。發於神經牽引也。此方主之。

每服一茶匙。日二服。見安用幾那散。幾那酒。并見牛乳汁。

亦良效。

撒法郎救喘水同治喘急神經牽引甚者。

撒法郎丁 葛私多僕護丁各一

泡加乃可草湯一

右三物。調勻服。日三二次。

加密列導蕪治喘急發於神經牽引者。當共發。喘亞魯瑪

地加醋。或鹿角精。或葛私多僕護丁於鼻中。或取以輩

數滴點水一匙。服不應者。與鎮痙芸香飲。見黃施以導

方。

加密列花

右湯泡和砂糖及油各少許施之。

雙花導同主治同前

亞爾尼加花錢一 加密列花一

右二味泡湯片時取一合二勺去滓以積筒射入臍中。

腦膠導同主治同前

樟腦錢一 牙皂樹膠水錢四

右二味入乳鉢內研爛更加加密列露一合二勺向臍

門射之。

前症防其再發宜壯元鎮痙丸見失苟或五物瓦爾拔尼

丸見服之不應者多服防腐幾那飲見腐發鏡酒發鏡

膏並見輩為佳。

乳沒丸同人被濕霧冷霧忽得喘急短氣者肺藏弛弱也

宜與此丸或香膏丸見水不應者撰用防腐幾那飲發

鏡酒發鏡膏見水必有驗。

薰陸錢各二 沒藥錢一

右三味細末的列並底那調每一錢作二十九服四丸

日三次以泡撒爾非亞湯送下。

加味大麥湯同九男子資稟血實者時下血或鼻衄身反

爽健婦人經行不失期。或產後下惡露。皆所以損。餘連滯而令得之。節也。若其血畜鬱而不得疎。或忿怒驚駭。後發氣急短息。精力虛脫。脉沈而無倫。四肢厥冷等症。者是血壅溢於肺也。須急放血。撰此方及洋葵清燥湯。接骨錦葵飲。吳見熾盛熱輩與之。兼行導方。以温布摩擦四肢。若初起。痔脉腫脹。廻施蜈蚣為妙。

加味梅肉湯同前症服前方輩而呼吸已利者。廻服此方。

或加味梅肉膏。加味酸角湯。三四日。見熾盛熱以利大便。

洋葵甘草湯同稀厲毒容於頭中。下注。侵喉。隴乃覺酸疼。

隨菟咳嗽喘鳴。氣急息迫者。宜此方。或洋葵甘草飲。見并

癩。加乳汁三分。一與之。益効。若毒多難愈者。貼天灸膏。

於項用上件方法。毒不復。下注。諸症全退。唯餘乾咳者。

用鎮痛止痛飲。見聖京健桃油卵黃圓。鎮痛芙蓉飲。見麻疹

痛壯神飲。見痘輩治之。

三製薄荷飲。發治氣急息迫。菟於胃中生風氣者。見痛

五物薄荷飲同主治同前。

霸王鹽 麻伍涅失亞泥篤利 喇姑石各二錢

龍腦薄荷舍利別十六錢 龍腦薄荷露六十錢

右五物調勻。一時服。二匙。用鎖痛墨栗薩飲。見水亦好。氣急發於聖京健。伊徭篤。亦癰等之內攻。或肺藏頑者。各從本病治之。其由宿食致之者。隨症吐之。或下之。同

胸水 漢所謂

導水飲。胸水之為患。水湊于胸內也。其症咳而痰不出。或時吐水沫。小便短少。清冷。或溷濁赤塗。若壯語大聲。或絕動作。則氣息欲絕。或短氣。或呼吸急促。若眠欲着。則氣急息迫。殆將室塞。忽然醒覺。或起啓戶牖。欲納新氣。以取快。其水滿胃內者。只可仰坐。而不可偃卧。若水

在右或左者。便得側卧。然其在左者。右邊貼席。在右者。左邊貼席。而卧。則氣急煩懣。咳嗽益甚。若足腫起。則呼吸較利。腫消。則依舊不利。或左或右。或共腫脹。而痿弱。易觸覺。或麻痺。胸中或覺濯々。有聲。若直立。則膈上急。而覺重。胸滿腹脹。但呼吸雖頗安。動輒有發。股背牽掣。胸中刺痛。頭目眩暈。或心悸。脉微如絕等症。大抵此病。脉弱小而無倫。或結代。或左右強弱不齊。搏動無度。其強而無異狀者。水未壓迫肺之候也。治法。宜先病人未衰憊。撰用此方。或分消飲。並是香露。酌精飲。加味菜

沃刺那飲。鼠婦丸。並見水利小水。每二三日。停之。用汞

散。如味汞散。並見清熱瀉心丹。見眼解凝散。鬱膏。見

健輩峻下之服。此輩而水從二便。疏呼吸漸利者。應也。

必勿轉劑。若下之後。心胸燥熱。氣急。咳嗽。甚。精力虛

脫者。速罷下藥。唯用利尿劑。以至全愈。

胸水。其足浮腫。而氣息稍寬者。速取燒酒。盛之。鉢內。熨火

舉足。奠於其氣腫處。乃汗出。如此日一二次。得驗甚。多。

間有其腫忽消。而氣息益急。迫者。非凶兆也。勉行此法。

往往致全愈。或刺其腫。或施打膿法。於肘脚。並妙。同法。日取

白瑞香皮。敷胸上。太驗。

導水膏子。治胸水利小便。

海葱頭。末五。復方海牛散。生薑。末五。

右三味。橙皮。舍利別。調。頓服。

導水薄荷飲。同。主治同前。

龍腦薄荷露。酒石灰汁。錢半。

生薑舍利別。錢四。

右三物。攪勻。服。

導水膏。同。主治同前。

益母草醬錄一

琥珀鹽錄五

杜松實油錄二

右三物調勻服。

導水杜松酒同 主治同前

杜松實錄十六

右一味搗爛。淹列應酒三日。濾去滓。更和複方蘿蔔水八錢。每服十六錢。日三四次。

導水健補酒同 主治同前

山薺菜

碎米薺

杜松實各十錢

酒石灰汁八錢

右四味。以麥酒一升二合。浸二時。濾去滓。服一合二勺。

導水健胃飲同 主治同前

生野艾蒿梢

金雀花梢各四錢

龍膽根錄二

右三味。溫湯三合四勺。浸去滓。服。

導水石鹼膏子同 主治同前

石鹼勿搗茶產一錄

安沒尼亞力膠錄半

乾海葱末錄四

右三味。舍利別調。一頓服。

海葱散

微治胸水。氣急息迫。不得眠者。神效。

海葱末

二三

右一味。細末。服之。

珊氏加砂糖

地惹太利斯飲

伊治胸水。腹水。其効神妙。

地惹太利斯

末二錢

右一味。浸水三合二勺。候藥味出。濾過。一時服。一匙。至

吐下而小水自利。

海葱石鹽酒

伊漢主治同前

海葱

乾酒石鹽

各八錢

右二味。淹燒酒一合六勺。置之煖處。出藥味。去滓。時服十五滴。至二十滴。

海葱酒

伊壽治胸水。腹水。及一切胸中停飲。並良。

海葱頭

一錢

右一味。用葡萄酒一合二勺。浸之。候藥味出。去滓。每且空心服半匙。至一匙。

心悸

防膈幾那飲。養心悸。為失血。或下利。或熱病。津液消耗。身體衰憊。而發之者。滋補津液。則應愈。及不愈。食不進。衰

億益加者。或因神經脆弱。寧急使然者。以此方治之。見

數幾鍊酒幾鍊膏水腫亦良

龍區瓜子乳同男婦其神經常易寧急者。動輒有卒發松

悸。而經久不止。是或由驚恐喜怒等發之也。宜選用此

方。見或鎮痲壯神飲。見聖甚香定喘飲。見喘鎮痲共香

飲。見黃葛私多儂護丁。見方並妙。

壯元鎮痲丸同治前症久服之亦防復發若神經虛極居

然不効者選防腐幾那飲。見幾鍊酒幾鍊膏水腫治

之。

接骨清涼飲同松悸發於血實者法當放血若無驗者清

下之則愈宜以方及加味梅肉湯加味酸角湯。備盛熱

乳清飲清下飲。聖方見輩。

蜩蛄消石散同驚悸即七情之所致甚則煩悶眩暈治之

安身體定神志則自巳若不已身大熱脉弦實者宜速

放血行導方與此方或消石栗接飲接骨清涼飲加味

梅肉膏。四方見瓦刺菴酸模湯。見輩。

遍挑膏同前症諸藥無効不寐煩燥者選此方。見或鎮

痲壯神飲。見聖加味麗春飲。見陪苦每時用一盃効

甚支。

加味梅肉膏 同前症與匾挑醬輩而無寸驗。脉無倫而結。稍動則悸益甚。短氣倚息者。若非心藏有息肉。會其大脉寬慢之所致。初起失治則不可救也。治之屢放血與此方見熾一時半一匙。隨用乳清飲。或清解飲並見聖一二盃。由是諸症漸衰者佳兆也。更連進之。庶奏全效。設令一日有差。切禁勞動。若衆治不應。諸症自若者。不治也。唯須用稀渙之劑。而使病人易堪其患。若脉較實。悸增劇者。即可刺絡放血少許。悸甚氣急息迫。不能眠。

者。當以與芙蓉蠟貼散。舍乃我魯私丸。二方匾挑醬熾

盛輩。晝間用鎮痲芙蓉飲。凡麻鎮痲壯神飲。見聖鎮痲

三物飲。見痘輩。

吐血

舍謨比東湯 吳治吐血者。宜救血之潮溢。約脉之呀悶。此

方甚良。若吐血已止。喉中痒起。頻欲咳。胸熱口憊者。欲

復吐之也。速放血而用此方。

舍謨比東根

精大麥 各八

玫瑰花 一

右三味。以水四合。煮去滓。微温服。一哥喜鐘。日數次。

按骨清涼飲後。吐血。脉弦實者。刺絡與此方。或匾桃醬方。

見職或施後。和導。用酒石散方。

桃花飲後。吐血。或放血。或施下導方。與涼藥而不止者。宜

輕收軟掇之劑。此方主之。

桃花石二錢 若格實溫 十二錢 麗春花露 六十

右三物攪勻。半時服二匙。

加味桃花飲同 主治同前

桃花石二錢 百藥煎末 五分 若格實溫 十二錢

麗春花露 五十

六錢

右四物攪勻。半時服二匙。

三物礬石飲同 主治同前

礬石十 麗春花露 六十 若格實溫 十二

右三物攪勻。服半時 二匙。

調血飲同 主治同前

篤爾面 奎刺根末 若格實溫 十二

麗春花露 六十

右三物攪勻。半時服二匙。

吐血者。先放血。縛肘脚。迺作大麥消石湯見感。加硫堇摺

少許或匾挑盧子乳一劑加消石一錢與之微
礬竭丸壽治吐血下血衄血崩漏良妙。

枯礬錢三血竭錢一

右二味細末舍利別丸朝夕服五丸

消石散蒲吐血有熱者速放血而用此散五分日二三見方

感

鎮痛止痛飲蘇吐血無咳嗽咳嗽久不止促血者選用此

方見聖或桃油卵黃圓鎮痛芙蓉飲作列布湯三方見

麻疹

咳嗽甚續吐血者與的里亞加或罌粟舍利別治之微

甘葵舍護比東飲蘇吐血已止乃罷淡血劑而滋養身體

久服此飲

舍護比東根三十一錢洋葵根十六錢甘草八錢

右三味湯泡温服加乳汁三分一益佳

屋失蔑兒醬同吐血後稠血仍與痰雜出而不去者勿必

止之止之則血鬱于內以發險症也若元氣微弱血痰

不快出者當促之宜此方

屋失蔑兒十六錢若格實温八錢

右二物攪勻。時服二小匙。加味麗春飲見卒亦驗

舍乃我魯私丸同前症連咳而睡寐不寧者。夕與此方。或

芙蓉痢散二方或匾桃醬見熾

防腐幾那飲同前症咳全已元氣不復者。一時半與一盃

方見腐

幾那散微治吐血。資稟虛弱者。宜此方。見麻

蘭苔甘草飲同吐血後咳久不止。胸中或隱々痛。或煩熱。

脈有熱狀。日晡所潮熱者。是為肺傷。其初唾血痰。不日

膿痰雜出者。傷處已成癰也。若癰漸大。胸中痞滿。欲寐

展轉不能安席。咽中酸痒。隨發乾咳。寒熱不劇者。此方

別見勞瘵治之ヲ

依蘭苔 甘草各八

右二味。湯泡溫服。撰用匾桃醬見熾洋葵甘草湯見亦

得。

加味大麥湯蕪吐血後寒熱劇。脈強實。乾咳者。放血與此

湯。或洋葵清燥湯。接骨清涼飲三方見熾

三物連錢醬子同前症用前件方法。寒熱減而吐膿者。與

此方。且富夕與匾桃醬見熾或芙蓉痢散見

連錢醬

紫堇醬

若格實溫各八錢

右三味調勻。一時服一茶匙。或撰防痾幾那飲見腐香

膏丸元水腫 蘭苔甘草飲見用上之亦宜

龍牙飲同 主治同前

龍牙草

劉寄奴

歇爾拔斯支花各一握

右三物。湯泡溫服。

排膿祛壞湯吳 吐血再三而帶微膿者。與舍護比東湯見上

煎又此湯。或豁痰利尿丸。豁痰利尿散肺癆並見

化痰醬蘇 吐血後肺膿潰大寒熱反劇。所吐深墨或帶綠

而臭惡者。宜與此方見急 或蘭苔甘草飲見上 與之不如

者。為難治也。只用緩和藥。而夕與通桃醬見熾盛熱 或鎮痛

壯神飲見聖京德 以今易堪患苦

撒爾非亞飲同 前症。自汗流漓。身體衰憊者。與此方見熾盛熱

或防痾幾那飲見腐改熱 下利甚。虛極者。宜桃花飲。加味桃

花飲二方見上

導水飲同 前症。腹及足浮腫。宜用此方。或分消飲並見利

小便。或與二物大黃散見熾盛熱 取微利。食不進。胃中有稠

飲者。殊良。

胸股痛類胸股痛。膈膜嫩腫。

蝮蝥消石散蘇胸股痛咳嗽痛熱久不解脈堅而弦者其

血凝泣也宜先放血而選此方及消石栗接飲加味大

麥湯接骨清涼飲接骨錦葵飲以上見熾盛熱洋葵甘草湯瓦

刺蘘酸模湯二方見瘰癧輿之

洋葵清燥湯司胸股痛痛熱已退痰咳不已宜選此湯或

四物導痰圓五物導痰飲輩方見熾盛熱

洋葵甘草湯同前症乾咳久不止胸內如焚者宜與此湯

或洋葵甘草飲二方見瘰癧輿

五物導痰飲同前症不痰出者險也宜用此飲見熾盛熱二物

化痰飲見聖治之若無効痰停于肺呼吸促迫者貼天

冬膏於腓腸取水醋各半蘸綿布溫令吸其氣尤驗

鎮痛止痛飲同胸股痛治之百端乾咳仍不止痛留而不

退晝夜不得眠疲勞轉加者宜對症藥兼用此方見聖

或桃油卵黃圓鎮痛芙蓉飲等見熾盛熱又治晝日吐痰甚

或夜分乾咳久而不能安眠者服之不効者久用芙蓉

油見瘰癧或芙蓉蝮蝥散見瘰癧神効

胸股痛治之刺絡與清涼藥三四日熱已衰而痛仍劇者

宜貼天灸膏於痛處同。董氏曰。胸膈痛。熱不

緩和導壽治胸膈痛及肺焮腫不得睡或大便秘閉者射

入之肛門方見熾

洋葵導蒲胸膈痛大便秘結者用此方疎滌腸中以導其

毒良效

洋葵葉一握

右一味以大麥煎汁若粳米煎汁煮之瀝去滓射注肛

門

清熱涼膈飲華治胸膈痛及肺焮腫熱壯痛甚者

甘消石精二十

樟腦精十

解熱散一銖

見

右三物加砂糖清水各適宜和勻每三時服之若痛不

去者加阿芙蓉液十二滴神情不朗者加薄荷油三滴

至六滴

獨聖散同前症惡心者宜先與此散二分輕吐之假令痛

加隨必良效方見神

麗春消石飲西治胸膈痛

麗春花露三十

消石錠一

董菜舍利別八

右三味攪勻服

化痰膏子歌 治胸膈痛咳甚痰難出者。

阿利被油一兩 白蜜二兩 鯨腦四錢

右攪勻時服二匙

轉行飲泥 治胸膈痛代常飲用之。

亞麻仁二匙 甘草二錢 點失刺護四錢

右三味以水六合四勺淹之置爐邊四五時太滓供用

或加粟殼斯膏見今方 若橙汁少許殊佳泥 或與四物葡

菊湯見熾盛熱亦效 氏蒲

角甘麥葡湯歌 治胸膈痛煩渴引飲者。

精大麥六錢 鹿角十二錢 乾葡萄二十四錢

甘草適

右四味以雨水一升八合煮取一升二合瀝去滓溫服

和胸定痛飲 具胸膈痛焮熱腫痛甚惡寒發熱胸膈築動

而痛益加短氣咳嗽不可忍者此焮腫使然也宜先放

血而用清涼宣腸飲見熾盛熱下之 次作以飲與之若發熱

而痛痛隨熱增減續吐痰者熱毒着肋膜也當從熱病

治法兼服此導痰其痛移處寒熱咳嗽並不劇甚脉數

而不強小便赤而無涎者此因稀厲熱液侵肋膜也亦

宜此方。

精大麥

錢各八

融失刺護葉

握二

麗春花

握一

右四味以水八合煎之去滓加消石錠二錢和勻服

麥酒盃日數次因飲腫者溫敷亞麻尉取亞麻仁以水或酪餘煮煉者

於痛處冷即易之因稀厲熱液者貼天灸膏

浮蓉酒石散藥治胸膈痛腸胃有積積者且選用此方或

霸王飲三物飲輩并見熾一盛熱

緩和定痛熨蒲治胸膈痛能行滯和血脉

接骨木花

或加密列花或洋葵葉一握

右水煎護綿布慰痛處或以乳水湯見慰之亦佳

發揮止痛油泥主治同前

扁桃油

若阿利襪油十六錢

鹿角精八錢

右二物內玻璃瓶振蕩相和溫塗一卵匙於患上日三

四次

溫和泥蒲治胸膈痛偶中寒氣而漸于危險者

白燕餅大

乳汁中

油若牛酪小

右三物和勻溫敷痛處

嬰粟鯨腦膏 吳 胸脇劇痛。短氣咳嗽。而無熱。脉狀小便無

與生平大異者。是聖京健毒陷下肋膜之所致也。宜外

敷。謨失刺及尼蒲私膏 見今方 內服。此方或發汗將 見感

白嬰粟舍利別 十六錢 鯨腦 乳香 各五分

橙皮油 三滴

右四物攪勻。服一卵匙。日數次。

豁痰舍利別 壽 胸脇痛。痰去出者。宜此方。

匾桃油 若阿利襪油十六錢 雞子黃 一個 蜂蜜 八錢

右三味攪勻。平時服二哥喜匙。和胸湯 見聖京健 一盃送下。

潤腸飲 微 治胸脇痛已愈。而食未進。口中不爽。頭仍重者。

方見

大麥消石湯 同 胸脇痛。向為痰出。苦悶漸減。今痰結于內。

而氣急息迫。煩燥悶亂。脉弦堅者。為危急也。宜先刺尺

澤。且取水醋。溫之。熏喉中。而多服此湯。此湯 見感

導痰飲 微 治胸脇痛。痰膠粘。難咯者。溫服之。一時一茶鐘。

若一匙。 方見

銻石喇蛄散 壽 胸肺焮痛。吐痰頓止。喉中喘鳴。氣急息迫

者。大危。宜急貼天灸膏於脛膈。而與此方。

結爾茂斯密搗刺列五

蝟蛄石一

右二味為末。每二時服之。隨湯服。和胸湯。加蜜少許。至復吐痰。

遠志根湯

泥。治胸膈痛。及一切胸肺。焮腫。水腫。聖京健痛。

頑癰等。此方能發汗利二便。

遠志根八錢

右一味。以水四合。八勺。煮取三合。二勺。瀝去滓。溫服。二三匙。日三四次。若藥不入者。加桂露二三勺。或減量與之。

涼膈飲

壽治胸膈痛。肺焮腫。不能睡者。

消石

一錢五分

蝟蛄石二錢

麗春花舍利別十六錢

大麥煎汁八十錢

右四味攪勻。二刻。與一匙。隨取和胸湯。二合。四勺。加蜂

蜜八錢。溫服。一茶鐘。

軟堅熨

同治胸膈痛。聖京健。肢節疼痛。腸焮腫。腸癰。微淋。

餘毒不盡。陰囊腫痛者。

緩和湯料

二十四錢。見喉風。

石鹼十六錢

右以水一升五合。先煮湯料。取九合。四勺。瀝去滓。下石

鹼消盡。乘溫慰患處。翌朝塗洋葵膏。且以此方熨之。當

夜貼烏爹泥膏。見今方

桃油莖菜膏子。蒲治胸腹痛。咳嗽而痰難咯出者。

匾桃油。或阿利。莖菜舍利別。各十錢。

右二味。和冰糖末。稀稠如蜜。時服二卵匙。

安沒泥。加乳泥。治前症不能服前方者。宜此方。見

消竜散。蒲治胸腹痛。肌熱如焚。蒸氣不發。小便短少者。又

治類胸痛。脉大數。因于蒸氣。過閉者。分之二為六貼。每二

三時。以白湯送下。一貼。方見腐敗熱

解毒匾桃乳。泥治胸腹痛。貼天灸膏中。其毒而小便淋瀝

者。上

匾桃仁 砂糖各八錢 牙皂樹膠四錢

右三味。先入仁糖於乳鉢。搗爛。別以大麥煎汁六合。四

勺化膠。徐徐注所爛藥上。攪至如乳汁。瀝去滓。代常飲。

用之。

三聖飲。蒲治胸腹痛。熱已退。精力漸加者。宜此方。緩下之。見

熱

胸腹痛。速期。喉腫不消。痛反更加。晝日戰慄。日晡潮熱。口

渴引飲唇類時赤舌乾渴加咳嗽增劇睡眠不寧汗出

者欲成膿也當與緩和劑即洋葵清燥湯施外敷藥以

促之必勿刺下之若膿已成唾膿痰而諸症退者可治

也宜與豁痰劑四物導痰圓五物清肺飲等是也當夕用芙蓉油見麻

或芙蓉蝟蛄散見痘

鎮痛止痛飲同前症膿痰出而乾咳不止者選用此飲及

桃油卵黃圓鎮痛芙蓉飲共見麻疹香膏丸見水腫至咳已瘡

口愈

蔓菁飲壽胸脇痛因循不愈痛有定處嗽而不痰出或吐

白沫脉疾數食後或晡時唇類必赤隨惡寒發熱至夜

大汗出小便多泡或清白遍身肉脫虛憊者其毒內鬱

而為胸癭也若吐膿痰者作此飲與之

水蔓菁 龍牙草 連錢草 劉寄奴各等

右四物湯泡更和蜂蜜每半時溫服一盃

乳麥湯同治前症

大麥煎汁不拘多少甘乳汁四分

右二味調勻代常飲用之至膿盡

沒藥蝟蛄散同治前症

沒藥

五分

蝮蛇石

五分

右二味細末日服三劑

類胸膈痛者。聖京健毒着于胸肋。以發劇痛也。其症槩似真胸膈痛。治法與聖京健同。

病人。心下胸內。竝灼熱刺痛。胸肋牽引。煩悶。噦。嗝。呼吸短促。而欲窒塞。稍動則益甚。呃逆不止。顏面瘳急。口如欲笑。謔言錯語。次之。精神錯越。而發腦。焮腫。諸症者。是為膈膜焮腫也。其輕者。諸症不劇。脈必實數。而堅。其重者。諸証漸進。衰憊。寂甚。面色蒼白。四肢厥冷。脈弱小而結。

代若不急治之。即變敗疽而死。治之。宜當初起。急放其血。設有虛候。必勿恐怖。放血。而諸症減。稍奏佳兆者。參照胸膈痛。腦焮腫。治法。以救之。

肺焮腫。肺癰。類肺焮腫。

洋葵清燥湯。肺焮腫。其症惡寒發熱。乾咳不斷。氣短面赤。舌燥口渴。肌膚如燔。頭重而頑麻。或謔言錯語。小便灼熱。脈實數。或弱小。或心下膨滿。則煩悶甚。噯氣。稍快。隨復如故。誤投熱藥。則死。其焮腫極甚者。氣息即絕。不復可救也。宜速刺絡。而作此方。服之。與洋葵甘草湯。

二方 接骨錦葵飲 輩見熾 亦得。若不知者。再可放血。大

四物導痰圓同 肺焮腫。諸症不劇。痰易咯出。其人虛弱。而無放血之候者。與此圓見熾 或洋葵甘草湯見瘡 導其痰。以至全瘳。

接骨錦葵飲同 前症。其人血實者。急放血。而選用此飲。及加味大麥湯。接骨清涼飲三方見熾 其痰不易出者。迺與

二物化痰散見聖 或五物導痰飲見熾 各驗。浮蓉酒石散同 前症。胃中有積穢者。當微利之。宜此散。或

加味梅肉湯。三物洋葵湯輩。二方見熾。和胸湯。壽治肺焮腫。代常飲用之。或取大麥煎汁二合。四

勻。和蜂蜜四錢。奠之。並良。涼膈飲同 肺焮腫。不能睡者。作此飲。見胸膈痛。每二刻服。一

隨用。和胸湯見聖 一盃。良驗。五物清肺漿寡 治肺焮腫。

接骨木花露六 接骨木子膏十 屋失兒 醋八 消石二

右五物調勻。一時服。二匙。

西園方選 卷六 三十五
瓦刺蘇洋葵湯 同 主治同前

瓦刺蘇根 二十錢 洋葵根 十六錢 屋失茂兒 十六錢

消石錢

右四味用井泉水先煮上二味取四合八勺下餘藥調勻服

大麥苦菜飲 微肺炊腫。初起惡寒。次發壯熱。言語妄錯。大便微利。裏急後重。不效。近衣被自汗出。膺反乾。痰難出者。危險也。宜急選此湯。方見感冒。或大麥消石湯。匾挑壺子乳。二方見熾盛熱。用之。熱勢極壯者。與碗董醬。一時半一匙。至

熱衰乃停後服

葵花煎 同 治肺炊腫

錦葵花

右一味。水或乳汁煎內囊中。或蘸綿布搭之胸上。

苗香甘草飲 蒲肺炊腫。不問真假。用此為常飲。

苗香根 甘草 瓦刺蘇根 各八錢

右三味。以水九合六勺。煮取四分之一。和栗殼煎。將薑服之。

清熱涼膈飲 肺炊腫。痛甚者。刺絡而與此飲。見胸膈痛。濕々

惡心者便與獨聖散二分吐之設令吐後痛增劇隨有良驗。

安沒尼亞加乳蒲肺焮腫痰膠粘而難咯出者宜此方見咳放血亦效。

清肺醬泥治肺焮腫痰膠着于內而氣急倚息者殊效。

安沒泥二錢加膠二錢海葱蜜八錢

礬酒石五分五種閑壅根舍利別八錢

右四味先取安沒尼亞加膠以卵黃煇化乃下餘藥和勻一二時服一匙。

洋葵寬胸乳寡肺焮腫吐痰止熱減而咳嗽劇者宜緩止痛之劑脉堅熱壯者不可與也若咳甚欲吐血者急作此方與之。

牙泡樹膠水一錢楳棹仁同蕃薇露研勻如乳汁者八錢

洋葵舍利別十六錢

右三物攪勻服。

錦葵導微肺焮腫寒熱甚痰難出或夢寐恍惚或頭痛或吐血者射此導於肛門日二三次第行放血及湯腳法

殊妙方見盛熱

導痰飲 同 肺焮腫。痰難出。或焮腫不消。膿成未潰。或已潰。

而膠粘難咯出。或吐膿暴止。而氣急急迫。寒熱虛羸俱

甚者。並服此方。見麻 每一時一匙。若一茶鐘。兼服三物

梅花飲。見殊驗。

肺焮腫。氣急乾咳甚者。宜溫湯和醋少許。令病人裏喉中。

久之乃效。同

緩和導毒 肺焮腫。呼吸促迫。不能卧者。宜放血。其血不稠

粘者。宜行此導利大便。又治肺癰大便數日不通者。見

熾盛熱

四物角精飲 寡 肺焮腫。脉堅實。醫刺絡一二次。脉即軟。而

搖動。謔妄筋惕者。宜取天冬膏。和樟腦貼之。若無效。目

眩搖掣者。此方主之。

鹿角精 葛根 桑葉 薄荷 各三
十滴 橙皮舍利別 錢四

橙皮露 十二錢

右四物調勻。一時若一時半。與半匙服之。其脉復堅。目

眩搖掣已。則每一時服麝香三四黍。甚妙。

天冬膏 蕪 肺焮腫。刺後。宜貼此膏於胸腹。或手足腕會處。

痰。又治痰壅塞而上攻頭腦。謔語妄言。拘急搐搦。或不

寐者貼之，肺膈。

豁痰舍利，別壽肺燉腫，嗽而痰能出者甚佳。假令痰黃而交血，緩必勿驚怖之。隨將變白痰，由此多得煩悶，減氣息安。脈實大也。宜與此，每半時二哥喜匙。隨服和胸湯一茶鐘。

銛石喇姑散 同前症吐痰暴止，氣急急迫，胸中喘滿，不可堪者，宜速貼。天灸膏於雙脚，而每二時與此散，是胸併服和胸湯，見聖內溫湯氣於口鼻，以令再吐痰。 苗香飲花 主治同前。

安沒尼亞加膠 末五分 沙糖 錢二 苗香露 三十錢

右三物攪勻，每服一二匙。

苗香甘露水石飲 寡肺燉腫，燥熱甚，食不進，舌有苔，心下痞重，惡心嘔逆，脈不強數，痰黃而不稠，小便如膽汁者，是敗穢在腸胃也。宜此方疏膈。

苗香露 八十錢 凝水石 六錢 甘露蜜舍利別 十二錢

右三物攪勻服。

清肺過腐飲 同前症用，前方已清滌腸胃者，宜與此飲。 瓦刺蕪根 洋葵根 凝水石

屋失茂兒

五種閃壘根舍利別

右五物以水先煮上二味瀝去滓下餘藥和勻更加綠
礬精適宜服之若不効惡心嘔逆口渴而吐唾者用二
仙散見熾盛熱治之

降氣泥蕪肺焮腫醫治百計痰仍不出謹妄舉急者毒已

侵腦也宜貼此泥見熾盛熱於足心不知貼天冬膏於腓脛

蔓菁飲毒肺焮腫十四日其毒不解脉數而弱肌熱短氣

時々振寒日晡所唇靨紅赤更作潮熱口渴引飲而食

不進寢汗遍身胸額殊多小便泡起身體瘦弱者已成

膿癰之候也當令破潰之若不破潰漸々隆起則氣息

欲窒也宜急取温湯或温醋令薰喉中以促之破潰其

已破潰而唾膿者作此方加乳汁三分一服之又肺癰

唾膿血而胸中覺寬快偶犯寒氣或因七情擾撓而膿

血不出喘鳴息迫呼吸欲絕者宜速令其口鼻受温湯

氣次取此飲多服之且每二時與石蠅散二方見

良驗或貼天冬膏於雙脚亦宜

加味大麥湯蕪肺焮腫旬日不差肌常微熱日晡寒熱脉

軟而弱氣短胸滿或無時戰寒大渴靨赤唇燥者已為

肺癆也。宜選用此湯及接骨清涼飲。接骨錦葵飲。洋葵

清燥湯。四方見 瓦刺換酸模湯。見

接骨如蜂蜜飲。微 治肺癆已潰膿稠厚難吐者。先與導

痰飲。見 兼用此方。

接骨木花 一握 蜂蜜 二十

右二味。先取花泡之。溫湯一合二勺。去滓和蜂蜜溫服。

一茶鐘。

幾那散 同 肺癆。身體羸瘦。脈虛數。食不進。睡眠不安。所吐

膿稀而紫黑。或綠。或黃。或交血。而惡臭者。宜此方和蜜

或水服之。方見

連接香花飲。微 肺癆吐膿。久而敗臭不可聞。日晡潮熱者。

癰已腐爛也。日後必變勞瘵。而不可治也。須急與此飲。

救之。

小連壳花 接骨木花 草零陵香花 各二

的列並底那油 四錢

右四味入罐內。灌溫湯。候藥味出。溫服。

肺癆咳嗽甚。不得眠者。宜取麗春花舍利列二三匙。和匾

桃廬子乳。先熾 或大麥消石湯。見 一盃。每夕服之。

排膿祛壞湯 吳 治膿壞液 案以謂肺癰

山蘿蔔 龍牙草 各一握 牛房

舍謨比東 各八錢

右四味以水三合二勺。白葡萄酒一合六勺。煮去滓。溫

服一麥酒盃日數次

豁痰利尿丸 同 治前症宜用此。

的列並底那 錢四 乳香 沒藥 琥珀 各八錢

舍謨比東末 宜適

右四味先取的列並底那以水少許煮。稀稠得所乃和

餘藥為丸甘草末為衣服三四丸日三次。

豁痰利尿散 同 主治同前

乳香 琥珀 蕪合香 各半錢 舍謨比東末

鹿角灰 各一錢半

右五味細末分作十八點日三服

五物拔兩撒摩丸 同 吐血胸膈痛肺癰腫後咳嗽纏綿不

止者。是為肺癰膿潰而浸淫四邊也。此方主之。

拔兩撒摩骨拜菴 錢四 拔兩撒摩亭露 分五

鯨腦 蘇合香 甘草末 各適

右五味。每一錢為十五丸。半時服一丸。服之。發熱者。乃停。後服。唯用寬胸湯。見咳

五物導痰飲。蘇肺癰已潰膿。已咯出者。與此飲。見熾或二

物化痰散。見聖又治肺癰腫痰出。而諸症漸退。偶觸事

故而痰俄不出。更發氣急息迫。或昏睡。或譫妄等症者。

先刺絡。而用此。緩和劑。即洋萎甘草湯。洋萎清燥湯輩。亦可。若不應者。

宜貼天灸膏於臍腹及肘手大妙。

香膏丸。同肺癰吐膿漸止。胸中無所患者。為膿已盡也。宜

此方。方見水腫

剝利瓦兩甘草飲。同治前症。又治其膿成而不潰。苛毒侵

全肺。遂混血中。日羸弱者。見胸水

蘭苔甘草飲。同治前症。亦有良效。方見吐血

蘭苔龍牙湯。寡肺癰已潰者。宜用大麥粳米龍牙草作湯

服。之若吐稠膿者。取若格實。溫和海葱蜜。與之。枯瘦者。

此方主之。

依蘭苔 龍牙草

右二味。水煎溫服。虛憊甚者。加幾那。

芙蓉油。同肺癰乾咳劇。夜卧不寧者。宜與此油。見麻或撰

芙蓉刺蝟散

見痘瘡

化痰驚

見喘急

匾桃膏

見熾熱

輩用之

四物甘草丸

見肺癆

已潰咳嗽夜最甚徹曉不能眠者宜

止痛藥無熱者此方主之

甘草膏

黃陸

藎合香

拔雨撒摩骨拜藎

各一錢

右四物每二錢作二十九丸

合乃我魯蘓丸

壽

肺癆咳甚者肺漸虛衰也宜當夕與此

丸

一分子若大便不通者射緩和導見熾熱於肛門

錐肺蜜

同

肺癆吐痰漸減飲食進氣力加熱解者宜用此

方

拔雨撒摩骨拜藎

分五

卵黃

個一

蜂蜜

錢八

右三味先取上二味內乳鉢研勻乃和蜂蜜服三哥喜

匙日二次隨報服後方

蘿蔔連壳湯

同

主治同前

黥失刺護

山蘿蔔

小連翹

各一握

甘草

錢十六

右四味湯泡温服

解凝石酸丸

藥

肺癆腫瘰後胸中覺重稍動大疲短氣倚

息不得卧脉小而無倫或乾咳不止者肺頑結也宜撰

用此丸見及鈎吻煎丸見失苟石酸鈎吻丸見聖兼服

緩和劑即洋葵甘草飲洋葵清燥湯類殊驗

乳清蜂蜜飲微肺癰腫諸症已解呼吸不暢時々乾咳食

後或動作後殊甚胸腹微悶者肺為堅腫也是日肺結

此方主之

甘乳清合四 蜂蜜八

右二物攪和每旦服一小玻璃瓶數月乃驗三物石酸

丸見聖亦宜

解結石酸丸 寡肺癰腫癰熱全解腫仍不消漸々硬結者

必氣息短促乾咳太苦總動作或食罷則益甚若不經

久者此方良驗

石酸八 安沒尼亞加膠二

芥桑鈎吻煎膏一

右三物研勻每一錢作二十丸服七丸日三次

六味大力湯同 類肺癰腫之病初起身體困倦衰憊抑鬱

神識蒼茫但嗜睡眠面赤帶黃氣急胸煩無熱或微熱

次洒然振慄寒熱往來氣急衰憊轉更增劇小便淡白

或赤色。或利濁。或澄而入。溺器即濁。反與塗。試振蕩之。則泡起。咳嗽而發。頭痛及夾症。幾似真痲腫。由是寒熱大減。以其人粘液充塞肺脉。乃遇冬春連煖之候。而粘液渙釋。汎溢以發是症也。此方主之。

牛蒡根 屋矢薺見 各十錢 依促布

接骨木花 各八錢 消石 各五錢 海葱 各八錢

右六味。以水先煮牛蒡一刻。下依促布。接骨木花。浸之須臾。故取四合八勺。把餘藥。分溫服之。不知者。與結雨。幾斯密。涅刺列。症危篤者。每一時。或一時半。與金硫黃。

一二黍

三物解煩飲 同 前症治之。寒熱已退。吐。出膠痰。而反胸煩者。以此飲主之。

蜀羊泉 莖十六錢 搗爛者 屋矢薺見

麗春花 舍利別 各八錢

右三物。以沸湯先浸蜀羊泉二刻。即畧煎之。濾去滓。下餘藥和勻。一時半。與二十四錢。

三味安沒尼亞丸 同 前症。變胸水者。往往有之。於老者。殊為多。故速其病。差宜用。以方預防之。

安沒尼亞加膠錢四

質利忽利比蒲倫鹿藿煎膏二錢

土木香煎膏錢一

右三物研勻。每一錢為二十九。銀箔滾服五丸。日四次。

小便少而體不腫者。加海葱煎膏二三黍。

大麥酒石飲微類肺焮腫案交痛者。只其症。大抵熱壯口

苦心下痞悶。眼色青蒼。面赤帶黃。皮膚大燥。小便污濁。

大便頻利。所下如膽汁。而臭氣撲鼻。脈強堅而數。其痰

必微黃。是肺有壅塞。而作腐敗之所致也。若肺微焮腫

者。宜放血。施導方。次與此飲。見腐敗熱

硫董膏同治前症熱劇者。見熾盛熱

加味酸消飲同治前症久不退者。見瘡

二物消石湯同前症初起。宜多服。以湯且點天冬膏於腓

腸。

牛蒡根或款冬根二十四錢消石五分

右二味。以水六合。煮片時。瀝去滓。服。或取三物接花飲

先痘瘡二合。四勺。加消石五分。用之亦佳。

白帛散同前症無焮腫之候。或其候全退者。宜與此方。見腐

或獨聖散見神經熱吐之

潤腸飲 同 前症病人惡吐藥者宜用此良效 方見

遠志根湯 同 肺藏炊腫不拘真假宜此方又治喘急 見胸

導痰飲 主治同前一時服一盃 方見

勞瘵虛損

蘭苔湯 伊 治勞瘵咳嗽一切虛損瘦怯無力神效若脉弦

舌乾肌燥者禁之

依蘭苔 八錢

右一味以水二合四勺煮二刻故取汁一合四五勺和乳汁或乳清二合四勺服

蘭苔甘草湯 同 治勞瘵乾咳及麻疹後咳嗽又治一切虛

損羸弱自汗盜汗

依蘭苔

浸水一宿曝乾者四錢

甘草 二錢

右二味水煎取三合二勺濾去滓半時溫服一茶鍾飲冷吐痰者加海葱蜜少許

六味蘭苔飲 同 主治同前

依蘭苔 八錢

甘草

蜀羊泉

並各六錢

點矢刺護葉

小連翹花

各三錢

茴香

總二錢

右六味湯泡溫服

幾那蘭苔湯

同

治勞瘵發於肺弱嗽而痰多者。殊良。
凡

肺有嗽腫之候者。必久與幾那蘭苔並有。害。

幾那

錢八

依蘭苔

錢四

洋葵舍利別

錢八

右先水煮一味。去滓。下洋葵舍利別。和勻。一時溫服。一

茶鐘。

挽回湯 沙 治勞瘵。以親驗之神方。得效甚廣。

海葱醋

兩一

石灰水

兩十

蜂蜜

各三

薔薇蜜

兩

拘椽

二個自

挽兩撒摩木

加一

羅健。常。可代用。

右五物水煎。掠去上沫。湯成。去滓。溫服。二匙。日五六次。

連錢飲

蒲

治勞瘵。宜代之。常飲。能健胃。扶尅。化祛。痰。活。血。

清液止渴。

連錢草

右一味。湯泡溫服。取睡菜。或加密。列花。泡湯。用亦好。

連錢甘草飲

花

治勞瘵。肺癆。內傷。熱病。矢苟兒。陪苦等。

連錢草

錢二

甘草

錢十六

右二味。以大麥煎汁。淹一時半。去滓。溫服。欲利大便。加

甘露蜜四十八錢。利小便。加消石六錢。

海葱膏

蒲

勞瘵之叢。乾咳。食不進。食輒吐。身熱。胸肋痛。

常唾鹹或交血續氣鬱渴多脉數而弱或實強也宜此方導痰

海葱新鮮者 安沒尼亞加膠 縮砂各二錢

右三味細末舍利別丸服四五丸日二三或刺絡治咳亦可

拘椽舍利別同 主治同前

拘椽汁 蜂蜜 砂糖各四兩

右三味上文火煎熬為舍利別頻與一匙與安沒尼加乳見咳亦佳

勞瘵初起咳嗽吐血而與驗者宜取白罌粟舍利別隔夕與中四錢大佳泥

甘葵含謨比東飲同 勞瘵唾血者用此為常飲

含謨比東根八錢 甘草 洋葵根各四錢

右三味以水一升二合八勺煮減半放冷和酸漿漿一卵匙服一茶鐘日四五

潤肺湯蒲 治前症

鶴子草根或粘魚鬚根或楮枝或西麻仁

右一味水煎温服

玫瑰膏 同 治前症以潤肺湯 上見 下之 下之 日三四次。久々奏效。

治勞瘵虛損莫良於人乳汁者。多服之為妙。嘗有一男子。

罹勞瘵精力大脫。非待它扶。則不能動履。偶遇其妻乳

汁而患頗減。始知其妙。日用之。漸々起復。遂全愈。 同○

病四春。治虛勞。每日五更。飲人乳汁一鍾。甚妙。監生劉

識菴。乃即患虛勞。命在須臾。予令其五更時。將壯盛婦

人。乳汁一鍾。重湯煮溫。作三四服。之。調理數月。而

愈。據以益足。以知人乳之妙。於勞瘵矣。疾無疑。而廣用

之。其使免天札之患。豈曰不

小補於濟世哉。故贅諸斯。

麥乳湯 同 主治同前

牛乳汁 各等 大麥煎汁 分

右二味調勻。服之。覺停滯者。每六十四錢。加燒酒一匙。

洋糖少許

勞瘵發於肺癆。不膿。乘痰而出者。須吸溫湯氣。或溫醋氣。

冷癘破。閱此法。捷而妙。同

一物幾那散 同 勞瘵發吐膿。短氣。日晡潮熱。羸弱盜汗等

症者。便成肺癆也。宜取此散八錢。分作十八或二十晝

間。每一時半。取其一。調舍利別少許。或平飲一盃。服之。

方見神 若不能服以散者。便淹幾那於水一合。六勻。一

晝夜。漉過。溫服一茶碗。日三次。若胸肺有焮腫之候。不

可與幾那劑

瑰幾膏子

同

前症服幾那散而下利者與以

陳玫瑰醬

二十錢

幾那末

八錢

右二味和橙舍利別或宜母子舍利別稀稠如蜜四五

日服盡

水楊湯

泥

治前症妙過血液敗腐固纖維縱弱

水楊皮

右一味水煎消綠礬少許服

三味大麥飲

伊

治勞瘵咳甚者大佳

大麥煎汁

四十錢

牙皂樹膠水

十六錢

甘消石精

三分錢

右三味調勻每二時溫服一茶鐘

加味匾桃乳 同 主治同前

匾桃仁

十六錢

右一味徐徐滴水研勻絞汁取三合二勺和牙皂樹膠

水罌粟舍利別各十六錢一時溫服一茶鐘

疏肺飲

同

治粘液勞瘵於肺弱者

苗香露

五十錢

驅風精

二錢

沒藥

末一錢

酒石鹽五

右四味攪和更下洋葵舍利別八錢綠礬末二分勻服
一七日四次或加幾那十六錢

沒藥丸同主治同前

沒藥二錢五分

硫黃華

珊篤里煎膏各二錢

右三味調勻每一錢作二十九丸蠅石末為衣一時服
三丸

錦葵湯補治勞瘵咳嗽聲嘶啞者

錦葵根八錢葉二握子二錢

右以甘乳汁煮取四合服一盃日二三次

趙護回生丸吳寒壞液病即虛初起無熱身體羸瘦自汗

出時々振寒日晡潮熱諸症日重不咳無痰者此方主

之

乳香

藜合香

安息香各一

沒藥一

瓦爾拔奴二錢

右五味細末每一錢作十丸搗皮末為衣初服二丸日
四次漸加至三四丸

幾那飲蒲神經勞注曰神經勞者無有寒熱咳嗽短

氣症。而飲食不進。肌肉消瘦也。此方見熾主之。取龍膽盛熱或加密列花泡湯用之亦良。

酸礬漿同治前症健胃消食最效。

丁香百二十 綠礬油二十

右二味徐徐攪和用紙濾過取二三十滴點葡萄酒或

清水一盃服日二次。

刮鍊酒泥治前症能固肺腑強筋肉清血液。

鍊粉二十

右一味浸列應酒一小玻璃瓶三週時振蕩出藥氣濾

過服一匙日二三

健胃散吳病人。顏面支體。其色萎黃。精神不聊。手足倦怠。食不進。無熱。或微熱者。是名翁傑達安篤竭意度漢耶謂脾損胃虛以方主之。

蘆會錢半 沒藥錢一 山柰錢二 薄荷油三

野艾黃鹽錢三

右五味。

健胃酒同 主治同前

羌活 水楊梅根各八 良姜錢四

薄荷

珊篤里各一握

蘆會錢一

凝水石錢三

右七味。用葡萄酒。或麥酒。一玻璃瓶。或水酒各半。浸之。

服一盃。日三次。

健胃丸同 主治同前。

沒藥錢一

乳香

質汗沒担護

各一銖

薄荷油滴三

石鹼

勿搗茶。二錢。

右五味。

發疹膏

園

治癩狂。肺癆。勞瘵。喘急。咳血。肝藏壅結。憂鬱悲

悶。侯一切神經諸症。均有神驗。

涌酒石錢一

白蠟膏錢八

右二物。合勻作膏塗之。勞瘵喘急。則肺上。骨節疼痛。則患上。

西醫方選卷七目錄

心痛。胃。炊。腫。腹。痛。腸。炊。腫。腸。癢。

母子飲 一

定痛筒 全

麝香定痛丹 二

鎮痛酒 全

乳酪糖油導 全

刺蝟散 三

大黃刺蝟散 全

雙白散 全

加味麝香飲 四

胡荽酒 五

石鹼導 五

旃那漿 六

大麥加酒石湯 全

葵葉湯 七

清熱水 全

樟腦阿利襪布 全

獨味作列布湯 八

大麥加膠湯 全

膠桃乳

輪埕飲 十

二物定痛飲 十一

和腸圓 十一

乳水飲 十二

潤腸湯 全

慈姑飲 十三

水石酸角飲 全

水酒二石飲 全

鎮痛清熱飲 十四

半百散 全

乳清薔薇漿 全

二物定吐飲 十五

寬和導 十六

密煎導 全

七物定痛飲 全

定痛利毒飲 十七

驅風定痛飲 全

麻僞涅失虫散 十八

定痛飲 全

旗嬰治疝飲 全

行氣油 十九

四温子飲 全

塩密水油導 全

行氣散 二十

桂糖幾鏡酒 全

幾那加密列導 全

薄荷飲 全

痲症丸 二十一

散痲油 全

洋葵瓦刺蕪湯 同

洋葵麻仁導 廿二

洋葵虫麻仁湯 同

寒水飲 同

茉莉酒石丸 廿三

甘露飲 同

阿勃勒酸角湯 同

劉寄奴 連壳龍牙飲 廿五

不食。飲食不化。

解凝健胃酒 同

解凝健胃漿 同

海塩水 同

四物健胃飲 廿六

枸櫞水 同

酸麥玫瑰湯 同

三味薄荷飲 廿七

剥祿布 秘漿 同

健胃膏 廿八

健胃枕子 同

三物健胃酒 廿九

幾那飲 同

飢症。異嗜。

痢姑膏 共九

痢姑散 全

四味結麗土酒 三十

健胃宣腸飲 全

健胃宣腸散 全

嘈雜吞酸噯氣。

土石豆蔻散 共

結麗土散 全

清熱健胃飲 全

角沒石塩飲 全

酒石沒藥散 共

枸櫞飲 全

將軍益智酒 全

惡心。乾嘔。嘔吐。膈噎。

鎮定飲 共三

清熱泥 全

和睦水 全

二製薄荷飲 共

建中酒 全

麻屈涅失虫散 共五

痢姑苗香飲 全

枸櫞酒石飲 全

五物飲 全

礞砂散 全

和中飲 共六

甘露酒石丹 全

神驗散 全

翻腸

神妙飲 共七

定反導 全

茉莉酒石散 共八

榛皮散 全

天工水 全

嘔血

調血飲 共九

瑰花消石湯 早

理血飲 全

霍亂乾霍亂。叔格刺虫度。

加密列湯 甲

酸角大黃湯 甲

和腸飲 全

炙蒸飪湯 全

和中湯 全

定吐止瀉飲 全

桂麥芙蓉飲 甲

六物薄荷飲 全

芙蓉薄荷丸 全

桂露芙蓉飲 甲

四物薄荷飲 全

加密列 全

清涼定吐飲 全

芙蓉樟腦油 器

橙皮酒 全

拘橐酒 甲

泄瀉

加味墨栗蔞飲 甲

薄荷飲 全

石長湯 甲

三仙散 全

柳葉菜散 甲

止洩飲 全

湧泉飲 全

定痛酒 全

健胃將軍醬 甲

加味大黃散 甲

灸大黃散 全

大黃酒 全

滌腸甘露乳 甲

掃涎酒 全

竜牙導 甲

蠟挺子 全

痢疾

獨聖飲 甲

獨將飲 全

獨聖加罌粟醬 全

四物石脂圓 甲

加味水楊湯

瀉毒宣腸飲 甲

土桂湯 全

麥粉導 全

雙膠煎 甲

大黃肉豆散 全

大黃茉莉散 全

定痛止瀉膏 全

芙蓉礬石丸 全

清熱抑膽湯 五十

靜息飲 全

緩和導 全

的列並導 五十

麥酸湯 六十

桂露麥煎酒 全

西瑪兒拔湯 六十

治痢膏 全

治痢圓 全

的列並導 全

乳油導 六十

作列布導 全

皂膠飲 全

定痛醬 全

固腸定痛飲 三十

石灰甘乳飲 全

喇咕珊瑚散 六十

五味乳香散 全

定利酒 全

龍牙舍謨比東導 六十

的列並挺子 全

大便秘閉

順利丸 六十

緩下醬子 六十

大黃石鹼丸 全

无憂潤腸油 七十

又胃腸痛由過飲停食。或敗膽汁。酸敗液發者。當下其毒。毒盡而痛仍不解。則選用此飲。輩並有良效。

芸薹香草飲同 前症雖服。鎮痙芸香飲。輩而全。退須補復。

虛衰以防再發。宜此飲見熾盛熱及杜元鎮痙丸見失苟三

製薄荷飲見痛輩

母子飲泥 治胃腸痛因宮癩。若涉卑濕發者。

甘乳汁一盞 接骨木子醬一匙

右二味。先溫乳汁。乃下子醬攪勻飲服。

定痛筒蒲 心痛倏忽發者。聚由脾癩。宮癩致拘攣甚。而使

然也。施以良驗。

阿芙蓉液六七滴

右一物。和溫湯射之。肛門寧痛轉劇者。增阿芙蓉液。令

與水各半。再次行之。且服後方必驗。

麝香定痛丹同 治前症神良。

的里亞加勿搗茶 麝香十黍至

右二物調勻。二時或二時半頓服。

鎮痛酒同 治前症。又治攔控脫臼。聖京健等。不厥腫而痛。

者。

白石酸錢八 阿芙蓉錢二 醃燒酒錢七十

樟腦錢三

右四味先取三味攪勻置煖處三日漉過和樟腦塗之痛處。

乳酪糖油導同 治前症大便秘者。

乳汁各四十 清水各四十 阿利襪油 牛酪

紫糖各十

右五物攪勻射注肚中加芒消或食鹽八錢則功益峻浮蔡酒石散發 病膈中絞痛煩悶食不進或噎苦或噎辛。

或噎腐胃中如燔者名曰嘈雜若口苦所噎如敗卵或

敗油者宜選用此方及加味梅肉膏加味酸角湯並是

熱取微利又腸痛喜酸味者有敗膽汁也亦宜以散輩

百葛霸王散同 前症温々欲吐者此方吐之加味白帛散

二仙散擦膈散亦宜若不愈用浮蔡酒石散或加味

酸角湯六方悉是 下之。

蝟蛄散同 治胃腸痛因酸敗液者。

蝟蛄石錢四

右一味細末服一小匙日二次。

六黃痢散同治前症

大黃錄二 痢姑石錄一

右二味散末。一頓服。

雙白散同治前症

霸王鹽分量 麻屈涅失亞泥篤利四錢

右二物細末。朝夕服。一哥喜匙。五物薄荷飲見帶亦效

二物大黃散同胃痛。胃中覺冷重。食不進。食則飽滿噎氣。

小便清白。漩面如繭絲。或漩脚凝。做糊樣。或時吐水飲。

者。宿水停飲之所致也。當下之。宜以散。及霸王飲。浮礬

酒石散三方見 熾盛熱輩

加密列飲同前症吐下後病已解者。用以飲。或菩薩香草

飲二方見 熾盛熱調理之。

心痛發於過酒者。多服微溫湯。或淹茶。取快吐。吐後熟眠。

則愈。若吐之。次日體疲。頭疼眩運。惡心欲吐者。毒未淨。

盡也。更吐之。下之。當夜胃覺冷重者。服大的里亞加一

錢。而令安寢。翌旦必愈同

分消飲同人喫酒漿後。即得胃痛。兼膨脹痞悶者。宜選以

飲。及健胃漿五凡 菩薩香草飲見熾熱與之 若從食物不

化得之者用浮磬酒石散見熾或三物閑壅飲霸王散

二方見瘧輩下之膨脹甚屢發痛者行下導法為妙

四味健胃飲同心痛久不解或已解而屢發之者共胃弱

也若解後仍不思食胃實則痞懣空則頗快者當防復

發宜以飲或健胃漿二方見瘧三物幾那飲見腐輩

加味大力湯同胃痛因自家或隣藏有凝結者膠固不易

治如以症抑按之乃可知也治法須止解凝結宜以湯

及分消飲三物閑壅飲霸王散解凝石酸丸五方加味

石酸鉤吻丸見聖輩久而有效

加味麝香飲伊治聖京健及伊屈篤病人元氣虛弱不足

外散之毒內攻而心煩胃痛者又治一切細瘡不快發

者皆妙

薄荷露二十錢橙皮舍利別四錢撒法即一錢

麝香一錢五黍七木換哇弗兒越的兒一錢

右五物攪勻一刻服一匙

心痛由于喫毒或服悍藥者宜緩和汁液加脂油牛蒡氏用

油以吐之不慮者用玄武餅或鉅石酒加味乙百葛格

安那酒三方見瘧更促之吳

健胃丸

同心痛。噫腐臭。空心則痛發。吐敗。則快。痛宴時

休者。胃中有腐敗毒也。宜先吐之。次與此丸。或健胃散。

或健胃酒。共凡防更生之。

胡荽酒。治胃痛及諸患發於胃寒者。

泥菖 土木香 拘樓皮各四

的蘭皮二十 胡荽子

小茴香 茴香各八

右七味。淹燒酒拂即二晝夜。去滓。服一匙。日三四。

石鹼導藿胃痛。惡心。噎氣者。當吐之。痛反增劇者。宜施此

導大便。秘結者。殊妙。

石鹼八 蜂蜜一

大右以溫湯先溶化。石鹼和蜜射入肛門。無膿者。百發

旃那漿包治胃腸痛。因神經拘攣。或粘酸液。或冷物停滯

者。

旃那錢四 葛樓子一錢 益智十

乾葡萄錢四

右四味。以稀燒酒一合。二勺。淹候藥味出。濾過。約取三

四分。一白葡萄酒調服。

單將散 蒲 胃痛食已輒甚者有宿食也先與輕吐藥而此

方 見蘇下之

胃痛發於風氣者常噯氣食已心下苦懣也取綠礬菜十

五滴至二十滴熨葡萄酒或加密列飲 見熾一盃日一

二服甚良固所歷驗

胃痛發於蛔者用殺虫劑治之 同○諸虫篇可參照

大麥加酒石湯 卒 治食罷即惡心嘔逆腹痛劇甚面色蒼

青頭運目眩而無熱者

大麥煎汁 浮酒石

右二味攪勻先服此湯兼施鹽鹼導 見卒次每半時

與宣腸散 見卒中風代海 一茶匙如無寸驗大便不通

痛不移處者食毒停腸中也宜作石鹼導 見上加光明鹽

阿利穢油射入肛門且取匾桃油二三匙熨白湯日數

服

葵葉湯 微 胃痛因燠腫者必惡心嘔逆心下痞滿時發謔

妄也宜刺尺澤而多服此湯兼作錦葵導 見聖射注肛

中不必問大便利不

錦葵葉

右一味。水煎溫服。匾挑盧子乳。昆氏曰。甘乳清勝。北劑。大麥湯。在

熾盛亦驗。

清熱水。昆前症初起用。此大驗。

冷水。不拘醋。六分

右二味調勻。蘸綿布敷腹上。

樟腦阿利襪布。同前症。病人虛弱。不堪清熱水者。用此。

阿利襪油。不拘樟腦。八分

右二味調勻。蘸綿布敷腹上。

前症。痛久不退者。屢浴溫湯。甚佳。徵腸胃有穢積者。禁之。

獨味作列布湯。八胃喉腫。發於其上口。或下口者。最為危

急也。宜速放血。與此湯。兼貼胃上。或貼天灸膏。施緩和

導方。浴湯沒至心下。或行湯腳法。

作列布

右一味。以水四合。八勺。煮取二合。四勺。每服一茶匙。

大麥加膠湯。同主治同前。

大麥煎汁。九牙皂樹膠。八

右二味。用大麥煎汁。烱化膠。和沙糖適宜。服之。

膠挑乳。同主治同前。

區挑錢八

牙皂樹膠水

錢十二

右二味以水四合八勺同研如乳汁絞去滓服之

消石散 蕪胃嫩腫者胃中灼熱刺痛食則痛不可忍或噦

逆而食不入脉堅數或伏大渴煩懣甚則心下劇急面

色青慘大汗流滴四肢厥冷脉細數殆不可診也治之

只須急放血藥汁得下則時々取以散五厘蒲氏用五分

大麥湯調下或選消石粟接飲接骨清涼飲二方是熾盛熱

葵甘草湯見瘡雙白散見上時與一匙頻行導法共有良驗

鎮痛止痛飲同前症刺絡行導法後嫩熱退痛悶減而嘔

吐不止者宜以飲見聖或桃油卵黃圓見麻鎮瘧三物

飲見瘡輩時與一匙

接骨木花飲微腹痛從傷食得之温々惡心欲吐不吐者

用此飲或加蜜列飲二方是熾盛熱或微温湯或鹽湯促吐之

若腹脹甚大便秘閉者温湯消食鹽射入肛中導大便

獨聖散同前症大便通腹痛止而口臭如敗卵者此方見神

經吐之

腹痛因飲食不化者宜先吐之痛稍定則用單將散下餘

穢蒲○方
見痘瘡

大麥湯蒲治腹痛發於食蜂蜜雞卵類者方見熾盛熱蔗飲湯

見麻考亦宜

接骨錦葵飲蕪人有夏月乘夜取涼或食冷飲水冬日衝

寒薄衣被或久涉濕地而得腹痛所謂寒病其痛統臍乍發

乍歇其發也甚則煩悶眩暈冷汗出其歇也脫然如失

脉平無熱無渴不惡心抑按其腹亦無所加痛也此飲

主之三方見熾盛熱加蜜列飲芸薩香草飲亦可選用兼敷腹

上以苗香布即以苗香所薰綿布或肉豆蔻布製法作油露導加

列花露亞麻油射入肛門等分調和者

鎮瘧三物飲同治前症諸治无効頑固不愈又治腹痛發

於脾瀉宮瀉及一切孽急者方見瘧鎮瘧芸香飲見黃亦

好

輪埕飲微腹痛發於寒冷者即寒病刺絡行湯脚而支服此

飲

善提樹花

右一味湯泡和乳汁少許服之隨服阿芙蓉液一黍痛

仍不止者貼芫菁膏於脚妙

脚足觸冒寒濕而腹痛者先行湯脚次與大麥加酒湯見

速效蒲

加味酸角湯 獲人有中異錫水銀信石等毒而發腹痛

鉛毒病。又經礦山病。神經病。隔滯病。礦夫。鑛金匠。漢畫匠等。罹此患者為多。病極為深。其痛

大抵發於胃或臍邊初不甚苦斯須乃休越時經日復

發之漸次增劇彌少間斷飲食不進肚腹膨脹愛氣或

嘔逆身體瘦弱腹裡拘急而覺如臍貼背小便不利大

便秘結肚門緊閉幾不可入積筒終至手足麻痺或全

軀瘦削也宜當起初用以湯或三物洋藥湯久之不驗

者選酒石茉莉散霸王飲五方見清涼霸王散先平清

熱瀉心丹見眼輩治之

煙草導同前症起初宜先施緩和油氣之導方利大便若

與驗者作此方或寒水導海鹽石鹼導皆先射之穀道

仍不應則真入煙草

壯元飲同前症衆治相應而諸症漸解發作不劇間歇頗

久者宜以飲見熾或大蓼飲石鹼鈎吻丸二方見分消

飲破結石鹼丸三物亞爾尼加飲三方見輩久服以至精

力麻痺共復若麻痺不復者浴硫黃湯則效

前症腸中有燥屎者雖愈必復發若欲防之須服亞麻油

亦可麻油三四兩，日二次，以利大便同

二物定痛飲，微治鉛毒疝痛甚，嘔吐不止者。

含電法，謨阿芙蓉液八十滴，墨栗薩露二十錢

右二味攪勻，每刻服一匙，或用阿芙蓉液一二匙，吐定痛止，停後

服，兼服單將散，或施錦葵導利大便，無驗者，共加扁桃

油。

和腸圓同，前症單將散不應者，宜此方。

扁桃油八錢，甘露蜜十二錢至十六錢

右二味調勻服。

大黃蝟蝟散同，治前症膠固不瘥者，又屢服之，則能防復。

葭宜下每半時服一貼，方見百兼用接骨木花煎汁或如

花煎下，蘸綿布熨腹上。

乳水飲同，前症痛甚劇者，服此飲，貼天灸膏於腹上。

乳汁，清水

右二味調勻，冷飲，間服潤腸湯，殊良。

潤腸湯同，前症雖痛已解，服此湯，或單將散為佳。

洋葵根，錦葵葉，鱧膠

右三味水煎服。

加味麗春飲蘇 鉛毒疝差後飲。啖酒漿菓瓜。復發者宜與

此飲見失苟 或解凝散鬱膏見聖 併服大力飲見 或鼠

婦丸見水

鎮痛芙蓉飲同 鉛毒疝諸方無效。痛淹纏不差者宜此飲

見麻 或鎮痛止痛飲見聖 鎮痙三物飲見

預防鉛毒法同 凡鉛礦為業者宜每且先未從事以乳汁

黃蘗麥作粥和脂膏啜之必免中其毒 飲油或酪一二

兩亦好

乳清導微 病人腹不膨脹而切痛難堪內熱煩渴口苦屢

吐黃水動輒頭運目眩或發熱或不熱小便快利而微

赤其脉不數不強堅經二二月而諸症退者以膽汁所

致也以名宜施以方 見熾或錦葵導 見或以温湯熨其

腹或浴湯沒至心下

慈姑飲同 治前症

車前葉山慈姑

右一味淹沸湯出藥味慮去滓更 和拘櫟汁或醋和少

許飲服或服酸角湯見 半時一茶鐘或服酒石散見 五

分拉良

水石酸角飲同治前症熱退而痛不解大便秘者

凝水石八錢 酸角十六錢

右二味灌沸湯一合六勺攪勻去滓每服半劑日二服

水酒二石飲昆前症溫々惡心欲吐者此方促之

涌酒石四錢 凝水石四錢

右二味將水四合消盡一時服一小麥酒盃

酒石散微前症屢發屢歇者用此方見防更發

清涼宜腸飲吳盛夏炎熱之候卒發腹痛口苦惡心噉氣

食不進胃熱而刺痛身體如灼者是縱啖油膩過飲酒

漿外感時氣而令膽汁敗腐也宜先用此方下之而選

大麥清涼飲酸模清熱飲蒸餅清熱飲四方見解其熱

並加罌粟一二顆或阿芙蓉液二十滴殊佳

鎮痛清熱飲伊治腹痛因膽汁者又治膽汁熱洞利等血

液已欲敗腐者竝妙

醋十六錢 舍利別四錢 酒石鹽一錢

忽弗滿止痛液二錢

右四物以沸湯八勺調勻每半時服一匙

酸角湯蒲腹痛因膽汁者其証繞臍剝痛煩渴甚大便秘

會吐黃水則痛少退須更如故至其甚則腸機逆運恰類腸攷腫也宜與此方見或作大麥湯見熾盛熱加拘櫟汁若浮酒石服之病人少壯脈實數者故血行導法後用欬者霍氏曰無熱者不可故血

半百散 腹痛因肉食不化激溢膽汁或生風氣發之心下痞滿或噯氣如敗卵者此方吐之

乙百葛

好大黃

酒石英

各半

右三味細末一頓服

乳清同

腹痛因膽汁者行緩和導方服此湯

乳清

和酸角適宜者九十六錢

舍宍

涅德鹽

各六錢若八錢

薔薇舍利別

十二錢

右三味調勻服或用酸角湯或作大麥湯加蜜醋或桑椹酸模香櫟等舍利別與之並驗

二物定吐飲同

前症嘔吐甚精力脫者先用薩薄酒即取薄荷墨栗薩二味浸燒酒出氣者慰中脘而用此飲

野艾蒿鹽

香櫟汁

各二錢

右二味攪勻乘泡沸服之症劇者煎鉄心和阿芙蓉樟腦作膏貼胃上病少間則用止痛藥若諸治不效作緩

和驅風導方。和阿芙蓉一二黍。射入肛門。吐定則服。大麥湯。若舌苔尿赤。腹堅脹者。加之酸角酒石。英清下之。

洋葵甘草湯。蘇病人大便逼迫不安。數日秘結。腸中有燥屎。按之如禪丸。或腹緊急而起落如波。鈍痛者。當通大便。宜以此湯。及加味大力湯。加味酸角湯。一方見熾盛熱。用峻下藥。

霸王散。同前症用。洋葵甘草湯。輩而大便不通者。宜選用。此散。及三物飲。二物大黃散。並見熾盛熱。輩。

寬和導。吳腸痛。大便數日不通。間或僅通。亦甚燥結。按其腹。則堅硬作環狀者。燥屎滯縮腸也。小兒最善患此。宜此方潤導大便。

精大麥 錢八 洋葵葉 一握 蘇那 錢四 食鹽 錢二

蜂蜜 錢八

右五物。以水三合。二勺。先煮三物。取二合。乃和鹽蜜。無溫射入肛門。令藥液不漏出。半箇時辰。必驗。小兒量用。三四分之一。

蜜煎導 同主治同前

蜂蜜錢八 食鹽錢一

右二物煎熱候其可銜手捻作允子大如小指塗以油少許更滾之使汗及扭護末內穀道中居可半時或一時餘乃得通利又取石鹼一塊作挺代之亦驗燥屎已除腹痛全解則與順利丸見大便閉利大便令不復發

七物定痛飲吳腹裏搐急冷痛風氣滿之面色蒼白無熱冷汗出或吐水液咽中覺有生菓味或下綠便者乃飲食酸敗於胃腸之所致也宜取格墨因子小茴香葛樓子等淹燒酒與之速效設投下劑則不啻不通利反生

風氣更加痛憊也但其毒在縮腸者施緩和之導方與趙酸藥以徐徐驅之以方主之

龍腦薄荷露 茴香露各二十錢 沒藥

刺楸布利性室各 酒石液各一錢

葛樓子油五滴 白罌粟舍利別錢八

右七味調勻平時服一匙痛劇者加阿芙蓉液一滴至二十滴病人慣喫悍烈之飲者加柏椽精若橙皮精茴香精消茹露輩四錢

定痛利毒飲同治前症用七物定痛飲痛止而大便不通

者凡欲排逐酸毒則方中非加止痛藥莫能全其功也

旃那錢三 酒石鹽錢一 小茴香錢一

白罌粟舍利別錢八

古四味以龍腦薄荷露一合六勺先淹三味出藥氣上

火一沸瀝去滓乃下罌粟舍利別和勻溫服半時一茶

鐘大便通則復服七物定痛飲令毒液勿更生

驅風定痛飲治腹痛發於神經急

薄荷油滴六 清水或葡萄酒

剝祿布利恒室茶匙 松漿五六

右三物調勻頓服若痛久不止加阿芙蓉液十一二滴

麻偃涅失亞散治腹痛因酸敗液及風氣者

麻偃涅失亞 茴香 白沙糖

右三味為末一時服一卯匙白湯送下

定痛飲腹痛發於腸及腸間膜寧急者倏忽本末緩無

定處也此方主之

龍腦薄荷露 茴香露各二十錢

急製硃砂精錢二 橙皮精錢四 阿芙蓉液滴五

沒藥錢一 白罌粟舍利別錢八

右七物攪和。每半時服一匙。至痛止。鎮痙飲。鎮痙除壞丸亦好。大便不通者。與定痛利毒飲。見上

腹痛發於官痛者。其症與因膽汁者無甚差異。大畧中脘

劇痛。多吐綠物。精力虛憊。謔言妄語。呼吸不利。間或發

黃。不日自去也。吐下刺絡。並非其治。但吐劇者。宜先與

微溫湯。淹茶。大麥湯。輩促之。以淨胃中。次取阿芙蓉液

十五滴。至二十滴。和桂露一酒盃。每五六時服之。至諸

症減。以石薄荷露一盃。送下阿魏丸四五粒。良効。蒲

旗嬰治疝飲。吳病人腹肚脹痛。而有翁傑達安底度之候

者。壞液戟刺腸之所致也。以方下之。

旃那錢三

葛樓子錢八

凝水石

橙皮

各一錢

白罌粟舍利別錢八

右五味。先取四味。浸水一合。二勺。候藥味出。瀝去滓。和

罌粟舍利別。乘溫頓服。

驅風飲

同胃腸機轉逆常。擦搖其氣。以發痛。名曰者。第定

其妄動。則風氣自散。痛乃止。以方疝黃主之。欲溫胃腸。

加驅風精見方二錢。

行氣油。伊治腹痛發於風氣痞滯者。又治嘔吐。

肉豆蔻油錢二

薄荷油五滴

阿芙蓉十

右三味調勻塗患處日二次。

四温子飲治腸痛發於風氣者良驗。

茴香 小茴香 格墨因子

葛儂子各四錢

右四味細釗泡沸湯四合八勺温服胃有停滯大便秘

閉者加凝水石四錢茴香舍利別十六錢。

鹽蜜水油導治前症。

光明鹽錢八 油 蜜 水各適宜

右四物攪勻每半時向穀道射之。

行氣散同 治前症或時發作者。

葛儂子 格墨因子各四錢 乾姜二錢

撒法郎半

右四味極末每服一銖至五分便秘加紫茉莉末一錢。

桂糖幾鍊酒同 腹痛發於風氣而膨脹甚大便秘者去腸

虛之所致或有腸麻痺而使然也此方治之。

幾那末十錢 鍊粉 桂 砂糖各四錢

右四物入長頸玻璃瓶內灌好葡萄酒一斤半出藥味。

瀝去滓服十六錢日二三。

幾那加密列尊同治前症

幾那粗末加密列花三握

右二味以水三合六勺煮幾那取二合下加密列出藥

味射注肛門

薄荷飲同腹痛發於風氣而膨脹者宜此方

龍腦薄荷油十滴龍腦薄荷露八十錢

砂糖八錢

右三味先取油糖調勻和露服二匙日數次

越謨回生丸吳腰腹一時發痛狀如腎疝証見而無結石

之候者以靈液中混屬毒也當驅逐其毒宜此丸見勞

或定痛排毒丸見聖旃那治疝丸見輩

非疝丸同腸痛定處久不止肘脚麻痺不逐者名曰非疝

以方主之

安沒尼垂加膠二錢拔爾撒摩字露

酒石鹽各五迷迭香油六滴山奈適宜

右五味每一錢作十五丸服四丸日四次久々乃効加

琥珀乳香亦可兼取散非油次摩肩背腰膠令靈液渙

通

散非油 同治前症並一切麻痺。

老利兒油 十二錢 的列並底那 四錢

拔爾撒摩字露 硃砂精 各二錢

右四味調和擦患處日二三次。

芙蓉刺蝟散 腹痛發於泄瀉痢疾後者。及兼裏急後重

也。宜選用此方及鎮瘕三物飲。並見鎮瘕芙蓉飲。芙蓉

油。並見神驗。

洋葵瓦刺換湯 寡治腸痛因飲腫者。

洋葵根 瓦刺換根 洋葵舍利別

舍謨比東舍利別

右四物以水先煮二根瀝去滓內餘藥和勻服。

洋葵麻仁導 同治前症。

洋葵根 四錢 亞麻仁 末二錢

右二味以水二合四勺煮取一合六勺更和蜂蜜七八

錢射入肛門。

洋葵亞麻仁湯 壽病人脈強身熱口渴嘔逆甚腹脹痛而

不可觸大便秘閉小便赤頽脫精力者為腸燉腫也。

治法急放血。若一刺而痛行緩滑導。見腐敗熱而作以湯與

之

洋葵根八錢 亞麻仁二錢 消石一錢 蜂蜜四錢

右以水先煎上三味一刻取七合二勺去滓下消石蜂

蜜烱盡每二刻服一茶鐘

天灸膏 治腸胃助膜肝臟等焮腫起初刺絡而貼之患

上則更良驗敷藥水

寒水飲治腸焮腫宜此方下之湯下劑不下者浴溫

凝水石十六錢 寡氏用八錢

右一味以溫湯三合二勺寡氏用二水消盡一刻與二三

匙服之間有嘔吐者防之取阿芙蓉液十五滴至二十

滴薄荷露一盃熨服妙

茉莉酒石丸同 主治同前

紫茉莉根 礬酒石各四錢 阿芙蓉一

右三味石礬丸一頓服不知更服一劑

甘露飲微 腸焮腫痛止熱退精力稍復但善寐者當下之

此方主之又治腸癰膿已成者並偉効

甘露蜜十六錢 凝水石一錢

右二味將甘乳清一盃烱消服慎勿用峻下藥

阿勃勒酸角湯 昆 治前症殊佳。

阿勃勒 酸角

右二味水煎温服。

洋葵清燥湯 獲 腸痛腹皮拘急痛定處而不可觸近其痛

隨吸氣更甚舌燥或白苔壯熱大渴脉堅實屢欲吐大

便秘結小便少而赤或莖中熱痛者此乃獲於腸燥腫

也宜速放血而選用此湯及洋葵甘草飲 二方 凡

石散消石粟接飲 二方 凡 熾盛熱 輩兼行導法 蜜腹上 以洋葵

加樟腦膏 見黃 射之以緩和藥如此而大便仍不快通

者作加味酸角湯加味梅肉湯三物洋葵湯 並見熾 輩

與之。

海鹽石鹼導 同 前在施上件方法而痛仍不止者角乾筒

子於腹上數處或貼天灸膏於痛處奇驗若大便秘結

百方無効者宜撰以導及煙草導水石導射入肛門次

作清涼霸王飲 共見 卒中服之必驗然諸藥未試者勿施之

藥共峻也

挑油卵黃圓 同 前症嘔逆不止藥汁不入者極危急也宜

速放血施導法傳緩和藥於痛上救之若嘔逆稍減則

與此方見疹或鎮痛止痛飲見聖壯神飲。舍乃我魯

蕪丸見腎痛輩服之嘔逆定則用緩下劑嘔逆復發則再

選此圓輩相間服。

蔓菁飲壽腸焮腫三四日不解痛止腹覺重身戰寒者已

變成瘰也。宜晝日用軟堅熨見胃痛蒸腹上當夜貼烏爹

泥膏見今日若瘰已潰下膿者頗行緩和道見腐作此飲

加蜂蜜服之兼用沒藥蝟蛄散肺瘰

腸瘰已潰日晡潮熱者服乳水湯見良驗。壽○微氏加之

方。隔日施之。

寄奴連翹龍牙飲寡治腸瘰膿下者禁早用之。

小連翹稍 劉寄奴 龍牙草各等分

右三味湯泡溫服。

不食飲食不化。

解凝健胃酒吳病人心下痞滿而覺冷重全不思食偶吐

稠飲則稍爽快者是稠飲阻格胃機之所致也。宜先用

銛石酒加味乙百葛格安那酒共見腐敗熱輩湧之而與此

方防其更生。

葛雨儒 野艾蒿各二握 蘆薈

酒石鹽 各二錢

右四味淹白葡萄酒六合。候藥味出太滓空心服。一茶鐘許日三次。服之。下利甚則減蘆薈。

解凝健胃漿 同前症服前方。下利甚者宜此方。

剥祿布利性室私漿 各四錢 酒石液 錢一

龍腦薄荷油 五滴

右三味調勻。葡萄酒點服二十滴許。

海鹽水 伊治胃弱不思食。

海鹽 錢四 海鹽精 錢二

右以水八勺。先烱消海鹽。次下精。每服一二卯匙。冷水點服。日二三次。

四物健胃飲 蒲治胃弱飲食不化。全不進食。

龍膽 珊葛里 各四錢 柏椽皮

橙皮 各太白 二錢

右四味細剉。淹沸湯六合。四勺。出藥味。濾去滓。服。一茶鐘。日二三次。

酸漿漿 同治胃腸虛弱。生風氣者。并一切服。健胃劑不効。症。每服十滴。至四十滴。葡萄酒點服。冷水亦可。方見勞瘵虛損。

拘椽水 人不思食胃熱如焦屢噫臭惡或噫辛熱苦味
向食惡心者是敗膽汁之所為也當用酸味克之宜以
方。

拘椽汁 清水

右一味和勻服若敗膽汁者用甘乳清浮酒石下之
酸麥玫瑰湯同煎症膽汁甚稀厲而不中吐下者宜以湯

精大麥 酸模根 各八錢 玫瑰花 半握

拘椽汁 八錢 列應酒 十六錢

右五味以水六合先煮上三味候麥熟內餘藥和勻頻

頻服少許

三味薄荷飲 同主治同前

拘椽汁 八錢 酒石鹽 一錢 龍腦薄荷露 四十八錢會缺即取龍腦

薄荷油三三滴調砂糖少許以大麥煎汁和勻代以

右三味先取上二味徐徐攪拌至不泡起和薄荷露服
一匙日數次

剥祿布利坦室松漿 健胃進食扶消化通大便

沒藥 末十錢 蘆薈 末八錢 撒法郎 三十錢

右三味入玻璃瓶注甘綠礬精四十八錢醱燒酒百九

十二錢固封安之隔砂火四日。瀝去滓每服二錢或葡萄酒調下。

宣腸散 平 飲食停滯胃遂致腐壞不思飲食者宜此方 見

中或單將散 見下之 下

健胃散 吳九人 飲食所不能壅滯者不啻由胃腸消磨傳送之更有津唾胃液膽汁大幾里雨汁者各竭其能以扶之也。若夫津唾胃液大幾里雨汁或損其性能或灌漑滲出稀乏則致寒飲而飲食不能消化也。舌胎粘滑胃膨脹而時吐留飲者即其候也。治法宜先用銛石酒

輩涌之酸角旃那飲 二方見 下之而與此散或健胃丸

共見 解凝健胃酒 見 輩防再患若口苦舌黃胎大便屢

變色者是膽汁失性之所致也。兼之心下冷痞者宜以

散。或健胃宣腸飲 見 飢若咽內胃中覺熱者清熱健胃

飲 先 治之 下

玄武餅 曰 飲食不化其人飲啖大過度停畜於胃而使然

者此方吐之鬱積於腸而致之者酸角旃那飲 二方見

下之 下

健胃膏 同 飲食不化胃腸冷重每飲食入胃即覺如石之

轉下者。以胃腸衰弱也。其胃腸无鬱滯者。宜服健胃

酒。輩非大便結者。貼以膏於上腹。振起胃機。

阿失格祿西奴護膏錢十六 丁子油六

府利油 拔雨撒護字露錢各一

右四物。先取膏攤柔韋。令其大可覆上腹。乃塗之餘藥。

貼之。更換日四度。

健胃枕子同 治前症。

龍腦薄荷 茱沃刺那各二

桂皮各四

右四物粗末。以綿混糝布作小枕子。實之。襯貼胃上。

三物健胃酒滿 治胃弱飲食不化。又預防瘡疾。

幾那錢八 益智 橙皮各二

右三味。以白葡萄酒一小玻璃瓶。淹五六日。濾去滓。每

服一盃。日二三服。徵氏文家衛生方。亦有龍腦。

幾那飲同 治胃虛弱而飲食不化者。

幾那錢八

右以燒酒四五匙。沸湯三合。二勺。浸二三日。濾去滓。服

一茶匙。日二三。

飢症異嗜。

蝻蛄醬裴 飢症者。隨食隨飢。若恐不食則眩暈是也。其夾吐瀉者。名曰犬飢。不吐瀉者。是為牛飢。共酸敗液。停畜於胃之所致也。當制其酸液。此方主之。

蝻蛄石末 勿撻茶的里亞加 各一錢

右二味調和。且夕麥酒下。

蝻蛄散同 主治同前

蝻蛄石 白糖 各一錢

右二味作散。且夕以麥酒一盃送下。

四味結麗土酒煎 症吐逆者。名曰犬飢。惡心暈倒者。名曰牛飢。並此方主之。

結麗土十六錢 的斯八錢 代佳 白檀

鐵粉各四錢

右四味。淹燒酒二合。出藥味。每思食與一匙。

健胃宣腸。飲小兒善飢。食不知飽。肢體羸瘦。心腹疼痛。大便不化。而帶酸臭。或吐酸臭者。又乳兒腹肚實滿。吐乳則酸敗凝固者。共腸中有酸液也。宜先用酸角梅那飲。見腐下之。次服此。飲且下。且調。

剝祿布利坦室私漿錢二

酒石鹽錢一

良姜錢各二

龍腦薄荷露三十錢

右五味攪勻服一匙日四五度服之大便難者加大黃

舍利別下利甚者減剝祿布利坦室私漿

健胃宜腸散同主治同前

沒藥錢一 質汗沒扭謨 酒石鹽錢五

鹿角燒灰良姜 龍腦薄荷油滴三

右六味為散服一兌充銅錢名即日三四

健胃散同子婦月經不調面色蒼黯者名室女病喜食砂

礫灰土類者是為異嗜其初發翁傑達安底度症漸成

壞液滲入胃中而使然也此散及健胃丸健胃酒共見

並良者有酸敗液之候者宜健胃宜腸飲見輩

鎮定飲同治善飢異嗜發於妊娠者方見

嘈雜吞酸噯氣

土石豆蔻散藿治嘈雜吞酸噯氣和胃腸制酸液驅風氣

消石潔淨 結麗土各六十錢 肉豆蔻十六錢

右三味細末

結麗土散蒲治嘈雜因酸液者

結麗土ケレイト 錢八

牙皂樹膠アラビシ 錢二

洋糖 錢四

右三味作末調水六合四勺。每服一盃。取刺蝟石或壯

麻僱濕 一匙。以薄荷露一盃下亦効。

清熱健胃飲吳治嘈雜神効

大麥煎汁八錢

枸櫞汁八錢

酒石鹽錢一

右三物攪勻。每服一匙。日二三服。

幾那飲蒲治嘈雜發於胃弱。飲食不化者。先用單將散見

下之。而與此飲見飲食調之。

角沒石鹽散吳治嘈雜吞酸噯氣由脂油留於胃發者

鹿角燒灰錢二

沒藥

酒石鹽錢各一

右三味細末。分為十六貼。每服一貼。日四服。

酒石沒藥散同前症胃熱如灼者。脂油留滯於胃殊為甚

也。宜此方。

浮酒石錢三 沒藥錢一

右二味細末。照前服之。

枸櫞飲泥治嘈雜發於膽汁或食肥膩者

枸櫞汁盞半

砂糖少許

右二味攪勻。一頓服。蒲氏曰。飲之燒酒少許亦妙。

嘈雜因膽汁毒者。取甘消石精一匙。熨水或淹茶服。蕭

將軍益智酒 同 治嘈雜發於胃中風氣者。

大黃錢八 益智錢二

右二味。淹燒酒三合。二勺。二三日。去滓。更和冰糖三十
二錢。每服一匙。日數服。

惡心。乾嘔。嘔吐。腸噎。

加味乙百葛格安那酒 吳 惡心發於飲食停滯。及一切敗

毒穢積者。宜此方。或玄武餅。銛石酒。三方見 嘔吐之。又

其由胃液。膽汁。及大幾里雨汁之敗腐。或敗液從諸脉

滲出。胃中而發者。吐粘液若膽汁。則稍得爽快。隨復發
口苦。噯氣。不食。心下痞硬等症也。亦此方吐之。

鎮定飲 同 惡心乾嘔。起於船暈。或環舞。或見嫌忌之食者。
擊不待治。而愈者。餘勢不已者。以飲定之。

列應酒 香櫞汁 各少

阿芙蓉液 一二滴。若嬰

許。

右三物。加水攪勻。稍々與之。

酸麥玫瑰湯 同 熱毒襲胃。必發惡心。吐粘液或膽汁也。宜
其緩和之飲劑。以助胃機。驅之。吐後仍惡心者。以湯

食加白罌粟舍利別與之

清熱泥同惡心其人心下苦悶。焮熱築動。食則痛益劇。胃中如焚。身熱久不解者。此乃胃或其近カクハラ次生羅斯。或焮腫之所致也。慎勿用吐藥促死。宜與酸麥玫瑰湯見而後貼此泥於中脘。

玫瑰花 接骨木花

右二物加醋搗和得所供用。

和眩水伊治惡心嘔吐因敗膽汁者亦此古之

野艾蒿鹽一鉢 枸橼汁或宜母子汁。或好醋。四錢。

右二物攪拌乘泡沸服之。

獨聖散壽嘔吐因停食者宜與微溫湯促之吐後惡心不

已。口苦舌胎者與此散見神隨多服加蜜列飲見熾吐

之當夜服定痛飲見瘡

二製薄荷飲壽前症吐之後用此定胃之擾亂。

龍腦薄荷露六錢 龍腦薄荷精四錢

右調勻一時半服二匙。

玄武銑吳嘔吐發於胃中痰積者宜此方見熾吐之次用

酸角旃那飲見瘡蕩滌腸中而後用健胃丸健胃散輩。

調之

健胃丸 同 嘔吐因常過飲酒漿致胃虛發之者，宜以漸停

酒漿用此丸或健胃散 並見 治之

惡阻嘔逆者，刺絡而用，緩下藥 蘇那甘露安無 順利大便

飲冷水亦可，胃虛加燒酒少許 蒲

建中酒 同 治嘔吐因胃弱者

龍膽 或加蜜

右一味浸燒酒飲服，便秘加大黃，或取酸礬漿二十五

滴，斃水或葡萄酒一盃，服日二三次，與幾那酒 見腐 幾

那飲 先熾 亦驗 下

麻僂涅失亞散 同 治嘔吐因敗酸液者

麻僂涅失亞

右一味研末，每服一茶匙，淹茶或乳汁服，日三四次。

喇姑茴香飲 伊 主治同前

鱉膠水 八錢 茴香露 八錢 喇姑石 三錢

蘇哇拂兒越的兒 二十滴

右四味攪勻，半時服一匙

拘緣酒石飲 蒲 治一切嘔吐神驗

拘椽汁十二錢

酒石鹽錢

薄荷露

桂露護者各八錢

白糖少許

右五物攪勻。一時服一劑

五物飲伊治嘔吐煩悶良驗

龍腦薄荷舍利別

薄荷露

拘椽汁各八錢

忽弗滿止痛液錢一

酒石油宜適

右五味攪勻。半時服一匙

硝砂散較治嘔吐因留飲者

硝砂錢一 葛爾儒鹽錢半

礬酒石五錢

右三物細末服。或取甘海鹽精八滴。至十滴。白湯熨服

和中飲伊治嘔吐并胃痛發於胃裏剝脫。或神經觸覺甚

者。

藜哇拂兒越的兒三十錢

加牙布德油二十滴

右二味攪和。每服二十五滴。冷水熨服。日三次。

皂樹膠飲同治嘔吐因胃裏剝脫神經裸露者。方見 阿英

蓉丸亦効

甘露酒石丹較治嘔吐發於喉腫或屬液者

甘露蜜錢十二 浮酒石錢半

右二物搜勻温麥酒調下

神驗散 雜治膈噎因食道瘡癘者良驗

龍腦五 加羅蔑兒一 砂糖適

右三味研和白湯送下

翻腸一名吐屎其症腸痛極劇嘔吐不止胃中物盡而稱逆勢遂使所留薄腸汁液道胃而出于口是因於喉腫或腸癰等使然也若吐糞穢者乃從厚腸輸薄腸海胃而出是胃腸運動反常之所致也其所以致之厚腸者最屬危急是須因明或臨間膜生敗症也其於治法各不同須推因明症而莫失措下

翻腸發於喉腫者當從腸喉腫治法大畧當初放血或以

緩和藥敷腹上或浴湯或施導法而後敷塗藥比藥

者於痛上每二時或半時熏入煙草於肛中若不效取

涌酒石六黍至八黍調水液射入之大效

法二日而後用煙草熏入肛中為妙

寒水飲同治前症頻服二匙方見若吐劇痛甚則刺絡施

導方而用止痛藥

二物定痛飲微治翻腸刺絡施油麥導即大麥煎每半時

用此定吐方見

神妙飲同稀渙稠粘清熱止痛利二便治翻腸

甘露蜜二十錢 消石一錢

右二味以甘乳清四合消盡分服或甘乳清和蜂蜜與之亦佳。

定反導吳吐屎發於熱毒侵腸者宜以導

酸模根 大麥各八錢 白罌粟苞二個

蜂蜜八錢 消石一錢半

右五味先以水三合二勺煮三味和蜂蜜消石乘溫先射入半劑於肛中兩後每半時或一時半施之以症則不可與催睡藥必無効設投吐下藥即死

茉莉酒石散 治吐尿因燥屎或大便秘閉者

紫茉莉脂一銖 浮酒石一錢

右二味作末服且用石鹼十六錢作導方射之穀道

捺皮散同 翻腸因腸焮腫者必發熱嘔吐臍邊焮熱大便

秘閉以方主之

捺皮一錢

右一味細末施清涼導方後服之

天工水同 主治同前

岩蓮花汁 蒲公英汁各十錢 浮酒石二錢

蓄薇舍利別錢

右四味攪勻服

嘔血

消石栗接飲。藜嘔血發於血實。若稠血。若痔血閉。經閉。寂
 為多治之。先放血一二次。隨施緩下導。而用此飲。或加
 味酸角湯。加味大麥湯。三方見熾盛熱瓦刺。藜酸模湯。見瘡輩下
 含護比東湯。吳痔血或經水壅閉。後惡心懊懣。嘔血。血色
 黯。補而不濃者。以湯主之。方見忌一切硬食。峻藥。

調血飲泥健胃止嘔血偉驗

綠礬油會缺用礬醋代之

右一味。和水。酸味適口為度。先與數滴。不知增之。

加味麗春飲。藜治嘔血。勿早用。瀉劑及麻藥。若血出。而

虛憊者。宜速與此飲。見失芎或桃花飲。見吐兼塗水醋

各半於胃上。或角之乾筒子。並佳。

鎮痲壯神飲。同治嘔血全止。嘔逆仍不收。煩躁不得眠者。

向冬服此飲。見聖或匾桃膏。見熾加味麗春飲。並良。見失

芎兒
陪苦

防腐幾那飲 同 治嘔血已久。精力虛脫。面頰蒼青浮腫。稍

動則心悸苦悶不可言者。宜取此飲見腐敗熱一盃和乳汁

少許。每一時半服之。若不效。與幾鐵酒。或幾鐵膏其見水腫

接骨清涼飲 同 打撲墜墮。傷損胸臆者。多嘔泄其血。若血

汎濫。腹隙。腹即膨脹。面色青脫。氣息促急。脉微而細。四

肢厥冷。拘急搐搦。死在旦夕。若患不深者。宜先放血行

導方。次用此飲見熾盛熱或消石接骨飲見丹毒清解飲見聖

輩。以渙釋稠粘。疏散鬱滯上

入服。峻藥若吐劑後。腹痛嘔血者。胃脉破綻。而使然也。宜

乳汁和水與之。令稠血易吐。污穢盡。腹痛止。則取白罌

粟舍利別。和水少許。頻々服之。慎勿早用。收瀉藥吳

玫瑰花消石湯 同 前症。胃腸築動。或大熱者。血鬱結也。此湯

主之。

玫瑰花 消石錠 白罌粟舍利別 各少許

右三味。先以大麥煎汁。浸玫瑰。候藥味出。瀝去滓。內餘

藥。和勻服之。此症放血亦應。

理血飲 伊 治嘔血。

桂皮丁 二錢 西電法護阿芙蓉液 一錢

龍腦薄荷舍利別錢六

篤雨面微刺煎膏

大麥煎汁四十錢

右五物攪勻。半時服一匙。蒲氏曰。吐血與阿芙蓉液。三滴。日二次。良驗。

嘔血。其血鬱於腸中。變成酷厲。以發腹痛者。宜下劑。蒲

霍亂。乾霍亂。叔格刺垂度

加密列湯輪。霍亂。腹中切痛。惡心嘔逆甚者。多服。此湯湧

之。

加密列花

右一味。水煎溫服。或溫湯和鹿角精數滴。用之亦佳。

獨聖散。泥治霍亂。胃中有穢積。吐甚者。兼能止瀉。經熱

每日或隔日服之。吐後必用。阿芙蓉劑少許。大良。

酸角大黃湯同。霍亂吐不甚者。此方下之。

酸角錢八。大黃錢一

右二味。以水三合。二勺。煮。應去滓。更和接骨木子醬少

許。半時服一茶鍾。

和腸飲。微治霍亂。吐瀉久不止。膽汁攻刺腸胃者。良驗。

大麥煎汁或區挑乳不拘多少。乳汁八分

右二味。調勻溫服。

炙蕪餅湯 同治前症

炙蕪餅 十麥製者九十六錢。蒲氏用燕麥製者或燕麥粉。

右一味以水三四升煎之二刻間服盡。

和中湯 西徵壽治前症

雞肉 或犢肉九十六錢。無則以炙蕪餅代之。

右一味以水三升許煮半時去滓溫服。或加葛苜舍利

別 若董萊舍利別八錢與之。壽氏曰用此物射入肚門亦良。

定吐止瀉飲 蒲治前症服炙蕪餅湯輩而吐瀉不止者。

酒石鹽 二錢 枸橀汁 二十錢 龍腦薄荷露

清水 各十錢 舍利別 八錢

右五味先合上二味至沸騰止乃調餘藥取二匙加阿

芙蓉液十滴每半時服之至吐止若虛憊甚脉弱者加

葡萄酒桂露等凡治霍亂吐下劑不中與之此方尤良

桂麥芙蓉飲 壽治霍亂用和中湯後半時或二時與此飲

又治吐瀉甚劇四肢拘攣者

桂露 八錢 大麥煎汁 四十錢 阿芙蓉 三錢

喇姑石 一錢五分 嬰粟舍利別 四錢

右五味攪勻半刻服一匙服之較得快者一時平用一

西醫方選 卷七
是至劑盡

六物薄荷飲 輪治霍亂。用加密列湯。腸胃已清滌者速作。此飲莫之。

野艾蒿鹽 銖一 宜母子汁 錢四 水煎薄荷露 錢十

酒蒸薄荷露 錢二 白罌粟舍利別 錢一

阿芙蓉丁 滴三十

右六味攪勻服。

芙蓉薄荷丸 同 主治同前

純粹阿芙蓉 泰一 薄荷油 滴一

右二味為丸服九服阿芙蓉劑即吐出者倍其量以溫湯一合許調勻射入穀道中經三四時復施之必驗。桂露芙蓉飲 西治霍亂吐瀉久不止虛脫甚而四肢厥冷者。

阿芙蓉液 二十 酒蒸桂露 錢八

右二味攪勻服。雜諸症退朝夕服少量至全愈。

四物薄荷飲 裴治霍亂。

龍腦薄荷露 若列應酒六十 爐甘石 一錢至

的里亞加 二錢 龍腦薄荷舍利別 八錢至

右四物攪勻。每服二匙。初每一刻。次二刻。終半時服之。良久而必效。

加密列加嬰果熨輪治霍亂吐瀉。腹堅滿緊痛者。

加密列花 嬰果殼

右二味。水煎。熨腹上。

清凉定吐飲泥治霍亂吐瀉。劇脈弱。虛憊甚者。

舍蜜捏德鹽製法見今日方

右一味。白湯消盡。和阿芙蓉液十滴服之。至吐止。

大麥清熱飲吳人當炎暑之候。血鬱敗于門脈。隨生敗膽

汁。而攪擾腸胃。得霍亂吐瀉。腹痛。煩悶。壯熱者。極危也。

宜作此飲。或蒸餅清熱飲三方見加止痛藥阿芙蓉液類與

芙蓉樟腦油輪治霍亂嘔吐不止者。良妙。

樟腦八錢 阿芙蓉丁四錢

右二味。別取阿利祿油十六錢。烱盡。樟腦乃和阿芙蓉

丁塗之腹上。

健胃散吳人飽喫膏粱。生冷瓜果。後上吐下瀉者。胃氣不

堪。欲擯之也。毒盡乃已。若吐瀉而乾嘔不止。頻欲下利。

者餘燼未收也。宜健胃劑。選此散。及健胃丸。健胃酒。方三

霍亂吐瀉。瘧後。欲防再發。須取阿芙蓉液十滴。至二十滴。

熨葡萄酒一盃。服時二次。極效。蒲

幾那酒。同。霍亂吐瀉已後。腸胃必虛。宜久服。以見神調之

橙皮酒。其人卒然腹裡絞痛。噁氣不絕。連轉矢氣者。名乾

霍亂。此方主之。

橙皮或拘

右一味。淹燒酒。候藥氣出。濾去滓。服。

拘櫟酒。同。乾霍亂。胃中有穢積者。此方主之。速效。

拘櫟汁。列應酒。

右二味調勻。服。

驅風飲。同。胃腸運動失常。以致乾霍亂者。宜此方。見黃或

旃罽治痢飲。見心

清涼宜腸飲。同。亞墨利加地方。有一種腐敗熱。初起腰痛。

心下苦悶。惡心嘔逆。皮膚乾燥。精力虛脫。脈數而弱。小

便短少。而赤。越一二日。病勢益進。氣息臭惡。口苦。而吐

敗綠。齒舌層着粘液。冷汗流瀉。手足厥冷。而顫掉。或咳

而咯異痰或吐黑物或下血眩暈昏冒謔妄搗搗者此
門脈之血腐敗而使然也是為難治若下惡物穢臭不
可當者名曰叔格利血度亦屬危篤並救之法唯急與
此方頻下之而後投大麥清熱飲或酸模清熱飲清解
其熱間收全効三方見熾盛熱

泄瀉

鎮痢止痛飲 養熱病其毒方解而下利者不必危也若下
利甚而久不止身體虛憊者宜選此方見聖或桃花飲
是吐作列布湯見麻與之至下利已減虛憊漸復乃停

後服但腐敗熱水腫勞瘵失苟兒陪苦瘡瘡等自下利
者為敗症決無生理不得已用此飲輩與其坐以待斃
不如安苦惱而過死期

加味桃花飲 同前症用鎮痢止痛飲輩不應者宜選用此

方及三物礬石飲 理血飲並見吐血

浮礬酒石散 同前症大便不順利腹肚脹急數飲上圍者

選此方及加味梅肉湯二物大黃散加味酸角湯四方見熾

盛洋葵甘草湯見瘡用之

加味墨栗薩飲 同治腐敗熱下利而衰憊甚者

的里亞加

幾那莫膏 各二錢

洛陽花舍利別 十二錢

墨果薩露 三十錢

右四味攪勻。一時服二匙。

薄荷飲 同人復夜取涼。或飲冷水。腸胃受冷者。腹中切痛。

而下利也。治法宜使其溫覆。而與此飲。或加密列飲。

盛氣敷薰布於腹上。汗出小便通。痛利乃解。

龍腦薄荷

右一味湯泡。頻々溫服。一盃。若不應者。當夕與的里亞

加。

二物大黃散 同前症初起。口糜心下苦悶。腹裏拘急者。胃

有穢積也。宜先用此方。見熾盛熱或施緩下導。而腸胃疎滌

則與的里亞加。

加味酒石散 微下利用。單將散。見痘輩而止。三四日復下利

者。稠粘毒未盡也。宜與此散。或加味酸消飲。二方水石

酸角飲。見腹痛蕩滌腸中。而後用單將散。二朝必驗。

石長湯 同治下利妙。

石長生

右一味。水煎溫服。與加密列湯亦效。

三僂散 藜 泄瀉飲 咳 堅硬難化物。或生冷果瓜。癥瘕銑。錫肉。敗卵。酒漿。冷水。等而發之。心下痞滿。惡心乾嘔。口苦。噯氣者。宜速用此方。或百葛霸王散吐下之。不兩間變。痢疾不可忽也。

乙百葛一銖 大黃一銖 霸王鹽半銖

右三物散末。一頓服。

芙蓉痢散 同 前症吐下之。當夜與此方。或的里亞加。終

夜睡安。次早諸症大減者。與加密列飲。見熾盛熱或薄荷飲

上見一盃數次。至夜復與此方。如此三日。仍不思食。口苦

而糜。心腹急滿者。且服二物大黃散。見熾盛熱暮的里亞加。大良。

柳葉菜散 伊藜 治前症與二物大黃散。輩不効者。宜此散。或

鎮痢止痛飲。見聖 桃花飲。見麻 又治天稟虛弱。泄瀉

赤痢不止者。伊藜

柳葉菜葉一錢

右一味。細末。服日二次。

止洩飲 藜 前症柳葉菜散。輩不應者。以飲甚良。

若格寶溫八錢 龍腦薄荷露六十錢

百藥煎丁

一錢五分

阿芙蓉液

十五滴

右四物攪勻。半時或一時服。二匙。加味桃花飲。見吐血亦

好。

湧泉飲。霍泄瀉。兼惡心嘔吐者。速用此散吐之。

大黃末

一銖

乙百葛末

半銖

健胃散

三黍。見嘈雜。

右三味。和水及砂糖飲服。

定痛酒 同治泄瀉

薄荷油

四滴。糖少許。

阿芙蓉液

八滴

甘消石精

二十滴

葡萄酒

一盃

右四味調勻服。

健胃將軍醬 同前症。定痛酒不應。腹中切痛。裏急後重者。

此方主之。

大黃

半銖

健胃散

二銖半

薄荷油

三滴

甘汞

一黍

右四物。舍利別調。每三時服之。

獨聖散 劫泄瀉。因停食者。莫効於吐藥。服此散五分。則應。

吐後宜與單將散 見五分下之。若毒仍不盡。澹泄者。更

二三下之。

西醫方選 卷七
下利五六日。惡心甚。舌胎口中不爽者。朝與獨聖散。夕用的里亞加微。

下利久不止。身體疲勞者。先與獨聖散。翌日四服。單將散見。且滋養之。若其候莫可吐者。朝用單將散。夕服的里亞加同。

壯元飲蒲。泄瀉發於悲憂驚恐等者。此方治之。取此飲見。或泡石薄荷湯。和阿芙蓉液十一二滴。每四五時與之亦佳。

加味大黃散毒。人暴怒悲哀驚駭後。下膽汁狀物者。反佳。

不甚則勿止之。此方下之氏。又治泄瀉。朝用此。夕定痛飲壽。又有春秋之候。一二月。心下鞭滿。不思飲食。腰腹

扯痛。脚膝倦怠。而頓掉。續自下利者。勿藥也。二三日自愈。但苦悶甚。而不快利者。下之。宜此方氏。

大黃五 訶子二分五厘。勃
氏用肉豆蔻

右二味。細末頓服。

芙蓉痢散同。前症。心下痞重緊滿。温々惡心者。當夕用

此散見。若下利久不止。肢體困倦者。桃花飲見。治之。

芙蓉油藥。一切下利。劇而久不止者。發腹中灼熱。裏急

後重也。須選用此方。及作列布湯。並見麻疹鎮痛止痛飲。見聖

健桃花飲。見吐血兼施緩和導。或的列並導。並見上痢疾

灸大黃散。伊治泄瀉痢疾纖維縱緩者。

好大黃 灸大黃各一錢五分 龍腦薄荷油三滴

右三味作散。冷水頓服。隨症加阿芙蓉少許。

大黃酒越治胃弱。飲食不化。下利腹痛等。

好大黃十六錢 龍膽四錢 食而便答利亞一錢

右三味淹燒酒二合四勺。去滓分服。

人嘗炎熱時。卒然下利者。宜先刺絡。與獨聖散吐之。而用

阿芙蓉。次投凝水石。清滌腸中。輪

滌腸甘露乳。同下利有熱者。宜用此。徐下之。而幾那湯加

阿芙蓉。與之。良效。

甘露蜜八錢 涌酒石二錢 嬰粟舍利別四錢

右三味。先用匾挑乳。烱消二味。乃和嬰粟舍利別。每半

時服。八錢至。腸中清滌。

幾那酒。吳治胃弱。食則便泄瀉者。宜此方。健胃。見神經熱飲赤

葡萄酒一盃。亦宜。

發散將同治久瀉。發於蒸氣壅遏。或病毒當表達。而不達。

者。解肌丹天見胃亦驗了

掃涎酒同乳糜利。其人粘液層着口內。腹實滿者。是粘液
滯着腸中。以俾乳糜脉細孔壅塞。而不能喻收乳糜。故
也。此患殊多。于小兒。當排逐粘液。開達乳糜脉。此方主
之。又治久瀉。宜選酸瑰清涼飲。見腐敗熱或選護回生丸。見
療兼服此中。

剝祿布利性室秘漿錢三 酒石鹽

沒藥末錢各一 白葡萄酒錢四十

右四味攪勻。每服一小匙。日數服。

健胃丸同 乳糜利。其人臍邊痞重鬱積。若覺冷者。是胃腸

虛弱。使乳糜不能納。諸乳糜脉而致下利也。宜選用此

方。及健胃散二方見 輦以健腸胃。又治久瀉。

散痲油同 治乳糜利。因腸間膜機里兩頑結。而壅塞乳糜

脉者。宜作此油見心 搽腹上。

龍牙導同 下利後。重墜努責不止者。腸涎耗損也。宜行以

龍牙草 洋葵根

右二味水煎。和蜂蜜少許。射諸肛中。

蠟挺子同前症行龍牙導而苛液已除則用此。

油蠟各適

右二物以的列並底那少許調和作挺子納之肛中下
蜜努責而迸出則更取一挺納之至全愈乃止。

痢疾

百葛霸王散蕪痢疾由穢毒畜於胃腸得之無熱而精力
未脫者朝與此散見熾盛熱或三儼散見泄夕服的里亞加
次日病勢依然精力尚不衰者再作此方與之又治口
苦嘔逆噯氣不止心下痞滿腹中脹痛大便臭惡者

獨聖散壽

痢疾初發當吐之宜取此散二銖徵氏用以葡萄

萄酒蒲氏以加密送下俟吐乃微温湯和蜜吞服隨

吐隨服當夜與一物阿芙蓉丸一黍次日復服此散若
仍不減者其翌亦用此。

獨聖飲徵主治同前

乙百葛錢二

右一味浸水八勺置暖處一宿濾去滓空心服之三日
而下利減者為善徵不減者凶候也隨症救之。

單將散徵治痢疾宜先以獨聖散吐之第二日與此第三

日與大麥酒石飲見腐敗熱第四日復服此散獨將飲泥治痢疾

大黃八錢

右一味以水三合二勺浸出藥氣瀝去滓每日或隔日午前半時服一二匙量下利消息之間服酸角湯殊佳腹痛甚者夕服阿芙蓉液十五滴至二十滴

獨聖加罌粟醬蒲痢疾吐下之後與此方

乙百葛末二匙

罌粟舍利別二匙

右二物調勻日服二三劑

四物石脂圓壽主治同前

赤石脂六錢

牙皂樹膠一錢

的里亞加十二錢

罌粟舍利別適宜

右四物調勻服一錢日三次

大麥酒石飲微痢疾夾嗽衝熱者必脈堅實頭腰疼痛腹

肚緊脹也宜先放血而步服見腐敗熱以葵花湯見聖射

入穀道日三四次

潤腸飲同前症嗽衝劇者宜用此飲見症踈滌腸中不至病

欲愈必勿與大黃劑

加味酸消飲 微 痢疾夾腐敗熱者 所謂宜先吐之而選用

此飲或酒石散 二方 酸角湯 見 水石酸角飲 見心 輩禁

用 大黃劑

加味水楊湯 普治疫痢

水楊皮 錢十六 洋葵舍利別 橙皮舍利別 各八錢

達刺侃篤膠 四錢

右四味以水先煮楊皮取三四合去滓下餘藥和勻半

時服半杯

瀉毒宣腸飲 吳 痢疾因疫熱發者多於夏尾秋頭其毒甚

與腐敗熱類宜與其治法處之且用此飲驅苛毒順腸機以防虛憊

龍腦薄荷露 六十錢 大黃 二錢 礬酒石 二錢

右先取三味上微火和阿芙蓉液十五滴服一晝夜三

四次盡劑

固腸導 同 前症已差熱未解者必復發宜施此導 見下防

之

土柱湯 治 痢疾腹痛甚膿血雜下者宜先用榮養乳雞

肉煎麥煎輩 共見 喉風射之穀道時與此湯

結麗土末二十錢 桂末二錢

右二味以水七合一勺煮半時。瀝去滓。溫服。病劇者。越二日後。止。與單將散再三。亦用以湯射入穀道。加甘汞。或阿芙蓉。則能解毒。固腸。

麥粉薄 痢疾吐下之而不差者。當收瀉之。宜此方。

麥粉

右一味。水煮作稀水糊。和阿芙蓉液二三十滴。射入魄門。日二次。與以雙膠煎。

雙膠煎同 治前症。

牙皂樹膠八錢 達刺侃四錢

右二味。以大麥煎汁三合二勺。文火煮之。每半時與一匙。

大黃肉豆散歌 痢疾毒畜于薄腸者。以此方下之。

大黃錢一 肉豆蔻半錢

右二味細末。麥酒或珍陀酒送下。

大黃茉莉散同 治痢疾。下膿血清涕者。

灸大黃二錢 紫茉莉 桂末各半錢

右三味細末。燒酒調。一頓服。

定痛止瀉膏 同治痢疾夕用之

的里亞加

蜷蛄石

血竭 各半錢

阿芙蓉 二

龍腦薄荷油 八滴

右五物調勻服

芙蓉礬石丸 同治痢疾腹痛甚者

阿芙蓉

明礬 各半錢

右合為六丸一二時服一丸

桃花飲 蘇前症用三仙散百葛霸王散吐之次日精力大

脫者即與此方 見吐血服之精力頗復而溫夕惡心頭疼

腹痛大便臭惡等症仍不退則復用三仙散輩當夕與的里亞加

鎮痛止痛飲 同痢疾用百葛霸王散輩吐之其勢漸衰而

腹中切痛毒未盡者選用此飲 見聖作列布湯見麻

葉菜散 見洩瀉以挫餘勇

加味大黃散 同痢疾用鎮痛止痛飲輩而噯氣惡心腹肚

滿痛仍不止者為毒未盡也宜每三日停本方朝服此

散 見泄瀉 夕與芙蓉蜷蛄散 見瘡良效

止洩飲 同痢疾腸胃穢毒已盡病勢未衰者以此飲 見泄瀉及

加味桃花飲見吐血並治之。又治下痢甚。躄大疲者服之。

諸症稍退者與作列布湯輩見麻疹至全愈。

洋葵甘草湯同痢疾初起身熱壯盛。脈堅實。或腸胃有焮

腫之候者。宜刺絡而多服。以湯見瘡或洋葵清燥湯見熾盛熱

輩見熾

加味梅肉湯同前症口苦。惡心。噯氣不止。心下痞重。腹中

脹痛。大便惡臭者。當緩下之。以除患原。宜此湯及加味

酸角湯。三物洋葵湯悉見熾盛熱輩。

發散將吳痢疾痛利並減而不煩悶者。宜此方。或解肌丹

見感冒發越之。

清熱抑膽湯同痢疾初起熱如燔。腹痛甚者是。因敗膽汁

致苛厲也。宜用此排斥之。

酸模根 精大麥 蒸餾再烘者

大酸角各八錢 礬酒石一錢

右五味。以水七合。二勺。煮。漉。去滓。微溫服之。

靜息飲同前症敗膽汁已除。痛利仍不止者。以方定腸之

餘擾。

龍腦薄荷露二十錢 拘椽汁四錢

白罌粟舍利別錢八 列應酒錢十六

右四味攪勻。頻々服。一匙。

緩和導。蕪痢疾初起。虛憊已甚。脉弱小。或遲而無倫者。危

候也。若精力猶能可吐可下者。百葛霸王散。見熾盛熱加味

大黃散。見瀉隨宜與之。較得効驗者。宜選用作列布湯。

是麻鎮癩止痛飲。見聖柳葉菜散。見泄兼服加密列飲。

見熾盛熱折熱膏子。見菩薩香草飲。見熾盛熱輩當夕必施此導。

阿利襪油錢四十 達刺侃薦膠水錢十六

右二物攪勻。向屁眼射之。

的列並導同主治同前

的列並底那同雞子黃研若格實溫研

亞麻油三十錢

右三物先取的列並與卵黃同研和內餘藥調勻射之

矢孔。

加味桃花飲同前症。行本件方法。而精力漸復。毒仍不盡

者。作清涼霸王飲。見卒中風與本方間服。至愈。若下利不止

者。用此飲及加味桃花飲。三物礬石飲。見吐血止洩飲。見世

瀉輩治之。又痢疾初起。衰憊殊甚。不可下者。亦宜此飲

輩。

加味芸香飲同痢疾初起。精力虛脫。脉沈者。其毒凶猛。正

氣不能克之也。速選用此方。及壯元飲。竜腦蝟蛄散。幾

那芸香飲。四方見大麥加醋湯。見乳清酒。見腐加味墨

栗薩飲。見泄。輩。并貼天灸膏於項膈。接之。

接骨洋葵飲同痢疾。小便臭濁。大便膿穢。而交敗血者。即

血液敗腐之候也。宜速選用此方。見水。及加味麗春飲。

見失苟。大麥礬精飲。見腐。若下利不止。腹劇痛而無間

斷。夜不得眠者。并服阿芙蓉液十滴。至二十滴。日二三

次。

痢後腹中灼熱。裏急後重。不止者。宜照泄瀉門治之。同

二物大黃散同痢疾。早用治劑。止之。則遺腹肚堅硬。温々

惡心。皮膚萎黃。或如土等患也。救之。宜每二三日。用此

方。見熾。下之。當夕與芙蓉蝟蛄散。見使痢無再發。

麥酸湯蒲治痢疾。代常飲。以乳清為最。遇關便作此飲。代

之。

大麥十六錢 酸角八錢

右二味。以水一升二合八勺。煮減半。飲服用。大麥酒石

飲亦佳。

一千七百七十五年即我安永四年八月温疫即惡性熱大行比其欲

愈發痢疾者甚多有請治于余者輒用白帛散見腐敗熱取

吐酸角湯下之大抵四五日而解如用大黃劑奏效

不過一二人矣同

桂露麥煎酒毒痢疾腹痛劇裏急後重脉弱无倫面色青

慘煩渴引飲食不進者惡候也宜速用此方

葡萄酒上好者四十八錢大麥煎汁百四十錢

桂露八錢洋糖六錢

右四味攪勻半時與二勺當夕與一物阿芙蓉丸一黍

服之諸症減精力加者只轉本方朝與以加味大黃散

瘥後與四物石脂圓見上五分四五日日三服

西瑪兒拔湯花伊治前症良效又治痢後腸內腐爛者

西瑪兒拔皮二錢

右一味以水四合八勺煮取一合六勺濾去滓時與一

茶鍾若服三鍾不知則至六鍾必驗

治痢膏更治痢疾

黃蠟若白蠟四錢匾桃油十二錢

右二味。上文火內玫瑰醬十六錢。調勻服。加阿芙蓉許則殊佳。

治痢圓壽治痢疾及下血

費魯扭護羅瑪泥五分。今日方。

大黃末十泰

右二味。合利別調頓服。

的列並導壽伊治痢毒苛厲。穀道赤爛。虛坐不通者。

的列並底那勿。茶。產。者。二。錢。卵黃一個。

大的里亞加四錢。甘乳汁四十錢。

右四物。先取的列並底那卵黃相和。下餘藥調勻。朝夕

向肛中射之。或曰。此導喜使直腸發痛。否則致痔疾。宜認得無後害。而後用之。

乳油導花伊治前症。此方不峻而効捷。大勝於的列並導。

亞麻油 甘乳汁

右二味攪勻。射入肛門。花伊用阿利襪油。或蔓菁油一味。

亦良。伊普

作列布導花伊主治同前

作列布根一銖。五泰

右一味。以水一合。煮去滓。更和甘乳汁六勺。射之。肛門

或飲服之。

皂膠飲 花治痢疾腹中絞痛者無作列布則用此

牙皂樹膠或用

右以乳水或泡如密列湯消盡多服之

定痛膏 痢久不愈腹痛難堪者內服此方外用列布

導見上

阿利襪油 牙皂樹膠水

白罌粟舍利別各十錢

西電法護阿芙蓉液十五滴

右四物搜勻一刻服一匙

痢久不已者宜取獨聖散二黍和砂糖少許且服之夕用

阿芙蓉劑神良伊

固腸定痛飲同治久痢應吐下者先與吐藥次用一物灸

大黃散二三次而久服此飲極效

桂露四十錢 蜀葵舍利別八錢 赤石脂三錢

幾腦膠二錢 勿弗滿止痛液二錢 阿芙蓉五厘

右六味攪勻一時服一匙

痢疾毒已盡腹仍劇痛者煮雞卵一個調牛酪食之日二

次妙壽

加密列飲蒲治痢疾健胃過腸中敗壞蒲治痢疾腹痛膠

固不已能寬擊急過敗腐復衰弱方見熾盛熱

痢疾腹痛久不止者貼天灸膏於痛上普花

石灰甘乳飲同治久痢腸虛者

石灰水 甘乳汁量半石 灰水

右二物調勻服

凡痢疾吐逆劇者甚危使人須臾虛憊若不急救之則死是矣因屬膽汁或油膩脂膏或飲食酒漿停滯敗腐於腸胃也精力未脫者或吐或下或與涼藥或施導方隨

因治之獲

鎮瘕三物飲同前症用對腔方法治之腸胃已疏吐利仍

不止精力漸脫者急作此方或止洩飲每二刻

與一匙若身體虛羸形色如死者宜每半刻與四物鎮

痢飲二匙誤投吐下藥即死

螭蛄珊瑚散歌 痢疾膿血漸盡切痛大減者當徐止下利

宜以散

螭蛄石 錄一 珊瑚修製者 収瀉鐵丹各半錄 見今日方

阿芙蓉 半一 黍 府利油四滴

右五味作散白湯送下。

五味乳香散 同 主治同前

乳香半 肉豆蔻一 柘榴皮半

阿芙蓉半 龍腦薄荷油五

右五味作散湯下。

定利酒 同 治痢疾。

阿利襪油 燒酒各十 肉豆蔻二

右三味和砂糖令湯服每一刻與二匙至全愈。

龍牙含護比東導吳 痢久不瘳則委使直腸腐爛病已瘳

而裏急過迫者宜行以。

龍牙草 含護比東根 各適

右二味水煎去滓別取的列並底那少許以雞卵一個

調勻而俱和之向肛門射入。

的列並挺子吳前症行前方而至腸中淨滌用此。

的列並底那

右一味煎熬下含護比東末少許調勻作挺子每大便

通先以前方灌腸中而內之。

大便秘閉 便秘者多兼發於諸病而特立者鮮矣兼發者治法各見本篇今此拾其較著

者一
二耳。

順利丸 吳人。大便久不通。燥屎實。縮腸則腸為是。麥開遂。縱弛失職。常與瀉藥。則大便通利。暫廢藥。則結滯也。治之。宜以方通大便。日一度。長將至全復故。

瓦爾拔奴護錢

沒藥

質汗沒扭謨

酒石鹽 各一

右四味細末。每一錢作二十九。橙皮末為衣。日服八九丸。若不應。更增三四丸。必有著驗。

健胃散 同 大便秘結。其人臍寒。會大便則不化。腹中覺重。

者。腸機衰弱。之所致也。宜用此散。健胃丸。健胃酒。共見。輒以登廁。日一度。

清涼導 同 大便秘閉。由熾盛熱。及身體燥熱。津液匱耗。而致之者。宜作此導。射注穀道。服清涼宜腸飲。見熾盛熱。至熱解乃止。

涼解乳清飲 同 大便秘閉。因津液涸竭。致之者。以飲見失。苦治之。

宣轉膏子 薑 閑 蜜 清 熱 通 大 便 宜 于 弱 人。

奧花果 九 十 六 錢

酸角

阿勃勒

大便秘閉

大便秘閉

六

梅肉

各四十八錢。伊氏曰。去酸。角阿勃勒。止。用。毒肉。亦好。

旃那

末六十。四錢。胡荽子。末三十。二錢。

甘草 二十。四錢。

洋糖 二百。四十錢。

右八味。先水煮。無花菓酸角阿勃勒甘草。至稀稠如粥。乃調餘藥。每服肉豆蔻大。服度隨宜。

大黃石鹼丸 伊治大便秘結。

大黃

石鹼

勿搗茶。各一錢半。

查波牙刺葉 奴私半錢。

右三味細末。每一錢。二十九。銀箔為衣服。三丸。日三。

无憂潤腸油

伊治大便閉。九。腸拘攣。而劇痛者。用他藥下。

之。則嘔吐悶亂。故如翻腸。吐屎。腎痛。膽中結石。鉛毒腹痛。則宜此方。徐取。下。切緩。而神良。

蓖麻子油

四錢。至八錢。小兒。一二錢。

右一味。調雞卵或牙皂樹膠水。服。至便通。

西醫方選卷七終

西醫方選

卷七 大便秘閉

六二

諸虫症

殺虫綠礬飲八

殺虫礬盧飲九

殺虫雙根散全

殺虫旃那飲全

四物殺虫醬全

二物茉莉散全

茉莉甘汞圓十

錫粉散全

五物殲虫餅十

殺虫圓十一

阿魏丸十一

殿軍散全

黑汞散全

甘汞大黃散十二

殺虫甘汞餅全

刺虫膏子全

殺虫補益飲全

大蒜煎十三

石鹼散全

錫粉黑汞散全

汞茱大黃膏子全

胡荽煎膏全

牛膽丸全

加味牛膽丸十四

殺虫膏全

盧會加石腦膏全

三物盧會散十五

殺虫餅子全

沒藥石鹼丸全

食鹽萵苣油十六

驅虫膏子全

驅虫丸全

羊齒散全

生兵膏子十七

猛將丹全

阿魏石腦飲全

阿魏石腦丸全

錫粉散全

加蠟油梃子十八

哥西亞丸全

入屋孚露牙酒全

三物阿魏丸十九

殲虫丸全

腹水并鼓脹

丁石藤黃丸十九

加丁石藤黃丸全

導水導二十

西醫方選

卷八目次

一

地惹太利斯散 全

石英散 全

加羅茂兒大黃圓 全

消石茉莉散 全

藤黃 酒石圓 全

西施丸 全

幾鏡橙皮圓 全

杜葱益智酒 全

利尿驅水酒 全

味托歇雨私散 全

塩芒散 全

乃私萬刺多 鼠酒 全

黑金沒藥酒 全

止渴丹 全

消硝芹露 全

旃那瀉利飲 全

琥珀利尿散 全

的里亞加發汗糕 全

阿魏哥西亞丸 全

驅風散 全

拔作兒地孔油 全

肝脾焮腫

酸角瀉肝飲 全

石鹼開壅丸 全

腎膀胱輸尿管諸病及腰痛

烏白烏而識散 全

加味烏白烏而識散 全

甘和石灰水 全

和水湯 全

秘加而而那薩水 全

蕁麻酒 全

阿利襪酒 全

膠菜蕁麻散 全

苧蒿飲 全

苧蒿導 全

歸正散 全

歸正飲 全

的列並大黃糖 全

膠脂琥珀丸 全

甘葵接蜜湯 全

滑利膏子 全

定痛膏 全

水羅油 全

利幾利極蘇 全

哥攝尼爾酒 全

枸櫞止痛飲 全

石鹼沒藥丸 全

葵麥嬰甘湯 全

蠟灰水 全

烏白烏而識湯全 舍乃我魯藥飲共 加味亞麻仁飲全

苗香國老飲全 杜松導水飲共 洋葵大麥甘草湯全

物拔爾撒摩丸共 幾巽麗春飲共 琥珀甘和飲全

溺血

瑰龍比舍讚筒 膠石甘葵湯全 物舍謨比東湯全

堅腎枕子全 加味石灰水早

淋瀝

蘇合乳香丸早 加味匾挑乳早 結麗土飲全

小便閉

溫暖驅尿酒四十 驅寒利尿慰四十 酸麥酒石湯全

五物水石散全 二物酒石散全 清熱慰早

洋葵大麥湯全 水蔓導全 匾挑加巽粟乳四十

旃甘飲全 洋葵煎全 寒太利酒早

神驗寶同 神驗散全 神驗乳全

角灰樹膠湯全 灰膠水早 乳煎礬石飲全

血竭礬石散全 玫瑰飲早 大黃縮砂酒全

神驗漿早

膜之動脈向腸隙滲出其所瀉恰如羹肉滑是乃漏洩
乙亥於血故也治法先與此方且間服趨護回生丸若
有熱者宜排膿祛壞湯二方見
勞瘵

大黃末

玫瑰醬

右二味調服。

清涼宜腸飲同肝崩其所下濃厚黯赭如於叔格刺亞度

見霍者。是血鬱敗於門脈而漏出腸中也宜數與此飲

疏滌之而與大麥清熱飲。薤白清熱飲。酸模清熱飲。方四

見熾
盛熱輩。

肝崩者發於脾動脈之破綻也治法同痢疾。較勃氏曰肝
崩痢疾治法

同相

肝崩者大便下稀血水腹中鈍痛而無蝕爛之候眼胞足

跗共浮腫睡眠不得是因洩乙過多及脈管縱緩也治

法先作發汗利尿之劑加叔瀋健補之藥服之慎斷過

飲次取麻藥阿美
蓉輩亦和叔瀋健補之藥與之。

搨棹湯同治肝崩効

搨棹

右一味水煎溫服。

單將散敷肝崩痢疾應下者宜此方見瘡

大黃芙蓉丸同治前症

大黃煎膏十六黍

阿芙蓉純粹者一黍

龍腦薄荷油滴一

右三味為四丸金箔為衣

加味三檀餅翟治肝崩

黃檀

白檀

赤檀各一

珊瑚修製者

車前子各一

大黃二錢

玫瑰糖三十錢

右七味調桂露茶苾露為十六餅

諸痔并下血

加味梅肉湯獲血痔者下血多有定期若觸事故過止則

發眩暈或發頭痛而連延不愈或致煩悶嘔血失明癰

症卒中風等患其脉強實者並放血而用此湯或加味

酸角湯三物洋葵湯下之而血再下或痔脉腫脹者應

也若不雨者以溫湯熏肛門令血溲之痔脉乃腫起而

血尚不下者放之水蛭吮血選洋葵清燥湯已上四方

洋葵甘草湯瘡輩多服之兼用下瘀血散見經日三次

且朝夕行湯脚法

盧會蜜煎挺子同血痔。血應下而不下者。法當放血。然不
發身熱及往來寒熱。其質不血實者。其血不可放也。宜
以溫湯熏肛門。更搯入以挺子與通經散見經。日二三
次。

盧會四錢 蜂蜜二十錢

右二味上文火煎熬。捻作挺子。

洋萎甘草飲同血痔。其血從前所下。畧有定量。一時不及
發。腹中掣痛。煩燥。苦悶。頭暈。目眩者。行緩和導。多服。以
飲兼。兼朝夕與通經散。下瘀血散。三物礪砂飲共見。輦閉。

血實者。可放血。

桃花飲同血痔。血出過多者。當止之。其人血實者。更刺尺

澤。施緩和導。而用此飲見吐。或加味麗春飲見失。芍若。

不効。虛脫甚者。宜加味桃花飲。或三物礪石飲見吐。見血。

理血飲同血痔。下血劇。經久不止者。與此飲見吐。或止洩

飲見泄。

四物關塞飲同黑液病。卷六其人黑血自下者。大佳也。宜

朝用。以飲數旬。且令其身體運動。太効。

血痔。下血甚者。取陳玫瑰膏八錢。調乳汁服之。日二三次。

服後半時與玫瑰丁一茶鐘殊驗蕭

螻蛄消石散癩盲痔者肛腸血脉腫脹作乳頭狀其色黯

赤或黑青是也其患在肛內者名曰內痔在肛外者名

曰外痔若嫩赤腫痛共劇而發熱者宜敷之毳布刺絡

去服此散或消石粟接飲加味大麥湯洋葵清燥湯接

骨清涼飲五方見輦熾盛熱

奴萬利通加樟腦膏前症嫩赤腫痛減者代緩和藥敷

以分利藥或貼此膏至腫痛全退

奴萬利通膏八錢〇見

樟腦五分

右二物先取樟腦以非阿斯舍亞謨油研勻與奴萬利

通膏煉和供用又治盲痔初發者貼此膏服加味梅肉

湯輦

加味奴萬利通膏同主治同前

百藥煎末錢

赤石脂三錢

奴萬利通膏四錢

非阿斯舍亞謨油宜適

右作軟膏

定痛膏同前症急痛或努責者宜貼此

阿芙蓉五錢

奴萬利通膏

剝彪列乙膏各四錢

右三物煉和為膏。

防腐幾那飲 同 盲痔欲壞敗者宜以飲或三物幾那飲 方二

見腐敗熱 幾那散 見神經熱 輩。

大蓼飲 同 痔瘻初發者宜服以飲 見聖京健 射入鉤吻接骨漿

於瘻孔灸效。

匾桃醬 同 痔瘻夾拘攣搗掣或裏急後重者服以方 見熾盛熱

鎮痲壯神飲 見聖京健 加味麗春飲 見失苟鬼陪苦 輩貼 奴萬利通

加樟腦膏 見上

內痔腫脹而腹痛脉堅實者治法與腸焮腫同 同

洋葵清燥湯 同 人有內痔腫痛而小便不利速溺血反得

快者若溺血因內痔者宜速與此湯 見熾盛熱 或洋葵甘州

湯 見瘻之

雙和膏 同 治肛內皸裂糞前糞後共熱痛者。

奴萬利通膏

剝彪列乙膏 各四錢

右二膏相和插入肛中 日二三次 國老膏 見今方亦妙

消石栗接飲 同 內痔結核長大上圍翻出而急痛者宜服

此飲或加味大麥湯洋葵清燥湯接骨清涼飲 四方見熾盛熱

輩行緩和導法。

加^カ密^ミ列^リ飲^シ 同 痔疾無腫脹之可候。劇痛如刺。痛牽引項背。

或頭暈目眩。或頭背顛掉。或氣逆耳熱。肢體怠倦。如被

鞭笞。神思虛衰。或沈重不聊。脉无倫而帶熱狀者。先服

消石栗接飲。或痢^ハ姑^コ消石散。隨用^テ此^ヲ飲^ス。三方見或洋葵

甘草飲。見一盃。日二三次。若睡寐不寧者。夕與^テ匾^ヒ桃^ト醬^シ。

見熾盛熱

雙白散 同 肛門赤爛。而焮痒難忍。稀水流出。四邊發細瘡。

而痒甚者。當先用^テ此^ヲ散^シ。見心緩下之。隨^テ多^ク服^ス。大力甘草

飲。見用密陀水。見丹毒洗患處。或傳^テ雙^シ和^シ膏^シ。見並^ニ良^シ。

龍腦痢^ハ姑^コ散 同 婦人先經行四五日。發痔刺痛。而牽引陰

門。若腹肚。若季肋。或連八膠。小便不利。努力如於淋疾。

大便秘閉者。先行緩導法。朝夕與^テ此^ヲ散^シ。見熾盛熱兼服洋

葵甘草湯。見一^ニ盃^ニ日^ニ數^ク次^ニ。

瓦刺蘘酸模湯 同 前症。其人血實者。用^テ此^ヲ預^メ防^ス。其發時時

放^テ血^ス。與^テ此^ヲ湯^シ。或洋葵甘草湯。二方洋葵清燥湯。見熾盛熱其

不^レ血^ハ實^ク者。隔^リ日^ニ朝^ニ夕^ニ服^ス。洋葵甘草飲。見可^ク一^カ月^ニ乃^チ効^ク。

硫萃酒石散 蒲丸治首痔。刺絡放^テ血^ス。飲膳撰。性清涼。物而

順^ニ利^シ。大^ニ便^ス。為^シ要^キ。以^テ方^ヲ主^ス之^ヲ。

硫黃萃 浮酒石分

右二味細末服一茶匙日三四次。

萃石醬伊治盲痔

硫黃萃錢八 消石淨製者四錢 伊氏用二錢

右二味細末調石長生舍利別伊氏或宜轉醬子三四兩

服一茶匙日三四

硫黃圓花 主治同前

硫黃萃錢八

右一味舍利別調每且空心服一匙一大盃水送下。

盲痔腫痛甚者以温湯薰之或温燒酒蘸綿布敷之或傳

乳銚泥和作泥者 慰之並效。

臭鬚石亭湯外治盲痔

朴窟福烏萬 粘魚鬚錢十六 硫黃錢十二

右三味以水八合煮去滓更和硃砂精一錢分服痛甚

者取無花果燒存性調燒酒敷之。

四物玫瑰導吳下血者血下而腹不痛是也。是因大小腸

之血脉壅閉也。治法同嘔血此方最驗。

玫瑰花握一 舍謨比東根 酸模根各八錢

白罌粟殼二顆

右四味向肚中射入日二三

諸蟲症即蛇虫寸白虫蛇虫

殺蟲綠礬飲蘇蛇虫之為病腹堅滿切痛其痛空心則殊

甚食則隨止面色脫青白睛帶青瞳子散大鼻中酸痒

口內惡臭或乾咳呃逆或食不知飽過食而瘦或惡心

眩暈或拘急搐搦小水淡白大便或秘或瀉脉無倫而

結也此方主之

綠礬錢一

荅那食通露

五十六錢

紫堇舍利別錢一

右三味取荅那食通露化綠礬更和紫堇舍利別每一時半服二匙

殺蟲礬盧飲同主治同前

綠礬錢一

盧會丁錢一

荅那食通露

十六錢

右三物攪勻照前服

殺蟲雙根散同主治同前

加乃可草根錢二

紫茉莉根錢一

右二味細末分為八貼每且空心服一貼

殺蟲梅那飲同主治同前

瓦刺微阿刺草

旃那葉

甘草各八錢

右三味細剉湯泡每朝空心服二盃

四物殺蟲膏同主治同前

白蘚根

紫茉莉各末二錢

野艾蒿膏十六錢

紫堇舍利別宜適

右四物調勻服一小匙日三殺蟲健胃丸見亦良

二物紫茉莉散壽主治同前奇驗

點雨百萬密涅刺兒五

紫茉莉二

右二物細末和沙糖一銖一頓服

茉莉甘永圓蕭人有發面色蒼白或艷紅鼻中酸痒夢裡

驚起聞牙咬齒上唇充脹或大貪喫或不進食或常

飲食食則苦慙燥渴下利惡心嘔吐氣息酸臭腹中切

痛或滿脹小便泡起或帶白色口流涎沫睡中最多心

悸服痛乾咳嗜眠聲音嘶啞頭目昏眩脉狀無倫冷汗

自漏神識昏冒瘰癧抽掣其他鬼憑邪崇種種異態者

乃蛇蟲之候也此方下之

紫茉莉二三甘永六七

右二味為末調舍利別少許服一週不知至二三週間

服錫粉散

錫粉散 同主治同前

錫粉 錢一

右一味。和蜜或舍利別。或的里亞加服。

五物熾。與飢。裴。蛇蟲之為候。面色蒼白。或黎青。青色環眼。狀如輪郭。鼻中酸痒。噫氣酸臭。心悸目眩。煩渴食食。思心嘔吐。腹滿而熱。或其痛如刺。又如嚙之。呼吸迫促。乾咳不寐。拘急搐搦也。此方主之。

攝絲施那

荖那食通子

野艾蒿油 各一錢

達刺侃萬膠 分五

沙糖 錢四

右五味調勻。作八餅子。服一枚。至四枚。

殺蟲圓 公治蛇蟲發熱者。

加乃可草根末

攝絲施那末 各二錢

紫茉莉根末 分五

右三味。海葱蜜調。每服一茶匙。

阿魏丸 壽人有頭運惡心。腹俄滿脹。或心腹時痛。鼻中酸痒。面色青悴。或大飢。或不思食者。是為有蛇蟲也。其蟄據於腸者。宜此丸。

阿魏五

右為丸每一時半服之二日而後平旦空心用殿軍散

下之

殿軍散同治前症

紫茉莉根二

黥爾百薦蜜涅刺兒五黍〇見今日方

沙糖錄

右三味細末。

異汞散伊治蛇蟲

黑汞三

右一味作末服四黍至八黍日二次或加荅那食通及

砂糖兼用劑亦良。

甘汞大黃散泥敷治蛇蟲神驗

大黃

質汗沒扭謨

甘汞各等

右三物和三倍稱之洋糖作末每服一錢小兒則半銖至一銖服之七日日二次。

殺蟲甘汞餅伊主治同前

質汗沒扭謨修製

甘汞各二十錢

砂糖三十錢

右三味調達刺侃薦膠水為餅子每服五分至一錢。

刺蟲膏子同主治同前神效。

黃豆莢毛

右一物。舍利別調服。時八錢。間服下劑。殊妙。弱人小兒

則減服量。

殺虫補益飲吳治蛇蟲強腸胃。令蟲不復生。

蘆會

沒藥

野艾蒿

各一錢

搗細施那錢

龍腦薄荷油四滴

右五味作散。五歲兒與一兌貨日四次。少長準之。令

上圍日二度為妙。

大蒜煎伊治小兒蛇蟲。

大蒜三辨

右一味水煎。和乳汁。每且服二茶鍾。

石鹼散蕭治小兒因蛇蟲腹滿甚者。

白石鹼

右一味作末。和飲食與之。

錫粉黑汞散蕭治蟲疰。小兒四五歲者。宜此方。

錫粉一銖 黑汞半銖

右二味調的里亞加一匙。服日二次。至一週或三四週。

每週停以服汞葉大黃膏子慎勿犯風寒
汞葉大黃膏子泥宜與前方相間服

大黃十 紫茉莉五 甘汞二

右三味舍利別或蜂蜜調每服一匙。

胡桃煎膏伊殺蛇蟲下大便尤效。

胡桃子未熟者

右一味入臼內灌湯搗爛取汁內罐煎焚作膏小兒服
之日二三匙大人三四匙。

牛膽丸同殺蛇蟲俾效。

牛膽煎熟者 紫茉莉根未各一錢

右二味每一錢百丸以肉桂末或銀箔為衣服四丸至
八丸大人則取牛膽二錢紫茉莉一錢每一錢二十九
服七九日三次或朝夕服十九丸。

加味牛膽丸同主治同前

龍膽 寡西亞煎膏 綠礬煨白者

紫茉莉各一錢 牛膽煎熟者一錢五分 薄荷油八滴

右六味調勻每一錢二十九丸剉石末滾服四五丸日
四次。

殺蟲膏 伊殺蟲通大便

苦瓠瓢末 盧會末各十 牛膽煎煮者

家猪脂六錢 野艾蒿油錢二

右五味調勻塗腹上。

殺蟲膏泥 治小兒蛇蟲腹滿便秘不肯飲藥者用此則蟲

從大便下腹滿立消。

牛膽各等 鯨油分 煙草少許

右三味煮調羅過更上火至稀稠如舍利別塗臍四邊

盧會加石腦膏伊治小兒蛇蟲神經易觸覺者宜貼此

盧會末十 牛膽煎煮者 石腦油各二十

家猪脂百九十

右四味先煇化猪脂下盧會調勻下火候稍冷和餘藥作膏塗之腹上。

幾那散家 治蟲下後隨生者胃虛也宜以赤葡萄酒送下以散五分日三四次或與石灰水或服剛鏡酒一匙日二三次並佳。

三物盧會散泥 殺蟲且下之。

盧會三 紫茉莉根末一 綠礬二

右三味作末。小兒每二三月。平且空心與之。大人增服量。

殺蟲餅子。盡殺蟲。又治小兒脾閉塞。

生鹿角 象牙末 石花菜八錢 同鶴鳩菜

砂糖六錢 四錢

右四味。達刺佩蕉膠水調作餅子服。

沒藥石鹼丸。花蛇蟲隨下。隨生者。胃腸虛弱之所致也。宜以此丸。

沒藥三錢 白石鹼一錢 拔雨撒摩字露 二十滴

右三味作六十九丸。且夕空心服三丸至五丸。或的里亞

加艾蒿醬見飛加鐵粉八錢服之亦佳。

食鹽高苴油蒲下蟲速効。

高苴油 食鹽各半 起

右二味。以赤葡萄酒一盃服。日三四次。

驅蟲膏子。但下蛇蟲寸白蟲。又治癩瘰發於蟲者。

攝餘施那錢末一 紫茉莉根末一 錢 白蜜十二錢

右三味調勻。小兒每三時服一茶匙。大人增之。小兒加綠礬二錢。大人加涌酒石三黍。功益速。

驅蟲丸 同主治同前。又治蟯蟲殊効。

撮絲施那 二錢 盧會 四錢 綠礬 煨化白者 六分

右三味細末。分作十二貼。每服一貼。日二三服。

羊齒散 伊治寸白虫神驗。

羊齒根

右一味細末。平且空心。以芳藥露 桂露薄 荷露類 少許調三錢。

服之 兒弱人小 服畢惡心者。嚼枸櫞皮。或以桂露少許潤。

咽。若嘔逆不入。更取三錢調藥。薑乾煖之。先經一時用。

後方下之。

生兵膏子 同治前症。

加羅茂兒 白 質汗沒扭護 各二 藤黃 五

右三味細末。接骨木子。薑調強。人一頓服。弱人減量。間。

喫二盃茶。服後二時而不應者。與凝水石四錢。至八錢。

虫仍不下者。三日後遍行諸方。然而無響响者。每一週。

行之必至。虫下。

猛將丹 同治寸白虫用。前方不効者。宜此方。

羊齒根 末十 六錢

右一味。洋葵舍利。別調一時服。一卵匙。連進數日。每一

週與生兵膏子上見此法屢試屢驗

阿魏石腦飲同治寸白虫尤効

石腦油錢半 阿魏丁錢六

右二味攪勻。一時半服一卵匙

阿魏石腦龍膽丸同主治同前比前方則易服而妙

阿魏錢三 石腦油錢二 龍膽宜適

右三味。每一錢為二十丸。每二時服三丸。

錫粉散伊治寸白虫

錫粉

右一味。小兒日與半銖至二銖。大人初日與八錢。二日

三日與四錢。四日更取瓦刺蘘根。梅那。甘露蜜。作湯與

之。

加味蠟油挺子吳治因燒虫重墜努責者法先用下藥或

行導法下虫而後摺入之肛門

蠟油的列並底那大各 野艾蒿末少

右四味。煉和作挺子。或取的列並底那。蜂蜜。加野艾蒿

末少許。煎熬作挺子用之亦可

哥西亞丸伊治蛇虫蛻虫奇驗

盧會

質汗沒扭謨各十錢

霸王鹽二錢

壺盧瓢八錢

右四味細末和丁子油二錢牙皂樹膠水適宜作丸與

一二黍至一銖四黍

入屋拂路牙酒同治前症妙

入屋孚路牙皮十六錢或代以苦棟皮

右一味以燒酒八勺水六合三勺徐煮減半初日二日

每半時服四勺三度至第三日每半時服一茶鍾至劑

盡必吐下粘液及蟲第四日與承萊散見下餘毒

三物阿魏丸伊治諸蟲症

阿魏三錢

入屋孚路牙皮十二錢

藤黃二銖

右三物細末每一錢為二十九丸甘草末滾服三丸日三

殲蟲丸同主治同前

入屋孚露牙皮

加乃可草根各末二錢

綠礬煨白者一錢半

龍膽煎膏二銖

右四味每一錢作二十九丸甘草末為衣一時半服四五

丸

腹水并鼓脹

丁石藤黃丸。病入其腹脹滿。按之不成窩。面色蒼白。四體羸瘦。呼吸促迫。大渴引飲。陰囊脚足連腫。小便或赤或清。或濁。側卧則覺腹中如水。就卑者是為腹水。漢稱者是也。治法雜出。水腫胸水。其與此也。治法當塞源疏瀹。其可下者。宜以方。

藤黃分二 丁子油滴一 礬酒石錢一

右三味為散分服。

加味丁石藤黃丸。同。主治同前。

盧會錢一 藤黃錢二 安汶尼亞加膠一 膠半一 錢

礬酒石錢二 丁子油滴六

右五味為丸。服一銖至二錢。

導水導氣。病人虛脫不可投下藥者。當行導法。宜以方。

人尿錢八 消石錢一 的列並底那勿搗茶產

卵黃宜適

右四物調勻。向臍中射之。

地惹太利斯散。伊利小水。治腹水胸水良驗。

地惹太利斯乾者一銖 沙糖四錢

右二味細末。今作二十貼。朝夕服一貼。病人減半服之。

吐瀉者加阿芙蓉少許。

石英散伊治腹水及一切水腫。

酒石英

右一味細末。服四錢。欠々收效。

加羅蔑兒大黃圓珊治腹水。

加羅蔑兒分一大黃分五

右二味。舍利別調。頓服。

消石茉莉散同主治同前。

紫茉莉末一銖消石半銖

右二味細末。

藤黃酒石乾姜圓同主治同前。

藤黃分二浮酒石分八乾姜分四

右三物。舍利別調。服用壺盧丸亦佳。

西施丸勃主治同前。

水銀

右一物。以猛水溶化。紙過之。上支火。稍散蒸氣。放冷。令結芒。以蒸餅心為小丸子。量強弱。與一丸至三丸。

幾欽橙皮圓孟治腹水。宜稍々與下藥間服之。此方強纖。

西醫方選 卷八
維利小便

幾那末十錢 橙皮末八錢 缺粉四錢

右三味。橙皮舍利別調。每服肉豆蔻大。

杜葱益智酒底治腹水胸水及一切水腫小便不利

海葱錢一 杜松實錢八 益智錢八

右三味細剉。內玻璃瓶置煖處三日。濾去滓。服一匙。日

三次。

一婦人患腹水。予取芫菁丁二十滴。點列應酒服之。漸增

至四十滴。小水潰決而愈。雜

利尿驅水酒孟治腹水及一切水腫其人虛弱或兼下利

者。或如宮癆家者皆不可下也。當利小便宜此方。

杜松實 消石

右二味以水葡萄酒各半。先浸杜松實候藥味出。濾去

滓。內消石和勻。服一盃。日三次。時加海葱末五六黍。與

之。

加味托歇雨私散珊治諸般水腫當發汗者宜此方

托歇雨私散二錢○見伊個篤 硝砂五黍

右調勻分服。

加味洋葵膏蕪治腹水用此水腫搽腹上一二刻。

鹽芒散勃治腹水及鼓脹煩渴引飲者。

海鹽芒製法取海鹽百九十二錢入列葛兒女內接漏斗管上火候其熔化津冷水少許放冷令

結芒供用。

右一味為末服。

乃私葛刺子鼠婦酒同鼓脹又名乾水腫者腹滿脹而堅。

以指彈之其聲如鼓是也當利小水此方良效。

鼠婦二十錢肉豆蔻三錢連錢草乾者

右三味淹杜松實精百四十四錢候藥味出每服八錢

異金沒藥酒裴鼓脹者只腹緊脹也此方治之。

鏡粉三十錢沒藥八錢

右二味淹列應酒出藥味濾去滓朝夕服一盃。

止渴丹勃治鼓脹大渴者。

宜母子舍利別四十錢消石錠一錢酸角三錢

右三物搜和分服鹽芒散見腹亦妙。

消硝芥露同療鼓脹。

硝砂八錢消石十六錢消石精百四十錢洋芹露四十錢

右四味調勻蘸之綿布慰腹上。

鎮痙除壞丸 吳 鼓脹之病。腹虛膨急脹。喟然似以氣充皮

囊。是乃氣鬱積腹隙之所。致其氣由痰癥抽掣生之者。

宜以丸及鎮痙丸。癩。見旃罽治疝飲。見心輩。若諸液停蓄

腹隙而成敗壞。以致此者。選排膿祛壞湯。豁痰利尿散。

見肺 疝 護回生丸。見勞 治之。

旃那瀉利飲 同 前症因大便不利。腹中積穢。致敗液而發者。此方主之。

旃那 錢二 酸角 錢八 凝水石 小茴香 各一

右四味。以水一合二勺。浸之。出藥味。去滓頓服。

琥珀利尿散 同 治前症因小便不利。致敗液而發者。

琥珀 錢一 鹿角燒灰 錢二 杜松實油 滴十

右三味作散。十分分之服。其一。日三。

的里亞加發汗糕 同 治前症蒸氣壅遏。致敗液而發者。

的里亞加 錢一 撒法郎 汗銻石 各末

右三物。白罌粟舍利別。調朝夕服。一劑。

阿魏哥西亞丸 伊 治鼓脹初發。發於膠粘液者。殊好。

阿魏 錢三 哥西亞丸 一錢半。

右二味。每一錢二十九。以銀箔或甘草末為衣。每服三

丸日三服

鼓脹治之日與阿魏至二錢間服大黃丸偉效伊

驅風散壽治鼓脹

小茴香油滴四 沙糖二 大黃一分五厘

右三味調勻每夕服之數日無塗按作兒地孔油於腹

上

按作兒地孔油同療鼓脹

樟腦錢一 匾桃油錢八

右二物內乳鉢研勻先用綿布摩腹片時乃塗之日二

次

止加亞歇兒曰一婦人患鼓脹予莫入烟草於肛門日數

次不日而愈花

天灸膏同治鼓脹宜貼腹上

肝脾炊腫

如味梅肉湯獲肝炊腫之為病心下苦悶右肋下沈重脹

痛而牽引頸大息則痛益劇脉堅實口渴引飲大便灰

白小便赭黃惡心嘔逆全腹緊脹是也宜當其初起施

緩和導與此湯若加味酸角湯二方見熾盛熱氣塗洋葵加樟

腦膏見黃於患上以緩和藥傳之其焮腫劇膽汁汎溢

血中而發黃者亦用此湯

酸角湯蒲肝焮腫治之宜先放血而此湯加蜂蜜少許與

之取微利且以溫湯熨患處若痛劇而不止者貼天灸

膏

幾那芸香飲蕪肝焮腫其人體中有瘀液或精力暴脫或

血液敗腐者並宜此飲及防腐幾那飲二味幾那散幾

那石鹽湯四方見熾盛熱輩

加味大力湯同肝焮腫間有臭汗大漏或遍身發細瘡而

諸症悉退者若細瘡久不愈則選此湯及分消飲二方

乳清飲見聖清熱瀉心丹見眼三味質汗散見丹輩或

清血或下之

三物關壅飲同肝焮腫瘥後頑結堅硬者內服此飲及分

消飲破結石齮丸三方外塗洋葵加樟腦膏見黃於患

上

酸角瀉肝飲寡治肝焮腫

瓦刺蕪根

酸模根

酸角各十

凝水石錢

已上三味以水四合八勺煮一刻濾去滓下凝水石煇

盡溫服。

石鹼開壅丸 同治前症差後發黃綿延不愈者。

石鹼 錢四 安沒尼亞加膠 錢二 大黃煎膏

霸王鹽 錢各一

右四味。每一錢作二十九丸。

肝炊腫之為病。隨其所發而頗異其症。發於上際者。痛劇如刺。從隔膜之鼓動而益甚。易呼難吸。或右肋下微隆起。脈堅而實。或軟而无倫也。其發於下際者。痛不劇而沉重。口苦。惡心。嘔逆。噯氣。發黃也。治法並宜刺絡。委放。

血而內服。加羅蔑兒。一二黍。日二三次。或加龍腦。用之。

外擦。規吉加樟腦膏。即規吉撒兒。上弗加樟腦者。偉効。若所發近鳩尾。

而發拘攣者。加羅蔑兒。加阿芙蓉液。與之。公

脾炊腫者。治法與肝炊腫同。同

腎。膀胱。輸尿管諸病。並腰痛。

加味大力湯。藜。腎中生砂石者。腰腹緊急。重痛。小便艱澀。努力。沙石或粉糊。乘尿而出。勞動痛劇。靜坐如失。甚者。腎部刺痛。毫無休歇。控引輸尿道。膀胱。鞏丸。或脚足麻痺。強梗。或惡心。嘔逆。小便不利。其痛稍減。則通利頗矣。

而灼熱。漩脚做粉糊。或混沙石。或混血。雖或諸症全退。一二月後復發劇患也。當其動發也。宜選此湯。及四物。閉壅飲。解凝醬子。分消飲。四方三物洋葵湯。見熾盛熱乳清飲。見聖治之。若症極劇危。飲食入口即吐。其痛殊甚。苦悶不可忍者。速用鎮痙三物飲。見痘其脉強實者。放血而與匾桃醬。見熾盛熱或鎮痙壯神飲。見聖至得快。催眠諸症退。則復用加味大力湯。輩防再發。

加味酸角湯。同腎中有沙石者。宜常服此湯。或三物洋葵湯。二方見熾盛熱。洋葵甘草湯。四物閉壅飲。分消飲。三方見瘡輩。或

行緩和導。見痢疾且以緩和藥作温湯浴之。取洋葵加樟腦膏。見黃疽擦腰腹。並日二次。良驗。若病人血實者。屢可放血。又胞中有沙石者。其候小便熱。如灼。頻努力而不快利。就其溺罷。視之。無有異徵也。其沙石大者。小便艱澁。淋瀝而熱。痛楚不可忍。或二三日涓滴不通。或忽然瘡閉。或滴々不禁。或雜膿血。或漩濁。有沙漠。或清白。而浮薄膜。或溷濁。而惡臭。或尿道刺痛。或痒不可忍。或胞中覺重。或發痔疾。或登廁後重也。治法全與本件所陳同。

導水飲 同腎中生沙石者久行前方而無影响則更選此

飲及破結石酸丸 二方杜松洋葵飲香露礪精飲 共見水腫

石酸鈎吻丸 見聖藥長將之

一物石酸丸 同主治同前每服二分漸加至二錢 方見聖藥

間服甘和石灰水 下日三四

烏白烏而識散 同主治同前

烏白烏而識

右一味細末服五分日二三次

加味烏白烏而識散 同主治同前

烏白烏而識

牡蠣 各五分

右二味細末服法同前

甘和石灰水 同治前症 氏妙治腎中生沙石其生於膀胱

者无効 氏伊

石灰水 十六錢至二十四錢

右以牛乳汁甘和之每服八勺日二三服

和水湯裴治腎痛小水慄悍而灼熱者

洋葵根 錢八

甘草 錢四

錦葵葉 握一

甜瓜子

冬瓜子 錢各四

菊花地丁

薩支弗刺瓦 錢各二

右七味以大麥煎汁四合八勺，煮濾去滓，和薑菜舍利別。麗春花舍利別各八錢，服一盃，日三四次。

加而激那私利萬亞薩水，治結石腎痛，効冠於諸藥。

加而激那私利萬亞薩四錢○見藥世辨

右一味以清水四五合溶解，日服盡。

葶麻酒叔治結石腎痛，神効。

葶麻根百九十錢

右一味以水四五合煮至三分之一，和白葡萄酒八合四勺，更上文火煮一時，放冷絞去滓，內磁罐澄清，和牛酪。

三小塊，平且空心服一盃。

阿利襪酒同主治同前。

阿利襪油白葡萄酒各二匙

右二味調勻，每且空心服。

膠菜葶麻散寡治腎痛，其人腹時痛，小便淋瀝而下沙石者。

葶麻末 砂糖各四錢 牙皂樹膠末二錢

紫茉莉根末一錢 橙皮油六滴

右五味先以橙皮油調砂糖，下餘藥和勻，每日或隔日。

服一錢

苧蒿飲歌 腰痛劇甚由腎中結沙石帶惡液者與此飲兼行苧蒿導下見

苧蒿花撮一 阿芙蓉黍二 杜松實油滴四

接骨木子醬半一錢

右四味以沸湯浸苧蒿花取六勺瀉去滓和餘藥溫服苧蒿導同治前症

苧蒿花 洋葵葉 芸香葉各半 小茴香

格墨岡子各二錢

右五味以海水三合煮取一合半更和白蜜十六錢阿利襪油適宜注射肚中

歸正散同前症用上件方法而其痛定者宜導惡液驅沙石此方主之

蝟蝟石若雞子殼燒及二黍 消石錠一 撒法郎一分

杜松實油滴三

右四味為散白湯送下

歸正飲同主治同前

拔爾撒摩格泮藿錢四 卵黃個一 大麥煎汁六合

百發方是

腎膀胱輸尿道諸病及腰痛

砂糖宜適

右先取格淋藿調卵黃次內餘藥和勻每飲一盃日三飲。

的列並大黃糖同前在便難者宜此方。

的列並底那勿搗茶產

大黃末二錢

砂糖宜適

右三味調勻服二銖至一錢。

膠脂琥珀丸同主治同前

安沒尼亞加膠一銖

紫茉莉脂半銖

琥珀油三滴

右三物作丸服。

甘葵接蜜湯同腎部焮腫者腰肢急痛小便灼熱宜放血而與此。

甘草八錢

洋葵一握

亞麻仁二錢

白蜜十六錢

接骨木子醬十錢

消石錠一錢

右六味以大麥煎汁一升許先奠上四味取五合去滓。

和餘藥每服一盃日數服。

滑利膏子同主治同前

阿利襪油若亞麻油

十六錢

砂糖宜適

右二味攪勻每服一匙。

定痛膏同 主治同前

樟腦錢一 阿芙蓉錢半 剝彪列乙膏錢十二

右三味先取樟腦阿芙蓉調蚯蚓油次和膏塗抹腰腹

水羅油同 沙石壅塞腎及輸尿道而小便利者宜以此方

拔爾撒摩修兒弗兒的列並底那滴十 琥珀油

杜松實油滴各六 砂糖宜適

右四味攪勻服或炒鹽盛囊裏與溫搭腰亦佳。

丁幾去兩干太利埏同 前症諸藥无効者與此良驗

羌青粗末

右一味盛布囊以燒酒一合六勺漬之置煖處一伏時。

每朝夕取二錢和刺蝟石末五分服之兼大麥湯和砂

糖與之按以羌青下治小便不利其先與二十五滴日一

則或用一二匙而得全愈者但投之則害隨之其量不可不慎也。

哥提尼爾酒裴 治腎痛有粘液或沙石而小便隆閉

哥提尼爾丁一錢至 列應酒二十四錢至

右二物調勻分服。

枸櫞止痛飲吳 結石腎痛者其症腰痛小水入溺器即生

石灰狀膜被著之舉止不得其痛自腎部斜接膀胱次

西醫方選

腎膀胱輸尿管道諸病及腰痛

腰痛去膀胱痛小便隆閉或艱利也此方良驗

枸橼汁錢八 匾桃油錢十二 肉豆蔻末二錢

右三味攪勻更調白葡萄酒四十八錢分服三四次間

飲水漿及乳汁以援藥勢

石鹼沒藥丸司警欲預防沙石之生殖於腎則須使其人

步履騎乘各隨所好以搖動身體且多飲水漿及乳汁

每旦以哥喜若茶送下此丸禁食鹽醃煮炙及一切難

消化物

石鹼勿搗茶產 沒藥 琥珀各五分

拔爾撒摩格海藿 甘草末宜適

右五味每一錢為十五丸每服四丸

葵麥翼甘湯同治腎中結石發痛者以方不翅定痛利尿

且預防尿血

精大麥 洋葵根 甘草各八錢 白罌粟殼三顆

右四味以水七合二勺煮去滓臨服和乳汁等分溫服

厲灰水藜蒲治沙石在腎

礬灰若石灰九錢

右一味灌沸湯三升八合四勺攪渾之放澄取上清如

西醫方選 卷八 腎膀胱輸尿管道諸病及腰痛

此三回。平旦空心服三合二勺。

治胞中沙石。宜先作礪灰水三合二勺。每服一口。送下石

礪一錢。平旦卓午薄暮刺水。則代常飲。日服盡。漸增至

石礪八錢。礪灰水一升二合八勺。其石大者服之數月。

若服之痛甚者。減石礪礪灰水與之。或與第二浸。即取

如法製者。第三浸。上共佳。同

烏白烏而識湯。伊治結石胞痛。又扶其分泌之機。預防沙

石之更結。

烏白烏而識粟八錢 白嬰粟舍利別十二錢

右二味。以水二合四勺。先煮粟減半。乃下舍利別和勻。

每半時服一二匙。

舍乃我魯蘊飲。養胞中結石。其痛劇。而有焮衝血實之候

者。宜久服此。

舍乃我魯蘊丸十黍 菩提樹花露三十錢

麗春花露八錢

右三物攪勻。半時服一匙。或用阿芙蓉液鎮瘕三物飲。

並見鎮瘕芙蓉飲見麻輩亦效

加味亞麻仁飲。同老人弱人。小便下砂石。而無痛楚時々

尿熱如火。或淋瀝難浹者。此飲大驗。

亞麻仁 龍傑兒涅蘘葛子 甘草末各八錢

右三味調和。分取四錢入罐內。灌沸湯二合。四勺密封。放置一刻。漉去滓。日二三服。若沙石滯尿道而不出者。射入之以緩。和導。見痢疾或以緩和藥慰之。

茴香園老飲同治前症

茴香根四錢 甘草十二錢

右二味湯泡溫服。用排膿飲見痘亦效。

杜松導水湯蒲沙石停塞於輸尿道者。宜先塗阿利襪油

少許於患部。而後用之。利小便。見其利小便者當以此

杜松實露 洋葵舍利別

右二味攪勻服。或甘消石精一小匙。常飲時服之。亦佳。

胞中結石。幾劇痛者。速刺絡。而取遍桃油。或阿利襪油。或泡洋葵葉亞麻仁湯。飲二三口。兼行緩。和導。以緩。和藥。慰腰腹。若不驗者。阿芙蓉液四十滴。加阿利襪油一匙。與之。本

洋葵清燥湯。腰灼熱刺痛。觸之益劇。其痛延及鼠蹊。

膀胱股腿急梗。鞏丸不縮。煩渴引飲。身體壯熱。小便了而不了。色赤而熱。或清白者。是為腎焮腫也。宜清涼之。而不中利尿。以湯見熾盛熱主之。洋葵甘草湯見權輩亦可服。且取洋葵加樟腦膏見黃塗患上。作緩和導射入肚中。再三便秘者。加食鹽。蜂蜜行之。

洋葵大麥甘草湯蒲治前症初起放血而與之

洋葵根 大麥 甘草

右水煎溫服。

分消飲。蘓前症遷延不愈。則成潰瘡。其候如肺癰者。當從

其法治之。若膿從小便利。或膿熱並隨通利漸減者。宜以飲或加味大力湯二方見瘡

乳沒丸同前在膿從小便利而漸少。熱亦隨減者。與此丸。

見喘急或香膏丸見水腫

腎焮腫者。初起腰隱如痛。隨漸劇。且覺築動。惡心嘔吐。小便如灼。或閉絕不出。病進一等。則肢體振慄。大便秘閉。小便淋瀝。心下煩懣。痠疼搗搗。脚足麻痺。陰囊牽縮也。治法。先放血再三。若痔脉腫起者。行蟻針。為良。布。蒸藥浴湯。下導法亦效。大便不通者。用酸角甘露蜜下。

之其因生沙石發者嘔吐必劇或沙石乘尿出宜溫湯和蜜與之以令易吐寡

二物按兩撒摩丸同腎焮腫其人振慄腰重而急緊者膿

已成也當急行下導法貼琵琶布次用嚏藥或乘車與促

其破潰否則發勞瘵或它重症也若小便下膿或混血

者是破潰也宜先與乳清次用按兩撒摩劑壽氏則作

此方治之

按兩撒摩格洋薑錢一 國老膏錢八

右二味調勻每一錢作二十九一刻用八丸隨飲乳清

幾罌麗春漿同治腎焮腫不消已膿潰膿者從小便出惡

臭撲鼻壯熱如焚身體虛羸百治不應者

麗春花露九錢十錢 幾那煎膏 牙皂樹膠錢各二

葶麻末錢一 白罌粟舍利別錢十六

右五味攪和服之隨飲乳灰水乳汁三分石灰水和者效驗

膀胱焮腫者治法與腎焮腫同

琥珀甘和飲尿道中天然有滑涎者所以滑利小水且

障其戟刺也若變苛厲則發腰痛其證候畧與沙石痛

同但小水漏泄粘液而不下沙石白塗雖多不結石灰

狀膜惡寒振慄特甚者乃名粘液腰痛也其效散

琥珀 乳香各一 鹿角燒灰二

野艾蒿鹽二 苗香油六

右五味作散分作二十點日服三四點痛甚者加純粹

阿芙蓉三黍

腰痛因聖京健毒侵腎發者其痛遊走不定也宜從聖京

健治法若因伊屈葛及刺達屈刺見聖京健篇者亦從本病

治之吳

溺血

瑰龍含謨比東筒吳溺血先利膿者有潰瘍于內也要知

其所在須認痛處含謨比東湯見吐血主之其患在胞內

或尿道者兼用此方射注尿道

含謨比東根錢八 玫瑰花握半 龍牙草握一

的列並底那錢二

右四味先取的列並底那同卵黃研勻次以水二合煎

餘藥去滓相和調每量所用溫之射入尿道

膠石甘葵湯蒲治溺血因腎中若胞内生潰瘍

洋葵二十錢 甘草四錢 牙皂樹膠十六錢 消石四錢

指按百方選

卷八 溺血

三十一

右四味以水一升二合煮二味減半。瀝去滓。下膠石炸消服一盃。日四五次。

四物舍謨比東湯。吳瀉血腰冷而無痛者。幾於尿管縱寬也。此方治之。

舍謨比東根 萬兩面室刺根各八 玫瑰花握半

桂錢四

右四味以水八合五勺煮之。每半時服一茶鍾。隨襯堅腎枕子。凡於腰外按之。

堅腎枕子 同治前症。

葉沃刺那 迷迭香 玫瑰花 各半 桂錢二

丁子錢一

右五味作粗末。盛布囊襯腰部。

加味石灰水 蒲瀉血久不止。虛脫甚者。宜此方。但勿初起用之。

石灰水 錢十二至四十錢。製法。取石灰九十六錢。灌水二升七合。強放置二日。紙過聽用。

幾那丁錢四

右二物調勻。日服三劑。

酸瑰清涼飲 吳瀉血。其人腰部焮熱築動。脉強盛。身熱如

燔者。以乃血湊激腎之所致也。宜刺絡而與此飲。此飲敗熱

溺血。其人血實。或兼喉腫之症者。當刺絡而用下藥。酒石大黃

甘露蜜或行緩和之導方亦宜。蒲

幾那馨精飲。同治溺血。其血焯崩使然者。為屬痘瘡麻疹

腐敗熱之夾症也。宜此飲。或化斑飲。並先腐敗熱

幾麥嬰甘湯。吳溺血腎結沙石。為其所傷而發之者。宜令

患者節其動作。而服緩和劑。此方主之。見腎痛若發於服

悍利藥者。速服乳汁及緩和之飲。或取洋葵根煎加

乳汁少許與之。或與此湯並得。

淋瀝 發於癰毒者名曰癰

拘櫟止痛飲。吳淋瀝。為胞中結石。惟之者。殊多。所謂此乃

沙石堅確。輾碾胞頭。以痒起之。令小水未滿而滴瀝頻

出。或因胞中為沙石剝喪消涎。而每小水未直受其衝

以便然也。宜選此飲及石鹼沒藥丸。葵麥嬰甘湯。共見腎痛

治之

淋瀝由多服利尿之劑。或過飲麥酒。而剝喪胞尿管道滑

涎者。宜多服乳水。或區桃油加肉豆蔻油少許與之。同

酸瑰清涼飲。吳一切劇病敗腐血液。而發淋瀝者。危徵也。

以飲宜之。見腐敗熱

麩護回生丸 同淋瀝發於水腫者水液變苛屬而敗腐之

候也。以丸冥之。見勞瘵

蘓合乳香丸 同淋瀝為聖京健毒。其它稀屬液與尿道滑

涎混清發者。僅通數滴則覺刺痛也。以方治之。

乳香 蘓合香 各二錢 酒石鹽 五分

鹿角燒灰 一錢 橙皮油 滴

右五味為散。分作十貼。以伊斯把尼垂酒服一貼。日三

次。壯肺利胸丸。見亦效

加味匾挑乳 蒲治淋瀝因苛屬液。或貼芙蓉膏。或服刺衡之劑發之者。

匾挑仁 八錢 牙皂樹膠 四錢 洋糖 大錢

大麥煎汁 二百五十六錢

右四味。先取大麥煎汁。乘溫烺消。牙皂樹膠。令冷定。次

取匾挑仁洋糖。內石臼搗爛。取所冷定。稍久注之。攪不

住手。至如乳汁。布過聽用。

結麗土飲 辛治淋瀝發於中。芙蓉膏。其它猛毒。

結麗土末 八錢 牙皂樹膠 一錢 砂糖 十六錢

桂露八錢

右四味以沸湯九合六勺灌之。下桂露和勻。時服一小盃。

小便閉

溫暖驅尿酒吳小便閉發於寒液充塞體裏者。腎胞胱無所痛楚。又不夾飲滿不得之症。胞內亦無小水之滿。此腎機不能分利小水也。當用溫暖分利之劑。宜此方。

獨活根

刺薊子

茴香

杜松實各八錢

右四味入玻璃瓶內。灌白葡萄酒五合。密封。置暖處出。

藥味瀝去滓。每一盃。點琥珀油。若杜松實油一二滴。服

日四次。兼用驅寒利尿。慰慰腰部。

驅寒利尿同治前症

蒲里阿尼亞根

杜松實各八錢

茴香

野艾蒿

二色檜葉各半握

右六味以水六合。煮去滓。乘熱釀綿布敷腰。

酸麥酒石湯外吳小便閉。其人無有溺意。腰重而痛。熱不散。

其動築外。遍身如燔者。是腎藏炊腫不能分利小水也。

宜先放血。次以湯下之。

大麥 酸角 各十錢 浮酒石 六錢

右三味水煎。取四合入勺。更和接骨木子醬十六錢。日

三服。至大便瀉。以清熱。見下慰腰。

五物水石散 同 主治同前

凝水石 浮酒石 沙糖 各一錢 枸櫞皮油 四滴

刺蝟石 二錢

右五味為散。分為十貼。每服一貼。日二三服。

二物酒石散 同 主治同前

酒石 沙糖 各五分

右二味為散服。

清熱熨 同 主治同前

接骨木花 非阿斯舍亞護花 草零陵香花

麗春花 各二撮

右四味以水二合煮去滓。更加接骨木花醋。薔薇醋 共見

今日 各十六錢。燒酒四錢。蘸綿布熨痛處。 蕭氏曰。用溫

加密列花。錦葵葉。水煎。來

洋葵大麥湯。 蒲 小便閉。因胞頸焮腫者。當刺絡。若不應施。

緩和導方。或熨胞頸。與此飲。

大麥煎汁 三合

洋葵舍利別 四十錢

消石 四錢

甘區挑油 三十錢

右四味攪勻。二時服。一茶鍾。若不應者。再放血。或浴溫湯。至沒腰。或插蠟。燃子於莖中。

消石散 卒 小便閉。其人血實者。宜先刺脚放血。次以洋芹

露下。此散。見感。兼射注水蔓導於肛門。

水蔓導 同 治前症。

水蔓菁

食鹽

阿利襪油

若加密列油

右三味以水先煮水蔓菁去滓。和餘藥射注肛門。

幾那散 卒 治小便閉。發於纖維。縱弱者。每半時與五分。俾

効 見神經熱

匾挑加罌粟乳 蒲 治尿道癢急。小便隆閉者。

匾挑乳

罌粟舍利別

右二物攪勻服。不効。放血。作緩。和熨劑。蒸之。

葵麥罌甘湯 吳 小便閉。發於沙石。若凝血。留尿道者。宜以

湯 見腎痛

鎮痙飲 同 小便閉。因拘牽抽掣者。與此方。或鎮痙除壞丸。

二方 治其本。迺愈。

西醫西藥 卷八
梅甘飲蒲治一切小便閉當須瀉大便但禁峻下藥

梅那 甘露蜜

右二味湯泡溫服或施緩和導方順利大便和寬膀胱殊妙。

洋葵煎 同治一切小便閉。

洋葵

右一味水煎釀綿布熨肚或和甘消石精一匙若石齮一錢時々服之並效。

寒太利酒伊治小便閉因膀胱麻痺者或癥淋毒解而白

濁積年不愈者又治遺溺失禁服十五滴日一次漸次

增之一名羌菁丁見聖京健凡用羌菁不明病因而輕投之却招大害宜斷無其害而慎量與之

神效

神驗寶蜜治小便閉及尿道諸患發於纖維縱弱或麻痺

羌菁末一分 龍腦二分五厘

右二味先取龍腦同匾桃油研下羌菁調勻分服二次或貼羌菁膏於腰亦效。

神驗散雜治小便閉由尿管輸尿管膀胱等纖維縱寬或麻痺或粘液凝滯發之者又治小便艱澀淋瀝

西醫西藥 小便閉

芫菁一泰至四泰

龍腦

砂糖各少許

右三味作散頓服

神驗乳司 主治同前

芫菁未半錢

龍腦二泰

匾桃仁八錢

右三味先取匾桃灌水二合搗下如乳汁乃內餘藥搜勻每一時或一時半服一匙

消渴多尿尿崩乳糜尿

角灰樹膠湯蒲消渴之為症煩渴引飲小便過多其色淡白而甜臭身體微熱口乾而涎沫多精力虛衰食音無

味骨立支牀腸中覺熱或腰脚陰囊浮腫也宜初起用此湯治之

鹿角燒灰十六錢

牙皂樹膠四錢

右二味以水九合六勺煮取六合四勺濾去滓更內膠少許烱盡服之

灰膠水同 主治同前

甘和石灰水九十六錢

見腎痛

牙皂樹膠八錢

右以灰水烱盡膠分服單用甘和石灰水亦佳

乳煎礬石飲伊消渴其症飢渴並甚引飲無度小便頻數

而多。嗅之氣如砂糖。是酸敗液之所致。此方主之。

礬石錢一

右一味。以乳汁二百五十六錢。煮取上清。調催睡藥。與之。單用。本方。每服八分。服已。溫覆取汗。禁一切酸味。及蔬菜果實。

血竭礬石散 蒲治消渴遺尿及小便失禁。

血竭

礬石各等分

右二味。先取礬石入坩鍋內。上火候煇化。乃下血竭攪勻。下火放冷。作散。用玫瑰飲此一茶鍾。下五分。日四五

次。

玫瑰飲 泥治前症。

玫瑰花

取茶末。被灌。綠礬精。一錢。晒乾者。八錢。

砂糖四十錢至四十八錢

右一味。以熱湯六合。四勺。淹二時。瀝去滓內。砂糖和勻服。

大黃縮砂酒 同消渴衰弱不甚者。宜此方取微利。

大黃

縮砂

右二味。淹葡萄酒。候藥味出。去滓服。

凡體中血液。原有相投相合之力。故腎能使其入臟者不

直奔尿道悉淘汰之錄其善良而歸諸腎靜脈也。若夫
損合之力損則齊做稀敗汁。從尿道濫出。身體瘦羸。精
力虛憊。是曰消渴也。由飲食若毒藥致之者。速禁其所
由則可愈。若不愈。宜用肉桂。肉豆蔻。橙皮作劑。多服之。
其症雖劇必除。吳

幾那散 蒲 治消渴衰弱甚者。最良。每服一錢。赤葡萄酒送
下。或取幾那湯。赤葡萄酒各半。調勻服。亦得。每服加酸
藥漿十五滴。至二十滴。則味佳。功峻。方見神經熱
消渴治之寬和。藥急刺衝。調血液之運行。亦驗。乃取阿蓉

液十滴。至二十滴。熨常飲一盃。服之日二三次。

發汗將吳 多尿發於蒸氣壅遏者。宜以方或解肌丹。並見聖京
健。

酸瑰清涼飲 同 治尿管發於熱壞液者。見腐敗熱

護護回生丸 同 治尿管因寒壞液者。又小兒或婦女脆弱。

罹病久而腎臟縱緩不能約血中之乳糜。與尿同洩。色

如乳汁者。名曰乳糜尿。以方見虛勞主之。

神驗漿雜 治尿管因腎中尿管及神經麻痺。不守其職

發者。神妙。又治小便失禁。

羌菁 未四 錢

右一味。浸綠鑿漿九十六錢。二三日。瀝去滓。服十五滴。至三十滴。日二三。次。

西醫方選卷八終

西醫方選卷九目錄

癰瘡

洋葵青龍飲 一

甘汞紫堇漿 二

鴛鴦甘汞飲 三

加味護護規吉漿 全

奇驗青龍酒 全

升汞醬子 全

兩葵麗春飲 全

化淋宜腸散 四

化淋醬 全

消毒清下飲 全

宜腸圓 全

清熱利尿散 全

清熱利水湯 五

朴蜜福烏蔞湯 全

甘汞水 全

健胃甘汞丸 全

甘草洋葵湯 六

奇功水 全

亞麻仁泥子 全

規吉撒爾弗 三方

紫苡亞爾尼加筒 八

礪礬水 全

拔爾撒摩 全

的列並甘草丸 九

甘汞丸 九

膠汞飲 全

兩全醬 十

殿軍水 全

三味 全

瓦刺微阿刺甘飲 全

鉤鶯煎丸 全

鉤吻甘草飲 全

強壯化淋醬 全

強健酒 全

鉛粉水 全

鉛龍水 全

幾那沒食子湯 全

的列並甘汞丸 全

蝟蝟龜腦丸 十四

琥珀龜乳丸 全

瘰癧子 全

排撚子 十五

鉤吻蜜 全

外汞鉤吻蜜 十六

大蓼花散 全

麥麥泥 全

甘乳蒸 全

沒綠酒 全

防腐水 全

礪塩升汞水 全

鉛粉泥 十六

三和膏 全

排毒洗 全

乳饒泥子 十九

礪汞膏 全

葉莉甘汞散 全

鉤吻甘汞丸 二十

雙能泥 全

潰破泥 全

排膿維子 全

分消膏 全

拔墨散 全

青龍乳 全

赤明油 全

神驗水 全

消疣水 全

芹葉鉤吻煎 全

大蓼煎 全

解毒湯 全

加味藥力湯 全

羊魚紫堇湯 全

蜀羊泉湯 全

六物解毒湯 全

黑汞丸 全

至寶丸 全

漢涅滿消毒散 廿七

五物解毒湯 全

福烏萬達蘭 廿八

二物福烏萬達蘭 廿九

粘魚鬚煎 全

仙遺糧煎 全

大力遺糧煎 廿九

四物魚鬚湯 全

殺越排毒湯 全

加味粘魚鬚煎 全

牛魚葡萄湯 卅

三物遺糧湯 全

胡桃皮湯 全

福烏萬達蘭 卅

粘魚鬚瑞香湯 全

瑞香湯 卅

四物瑞香湯 全

瑞香魚鬚湯 全

加瑞香魚鬚湯 全

玄珠膏 卅二

護規吉丸 全

玄女水 全

玄珠丸 全

青龍酒 卅三

玄水醬子 全

滌腸丸 全

單方青龍丸 全

藤蘆白汞丸 卅四

白汞膏 全

外汞膏 全

青龍水 全

防腐水 全

規吉新麗護 卅五

銀朱薰 全

玫瑰酒 全

土木香煎 全

解水試驗方 卅六

癩疽疔瘡。

散消油 卅六

成膿泥 卅七

麥麩泥 全

拔毒膏 全

蘭皮幾那湯 卅八

母鯨油蜜泥 全

清疔水 全

疥癬癩疾。頭瘡。白禿瘡。

甘永茉莉散 丸

薩撒弗刺斯湯 平

鉅消散 全

加味石亭散 全

美永膏 四十

鹼硫膏 全

石亭硝砂膏 全

石亭酒石散 全

硫黃膏 四十

盧硝膏 全

榆白皮湯 四十

排毒湯 全

排毒散 全

洗藥 二方

治癬水 四十

芥葉鈎吻膏子 全

治癩疾方 全

硝消散 全

一方 四十

治白禿瘡方 全

代指鼻淵

治鼻淵方 四十

熏藥 四十

凍瘡雞眼充贅

硝砂膏 四十

乳房皸裂乳核乳癰

奇功水 全

芥葉鈎吻散

五物規吉丸 四十

樟姜酒 全

金瘡

黃蠟膏 四十

黃拔細栗膏 全

打撲

醋水泥 四十

樟腦精 全

消甘乳清飲 五十

湯火傷

甘燥膏 五辛

雞卵膏 全

密陀醋 一辛

鉛卵膏 全

蠟卵膏 全

蠟布法 全

膏布法 全

石灰油 一辛

結麗土油 全

竹木刺

諸咬傷

消毒水 三辛

蟹灰散 全

國蒲散 四五十

四物奇功圓 四五十

三物奇効圓 全

龍消食而便散 全

竜麝阿魏丸 五五十

治犬咬傷 屢方全

解凝排毒湯 全

蒜錫芸香飲 六五十

牡蠣散 全

神秘丸 全

白薇散 七辛

乳蜜蒸餅泥 八五十

中毒

甘和乳 八五十

酒石水 九五十

清涼乳 六辛

酒石飲 一辛

麥乳各半飲 三六辛

鹽汁薄荷飲 四六辛

中氣 并 電死

縊死 并 壓死

溺死

暈死

切膏梁油膩辛酸熱物。

甘葵舍護比東飲。前症用前方而諸症大減者宜多服。

此飲血見吐每五六月停服用加味大黃散見泄日二三

次若焮痛已止小便仍頻數綠膿未罄者隨病人強弱

隔五七月兼用汞葉散加味汞葉散二方見三物飲酒

石茉莉散霸王飲三方見熾盛熱輩下之

洋葵青龍飲傑癰淋初起陰莖不腫起當小便乃覺尿道

焮痒而稀液滴瀝者為尿道有微焮腫也此方良驗。

水銀以硝石精溶化者二三滴洋葵煎汁三十二錢至四十八錢

右二味和勻日服盡。

癰淋每小便輒尿道熱痛陰莖腫脹包皮焮赤振作癢痛。

至夜最甚或其痛時牽引會陰小水漸稠厲或灰色或

黃綠或交血而臭惡者當先刺下之至焮熱腫痛已減

乃用規吉斯麗謨射入尿道甚好同。

刺蝟消石散蘇洽癰淋初起莖中劇痛不可忍陰莖振作。

小便如灼身大熱脉堅實者宜先放血而與此散或加

味大麥湯消石栗接飲洋葵清燥湯四方見熾盛熱輩頻用溫

湯或散毒湯即散毒囊料水煎者見丹毒潰陰莖若大便秘者選用

加味梅肉湯。加味酸角湯。三物洋葵湯。輩至_九。焮熱劇痛俱減_五。乃與霸王飲。三物飲。酒石茉莉散。輩下_二之。其人不欲_二下藥。或用之。而无驗。膿水黧綠者。與洋葵清燥湯。接骨錦葵飲。_{以上八方並見熾盛熱}洋葵甘草湯。大力甘草飲。_{二方見瘡}輩間服此散。_{見熾盛熱}或甘汞紫堇漿。_{見下}甘汞紫堇漿同。治前症。焮熱劇痛共減。而膿水黧綠者。又治_下一切癰毒及細瘡諸藥不效者。_上

甘汞_{分二} 紫堇露_九 紫堇舍利別_{十六}

右三物調勻。每一時服_二匙。

鴛鴦甘汞飲 同 主治同前

鴛鴦菊煎膏_五 甘汞_{分一} 白糖_{錢一}

右三物內乳鉢研末。分作六貼。每服一貼。日_二三服。

加味護謨規吉漿 同 主治同前

水銀_{錢一} 牙皂樹膠_{錢三} 紫堇舍利別_{十六}

苗香露_六 四_{錢十}

右四物先取銀膠入乳鉢內。研至不見星。乃下餘藥和勻。服_一匙。日_二三_次。

奇驗青龍酒_同 主治同前_氏 癰毒諸症。用以良效_氏

升汞末一

燒酒

九十六錢〇壽氏
用百九十二錢

右二味調勻。朝夕服一匙。

氏隨服大麥加乳飲。即大麥煎加乳

者。或甘草洋葵湯見下

升汞醬子同主治同前

升汞末五

厘

接骨木子醬

四錢

右二物。入乳鉢內研和服一匙。日三四次。

兩萎麗春飲布治癰淋及一切痲痛。

洋葵根錢十六

錦葵葉

麗春花各半

右三味。用水六合煮片子時。取四合八勺。每一時服二

茶鍾加罌粟舍利別。或砂糖少許益良。

化淋宜腸散布治癰淋。祛尿道。煖熱服之。一二週則令膿

汁如水。

大黃

芒消

酒石英

各三錢

右三味作末。分為九貼。每一時半服。一貼。白湯送下。

化淋醬同治癰淋。尿熱已止。所漏如糖水。尿道未縱弱者。驗

大黃

芒消

浮酒石

各三錢

拔爾撒摩格拜五。

砂糖和

右四物。宜轉醬子見。便閱調服一錢。日四次。

消毒清下飲泥淋疾宜以此方下之神驗

旃那二錢 酸角八錢 芒消四錢

右三味將沸湯一合六勺淹二味一宿下芒消煨盡每

二時服二茶鍾

宣腸圓同 主治同前

宣轉營子三十二錢 紫茉莉二錢
見大便秘閉

大黃一錢

右三味薔薇舍利別調平且及臨卧服二茶匙

清熱利尿散蒲治癰淋焮痛甚者放血而用此

消石八錢 牙皂樹膠十六錢一作三十二錢

右二味為散分作二十四貼每服一貼湯液一盃送下

若服之小便過利者去消石加麻僂涅矢血十六錢

清熱利水湯外動清腎熱利小便治淋疾

大麥 乾葡萄 甘草 粘魚鬚

右四味水煎溫服

朴蜜福烏蒿湯歌治癰淋及一切癰毒

朴蜜福烏蒿二十錢 甘草十六錢

右二味以新汲水三升煮福烏蒿一時或一時半乃下

甘草片時瀝去滓服。

甘汞水 蒼癰淋尿熱如燬者。先用墨栗薩飲見與解熱散

見感二三度。次行此方。又治陰莖倏忽振作強硬。或牽

縮者。并下疳痛苦難忍者。用此屢洗之。都佳。

甘汞一銖

右一味。以清水八錢一作十錢攪和。射入尿道。日三次。施

此。久則能拔病毒。

健胃甘汞丸 同治前症。又治下疳不兼淋者。

健胃散二銖 見雜

甘汞一銖

右二物。清水調作二十九。朝夕服一九

甘草洋葵湯 治尿道腐爛。小便淋瀝者。多服此湯。且作

乳水湯。是瘡潰陰莖。日數次。必應。

洋葵十六錢 甘草八錢

右二味。先畧煎洋葵。乃下甘草。取九合五勺。強溫服。

癰淋陰莖。變急甚者。取乳汁。調阿芙蓉少許。射入莖中。或

用此。慰之。亦得。雜

奇功。水布淋疾。并白帶下。因癰毒者。以積筒射入此。又癰

毒內攻。而眼目焮痛者。以此洗之。

升汞一黍 牙皂樹膠一錢

右二味與清水二合四勺同入乳鉢研勻或加蜂蜜八錢以代愈創水一切癰瘡以此為洗劑咽喉腐爛則含漱之又便毒石灰腫包皮光腫及諸腫因癰毒者並此為熨劑咸有奇功。

亞麻仁泥子蒲 癰淋胞頸熱腫痛者射入緩和導於肛門或行乳水湯見 瘡若浸亞麻仁湯於尿道或用乳水湯見 瘡潰陰莖日二三度或作此泥子敷患上或施熨藥
亞麻粉

右一味煉和牛酪或阿利襪油攤綿布乘溫敷取白蒸餾和乳汁代之亦好。

規吉撒爾弗 治癰淋甚劇性悍惡者又治淋毒波及胞胱若精囊者每日或隔日取以膏塗患上一次 氏菴 治便毒畢丸腫骨節疼痛及一切癰毒。

水銀八錢 伊氏 家猪脂三十二錢 蒲用二十四錢 氏用各等分

右二物先煇化猪脂離火候稍冷徐徐下水銀研和至不見星擦之患處。

又方 藿治癰毒諸症殺陰虱。

淨水銀錢八

的列並底那勿搗茶產者二錢

家猪脂四錢

右三物先取水銀同的列並底那研磨至不見星而肉

家猪脂和勻敷患處

又方伊消便毒畢丸腫特良

水銀錢八

阿芙蓉

樟腦各八錢

的列並底那勿搗茶產者三錢

家猪脂

適宜一方作十錢半

右四物先取水銀同家猪脂研至不見星和餘藥敷患

上

加味大麥湯同癰淋其膿膠稠不易出小便艱澀者且將

此湯或洋葵清燥湯見熾盛熱大麥加薔薇蜜湯鈎吻接骨

漿見明喉射入尿道中

癰淋尿道灼熱膿稀厲者宜選洋葵甘草湯見熾盛熱或淨穢

水甘和湯見二方輩射之尿道尤佳同

茶以亞爾尼加筒同癰淋其膿黃綠而惡臭醫治之色已

化白黃惡臭去漸稀淡如水者其毒殆盡之候也雖則

如水漏出而久不止者須作此方或薔薇蜜陀水見眼目

射注尿道

芥苡握一 亞爾尼加葉握一

右二物水煎取九十六錢用之

礪礬水同 主治同前

礪砂勿搗茶 產者 明礬各半 井泉水九十 六錢

右三物調勻向尿道射之

拔爾撒摩卵黃飲同 凡治癰淋勿早用拔爾撒摩劑犯之

則發熱煩渴莖中焮痛也其毒頗解痛止膿減則用此

間服加味龍牙飲見吐血 利利尾爾甘草飲見胞

拔爾撒摩木加七滴 卵黃個一

右二味入乳鉢內研勻更和茴香舍利別十二錢撒爾

非亞露六十四錢每一時半與二匙用香膏丸腫見水乳

沒丸急見喘 龍腦丸見非輩亦得

的列並甘草丸同 主治同前

甘草末錢四 的列並底那宜適

右二味調勻每一錢作二十九一時半服二九一

甘汞丸蒲 淋疾尿熱如灼莖中刺痛時々振作者雖有刺

下蒸慰而偶愈多不能根治故宜行其法而只退劇症

與此丸以拔其根

甘汞二三

右一味。蒸餾心調為一丸。隔夕臨卧服。漸增至半銖服。之腹痛或下利者。與泡旃那湯。或大麥湯。或蒸餾湯。豫防下血。若下利腹痛而腸弱。者。延調之。若斯哥而需。護五分。用之。凡用汞劑者。須三四日。一。下之。以防流涎。膠汞飲。泥前症。當用水銀劑。而其人不能服丸膏者。作此飲與之。此方无口內腐爛之患。而効甚良。

水銀錢一 牙皂樹膠錢二

右二味。以水先烱盡。牙皂樹膠。同水銀入乳鉢內。研和。

至不見星。更下。按兩撒摩舍利別四錢。桂露六十四錢。和勻。且夕服。二匙。病人腸弱不堪內服者。擦規吉撒兩弗一錢許於股內側。功不異內服矣。按兩撒摩舍利別見小兒科

兩全醬同 癰淋治之。尿熱退。莖中腐爛止。鼠蹊不腫。陰囊不痛。膿出已少。真粘並去。唯白色者。為毒殆解也。當收且瀉。以方主之。又治滑精白濁。

宣轉醬十六錢 浮酒石 大黃各四

按兩撒摩格洋藿錢十二

右三味。玫瑰舍利別調。朝夕服。肉豆蔻大。

殿軍水 同治癰淋毒已盡淋瀝仍不止。又治滑精白濁。

蓄薇露 二十四錢至三十二錢 鉛糖 十黍至二分

牙皂樹膠 少許

右三味先用露溶化膠乃下鉛糖和勻取二三錢微溫以射入尿道。

癰淋瘥後漏涕狀物積年不愈或尿道腐爛而膿水不盡

或滑精白濁久不已者宜與芫菁丁十五滴日一次漸

增至小便淋瀝伊芫菁丁見聖京徒

白頭翁散 同癰淋雖守常套治之不得效驗者宜作此散

見眼目治之亦治其初起或其積年不愈或膠固百方无

應膿水不盡苛厲惡色小便不利者良驗若當溺莖中

劇痛者兼外敷規吉撒爾弗上見殊效又治咽喉腐爛骨

節疼痛四肢疔瘡腐骨疽潰瘍瘰肉疥癬眼目蒙昧等

因癰毒者

三味瓦刺微阿刺散 同主治同前

瓦刺微阿刺煎膏 一錢 麻屈涅失亞 六錢 茴香 一錢

右三味為末服一刀尖日三次撰用逐瘀丸大蓼飲瓦

刺微阿刺酒三方見聖京徒甘汞紫堇飲上見亦宜

凡刺微阿刺甘草飲 蘇主治同前

大瓦刺微阿刺草 甘草各八錢

右二味湯泡溫服

鈎耆煎丸 同主治同前

芹葉鈎吻煎膏 鴛鴦菊煎膏

右二物調和每一錢作二十九丸每服二丸日三服

鈎吻甘草飲 同主治同前

芹葉鈎吻 甘草 各八錢

右二味湯泡溫服

強壯化淋醬 布治淋疾遺精白濁帶下多漏稀液而久不

愈漸羸瘦者殊效

老里兒 幾那 橙皮 桂皮

銅鏡煎膏 各二錢

右五味細末橙皮舍利別調服一錢日四次

強健酒 同主治同前其不因癥毒者殊佳

鏡粉 幾那 老里兒 各四錢

右三味作末入磁器內注葡萄酒四合八勺固封置煖

處十二時澆過服一匙日三漸次增之

鉛粉水蒲凡癰毒淋疾者。為難速根治。設令不失其治。延數月也。但初起射此水。則間有奇驗。

鉛粉若鉛糖五分

右用薔薇露一合。二勺。烱化微濕之。用小積筒射入尿道。日五六次。至淋瀝止。

鉛龍水劫治尿道腐爛者

鉛糖五分 龍腦一銖

右二味。以水三勺。調勻之。向尿道射入。

幾那沒食子湯混癰淋毒盡痛已。但常滴出白液者。名曰

白濁。其滴瀝因循不絕。雖用收瀉劑。毫不應者。尿道有潰瘍也。若白液唯當發其情慾。或登廁努力。而出者是尿道縱弱之所致也。當與此湯強收之。

幾那六錢 沒食子二錢

右二味搗末。以水四合。八勺。煮取二合。四勺。濾去滓。更和幾那丁二十四錢。每服一茶鐘。點酸礬漿十五滴。或二十滴。日三服。且用殿軍水射入莖中。或加礬石若亞鉛礬一二黍。行之。

治前症莫緊於浴冷水法。平旦空心行之。三四週。每浴三

四刻。但血實及腑臟虛弱者禁之。

的列並甘汞丸泥茶。前症衆治無驗。在再久不愈者。為尿道有潰爛也。當用水銀劑宜此丸。

甘汞分五 的列並底那勿搗茶產煎 熱者四錢

右二味作六十丸。每服五六丸。朝夕朴蜜福烏葛煎。或薩撒弗刺斯煎下之。口中腐爛。氣息臭惡。則停後服。俟其已復用之。

尿道有潰瘍。若腫瘍。若息肉者。作釀膿。然子製法。先以文

膏八錢。護秘刺及尼蒲松膏二錢。乃下白汞一錢。半和勻。塗西洋布。切作一條。按之。大如羽翮。塗阿利

襪油。搽尿道。經三四時。擢之。大良。蒲

刺蝟龍腦丸。剋剋。伏伏。酸酸。毒毒。治小便淋瀝。

刺蝟石錢四 龍腦 的列並底那勿搗茶產 各三錢

拔爾撒摩拾。洋二。藿二

右四味。每一銖作五丸。

琥珀龍乳丸。同。主治同前。

乳香錢四 龍腦錢二 琥珀鹽銖一 琥珀油滴二十

右四物作丸。

瘳然子傑。治癥淋刺下之。症已退。所淋瀝稠粘白色。經久

不止。或小便艱澀者。宜作此。插入尿道。達于膀胱。能復尿道縱弱。而無貽尿道息肉。潰瘍。或幾里兩突起。以妨礙通利。等之沮。此乃所歷驗。

金蜜陀僧末八錢

鉛粉末八錢

阿利襪油八錢

右三味相和。上文火煮至黑色稠固。如硬膏為度。乃取四錢。加黃蠟三十二錢。赤汞末二分五厘。至五分。更上微火烺化。投一條。緻布。候膏浸徹。即揭出。令膏滴。俟冷。自一端斜截兩邊。至下端作三稜形。又截下端作半月樣。然捻之。以板子夾之。旋轉為條。捻子供用。若病人血

實者。先刺下之。而後取此。塗甘和油。亞麻仁油。阿利襪油類。插入

之。居一二時。至四五時。隨病人之堪否。

排捺子同治尿道狹窄。或生息肉。幾里兩腫。癢痕等。沮格小便者。宜用此。潤開尿道。余嘗用之。而收効。可以十數法。取軟革極薄。兩面等者。切作長一尺許。徑一二寸。啣之以唾濕。斜捻為一條。硬捻子。俟乾。搯之。一法。取牛腸入水中。乘濕剥去其膚。張幘曝乾。截徑一二分。以作捻子。更塗蠟用之。

癩毒。陰莖包皮。或龜頭。嫩赤腫痛。身體壯熱。其人血實者。

放血而以散毒湯即散毒裏煎慰之服清涼緩下之劑

蓋謂蚶蛸消石散消石栗接飲加味大麥至諸症減乃湯加味梅肉湯霸王飲清熱瀉心丹等

用治淋之劑

密陀水同前症用散毒湯輩慰之或漬之過度則成水脹

也宜敷此方見丹毒治之若用燒酒劑急消其脹則往々

包皮頑結堅硬其未經久者以芸香硝砂水見熾慰之

乃愈若包皮龜頭之間有毒液而稠粘惡厲者選緩和

劑即大麥加蕃薇蜜湯四物芳香用積筒洗淨之

鉤吻蜜同包皮若龜頭生息肉及蝕瘡即下者當用散毒

湯見上蒸之太佳若瘡頑惡做猪脂狀四邊堅硬石然而

漸侵蝕者敷之以此方或外汞鉤吻蜜次服以治淋之

劑

芥葉鉤吻煎膏錢一 蜂蜜錢八

右二味調勻敷患處日二次

外汞鉤吻蜜同 主治同前

外汞末十 芥葉鉤吻煎膏錢一 蜂蜜錢十二

右三味調和敷瘡上日二次

大蓼花散同 主治同前

大蓼花八錢

右一味為末，搽之瘡上。

蕪麥泥，灌治癰毒，包皮焮腫甚，而冒龜頭，或陰莖忽然振作，或牽縮者。

蕪麥粉

或蒸餅再燒者三匙

蜂蜜一匙

右二味水煮如泥，和阿利襪油半匙，乘溫敷患上，更換日二次，兼塗規吉撒爾弗益佳。

消石散傑，治癰毒，包皮焮痛腫脹，或包皮冒龜頭而阻小便，或兼下疳，或兼淋疾者，病人年壯血實者，宜先放血。

而每半時服，以散見感八厘強，至焮腫消，或里木奈埕

和砂糖橙汁送下，此散尤效。

甘乳同，治前症速驗。

甘乳 葡萄酒 水

右三物調勻，微溫頻敷患處。

二仙散，蒲包皮腫脹不退者，治法與淋疾同，宜放血與下

藥，施中煎劑，若不效，緊脹居然而腐壞者，以方見熾熱吐之。

白湯或大麥煎汁送下。

沒綠酒，歌下疳不拘，輕重用此治之。

沒藥錢八 銅綠錢二 亞鉛礬錢一

右三味細末。淹葡萄酒九十六錢。出藥味。濾去滓。分温以綿撒絲。蘸之。且洗且敷。

防腐水外治 下疳腐蝕甚者甚驗。

銅綠半握 外汞四 樟腦一

葡萄酒二十四錢 會缺 以燒酒代之亦佳

右四物攪勻。頻洗患處。

硃鹽升汞水同治 前症。

升汞錢四 硃砂 兩水九合

酒石鹽錢十六

右四物。先取三物。內玻璃瓶。時々振蕩。便下酒石鹽。候升汞悉沈定。瀉取上清。洗患上。其滓脚曝乾。以供他用。

鉛粉同治 下疳完瘡口。

鉛粉錢四 蜜陀僧錢三 黃陸錢二 赤汞錢十六

右四物。燒酒煉和如泥。貼患上。

三和膏。下疳痛苦已忍。者宜以甘汞水。上洗之。若不效。

乃傳此膏。速驗。

規吉撒爾弗二 甘汞末一 赤汞半

右三物煉和傳患上。

下疳不兼淋疾者多發揚梅毒也。宜朝夕服健胃甘汞丸

見一粒以防之。

排毒洗歌治下疳包皮腫脹而不可見瘡口者。

銅綠

沒藥

蘆薈

各一錢

燒酒

三十錢

右四物攪勻以積筒射患處。

幾那芸香飲。下疳便毒陰囊腫壞敗急速。脈虛數。精力

脫者。宜與此方見熾熱或防腐幾那飲見腐敗熱兼用芳草

囊是丹毒慰患處。

幾那散蕭下疳腐蝕甚者取以散見神熱每一二時服一錢

且作幾那加密列煎兼溫慰患處。

加味和胸湯壽陰囊嫩赤腫痛因淋毒者宜刺絡放血用

軟堅慰見胸腹痛腫上多服以湯即和胃湯九十六錢加消石一銖本方見聖京

健。

乳餅泥子蒲治陰囊嫩腫刺絡後用此。

蒸餅

乳汁

阿利襪油

若牛酪

右三物煉和如泥。乘溫敷患處。不應者宜規吉撒爾弗。有痛敷之患上。无痛傳股內側。作粘魚鬚煎見下多服之。

芥葉鉤吻煎同前症服粘魚鬚煎敷規吉撒爾弗而並無效驗變成硬結腫者宜作此方下見日蒸其腫且飲服之

硝汞膏雜治前症一切腫瘍因癰毒者

硝砂精錢四 阿利襪油錢十二 規吉撒爾弗錢八

右三物先取二物內玻璃瓶振蕩令混和乃與規吉撒爾弗同研勻日取肉豆蔻大搽患處

茉莉甘汞散陰囊腫痛并便毒初起宜以此方下之

紫茉莉一錢 甘汞五厘

右二味細末調砂糖及清水平且用淹茶送下之并敷

規吉撒爾弗不效取燕麥泥見唯和水銀敷之

鉤吻甘汞丸癩便毒初起其毒不猛者宜選用此丸及逐

瘀丸見聖解凝石鹼丸癩鉤吻煎丸癩并服洋葵甘草

湯洋葵甘草飲大力甘草飲三方腫乃消若不消者每

日或隔日搽規吉撒爾弗於腫上覆以硬製規吉膏見

方日

甘汞錢五 芥葉鉤吻煎膏二錢

右二味調勻每一錢作二十九丸服三四丸日三次

甘汞紫堇飲同前症用前方不應者須用此飲或奇驗青

龍酒外禾醬子

是上消輩下之。蒲氏曰：便毒焮腫者，用酸角芒。

便毒單丸腫硬者

並敷規吉撒爾弗。是為良藥。

消石栗接飲

便毒焮熱腫痛甚，身體壯熱者，先放血而

用散毒湯

即散毒藥料煎。湯者方見丹毒。慰之作。此湯或接骨清涼飲。

洋葵清燥湯加味大力湯

蠅蝟消石散。五方先熾盛熱輩服之。

焮腫退壯熱解者乃用鈎吻甘汞丸

輩隨法。見鈎吻甘汞丸條。

治之若焮腫不退熱不解者欲膿潰也膿成即熨破之

乳銜泥

蒲便毒起初焮熱腫痛築動並甚，身體燔熱者，宜

溫傳此泥是釀其膿若病人虛寒不能成膿者此泥加

拔細粟膏膿仍不成頑結者作芥葉鈎吻煎是內外用

雙能泥外治便毒及一切腫瘍以方便腫能消散能釀膿

就其便宜

麵粉

二十錢

卵黃

六個

樟腦

二錢

撒法即錄

右四物煉和如泥溫敷患上即炒砂盛囊慰之

潰破泥

同便毒膿已成未潰者敷此

蒸餛母

四錢

白芥子

十六錢

異石酸

右三味燒酒煮如糊攤綿布乘溫敷之

酸有類方無石酸有莞菁末一

錢而代燒
酒用醋

排膿維子歌治便毒已潰而膿出者

白屈菜汁若蜂蜜 沒藥末少許

右二物調勻蘸綿撒絲維入瘡口

便毒膿已成者宜刺開之而拔細栗膏八錢和赤汞一銖

貼之藿

分消膏布治便毒頑結良効

若爾荅尼薦膏

那波里膏各八錢○共
見今日方

曼陀羅護刺根末十
二錢

右三物調蜂蜜朝夕搽患處且貼之

治獨脚楊梅瘡并息肉宜剪之而貼規吉赤汞各半膏規即

詩撒爾弗赤汞
未等分煉和者服茉莉甘汞散見俾効藿

鉤吻接骨漿蘇咽喉眼目及餘所腫焮身熱如焚者當先

施焮腫治法至諸症退若咽喉焮赤延纏不解并鼻內

生惡瘡不愈者宜作此漿見喉每一二時含漱之不應

者及咽喉腐爛膠固不愈者加之奇驗青龍酒四五匙

若外汞醬子見上方三匙切猶不完者用鉤吻蜜或鉤吻

外汞蜜見上方塗患處必應又治無花果瘡

拔墨散 伊 治咽喉腐爛骨節疼痛無花果瘡楊梅瘡潰瘍
及皮膚諸瘡取效如神

福斯福露修列規吉 泰十四 桂末 泰十四 砂糖 錢三

右三味細末分作八貼朝夕服一貼 或云治咽喉腐爛
綠礬精和蜂蜜與

之屢經
神驗

青龍乳 布 治癰毒咽喉腫痛眼目焮腫包皮脹痛

水銀錢一 牙皂樹膠 錢四 牛乳汁 畧煎者六
十四錢

右三味先取銀膠內乳鉢與罌粟舍利別適宜同研和
至如泥下乳汁搜勻洗患處

赤明油 同 治角膜潰瘍曇暗星翳眼眵及一切癰毒眼疾
經久不瘥良効

牛酪 新鮮者二
十四錢 白蠟 錢四 赤汞 二錢
半

魚鉛精錢一 龍腦 七分五厘以
雞卵油烱化

右先取酪蠟入鍋內上微火候烱化乃下餘藥和勻
鐵鋒許於患處

加味大力湯 蘇 婦人癰毒陰中頑硬或焮腫而皸裂洩熱
血漿惡臭不堪聞者為難症也治之宜選用此湯及大
力甘草飲洋葵甘草湯 三方
兼取鉤吻接骨漿
見喉或

接骨蓄薇水淨穢水並見射入陰中洗之

神驗水同癩家前陰若後陰若會陰生疣狀瘡者先塗鉛

石乳是今日方一次至瘡枯死作水水洗之

升汞錢一 硃砂錢一 鉛粉各二錢 醋四十錢

右四物攪勻洗患處

消疣水 布治疣瘡狀瘡發於癩毒者

醃燒酒 蒸餾水各十錢 升汞末錢一

礬石 樟腦 官粉各末五分

右六物攪勻以筆塗患上日二度隨以規吉撒兩弗貼

之

芹葉鉤吻煎蕪潰瘍惡性腐蝕骨者宜以此煎或大蓼煎

鉤吻接骨漿見喉洗之且朝夕蘸綿撒絲敷之

芹葉鉤吻葉連莖二握

右一味細剉水煎二刻取三合一勺瀝去滓洗後搽大

蓼花末亦良

大蓼煎同主治同前

大蓼末錢二

右一味剉水煮一刻取三合一勺瀝去滓洗患處

洋葵甘草湯癩毒浸染血中而壯熱稽留或夾腑臟嗽腫者是名癩毒熱其劇症不迅則勿用水銀劑當須與清涼峻下之劑以至熱解若熱已解臭汗大漏或小水不利而如灼渾濁惡臭者宜選此湯及大力甘草飲洋葵清燥湯分消飲瘡輩祛瘀清血其熱欲解而遍體發赤疹癢痒難忍或炊熱不得眠者亦宜此湯輩兼取遍桃膏見熾盛熱當夜服之

解毒湯同癩毒熱欲解而遍身發赤疹用大力甘草飲輩不驗速夜肢體倦惰翁々發熱癢痒不可忍或熱已解

而頭痛如割肘脚疼痛或腑臟為毒所侵其機虧損者宜此湯發汗利尿至諸症退更作水銀劑與之

生銻石末二十錢

粘真鬚

槲寄生各八錢

薩撒弗刺斯四錢

右四味以水一升二合煮取三合六勺去滓朝夕服一盃

加味葵力湯同主治同前

牛旁根十二錢

洋葵根八錢

赤汞一茶

紫堇舍利別十六錢

右四味以水先煎二根取四合八勺下餘藥和勻日服盡。

羊兔紫堇湯同 主治同前

粘魚鬚錢十六 蜀羊泉錢三 紫堇舍利別錢十六

右三味以水先煮二味取三合六勺和紫堇舍利別服一盃日三四用陰陽散見聖京健三味瓦刺微阿刺散見亦得。

蜀羊泉湯布 治癩毒骨塊腫頑癬伊屈薦尤効

蜀羊泉錢三

右一味以水三合二勺煮取二合六勺和乳汁服六勺日三次。

六物解毒湯伊 治癩毒并一切惡液諸病。

朴窠福烏 粘魚鬚 蜀羊泉

甘草各十錢 黃檀八錢 薩撒弗刺斯六錢

右六味以水一升九合先煮上三味減半乃下餘藥煮片子時去滓服一合許日三四服已溫覆助藥力發汗微毒用水銀劑者皆宜此此湯送下之。

異汞丸越 治癩毒發於皮膚而生瘡瘍者良効

白散

微毒諸症

三十一

水銀六錢

金硫黃

朴蜜福烏葛膠

蜂蜜各四錢

右四味先取銀蜜研至不見星下餘藥和勻更調牙皂

樹膠水作二百四十九丸每服二丸至四丸朝夕以六物

解毒湯上見送下

至寶丸伊治皮膚諸病因於癩毒者

水銀十二錢

朴蜜福烏葛膠

石鹼各一錢

金硫黃一錢

舍利別宜適

右五味先取上三味入乳鉢研磨至不見星下餘藥和

勻每一錢作十五丸每服二三四丸朝夕與之

漢涅滿消毒散伊治

一切癩毒得効尤捷症雖沉痾不數

週而痊非他水銀諸劑之所及必莫有瞑眩流涎病毒

內攻或加惡症之憂能輕瀉而竭患源

漢涅滿尼規吉屋矢需列十六

沙糖二錢

右二味研勻分作十二貼朝夕服一貼不許食用鹽味

漢涅滿尼規吉屋矢需列製法水銀三十二錢消石精

四十八錢蒸餾水十六錢右三物先取精與水相靜定

一時乃於冷處指々下水銀溶化至水銀盡放去少頃

則結白芒別取蒸餾水洗淨其芒置紙上令乾投之其

五十倍蒸餾水化勻鎮定一二時用磁筴攪搜更取礪

砂加石灰精徐々滴下候其末分界悉為黑塗脚傾去

西國醫方選

微毒諸症

上澄取末蒸餾水洗淨至膏之无味為度紙上放乾玻璃瓶納貯于冷處否則變灰色而服者流涎矣。○硝砂加石灰精

五物解毒湯 同治癰毒諸症與水銀劑併服。又治感冒四

肢疼痛並良。

土茯苓 錢八

粘魚鬚 錢十六

朴蜜福烏葛

甘草 錢各四

薩撒弗刺斯 錢三

右五味以水一升九合先淹四味六時煮之減三分之

二乃下薩撒弗刺斯一二沸去滓溫服。

福烏葛連蘭乞布 治癰毒諸症水銀不應者殊為要藥天

稟虛寒者宜必用之妙。

朴蜜福烏葛 錢十六

右一味以水六合煮取四合八勺日服盡一方加水銀

銛石各一錢名複方福烏葛連蘭乞。

二物福烏葛連蘭乞白 主治同前

朴蜜福烏葛 去白皮九 錢十六

乾葡萄 四十八錢

有甘草九十六錢

右二味以水二升八合強先漬福烏葛一日餘同葡萄

入罐內上文火煮至九合強取滓更加福烏葛四十八

錢乾葡萄九十六錢以水三升六合煮取一升三合初

煎二煎相併日用一劑

粘魚鬚煎 布治癰毒此為排逐污穢稀薄稠粘之良方血

實熱質者殊宜此湯 布治一切癰毒強健心胃虛弱者

殊效 氏蒲

粘魚鬚 二十錢

右一味以水六合煮取四合八勺日服盡 布 ○以水一

升二合煮之減半更內甘草少許 勅氏作甘草六錢 畧煎三四

分之晝夜服其一兼用水銀劑益妙 氏蒲

仙遺糧煎 白治癰毒諸症勞瘵肝臟閉塞脚氣及一切潰

瘍並良

土茯苓 二十錢

右一味以水二升八合六勺淹一伏時乃入罐內煮減

半

大力遺糧煎 係治癰毒

土茯苓 各十錢

右二味剉以水一升三合許煮減半去滓溫服 是聖

四物魚鬚湯 蒲主治同前與水銀劑相併服 是聖

發越排毒湯 外治癰毒彌滿血中發揚梅瘡骨節疼痛等者

此湯發汗偉効

朴蜜福烏葛 三十錢 朴蜜福烏葛皮 四十錢

甘草 四錢

右三味水煎取八合去滓温服

加味粘魚鬚煎 同 主治同前

粘魚鬚 各二十錢 土茯苓 各二十錢 薩撒弗刺斯 十六錢

甘草 八錢

右四味水煎温服 一方无土茯苓 粘魚鬚煎 是上 亦可用欲取下

去薩撒加山慈姑牛皮消各八錢

牛魚葡萄湯 同 主治同前

粘魚鬚 牛旁根 乾葡萄 各二十錢

右三味水煎温服

三物遺糧湯 同 主治同前

土茯苓 欬冬根 牛旁根 各二十錢

右三味水煎温服

胡桃皮湯 治一切癩毒沉痼者奇驗

胡桃實青皮 八錢

右以温湯二合四勺淹三時畧煮日盡一劑 會缺取胡

煎膏水
解代之

福烏萬加銻石飲 布○里秘 治癩毒用水銀劑後久服此

能解餘毒

粘魚鬚 赤檀 白檀 各二十錢 瑞香皮

甘草 各四錢 羅梅福烏萬 會缺代 朴蜜福烏萬

薩撒弗刺斯 各八錢 銻石 十六錢

右九味以水二升四合淹十又二時煮減半瀝去滓服三合六勺漸增至一劑

粘魚鬚瑞香湯 同治癩毒瘡于皮膚及筋骨累歲不愈

粘魚鬚 十六錢 瑞香皮 半錢

右二味以水七合二勺煮取六合和玄女水下八錢服四合八勺可一月良驗

瑞香湯 同治癩毒骨節疼痛石灰腫結核腫關節諸腫奇效

瑞香根皮 生新者 四錢 甘草 八錢

右二味以水一升六合八勺先煮根皮至一升許下甘草一沸瀝去滓服一合二勺日四次

四物瑞香湯 治癩毒諸瘡骨節疼痛腐骨疽及一切皮

西醫方選 卷九
膚元名惡瘡偉驗

羊蹄根

牛旁根 各八錢

瑞香皮

甘草 各四錢

右四味以水七合二勺煮取三合六勺瀝去滓溫服

瑞香臭鬚湯 蒲治一切癰毒強健心胃其人虛寒者殊効

瑞香皮 生新者 八錢

粘臭鬚 六十四錢

甘草 少許

右三味水煎溫服

加味瑞香臭鬚湯 同治癰毒者陰症

粘魚鬚 十六錢

甘草

瑞香根 各四錢

扑蜜福烏薦

薩撒弗刺斯 各八錢

生銛石 十二錢

右六味以水二升五合六勺淹一伏時乃煮取二升三

合去滓溫服日五六合

玄珠膏 布治癰毒諸瘍結核石灰腫

拔細里膏 十二錢

赤汞 二錢

右二物煉和聽用

護規吉丸 同治癰毒諸症並有捷功

水銀 一錢

牙皂樹膠 末三錢

大黃舍利別 適宜

右三物入乳鉢研磨至水銀不見星乃調蒸餾四錢每

一錢為二十九衣甘草末伊氏用麻朝夕服十九水銀

不九星加蓄薇露九十六錢每十日用滌腸丸下防吐

涎

玄女水布治癩毒骨痛及皮膚諸瘡護謨規吉不効者奇

驗弱人小兒珠宜此方。

升汞分一龍腦薄荷露九十六錢白罌粟舍利別錢八

右三物攪勻朝夕服一匙

玄珠丸同主治同前

升汞十五白蒸餾心二錢

右二物以蒸餾水一錢同升汞上微火水氣盡為度調

蒸餾心作百二十九朝夕服二丸用奇驗青龍酒亦妙

青龍酒同主治同前

升汞分一麥酒九十六錢

右二味攪勻澆過朝夕服二匙隨手服洋葵煎大麥煎

以防腸胃發熱急

玄水膏子布治小兒癩毒尤良

水銀錢一牙皂封膠末錢一大黃舍利別適

右三物內乳鉢研磨至水銀不見星更和大黃舍利別

十二錢朝夕服一小匙漸次增之。

滌腸丸 布治癩毒用麩護規吉丸者每十日與此取下

律比丸料分五 紫茉莉脂 甘汞三度服升者各四黍

右三物調和每一錢為二十九與之上剛六七行則無

眩暈之患予屢歷試之。

單方青龍丸 伊治癩毒諸症此方勝於麩護規吉丸。

水銀錢八 的列並底那三錢勿擲茶 甘汞五錢

右三味研和每一錢作三十九與一九至十九日二次

隨症增損。

藤盧白汞丸 外治楊梅瘡骨節疼痛。

盧會 藤黃 白汞各一錢

右三味作七丸取汗者去盧會藤黃加朴密福烏葛

膠一銖作六丸。

白汞膏 布敷。癩毒潰瘍下疳不可敷侵蝕藥者傳此膏偉

効又療疥癬惡瘡。

白汞錢 家猪脂八錢

右二味研和敷患處。

升汞膏 伊治癩瘰骨腫及一切癩瘡渾佳。

家猪脂錢八 升汞錢未一

右二物研和作膏取少許擦患處。

青龍水錢未一 治癰毒諸症宜以此洗患處。

升汞錢未一

右一味以水四合八勺研磨聽用一方加硃砂一錢

防腐水布治癰毒潰瘍積年不愈及癰瘡腐骨疽又治咽

喉蝕爛諸藥普試而雖頗得効不能全愈以筆塗患上

日二次良妙。

浸乳香湯錢十六

升汞錢未一

右二物調勻蘸綿撒絲敷患處。

規吉斯麗護布癰毒潰瘍痛不可忍者宜傳此又治口內

咽喉腐爛眼目焮痛角膜星翳淋疾尿道潰瘍共多和

水或乳汁作洗劑。

水銀錢一 牙皂封膠末錢三 白罌粟舍利別錢四

右三物內乳鉢研磨至水銀不見星為度。

銀朱真伊 治口鼻潰瘍咽喉腐爛及其它毒結於一處者

一切皆驗。

朱砂

右一味撒炭火上熏患處。

癰毒用水銀劑而齒牙搖動腫痛或頸項腫口流涎唾者宜先下之次作洋藥甘草湯見喉頰含漱之藥

玫瑰酒 治癰毒服水銀劑而口中腐爛甚者

玫瑰蜜錢八 燒酒錢十六

右二物攪勻含漱日數次。

土木香煎 治癰毒久用水銀劑却加惡症發類癰骨痛四肢顫掉筋惕肉跳拘攣掣抽等者宜此方。

土木香

右一味水煎溫服或作散或煎膏亦佳或和之朴窩福烏葛飲與

之能驅水銀之滯滯於內者發越體表。

解水銀毒試驗方 治過用水銀劑而發諸患者其發惡屬潰瘍者殊有神驗。

石灰九十大錢 硫黃百四十錢

右二味調勻內掛鍋以泥固封上火煨之四五刻乃下火候冷取出作細末收貯玻璃瓶內服五黍至十黍日三四次隨飲酸味之水漿則患之解也更速。

山羊乳蒲○諸厄 治癰毒誤治而癩癩者宜多服之神妙。

西醫方選 卷九 癰毒諸症

癰疽疔瘡

蝟蛄消石散 癰初起。焮赤腫脹。而築動。憎寒發熱者。
 宜先刺絡而灸服此散。或消石栗接飲。加味大麥湯。洋
 葵清燥湯。輩用緩和藥。蒸患上。大便秘閉者。加味酸角
 湯。或加味梅肉湯。悉見焮盛熱下之。
 散消油 蒲癰焮赤腫脹者。宜塗此消之。

阿利襪油

百九十

醋六十四

右二物攪勻。塗患處。以蠟膏覆之。

洋葵甘草湯 癰焮腫。服蝟蛄消石散。輩而無効。應疼痛

不已。時々寒戰者。將作膿也。宜服此湯。若洋葵甘草飲。

二方用緩和藥蒸之促其膿

成膿泥 蒲癰腫大。築動疼痛。並劇寒熱不止者。將膿也。當
 促之。其此泥。

百合三十

乾無花果

生葱

各八錢

拔細栗膏十六

瓦爾拔奴護

四錢

亞麻仁粉

右六味。以水先煮上二味。搗爛。下餘藥和勻。乘溫慰腫

上。乳餅泥。見症熨之。亦得。

加味芸香飲 癰未成膿。而諸症減。身體虛憊。脈小無倫。

或結代四肢微冷唇青眼陷粘汗流瀉者血液敗腐之所為最險也當急過敗腐宜此方及壯元飲芸香開壅飲龍腦蝟蝟飲四味龍腦飲幾那芸香飲悉見熾盛熱麥麩泥蒲癰腫其色紫黑而發水泡者變為疔也當多服幾那劑以此方

麥麩

右一物以灰汁如泥乘溫敷患上敷的里亞加亦宜拔毒膏外動凡治疥瘡莫良於敷鉛石乳過其彌延且服汗藥而結痂已欲脫者傳此膏

石灰 羌菁 綠青 丹礬各八錢

人言錢二 蜂蜜 石鹼各適宜

右七味煉和為膏

蘭皮幾那湯泥治瘰癧飲海水若鹽水令大便日二行且作湯浴之服以此方

幾那錢八 印的蘭皮錢一 甘草錢四 乾葡萄握一

右四味以水六合四勺煮上二味至三合二勺下餘藥一沸下火瀝去滓服三四匙日三次取幾那散見腐五分赤葡萄酒送下日四次亦得若潰破者按細粟膏加

赤汞六七分之一貼之。

母鹼油蜜泥外吳治疥瘡宜以此泥釀其膿

蒸餅母錢十六 石鹼錢二 蜂蜜錢四

加密列油錢二

右四味煉和如泥貼患上。

清疔水同疔瘡膿成以此水洗之

的列並底那錢二 卵黃錢八 蜂蜜錢十六 燒酒錢四

水四錢

右先取上二味研勻乃和餘藥。

疥癬 癩疾 頭瘡 白禿瘡。

洋葵清燥湯 蕪 疥瘡 脉數 身熱 燥渴 皮膚急脹 焮腫者宜

選用此湯 或瓦刺蕪酸模湯 接骨清涼飲 加味梅肉湯

加味酸角湯 清血熱 若大便不快 通者 每三四日用霸

三飲三物飲 輩悉是熾盛熱 下之。

解凝散 薊膏 同 疥瘡 用前方治之 熱已退而痂不脫 毒漸

蠶蝕 癢痒焮熱不可堪者 與此方北聖或三味質汗散

見丹 兼服 加味大力湯 或大力甘草飲 見瘡以石鹼湯

即取石鹼少許 用溫湯洋盡者 洗之大効。

蕃薇蜜陀水 同 疥瘡間有滲出惡屬液侵四邊以致焮腫
更生細疱潰瘍者防之宜用此水 見眼 或蜜陀水 見丹

或温乳汁數洗之

乳清飲 同 疥瘡惡處無焮熱寒熱不往來者宜先用霸王

飲三物飲二物大黃散 三方見 輦下之次選此飲 見聖

或加味大力湯分消飲大力甘草飲 三方 與之隔六七

日復下之以至全愈

甘汞茉莉散 著 治疥瘡宜先用此方驅逐瘰液而與健胃

甘汞丸 見瘰

紫茉莉末 錄一 甘汞 五

右二味細末調砂糖清水各少許平且淹茶送下俟取

點兩粒兒蠟膏 見眼 十六錢和甘汞二錢擦之

薩撒弗刺斯湯 同 治疥瘡用之代常飲

薩撒弗刺斯

右一味水煎温服

解熱散 同 疥瘡有熱者臨卧與此 見感 發汗

加味酒石散微疥瘡先與和血湯 見聖 或遺粮湯 見齒 四

五日而用此方 見瘰 或寒水湯 見瘰 下之良驗

銛消散同 疥瘡纏延引日不愈。癢痒難忍。夜卧不寧。或惡寒發熱。而羸瘦衰憊者。宜此方。

生銛石 消石各二錢

右二味極末。分作八貼。朝夕用。和血湯送下。一貼。十又五日。

加味石亭散壽治疥瘡

硫黃五分 吳汞十黍 質汗沒扭護五分 砂糖五分

汗銛石二分

右五味細末。每八月。平旦服。

吳汞膏同 療疥瘡

黑汞八錢 家猪脂二十四錢

右二物煉和。初日擦手。臂。次日脚足。三日腹背。四日復擦手。臂。輪次施之。必效。但勿一時施遍身。恐有內攻之患。

酸硫膏花治疥瘡

吳石鹼九錢 硫黃六錢 硫黃三十錢

右二味研勻。吳前塗患上。

石亭砂膏後治疥瘡

硫黃華

十六錢

硝砂

應氏代食 益〇二錢

家猪脂

若半酪三十二錢

右三物調和為膏。先與下藥六七日。而後平且空心取

此膏八分一塗之。四日盡劑。更作一劑。隔日塗之。蒲曰

三日。取肉豆蔻大。臨卧擦四肢。燥其臭者。加枸櫞精一銖至五分。為可。若瘡反出。復下之

而施此。

石亭酒石散

蒲

治疥瘡血實者。當先刺下之。下之宜此方。

硫黃華

浮酒石

右二味細末。調的里亞加。若乳汁少許。朝夕服之。且塗

石亭硝砂膏

見上

解凝醬子。蕪疥癬累月。因循不痊者。宜與此方。瘡或酒石

碎箭醬

見丹毒

逐瘰丸。同疥瘡。頑癬。及一切皮膚諸瘡。百治不應者。與此

丸。及加味石酸鈎吻丸。並見聖輩尤効。

硫黃膏

同伊治疥瘡。服藥無速効者。擦此膏。或規吉撒兒弗

見微但有熱者。勿施之。

硫黃

八錢

家猪脂

二十四錢

右二物調和為膏。

伊氏曰。或加老利兒。搽患處。浴硫黃

甘草四錢

右四味水煎取八合去滓服。

排毒散同 主治同前

蝮蛇石 鹿角燒灰 野艾蒿鹽

硫黃華各一錢

右四味細末分作十二服。

洗藥同 治乾癬

車前汁各四十錢 菘葵汁各四十錢 玫瑰醋十六錢

右三物調勻洗患處。

一方 治乾癬

菩提樹皮末二握 薔薇露六十錢

右二物攪和或慰之或洗之

治癬水外治乾癬

醋二十錢 鉛丹十六錢 水二十錢 食鹽三錢

右四物先取丹浸醋一日漉過下水鹽和勻洗之用石

灰水溫熨之亦良。

芥葉鈎吻膏子伊治一切皮膚病積年不差者

芥葉鈎吻葉二錢

右一味細末。調煉蜜十六錢。時服一卵起。

治癩疾方外

酸模根

骨碎補

羊蹄根

各十錢

甘松二錢

旗那十六錢

朴蜜福烏三錢

硫黃十六錢

朴蜜福烏十二錢

牛皮消八錢

右九味水煎。取三合。每服二三勺至四勺。

確消散同治癩疾

消石八錢

確砂華一錢

右二味細末。每服一錢。日三服。

一方同治頭瘡

百合

洋葵根各十錢

右二味以灰汁燒酒各適宜煮取九十六錢。慰之。

治白禿瘡方同

胡桃油十六錢

硫黃

朱砂各四錢

右三物攪勻塗之。

代指鼻淵。

代指初發服藥。鼻癰腫同外。宜減煖腫軟皮膚。而令潰膿。但其初用微溫湯漬指。或敷消散藥。間亦有愈。若嬰潰。

膿取蜀葵與乳汁同煮。搗爛如泥。攤綿布縛指。或作乳
鉄泥症北敷之。焮腫已減。欲膿潰者。加之葱白。已潰者。傳
蓄薇膏症北。若生息肉。搽枯礬微。若鉛丹。

幾那散同代指骨腐壞者。宜每一時與此散北神一錢併
幾那湯雙硫黃精少許。乘溫蒸患處。

治鼻淵方同

薰陸 礬石 鉛丹 甘汞

柘榴皮各二錢

右五物以葡萄酒煮取四十八錢洗鼻中

真藥同治鼻淵

乳香 安息香 黃檀各一錢 朱砂四錢

右四味細末。真鼻中慎勿吸入其氣於喉中。

凍瘡雞眼疣瘡

療凍瘡微取鮮凝排毒湯見犬微溫浸患上日三次。或石

灰水和人尿浸之。而患處軟。乃覺痛痒者。取樟腦精水。

等分洗之。若焮腫劇寒熱來往者。放血。施導方。與消石

散見感須慎斷酒禁肉腐爛者貼椰子膏見方

三物石酸丸同見四五歲至十歲動輒生疣此方主之見聖

京健

硝砂膏同治疔百不失一。

硝砂 瓦爾拔奴護

右二味為硬膏貼疔上必脫取食鹽以釀醋烱消傳之

亦効亦効

乳房皸裂乳核乳癰。

奇功水外治治乳房皸裂者。

牙皂樹膠 達刺仇萬膠各一錢

右二物以茶苾露或車前子煎汁二十四錢烱盡濾去滓更和

鉛粉洗患處用燒酒洗之亦妙。

五物規言丸蒲乳核初起宜與此丸或刺絡放血取規言

撒爾弗少許擦患上以溫布覆之。

水銀 蜂蜜各四錢 石酸二錢 大黃十二錢

甘草末若蒸餅心適宜

右五物舍利別丸每二三日服粘魚鬚煎二合二勺殊

効。

芥葉鈎吻散伊百治乳核類乳癰發於癰瘰毒則無効

芥葉鈎吻葉生鮮者

右一味細末先服一二黍漸增至五分或湯泡與之且慰患上。

治瘰癧生鼻若顴者宜與外汞酒凡眼目。

樟姜酒外口中生瘡痛微色紫臭臭氣衝鼻毒甚者腐壞

骨也宜此方。

樟腦二錢 乾姜末一錢

右二味調燒酒四十錢含漱日數次。

金瘡

金瘡出血而大脉不傷者宜敷蠟布見火傷以阿利機油和

綿敷之亦可微

金瘡大而焮熱腫痛寒熱來往謔言錯語者乳餅泥見和

阿利機油少許或酪不敷之日二三次若皮膚極柔不

宜乳油者單取蒸餅以水煉和敷之蒲

榭寄生散同金創大脉截斷者宜取以散敷傷處用布壓

定且繃縛之傷在手足者併以薦兩溼結薦緊縛其上

處若焮腫者用清涼藥若下導方微

治金瘡出血蒲取丹礬以水煇盡蘸綿布敷傷處燒酒亦

好。

黃蠟膏

泥蒲

金創深者，創唇不合，內釀膿而腐爛，治之宜內

柔兌頭，以此膏或油布蓋覆，且綳縛瘡口，令之合着。

黃蠟

九十六錢

松脂

羊腎脂

各四十錢

右三物上，文火烱化為膏，最宜小創，大者欬瘡而收

口之時，用此則佳。

黃拔細栗膏

泥蒲

金瘡腫消而後敷此。

阿利襪油

百二十錢

黃蠟

黃松脂

番瀝青

各九十錢

的列並底那

二十錢

右先取四物，上火候烱化，乃下的列並底那，乘煖布過

供用。若生息肉，加枯礬赤汞少許。

打撲

醋水

微

治打撲杖瘡。

蒸餅心

三十錢 接骨木花

加密列花

小連翹花

各一握

右四味，將醋水各半，煮如泥，敷患上，換日二，敷釀醋布。

或醋湯布

即取醋和於傷處

更換一時一次，亦宜。

方只元小連翹花

治打撲杖瘡輕者，醋和燒酒少許，溫釀布敷患處。

大麥酒石飲微打撲杖瘡死血融化欲浸諸脉者宜服

此見腐敗

加味接骨飲微治打撲杖瘡此飲凡感胃四合加消石五分

服之

樟腦精霍治打撲損傷捫挫脫臼骨傷聖京健痛能散凝

血

樟腦十六錢

右一味同燒酒四合八勺研勻取少許擦之二加迷迭

香油一錢石鹼四十八錢每氏用樟腦洗方見聖京健

消甘乳清飲微治打撲損傷重者宜服此疏腸

甘露蜜四錢消石一錢甘乳清百六錢

右以甘乳清烱盡餘藥服之加味酸消飲酒石散二方

並佳甘乳清和蜂蜜與之亦效

湯火傷

湯潑火傷輕而皮膚不起疱且不破者宜冷傷處面火用

塩搽擦之或以綿布蘸燒酒敷之蒲

火傷輕只在皮膚者取葱同塩搗和傳之妙或取薔薇露

雞子白赤石脂末三物搜和供用

療火傷輕而不水疱但疼痛者取綿布蘸冷水敷上每二刻換之至痛止微

甘燥膏蒲治湯燙火傷起疱或爛破者

阿利襪油百二十錢 黃蠟 爐甘石各四十錢

右先取油蠟上文火溶化下火候其稍冷將凝下爐甘石不住手攪之至冷定更調阿利襪油等分攤柔布敷患上。

雞卵膏微主治同前

雞卵一個 阿利襪油八錢蒲用蒿

右二物攪勻傳傷處若肉爛已經二三日者和之黃拔

細栗膏見金

密陀醋泥主治同前

金蜜陀僧

右一味浸醋出藥味蘸綿布敷患處更換日二三次。

鉛卵膏微治火傷起疱者

鉛粉二錢研和醋四錢阿利襪油三匙者八錢

卵黃半個若一個隨其大小

右攪勻塗綿布敷傷處更換日二次若皮肉潰爛者塗

綿撒絲傳之以蠟布或膏布次覆之

蠟卵膏微治前症最良效

蠟八錢 阿利襪油八十錢

右二味烱化每二十六錢和卵黃一個冷定收貯供用。

蠟布法同治前症一

白蠟三十錢 油冬日八錢 夏日二錢

右二味上火烱盡流布乾貯。

膏布法同主治同前

薔薇油九十錢 鉛丹四十錢 醋三十錢

黃蠟十二錢 樟腦二錢

右五物先取上三物上火煉過至如膏乃下蠟烱化調樟腦注下紙筒為挺收貯及作膏布更和油少許溶化蘸綿布與前用之。

火傷皮膚焮赤或起疱者宜取明眼水見眼敷傷上外布

湯潑火傷焮腫或起疱者先抓破之取點兩濕兒蠟膏先

目每八錢加甘汞赤汞各十黍敷之董

大麥消石湯微火傷重焮腫甚者先刺絡行導法而服此

湯見感或匾挑盧子乳見感

火傷甚重。或刺發。痲腫。而勢或欲成。敗疽者。當敷麥麩泥。

見瘡 或的里西加。與強心劑。或幾那劑。併放血。快利大。

便節食。與稀淡之飲料。若傷處已為紫黑。兆敗疽者。內

服幾那湯。是腐外取 樟腦精。是打 沒藥丁。調勻。溫傳傷

上。或用幾那煎。慰之。亦好。蒲

石灰油。外治 火傷肌膚結痂者。宜用此。脫其痂。

石灰二錢 阿利蔑油八錢

右二物調勻。敷患處。以石灰水洗之。亦可。

結麗土油。同。主治同前。

蔓菁油

結麗土

右照前用

竹木刺

療竹木刺在肉中。不出者。先以溫湯氣蒸之。次取乳。既泥

是 和油敷之。刺已出。則以綿布蘸湯。搭傷處。必免後害。

微

咬傷

消毒水。微 狗犬咬人。先用此水。或微 洗淨傷處。次用角筒子

貼。芫菁膏。或時燒鐵烙之。或傳齋藥。必令咬處勿愈。

西醫方選

卷九

咬傷

五十二

清水或醋 食鹽

右二物攪勻用若毒彌一身者刺絡與涼下藥或無意之中投之水裡令吃一大驚恐發怖水之症

蟹灰散 本治狗咬宜服此二週且浴海水

川蟹性燒存

右為末每服一二匙葡萄酒送下

療犬咬傷先刺絡放血一二三次若三即用食鹽漿即取食

六錢兩水微溫以洗淨傷處勃氏醋洗而敷板細栗膏八合消者

蒲加赤換日二次以成醱侯用規吉撒兒弗先微搽擦

四邊一次微

國蒲散 同解犬咬毒預防痙攣狂躁又其毒經日不解發

搗狂躁者並功

辰砂 朱砂各四分 麝香十六

右三味細末每三日盡一劑發搗狂躁者一時半盡一劑

每以燒酒若阿刺乞一盃送下卒云飲醋三合為妙

允物耳代之以水銀

四物奇功圓微主治同前功勝麝香劑

食而便谷利亞錢 龍腦 阿魏各十

阿芙蓉一

右四味細末。調接骨木子醬。以泡接骨木花湯。或泡菩提樹花湯。一頓吞下。更作日一二服。若欲日三四用之。去阿芙蓉。

三物奇効圓蒲治犬咬毒發搐者巨効。

食而便五 阿魏二 龍腦七

右三味。撒法即舍利別調。一頓服。

龍消食而便散同主治同前。

消石四 龍腦一 食而便五 舍利亞二

右三味細末。分十貼。每服一貼。

龍麝阿魏丸卒治犬咬毒發搐怖水昏冒等症者。

龍腦一 麝香十 阿魏二

右三味作丸。白湯下散服亦可。

治犬咬傷屢効方。遇犬咬。宜即刺絡。而與此預防諸惡症。

地錢洗乾者 胡椒二

右二味細末。分四貼。每且空心服一貼。溫乳汁一合。六勺送下。

解凝排毒湯微犬咬毒傳于內則發咽乾口渴湯液却不
 下深怖見水聞話水亦大怖動輒為是搨抽搗粘汗
 常出或吐黃穢物小便艱澀熱濁莖中覺痛若全降閉
 或嘶啞而作大聲或怖大靛或時狂躁口流白沫或啞
 久或欲咬人憤然有怒色等症倘面色時赤或肢體顫
 掉者殊危篤也其人壯強血實者宜先刺絡再三且浴
 溫湯或行湯脚一二三次施錦葵導二三次擦銀鱈膏於
 傷處及四邊更換二次且塗遍阿利襪油於全軀作國
 蒲散上無一時半以泡菩提對花湯或泡接骨木花湯

一二盃送下當夜輒與此飲一二盃

置根

加密列葉各一

石鹼

硃砂各一

右四味以溫湯一升泡出藥味溫服夜卧不寧者朝亦
 與之

獨聖散同前症口苦欲吐者宜與此散見神五合至八合

取吐

蒜錫芸香飲本治犬咬毒

芸香

八錢

大蒜

的里亞加

錫屑

各三十

右四物以麥酒四分之二煮取半去滓服之七日每服九匙小兒則斟酌與之

牡蠣散 同主治同前

牡蠣假化者 四錢

右一味細末日二服葡萄酒送下

神秘丸 伊 獠犬咬傷發狂怖水者宜與此丸且飲食和醋

進之

芫菁 一分 桂 二分 冰糖 七分

右三味細末玫瑰舍利別調為三十九丸穉兒至三歲與

一丸四五歲者二丸六歲以上四丸大人則六丸並每

一時用之併敷芫菁膏於傷處

白薇散 治獠犬咬怖水者

白薇根 一錢五分

右一味為末服之四十日

幾那散 同 獠犬咬發搐怖水等症全解而形神怯弱恐驚

不斷者與此散 見麻日三次

療蚊蛇咬先取火藥盛咬處發之或燒鐵烙之或放水蛭

吮血或啣却之或以刀開瘡口次以醋水若盪洗淨或煖

阿利襪油擦之或取宜母子瓢同食鹽搗爛温敷之以

接骨木皮若乘覆之醋若橙汁若水醋各半若大麥湯

加醋多飲以發汗若瘡口不膿者貼芫菁膏是熾感熱炊腫

者取的里亞加以泡接骨木花湯服之間用消石散是

冒外敷乳餅泥皆妙本蒲泥

蜘蛛咬取無花果乘乳液敷之即愈以乳汁洗之或的里

亞加調醋敷之亦妙同雜

蜂螫入頻々塗蜂蜜或取人溺新擦之又取洋芹和水搗

爛擦之又取野苧或冷土或的里亞加或醋敷之本雜

療蚊蚋類咬傷松脂或枸櫞汁或阿利襪油或的里亞加

或醋傳之立治若炊腫甚熱大發者傷神經也宜刺絡

飲里木那埵或乳清良效本雜

療水蛭喂入用塩水洗之以油摩之又悞吞水蛭即服阿

利襪油教之同

療諸蟲咬傷泡接骨木花湯加的里亞加少許服之微

乳蜜蒸餅泥微諸蟲咬入大率傷處紅赤腫痛恰如丹毒

疥瘡之狀若咬面部則兩眼腫閉甚者發壯熱頭疼心

痛不寐精神昏冒頭目眩暈拘急搐搦等症也治法急

作此泥敷之行湯脚服泡接骨木花加消石湯方取接骨木花

沸湯泡過即投消石煒盡

蒸餛飩 乳汁 蜜

右三物加的里亞加少許為泥敷咬處又遭咬即滴油擦之能防炊腫止疼痛

中毒毒之害人雖其質萬不同統之不出于二所謂麻毒與屬毒而已矣治法於是乎分焉

者細味本篇詳釋其治擴而充之則極急救率下手之際無孟浪失措之弊矣

甘和乳微蒲卒雜 砒石 礞石 升汞 猛水 綠礬油 鉛石 赤銅 綠青

芫菁 烏頭 附子 甘遂 大戟 巴豆 續隨子 芥葉 鈎吻 底垓

羅仙石蒜同種 竜骨 木脂 毛萇 大蓼 藜蘆 質汗沒扭謨地老

太利斯 灰汁 鹽類 服之中其毒則發心腹灼熱 脹痛 煩

渴 惡心 嘔逆 吐出穢物 煩躁 悶亂 舌腫 口乾 咽燥 如焚

面頰盈脹 眼目突出 吊竄 瞪視 大便鴨澹 小便如水 頭

顫肢掉 錯言妄語 唇吻紫黑 周身發斑 或吐血 下血 頭

痛眩運 冷汗淋漓 或舌強梗 麻腫 毫不能言 精神昏聩

人事不省等症也 法當急吐之宜此乳

胡桃油或阿利襪油會缺便用麻油 乳汁

右二味調勻服或取微溫湯若大麥濃煎汁和阿利襪

油。匾挑油。牛酪輩。多飲。至吐盡毒。不知和海葱醋三四

匙。或與獨聖散。見神經熱五六分。尚猶不應。迺與白帟散。見

熱五六黍。若重鉛礬五六分。必吐。若毒傳于腸。肚痛不

可忍。者。錦葵煎。洋葵煎。大麥湯。阿利襪油。芒消煎。選而

服之。俛取乳汁。射注肛中。或大麥煎和乳汁。施之。亦宜。

中并棄鈎吻。石蒜。烏頭。藜蘆。竜骨。木脂。甘遂。大戟。毛茛

大蓼。反汁。塩等者。酸乳清。回生水。里木。那垣。輩。或硫黃

精消石。精數滴。點水時。而兼用間服之。獲効尤饒。餘毒混血中。氣力衰憊。心思

不聊者。乳汁和雞卵。服之。三四月所。乃全瘳。

酒石水。中玉水。消石精。綠礬精。鉛石乳。丹礬等毒者。口

舌咽喉俱灼爛。氣管牽縮。危如填塞也。急與此方吐之。

酒石鹽 四錢或酒石油八錢 清水 九十大錢

右二味攪勻。服。隨取阿利襪油。微溫之。多飲。至吐。

清凉乳 同前症。吐後。腹中灼熱。仍不解者。急服此。

乳汁 三百八十錢 酒石油 四錢

右二味攪勻。服。又取刺蒿。亞斯。八錢。以一玻璃瓶水。消

與之。兼行大麥濃煎汁。若洋葵煎。多飲。牛乳汁。

鉛毒。或石灰毒。中人。則温々惡心。屢吐。綠水。胃腸重。瀉。拘

急。其痛殊劇。而牽腰背。胸肋。及四肢。四肢疲倦。或拘攣。

大便秘澀其被毒深者津唾必青而甘體頓虛慙全不
 進食手足勾屈而麻或削瘦身或熱頭痛眩暈譫妄搗
 搗蕎然倒仆始覺中毒即用甘和乳見湧之不知更取
 白帛散八黍至十黍以冷水相間服得吐乃止兼與酸
 乳清里木那埵見腐敗熱回生水見卒輩卒

治鉛粉毒桃仁同大麥煎研調服雜

鉛毒浸潤中人者先與乳水各半次用酸乳清里木那埵

見腐敗熱回生水見卒輩卒

治服羌菁中毒發熱掣抽方瀉莖中切痛龍腦二黍消石

五分調勻日二三服兼用藥麥湯多々益佳

凡中阿芙蓉非阿私舍亞護黃若曼陀羅莖等毒案是輩皆保毒

毒河豚亦一種毒故中其毒者當從此治法者其初惡心嘔逆少頃乃止舌

燥咽乾或大渴或手足麻痺若拘急遍身瘙癢或發熱

胃熱腹微痛心下苦悶如酩酊時煩躁不甚而大衰憊

沉默如寐肢體軟緩心思錯越驚駭恐怖鄭聲妄語眼

目朦朧或全不視物面色如死或額紅脉遲口吃舌重

唇厚終冷汗出氣息冷而死是其大槩也怪在異候往

往不可具載焉救之當急與甘和乳見或白帛散見腐敗熱

或獨聖散是神經熱或曰作塩湯和沙糖少許多飲之任服此散或海葱蜜五六

匙或亞鉛礬五分至一錢取吐酸乳清加屋失蔑兒間

眼之吐後温湯和沙糖或大麥煎和醋汁若橙多飲之且

行導方以淨刷腸中

酒石飲同前症毒已經時而傳于腸者先取石鹼八錢以

酸乳清二合四勺煮之射注肚中大便仍不快通者即

作此漿與之

浮酒石八錢

右一物以水若酸乳清一合餘煇盡更下屋失蔑兒和勺一

頓服兼飲回生水是卒酸乳清里木那埵是畜敗熱大麥煎

和醋汁若橙用之亦得

食諸菌中毒呼吸欲窒心下痞脹吐瀉呃逆小便灼熱大

便努責胃膈切痛或失氣昏冒拘攣抽掣者宜速取海

葱蜜一二匙以許多微温湯送下或服獨聖散是神二

三十黍湧之其人吐下自甚者屋失蔑兒以微温湯消

服之頻射甘和乳是於於肚門下利甚疲極者取炒麥

或蒸餅泡湯與之且浴微温湯行下導法腸中已滌淨

乃與回生水是卒或里木那埵是腐敗熱或大麥煎加醋若

浮酒石服之。卒

治菌毒取雞屎調蜂蜜以葡萄酒送下。乃解食胡蒜亦良。

雜

食蛤蠅類中毒者。頭面膨脹。身體瘙痒難忍。皮膚起水泡。發熱嘔吐。治法與菌毒全。或取乳汁微溫多飲亦佳。卒

中蟹鰕類毒者。面發赤斑。或赤疹。狀如丹毒。尋麻疹。從解菌毒法治之。又取枸橀汁。淹茶調下。亦佳。同

療食病畜肉及敗肉。敗卵等中毒。白帛散見腐敗熱一二黍。或亞鉛礬五分。以微溫湯。或大麥湯送下。吐之。吐利自劇。

者。熨治菌毒法左右之。同

誤吞蜘蛛或云。喫溫酒一盃。蠅蚋。若毛髮等吐瀉極劇者。

海葱蜜一二匙。微溫湯送下。同

過食一切未熟果實。及大蒜。白芥子。山蒼菜。葱類。胃中炊

熱。腹痛吐瀉者。多飲微溫湯。或大麥煎。其當吐之者。宜

獨聖散下之。宜麻。促涅失亞散。頓服八錢。大黃酒石各半散。

用四十黍。至一錢。同

過用番椒。胡椒。丁子。薑鹽等中之者。乳汁一味。和清水。多

飲之。且用積筒射之。穀道。同

飲瀦水汚流中。毒者醋。硫黃精。綠礬精。薑。薇醋。及一切酸液解之。同

飲酒過多。神昏情痴。眩暈。惡心。嘔逆。喜眠。或昏睡。全然不知人者。先裸形。仰臥。頭高於脚。次多與大麥湯。促吐。但惡心不吐者。亞鉛礬二分。大麥湯送下。湧之。兼用洋葵煎。每一時與宜腸去海芋加消石散。宜腸散見中風以醋。嗜鼻。其人血實。身熱。悶絕。或氣息欲塞者。即刺尺澤。同麥乳各半飲。同中燒酒。口如吐。焰者。此湯多飲治之。

大麥煎汁

乳汁等分

右二物調勻。微溫服。或取蜷蛄散。凡心腹痛一茶匙。乳汁送下。一睡而後。頭痛惡心。心中擾悶。精神恍惚。四肢疼痛者。與鹽汁薄荷飲。凡或取葡萄酒加砂糖。與一小盃。併多服。大麥煎。或莢麥煎。每一時服。宜腸散。見中風茶茗哥喜過度。心腹痞脹。膨滿。大汗出。或膚乾燥。四肢顫掉。頭目眩暈。心神昏蒙。血液湧沸者。當急以鷲翎掃咽中。引上吐。每一刻與宜腸散半匙。方見中必勿令身熱同飲水過多。停瀦。胃中發心忤。驚駭。頭目暈眩。腹肚滿痛等症者。當速用鷲翎探吐。若不知者。凝水石四錢。消溫湯

一小盃服之。候取凝水石八錢。或食鹽四錢。以水消盡。

射法。穀道。又微溫。阿利襪油。搽肚上。小便立通。而解。

服。峻吐下藥後。腹大痛者。服大麥濃煎汁。鹿角煎。乳水湯。

疔瘡。牙皂樹膠煎。洋菜煎。輩。且選此輩。和阿利襪油。向

肛門射之。

鹽汁薄荷飲。同。服。峻吐下藥。吐利劇。而不速止。頭暈目眩。

四肢厥冷。虛脫甚者。宜此飲。

龍腦薄荷露四錢 拘椽汁八錢 野艾蒿鹽一錢

右三味攪勻。時與一茶鐘。間服。的里亞加一茶匙。又溫

葡萄酒和砂糖與之。或飲燒酒一食匙亦可。

中氣花電死

療中酒氣。炭火氣。燭烟。竝去。窖廢井。氣悶絕。先移其人於

外。仰卧。切不可內室中。宜以回生水見本灌口。或溫里

木那埕見商灌之。若不應。取揮發鹽。醋。鼻刺。絡湯。脚且

摩擦。身體稍醒。復可為飲者。消石末。以回生水。或里木

那埕。焯消灌之。且行導方伍的列並底那。雞卵者為佳。痛。

中酒氣。悶胃者。急解。患人衣。偃卧。凉地。以冷水。濕身。或以

醋。嚆鼻本

療中釀氣悶者移患人於地上摩按雙脚且漬之温湯

刺絡放血肺及肛門吹煙即淡巴菘下稱入之以礶砂

精若醋啗鼻温葡萄酒若燒酒敷鳩尾裸形以土埋之尺

出其頭依此救之則無不甦矣同

中炭火氣昏仆者先移之室外擦遍雙脚且漬温湯礶砂

精和醋灌口且與吐藥口內肛中竝吹氣入之鳩尾敷

温葡萄酒或温燒酒屢搥肢體乃取屋失蔑兒二匙泡

杜衡湯少許送下鵝翎蘸油掃咽取吐同

鰾石導同前症其人自吐若刺絡後面腫脹者不可與吐

藥也宜作此導用石鹼水解漏酒石五六黍者射注肛門取里木那埵

或醋和消石豸服之以醋啗鼻角乾筒子於足心脾腸

而與温葡萄酒二三匙或接骨木花飲又鹿角精和水

與之亦得同

療中硫黃氣昏仆急扶在涼地寬衣取礶砂精啗鼻更和

水灌口中以管吹氣於肺中以小鞴吹穀道取鵝翎蘸

油探咽引上吐礶砂精或温葡萄酒或温燒酒蘸布敷

鳩尾屢動肢體角乾筒子於臍上足心選吐藥以加密

列飲是熾熱送下或作鰾石導上見射注肛門同

預防中硫黃氣取礬砂精蘸布掩口同

阿芙蓉撒法即葭宥非阿斯舍亞謨葡萄酒燒酒麝香龍

腦龍涎香淡芭菖私多樓護百合花蠶豆花及一切

芳花等中其氣則頭痛眩暈精神恍惚失氣悶冒甚則

殺入救之急扶在涼處裸體灑水用醋啗鼻抑腹打背

刺頸靜脈放血蘸醋布啣口鴛翅蘸油探吐溫葡萄酒

若溫燒酒蘸綿布敷胃膈或隨症用吐下導捷功同

為雷所震死者宜隨治中硫黃氣法及解麻毒法救之同

縊死壓死

救縊死法卒急令人抱將繩解開出諸室外引新氣摩按

腹肚勾頭打背雙脚且擦且漬溫湯乃刺頸靜脈出血

或過半時放血尺澤敷頸以緩和藥肛門以管吹煙入

之嚏藥啗鼻中筒子角足心臍上如活海葱蜜五六匙

調水灌口而引上吐鹽水九十六錢加萬利昆膏凡今

八錢蓄薇蜜一匙調勻射注肛中以下導之

乳母睡中展轉誤壓其兒氣脈並絕目睜鼻涕填一身滄

冷者須先裸體就溫褥右貼席而卧便把麻布擦摩之

俱不可令肌膚剝傷隨取溫灰層々鋪綿布上救見於

上左貼席而卧。將其綿布與灰蓋之。自踵至頸。更加被褥。屢接鼻下。以磁埴劉設。見今一玻璃瓶入鼻口。以煙相間吹之。雖體溫脈出。居三刻而後。抱取衣之。自眠着而復矣。
蒲○爺寅氏拯。縊死。以此法。案凡為。墻壁等所壓死者。亦以此法治之。

溺死

凡遇溺水者。急將濕衣解去。卧溫蓐中。或以火氣煖之。或曝之日下。取薰香布以香薰薰。微於布者。用力摩周身。或煖燒酒加食鹽少許。搽之。或以手摩遍肢體。以揮發蒸敷胸膈。便取溫壺。挾其腋。胸令一人自頂及踵。遍按換之。又令

一人以雙手按揉胸上。屢動之。或以左手搭右季肋下。以右手搭左季肋下。左右相摟。或以一手按下其腹。又以一手按下其胸。忽放其手。如此數回。氣息仍不出者。用管吹氣入鼻孔。或向肺吹煙入之。生氣未盡者。血乃得流行也。微

又方。以溺人安着肛門。以管子吹氣。若烟內之刺。頸靜脈放血。硝砂精或薄荷末。或芸香末。啗鼻得少甦醒。乃取海葱蜜五六匙。溫湯調勻。稍々灌之。半時間。與盡焉。或灌鹽湯。或取加密列飲。和蜂蜜用之。

又方。急解溺人衣。溫褥安着。溫被蓋之。按換身體。屢搖動之。取砂或鹽烘之。乘熱盛布囊加足心。

一男子溺水。余拯之。先刺顛額靜脈。及外頸絡。放血。以揮發精及油。摩口吻及頸背。肛門吹煙肉之。雙脚用力擦之。經二時。而無影响。於是法。穴氣管。把小管吹之。接氣須臾。血始運于面。脉稍動。乃摩擦其面。手不姑住。脉漸得強數。而搽碗砂精少許於口鼻。眼閉。乃與溫補藥。二日而復故。蒲

凡救溺死。其法不一。時利時害。或令石若鏡熱加之體上。

或放血。或穴氣管。或以水濕身。或入煙於肛中。或吹氣於口鼻。如其向肺吹氣。特為多害。但搖擻溺人。以龍腦消燒酒。搽肢體。以毛布及手擦摩之。以灰將渾身埋之。多曾見救焉。瓦

喝死

人涉暑路。或就作業。或醉裡眠中。暑氣襲之。頭顛則發。眼目焮腫。喉頭痛。謔言妄語。昏冒卒中。等。侵其四肢。則疼痛發熱。關節強梗。腰膝刺痛也。宜即放血。或行蟻針於頭及顛額。漬脚於溫湯。或浴溫湯。沒至心下。且施乳清。

導服之以里木那垓或回生水把蓄薇露少許和冷水
蘸之綿布貼頭而後與酸角湯見腐敗二十四錢日五六
次卒

凍死

凍倒人切不可早移暖室或溫葦是絕活路也當須出諸
雪裡渾身以寒水澀之唯慎避口鼻多有佳兆仍織毫
不應者必不可救矣若身微得軟者即為佳兆宜以冰
貼周于體少之冰旋々解者益佳乃用葡萄酒或燒酒
少許和水摩擦肢體而扶入室內取綿布蘸酒及水更

摩擦之取藁蓋之至稍醒甦按換肢體以乾衣被體以
冰浸雙脚酒或醋和水澆面及手吹氣及煙入肺與肛
中以至呼吸通又龍腦醋若龍腦精少許和微溫湯射
肛門鷲翅蘸油掃咽中取酒塗心上嗅嚏藥入口鼻石
腦油或樟腦精擦四肢漸次移暖處就溫衣葦而用強
壯藥蘸綿布於燒酒敷股間卒

凡冬月凍倒者四肢之血凝返以衝逆於腦也手足強梗
者漬之冷水或以雪擦之稍甦身得溫者移之室內取
茶或接骨木花飲和蜜與二三盃若無蘓復之候者投

之冰水中蒲

西醫方選卷九終

西醫方選卷十目錄

婦人科

經閉

琥珀消蝨散一

芸香雙花飲二

三物礪砂散四

下瘀血散全

通經散全

雙花飲五

活血丸五

鍼砂散全

鍼砂丹全

鍼砂酒六

鍊砂圓全

竜膽散全

檜葉酒全

五物薄荷散全

薄荷桂皮散七

沒藥芸香飲全

撒法郎飲全

良姜酒全

瓦爾拔奴護酒八 安沒丸全 六物通經散全

鐵粉沒藥散九 一方全

崩漏帶下。子宮焮腫。

調血湯十 調血散全 蒼草煎丸全

石沒食子散全 理血玫瑰飲十一 梅覆二液漿十二

理血清涼飲全 大黃茉莉散十三 四物瓦爾拔奴護丸十四

酒石醬全 幾那醬全 理血茶瑰飲全

二皮幾硫散十五 龍膽醬全 理血乳石丸全

理血食子散全 幾那灰水筒全 赫篤里阿里酒十六

宮痛

橙荷葛 護漿十六 六物芸香漿全 一物鎮痛散全

阿魏酒全 阿魏丸十九 安沒尼亞加丸全

椰子樟腦膏廿 鎮痛芸香油全 鎮痛壯神飲全

鎮痛麝香漿全 鎮痛瀉利丸全 鎮痛麝香丸廿一

產前

蝟蛄葛 散廿二 鎮瘕導廿三 定吐酒石飲廿五

產育

產後

質驗理血飲 二十七

橙皮加密列酒 全

雙瓜散 八

阿魏酒 全

冠刺獲乙飲 九

分消錠 全

六墨栗薩漿 全

錦加密列湯 一

芥葉鉤吻丸 全

芥葉鉤吻煎 全

乳餅泥 全

油蠟膏 二

薔薇膏 全

龍鹿幾那膏 三

幾那百藥煎膏 全

小兒科

初生并衆疾

蜜漿 世五

失格列乙利別 全

物甘露漿 全

二物甘露膏 世六

治兒不方 全

乳母散 全

硼砂蜜 世七

白黃散 全

酒水蜜 全

奇効醬 全

佛甲蜜 全

作列布麻仁飲 世八

麻仁煎膏 全

宣轉鎮瘕飲 全

石鹼蛭蝟膏 世九

消毒散 全

紫堇酒石醬 全

紫堇酒石飲 四十

宣腸飲 全

大黃蝟蝟膏 全

蝟蝟通挑醬 全

固腸飲 四十

鎮瘕三物醬 全

鎮瘕四物醬 全

化酸散 四十

天女散 全

石鹼飲 全

石鹼苗香露飲 全

石鹼導 四十

麻偃濕失虫散 全

黃薄 麻偃濕失虫散

和中酒 全

銻石膏 四十

制酸宜腸膏 全

末兒叔尼斯散 四十

撒塔密時散 全

簡易神効散 全

茉莉區挑膏 全

乳油導 四十

加味麻垂散 全

甘露漿 四十

定痢飲 全

石長飲 全

六物苗香漿 四十

百効散 四十

蘓黃飲 全

糖椽水 全

橙黃酒石漿 全

四物將軍酒 五十

酒乳飲 全

雙膠石脂飲 全

鏡桂肉豆蔻酒 全

仁膠乳 五十

大黃湯 全

發越醬 全

清肺飲 五十

救急飲 五十

芥葵泥 全

阿魏飲 全

四物解凝飲 五十

甘酒飲 全

珀腦布 五十

綠礬散 全

刺薦亞斯水 全

石鹼羊膽丸 全

拂郎察醫治諸方 五十

幾那濕麻垂飲 全

諸証全退。或只通濁水而致輕快也。爾後經水當來而
不來。諸症復發。二三日後迺解。而經水不快通者。元氣
不振之候也。若脈急數。熱壯。頭痛。面色赤者。宜作此散。
用消石粟接飲。洋葵清燥湯。接骨清涼飲。四方洋葵
甘草湯。洋葵甘草飲。二方兼行湯脚施緩和導殊良。是瘡輩一二盃送下之日二三次

琥珀修製者 消石各七 珊瑚石一
右三味細末。日三服用。鎮痼壯神飲亦得。

琥珀修製者 消石各七 珊瑚石一
右三味細末。日三服用。鎮痼壯神飲亦得。

芸香雙花飲 同治前症。宜與前方兼用之。

芸香 加蜜列花 洋葵花各一
右三物。湯泡溫服。經來諸症退。乃停後服。

加味大麥湯 同經閉。其人素強壯。因常慣勞作。肢體剛硬。
或脈緊數。或面貌豐紅。或胸中急煩。或頭暈目眩者。此
脈管強硬。其血有餘而稠厚之所致也。宜多服此湯。或
洋葵清燥湯。二方見熾盛熱 瓦刺蘘酸模湯。洋葵甘草飲。二方見瘡
輩兼用。蠅蝨消石散。或浮蓉酒石散。二方見熾盛熱 日二三次
施緩下導亦可。

加味梅肉湯 同治前症久服此湯或加味酸角湯 三物洋

葵湯 三方見熾盛熱毒 消石接骨圓 見丹毒 輩瀉血之有餘諸症乃

隨愈或取浮鑿酒石散 見熾盛熱毒 先經水之期五六月用洋

葵甘草飲 見瘡 朝夕送下一貼約四五月或先其期五六

日用霸王飲若三物飲 三方見熾盛熱毒 亦妙

四物紫葢飲 同經閉其人面色蒼白或綠黃身體疲憊精

力虛脫浮腫或於面部或於四肢或及一身呼吸促迫

心悸怔忡稍動則苦憊不可堪者以血液稠粘而鬱蓄

之所致也宜選此飲或解凝散鬱膏 共見聖 破結石酸

丸解凝膏子解凝石酸丸 三方見瘡 酒石碎菴膏 見失苟輩

長將之稀渾稠血瀉泄粘液以至浮腫消

壯元鎮症丸 同治前症久用四物紫葢飲解凝散鬱膏輩

而仍身體疲倦精力虛脫不復絕有動作則頭痛心悸

氣急急迫者宜選此方 見失苟及幾鐵酒幾鍊膏 二方

異金幾那圓 見黃輩 健補之

瑤消蠅蛄散 同婦人虛弱方經至之期而患腹中急痛心

悸筋惕惡心等者宜選用此方 上及鎮症共香飲鎮症

三物飲 見瘡 共香雙花飲 上鎮痛壯神飲 見聖 輩速効經

行而後用二物大黃散見熾取微利久服壯元鎮瘳丸

見失芍成全績治此症用蕭氏見陪苦成全績阿魏丸亦妙

加味大力湯自婦人腹中有塊由是經水艱通腹中疔痛

或阻格經水全不下或統下苦楚不可忍者並選此湯

及分消飲三物閉塞飲四物閉塞飲破結石鹼丸解凝

石鹼丸六方解凝散聖方取洋葵加樟腦膏見黃朝夕塗塊上聖方

神僊健胃酒泥治婦人身體肥滿經水俄閉者當順利大

便宜此方見咳

酒石散蒸治婦人年紀四十許經水俄閉者每旦空心服

大効方凡瘧疾

鉤吻煎丸蘇婦人經閉不可知其所以者宜選此方及壯

元鎮瘳丸石鹼鉤吻丸解凝石鹼丸與之數週兼用加

味大力湯或分消飲並見

三物礪砂飲同經水雖至期而來其血稠厚僅通一二滴

而色異或粘液雜出而發胸中煩悶心悸怔忡頭疼渾

身如蠶脉無倫而弱面色蒼白身體冷清等症者此方

主之施湯肺法行導方亦各有効驗慎勿投熱藥

礪砂 勿搗茶產 一銖半

洋葵舍利別 十二錢

芸香露 六十錢 四錢

右三味攪勻。一時服二匙。

下瘀血散 同治前症。

麻僂濕失血 二銖 礪砂 勿搗茶產 五銖

消石半

右三味作末服。

通經散 同治前症。

麻僂濕失血 二銖 沒藥 五銖 蘆會 二銖

右三味作末服。排膿散 瘡 瑋消刺蝟散 見 亦可服。

雙花飲 同 婦人篤疾下利失血後。或放血過度而經水不

來者。血虛體弱故也。法當滋養之。不驗者。迺服此方。

亞雨尼加花 一錢 加密列花 一握

右二味湯泡。取一合二勺。去滓溫服。

活血丸 同治前症。

鏡粉 三錢 幾那煎膏 二錢 沒藥

安淺尼亞加膠 各一錢

右四味作末調的列並底那一錢作二十九丸。一時半服。

三九墨栗薩飲 瘡 送下服。幾錢酒或幾錢膏 並見 水腫亦得。

婦人纖維縱弱。身體疲倦。精神不了。心下痞悶。飲食不進。

月水不調者。宜與鍛錢水微

鍼砂散微治前症。又治諸病發於經閉者。殊效。

錢粉 砂糖各八錢 小茴香末四錢

右三味合勻。分作二十四貼。食前服一貼。日三次。見代氏

小茴香以桂則能消錢之味。

鍼砂丹同治前症。又治經閉殊效。

錢砂十六錢 芸香 小茴香各四錢

右三味。蜜煉和。每服一錢。日三服。

鍼砂酒蒲治經閉。發於經脈。縱弱。諸藥莫及也。前

錢粉十六錢

右一味。浸葡萄酒。或好麥酒二百五十六錢。放置煖處。

十有二時。濾去滓。每服一盃。日三四服。一方加桂。利各二錢。

錢砂圓同主治同前

錢粉五錢

右一味極末。和蜂蜜或的里亞加少許。日二三服。幾那

酒。幾那散。幾那飲。亦可選用。各良。

龍膽散伊治經閉。因虛弱者。神效能健補胃弱。

龍膽錢三 綠礬錢一 沒藥錢二 撒法郎錢二

二色檜油十五

右五味為散分作二十貼服一貼日四五次。

檜葉酒伊治 粘液過夥神經觸覺不敏而致經閉者。

二色檜葉 野艾蒿各三十 良姜錢三

老里兒錢一 泥菖根錢一

右五味為粗末取半泡小茴香酒百九十二錢服二三

匙日數度。

五物薄荷散伊治 經閉因寒粘液及氣血虛衰者。

龍腦薄荷葉錢三 山奈 馬孤兒皮

攝繇施那錢一 鍊粉錢二

右五味為末分作二十四貼每一時以葡萄酒送下一

貼久之經水猶不來者加二色檜油一貼一滴。

薄荷桂皮散同主治 同前。又發汗利尿治陰萎。

竜腦薄荷油二十 桂錢一 白糖錢十六

右三味為末時服一卵匙。

沒藥芸香飲同 閉塞通月經。

沒藥 芸香各八 酒石液錢四

右三味同搗爛。以清水適宜浸三時。煮之二刻。取三合。每服一二匙。日二三服。用加密列飲。見熾亦得。

撒法即飲。伊治精神虛耗。經水不來者。

撒法即十黍至一銖

右一味湯泡。數日連進。加阿芙蓉。葛私多。僕護亦宜。

良姜酒 同 健胃通經。

龍膽 獨活 良姜 各四 珊篤里 薄荷

老里兒 杜杏實 胡荽子 各六

右八味用燒酒煎。取八合。調蜜漿服。半匙。日三。

瓦爾拔奴謨酒 別治經閉。

瓦爾拔奴謨 錢八

右一味以燒酒二合。烱盡之。日服一二卯匙。

安沒丸 伊治經閉。

安沒 尼亞加膠 沒藥 各二 蘆會 沙哥多刺 產一銖

二色檜油 十二滴

右四味調勻。每一錢為二十九丸。衣銀箔。服五丸。日四度。

六物通經散 裴治婦人血液稠厚。經水不來。

錢粉 修製者 沒藥 琥珀 各二

葛私多僕護各五 二色檜油半 丁子油五滴

右末朝夕服一戒指

經水因七情撓亂。若冒寒卒雨閉止。而一身灼熱大渴。疲倦頭痛胸煩。呼吸不利者。當放血行導法。施湯脚與清涼緩和之劑。以鎮定血熱。其經雖累閉然脉不強。熱不發者。宜選用洋葵清燥湯。洋葵甘草湯。洋葵甘草飲。瘡行湯脚及導法。若不應者。延用三物礪砂飲。下瘀血散。瘡上輩獲

龍腦安神散同 婦人素虛弱。動輒發瘵。急一旦為七情所

傷。或聞惡臭。即為經閉者。宜用此方。是熾良効。

鐵粉沒藥散裴室女。面目四肢浮腫。肢體倦重。腰脚拘瘳。

呼吸短促。心悸頭痛。喜睡善飢。或經水不順者。為白瘧。一名室女病也。此散或折衝丸。鐵粉沒藥酒。輩治之。脾癰。

錢粉修製者 沒藥錢二 琥珀錢一 葛私多僕護

磬酒石各五 金箔六枚

右六味細末。朝夕服一戒指

一方同 主治同前

錢粉三十 沒藥四 蘇茉莉根八

生酒石錢二

右四味以列應酒四斤淹之朝夕服二盃。

甘萎含護比東湯同婦人無病而經閉二三月俄然乃崩

血者勿遽止之宜使其慎避風寒勿勞心意若延纏彌

日發肢體虛羸脚膝顛掉心下苦悶拘攣等症者乃用

此飲或挑花飲或加味挑花飲不知與理血飲三物礬

石飲五方共止洩飲見泄輩至血止又崩漏久不止或

發精力虛脫脚膝軟弱心悸等症而無多血之候者亦

宜此飲輩。

崩漏帶下子宮焮腫。

調血湯蒲婦人年及四五十患崩漏者多有之大率身體

衰弱面色蒼脫尅化飲食之機關衰廢而全不進食足

跗浮腫動輒變成水腫或勞瘵也宜此湯。

蓴麻根若合護比

右一味水煎溫服。

調血散泥崩漏用調血湯不効者與此

礬石錢二 百葉仙錢一

右二味為末分作八九貼每服一貼日三服如有不能

之者。乃取玫瑰丁二匙。和阿芙蓉液十滴。與之日三四次。共不得効者。取幾那散五分。和綠礬漿十滴。以赤葡萄酒一盃。送下。日四次。

著草煎丸 伊治婦人躰質虛弱。神經寧急。經水不調。或崩血者。又治一切諸血症。神驗。

著草煎膏 十六錢 阿魏 一錢 叔瀉 錢丹 四銖。今日方見。

鹿角鹽 二銖

右四物調勻。每二錢作二十九。石柏為衣。一時服一丸。血石沒食子散 同治婦人帶下崩漏劇甚者。

血石 沒食子各八錢

右二味末。一時取一戒指名量和舍利別服之。

理血玫瑰飲 同治崩血

玫瑰花 六錢

右一味。沸湯泡過。取九十六錢。和乾玫瑰舍利別八錢。刺別兒水二錢。服一茶鐘。

霸王飲 蕪崩漏其面色潤澤。脉弦實。精力不衰者。為血實也。宜先放血。而用此方。或三物飲。緩下之。次選浮礬酒

石散。消石粟接飲。 四方見。熾盛熱。霸王散。見酒石散。見聖輩與

之必日常間服甘葵含護比東飲見吐二盃大佳

大黃痢散同治崩漏其人虛弱血脉弛弱面色蒼白精

力虛脫少勞心稍動作則心悸煩悶氣急息迫者宜與

此散見心并服桃花飲加味桃花飲甘葵含護比東飲

三方見吐血輩至血止而後長將固形丸見或幾鐵酒幾鐵

漿水腫強固血脉防其復發

解凝醬子同崩漏因循久不差其血濃異或雜粘液者與

此方見或酒石碎蒼醬見丹排膿飲見輩并服大黃痢

散見心不重劑而俾驗若服之久而其血雖變鮮紅

稀淡崩仍不止者與桃花飲或加味桃花飲共見良效

大蓼花散同帶下崩漏其物稠粘苛厲經久不止漸侵蝕

陰門而焮熱癢痒不可忍者宜選用此散或三味瓦刺

微阿刺散二方大蓼飲見聖鈎吻煎丸見輩

雙將丸同崩漏彌久不瘥子宮或其周圍發疔瘡若瘰狀

潰瘍者宜選此丸見鈎吻煎丸見解凝石酸丸見輩

久服之若陰唇剝脫或潰爛者以鈎吻甘草飲見洗之

旃覆二液漿伊治婦人子宮有瘰狀瘡而崩漏帶下腹痛

不可忍

旗那錢三 覆盆子舍利別

忽弗滿止痛液二

西電法護阿芙蓉液四

右四物以清水先浸旗那取四十八錢下餘藥和勻每時服一二匙

理血飲同 治崩漏兼宮癰脈數而緊顛掉疲倦手足冷清

血走注子宮者殊効方見

理血清涼飲吳 人患痘瘡丹疹溫疫驚口瘡霍亂虛勞失

苟兒陪苦潮熱等崩血者險也宜此方防之

珊瑚

血石

桃花石

礬石

各半

大黃阿芙蓉純粹者

四索

下發水血實者

右五味細末分為六貼每夕服一貼

大黃蝮蛇散 婦人有月經前後二三日下白物者此身

躰虛弱或粘液質之候也當搖動身躰慎節飲食但漏

下劇甚身躰疲勞者先與此方次用健補之劑

解凝散鬱醬蕨 帶下其下多而久不止則致肢躰羸弱神

經寧急呼吸促迫心悸健忘四肢顛掉等患大抵懼以

病者面色蒼白肢躰痠乎腫脹呼吸不利總有動作則

心悸食多不進而溫々惡心嗜喜異味或嘔吐心下苦

悶脉細數而无倫小便多而淡白間或雜粘液常嗜睡
久寢四肢倦惰此乃發於粘液若酸液彌倫身體也宜
當其初起選用此方見聖及破結石酸丸解凝石酸丸
解凝醬子三方酒石碎菴醬見丹治之並有良効

幾鐵酒同前症用解凝散醬醬輩而諸症頗退但皮肉筋
脉弛緩面色蒼白脉弱小帶下仍不減者宜此方或幾
鐵醬捷補之又治帶下發於筋脉繼弱者先用加味大
黃散見泄疏滌腸中而與此見水
大黃茉莉散勃治帶下發於血實者

大黃錄二

紫茉莉錄一

龍腦薄荷油滴二

右三味為散服用落葉松寄生取微利亦佳

四物瓦爾拔奴護丸別治帶下

瓦爾拔奴護

大黃煎膏

酒石鹽

石鹼勿搗茶產
各二錢

右四物攪勻每一錢為二十九以冷水吞下十四丸日
四次

酒石醬同治前症

酒石油 洋藥舍利別各四

西電法謨阿芙蓉液錢一

右三物攪勻取二卵匙錢一 燉冷水一盃服日二三。

幾那醬同治帶下因衰弱者

幾那煎膏錢六 支瑪兒拔錢一 礬石各末錢一

鏡粉錢二 橙皮舍利別錢十六

右五味調勻一時服二卵匙

理血茱瑰飲治帶下發於纖維縱寬者

朱苾露百九十錢 薔薇露三十錢 綠礬精適宜

右三味畧煎更內玫瑰花一握砂糖適宜浸之半時濾

去滓服

二皮幾硫散吳治前症

幾那五錢 印的蘭皮錢一 秦皮各一錢 硫黃精二滴

右四味為散以水少許送下一戒指日三四次。

龍膽醬別治帶下因神經易觸覺發者

赤龍膽煎膏錢二 幾那煎膏錢六 龍腦薄荷露錢八

橙皮漿錢十六 忽弗滿止痛液錢二

右五物攪勻每服二卵匙錢一 燉刺酒服日四次。

理血乳石丸治帶下崩漏

乳香

桃花石

鏡粉

修製者各半

鉛糖

龍腦各一

結麗土

刺蝟石

各五

消石錠

七

右八味的列並底那九平旦服一銖

理血食子散同 主治同前

沒食子半

乳香

玫瑰花

結麗土

楠葉各一

桃花石一銖

鉛糖八

鏡丹一

右八味作末每服一錢

幾那灰水筒別 治帶下因衰弱者

幾那十六錢

石灰水四十錢

右二味以水先煎幾那取一合六勺和石灰水射入子宮內日四次

排膿飲蘇 帶下其人面色鮮潤肚腹或鈍痛或覺痞重或

緊急或絞痛漏下久々不止或漏下不多者子宮有一

種粘液以致之也此方見治之其病漸瘥所漏粘液雖

較稀薄尚遷延彌日不止者每四五日間服加味大黃

散見一劑收全効

蘇列布湯同 前症劇盛或久之菱身軀枯瘦乾咳胸煩精

力虛脫言語艱澁等症者宜作此湯耳與之或以大

麥湯。粳米煎。滋養之。兼與排膿飲。見日數次。病仍延纏。

不已者。停排膿飲。選用香膏丸。見水腫乳沒丸。見喘息防腐。

幾那飲。幾那薄荷膏。三物幾那飲。三方見

洋葵清燥湯。同帶下。忽然閉止。隨發呼吸促迫。咳嗽終之。

吐痰者。用此湯。或四物導痰飲。三方見徐促其痰。若咳。

嗽延綿不止者。與香膏丸。見水腫乳沒丸。見喘輩。

幾那散。蒲帶下。夾面色青白。背脊疼痛。脚足浮腫。不思食。

等症者。纖維緩弱。之所致也。此方。見腐敗治之。

赫萬里阿里酒。注主治同前。

綠礬油。上好者燒酒。再餾者

右二味。以綠礬油滴入燒酒。每服二三十滴。幾那湯。先

熱一盃。熨服。日二三次。

大蓼飲。蕪帶下。所漏臭熱。而苛厲。漸侵蝕陰門。或悶痒不。

可堪。或兼疣瘡。若腐爛者。宜選此飲。見聖及鈎吻煎丸。

見大蓼花散。三味。瓦刺微阿刺散。鈎吻甘草飲。並見

之。且以乳水湯。見或密陀水。見丹類洗患處。

洋葵甘草飲。同婦人冒寒。後脉強。舌燥口渴。肢體脫力。腹。

肚堅硬。而燔熱。觸之即痛。越二三日。諸症大減。從陰門。

漏稠穢而速變膿狀者。此乃子宮炊腫使然也。熱勢甚者宜先放血以緩和藥。慰小腹施下導方。而與飲或洋葵甘草湯。二方洋葵清燥湯。見熾感熱至痛熱解。若服此飲輩其膿變稀水而漏下不止者。與排膿飲。見瘕數日而用香膏丸。乳沒丸。見喘卵黃撒兩非亞飲。瘕輩至全痊。

三物飲。同。婦人年四五十。經行絕後。血液沸騰。而大熱如焚。胸中懊懷。腰腹牽引。切痛。心悸。惡心。頭痛。眩暈者。宜先放血。而選以飲。或加味酸角湯。霸王飲。長將取下。其

症不劇。無血實之候者。宜作蜷蛄消石散。浮磬酒石散。以上方見熾盛熱雙白散。見心痛輩。以洋葵甘草湯。洋葵甘草飲。二方送下。日一二。久服之。若病者虛弱。神經易觸。覺或易發痙瘕者。選壯元鎮瘕丸。見失苟兩陪苦破結石酸丸。見瘕橙葉散。見瘕琥珀蜷蛄散。香草雙花飲。見上方之類用之

宮癩。即子宮

橙荷葛私多儂護漿。伊治宮癩拘癩搗掣。

龍腦薄荷露。四十錢橙皮舍利別。八錢

葛私多儂護。二錢代琥珀丁或何魏丁亦佳。

西電法護阿芙蓉液四十滴 忽弗滿止痛液一錢

右五物攪勻每二刻與一匙。

六物芸香漿同治前症。

芸香露若薄荷露若茜香露四十八錢 龍腦薄荷舍利別六錢

琥珀丁 阿魏丁各二錢 勿弗滿止痛液一錢

西電法護阿芙蓉液三十滴

右六物攪勻每二刻服一匙。

一物鎮痛散同治癩症。舞蹈病。宮癩。拘挛。腹痛。異障。眼粘。液。卒中。麻痺不遂。頭痛眩暈等。並良。

加乃哥草根

右一味末每服二分五厘至一錢。日數次。用五物壯元

飲見亦得。

鐵粉沒藥散裴治宮癩脾癩宜朝夕用二三戒指四神散。

折衝丸。鍊粉沒藥酒四方見脾癩 亦得。

阿魏酒同治宮癩及一切痙攣搐掣。

阿魏十六錢

右一味入罐內。注硝砂加燒酒精九十六錢固封放置六日。濾過每服十滴至十六滴。與葡萄酒或蜜漿服之。

或和阿芙蓉液等分服十滴至十五滴。阿魏角油丸。麝香丸。鉛華散。五物壯元散。是方亦得。

阿魏丸。蒲治宮癩。大便秘結者良效。

阿魏錢四 沒藥錢二 石鹼錢二 蘆會錢一

右四味。舍利別丸。每服二三丸。日二服。

安沒尼亞加丸。伊治婦人小腹癢塞。發宮癩。兼經閉。

安沒尼亞加膠 石鹼勿搗 茶產

蒲公英煎膏各二錢

右三味調勻。每一錢二十九。甘草末為衣。每服五丸。日

四服

椰子樟腦膏。治宮癩。

椰子膏錢四 樟腦錢二

右二物調勻。貼臍。

鎮癩芸香油。同治宮癩。

芸香油錢十二 的列並底那精錢二 樟腦錢一

右三物攪勻。塗肚腹。

鎮癩壯神飲。同治宮癩。發而口噤者。

石薄荷露錢十二 琥珀油滴四 葛和步儂錢半

阿芙蓉液一泰

右四物攪勻。每服灌一匙。

橙葉散治宮癩五物瓦爾拔尼丸。破結石酸丸。四物安

神丸。橙花飲並凡解凝石酸丸凡虛並可選用各良。

鎮癩麝香漿同治宮癩發搐甚者奇效。

麝香 血竭各一 橙花露二十四錢至三十二錢

右三物攪勻服。

鎮癩瀉利丸同治宮癩宜常服之。

紫茉莉銖 甘汞五 葛松多儂一銖

右三物作丸。每服三丸。

鎮癩麝香丸同治宮癩強腦壯神。

麝香分一 安息香分五 白糖銖一

右三物調桂露為丸。時々與之。

產前

浮藥酒石散兼妊婦惡阻心下痞悶。不思食。或向所常嗜

食却惡心嘔吐。或喜食所常惡。頭暈目眩。耳鳴齒痛。胸

煩。心悸。其脉弦實者為血實也。宜放血而選此散及刺

蛄消石散二方是 瑤消螭蛄散見經之類。而與之。或行

下導方良驗雖妊婦虛弱居常交通經水而血實者當放之血勿恐其虛弱否則有先期而今晚者

刺蛄葛私多兒散獲妊娠其人血實形體虛弱神經易觸覺時發寧急者動輒有發前症或劇於前症也治之當定其寧急慎勿刺絡此方主之

葛私多僕護二 刺蛄石

麻屈涅失亞尼葛利各山

右三味細末每服一小匙日二三服如蜜列飲一盃送下或用瑞消刺蛄散見經加蜜列飲見熾輩或取葛私

多僕護丁若鹿角精二三滴調清水一匙服之甚佳

鎮瘕三物飲同前症眩暈太劇而本件諸方不奏效者與

此方是或鎮瘕芸香飲見黃

妊婦胃痛嘔吐頭疼齒痛者宜刺絡微○蘇氏曰妊婦之

確乎可刺之症則勿放血犯之大害雖其症大抵如可刺多不故血而產安舉健兒矣

百葛霸王飲同妊婦胃中有瘀滯嘔吐不已身軀疲勞或

不可用下藥盡下之者宜此方見熾取輕吐吐後必用

鎮痛芙蓉飲見麻或鎮瘕三物飲見熾鎮其餘擾

酒石散獲妊婦嘔吐由膽汁或污穢滯胃者宜用此方見聖

健或浮礬酒石散見熾盛熱日二三次。

三物開壅飲同 妊婦嘔吐由稠飲在胃發者宜此方治之。

蜷蛄散同 妊婦吐酸者宜此散見心痛 或五物薄荷飲見喘急

治之

鎮痼芙蓉飲同 妊婦嘔吐發於神經大擾動或拘挛者宜

此飲見麻疹 及鎮痼芸香飲見黃疸 鎮痼三物飲見痘輩

鎮痼導同治前症

泡加密列花湯

阿利襪油等

右二物攪勻射入肚門且以葛私多儂護丁蘸綿敷臍

上

妊婦惡心嘔吐者宜刺下之飲冷水亦得胃弱者加燒酒

少許其人虛弱而眩暈者取桂露一匙和糖橙少許與

之蒲

妊婦嘈雜者令嚼綠茶為妙同

妊娠中間有月水仍來而不致患者其人無他病而精力

旺盛則不別議處置但注意其血多少為要如血多而

有沸勢者宜刺絡而選涼藥之穩當與之菴

妊婦罹泄瀉赤痢者其害非同小可宜速用緩下劑蕩滌

腸中之穢積，而後從所罹治法，早止之。黃

消石粟接飲，義 妊娠初月無故崩血者，大危，宜冷其人，靜

寧，即刺尺澤，放血，次選此飲，及接骨清涼飲，匾挑膏。三

見熾 鎮痲壯神飲，見聖 類與之。盛熱

匾挑膏 同 妊婦因七情內傷，或勞動跌撲等血崩者，此脈

絡破綻，胞衣分離，欲小產也，宜令其靜處，其未陣疼子

臟不開者，料其強弱而刺絡，大便秘閉者，與此方。見熾

或鎮痲壯神飲，見聖 加味麗春飲，見聖 芍藥輩，施下導方。

別取水醋各半，醃綿布敷腹上，血崩即止，不墮胎，是屢

効之良法。

加味桃花飲，同 前症雖血崩不止，而無真陣疼者，當選此

方，或三物礬石飲，理血飲，共見 止洩飲，見泄 與之，至血

止，乃復用匾挑膏，見熾 輩。盛熱

洋萎甘草飲，同 妊婦血崩而無幾，更腰膠牽引，或自腰控

前陰而病痛，乃雖用匾挑膏輩治之，其症不減，子臟漸

開，陣疼頻來者，將墮胎之候也，於是莫思止血，或施安

胎之術，只須與此方，見 或洋萎甘草湯行下導方，以易

分娩。

鎮瘧芸香飲 同 妊婦素虛弱，易感驚動，輒拘攣者，所謂統

動心意，聞惡臭即為血崩也。宜此飲。見黃或芸香定喘

飲。見喘鎮瘧三物飲。見等若服之，拘攣雖定，血崩未止

者，宜選用桃花飲。加味桃花飲，礬石飲。並見止洩飲。見

瀉輩

防腐幾那飲 同 前症血崩已止者，宜長將此方，或三物幾

那飲。吳見腐強健之

幾鐵酒 同 妊婦素虛弱，向患宮癩者，四五月至八九月，動

輒為小產，其子宮縱弱者，殊易然也。故妊娠及二三月，

則選用此方。或幾錢醬。並見雙花飲。見幾那散。見神三

物幾那飲，以防之。或且夕服橙花飲，二盃亦宜。

定吐酒石飲 蒲 妊婦血實有小產之候者，須先刺絡，發血

及四十乃用大麥湯加枸櫞汁與之，或每二三時取消

石散一錢，以大麥湯服之。其人下利者，與鹿角及煎嘔

吐者，與此飲。

酒石鹽錢 薄荷露 十六 舍利別錢 八

右三味以沸湯八勺，先烱消酒石鹽，候冷更下綠礬精，

不沸騰為度，乃下餘藥和勻，時與二匙。

孕婦子宮神經觸覺素甚者。動輒致小產也。須受胎三月
而後。幾那加阿芙蓉日與少許預防之。

產育

洋葵甘草湯。藉妊婦久不覺胎動。或胎動漸止。或其動俄
止。肚覺重。或覺如物轉。精力虛脫。面色萎悴。或振慄。或
乳房慢緩。或乳水自滴者。死胎也。若陣疼而血下者。宜
用此湯。或洋葵甘草飲。見產催之。切勿與止血藥。
妊婦臨月小便隆閉者。此子宮迫下。梗于尿道也。宜射緩
下導於穀道。若不知。令其婦仰卧。稍高脚。後子宮便復。

故而小水得利。若子宮不復者。醫以手上推其肚。勒提
子宮。小水仍不通。乃用測胞子導之。必勿用利尿藥。其
大便秘者。亦宜緩下導。

三物礪砂飲。同臨產陣疼劇。而久精力疲勞。不能分娩者。

宜與此方。上見催生。或選鎮痛墨栗薩飲。見水三製薄荷

飲。見加琥珀丁少許用之。

加密列飲。同臨產陣疼。有真假之別。疼起髀腰。及陰處壓
產。明而漸闕之者。真也。其疼在腹。而當臍邊。殊切痛緊
脹。較真頗艱者。為假也。當急祛之。趣其真法。以府利薰

綿布敷腹上頻更換之或服此方見熾一盃若不應者

作鎮痲芙蓉飲見麻或鎮痲三物飲見痲頻々用一二匙

取葛私多儂護丁二三滴調水一匙服之亦可

婦人臨產昏暈者宜取芸香醋見方塗額顙且噴鼻中用

鹿角精或葛私多儂護丁亦佳同

孕婦臨產子宮寧急其機逆轉而不能產者用阿芙蓉劑

則婉矣屢試屢效伊

產後

大麥消石湯微產後血崩者放血服此湯或消石散並見

其劇者令婦卑頭而卧取水酒各半或葡萄酒蘸綿布

敷腰腹股腿溫即換之又產後二三日乳汁不快出憎

寒發熱者名曰乳熱亦宜此湯

理血飲伊產後脫血發於痲者此方見嘔大效

芙蓉刺蝟散獲臨產及產後血崩甚大精力虛脫發暈者

宜急用鎮帶緊紮其腹頻與淡羹或大麥煎汁若脫下

不減者選用此方見痘及桃花飲甘葵舍護比東飲見吐

輩又治惡露久不盡而精力虛脫面色蒼青心悸惡心

者

三物礬石飲 同前症行本件方法而不應者選此飲及理

血飲並見吐血止洩飲與之且用醋水各半蘸綿布敷腹上

鎮痼芙蓉飲同產後胞衣不下或凝血留滯者醫先引拔

胞衣排除凝血而用此見麻疹

質驗理血飲治產後血崩甚

石薄荷露 桂露 嬰粟舍利別各十錢

酸礬漿錢一

右四物攪勻每一時服二匙

橙皮加密列酒治產後惡露不盡

加密列花一握半 橙皮乾者八錢

右二味以麥酒煎服

蟹爪散產後兒枕痛劇甚者宜多服泡撒法即湯若加

密列飲或此輩一盃加匾挑油八錢熱甚者延與此散

蟹爪修製者四錢 消石淨潔者二錢 撒法即五分

右三味入乳鉢內研末分為八九貼二三時服一貼加

密列飲送下

阿魏酒同治產婦虛弱或患宮痼者

阿魏錢十六

右一味。淹香竈揮發精百二十八錢。八日。濾過時服十

二滴至十五滴。葡萄酒若泡石薄荷湯一盃調下。

消石散同產後有肚腹緊脹。撮痛不可觸近。手脈軟而數

憎寒發熱。語言妄錯。或嘔吐呃逆。子宮所漏。微赤而惡

臭。肛門努責不斂。身熱如火。或小便隆閉者。乃子宮焮

腫之候也。須以大麥煎汁一盃送下此散見感五合。日

三四次。或用溫湯數射注肛中。或蘸綿布熨腹肚皆効。

遍桃盧子乳微產後子宮焮腫。而腹肚脹痛。觸之益劇。小

腹發赤斑。變成黑色者。不可活也。若衰憊殊甚。面色異

常。謔言妄語。脈弱而堅。身熱稽留。或嘔吐或呃逆。惡露

下少。其色微赤而惡臭。小便灼熱。或隆閉者。宜此方。見

盛或大麥消石湯。見感又治兒枕痛惡露不下。

產後昏暈。因血虛及衰弱者。宜以綿布摩擦四肢。與墨栗

薩露。硃砂精等類。微

瓦刺蘘矢格列乙飲。同產婦虛弱。蒸氣過閉。惡露不下。而

乳汁不出。或乳汁潛行股間。或內陷為腫瘍者。宜內服

此方。外敷。令消。既速。消其腫。

瓦刺蘘根 失格列乙根各八錢

右二味以水四合煮一刻更下凝水石四錢甘露蜜十

六錢煇盡濾去滓一刻服一茶鐘

分消饒同治前症

蒸饒心加密列花 乳汁

右三味搜和為饒子每一饒和石酸勿搗茶產一錢敷患上

加密列飲產後兒枕痛輕者先取府利或琥珀末撒炭

火以薰綿布敷小腹次服以飲一盃効必神見熾盛熱

六味墨栗薩漿伊治產後兒枕痛又治鉛毒腹痛妙

墨栗薩露四錢 蓖麻子油八錢 石酸半一錢

卵黃一個 阿芙蓉八黍 洋葵舍利別四錢

右六物攪勻一時服一匙

鎮痛芙蓉飲同產後兒枕痛劇甚苛留者與此方見麻或

鎮痲三物飲見定之若由胞衣或凝血留停得者不投

其本無已也

螭姑散產後惡露下順者腹必不痛縱有痛亦甚為微

其脉不異常六抵經三四日其下漸減而漏白物乳乃

作脹若無兒飲痛殊劇憎寒發熱脉洪數者名曰乳熱

五六日而乳汁自出寒熱脹痛全解其於乳熱時必勿

勞動用力。宜寧處。而朝夕用。以散見心。一茶匙。候服洋

葵甘草湯。見瘡。一二盃。大便秘者。每日或隔日行。緩下導。

其熱劇盛者。選接骨清涼飲。蝮蝮消石散。消石栗接飲。

三方見。洋葵甘草湯。洋葵甘草飲。一方見瘡。與之。日三四次。

乳熱。乳房堅腫。焮赤疼痛。其人血實。脈堅實。從焮腫治法。

若焮痛殊劇者。作緩和小。傳之。焮痛寒熱。並退。贏得硬

腫者。與緩和小之飲劑。候服。利毒飲。見瘡。若頑結。而不解者。

貼芥葉鈎吻膏。選鈎吻煎丸。二方見瘡。石酸鈎吻丸。加味石

酸鈎吻丸。一方見瘡。解凝石酸丸。見瘡。久服之。

錦葵加密列湯。公。產後乳脹痛。而及腋背。頭疼背痛。寒熱

往來者。名曰乳熱。此湯治之。

錦葵葉 加密列花 各一握

右二味水煎。乘溫慰之。

芥葉鈎吻丸。微。乳汁凝固于內者。先其未硬結。早解之。否

則變乳癰。其中惡症也。宜此方。發疹而解散。又治乳按

久不解者。

芥葉鈎吻煎膏 錢八

右一味。和芥葉鈎吻末。每一錢為三十丸。朝服。一丸漸

次增之。

芥葉鈎吻煎 同治前症。

芥葉鈎吻 乾者不拍少

右一味盛布袋水煮時絞汁熨乳且用其煎汁每一時溫而蒸之。晁氏曰作蕎麥泥熨之亦妙。

乳餅泥 蒲乳房嫩赤堅腫者是膿將成之候也此方奇效

蒸餅 乳汁

右二味和阿利襪油或鮮牛酪如糊敷患上更換時二次至膿成或腫消。

油蠟膏 同治乳頭皸裂剝脫者。

阿利襪油 蠟

右二味煉和或更溶化牙皂樹膠少許洗之頑固已治者與清下劑。

蓄薇膏 微治前症。

蓄薇油 九十錢 鉛丹 八十錢 醋 三十錢 黃蠟 四錢

樟腦 二錢

右五物先煎煉上三味候稀稠如硬膏乃下蠟腦烱化下火冷定為挺子。

治產後乳頭皸裂爛痛方。取楤椀核汁。或佛甲草汁。或雞卵油。或蠟油塗患上。得效甚捷。

密陀水。同前症。其色極赤。痛痒甚。苛液渗出。而侵蝕四邊者。用此水。見丹。頻洗之。若蘸綿布敷之。

下瘀血散。同治產後惡露極少。肚腹撮痛。頭暈目眩。胸中懊懣。心悸脉實者。先作緩和藥湯。漬脚次。取洋葵加樟腦膏。見黃。擦腹。作緩下導射。肚中。選芸香雙花飲。見洋葵甘草飲。見癩。輩。多服之。不知者。與此散。或三物研砂飲。

通經散。益見。經閉。輩。若脉弦實者。放血。

產後惡露逐序漸々止者佳也。與三物飲。或霸王飲。見方。

熱盛

龍虎幾那醬。吳治產後崩血。其人妄語者。

鹿角鹽。半銖。若二。幾那。未半。

右二物。調龍腦薄荷醬。朝夕頓服之。八日。間服幾那劑。產後有惡露。為風寒。或卒驚暴怒。俄止。而衝冲臍膈。發之。嫩腫。性凶惡。而危險者。須從嫩腫之治法。勿誤投逐瘀之劑。不。蘇。

幾那百藥煎醬。吳產後六七日。下利者。大險也。急與此救。

百藥煎末 幾那未各 三錢

右二味調玫瑰醬每半時服栗子大。

加味大黃散 產後有無故下利如膽汁惡露乃止者其

下利不劇餘症不發者勿強止之若下利甚劇延日不

化者宜先與此散見泄瀉次用桃花飲見吐血

產後下利因冒風寒或為飲食發之者隨其因治之同

加味大力湯同產婦乳汁不出鬱敗于內或乳脹暴消乳

汁逆行血中而侵腦宮諸臟者極為危也其浮越于表

而發腫瘍者宜用緩和之劑救之若其着肢節而疼痛

甚屈伸不得者選此方見熾熱或今消飲大力甘草飲二方

見利毒飲加味石鹼鈎吻丸見聖久服之効必偉精力

未脫者屢與緩下藥為良

產後間有發粟疹者治法全與熱病發疹者同全

產後發粟疹者行粟疹治法蒲

小兒科

初生并 衆疾

小兒初出脂垢汚染遍體者取清水和葡萄酒減半洗之

五六日。日一洗。切勿溫而用之。以令皮膚弛弱。若脂垢粘着不脫者。浸加密列水。調石鹼少許洗之。微

小兒初出。須先去口中粘沫。法取布蘸微溫湯。絞之拭淨口中。次以微溫湯浴之。用海水殊佳。公

小兒初生。元氣虛弱。面色青白。氣息微。眼不開。巨里及諸脈微弱。身軀僅溫者。宜速縛臍帶。斷之。取水酒各半。微

溫以浴之。用綿布摩肢軀。用鹿角精者擦額顙。鼻孔。鳩尾。後

小兒初生。殆如死。頭面盈脹。其色脫青。口流涎沫者。為血

鬱于頭面。而壓迫生機也。宜不縛臍帶。而斷之。出血一

二匙。以疏其鬱。多向活路。血出已足。乃縛所餘臍帶。而

溫水酒各半。浴之。同○公氏曰。見初生。神氣昏冒。面頰

帶之脈葉動甚者。斷臍帶出血。

蜜漿羅小兒初生。與此下胎屎。

蜂蜜 若砂糖 水

右二物攪勻用。

矢格列乙加大黃合利別。羅初生胎屎不通者。取此方八錢。以水二三時開與之。不

大黃四十錢

失格列乙葉連根十錢

砂糖二百八錢

右三味以水七合二勺先煮失格列乙減三分一濾過

乃下大黃浸六時再煮沸去滓下砂糖文火煎作舍利

別伊氏曰此方去失格列乙為可易製而功却多○蒲

起和蜂蜜少許与之胎尿不盡則諸病從是發矣

產母初出乳汁能下胎尿其功非諸藥所及也羅蒲

四物甘露漿公初生必當下胎尿宜以此方

失格列乙加大黃舍利別

甘露蜜

海葱蜜各四錢

銘石酒半

右四物調勻時與一茶匙

二物甘露膏小兒胎尿不利腹肚急脹啼泣不止而脚

急縮悶擾身體者腸內切痛或焮腫也急宜此方下之

扁桃油新者 甘露蜜舍利別十二錢

右二物調勻時與一哥喜匙至胎尿盡下用失格列乙

別亦若胎尿臭惡者取阿利襪油調肉羹時射入肛中加大黃舍利

小兒虛弱生下五六日至十四日失氣昏冒者即用溫衣

纏身服銘石酒七腐五滴至十二滴或用獨聖散一二黍如藥不

入以積筒射注咽中或以管吹喉中且取冷水若酒灑

鳩尾以誘噎藥噴鼻以軟布摩肢體公

治小兒口舌唇齟剝脫而疼或發細疱而不能吮乳者

佛甲草汁 搥梓核汁 薑菜舍利別各四錢

右三物調勻頻塗患處用薔薇核汁蜜見咽亦宜若白

苔攤着細疱者先取綿布蘸水滾之糖糝散砂糖八錢明糝二錢

為散以輕々拭却以水洗淨而後塗此蜜

乳母散羅凡鴛口瘡生咽則阻格飲食生胃則嘔吐呃逆

生膈則致赤白下痢也治之宜與失格列乙加大黃舍

利別見上且服乳母用以散

麻低涅失亞錢八 橙皮去白者 砂糖各二錢

右為散每服三四茶匙乳兒腹痛之時亦與之乳母

研砂蜜蒲公治鴛口瘡先用吐下藥清滌胃腸浴溫湯而後

塗此

蜂蜜錢八 研砂錢一 枯礬今五 玫瑰蜜錢二

右四物調勻塗口內公氏方無

白黃散羅鵝口瘡者口舌生白疱甚則彌延咽喉若胃腸

是也腹痛者當下之宜此散

大黃五 麻低涅失亞五

右二味細末。分為六貼。調飲食。若蓄薇舍利別。每二三時服一貼。

酒水蜜 羅治驚口瘡。

葡萄酒 蜂蜜 水

右三物搜勻。蘸布片。搥指摩瘡。

奇効膏 同治前症。

桑椹醬 若胡桃醬 玫瑰蜜 各一錢

右二味調勻。另加綠礬精少許。塗患上。日五六次。

佛甲蜜 同治前症。

佛甲草汁 蜂蜜 等分 枯礬 少許

右三物攪勻。塗患處。良驗。

作列布麻仁飲 公治驚口瘡腹痛者。

作列布根 二錢 亞麻仁 四錢 硃砂 半錢

看百設福烏葛煎膏 幾那煎膏

洋葵舍利別 錢八

右六味。先以沸湯泡過。上二味去滓。乃下餘藥。和勻。每服一食匙。

麻仁煎醬 同治驚口瘡及腸胃者。

西醫方通 卷十
亞麻仁四錢

右一味以水三合二勺煮稀稠如蜜澆過和薔薇蜜十
六錢服之或煨燕菁若胡蘿蔔絞汁和薔薇蜜多服亦得若
下利紅白物者取牙皂樹膠水和乳汁多與之瘡吳爛
者用幾那湯是腐敗熱

宣轉鎮痙飲同治小兒生下不日發黃腹肚膨脹有酸敗
液之候者

刺蝟石 麻風涅失亞尼篤利各五分

甘露蜜 失格列乙加大黃合利別各八錢

菩提樹花露十六錢

右五味攪勻時服一小匙公氏曰見初生因肺肝機轉
無倫或尿痔積腸中發黃

者浴微溫湯
服檢下藥

石鹼刺蝟膏同治前症

石鹼二分五厘 刺蝟石五分

失格列乙加大黃合利別各十六錢

右三物調菩提樹花露八錢時服一小匙

消毒散 公兒生二日至二週徃々有眼胞焮腫而內反膿
汁漏出乘寐封合寤而不能開眼中疼痛角膜痿弛而

不清。膿出。思。不日發熱。不寐。不思乳。大便瀉利。或秘閉者。不急救。則失明。或隕命。宜速取乳汁。點目中。作此散與之。

麻偶濕失亞

大黃

加羅茂兒

右三味作散服。或初起取鉛糖一黍。以清水一錢。烱解洗患處。亦良。其焮腫劇者。放水蛭於耳根顙。貼天灸膏於項。

紫堇酒石醬。治小兒頭面。口舌唇齟。其它發細瘡。癢難忍。惡液浸淫。四邊焮熱腐爛者。以乳水湯洗之內。

服此醬。又治小兒生下不日發黃。大便不通。而無酸敗液之候者。

葉片酒石

分五

紫堇舍利別

錢二十

右二味搜和。時服一小匙。

紫堇酒石飲 同 主治同前

苗香露

菩提樹花露

各十錢

紫堇舍利別

錢十六

葉片酒石

錢一

右四物攪勻。一時與一小匙。

宣腸飲 吳初生兒胎屎未來。而發搐者。此方下之。

大黃

霸王鹽合半錢

甘露蜜十二錢

右三味浸龍腦薄荷露二十四錢去滓每半時若一時半與一小茶匙至胎尿下爾後仍與一小粥匙日二次胎尿盡患乃解

大黃蚘蛄醬蕪乳兒腹痛拘急吐乳下利所下或綠或深黃少頃變菜色者乳汁酸敗於胃腸故也宜此方驅之

蚘蛄石末二錢

失格列乙加大黃合利別十六錢

右二物搜和時服一哥喜匙

痢蛄匾桃醬同治前症

小蚘蛄石末二錢

匾桃油新者四錢

甘露蜜合利別十六錢

右三味調勻時服一哥喜匙用宜轉鎮痙飲石酸痢蛄醬見上方亦得若切痛甚者施油肉導肉羹和作府利布

即以府利或加密列囊花盛囊者溫敷腹

固腸飲同前症用前方腹痛拘急已止但下利者與此方

茴香露四錢

若格實溫六錢

桃花石修製者

蚘蛄石各五分

右四味攪勻一時用一匙必勿與峻澁劑恐為腹中癥結致疝勞

鎮痙三物醬同治前症用前方輩酸液已盡拘急未止者

菩提樹花露二十錢芍藥舍利別八錢鹿角精六滴

右三物攪勻時服一匙若毒未盡而拘急劇者與制酸

劑兼服

鎮痙四物醬同主治同前

琥珀修製者一錢芍藥舍利別八錢

菩提樹花露二十錢阿芙蓉液六滴

右四物攪勻時與一匙用加味非阿私含無誤飲見百

亦得

初生兒乳汁酸敗於胃中而腹痛吐瀉拘急搐搦者宜失

格列乙加大黃舍利別下之微

化酸散同前症下之後宜與此散制酸敗

麻屈涅失亞若蚶蛎石二錢桂四黍

右二味細末為一服乳前以水若乳一匙送下症重者

日三服輕者一二服兼服泡菩提樹花湯

天女散公治小兒吐乳肢體虛羸者速効

加乃可草根各一錢麻屈涅失亞各一錢煙蘭根半錢

甘草錢二小茴香五分撒法郎八黍

右六味細末每服一刀夫日數服。

石鹼飲伊羅乳兒諸病即吐乳下利腹痛拘急等發於酸敗液者神驗。

石鹼二三分

右一味以苗香露或他芳香之露水烱盡之服。

石鹼苗香飲伊主治同前。

苗香露四錢龍腦薄荷舍利別三錢

麻僂涅失二錢石鹼十黍

右四味調勻每二時服一粥匕大便難者加大黃末二

三黍下利腹痛者去龍腦薄荷舍利別加罌粟舍利別

三錢

石鹼導微小兒起居不寧無時啼泣或睡中冷笑吸

乳如太飢而握乳復即捨大便綠色酸臭狀如攪雞卵

者乃腹痛之候也羅氏若初生一月許腹痛胃隨虛者微

宜施此導。

石鹼棒子

右一味以泡加蜜列湯烱消射入肛門。

麻僂涅失公蒲散小兒腹中切痛大便綠色下利酸臭者

腸中有酸敗液也此方下之。

麻屈涅失亞

右一味每服十黍至一茶匙。

黃薄麻屈涅失亞飲同主治同前

麻屈涅失亞

錢二

大黃末五分

薄荷露

清水

各十錢

砂糖宜適

右五物攪勻每服一匙日三四服或施導方。

和中酒同前症痛殊劇者以燒酒少許擦腹上不效乃與

此必先取下而共用之其未下者不問內外勿用燒酒

及辛熱藥

燒酒

不拘多少

清水

二倍

右二味調勻更和砂糖時與一匙與薄荷露少許亦良。

白帛散滿小兒腸胃有穢積而為其所惱必發惡心腹痛

拘急是名內癩動輒成真癩而殞命當須早驅其毒乃

取此散見腐敗一黍調水三勺舍利別少許或取獨聖散

匙水與些一刻與一小茶匙至吐取銛石酒見腐敗六七

滴和水一小茶匙用之亦宜羅氏曰搗搗發於腹痛者

聖散調大黃舍利別用之白帛散亦佳若吐後不下或大便秘結者與麻

屈涅失亞散上下之

鉛石膏公 小兒下利。或水瀉。或其色綠。或雜血。或腹痛者。多發於胃腸積穢。此方吐之。

鉛石酒錢二 砂糖錢六

右二物調勻。煮至如舍利別。每一刻服二三十滴。

制酸宜腸醬同 治前症。宜此方稍々下之。

甘露蜜錢六 浸大黃水錢四 麻僞涅失錢二

礬酒石錢各一 茴香露錢八 海葱蜜錢二

麗春花舍利別錢四

右七味攪勻服。一時二茶匙。麻僞涅失亞散上見亦可用。

前方或無効者。宜阿芙蓉劑。

末兒兒叔尼斯散 吳凡小兒者。腸胃脆弱。不完能消化飲食。

化製乳糜動輒乳食敗于內。變作厲酸液戟刺腸胃。發

痼瘕也。此方治之。

芍藥 白蘚皮 檉寄生 鹿角

真珠母各二十錢 蜚蛭石十六錢

右六味細末。

格密的撒見篤散 吳主治同前方見痼瘕

簡易神効散 吳治前症極驗

蛭蝟石

鹿角燒灰

琥珀各一錢

酒石鹽錢半

橙皮油滴三

右五味為散和粥少許與一兒禿

銅錢名徑七分五厘

日數次小

兒生齒時。間有因其痛與酸敗液。發搔者。加阿芙蓉二

黍良驗

茉莉區挑醬

徵羅

小兒腹痞脹。顏失色。澤食不進。舌有苔。睡

眠不得者。腸胃有積穢。若敗酸液。而將發搔之候也。當

速除之。此方治之。又治已發搔者。

紫茉莉脂二黍

砂糖二分五厘

區挑仁三個

右三味。同水二匙。研勻。如乳汁。和石長生舍利別八分。

服之。下導法亦効。其發於虵者。與幾那散見神良効羅氏

曰發搔之際。除非下導法之外。絕無緊要。

乳油導羅。小兒發搔已危急者。聚為難治。只須察諸未然

以速救之也。無時冷笑。二便不利。發熱。上竄。腹痛。生齒。

瘡疹內陷。蛔蟲等。皆為之嚆矢矣。若發搔而腹堅脹。處

處有起落者。是為發於大便閉也。凡搗搦劇甚者。多因

乳汁凝滯胃中也。宜此導利之。

溫乳汁六匙

阿利襪油四匙

沙糖許少

右三物攪勻向肛門射之內取阿利襪油。匾挑油等分。砂糖少許與之至腹中雷鳴或石鹼加大黃少許用之亦得。

加味麻屈涅失亞散伊羅前症下大便而在定者。迺與此方。

乳母則用乳母散見上治小兒常飢貪食腹脹羸瘦者。

脾所謂并腹痛因酸敗液風氣者伊氏

麻屈涅失亞錢一 茴香分二 砂糖二分
伊氏

撒法郎五分
伊氏
方無此一物

右四物研末每服一小刀尖茴香露若白湯送下。

甘露漿伊前症當下者宜此方。

墨栗薩露錢八 甘露蜜錢六 消石錢一

麻屈涅失亞錢四

右四物調勻時服一茶匙。

定痛飲泥治小兒欲生齒而發搖者良効。

麻屈涅失亞 大黃舍利別

龍腦薄荷露若苗
香露

右三物攪和服或每二時與鹿角精二三四滴。

小兒欲生牙齒疼痛者。泡菩提樹花湯和乳汁少許與之。
 取蜂蜜。搗碎按汁等分。頻擦齒齦。或令嚼甘草。若象大
 便秘者。射入錦葵煎於肚中。微

石長飲。小兒生下三四月。頻喜嚼物。而口流涎。兩頰赤
 熱。齒齦痒痛。或身大熱。面色嬌紅。喜卧。脈洪數。大便不
 快通者。是所謂此方治之。又有七八月齒將生而齒齦
 焮赤腫痛。顴赤。目瞪。口流涎沫。或惡寒發熱。口渴引飲。
 煩燥不寐。或筋惕肉跳。拘急搐搦者。其熱甚者。宜此方。

消石錄 石長生舍利別錢 菩提樹花露 二十錢

右三物攪勻。每半時或一時。服一匙。兼貼瓦兩枚。奴護
 膏。或蒸餛母於足心。擦薑薤核汁蜜。見咽於牙齦。大便
 不快者。數行導方。若行諸法。而熱反增劇。眼中洒朱。拘
 急搐搦不止者。當刺絡放血。或放水蛭於耳根。吮血。
 鎮痙三物醬。同治前症。但方有熱。禁投熱藥。故熱已解。拘
 急搐搦仍不止者。乃選此方。或鎮痙四物醬。二方加味
 非阿斯舍亞。飲。見百與之。又治生齒時熱微。而身體
 疲倦。但欲眠。拘急搐搦者。其胃腸有粘液。若酸液者。用
 石鹼。刺蝟膏。見輩。不應亦實。用以醬輩。而拘急尚不止。

者貼天冬膏於腓腸。

六物苗香漿伊治小兒拘急發於齒牙艱生。

小苗香露十二錢 麻僞涅失亞一錢 消石五分

龍腦薄荷舍利別各四錢 甘露蜜各四錢

非阿斯舍亞護煎膏二黍

右六物調勻每半時服一二茶匙。

麻僞涅失亞散公治嘔吐因敗酸液服此散上一茶匙日

二三次毒已盡嘔吐仍不定者取阿芙蓉液三四滴點

苗香露與之。

百効散羅治小兒吐瀉酸臭者。

麻僞涅失亞四錢 苗香三錢 泥菖根二錢

撒法即今五

右四味細末每服一小刀尖苗香露調下。

蘘黃飲同治前症。

大黃五分 蘘木二黍

右二味注沸湯一合五勺置温灰上一宿瀝去滓更調

桂露四錢服取酒石鹽四錢烱盡水二合四勺與之亦

宜。

糖椽水同小兒嘔吐口臭如敗卵者胃機素弱過噉肉而
敗腐所致也此方主之

拘椽汁 砂糖 水

右三物攪勻服

橙黃酒石漿同小兒心下硬滿痞脹而吐膠粘液者當吐
之而與大黃劑若食輒吐者胃虛也吐後用此方捷補
之

橙皮去白四錢 大黃六分 葉片酒石八錢

右三味浸葡萄酒五十六錢上慢火出藥味濾去滓別

和龍膽煎膏四錢加密列油薈州油各五十滴每服十
五六滴桂露點服

四物將軍酒羅治小兒飲食不節下利甚腹痛雷鳴虛憊
者

大黃八錢 龍腦一錢半 哥提尼爾一分

加乃可草根一錢

右四味浸燒酒九十六錢二日去滓每服一錢二三日

有酸敗液之候加酒石鹽或與麻屈涅失垂散見上惡心
乾嘔者當與吐藥小兒下利因乳母散見上小兒則塗上

以肉豆蔻酒

酒乳飲同治下利虛蕪者

乳汁 葡萄酒許少

右二味煮取上清服

雙膠石脂飲同下利前方輩不效者此飲治之

赤石脂半銖 遠刺五 佩篤膠五 牙皂樹膠二錢

右三味用米煎汁六十四錢烺化服又取蠟同乳汁煮服之俱佳

鏡桂肉豆蔻酒同下痢發於腸中喻收管失其職者皮色

蒼白脫力枯瘦而無腹痛拘攣也

鏡粉三十錢 桂 肉豆蔻各四錢

右三味浸列應酒三百六十六錢候藥味出瀝去滓服一錢日三四次幾那散亦得

仁膠乳同炎夏膽汁注腸過多忽遇秋涼過閉蒸氣則下利此方主之

牙皂樹膠四錢 匾桃仁八錢

右二味以清水四合八勺溶化膠徐々下仁研爛更和桂露八錢砂糖二錢服之

大黃湯 同 前症下大便

大黃

右一味。水煎溫服。酸角湯亦得。

小兒將生齒而下利甚者。每一時半。取鹿角精八九滴。和

水與之。以葦越蒸氣西公

葦越蕪治小兒胃寒。咳嗽。聲嘶。惡寒。發熱。大渴者。

消石 汗銛石未一 洋葵舍利別十六

麗春花露三十

右四物攪勻。半時若一時服。一匙。間服接骨錦葵飲。凡

盛熱 數次。

清肺飲 同 治前症及痰出咳減與之。亦治咳嗽甚痰涎壅

肺而不能咯出者。

礬酒石二 甘露蜜舍利別二十

菩提樹花露四十

右三味攪勻。一時服。一二匙。

撮口臍風氣喘。啼聲不出。不能嘔乳。肢體拘急者。是委由

斷臍帶太短。或腸胃穢積。或冒寒發之。其發於斷臍帶者。

宜解其結縛。若發於積穢。及冒寒者。先行吐方。錫石酒

浴溫湯。次以阿芙蓉輩作導方射之。肛門貼天冬膏於項背。更用緩下劑。

獨聖散羅小兒咳嗽。口臭舌苔。心下痞脹。不思食。食後咳

殊甚。鳩尾必先作痛。隨便咳。或咳而嘔吐。其痛乃止者。

是為胃咳也。宜此散和砂糖吐之。吐後行乳油導上併

取薄荷末和砂糖服。一小刀尖。日二三次。

小兒胃寒咳嗽者。取茴香茶泡與之。乳母亦服之。同

馬脾風。俄然發熱。咳嗽喘鳴。或嘔逆。倚息煩悶。舌微白。而

粘潤。脈細數而緊。熱漸增劇。喘鳴轉益甚。脈乃微弱。四

肢厥冷。眼閉腫不動。移而死。救之宜速。與劇吐藥酒和石

者砂糖貼天冬膏於肘及膈上。施刺銜之導方。隨用麝香

葛私多儂。護揮發鹽輩。

救急飲蕭馬脾風之發。多在卒暴。不速救即死。其候氣急

息迫。喉中水雞聲。脈急數。面赤。或青。或紫。是也。急宜行

湯脚刺絡導方。而令吸溫湯氣。慰以緩和藥。而其症不

減。即貼天冬膏於項背。與此方。

洋葵舍利別 枝爾撒摩舍利別 各八錢 ○方取

十二錢 淹好燒酒百二十八錢 置暖處八

日。漉過。每八錢和舍利別百九十二錢。

石薄荷露 二十錢

右三味攪勻。頻々服。一起阿魏飲下。亦宜。

芥菜泥 羅治馬脾風。

洋葵葉 二十錢 白芥子 未二錢

右二味以水先煮葵葉搗爛如泥。乃下芥子搜勻。乘溫

敷頸。

阿魏飲 公 小兒大抵二三歲至十歲間有霍亞斯荅麻刺

利者。其初起微熱。狀類感冒。得之一二日。氣急息迫。聲

啞喘鳴。才經一二日。總如全解。雖然如解。若六七時。若

十時許。若七八日後。其症必復發也。治法取扑蜜福烏

萬膠以明埵列利精磨消與之。每二日用銻石酒。是腐

獨聖散。見神 輦吐之。八日後夕與托歇爾私散。見伊 晝

日用此飲。

阿魏 二錢 明埵列利精 八錢 石薄荷露 二十錢

右三物攪勻。每一刻服。一起不能服者。作穩當下導方。

和阿魏。每三四時射入肛門。兼貼天灸膏於胸膈。服以

麝香一味亦妙。

四物解凝飲 藥小兒腹脹有痞塊。所謂者久服 紫莖酒石

膏或紫堇酒石飲上方若不應生瘰癧與如味鈎吻飲
見百並腸中有酸敗液者此方治之

石酸一銖 芹葉鈎吻煎膏五銖 紫堇舍利別十六錢

失格列乙加大黃舍利別八錢

右四物先用菩提對花露二十四錢溶解上二味乃下
餘藥和勻每二二時服一匙

甘酒飲同治諸人里亞病即龜背龜胸支節句屈等症大便秘閉或不

思食者宜此飲

礬酒石二銖 甘露蜜舍利別二十錢

菩提樹花露二十錢

右三味攪勻每時服一二匙紫堇酒石飲及醬上方亦佳

珀腦布同治前症良効

樟腦 琥珀

右二物投炭火中薰綿布擦腹及四肢關節

綠礬散伊泥治諸人里亞病神驗

綠礬煨白者 蛎姑石十六錢

右二味細末分為二十四貼朝夕服一貼乳汁送下氏

用綠礬一錢。刺貼石三錢。分作四十貼。日服二三貼。

幾那酒 治諸久里亞病。

刺葛亞斯水 羅治諸久里亞病。制酸敗液。

刺葛亞斯酒 四錢一作石鹽

右消井泉水二合四勺。每朝取二十滴至百滴。燖水一

盞服。牡蠣亦效。

石鹼芋膽丸 同治諸久里亞病。成乳糜。生良血。驅粘液。閉

閉塞通大便。

石鹼 一 牛膽 一 海芋 五

右三物。每一錢六十九。銀箔為衣。日服八九。

拂郎察醫治諸久里亞病。試驗方。

茜根 二 橙皮 十 茴香 二

右三味。水煎溫服。數月乃效。

幾那麻屈涅失亞飲 同治諸久里亞病。

幾那 八 麻屈涅失亞 三

右二味。泡沸湯一合六勺。溫服。

西醫書目	卷十	五十六
西醫今日方	初篇	既刻
西醫方選		近刻
西域本草		既刻
物理源本		既刻
生理真原		既刻
病理真原		既刻

普山先生著述目錄

和蘭語法解		既刻
和蘭藥性辨	初篇	既刻
西醫今日方		近刻
西醫方選		既刻
西域本草		既刻
物理源本		既刻
生理真原		既刻
病理真原		既刻

訂和蘭語法解

遠西度量考

太西水腫纂要

嗣出

嗣出

嗣出

文政戊子季冬五卷刻成 全部十卷

富小路竹屋町

寺町二條

三條柳馬場

御幸町三條

寺町蛸薬師

寺町三條

下谷池之端仲町

名古屋本町七丁目

袋屋 佐七

林 權兵衛

林 喜兵衛

河南 儀兵衛

伏見屋半三郎

山城屋佐兵衛

須原屋伊八

永樂屋藤四郎

書賈

京都

江戸

尾州

