錦蓮集 全

ヤ9
775

775

六味地黃元　熟芊八兩　山藥　山茱萸各四兩　澤瀉　禾母皮　白茯苓各三兩　加肉桂附子各一兩八味丸　加五味子四兩腎氣丸　或加白茯神　益智仁五味子

四物湯　血虛陰衰　熟芊為君　精滑　山茱萸為君　小便淋漓　澤瀉為君　心氣不足　牧母為君　皮膚乾澁　山藥為君　熟黃地　補血滋腎　一戈二分半　味甘寒　血中血藥　通腎經能生真陰虛之者　白芍藥　涼血補腎　一戈二分半　味酸寒　能涼血通脾經又治血虛腹痛　川芎　行血通肝　一戈二分半　味辛溫　分三治血中主氣藥　通肝經　當歸　和血故經　一戈二分半　味甘溫　分三治血中主血藥　能生新血　破瘀血各故其經　一方春倍川芎　夏倍白芍藥　秋倍地黃　冬倍當故　春加防風　夏加黃芩　秋加天門冬　加桂枝　蓋陰藥之爾必行此而取則為　欲補血藥其四物之謂乎

諸淋加甘草梢　桃仁本通活名本香並湯春澁腎丸百丸　黃柏知母并洛洗焙一兩或宜桂及水丸吾子大名若老虛精已竭而小便淋瀝者　酒鹽湯下五十丸　全補腎水　兼理脾胃　潤肺之源　血虛一經兼　宜陰虛　八味丸全功而宜滿虛　湯而復　載之則大小便自一　澤瀉　金疼則金燄大小便合　使則金痛此當滋化源不可誤用　知柏淡滲之劑

既濟頁湯復損陰以宜八味地黃丸倍附子私之丸　五味子溫補胃並作茶飲熾炭焙收之

加減八味丸　專補腎水無補命門火　熟地黃二兩　山藥微炒　茱萸各一兩　澤瀉酒蒸　牧丹皮白茯苓各一錢　五味子畧炒一兩半肉桂五錢　蜜丸梧子大五更初未言語時　鹽湯或溫酒下五七十丸

或晚間空腹再服或細到並服名曰加減八味湯

滋陰降火湯　治腎水不足陰虛火動　白芍藥一錢三分　熟地黃天門冬麥門冬白朮各一錢　生地黃八分　陳皮七分　知母黃柏并童水炒甘草炙五分右剉作一貼薑三片棗二枚水並服

老人治病

精　氣　神　血　夢聲音　言語　疾欬　肝　心　脾　肺　腎

膽　胃　小腸　肪胱　大腸　三焦　胞　虫　小便　大便　頸　面　眼　耳

鼻　口舌　牙齒　咽喉　頸項　背　齒　乳　腹臍　腰　脇　皮　肉　筋

骨　手　足　前陰　後陰　風　寒　暑　濕　燥　火　內傷　虛勞　霍亂

嘔吐　咳漱　積聚　浮腫　脹滿　消渴　黃疫　疫癘　瘟疫　邪祟　癰疽　諸瘡　諸傷　解毒

救急　雜方　婦人　小兒　單方

治痢方

生黄連生黄芩生白芍各一戔二分只角八分去穰炒山查肉一戔二分厚朴薑汁拌乾檳榔青皮去穰炒各三分桃仁去油用水三椀煎半空心服渣再煎三四貼便色若白紅相兼裏急後重身熱腹痛者皆可用單白者去青皮地榆梔仁加槐紅四帖泄甚者加大黄酒炒二分婦人瘧孕者去梔仁紅花檳榔若紅川黄連酒炒六分黄芩酒炒六分白芍厚朴青皮橘紅檳榔地榆各四分甘草炙四分卢會歸五分紅花酒洗三分木香二分

白補赤瀉

老人治病

年老之人切忌苦寒柔及汗吐下宜以平和之劑調治一向憶之之人宜却病迓壽湯增負白术散補中益氣湯內傷異功散五莊衛生湯加減三方並虛勞小便頻數腎氣丸虛勞去澤下一方伏茯神益智入便乾燥宜疎厚腸氣丸痲麻粥並大便秘病六君子湯痰飲三子養親湯咳嗽且於養性迓年之菜皆可選用又人乳牛乳常服佳病迓壽湯治年老火水人參白术各一戔牛膝白芍菜各七分陳皮白茯山查當歸甘草各五分干三春加川芎夏加黄芩秋冬倍當歸增損白术散人參白术白茯陳皮藿香乾葛各七分木香乾生干甘草各三分服入乳法乳汁二盞清酒半盞入銀石罐内同滾服服牛乳法牛乳一升米泔亦許煮粥服

精

精宜秘密陽不開密則陰泄精渴宜秘真丸秘真丸一名秘元丹治精不固白龍骨一兩大訶子皮五箇朱砂五戔一戔為衣砂仁五戔為末糊丸菉豆大空心塩水下二丸臨卧冷水下三丸遺泄精屬心腎氣虛相火擅權精走不固甚則夜遺日流宜黄連清心飲黄連生半當歸甘草茯神酸棗遠志人參蓮肉各等分每五戔夢泄屬心邪客於陰神不守舍故感夢而泄也宜黄連清心飲見上保精湯故元汝桌血久虛精滑夢遺者八勿湯虛勞加減吞下樗根皮丸保精湯治陰虛大動夜遺當歸川芎

白芍生半麥門黃栢知母並蜜水炒黃連炒梔子便炒乾干炒黑牡蠣煅粉山茱萸各五分　敔元散升提腎氣以敔元人參白朮白茯遠志酸名仁炒麥門黃栢知母並便炒芡仁蓮葉枸杞陳皮川芎各五分升麻甘草各二分半蓮肉三枚棗子一枚　椿根皮丸治精滑椿根白皮炒為末酒糊丸梧子大八物湯吞下　夢泄亦屬虛若與洪莖遺濁反甚宜遵赤散五並　精滑脫屬虛不因夢而自泄謂之精滑皆相火旺動也陰寒脉虛宜巴戟丸桂枝龍骨牡蠣湯固精丸約精丸又五倍子一兩白茯二兩為丸服炒妙黑想無窮欲願不遂或入房太甚宗筋弛縱發為筋痿而精自出者謂之白淫宜加減珍珠粉丸小便清心蓮子飲消渴　巴戟丸補肝腎益元湯五味子巴戟肉菟絲子入參白朮熟苄骨碎補菌香牡蠣龍骨覆盆子益智各等分為末蜜丸梧子大三十丸米飲下日三盧甚八物湯下　桂枝龍骨牡蠣湯桂枝白芍龍骨牡蠣生干各三兩甘草二兩棗十二水七斤煮至三升分三服　固精丸知母黃栢並鹽水炒各三戔龍骨二戔山茱萸五戔為末山茱糊丸梧子大空心鹽湯下二十九　白淫莖中痛痒陰縱不收白物隨溲而下宜與精滑脫同　宜肉蓯蓉丸小便單方白茯治夢泄為末每四戔米飲調下牡蠣固脫為丸服五味子益精固精

氣

氣逸則滯　逸則氣滯氣結常須行動橘皮一兩單煎服　七氣人有七精病七氣之結則生痰痰盛則氣愈結或中滿艱食或上氣喘急曰隔曰滯曰秘曰中以至五積六聚疝癖癥瘕心腹塊痛無往不至矣宜四七湯分心氣飲香橘湯七氣之外又有寒氣炅氣合為九氣並宜神仙九氣湯正氣天香湯　四七湯治梅核氣結　又二戔赤茯一戔六分原朴一戔三分紫蘇八分干七片二　分心氣飲通利二便清而疏快紫蘇葉一戔三分甘草七分炙半夏枳角各六分青皮陳皮木通大腹皮亲白皮木香赤茯檳榔蓬术麥門吉更桂皮香附薑香各五分干三片二燈心十莖　香橘湯便香附半夏橘皮各一戔五分甘草炙五分干片　神仙九氣湯治氣痛便香附干黃甘草炙等分為末每二戔鹽湯点下　正氣天香湯尤宜婦人便香附三戔烏葯陳皮蘇葉各一戔乾干甘草各五分　中氣暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁怫意氣多厥逆以至昏塞牙關緊急中風則脉浮身温口多痰此中氣則脉沈身凉口無痰沫急灌蘇合元醒後隨證治之虛者八味順氣散實者四七湯　八味順氣散人參白朮白茯青皮白芷陳皮烏葯各七分甘草三分　上氣邪在肺則呼多吸小上氣喘促宜蘇子降氣湯沈香降氣湯　蘇子降氣湯半夏曲蘇子炒研各一戔官桂橘紅各七分半當歸前胡厚朴甘草炙各五分紫蘇五葉干片　沈香降氣湯治氣不升降便香附四兩甘草炙一兩砂仁五戔沈香四戔為末每二戔蘇鹽湯調下　短氣吁吸不能相續似喘而

不搖肩似呻吟而無痛有結胷者有停水拒抑者有風濕相搏者有素弱氣虛者大抵心腹脹滿為實矣邪在裡心腹濡滿者為虛邪在表短氣有徵飲者當從小便去之宜苓桂朮甘湯腎氣丸亦主之虛勞小便利者四君子湯去茯令加黃芪補之　苓桂朮甘湯　赤茯二戔桂枝白朮各一戔五分甘草五分　火氣肺虛則氣火不能斂息又曰腎虛則氣火宜生脉散暑門黃芪湯內傷脾胃宜補中益氣湯益胃升陽湯並內傷　黃芪湯　黃芪二戔人參甘草各一戔當歸五分五味子九粒

四君子湯　人參白茯白朮甘草炙各一戔二分半　人參黃芪湯　人參二戔黃芪白朮陳皮各一戔當歸白茯甘草炙各五分干姜　氣痛七情飲食過傷以致壅逆而為積癖痞滿刺痛芽疟初宜辛溫開鬱行氣豁痰消積久宜辛寒降火以除根上焦心胷痞痛宜桔梗只角湯胃門中焦腹脇刺痛宜神保元木香破氣散下焦腰痛泄瘕宜蓯蓉散前陰四磨湯大便木香順氣丸周身刺痛或浮腫宜流氣飲　皮散浮腫　神保元無治腎氣痛全蝎七箇巴豆十介為霜木香胡椒各二戔半朱砂一戔半為衣為末用丸麻子大五十丸溫酒干湯任下　木香破氣散便香附四兩烏葉干黃各二兩木香甘草各一分各五戔為末每二戔鹽湯調下　木香順氣丸黑丑頭末破古紙各二兩只角陳皮香附各一兩不香茴蘿蔔子大腹皮各五戔為末水丸梧子大溫水下五十丸使氣升降而歸於腎也　流氣飲子治氣注痛腫脹不消干一戔陳皮赤茯當歸白芍川芎黃芪只實半

夏防風甘草各七分半蘇葉烏苯青皮吉更各五分木香二分半干召　木香流氣飲治同上陳皮一戔藿香木香厚朴青皮香附麥門白芷沈香各七分半白朮官桂木通各七分半草果甘草各五分大腹皮木瓜人參蓬朮丁香皮半夏赤茯菖蒲各三分分二貼干召　氣逆宋衛逆行清濁相干氣自肝出中挾相火而逆上則或煩喘或眩仆宜滋陰降火湯虛勞如香附茯神退熱清氣湯亦主之　退熱清氣湯柴胡陳皮赤茯各一戔半夏只角各八分香附七分川芎五分砂仁四分木香甘草各三分干三　氣痞因七情六氣飲食以致津液不行清濁相干氣為之痞或痛宜交感丹濕滯浮脹宜流氣飲子木香流氣飲五皮散浮腫　交感丹治氣滯抑痞痞悶諸疝香附一斤長流水浸三日取炒茯神四兩為末蜜丸彈子大每一丸細嚼以降氣湯送下　降氣湯便香附茯神甘草各一戔　通治氣苯宜蘇合丸交感丹四七湯分心氣飲　木香流氣飲蘇合元方不錄　單方羌黃治冷氣刺痛　陳皮降氣導滯蘇葉散氣　人乳牛肉　黃狗肉並益氣　蘿蔔大下氣子同　葱白通陽氣

神

神統七情喜傷心怒傷肝憂傷肺思傷脾悲傷心包恐傷腎驚傷膽　驚悸心卒動怕驚也病在心膽宜朱砂安神丸心跳欲厥宜清心補血湯大槩屬血虛與疾瘦人血虛宜養心湯肥人

多痰宜加味温膽湯　朱砂安神丸黃連六戔朱砂五戔甘草乾半各三戔當歸酒洗二戔半為末蒸餅丸黍米大津嚥下二三十丸　清心補血湯治虛損頭眩氣短煩熱人參一戔二分當歸白芍炒茯神山石仁炒麥門各一戔川芎生芐陳皮琥子炒甘草各五分五味子十五粒　養心湯白茯茯神當歸生芐各一戔黃芪蜜炒遠志干炒各八分川芎栢子仁山石仁各七分半夏曲六分人參五分甘草炙桂皮枝各三分五味子十四粒停水疋忡加枳即赤茯　加味温膽湯香附一戔四分橘紅一戔二分半夏枳實竹茹各八分人參白茯朱胡麥門吉更各六分甘草四分干石　疋忡躁動不安惕然人將捕多因肝願不遂而致也屬血虛與心下停水宜四物安神湯天王補心丹停水頭眩宜芍夏湯痰飲薑朮湯　四物安神湯當歸白芍生芐熟芐人參白朮茯神山石仁炒黃連炒梔子炒麥門竹茹各七分辰砂五分調服干石菖一戔半桂皮甘草各一戔干石　健忘由心脾血火神彪宜定志丸聰明湯歸脾湯　定志丸治心氣不足神魂不安人參白朮茯神各三兩菖蒲遠志各二兩朱砂一兩半為衣為末蜜丸梧子大　聰明湯白茯神遠志製菖蒲各等分或煎或末茶湯調服　歸脾湯兼治疋忡當歸龍眼山石仁遠志人參黃芪白朮茯神各一戔木香五分甘草三分干石　心膽氣大動不怕驚而心自動者屬膽虛亦屬痰飲　癲癎痰熱相煽而動風心相亂則悶聲眩甚仆倒於地名曰癲癎大人曰癲小兒曰癎又曰疾邪逆上陽分乱於頭中故仆倒不省又曰身熱脉浮為陽癎宜妙香丸昏身凉脉沈為陰癎為五生丸服人多痰宜追風祛痰丸瘦人火盛宜龍腦安神丸氣血虛損宜清心温膽湯五癎通宜龍腦安神丸肓魂冊磬冊丸再五生丸南星半夏川烏白附子黑豆各生用一兩為末干糊丸梧子大每三五丸干湯下　追風祛痰丸半夏六兩分一二分皂角煎湯浸一分干汴浸並一宿南星一兩分一二分白礬水浸一分皂角湯浸並一宿防風天麻白干蚕炒白附子煨皂角各一兩全蝎炒白礬姑木香各五戔為末干糊丸梧子大朱砂為衣干湯八十七九　龍腦安身丸白茯三兩人參地骨皮麥門甘草各二兩桑白皮犀角旁各一兩牛黃五戔龍腦射香各三戔朱砂馬牙硝各二戔金箔三十五片蜜丸彈子大每一丸水化下　清心温膽湯半夏陳皮茯苓只實竹茹白朮菖蒲黃蓮干炒香附當歸白芍茱各一戔麥門八分川烏遠志人參各六分甘草三分干三　育魂冊山茱一兩半夏胆星白茯神白朮黃蓮遠志山石仁炒栢子仁各六戔竹茹天麻白附子煨川芎各五戔犀角羚羊角白礬陳皮各三戔半全蝎三戔二分朱砂二戔二分牛黃一戔二分射香一戔金箔二十四片甘草滑石研和丸炎實大每一丸干湯下　礬冊丸黃冊白礬各一兩鑿塘一窠先安冊次安礬以炭五升煅火盡取出細研猪心血和丸菜豆大每十九至二十九橘皮湯下　癲狂輕則自高自是好

歌好舞甚則棄衣走而踰垣上屋又甚則披頭大叫不畏水火且欲殺人此由疾大極盛而然陽虛陰實則癲陰虛陽實則狂又曰癲者顛倒錯亂也於癇於狂皆無病也火盛宜牛黃瀉心湯疾火宜牛黃清心丸風門風疾宜犀金丸因驚傷心宜鎮心丹勞心過度宜養血清心湯不得眠卧宜辰砂散　牛黃瀉心湯大黃一兩龍腦朱砂朱硃牛黃各一戔為末每三戔干湯調下　犀金丸犀金七兩白礬三兩糊丸梧子大每五十丸湯水任下　鎮心丹辰砂白礬煅等分水丸炙仁大每一丸人參湯化下　養血清心湯當歸生羊各一戔半人參白朮茯神遠志干棗山名仁炒川芎各一戔甘草五分　辰砂散辰砂一兩山名仁炒乳香各五戔為末置病人靜室量病人酒量以前並作一服温酒調令飲沈醉勿令吐熟眠一日或二三日勿令喚覚伺其自醒　脫營失精證當貴後賤當届後貪血為憂煎氣隨悲減飲食無味神倦氣瘦宜交感丹門氣清心補血湯天王補心丹升陽順氣湯升陽順氣湯黃芪蜜炙二戔人參半夏各一戔五分黃栢甘草各二分半干三　神病通治藥牛黃清心丸風門朱砂安神丸加減温膽湯安神丸天王補心丹　加減温膽湯茯神半夏陳皮枳實桅子白朮麥門黃連各一戔當歸山柬仁竹茹各八分人參六分辰砂五分調服甘艹半三分干名竹瀝半盞　安神丸人參白茯苓山名炒當歸各二兩朱砂為衣天竺各五戔雄黃琥珀真珠牛黃各二戔蜜丸梧子大米飲下五十丸　天心補心丹乾羊四兩黃連二兩菖蒲一兩人參當歸五味子天門麥門栢子仁山名仁玄參茯神丹參桔梗遠志各五戔蜜丸梧子大朱砂為衣臨卧燈心竹葉湯下三五十丸　單方鐵裝生鐵置罌中水浸經久用　紫河車養血安神治癇取肉炙食又鴿頭二枚燒黃丹一兩為末作丸服之　黃丹或丸或散　天門為末酒調鴿頭蜜熟服

血

血為氣配氣者血之師也氣行則血行氣止則血止氣温則血滑氣寒則血涩故調氣為上調血次之　熱能傷血熱能傷血四順清涼飲方見火門不可無也　七情動血怒則氣逆甚則嘔血又曰五志動甚火載血上錯經急行宜保命生地黃散　蓄血證則瘀血積蓄也嘔吐為上部宜犀角地黃湯血結胷膈為中部嗽水不欲嚥血結下焦為下部糞黑腹硬並宜桃仁承氣湯門又曰韭汁善治上焦瘀血　七血脫血色白天然不澤脉空虛通用四物湯　衄血ミ上溢於腦從鼻而出陽明熱盛則口鼻俱出又曰衄血出於肺宜涘芎散三黃補血湯保命生地黃散當以補血行血為主犀角地黃湯加犀金丸茶升麻無用止衄法傷寒不汗熱盛衄血麻黃升麻湯　涘芎散香附四兩川芎二兩為末每二戔茶湯調下

三黃補血湯升麻白芍各二錢乾羊一錢當歸川芎各七分半生羊柔胡黃芪牧丹各五分　犀角地黃湯生羊三錢赤芍二錢犀角旁牧丹各一錢或加當歸苓連各一錢戶麻黃升湯治傷寒未解作衄麻黃升麻赤茯黃苓石膏赤芍甘草各一錢干三微汗　止衄法以白紙一二張作數十摺浸溟冷水置頂中熨手大熨之又白芨或白草霜細末二三錢冷水調服蒲黃炒或血竭或油髮灰細末吹入鼻中　嘔血吐血嘔吐血有三內衄肺疽傷胃也內衄者吐如曼衄此近從心肺流入胃中或吐至數斗得之於勞倦飲食過傷也肺疽者飲酒後毒熱滿悶時或吐出一合半升是也傷胃者飲食大飽不能消化煩悶強嘔傷裂胃口吐血腹痛是也傷胃症理中湯（寒門）加川芎乾葛肺疽症葛黃丸內衄症實者三黃瀉心湯加生羊虛者茯苓補心湯（寒門）傷寒熱毒吐血狂譫輕者犀角地黃湯重者桃仁承氣湯通宜四物湯加山梔童便干汁又犀角地黃湯清熱鮮毒湯花蕊石散　葛黃丸黃連四兩葛花三兩（無則葛根代之）為末水熬大黃末成膏和丸梧子大水下百丸

三黃瀉心湯大黃二錢黃連黃芩各一錢加生羊二錢　茯苓補心湯白芍二錢熟羊一錢半當歸一錢三分川芎白茯人參前胡半夏各七分陳皮只角桔梗乾葛藕葉甘草各五分干名清熱鮮毒湯升麻二錢生羊一錢半黃柏赤芍又丹各七分乾葛黃連黃芩桔梗梔子連翹甘草各五分干三　花蕊石散花蕊石煅研三四錢溫童尿調下　咳嗽吐咯血咳血者咳甚出血本於肺宜玄霜膏嗽血者痰嗽帶血本於脾六君子湯（痰飲）加棗白皮元參只角五味子吐血者鮮血隨吐而出本於腎宜滋陰降火湯（門火）先血後痰四物賀湯毋天花粉山梔麥門牧丹皮先痰後血宜山梔地黃湯　玄霜膏烏梅　沙柿霜炒砂磄白蜜蘿蔔汁各四兩干沙一兩赤茯八兩乳汁沉服熬冬花紫菀各二兩為末共入鍋內熬膏九如彈子大每一丸臨卧含化　山梔地黃湯山梔仁二錢三分生羊赤芍知母貝母瓜蔞仁各一錢天花粉牧丹麥門冬各五分　尿血小便出血而不痛者為尿血非淋也血從精竅中來乃心移於小腸也四物湯加山梔滑石牛膝芩連宜髮灰散清熱涼陰湯腎氣虛損宜腎氣丸髮灰散亂髮燒存末每二錢水醋湯調下　清熱涼陰湯生羊麥門冬梔子黑炒各一錢玄參牧丹各八分當歸川芎赤芍各五分知母黃柏並酒炒白木陳皮甘草各三分　便血邪犯五莊則三陰脈絡不和血因停留滲入腸間而為便血宜胃風湯大便加減四物湯有實熱者當歸承氣湯亦治腸風側柏葉生羊當歸承氣湯當歸二錢厚朴煎補中益氣湯當歸川芎各一錢枳角荊介槐花炒甘草炙九　加減四物湯有實熱者當歸承氣湯日久者厚朴煎厚朴枳實大黃各八分芒硝七分厚朴煎厚五分干三梢一　當歸承氣湯當歸二錢厚

朴生干各五兩同搗闡炒黃白朮神曲麥芽並炒五味子各一兩為末糊丸梧子大米飲下百丸　酒蒸黃連丸黃連四兩剉酒淹一宿晒乾為末粟米糊丸梧子大溫水下三五十丸

腸澼訂詳見後陰　齒衄宜齒金散　齒金散治齒衄失血出蒲黃炒末糝之即止　失血眩暈去血過多煎入鹽含嗽名湯含嗽亦妙　吉衄血從血出眩暈悶絕崩中投鹽金瘡產後皆有此症宜芎歸湯生芎川芎當歸各一戔半赤芍山梔黃芩黃連各七分防風二戔徐徐灌下　通治血病芣宜四物湯保命生地黃散清熱涼陰榮散童子尿　四物湯熟半白芍川芎當歸各一戔二分半春倍川芎夏倍芍芣秋倍地黃冬倍當歸春加防風夏加黃芩秋加天門冬加桂皮保命生地黃散治齒熱衄止便尿血生芣熟枸杞子地骨皮天門白芍黃芩柴胡各一戔黃芩黃連甘草各五分身涼脉微加桂皮　固榮散治同上蒲黃地榆各一兩白芨五戔甘草二戔半為末每四戔溫酒調下　童子尿童便一盞入干汁三二点日進二三次諸血芣中調服亦佳　單方白茅霜治諸吐衄失血每三三戔米飲或冷水調下　白茅根治諸失血煮服佳　地榆同上　側栢葉治同上為末調服或煎服取汁服　松烟墨止血水磨服　生藕汁止血韭汁止血破瘀　亂髮亦治血

夢

魂魄為夢心虛則魂魄飛揚紛紜多夢宜益氣安神湯　益氣安神湯治眠卧不安恍惚驚悸當歸茯神各一戔生芣麥門山名仁炒遠志人參黃芪棗炒胆星竹葉各八分小草黃連各四分干名　虛煩不睡大病後虛煩宜山名仁湯甚者辰砂益元散暑門勞心胆冷不眠加味温胆湯山名仁湯石膏二戔半山名仁炒人參各一戔半知母赤茯甘草各一戔桂心五分干名三　加味温胆湯治心胆虛刼夢寐不詳虛煩不眠半夏一戔半陳皮一戔竹茹枳實各八分山名仁炒遠志五味子人參乾芣白茯甘草各六分干名　單方安息香燒之辟夢　苦竹葉小麥並治虛煩煎服佳　山名仁眠多生用不眠炒用　棊煎服際眠

聲音

聲音出於腎　肺為聲音之門腎為聲音之根大病後腎虛聲不出宜腎氣丸虛勞　卒然無音醉卧當風使人無音宜荊薤湯卒瘂苦竹葉或橘皮頻煎服　荊薤湯通治感風寒卒瘂荊介薤葉木通橘紅當歸桂皮菖蒲各一戔　回雜病失音中風失音不語小續命湯風門去附子加菖蒲一戔咳嗽失音人參清肺散痰塞失音芎辛散諳歌失音響声破笛丸症後失音天花散小兒產後失音茯苓補心湯血門　人參清肺散人參陳皮貝母各一戔半夏吉更茯令桑白皮知母枳角杏仁黃蓮一戔款冬花麥門地骨皮甘草各五分五味子二十分作二帖干三　芎辛散治熱疾川芎細辛防風桔梗白芷羌活桑白皮各一戔甘草五分薄荷三

葉干三　響聲破笛丸薄荷四兩連翹吉更甘草各二兩半百蒂煎無則代五倍子二兩川芎一兩半砂仁訶子大黃各一兩鷄子清丸彈子大每一丸臨卧含化下　瘖瘂有二一曰舌瘖乃中風舌不轉運之類二曰咳瘖乃勞嗽失音之類　聲嘶久唆則咳破聲嘶宜人參加玄參單方柱心杏仁等盞九治卒含化癒　鷄子淡煮服潤肺咳

言語

肺主聲為言入肝為呼入心為言入脾為歌入腎為呻自入為哭　諧語皆因胃熟乘心故也詳見寒門瘖不得語心脾腎三脈虛損疾泥乘之則脈道閉塞血不能運風熟乘之則舌脈弛縱不運風寒乘之則舌脈縮不運隨症治之又曰疾塞不語導疾湯疾飲加菖蒲竹瀝人參蔵苓連七血不語四物湯加人參白朮陳皮甘草菖蒲遠志

鄭聲鄭者重也大病有之詳見寒門言徵真氣虛弱脈微懶語宜人參黃芪湯氣門大驚不語大驚則敗血頑痰填塞心竅瘖不能語宜茯神散治因驚言語顛錯茯神乾芐白芍川芎當帰吉更白茯遠志等分為末每三錢燈心大名煎湯調下　中風不語詳見風門　婦人產前產後不語詳見婦人　小兒語遲詳見小兒

津液

腎主五液入肝為淚入心為汗入脾為涎入肺為涕　自汗多汗身軟者濕也心主熱脾主濕二熱相蒸而為汗宜調胃湯表虛玉屏風散胃熟二甘湯內傷及一切虛損之症自汗不止者捴用補中益氣湯內傷小加附子麻黃根浮小麥但牛茱蜜炒通用逍和湯虛勞參附湯調胃湯黃芪一錢羌活七分甘草當帰尾黃芩半夏各五分麥門生芐各三分猪苓二分藁木紅花各一分五味子乌梅肉等分劑每五錢干名　參附湯治陽虛人參五錢附子炮一兩分作三貼干三　盜汗盜汗者睡中汗出覺則止也乃陰虛血虛有火也當帰六黃湯主之又四物湯血門加參朮黃芪知栢脾濕盛者四製白朮散肝熱者龍胆散　當歸六黃湯黃芪三錢生芐熟芐當故各一錢黃芩黃連黃栢各七分四製白朮散白朮四兩剉分四包以黃芪石斛牡蠣粉炙栗米飲調下　龍胆散龍胆防風等分為末每一錢臨卧米飲調下　童子盜汗　童子盜汗諸葉不效涼膈散三黃丸並見大門　頭汗頭者三陽之會汗出為陽衛濕多胃實水結胷芎藭亦有頭汗心汗思慮過度以致當心獨有汗出白茯苓為末每二錢陳艾湯調下　手足汗熱脚胃府逼而出之宜牡蠣丹前陰　陰汗腎虛陽衰之致宜三味安神元虛勞又蛇床子炒白蠣陳醬水煎洗黃汗詳見黃疸　漏風訂身熱鮮惰汗出如洛惡風小氣甚則喘息口渴食後愈出病名酒風

一去漏風蓋因飲食酒過多傷風必成消渴白朮散主之 白朮散防風三兩半白朮一兩二戔牡蠣煅三戔為末每二戔溫調下 亡陽訂真陽脫亡則汗不止身冷便渋桂枝附子湯主之 桂枝附子湯治傷汗發汗過多遂漏不止四支拘急桂枝附子炮各三戔白芍二戔甘草炙一戔千台 止汗法汗出不止恐作亡陽以獨勝散填腑或牡蠣麥麸麻黃根京本防風白朮糯米等分為末周身摽傅 獨勝散五倍柿白礬等分為末津吒調勻墳填腑中以綿縛之 漏時常漏自下者脾有疾熱二陳湯痰飲加白朮白芍升麻芩連梔子神曲麥牙乾生干虫動惡心漏下者用治虫并 吒腎冷則多吒腎熱則無吒大病後喜吒者胃寒也理中丸門寒溫之虫訂多吒詳見虫門 單方葱白忍冬散表小麥宗表止汗煎常服 烏梅止多吒依蒸飲 汗出汗 柔藥溫汗 浮

痰飲

痰飲分清濁 飲者因水飲不散而為病痰者因大炎熏灼而成痰故痰形稠濁飲色清痰飲病有八皆因飲酒昌寒或飲水過多而致 留飲水停心下背冷如掌大或短氣而渴肢節疼痛脇痛咳嗽 道寺痰湯加減用通川芎夏湯 癖飲水癖在脇搖動有聲宜十台湯寒門 痰飲素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲宜苓桂朮甘湯胷脇支滿已成窠裹宜神朮丸 苓桂朮甘湯赤茯苓三戔桂枝白朮各一戔半甘草一戔 神朮丸蒼朮一斤為末白脂麻五戔水三盞研癒取汁大白三十枚蒸取肉以麻汁調和成膏和朮末搗丸梧子大每百丸至二百丸空心溫水下若膈燥則山栀末一戔水點服 溢飲水飲流行歸於四支當汗不汗身體重痛小青龍湯寒門 懸飲水在脇下咳吐引痛宜十台湯寒門 支飲倚食短氣不得卧宜小青龍湯寒門茯苓五味子湯 茯苓五味子湯赤茯苓二戔桂心甘草各一戔半五味子一戔二分嘔者加半夏 伏飲水停膈滿嘔吐喘咳惡寒發熱腰背痛宜控涎丹 痰病有十 風痰多癲癎奇訂眩暈搐搦宜導痰湯 導痰湯半夏二戔南星橘紅枳朮赤茯甘草各一戔千五 寒痰即冷痰也骨痺刺痛凝結清冷宜溫中化痰丸 溫中化痰丸青皮陳皮良干乾干如等分為末醋糊丸梧子大米飲下五十丸 濕痰倦怠困弱宜神朮丸或二陳湯加蒼白朮 熱痰即火痰也多煩熱燥結顛癲狂怔忡懊憹嘈雜宜小調中湯熱痰色黃 小調中湯黃連煎水浸甘草二二煎水浸黃連瓜婁仁煎水浸半夏半夏煎水瓜婁仁各炒乾為度等分每貼五戔干三或為末良干煎水和糊丸梧子大白湯下五十丸 大調中湯治虛人火痰前方加人參白朮白茯苓川芎當帰生干白芍 燥痰與老痰燥痰同盃於心肺之間凝滯稠疊咀乾喘嗽宜節齋化痰丸天門冬苓酒炒瓜婁仁橘紅海粉各一兩芒硝香附鹽炒吉更連翹各五戔青黛二戔為末蜜和干汁丸櫻桃大細嚼一丸茶湯送下或如黍米大下五十丸 加減二陳湯橘紅鹽水浸焙一戔二分枳實黃芩炒各一戔白朮貝母

干炒便香附各九分白茯天花粉鹽炒各七分防風連翹各五分甘草五分　氣痰七情畜結痰滯咽喉形如敗絮梅核咯不出嚥不下胸膈痞悶宜加味四七湯（咽喉）　前胡半夏湯前胡半夏赤茯各一錢陳皮蘇葉只角各七分木香甘草各五分干五梅一　食痰飲食不消或挾瘀血多積塊痞滿宜正傳加味二陳湯　正傳加味二陳湯山查一錢半香附半夏各一錢川芎白朮蒼朮各八分橘紅茯苓神曲各七分砂仁麥牙各五分甘草三分干名　酒痰飲酒不消嘔吐酸水宜對金飲子加半夏乾葛（內傷）　驚痰因驚痰結成塊發則跳動痛不可忍或成癲癇宜滾痰丸　痰飲流注證胸背手脚腰膀隱痛筋骨牽引時時走易用風茶及鍼灸皆無益只服控涎丹其痰如失控涎丹一名妙應丹甘遂大戟白芥子等為末糊丸梧子臨卧干湯下七丸至十丸　痰病有似邪祟氣血虛損痰客中焦妨礙作降視聽言動皆有虛忘先宜多飲干鹽湯吐之或宁瀝香油多灌之而尊痰湯如苓連人參桔更甘草干名用　痰厥內虛受寒痰塞手足厥冷脉沉昏倒宜加味二陳湯　加味二陳湯半夏陳皮白茯當帰枳實桔梗吉仁各一錢良干砂仁各五分木香桂皮甘草各三分干五　痰塊痰飲流注於胸背頭項腋膀腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按之無血潮雖或有微紅赤淡薄不熟破之無膿或有薄血或有清水又有塊內如瘭瘜在皮內之間如鷄卵可移動不硬惟覺咽喉痰結寒熱宜二陳湯加大黃連翹柴胡桔梗白芥子黃連入竹瀝用又南星草烏等分為末干汁調膏敷核上　喜嗌痰脾虛不能制腎水多吐痰咯而不咳宜八味元（五痰飲治法凡治痰用利藥過多致脾虛則痰反易生法當補脾胃清中氣則痰自遁下宜六君子湯加竹瀝干汁或補中益氣湯（內傷）加半夏竹瀝干汁　六君子湯半夏白朮各一錢半陳皮白茯人參各一錢甘草炙五分干名　痰飲通治藥通用二陳湯茯苓半夏湯五飲湯滇熱痰飲滾痰丸　二陳湯半夏製二錢陳皮赤茯各一錢甘草炙五分干三　茯苓半夏湯半夏三錢赤茯二錢干七　芎夏湯川芎半夏赤茯各一錢陳皮青皮枳殼角各五分白朮甘草各二分半干五　五飲湯旋覆花人參陳皮枳實白朮茯苓厚朴半夏澤瀉猪苓前胡桂心白芍甘草各七分干七　滾痰丸大黃酒蒸黃芩各八兩青礞石一兩同焰硝一兩入罐內蓋定鹽泥固濟候乾火煅紅取出沈香五錢為末水丸梧子大溫水下四五十丸臨卧服仰卧　節方白礬（吐去胸中痰飲一兩煎半入麥服探之）　木瓜（消痰補脾作煎入蜜竹瀝二件服）

五

肝病虛實肝莊血ミ舍魂肝實則兩脇下痛引小腹善怒虛則善恐　肝病治法肝虛宜八物湯加川芎清肝湯肝實宜瀉清丸洗肝散當帰龍薈丸　清肝湯白芍一錢半川芎當歸各一錢柴胡八分山梔牧丹各四分　瀉清丸當歸草龍膽川芎梔子大黃煨羌活防風芩分為末蜜丸芡仁大每一丸竹葉湯調砂糖化下　洗肝散羌活當歸薄荷防風大黃川芎梔子甘草各一錢或加龍胆一錢　當歸龍薈丸

當歸龍胆山梔黃連黃栢黃芩各一兩大黃盡末青黛各五戔木香二戔半麝香五分為末蜜丸
小豆大干湯下二三十丸　單方山名仁　肝

心

心病虛實心莊脉ミ舍神心虛則悲實笑不休　心病治法虛宜朱砂安神丸神門醒心散實宜瀉心湯導赤散小腸十味導赤散　醒心散人參麥門各五味子遠志茯神生半菖蒲各一戔　瀉心湯黃連為末每五分或一戔温水調下　十味導赤散黃連黃芩麥門半夏地骨皮茯神赤芍木通生半甘草各五分干五　單方梔子清熱煮飲鷄子頓心清熱生吞一枚　竹葉除虛煩煮服

脾

脾病虛實脾莊宮ミ舍意實則身重善肥肉疾懶動虛則腹滿腸鳴飧泄食不化　治法虛宜益黃散補脾湯實宜瀉黃散調胃承氣湯應門　益黃散陳皮一兩青皮訶子肉甘草各五戔丁香二戔為末每二三戔水調下或劑五戔煎服　補脾湯參芩朮甘草炙各一兩半人參白茯苓果乾干炮各一兩厚朴陳皮白朮各七戔半劑每五戔煎服　瀉黃散梔子一戔半薑香甘草各一戔石膏末八分防風六分右蜜酒拌炒煎服　單方五味子收肺氣作茶飲胡桃止喘常服鷄子白清肺生吞桔梗理肺氣調煎服

肺

肺病虛實　虛則臭息不利火氣實則喘喝仰息　治法虛宜補肺散實為瀉白散　補肺散阿膠珠二戔鼠粘子糯米炒各一戔二分馬兜令炒七分甘草炒五分杏仁夫炒九箇　瀉白散桑白皮地骨皮各二戔甘草一戔或加知母貝母桔更梔子麥門生半　單方五味子收肺氣作茶飲胡桃止喘常服鷄子白清肺生吞桔梗理肺氣調煎服

腎

腎病虛實　實則腹大脛腫喘咳身重寢汗虛則胸中痛大小腹急清厥意不樂　治法腎本無病不可瀉左腎屬水ミ不足則陰虛宜腎丸六味地黃丸滋陰降火湯右腎屬火ミ不足則陽虛宜八味丸温腎散　補腎丸龜板酒炙四兩知母黃栢並酒炒各三兩乾干一兩為末煉丸梧子大温酒鹽湯下五十丸血虛陰衰熟羊為君精羊八兩山藥山茱萸各四兩澤瀉牧母白茯各三兩為末蜜丸梧子大温酒鹽湯下五十丸血虛陰衰熟羊為君精滑山茱萸為君心氣不足牧母為君皮膚乾渋山藥為君　滋陰降火湯白芍一戔三分當歸一戔二分熟羊天門麥門白朮各一戔生羊八分陳皮七分知母黃栢並蜜炒甘草各五分干合置火門　八味丸六味丸加肉桂附子各一兩加五味子名曰腎氣丸　温腎散熟羊一戔半牛膝肉蓯蓉五味子巴戟麥門甘草炙各八分茯神乾干杜沖炒各五分　單方五味子温補腎莊作茶飲栗補腎煨常食

六腑膽

膽病虛實　虛則恐畏不能獨卧小眠實則怒多嗌胆病之人善太息口苦嘔苦汁心中澹ミ然動

治法虛宜仁熟散寒半夏湯又小柴湯裏門治小陽寒熱往來　仁熟散栢子仁熟半各一戔人參枳角五味子桂心山茱萸甘菊茯神枸杞子各七分半　半夏湯生半山各仁各五戔半夏生干各三戔遠志赤茯各二戔黃芩一戔煮米一合劉每一兩長流水煎澄清服　單方地黃肥

胃

胃病虛寒　寒則脹虛則宜寒泄平胃散虛宜異功散補中益氣湯內傷不進飲食養胃進食湯　平胃散蒼术二戔陳皮一戔四分厚朴一戔甘草六分干各　異功散人參白术白茯陳皮甘草一戔干各　養胃進食湯蒼术人參白术各一戔陳皮厚朴白茯甘草炙七分神曲麥牙各五分干各　單方青粱米　鯽魚　石魚　大各並胃

小腸

小腸病症　控睾引腰脊上衝心者邪在小腸有氣則小腹痛有血則小便澁有熱則莖中痛病在小腸宜通利用導赤散　導赤散生半木通甘草各一戔竹葉七片　單方木通　栀子　冬瓜汁清熱通水

膀胱

肪胱病症　虛冷則溏瀉上溢多睡小便不禁宜既濟丸熟寒則小腹苦滿小便不利宜五苓散寒門葵子湯　既濟丸免絲子益智仁白茯韭子炒肉蓯蓉當歸熟半各五戔黃栢知母並鹽炒牡蠣山茱萸各三戔五味子一戔為末酒糊丸梧子大鹽湯下百丸　葵子湯葵子赤茯豬苓枳寒翟麥活石

木通黃芩車前子甘草各一戔干五

大腸　在肪胱上

大腸病症　腹痛腸鳴上氣喘息邪在大腸也寒則腸鳴飧泄熱則出黃如糜熱宜瀉白湯寒宜實腸散　瀉白湯生半二戔赤茯芒硝各一戔陳皮竹茹黃芩栀子黃栢各五分干各　單子五倍子石榴皮並澁腸　脂麻油通腸　水芹清利大小腸

三焦

三焦病症　上焦如霧ミ不散則為喘滿中焦如漚ミ不利則為留飲為中滿下焦如瀆ミ不利則為腫滿又曰水穀之道路其病宜通利宜枳角丸　枳角丸枳角二兩陳皮一兩挾即五戔木香二戔半黑牽牛子四兩一半生用一半炒用取頭末一兩半為末蜜丸梧子大干湯下三五十丸

肥

肥人形色　經色紫者風也四物加防風白芷荊芥紫黑者熱甚也四物加黃芩黃連香附淡白者虛而有痰也芎歸湯婦人加人參香附白芍黃芪淡白者亦有水渾之也二陳湯加參蘇飲加芎歸如炮塵屋漏豆汁者濕則傷血ㅇ青宜瀉血不調者宜疏血湯便子附歸丸婦人　調血治法經水或前或後或多或少或逾月不至或一月再至皆不調之故宜調經

森按三品或全或減神仙濟惡且無陰虛之劑醫惡濕痰皆本一也芎歸湯加參香附白芍黃芪淡白者亦有水渾之也二陳湯加芎歸如炮塵屋漏豆汁者濕則傷血ㅇ青宜瀉血不調者宜疏血湯便子附歸丸婦人調血治法經水或前或後或多或少或逾月不至或一月再至皆不調之故宜調經

牡丹皮玄胡索各五分 芍玄胡索各一兩同酒浸四用烏藥二兩同泔浸五用川
芎玄胡索各一兩同水浸六用三稜柴胡同一兩同醋浸七用紅花烏梅各一兩同鹽水浸右各浸春五
日夏三秋七冬十酒乾只取香附為末以浸藥水右糊丸梧子大晾卧酒下八九十丸 血閉經閉有三
因勞心氣火上行月事不來此上焦心肺腑熱結也月事不來先服降心火之劑宜三和湯後以衝生湯
補脾養血氣上迫肺宜導滯降火宜通經湯胃弱血枯經斷宜補中益氣湯內傷 加川芎生半天
花粉正半産後失血多經斷宜十金大補湯虛勞洪疲粘住經斷導痰湯飲疾 加芎黃連氣血盛宜經閉宜
血極育血海虛痛宜烏茱湯瑞金散肝脾畜怒血傷不通宜加味歸脾湯 三和湯乾半白芍川芎
當歸連翹大黃朴硝薄荷黃芩桃子甘草各七分 衛生湯黃芪二戔當歸白芍甘草一戔 通
經湯當歸川芎白芍乾半大黃宜桂厚朴只角只宗黃芩藕木紅花各七分梅一干白 血極膏
大黃為末醋熬成膏九如芡仁大每一九臨卧熱酒化下或加當歸或四物湯煮水下七八十九 烏茱
湯香附二戔烏茱一戔半當歸一戔木香甘草各五分 瑞金散羌黃一戔半牡丹皮蓬术紅花當歸
赤芍川芎玄胡索宜桂各七分水一盞酒半盞煎 加味歸脾湯歸脾湯柿門加柴胡山梔仁各一戔
室女月經不行女子十四歲衝任脉盛血自下若不期不通則宗者血極膏虛者四物湯加蓬术桃仁
牡丹皮玄胡索酒紅花 血結成瘕 任脉為病男子為疝女子為瘕月事不行血結成瘕宜歸术
瘕未盡而咸者 破瘕湯立效散 歸术破 湯香附醋炒一戔半三稜蓬术並醋炙赤芍白芍當歸尾青皮各一
白术伏神乾漆去 戔烏茱七分紅花蘇木宜桂各五分入酒 立效散青皮陳皮烏茱乾干香附蓬术三稜等分剉
胡索有合加羞桂 醋煮焙乾為末陳皮湯調下二戔 血枯脇滿妨食先聞腥臭嗌血目眩宜八物湯虛勞 血崩血
非時下血淋漓不調之 滿非時血下淋瀝不止謂之漏下忽然暴下若山崩然謂之崩中崩漏有三一者脾胃虛損洪熱
瘕亦有產後 半兩薄荷葉各一兩同煎服 熱下迫三者先富後貧大熾血脉三者悉衰太甚肥絡絕也治法悲衰太甚宜備金散四制香附
瘕未盡而咸者 子白伏神各一兩半水煎服 一法五靈脂炒煙盡一兩調服 有鬼仗者加朴硝一兩 通用五積散煮麻黃勿見刺水穀少益服時和醋已有鬼仗者加朴硝一兩
本方加炙連黃柏梔子各一戔名崩急治藥白芷血陽草霜末調服又神香湯煎仗行壯未戔童便調服又參里丸煎仗行壯未飯服又阿膠湯煮一戔水調服又麥門冬湯煎一戔半人參半夏白芍

血枯經閉

四物湯加桃仁紅花多服又入物田五散

婦人腑下連三陰連

惡瘀痒痛不宜便

葶作出百方不效過

四兩青黛二兩同研

付乾則名內服五散

九漬熟下迫紫色腐臭宜涼血地黃湯先富後貧宜養血開胸四物湯胃氣下隔宜并麻陽調經湯益胃升陽湯傷有寒下香膠艾湯有熱涼血地黃湯室女崩漏宜加味逍遙散婦人通用四物湯加荊芥參

芩止血神效急則治其標五靈脂末一戔溫酒調服後用他葶調治失血過多眩暈宜生地芩連湯門血

備金散香附炒四兩當歸尾一兩二戔五灵脂炒一兩為末每二戔醋湯調下　涼血地黃湯羌活柴胡防風

各一戔生芩當歸各五分知母黃栢荊芥細辛薏苡荊子黃芩川芎膏本黃連升麻甘草各三分紅花

一分　開胸四物湯香附當歸身白芍熟芩白术各一戔川芎黃芪蒲黃地榆人參各五分升麻三分　升陽

調經湯柴胡羌活蒼术黃芪各一戔當歸防風升麻膏本甘草各七分薏苡荊子五分獨活三分　丁香

膠艾湯治色如屋漏臍下如水當歸一戔半艾葉一戔三分阿膠七分川芎丁香各五分熟芩白芍各四分

赤白帶下熟入小腸者赤熟入大腸者白又曰赤屬血白屬氣厚其本皆濕熱滲結津液溷溢臍下痛綿

綿而下也肥人白帶是濕痰宜蒼栢樗皮丸瘦人是熱宜芩栢樗皮丸通用四神丸清白散久帶下

陽氣虛挫虛桂附湯朶婦白帶宜芩术樗皮丸室女帶下宜琥珀朱砂丸　通用龍肝散川芎黃芩芍藥當歸白芷白薇白芍

栢樗根白皮海石粉　半夏南星川芎香附乾干芎等分為末醋糊丸梧子大白湯下五七十丸夏去乾

干代活石　芩栢樗皮丸黃芩黃栢樗根白皮活石川芎海石青黛當歸白芍等分為末制水服同

四神丸香附八兩以酒醋鹽水童便各浸二兩過三日乃炒蒼术四兩牡蠣矽仁樗根白皮炒各二兩

上五藥末糊丸梧子大空心陳下五七十丸　蒼根薇衣前代之　赤白帶下地榆三斤水五水四升煎二升每服二合日三又加每斤銀花四兩連翹四兩

又何首烏芡實茯苓根薇衣前代之　赤白帶下地榆三斤水五水四升煎二升每服二合日三又加每斤銀花四兩連翹四兩

九梧子大白湯下五十九　琥珀朱砂九琥珀木香當歸沒葯各四戔乳香二戔麝香朱砂各二分半為末

水糊丸芡實大每一九溫酒磨服　五色帶下傷肝則青如　色傷心則赤如紅津傷肺則白如臭溏傷脾

剛黃如爛瓜傷腎則黑如鼈血宜地榆散　地榆散地榆三兩剉醋一升煮十餘沸空心熱服一合　寒入血室

月經不通遠臍疝痛脉沈宜瑞金散　熱入血室婦人傷寒發熱經水通適來適斷夜則譫語宜柴胡破

疫湯　柴胡破瘀湯柴胡二戔黃芩半夏赤芍當歸生芍各一戔桃仁五灵脂甘草各五分　斷經復行

婦人四十九岁以後天癸當住而却行不止宜子芩丸　子芩丸条芩四兩剉醋浸紙裹煨當歸酒洗香附醋

炒各二兩和丸梧子大酒下五七十丸　葶方百草霜　伏龍肝　艾葉樗根白皮　牡蠣　牛角腮　並治

芥下　治帶　烏賊魚骨　治血枯又通月經療崩漏　水崩漏　為末丸服或末服皆佳　地榆　調血止血　末二兩煮白湯頓服

虫

濕熱生虫濕熱盛積則變生諸虫　蛔厥吐虫心疼而煩時作時止得食而嘔宜烏梅丸胃中冷必吐蛔

宜理中湯寒門加川椒椒即煎水吞下烏梅丸小兒虫痛灵蓼散蛔厥心痛通宜追虫取積散　烏

梅九烏梅十五箇黃連七戔半當歸川椒細辛附子桂心人參黃栢各三戔為末醋浸烏梅取肉和蒸搗匀九梧子大米飲一二十九下　灵犀散五灵脂二戔枯白礬五分并研煎用　追虫取積散蕪荑雷丸錫灰使君子柹即黑丑頭末大黃鶴虱木香芜分為末蜜九麻子大茶湯下二三十九　寸白虫居腸胃中時或自下耗人精氣宜碧金散　碧金散苦練根一兩鶴虱柹即使君子青黛各五戔射香二戔半為末大人三戔小兒半戔猪肉湯調下　一方石灰蕪荑即為末每二戔米飲調下　治諸虫茶諸虫漸滋當破積殺虫宜追虫取積散效應丸追虫丸　效應丸檳榔一兩二戔黑丑三戔大黃雷丸石灰蕪荑木香使君子各一戔葱白湯和丸粟米大每三四戔五更葱湯下寸白虫石榴根皮煎湯下小兒一戔或五分　追虫丸黑丑一兩大黃三戔使君子二戔木香柹即蕪荑石灰各二戔二分為末皂角苦練根煎熬成膏和丸梧子大沈香末為衣又以雷丸末為衣每五十九砂糖水下　勞瘵病症潮熱盜汗咯血痰嗽遺精泄瀉也輕者六症間作重者六症兼作治法一則殺其虫以絕其根本一則補其虛以復真元殺虫宜紫金硇子　一名萬病解毒丹方見解毒　補虛瓊玉膏　與形　凝神飲子　凝神飲子人參當歸白芍白茯神茯苓黃芪白朮半夏曲五味子熟半蓮肉麥門吉更甘草各七分梅一白三　單方意苡根川椒苦練根脂麻油　石榴東根野鴨　並治諸虫扁　槌子　治寸白及諸虫　天門冬生地黃　青盞汁　童便　並治諸虫　芽根濃煎空心服下虫　苦練煎水三合白汝兒細末二匕同化空心服三日虫盡下

小便

小便不利小便渋者血因大燥溲泄之令不行也宜補陰降火四物湯加知栢牛膝甘草梢赤渋欲成淋宜導赤散五苓散小便不通肥移熱於肪胱則癃八正散加木香主之湯而不通者熱在上焦宜清肺散不渇而不通者熱在下焦宜滋腎丸小便不通腑下狀如伏梗痛悶治法有二如氣不能化而不通則陳皮茯苓煎湯調木香沈香末二戔服如血污於下而不通則用桃仁承氣湯之類熱門加減用又猪苓湯通宜五苓散熱門　八正散大黃木通瞿麥扁畜活石梔子車前子甘草各一戔入灯心一團　清肺散猪苓木通各一戔半赤茯澤瀉灯心車前子各一戔扁畜木通瞿麥各七分琥珀五分　滋腎丸黃栢知母並酒洗焙一兩官桂五戔水丸梧子大白湯下百丸　猪苓湯猪苓木通澤瀉滑石枳角黃栢牛膝麥門瞿麥扁畜車前子各七分甘草三分灯心一團　老人癃閉四物湯加黃芪煎水下滋腎丸　癃閉宜吐先隨疟服茶後探吐比如滴水之兒必上竅通而後下竅之水出焉　癃閉宜溏實熱癃閉用八正散大便通則小便自通　轉脬疟轉脬之疟腑下急痛小便不通因尿急疾走或飽食走馬或忍尿入房使水逆氣迫脬不得舒張也宜蒲黃散葱白湯朵婦轉脬睞利不效則當令胎系自舉宜參术湯　蒲黃散蒲黃滑石等分為末每二戔鷄子清調下　葱白湯陳皮一兩蒌子三戔葱白三莖　參术飲四物湯料加人參白术半夏陳皮甘草各一戔干白煎服後探

吐之 一方葵子梔子沽石各五戔木通三戔煎服外以葵子梔子沽石為末生葱汁或田螺肉搗膏貼臍中 又法令產婆以油沫手入產門托起其胎尿出如注又將孕婦倒豎胎自隆轉尿出勝於手法 關格症陰陽易位病名關格寒在胸中水漿不下故曰格熱在丹田小便不通故曰關實者大氣承湯門壅虛者補中益氣湯傷內加柴即痰格者二陳湯痰飲探吐 小便不通外治法陰陽熨法治轉脬及二便不通先以冷物熨小腹幾次後以熱物熨如前數又以冷物熨之自通 又葱白三斤搗炒熨臍下 又田螺生搗封臍 又葱白十飲根和鹽搗填臍中以艾灸之 又白礬白鹽各二戔半研勻以紙圈圍臍填葇其中滴冷水葇上最效 小便不禁肪胱不約為遺尿又曰不禁色赤為熱色白為虛 熱宜五苓散合黃連解毒湯并寒門 虛宜大味丸五並去澤瀉加益智仁虛冷不禁遇夜愈多宜秘真丸精門 家韭子元產後遺尿宜猪脬湯小兒遺尿宜鵝胞脛散家韭子元韭子炒六兩鹿茸四兩肉蓯蓉牛膝並酒洗熟羊當歸各二兩兔絲子酒蒸巴戟各一兩半杜沖石斛乾干炮桂心各一兩為末酒糊丸梧子大溫酒鹽湯下百丸 猪脬湯治產後脬破不禁人參白朮各三戔桃仁陳皮黃芪白茯川芎當歸各一戔入猪脬或羊脬同煎久用 鵝胞脛散鵝胞脛一个鵝腸一个燒存性猪脬炙炒為末一戔酒調下 諸淋疝諸淋昕發以腎虛而肪胱有熱也膏血砂石從小便出欲出不出淋瀝不斯令人悶絕腎虛極而淋者當補腎精而

無利小便諸淋皆屬于熱雖有冷淋蓋千百之一也淋而小腹脹滿者宜瀉腎湯諸淋宜四物湯加甘草梢木通活石木香煎湯吞下滋腎丸 勞淋勞傷虛損則發四物湯加知栢活石琥珀忍欲不泄成淋六味丸澤瀉為君 血淋小便血出疼痛四物湯加知栢澤瀉赤茯宜增味導赤散 增味導赤散乾羊木通黃芩車前子梔子川芎赤芍甘草各一戔千三竹葉十片 熱淋暴淋尿赤淋瀝通甚宜八正散 氣淋小便澁滯常有餘瀝小腹脹滿宜通秘散 通秘散香附陳皮赤茯各 石淋莖中痛引小腹尿下砂石令悶絕宜益元散 膏淋尿出如膏莖中澁痛宜鹿角霜丸 鹿角霜丸鹿角霜白茯苓秋石等分為末糊丸梧子大米飲五十丸下 海金砂散海金砂活石各一兩甘草二戔半為末每一戔麥門灯心煎湯調下 二神散海金砂七戔半汉淋陰莖有汉溢痛火熬津液凝結輕則為砂重則為石宜二神散琥珀散活石五戔為末每二戔以木通麥門車前子草煎湯入蜜小許調下 琥珀散琥珀滑石各二戔木通當歸木香蟲金扁畜各一戔為末每三戔以燈蘆葉竹葉湯調下 冷淋必先寒慄小便澁數宜八味丸五並諸淋通治通用瀉腎湯五淋散琥珀散婦人產後淋宜茅根湯婦人 瀉腎湯燕治小腹脹急大黃二戔別水浸一宿磁石碎一戔六分菖蒲生羊各一戔玄參細辛各八分羌硝赤茯黃芩各六分甘草四分水二盞煎至一盞半入大黃煎至七分厂羌硝 五淋散赤芍山梔各二戔當歸赤茯各一戔條芩甘草各

五分　赤白湯小便濁主溏熱有痰有虛赤屬血白屬氣與痢疾帶下同治肥人多溏痰宜星半蛤粉
丸瘦人是虛血四物湯加知母黃栢通宜加減珍珠粉丸導赤湯　星半蛤粉丸蛤粉二兩南星半夏青
代蒼朮各一兩為末干汁打神曲糊丸梧子大干湯下五十七丸　加減珍珠粉丸燕治白濇黃栢半生半炒
蛤粉各三兩活石二兩檳根白皮一兩青代乾干炒各五戔神曲糊丸梧子大溫酒下七八十丸　導赤湯木
通活石黃栢赤茯生苄梔子甘草梢各一戔只角白朮各五分　衰病白濇訂詳精門小腹寬熟而痛瘦出
白漿病名曳宜薤蒼丸　肉薤蒼丸肉後蒼白茯黃芪澤瀉牡蠣粉五味子龍骨當歸各一兩蜜
丸梧子大酒下三十丸　脬脾疝脬脾者小腹按之內痛渋于小便上為清滓屬風寒溏宜溫腎湯
溫腎湯赤茯白朮澤瀉乾干炮各一戔三分半　並中痒痛童子精末盛而御女老人陰已痿而思色
精不出而內敗並中痛渋而為淋八味丸五並加車前子牛膝精竭不痛並痒者八味丸熟盛燕渋
導赤散五並加梔子大黃　交腸症婦人小便中出大便名交腸此陰陽失於傳送先服五苓散又
用補中益氣湯　飲後即小便由精氣不輸於脾宜補中益氣湯　草方浮名治砂淋車前
草木通梔子榆白皮　冬瓜汁並治淋渋猪胆治癃用熱酒調服又並並頭使汁入猪脬鷄腸及脛裏黃皮益智仁
牡蠣並治淋渋不禁

大便

泄症有五胃泄者飲食不化色黃宜胃風湯脾泄者腹滿泄注食則吐逆宜胃苓湯大腸泄者食已
窘迫腸鳴坊痛宜五苓散寒門小腸泄者溲渋而便濃小腹痛宜芍藥湯大瘕泄者裏急後重
數至圊而不能便並中痛宜大黃湯　胃風湯人參白朮赤茯當歸川芎白芍桂皮甘草各一
戔入粟米一撮　胃苓湯蒼朮厚朴陳皮豬苓澤瀉赤茯白芍各一戔官桂甘草各五分干白
泄瀉諸症凡泄皆無溏先當分利水穀次則理正中焦不效然後方可斬下大便完穀不化
小便清白身冷不渴脉微而遲者皆寒症反此者熱症也通用三白湯燥溏湯　三白湯白朮
山茱萸肉豆蔻肉各白芍各一戔半甘草灸五分　燥溏湯三白湯加陳皮一戔防風各　溏泄即濡泄亦名洞泄其
症如水傾下腸鳴身重腹不痛胃苓湯加草豆久主之身痛五苓散寒門加羌活蒼朮亦宜萬病五
苓散　萬病五苓散赤茯白朮豬苓澤瀉山茱陳皮蒼朮砂仁肉豆久謂子各八分桂皮甘草各
五分干三梅一灯心一團　風泄惡風自汗或帶清血因風邪入於腸胃宜胃風湯加桂枝麻黃
寒泄惡寒腹痛腸鳴鴨溏完穀不化理中湯寒門加赤茯厚朴又宜附子溫中湯　附子溫中湯附
子乾干並炮一戔半人參白朮白茯白芍甘草灸一戔厚朴草豆久燥陳皮各六分　暑泄煩渴尿
赤暴瀉如水宜薷苓湯加白芍又宜清六九　薷苓湯澤瀉一戔三分豬苓赤茯白朮香薷黃連
白扁豆厚朴各一戔甘草三分　清六九益元散加神曲五戔陳米糊丸梧子大白湯下五七十

九　火泄即熟泄也口乾喜冷痛一陣瀉一陣其來暴速宜萬病四苓散　萬病四苓散赤茯白朮猪令澤瀉蒼朮山茶白芍椵子陳皮各一戔甘草炙五分梧一灯心一團　虛泄困倦無力遇食則瀉或腹不痛水穀不化宜參苓連朮散養元散　參苓連朮散人參白朮白茯山茶連肉陳皮各一戔砂仁薑香謂子肉豆久乾干甘草炙各五分梅一灯心一團　養元散糯米一斗浸透炒山茶一兩胡椒小許為末砂糖湯調下或加連肉炙仁尤好　滑泄滑泄不禁大孔如箇元氣大陷宜補中益氣湯加白芍訶子肉豆久又宜固腸丸實腸散　實腸散厚朴一戔半肉豆久訶子砂仁陳皮蒼朮赤茯各一戔木香甘草各五分干台　飧泄清氣下降或風邪于胃失沖和之氣故不能化而令物完出亦渭水穀痢宜加減木香湯防風芍茶湯　加減木香散木香良干升麻梹郎人參白朮各三戔半神曲二戔肉豆久吳茱萸乾干陳皮砂仁各五分為麤末每五戔煎戔黃芩一戔　痰泄時瀉時止或多或小二陳湯加乾薑白朮神曲虛者六君子湯　痰飲食積泄而腹痛瀉後痛減臭如敗卵噫氣吞酸宜香砂平胃散內傷去枳實加白朮白茯　酒泄飲酒後特甚平胃散五加減乾葛神曲麥牙砂仁丁香為末米飲調下二戔　脾泄面色萎黃腹滿宜香砂六君子湯內傷久傳腎為腸澼經年不愈者宜調中健脾丸　調中健脾丸白朮破故紙炒訶子肉豆久並煨各一兩赤茯陳皮各八戔黃連以吳茱萸煎湯炒七戔神曲六戔木香厚朴面香炒砂仁山茶蓮肉各五戔糊丸梧子

大蓮肉湯下七十九　腎泄一名晨泄一名瀼泄每五更糖泄一次此腎虛感陰氣而然宜五味子散二神丸四神丸三神丸六神湯　五味子散五味子二兩吳茱萸五戔並炒每二戔米飲調下　二神丸加木香一兩名　三神丸合五味子散名　四神丸破故紙炒四兩肉豆久二兩為末石四十九介干四兩切片同煮去干取白肉和丸梧子大鹽湯下五十九　六神湯肉豆久破故紙白朮白茯各一戔半木香甘草炙各七分干台

暴泄大腸不能禁固卒然而下大便如水中有結糞小便清利治宜溫之理中湯寒門主之　久泄多因真陰虛損元氣下陷若非補中益氣湯四神丸之類滋其本源則後必脅痞腹脹宜實腸散傅愛欲成痢以厚朴枳實湯防之　厚朴尺實湯厚朴訶子皮枳實各二戔木香一戔大黃六分黃連甘草各四分　泄瀉宜升陽客邪寒濕之勝治當滲利然全用利茶則降之又降益其陰而瀉其陽宜以升陽之劑舉之羌活獨活升麻防風各一戔半甘草炙一戔　久泄成痢太陰受濕為泄身重腹滿不知穀味必變為痢赤痢赤痢屬血自小腸來濕熱為本即血痢也宜導赤地榆湯地榆當歸身酒洗各一戔半赤芍黃連黃芩並酒炒槐花炒各一戔阿膠珠荊介穗各八分甘草炙五分干台　加減平胃散白朮厚朴陳皮各一戔二分桃仁人參黃連阿膠赤茯各七分甘草九分木香梹郎各五分干台　固腸丸去腸胃陳積之後用此以斬之樗根白皮焙乾為末粥丸梧子大米飲下三十九　白痢白痢屬氣自大腸來濕熱為本俗以痢白痢白為寒誤也宜益元散暑門溫六丸瀉白安胃飲　溫

六丸益元散一劑加乾干末一兩飯丸梧子大白湯下五七十丸
半人參陳皮白茯黃芪蜜炒當歸酒洗各五分木香乾
宜茱連丸小肚車元固腸湯真人養腸湯　茱連丸吳茱萸黃連各二兩以好酒同浸三日各揀取焙
乾為末醋糊丸梧子大赤痢則黃連九三十粒以乾干湯吞下白痢則茱萸九三十粒以乾干湯吞下赤白
痢則各取三十粒以甘草乾干湯下　小肚車元黃連三兩阿膠珠一兩半當歸一兩乾干五戔為末醋糊
丸梧子大米飲下三五十丸　固腸湯鬻粟殼醋炒二戔白芍一戔半當歸甘草炙各七分半陳皮訶子乾
干各五分人參木香各三分　真人養腸湯鬻粟一戔甘草九分白芍八分木香七分訶子六分當歸人參
官桂白朮肉豆炙各三分　水穀痢與飧泄同　膿血痢膿血稠粘裏急後重皆屬於火行血則
便膿自愈調氣後重自除芍茱湯主之漬渋而便膿血宜大黃湯下之黃芩芍茱湯和之紫黑色者疾血
也桃仁承氣湯下之宜導氣湯入參散　芍茱湯白芍二戔黃連茶芩當歸尾各一戔大黃七分木香槟
即桂心甘草各五分　大黃湯大黃一兩酒二盞浸半日煎半分二次用　黃芩芍茱湯黃芩白芍各二戔甘草
一戔或加桂心三分　導氣湯當歸二戔半大黃三芩白芍各一戔黃連木香槟即各五分　人參散治久痢槟根
白皮人參各一兩為末每二戔米飲調下　噤口痢不納食飲謂之噤口頭疼心煩聞食先嘔此過飲渋茱之致宜
倉廩湯開噤湯　倉廩湯人參敗毒散寒門加黃連一戔石連肉七枚陳倉米三百粒干乙　開噤湯砂糖

七戔細茶五戔砂仁一戔干五煎露一宿温服　休息痢不作不止過年不差以致氣血虛極八味湯虛勞加
陳皮阿膠芩連胃虛補中益氣湯參芩白朮散並傷內
珠等分蜜丸梧子大厚朴湯下五十丸　風痢惡風臭塞純下清水宜胃風湯　寒痢白如鴨溏腸鳴
不甚痛隧宜理中湯寒門加訶子肉豆久　濕痢腹脹身重下如黑豆汁比危疝宜加味除濕湯　加味
除濕湯半夏厚朴蒼朮各一戔二分薑香陳皮赤茯各七分木香桂皮甘草各五分干乙　熱痢即暑
痢九痢多因伏暑鹵乾燥渴宜酒蒸黃連九血門黃芩芍茱湯烏梅九　烏梅九黃連一兩半烏梅肉
當歸尸角各一兩醋糊九米飲下七十九　氣痢狀如鱉渤最甚拘急宜茱連九　虛痢虛滑不禁氣
血俱脫血虛四物湯加人參白朮地榆槐根白皮血虛真人養腸湯　積痢出於積滯黃如魚腦腹膿惡
食射香蘇合元用芍茱湯或加味除濕湯或干茶湯調下　久痢下痢日久穢積已盡當以固腸九斬下
宜真人養藏湯養元散木香散　木香散甘草炙一兩木香黃連同炒鬻粟殼生干同炒各五戔為末入
射香小許米飲調下二戔　疫痢一方一家之內傳染相似人參敗毒散加陳皮白芍或干茶湯以防之
干茶湯通治諸痢生干茶芽等方　蟲痔痢毒氣蝕於脏腑下血如雞肝雜膿發渴五內功痛此因多
服五石血自經絡而來以茜根九茜根屑角升麻地榆當歸黃連只角白芍等分醋糊九梧子大
米飲下七十九　五色痢五色俱下乃脾胃食積及四氣相併以茱連九救之　痢疾腹痛下痢腹痛不可用

參芪須以白芍甘草為君當歸白朮為佐惡寒加桂惡熱加黃栢宜香連九干葵湯　香連九無治諸痢黃連一兩吳茱萸五戔水浸一宿同炒去茱萸木香二戔半醋糊梧子大米飲下三十九　痢疾裏急後重下墜異常必是先血用桃仁活石行之虛坐督責此為亡血倍用當歸佐以生芍芍茱桃仁陳皮血生自安　痢疾大孔痛此大虛之疝灸枳窒熨之須用補劑又并藥黃蠟訶子同燒烟熏之又炒鹽熨之又葱椒擣爛塞大孔并服固腸之劑　痢疾宜下初得二日間必推蕩之宜承氣湯之類五六日後不可下　痢疾通治宜水煮木香煮木香膏和中飲　水煮木香膏鷰粟殼蜜炒三兩砂仁肉豆久煨乳香各七戔半木香丁香訶子藿香當歸黃連厚朴陳皮青皮白芍甘草灸各五戔枳窒乾干各二戔半蜜九彈子大每一九水一盞召一枚煎至七分去召和滓服　和中飲鷰粟殼醋炒一戔半陳皮白朮赤茯赤芍各一戔草果七分甘草三分砂糖三戔陳倉米二戔梅三干召　飯後隨即大便蓋脾腎不能交濟二神九鹽湯下　大便秘結津液虧小故大便燥結胃實而秘者能飲食小便赤宜滌ㇾ腸胃如脾約九承氣湯寒門之類主之胃虛而秘者不能飲食小便清利宜滋血潤燥湯之類是也風燥宜疎風潤腸九血燥宜從沈九當歸潤燥湯通幽湯氣滯搜風潤腸九四磨湯六磨湯　疎風潤腸九麻仁二兩半桃仁二兩皂角燒存性一兩三戔大黃羌活各一兩防風當歸各三戔蜜九梧子大白湯下七十九　從沈九肉從蓉二兩沈香一兩為末麻仁汁打糊九梧子大米飲下七十九　當歸潤燥湯一名潤燥湯當歸

大黃熟半桃仁麻仁甘草各一戔生半升麻各七分紅花二分先取七味煎將至八兩入桃仁麻仁煎半分　搜風潤腸九郁李仁一兩木香檳即青皮陳皮沈香蘿當子炒楓角枳角枳窒三枝煨大黃各五戔蜜九梧子大米飲下七十九　四磨湯加大黃枳角名六磨湯檳即沈香木香烏药芽分水磨取汁煎三五沸　老人秘結津液小乘以秘宜疎風順氣元蕪麻粥三仁粥　疎風順氣元並治火年諸秘大黃酒蒸五兩車前子炒二兩半郁李仁檳即麻仁炒鬼絲子牛膝山茱萸各二兩枳角防風獨活各一兩蜜九梧子大米飲下七十九　蕪麻粥並宜產後秘蕪子麻仁芽分同磨取汁入米泔心小許同煮粥　三仁粥桃仁海松子仁各一合郁李仁一戔同磨取汁入米泔煮粥　脾約疝傷寒陽明病自汗小便數則津液內渴大便必難其脾為約脾約九主之虛者不可輕用　脾約九並治凡人脾約大黃蒸四兩枳窒厚朴赤芍各二兩麻仁一兩半杏仁一兩二戔五分蜜九梧子大溫水下五十九　大便不通腸受風燥閉塞脹急熟者三黃湯冷者及宿食宜脾積九風秘宜脾約九氣不下降吉更枳角湯膏門凡不通疝用承氣湯之類不通者四物湯加檳即只角桃仁紅花老人虛人宜潤腸九外治提金散　脾積元蓬术一兩半三稜一兩青皮五戔良干醋煮焙木香百草霜巴豆霜二戔半糊九麻子大橘皮湯下七十九　潤腸九當歸生芍只角桃仁麻仁芽分蜜

九梧子大米飲下五十九　潤腸湯蜂蜜一兩香油五戔朴硝一撮合水煎數沸用　提盆散草烏細末葱一枚　去根其頭有汗麪草烏末納肛門即通　大小便不通陰陽関格乃三焦約之病也宜三日尽氣湯憲門枳角九五腓顛倒散並用外治　顛倒散大黃活石皂角各三戔小便不通倍活石大便不通倍大黃為末每三戔酒調下　畧腑法治三便不通白礬末一匙安腑中冷水滴之又大田螺二介和鹽連売搗置腑下一寸三分包繫　導便法入蜜熬入皂角末小許作錠納肛門又猪胆汁和醋灌入穀道中又口含香油以小竹筒入肛門吹油入肛内　單方黃土水牛角鰓石榴皮並治泄痢桃花杏油秘蜜治痢疾和干汁用

頭

頭風疕宜消風散川芎多調散菊花多調散欲綿帕包裹者熱盃也二陳湯加酒芩荊介川芎薄荷石膏細辛婦人頭風宜養血祛風湯　消風散荊芥甘草各一戔人參茯苓白干蚯川芎防風薤香蟬退羌活各五分陳皮厚朴各三分入細茶一撮　菊花茶調散甘菊川芎荊芥羌活白並甘草各一兩防風七戔半細辛五戔蟬退白干蚯薄荷各二戔茶清調下　養血祛風湯當帰川芎乾羊防風荊介羌活細辛膏本石膏蔓荊子半夏旋覆花甘草各五分干白眩暈諸疕眩暈皆稱為上實下虛蓋虛云者氣與血也宗云者痰泄風炎也　風暈傷風自汗或素有頭風而發宜芎藭散　芎藭散川芎一戔當帰七分半羌活旋覆花蔓荊子細辛石膏藁本荊介半夏曲熟半防風甘草各五分干二　熱暈火熱上攻煩渴宜荊黃湯　荊黃湯大黃酒炒荊介防風各二戔　痰暈痰盛嘔吐頭重不舉眩而悸宜天麻半夏湯天麻半夏各一戔陳皮柴胡各七分黃芩白茯前胡甘草各五分黃連三分干三　氣暈七情過傷氣血生涎眉稜骨痛眼不可開宜補虛散　補虛飲人參麥門冬柴各一戔白茯茯神各八分半夏黃芪各七分前胡熟半各五分枳角遠志甘草各三分干五　虛暈內傷虛挺而發宜補中益氣湯傷飲失血過多宜芎帰湯　芎帰湯入宜滋陰健脾湯　滋陰健脾湯心脾虛損嘈雜不寧有痰有火無治之白朮一戔半陳皮鹽水洗去白半夏白茯各一戔當帰白芍乾羊各七分人參茯神麥門遠志各五分川芎甘草各三分干白　濕暈冒雨傷濕而發宜芎朮湯　芎朮湯川芎白朮半夏各二戔甘草五分干七　頭目不清利此由風熱濕痰畜于精明之府宜防風散　防風散防風川芎白並甘草甘菊各一兩為末茶清調下二戔　正頭痛手三陽從手走頭足三陽從頭走足是六陽之脉俱上于頭面也頭痛多在三陽罕見三陰頭痛蓋由風痰而甚者火多也通宜川芎茶調散並治偏正頭痛及頭風薄荷二兩川芎荊介各一兩羌活白並甘草各五戔防風細辛各二戔半為末茶清調下二戔或剉取七戔入茶少許煎又以葱泥調茶在左四物湯加防風荊芥薄荷細辛蔓荊子柴胡酒芩通用二陳湯加川芎白並防風荊介薄荷酒芩在左四物湯加防風荊芥薄荷細辛蔓荊子柴胡酒芩通用川芎茶調散川芎散年久便燥目赤者大承氣湯寒門下之外用大黃芒硝為末井泥調貼兩太陽穴　川芎

散甘菊石膏川芎白干姜各六戔為末茶清調下三戔　風寒頭痛風寒邪客於經絡令人振寒頭痛宜芎辛湯芎並香豉散寒門　芎辛湯川芎三戔細辛白朮各一戔半甘草一戔干五茶少許　濕熱頭痛濕熱在膈心煩頭痛宜清空膏又用吐法　清空膏黃芩三兩半生半酒炒甘草炙一兩半防風羌活黃連酒炒各一兩柴胡七戔川芎五戔為末茶清調下二戔臨卧用　厥亦頭痛大寒犯腦頭痛齒亦痛宜羌活附子湯　羌活附子湯麻黃附子防風白並白干姜炒各一戔黃柏羌活蒼朮各七分黃芪升麻甘草炙各五分　痰厥頭痛每發時目不欲開身体沈重九竅欲吐宜半夏白朮天麻湯芎辛導痰湯　半夏白朮天麻湯半夏陳皮麥牙各一戔半白朮神曲各一戔蒼朮人參黃芪天麻白茯澤瀉各五分乾干三分黃柏二分干五　芎辛導痰湯半夏二戔川芎細辛南星陳皮赤茯各一戔枳角甘草各五分干七氣厥頭痛氣血虛而邪氣迸上九竅不利太陽亦甚氣虛黃芪益氣湯血虛當歸補血湯　黃芪益氣湯黃芪蜜炙一戔人參白朮半夏陳皮各七分當歸酒洗川芎藁本甘草各五分黃柏酒炒升麻細辛各三分干白　當歸補血湯乾羊酒洗白芍川芎當歸尾芩酒炒各一戔防風柴胡蔓荊子各五分荊介藁本各四分　熱厥頭痛煩熱頭痛雖冬天猶喜風寒則輟止熱則痛甚宜清上瀉火湯　清上瀉火湯柴胡一戔羌活八分酒芩知母各七分酒黃柏甘草黃芪各五分生羊酒黃連藁本各四分升麻防風各三分半蔓荊子當歸身蒼朮細辛各三分荊介川芎甘草各三分酒紅花一分　濕厥頭痛胃雨傷濕頭重眩痛遇陰則甚宜芎辛湯　頭痛當分六經　太陽頭痛惡風寒脈浮緊宜羌活獨活麻黃川芎之類小陽頭痛往來寒熱脈弦而細宜柴胡黃芩之類陽明頭痛自汗發熱脈緩長宗宜乾葛升麻石膏白芷之類太陰頭痛有痰身重脈緩而沉宜蒼朮半夏南星之類　小陰頭痛足寒氣逆脈沉而細宜麻黃附子細辛陽寒門　厥陰頭痛吐痰厥冷脈浮而緩宜三味參附湯　三陽合病頭痛宜三陽湯　三陽羌活防風石膏白芷柴胡川芎各一戔荊介升麻葛根芍藥細辛各五分葱白三根　腦風疝項背怯寒腦戶極冷宜神聖散　神聖散麻黃細辛葛根藿香各一兩為末每二戔荊介薄荷酒調下　首風症新沐中風頭面多汗惡風每當先風一日病甚頭痛宜大川芎丸　大川芎丸川芎四兩天麻一兩蜜丸彈子大每一丸細嚼茶酒下眉稜骨痛目不可開晝靜夜極宜芎辛導痰湯如白朮川烏又宜選奇湯　選奇湯羌活防風半夏各二戔酒芩一戔半甘草一戔干三　風頭旋別無疾痛頭虛自撓不自覺知乃肝風感也治同頭風　擂鼻法治諸頭痛乳香沒藥川芎石雄白芷各二戔芒硝五戔為末令病人仰卧舍涼水取藥小許嗑入鼻內名六聖散又皂角末或硝石末吹入鼻中偏頭痛藿香汁一覰殼仰卧注鼻中左痛注左右俱痛注神效　吐法疾盛脅煩頭痛難當以苧蒂散吐之又單煮茗飲一二升探吐不損人　單方甘菊茶　並清頭目　葱白發散風寒　蘿蔔

取汁嗑鼻治偏正頭痛　研爛取汁入白芷川芎末各三戔煨烟熏人頭痛取汁飲　蘿蔔子　研爛取汁治同蘿蔔　牛腦髓　酒煮熟服最效

面

面病專屬胃大陽之經皆上頭面其中陽明經維絡面上故面病專屬於胃或風熱乘之則變生諸病隨症治之

面熱胃熱上熏獨燎其面升麻葛根湯 痙門加黃連犀角白芷荊介川芎薄荷 面寒胃有寒濕面不能耐寒升麻葛根湯加附子白芷黃芪人參草豆久益智仁 面戴陽諸病面赤浮火所衝也不可用涼藥當發表自愈宜用葱白以通陽氣 胃風疙即面腫飲食後當風以致宜升麻胃風湯 升麻二戔白芷一戔二分當歸葛根蒼朮各一戔甘草一戔半麻黃當節五分柴胡羗活半夏各三分草豆久各三分蔓荊子二分干姜 搭臆腫因風熱及膏粱積而作宜升麻胃風湯或荊防敗毒散 痙門加味消毒飲荊介防風惡實甘草連翹羌活各一戔

末難子清調貼又石灰醋調付 加味消毒飲荊介防風惡實甘草連翹羌活各一戔 面生雜病面生熟毒瘡癤瘍宜升麻胃風湯清上防風湯 清上防風湯防風一戔連翹白芷吉更各八分酒芩川芎各七分荊介桃子酒黃連枳角薄荷各五分甘草三分煎後竹瀝五匙 葷方白蘞 酒調塗面治面上雜病

干汁 調輕粉付之 滅傷痕

婦人面凡時疳

眼

目睛屬肺黑睛屬肝上臉屬脾下臉屬胃大小眦屬心瞳人屬腎

眼目暴赤原已氣惱傷于 眼病所因皆屬風熱及血衰神勞腎虛又曰脾病 心肺二經曰風則淚出虛煩則眼昏勞力則皆赤 內障肝病也在睛裡昏暗與不患之眼相似但瞳人裏有隱

久生翳大半 翳在內障者肝病也白珠紅筋昏障者肺病也上下眼胞如桃者脾病也迎風出淚坐有外感內傷也肝窠赤也心窠赤也肺窠白也脾窠黃也腎窠黑也有外感內傷也肝窠赤也心窠赤也肺窠白也脾窠黃也腎窠黑也凡中惱之症法隱青白者無隱隱青白者亦有之又曰外無翳膜因腦脂下凝胎珠轉白或如金色或菜豆色或如雲頭上動胃沙 烟或見五色治此外障更難屬血少神勞腎虛也宜養血補水安神以調之宜益陰腎氣丸滋腎明目湯羊肝元 益陰腎氣丸熟羊二兩乾羊酒洗山茱萸各一兩五味子山藥牧丹皮柴胡當歸尾羊肝元黃連為末羊肝一具去膜砂盒內同研細衆手作丸梧子大溫水下三十丸進進五六劑 內障諸醫有圓醫水醫滑醫澁醫散醫橫開醫浮醫沉醫偃月醫棗花醫黃心醫黑花醫胎患凡五變初起生胎久久不散遂有石外感內傷也 雷頭風驚振綠風為風黑風青風等症或痛或不痛然間多難辨之症蒙當問其受傷診其脉候法仕宜先去醫要去醫之醫難法 察障醫形色然後選用補肝散通肝散八味還睛散涼膽元羚羊角丸等劑而八味還睛散為內外障主治耳其中胎患漸成白花無治法肝虛雀目高風雀目肝虛目暗立余于下 肝虛雀目日落不見物曰脾血少時或花起年深則盲小兒因痘得之宜光雀盲散又雀頭取血点眼 高風雀目緩至黃昏便不見物大人肝木衰而得之宜還睛丸 肝虛目暗宜補肝散與眼昏同治 補肝散治圓醫昏花柴胡一戔半白芍一戔熟羊白茯甘菊細辛甘草各七分栝子仁防風各五分 通肝散治氷醫山梔子白蒺藜只角荊介連翹內退火也多錯認此條不須用 甘草各五戔車前子鼠粘子各二戔半為末炒葉湯下二戔 八味還睛散治內障諸疳草決明一兩白蒺藜防風木

賊梔子甘草各五戈蟬退青箱子微炒各二戈半為末麥門湯菊花湯下二戈　凉膽元治黑花醫防風芎會各一兩黃連
黃芩荊介草龍胆各五戈地膚子黃栢各二戈半蜜丸梧子大薄荷湯下三十丸　羚羊角丸治綠風羚羊角一兩石決明草　水瑕
決明車前子犀角各七戈半獨活防風蔓荊子甘菊藍宗梔子甘草各五戈蜜丸梧子大溫水下三十丸　崔耳散搐肝竹　深醫
刀挑開入夜明砂札縛煮以米泔嚼肉以汁送下或煮猪作凡　黑水
炒入參細辛防風白茯甘菊栢子仁川芎各一兩蜜丸梧子大溫水下三十丸　外障肺病也在睛外遮睛從上而下屬太　玉醫
陽必眉稜骨痛或腦項痛治宜散之宜逆奇湯之類頭卻從下而上者或從肉而外者皆屬陽明其疕多熱便宗治宜寒　浮滿
之下之宜瀉青丸之類腧從外而內者屬小陽治宜和解之宜神仙退雲之類　外障諸疕肝藏積熱赤腫痛澁忽生翳　黑珠
瞼初患一目漸延兩目宜石決明散蟬花散　混睛痛痒羞澀目如凝脂宜地黃散　努肉犖睛赤爛多年皆生努肉宜　玉色
速效散　兩臉粘睛此乃爛弦或痒或痛宜防風通聖散去硝黃酒製服点以爐甘石散洗以驅風散又鍼刺目眶出血　不痛
妙　瞼入水輪黑珠瘡痕浸入水輪　瞳人乾缺睛澁無淚疼痛黑白　小兒青盲胎中受風視物不明　上三症　不紅
醫根深瞼如銀釘根入黑睛宜石決散点之　黑翳如珠如小黑豆腎受風熱宜羚羊角散　花翳白隔白如花　血治法　味辛
肝肺積熱宜羚羊角散点磨翳膏　翳順逆生醫上順下逆順易逆難宜車前散点磨翳膏　鷄冠覜肉生　釘　散
在臉內睥經受熱宜石決明散外以胡胆草輕輕刮去將藥点之　瞼生風粟瞼生如粟或赤或白宜消毒飲　古青
臉赤翻出睥受風毒宜消毒飲　神祟疼痛旧無根因忽然痛剌宜石決明散　旋螺尖起醫膜尖起形似
以針挑之　胞肉膠凝胞腫如桃睥家風熱宜消風散　渴睛瞳出皆瘡流膿無醫無

痛宜黃芪散及点藥　蟹睛疼痛如大豆子出黑珠上宜羚羊角散及点藥　突起睛高風熱蘊積眼珠
突脹黑睛脹宜龍胆散白睛脹宜清肺散又拌水灌眼中　風起喎偏　偏風牽引兩目喎斜宜消風散　頸
倒睫拳毛眼皮漸急睫倒剌痛宜明目細辛湯針出熱血以左爪甲迎住針鋒立愈又摘去拳毛　風牽瞼出
臉赤翻出睥受風毒宜消毒飲　神祟疼痛旧無根因忽然痛剌宜石決明散　旋螺尖起醫膜尖起形似
旋螺宜石決明散　轆轤轉閃風入眼帶瞳人牽下宜天門冬飲子　被物撞打瞳人被驚漾漾留瘀貼地黃
膏眼石決明散撞打睛出帶未斷即推入瞼中生竿細椅厚付之無眼地黃散　撞剌出醫生醫疼痛或
兼風熱先眼經效散次眼石決明散　血灌瞳人瞳為血灌痛剌不明宜車前散　睒目飛塵飛絲坐埃入目
隱渋不開宜濃磨好墨新筆蘸入目中閉小時自成塊着在睛上以綿輕輕惹下未盡再点又牛筋撓擘如
絲着睛上輕絞之　天行赤目忽赤瞳長幼長似宜石決明散救若湯以洗眼湯洗之地黃膏貼之　赤眼後生医白
睛紅花漸成醫膜宜貼地黃膏眼洗肝湯　胎風赤爛小兒初生弦爛痒痛宜消風散　頭　風赤
瘡疾瞼似抹朱黑睛端然宜消風散洗以湯泡散　衝風淚出風熱相搏淚出消消宜當歸龍膏丸五又四物
湯加木賊防風甘菊白芷　暴風客熱風熱所攻白睛起障宜清肺散　瞼硬睛痛瞼內紅硬睛疼淚出宜通肝散及
膏藥　痛如針剌睛忽痛剌目根緊急宜八味還睛散　痒極難任瞳子及胥痒極難任宜驅風一字散
黃膜上衝膜衝痛澁睥風食毒宜犀角飲　赤膜下垂膜垂遮睛望風淚出宜通肝散　小胥赤脉小胥生

赤漸漸衝眼宜羼甸飲　小兒通睛觀東見西小兒肝風宜牛黃丸　小兒胎中生瞽豆懸宜消風散　頭部　偷
鍼眼生小疱細紅如瘡宜鍼刺即差故為名南星生芊向研貼太陽拔去睫毛　神仙退雲丸治一切內外障瞽聾
酒洗一兩半川芎木賊便浸焙蜜炙花荊介地骨皮白蒺藜甘菊羌活各一兩川椒炒七戔半瓜蔞根枳殼蔓荊
子薄荷草決明炒甘草各五戔蛇蛻蟬蛻黃連各三戔蜜和兩作十丸茶清或溫水化下一丸　石決明散治一
切風熱障翳石決明煅草決明各一兩羌活梔子木賊青箱子赤芍藥各五戔大黃荊介各二戔半為末二
戔半式每次麥門冬湯調下　蟬花散草龍膽甘菊蜜炙花蔓荊子荊介川芎羌活人蔘伏苓升麻大黃
車前子玄參黃芩各七分梔子細辛各三分　地黃散生芊一兩赤芍藥當歸甘草各五分剉每五戔　速
效散治紅白翳障及胞腫黃連黃芩黃柏梔子連翹薄荷荊介柴胡當歸生芊地骨皮天花粉蔓荊子
甘菊惡實白蒺藜草決明石決明枳殼甘草各五戔　爐甘石散　炉甘石煅淬童便黃連湯雀舌茶各
七次三汁合淬三次研入腦射少許　清涼散蔓荊子荊介苦竹葉甘草各一戔半梔子七分半薄荷七
葉　車前散蜜炙花甘菊白蒺藜羌活草決明車前子黃芩草梔胆甘草各等分為末飲調下二戔
清肺散桑白皮斤芩甘菊枳殼防風荊介柴胡升麻赤芍藥當歸尾玄參苦參白蒺藜木賊蔟
花蔓荊子甘草各五戔　明目細辛湯羌活麻黃根各一戔半防風一戔荊介七分藁本白伏當
歸楠各五分生芊蔓荊子川芎各三分桃仁五介川椒四介細辛紅花各二分　天門冬飲子天

洗眼方　白礬六戔　白水鍾半　煎至七分　臥三日去　大盡每月　遇日期洗　之不可間　斷　正初　五日二初　二日三初　三日四初　九日五初　五日六初　四日七初　二八月初　一日九初　三日十月三　日十月三　四初忌葱　蒜

門冬苡蔚子知母各一戔人參赤茯羌活各七分五味子防風各五分　地黃膏生芊一各取汁黃連一
兩黃栢寒水石各五戔為末和地黃汁成餅攤帖眼無治風熱目赤生地黃散乾芊川芎羚羊角大黃
胆各一戔四分當歸甘草各一戔川芎六分生芊黃栢黃芩知母各五分羌活升麻柴胡防風豪木黃連各三分吉
更連翹細辛紅花各二分驅風一字散川芎荊介川烏炮各五戔羌活防風各二戔半為末薄荷湯調下二戔
羼角飲羼角房二戔羌活黃芩車前各一戔白附子麥門冬五分　牛黃丸羼角六戔牛黃一戔金箔銀箔各
五斤甘草二戔半蜜丸菉豆大薄荷湯下七丸　醫膜治法醫膜者風熱重則有之或瘢痘後亦有之醫自熱
生然治法先退醫而後退熱若去熱則血為之水而医不能去矣宜明目地黃丸新醫初生羌活退醫湯久醫
不去神仙退雲丸通宜正傳羊肝丸退雲散明目地黃丸生精血退醫膜生芊熟芊各四兩牛膝白疾
木各七分知母五分黃栢四分川芎當歸各三分麻黃生芊各二分川椒細辛各一分正傳羊肝丸黃
連一兩甘菊防風薄荷荊介羌活當歸川芎各三戔為末羊肝一具蒸熟同搗作丸　退雲散當歸乾
半夏精草甘菊木賊羌活石決明大黃蔓荊子白芷黃栢連翹龍胆各一戔蟬退七分　眼花眼見黑
花或飛蠅懸蟢皆內障肝腎虛之症宜熟地黃丸三花五子丸　熟地黃丸熟芊石斛兔絲子防風黃

芭車前子充尉子覆盆子肉蓰蓉磁石煅地膚子各一兩兔肝一具炙蜜丸梧子大酒下七十九三花
五子元蜜家花施覆花甘菊花決明子枸杞子兔絲子鼠粘子地膚子石決明甘草等分蜜丸梧子大麥
門湯下五十丸眼疼目疼有二晝甚宜苦寒藥宜救苦湯夜甚宜夏苦草散通用當歸防風細辛薄荷等分為
末每二錢麥門湯調下日三 夏苦草散夏苦草二兩香附子一兩甘草五錢為末茶清調下二錢 眼昏由血氣不足宜
四物五子元熟病後眼昏生翳宜石決明散 四物五子元當歸川芎熟羊白芍枸杞子覆盆子地膚子兔絲子車
前子等分蜜丸梧子大鹽湯下七十九 老人眼昏宜夜光育神丸 夜光育神丸熟羊乾羊遠志牛膝兔絲子枸杞
子甘菊枳角地骨皮當歸等分蜜丸梧子大 不能遠視不能近視者血虛氣盛也不能遠視者氣虛
血盛也血虛六味地黃丸以補腎氣盡空志丸神門以補心目不得開合足太陽之筋為目上綱足陽明之筋為目下
網為風熱所乘縱不得開羞明怕日芎芷香豨散寒門加前胡葱白 眼生眵糞眼有血紅及生糞此是熱宜經
效散 讀書損目讀書博奕過度患目者名曰肝勞非三年閉目不可全羞宜正傳羊肝丸點眼藥有雲膜
方可用點藥無翳膜但可洗之 磨翳膏犀仁青葙子各一錢斤腦三分空青二分研細 春雪膏鵬砂三錢龍腦一錢
朴硝五錢研細調津小許用 石決明散石決明真珠琥珀各三錢烏賊魚骨二錢龍腦五分研細銅筯攪取用洗
眼藥 湯泡散黃連赤芍藥當歸各一錢煎熏洗又方當歸赤芍黃連防風杏仁各五錢薄荷三錢銅綠
二錢每三錢煎熏洗 洗眼湯赤芍防風各五分當歸黃連各一錢杏仁四介水半鐘入乳少許煮過澄

耳臚
用柿蒂
燒存性研
末吹入耳

清乘溫点洗 驅風散治爛強龍胆防風各五錢銅綠三錢五陪子二錢竹葉一握為夕鹿末每一錢熱湯二
合泡澄洗通治眼病藥宜神仙退雲丸速效散石決明散 单方蜡湯泡洗白礬烏賊魚骨雄雀屎
牛肝揩肝兔肝常服

耳 新聲多為屬少陽火明火宜散凡為用疾盛之劑曰聲多屬腎
凡恐上壅時耳鳴耳

耳者腎之竅腎藏強盛耳聞五音若勞傷氣血蕪受風邪則耳聾無聞也耳鳴耳者宗脉所聚也胃虛則鳴髓海不
足則鳴腎水枯陰火上炎則或痒或鳴漸至聵聾又曰觸風邪鳴噪宜芎芷散痰火上升鳴甚宜通明利氣湯腎虛微明
滋腎通耳湯芎芷散川芎一錢半白芷蒼术陳皮細辛薑蒲厚朴半夏木通藁葉柱皮甘草各七分干三葱二通明
利氣湯貝母一錢二分陳皮黃連黃芩黃栢梔子玄參酒洗各七分蒼术白术便香乾羊槟柳各五分川芎四分木香
甘草各二分干三煎八竹瀝五七 滋腎通耳湯當歸川芎白芍乾羊酒各一錢知母黃栢黃芩並酒炒柴胡白芷便香附
子各七分蒼术白术便香乾羊槟柳各五分川芎四分木香甘草各二分干三煎八竹瀝五七 滋陰地黃湯熟羊一錢半山
藥山茱史當歸川芎白芍各八分牧丹澤瀉白茯苓蒲連
聖散滋陰降火 滋腎丸柴藘生干又明礬散參入耳中 虛聾回多濕及大病後風邪乘虛宜四物湯加知栢菖蒲遠志勞役脫氣者補中益氣內傷
治症大抵兩腮龍胆酒洗當歸酒洗梔子炒黃芩青皮各一兩大黃酒蒸青黛柴胡各五分麝香五分為末神曲糊丸桑大干澁下二十九日三

治厥痺方和 加菖蒲白茯知柏 勞聾因房勞脫精六味地黃丸五粒 加遠志菖蒲知柏腎虛久聾宜干蝎散開之薑蝎散全蝎
劑流氣飲加 石昌蒲每服三 四十九介去梢焙生干 切斤如蝎大四十九斤二味銀石罌 內炒乾為末向夕勿食夜卧酒調作一服至二更以水徐
弋干苦酒食 後服所 喉聾徐盡量飲五更有聞 厥聾因藏氣風厥逆入耳痞塞必 清神散治重症頭目不清為治辛夷白芷甘菊各一兩荊芥木通川芎甘草各七分
陽表陳氣陽 不復全已氣散 辛聾腎虛風襲宜芎並散龍腦膏塞耳 重聽宜聰耳湯聰耳湯宜黃柏一戈當歸白芍生 芍並酒洗川芎知母
指迷七氣湯 甘各五弋石昌甘草各二弋半每服三弋食後煎調服
陳皮烏藥白並防風羌活獨活並酒洗薄荷蔓荊子
蝦者吞煮後 丹重者各煮 鄭衛鳴而耳連翹三戈柴胡二弋仁冬南薄甘半各五弋干三水二盞煎七分去滓入水蛭末五分蚤虫三介末麝香少許食遠
滯留生膿結核塞耳 暴聾為聤耳外用豬脂地龍鍋底煤等分葱汁丸棗核大綿裹入耳令閉挑去
精丹凡治耳 聾皆宿調 耳痛成膿耳風熱上壅腫痛連翹同上各七弋去心青皮山梔鼠粘子炒
氣之生於肺 出膿汁或鳴音作 聾劑生半夏各一弋半皮薑汁炒南星各一弋半食後服
者腎之母從 此川芎白芍柴胡枳角黃芩梔子白並吉更各七分甘草五分 明礬散枯礬白龍骨各三戈黃丹二戈乾
乃天一生少之義也

胭脂一戈麝香少許為末拭膿後吹入耳中 耳痒挑剔出血乃腎虛浮毒宜玄參貝母湯 玄參貝母湯治耳熱出汗作痒乃痰火也防風貝母天花彩黃柏白茯玄參白並蔓荊子天麻半夏各一戈甘草五分干三 透閑通氣藥宜塞耳丹龍腦膏透鐵關法 塞耳丹菖蒲一寸巴豆一粒全蝎一介為末葱涎和如棗核大綿裹塞耳 龍腦膏龍腦一分椒目五戈杏仁二戈半為末綿裹塞耳 透鐵關法治滋石棗核大二塊搽射香小許石火煅紅淬醋三次研末 塞兩耳口含生鐵一塊連五六次 諸虫入耳將兩耳塞耳又韭汁灌耳又麻油塗耳門又一切虫物入耳以竹管入耳用口氣盡力吸出最妙 箪才盞治耳聾妙熟布

聾聵 在曼菁在曼柱 尖圓 鼈針出血

聾桅 菖蒲用一寸圓巴豆一粒作九綿裹塞耳日易之 甘遂綿裹塞耳日換甘草末通甘子各一戈五分為末每服三戈茶清下 枯礬加硇砂吹入
聾 聾肉生辛夷白並升麻棗本防風川芎細辛木通甘子各一戈五分為末每服三戈茶清下 枯礬治耳痛膿出

聾為肺之竅心肺有病聾為之不利 聾渕聵移熱於腦辛頗聾劑聾渕者濁涕下不止也恐成
衄血通聖散加黃連 聾聵聾者聾流清涕也屬肺傷風寒治同聾塞 聾衄辭見血門聾塞寒傷皮毛
聾塞流涕宜羌活沖和湯參蘇飲 並寒門 火盛清道久則畏感風寒聾塞便發宜涼隔散門麗澤通氣湯
且以菖蒲皂角末綿裹塞聾 麗澤通氣湯黃底一半蒼术羌活獨活防風升麻葛根各七分甘草炙
五分麻黃川椒升麻白並各三分干三葱二 聾痔肺氣極熱日久熯濁結成瘜內如棗大滯塞聾竅
甚者亦名聾聵宜通聖散風門外用白黃散 白黃散雄黃細辛芎藭等分為末大腥汁丸綿裹塞聾
聾癖乃肺熱也宜黃芩湯又青黛椵花杏仁研付聾中 黃芩湯戈芩椵子並酒炒吉更赤芍赤白並
交門荊介薄荷連翹各一戈甘草三分 聾痛風邪襲搏聾道不通為痛宜通氣驅風湯風門 臭魅
淳頭紅也甚則紫黑酒客多有熱血入肺盍久凝濁而作或有不飲酒紅者名曰肺風癉俱宜清血四物湯椵
子仁九外用豌黃散 清血四物湯川芎當歸赤芍生芍斤芩紅花赤茯陳皮各一戈甘草五分干三五
靈貞末一戈調服椵子仁九山椵仁為末蠟九彈子大 茶清嚼下忌熱物硫黃散 硫黃五戈
杏仁二戈半輕粉一戈為末臨卧塗之明早洗去 臭瀋詳見津液 單方白礬雄黃 並治疳瘡硫黃治臭紅淬燒酒和汁調付

口舌

口舌主五味心氣通於舌能知五味脾氣通於口亦能知五味　口酸由肝熱小柴胡湯(寒門)加龍膽青皮　口苦由心熱武生瘡宜瀉心湯(五肝熱移於膽亦苦)宜小柴胡湯加麥門山召仁地骨皮遠志　口甘由脾熱或臭宜瀉黃散(五胃熱則口甘胃虛則口淡)　口辛由肺熱宜瀉白散(五)　口鹹由腎熱宜滋腎丸(小便)　口臭由胃熱宜芩並　口糜口瘡糜爛也由藏府積熱宜回春凉膈散升麻散無用龍石散糝之膈砂元含化久年口瘡宜熏參朮化糝藥在下可擇而用之回春凉膈散連翹一戔二分黃芩梔子吉更黃連薄荷當歸生苄枳殼赤芍甘草各七分　升麻散升麻玄參川芎生苄麥門各一戔大黃二連黃芩甘草各五分干吕　膈砂元寒水石二兩半膈砂五戔馬牙硝一戔龍腦射香各五分甘草膏丸炙宗大含膿津下或取末糝之　黑參丸玄參天門麥門等分蜜丸彈子大每嚼一丸妙　虛火口瘡用凉藥不愈者虛火泛上也甘草乾干為末糝之唇腫唇瘡心脾受熱所致宜芩藥湯藍葉取汁洗芩藥湯赤芍梔子黃連石膏連翹薄荷各一戔甘草五分　鼈唇口唇緊小不能開合不急治則死又曰緊唇亦曰潘唇宜瀉黃散(五)無用白礬散付之又青皮燒灰豬脂調付　白灰散布作燈炷如脂大安斧刃上燃火汗出拭取付唇上　舌腫舌腫滿口名曰木舌(與舌腫同)舌上生胎是熱耗津液生干醞密蜜擦之又新青布裹梔離冷水頻心脾熱壅也不急治危宜黃連湯霜鹽　黃連湯無治舌瘡燥裂出血黃連梔子並炒生苄酒洗麥門當飲赤芍各一戔辟角薄荷甘草各五分　霜鹽散百草霜青鹽等分為末井水調塗舌上　重舌附舌根而重生小舌也鍼剌去惡血此由心脾熱盛宜青黛散無用黃連煎湯頻呷之又箭蒲黃或黃栢末以炒瀝調付著齦生名曰齦鍼剌去血即卧愈　青黛散黃連黃栢各三戔青代馬牙硝朱砂各六分雄黃牛黃鵬砂各三分龍腦一分為末先以薄荷汁拭口為末糝之並治咽瘡　木舌(與舌腫同)舌上生胎是熱耗津液生干醞密蜜擦之又新青布裹梔離冷水頻頻揩之輕者易脫重者用凉藥(下之)　舌生苔剌是熱結甚也薄荷自然汁白蜜等分調付先以薑蜜揩洗付藥又朱砂雄黃鵬砂腦射各小許為末付又黃栢薄荷鵬砂各二戔龍腦小許蜜丸含下化　脫頷頰車蹉跌但開不合以酒飲令大醉眡中取皂角末搐鼻令嚏自正又南星末干汁調付患處縛之又口不能開合用塩梅肉擦牙用治風藥　噤不開(詳見風門)　小兒口舌病小兒難用藥南星取中心如東之大為末醋調塗兒足心縛之又茱萸散灌足法亦可用乳母宜瀉心湯(五涼膈散門)　口舌瘡糝付藥宜付宴散龍石散　赴宴散五倍子一兩黃栢蜜炙活石各五戔為末每五分糝之又黃栢青代蜜陀僧等分為末糝之又細辛黃栢炒等分為末糝之吐延又黃栢核兒茶白礬等分為末糝之又乾干黃連等分為末糝之初若不堪應手即愈　龍石散治咽嗌腫塞寒水石三兩朱砂二戔庄腦二分為末糝患處　口舌瘡外治法宜茱萸散灌足法　茱萸散無治咽痛吳茱萸地龍等分為末醋調八數末小許塗足心又草烏南星生干等分為末醋調臨卧貼手足心　灌足法白礬三兩為末調化熱湯沈足半日　單方白礬　百草霜　蒲黃五倍子　炒瀝(並治口瘡)　白梅(治口臭含之)

牙齒

齒縫出血竹茹四兩醋浸一宿小二含之三四次

齒病足陽明絡脉入齒上縫其病喜寒惡熱手陽明絡脉入齒下縫其病喜熱惡寒上斤牙痛宜細辛湯下斤牙痛
白芷湯　細辛湯細辛一戈五分薏荊子鼠粘子各一戈升麻黃連防己各七分黃栢知母酒炒各五分薄荷三分華
簽一分　白芷湯防風荊芥連翹白芷薄荷赤芍石膏各一戈　牙齒痛有七因胃中濕熱上攻牙齦之間適夜
風寒或飲冷則濕熱不得外達故作痛也寒是標故外用辛温擦漱之藥熱是本故内服辛凉散熱之劑通用謝傳
笑去散呷風痛甚者胃中風邪也開口臭穢者腸胃積熱也俱宜當飲連翹飲　風熱痛外風内熱相搏齒齦
腫痛臚沐臭穢宜髁角升麻湯以荊芥湯盒漱　風冷痛齒齦不腫不甚日漸動搖宜温風散　熱痛腸胃
積熱腫爛臭穢深凉膈散門加知母石膏升麻膏梁濕熱之火調胃承氣湯寒門加黃連下之胃熱齒痛
喜冷惡熱宜清胃湯　寒痛客寒犯腦頭連齒痛宜羌活附子湯頭門外用香椒散　毒疾痛熱則生疾
毒氣上攻取能簽痛外症疾盛咳嗽宜二陳湯痰飲加細辛枳殼干台以羌活華簽煎湯浸吞涎流妙
疾血痛風熱挾攻齦間血疾製掣痛如刺宜髁角地黃湯血門又以五靈脂醋煎含嚥　熬餌痛腐臭淹積
要蝕齒齦有孔疼痛宜椒塩散含漱　當飲連翹飲當飲生苹川芎連翹防風荊芥白芷羌活黃芩梔子
只角甘草各七分細辛三分　髁角升麻湯髁角一戈半升麻羌活防風各一戈川芎白附子白芷黃芩甘草各等
温風散當飲川芎細辛白芷華簽藁本露蜂房各一戈水煎含漱吐之　牙齒動搖齒齦宣露動搖者腎
元虛也宜八味丸五粒陽明風熱攻注齒齦宣露動痛宜獨活散　獨活散獨活羌活川芎防風各一戈五分生平

荊芥薄荷各一戈細辛七分　牙齒脫落牙痲腫爛脫落宜清胃湯固齒散　清胃湯石膏二戈梔子連翹牧丹皮茶
茶各一戈生苹酒洗黃連各八分升麻白芍吉更各七分藿香五分甘草三分　塞耳藥取壁錢包胡椒末左痛塞
右耳右痛塞左耳手掩扰之側卧少頃　牙齒疳蟲蝕宜血竭散　血竭散蒲黃一戈龍骨膏白礬各一戈寒水
石煅四戈血竭五分為末小許糝瘡上以紙封貼　齒痛塗擦方宜謝傳笑去散固齒散香椒散　謝傳笑去散香淡藥
雄黃胡椒兩頭尖烏藥等分為末擦患處吐涎　固齒散大鼠一介取骨川椒炒乳香各二兩傻香附白蔌藜炒
青塩各一兩為末每日擦牙永無齒痛　香椒散香附川椒破故紙各二戈華簽一戈炒塩二戈為末擦牙　齒痛
舍漱方宜荊芥湯椒塩散　荊芥湯荊芥薄荷升麻細辛等分為末每二戈沸点漱吐之　椒塩散川椒白塩蜂房
各一戈葱三煎漱吐之　消齒壅法齦間芽肉漸長此乃齒壅朴硝為末付之　去痛齒不犯手方川椒細辛各二戈草
烏華簽各一戈為末小許揩痛齒自落　落齒重生方雄鼠脊骨為末揩拆處齒生如故　齒衄血門單方　雄黃
治虫痛白塩　骨碎補炒為末頻頻擦牙大能固齒　羊腦膗骨灰上塗　露蜂房入細辛煎湯含漱之　胡桃肉治食酸齒甚

咽喉

喉蚘入指甲尾上焙炒黃色研末吹入即破
咽喉病喉以納氣咽以嚥物咽喉之疾皆屬火熱輕者可以緩治急者鍼刺血受取為上策　單乳蚘方乳蚘喉痺
會厭方之兩旁腫者為之蝦乳蚘易治古方通謂之喉痺皆因酒色七精不節火動痰
上而作重者言語不爽水漿不入呼吸不通天氣閉塞危且急矣宜解毒雄黃元牛黃涼膈元實火清涼散虛火加味

四物湯　鮮毒雄黃元雄黃壺金各二戔半巴豆十四介去油為末醋糊丸菉豆大茶清下七丸若難下化灌牛黃涼膈元
馬牙硝寒水石石膏並煅各二兩甘草炙一兩膽星七戔半柴石英煅水　五戔牛黃龍腦射香各二戔半寫丸彈子大薄
荷湯嚥下　清涼散吉更一戔半梔子連翹黃芩防風只角黃連當歸生羊甘草各七分薄荷白芷各三分灯心一
團細茶一撮　加味四物湯吉更甘草各一戔半熟羊白芍各七分當皈川芎黃栢知母天花粉各五分煎後入竹瀝
一鍾　急喉痺喉閉暴發暴死者名走馬喉痺速用鍼法吐法皂角白礬黃連等分為末以竹管吹入喉中竹
瀝干汁頻灌之宜解毒雄黃元玉鈐匙巴豆炮　玉鈐匙無治纏喉風塩硝七戔半鵝砂二戔半白干蚕一戔三分龍
腦一字為末竹管吹入喉中　巴豆炮巴豆肉以紙壓取油用紙作撚子燃火吹滅以烟薰鼻中涎流自開　纏喉風屬痰火
咽喉裏外皆腫者是也宜解毒雄黃元玉鈐匙巴豆炮佛手散無用鍼法吐法　佛手散芒硝一兩白干蚕五戔甘草二戔半
青代一戔為末火許糁之如閉甚以管吹入　喉痺失音咽喉生瘡閉聲不出宜荊介湯　荊介湯吉更二兩甘草一兩荊介穗
五戔為鹿末每四戔干三煎呷嚥　咽痛不能納唾與食地氣閉塞也蓋病喉痺者必無咽痛病咽痛者不無喉痺荊防敗
毒散門寒加薄荷黃芩半夏倍吉更又宜必用方甘吉湯　必用方甘吉湯吉更二戔甘草荊介防風黃芩薄荷各一戔
加玄參一戔尤妙　傷寒咽痛陽毒陰毒皆有咽痛門見本　宜吉更湯寒門又宜荊介湯　咽瘡胃熱熏灸上焦而發宜利
膈湯佛手散加味四物湯　利膈湯薄荷荊介防風吉更入冬鼠粘子甘草各一兩為末沸湯調下二戔　懸雍垂
懸雍腫而垂下有長數寸者謂之帝鍾風由莊肘伏熱上衝宜塩礬散不可鍼破鍼則必殺人　塩礬散白塩白

礬同化枯為末以筯頭蘸藥塗其上　梅核氣七精氣凿結成痰涎窒碍咽喉咯不出嚥不下如梅核之狀詳見氣門
宜四七湯氣門加味四七湯　加味四七湯紫蘇半夏厚朴赤茯陳皮枳実南星砂仁神曲各一戔青皮七分
白豆炙七分梹榔盖智仁各三分干五　鍼法吐法咽喉急閉關上見慶急用鍼刺出血關下不見者令病人含水
用芦管火剌舌孔出血又用好醋噙漱吐痰又白礬石占沸湯噙化吐痰　咽喉閉通治不可驟用寒凉藥上熱未
除中寒復生至於痰喘脹必為難治之症咽喉腫閉諸症清凉散加減用之通用必用方甘吉湯　魚骨鯁諸魚
胆下骨鯁又鵝砂噙化又貫衆濃煎連進　鼈骨鯁衆牙磨水下又将狗倒吊取涎下又鵝足一對燒火灰水調
服　魚鼈骨鯁通治綿絮即劇一小塊蘸醋以綿係其中吞到梗處引之　單方白礬朴硝並治喉痺白礬一戔
礬末吹喉又半戔鵝子清調下朴硝一戔蕈麻子一介同研新水化服又呂含細嚥汁熘硝同　蚯蚓治喉痺取
取汁嚥　鵝子治喉痺取清化醋下　飴糖治骨梗作團嚥

頸項

項強頸項乃足太陽膀胱之經感風濕為頸項強痛宜田首散羌活
挫枪烏藥順氣散風門加羌活獨活木瓜　羌活勝濕湯羌活獨活各二戔蕎本防風甘草各一戔川芎蔓荊子各五
分　單方黑豆治項強蒸熟納袋中枕之　桃葉並入袋熨之治項強妙

背

背寒內伏寒痰則寒從背起冷如掌火遵寺痰湯痰門合藿子降氣湯氣門　背瘇背屬肺肺瘇則背瘇酒芩為

末白湯調下二戈名曰清金散　背痛肺病者喘咳氣逆背痛又曰邪在腎則肩背頸項引痛宜通氣防風湯奪連項痛宜羌活勝濕湯頸項　通氣防風湯黃芪升麻柴胡各一戈防風羌活陳皮人參甘草各五分青皮三分白豆久黃柏各二分　單方　羌活　治風濕奪痛項強

肖　沉香化滯丸專治胃脘痛脇中滿悶脹痰積塊滯氣塵塞不拘遠年心胃痛神效沉香玄胡索酒炒茱术各三戈大黃炒良薑各五戈紅香二戈兎絲子三个火煅醋浸一日右細末醋糊丸黃豆大每服九九壯漆草一九滾白水送下食前二次米湯補

心痛胃脘痛胃之上口名曰賁門與心相連故經旨謂胃脘當心而痛俗謂心痛者誤也九種心痛多在胃脘不在心也又曰胃脘當心而痛脾脘連心而痛揔云心痛然蓋心痛小而脾胃痛多心痛回傷思慮脾胃痛回傷飲食痰飲瘀血通用手粘散　手粘散草果玄胡索沒藥五灵旨等分為末酒調下三戈　七精心痛七精過傷作痛宜分心氣飲氣門驚悸心痛四七湯氣門加茯神遠志　冷心痛寒氣客於肖俞相引而痛或腎邪乘心宜五積散門二薑丸　二薑丸乾干良干等分糊丸梧子大陳皮湯下三十九　熱心痛積熱攻心暑毒入心面赤身熱便難宜連附六一湯梔薑飲　連附六一湯黃連六戈附子一戈干台　梔薑飲山梔仁十五介炒焦水一盞煎至六分入干汁三七寺煎熱飲入川芎一戈尤妙　痰飲心痛胃有清痰作痛如刺輕者芎夏湯痰飲重者三花神祐丸門下　食積心痛暴傷生冷及過食炙致心痛宜行氣香蘇散或平胃散五莊加神曲麥牙山查肉久而成積過食還矜宜草豆久丸香砂養胃湯　行氣香蘇散紫蘇陳皮蒼术香附烏藥川芎羌活只角麻黃甘草各一戈干三　草豆久丸根窠二兩草豆久煨白术各一兩麥牙神曲半夏各五戈乾生干青皮陳皮各二戈炒盐五分糊丸菜豆大白湯下七十九無

治冷心痛　瘀血心痛傷熱物死血留胃口作痛重者桃仁承氣湯門下之輕者韭汁枳窠吉更開之宜失笑散婦人手粘散　輿心痛上下攻刺嘔噎泄沫時作時止宜炒應丸虫門或二陳湯痰飲加苦練根當與虫部參治　風心痛因傷風冷或肝邪乘心而脈引痛宜分心氣飲氣門麻黃桂枝湯　麻黃桂枝湯治寒熱心痛麻黃桂枝白芍細辛乾干甘草各一戈香附半夏各七分干五　胃心痛腹脹而心胃痛寒盛而作宜清熱解毒湯　清熱解毒湯山梔炒焦一戈半只角川芎香附各一戈黃連蒼术各七分陳皮乾干炒焦甘草炙各五分干三　脾心痛心痛甚而下至脘下如刀刮者已遠及脾藏矣宜訶子散手拈散　訶子散訶子炮乾干炮厚朴草果陳皮良干炒茯苓神曲麥牙甘草炙等分為末每三戈入盐小許煎服　腎心痛與背相控觸其心宜神保元門蟠葱散前陰腎積日奔豚自臍下上衝心痛最急五苓散寒門去白术倍官桂用　心腹痛並痛宜桂苓散蟠葱散前陰五積散寒門　桂灵散桂心五灵旨良干厚朴等分為末熱醋湯調下一戈　去來心痛或作或止久而不愈神仙九氣湯氣門調下愈痛散又宜炒應丸虫門　厥心痛寒厥尿清不渴宜附子理中湯寒門熱厥尿赤煩渴宜梔薑飲　真心痛手足青至節而痛不治　心痛虛宗接之痛止者為虛故脾湯神門加味小建中湯按之痛反甚者為宗宜大柴胡湯寒門梔薑丸　加味小建中湯白芍酒炒三戈桂心一戈半甘草炙遠志干炒各一戈分二貼干台　梔薑丸山梔炒焦一兩半吳茱萸香附各二戈半糊丸菜豆大干湯下三十九　心痛劄并宜連附六一湯愈痛散　愈痛散五灵旨玄胡索蓬术當歸良干等分為末熱醋湯調下二戈

肖痞肖滿而不痛者為痞滿而痛者為結痞輕於結肖用茱俱同乃至來心下而為痞也雜病下之過亦作

痞宜升胃氣以血藥兼之若全用氣藥則氣愈下降必為脹滿治法寒痞枳宗理中丸熱痞加味陷胸湯痞痛瓜婁實丸久痞黃連消痞丸食已心下痞平補枳朮丸陰伏陽鬱香砂養胃湯痰火痞柴梗半夏湯通治吉更只角湯枳宗理理中丸枳宗人參白朮白茯乾干甘草等分蜜丸兩作四丸熱湯化下善治傷寒結胸　加味陷胸湯吉更枳角一戔半ミ夏黃芩黃連瓜婁仁只角半夏吉更各一兩干糊丸梧子大干湯下七十丸加黃連尤妙　黃連消痞丸黃連黃芩各六戔只宗五戔半夏四戔干黃白朮澤瀉各三戔人參陳皮厚朴各二戔猪苓一戔半縮砂乾干神曲甘草各一戔糊丸梧子大白湯下百丸　平補枳朮丸白朮三兩白芍一兩半陳皮枳宗黃連各一兩人參木香各五戔荷葉湯煮糊丸梧子大米飲下百丸　香砂養胃湯白朮陳皮半夏白茯各一戔香附砂仁木香枳宗薑香厚朴白豆久各七分甘草三分干台　柴梗半夏湯柴胡三戔瓜婁仁半夏黃芩枳角吉更各一戔青皮杏仁各八分甘草四分干三　吉更只角湯吉更只角各二戔甘草一戔干五　慰痞法治諸痞生干斤擣取汁別貯只取渣炒熱帛炮熨心胸脇下冷則再拌汁炒再熨熱結不用炒　結胸傷寒下之太早當心緊痛水漿不入仰而不能俯吉更枳角湯通治結胸氣疝見寒門　小結胸按之方痛治見寒門　大結胸不按而痛治見寒門　傷寒結胸寒結胸寒宗枳宗理中丸熱宗加味陷胸湯水停心下頭汗宜半夏茯苓湯　半夏茯苓湯半夏赤茯各二戔陳皮人參川芎白朮各一戔干五　血結胸婦人傷寒便有此症痛甚宜玄胡索散　玄胡索散玄胡當歸蒲黃赤芍官桂各一戔羌黃木香乳香沒藥各七分甘草五分干七　傷寒痞氣證並詳治寒門慰結胸法治手足厥冷陰症結胸葱白十莖生干一兩擣作餅炙熱貼臍中火斗熨之　單方白龍肝治卒心痛湯侵清飲　白礬

陳葉葉治心痛濃煎服　梔子治胃熱痛濃煎服　鷄卵治心痛醋煮服　韭汁惡血痛先嚼桃仁干　脂麻油去宜蛔痛　芥子酒醋研服治心痛

乳結核看法仍著穴各三戔甘草節干戔腫則破之水從破口出若生瘡付之神效又痛黃根搗付伏兔肝末和雞子清付和炭末庚付穹處

乳癰膿已潰肝經虛後乳汁不行乳汁不行有二有氣血盛而壅閉不行者有氣血弱而枯涸不行者猪鬣蹄四隻通草五兩煮服或鯽魚木通煮服　通乳湯猪蹄四隻通草川芎各二兩穿山甲十四片炮甘草一戔水五升煎半分三服更以溫葱湯頻洗乳房　通草湯吉更二戔麥柴胡天花粉各一戔通草七分木通青皮白芷赤芍連翹甘草各五分細ミ飲下手摩乳房　無兒當消乳無子飲乳ミ房脹痛麥芽炒為末白湯調下五戔以消為度　吹乳妬乳ミ屬陽明乳頭屬厥陰忿盃昳過厚味昳養厥陰之血不行故敷閉計滯

乳頭破裂花椒屎水調付之脹痛蛤粉付之丁香煩渴嘔吐宜乳粉托裏散瘡付偏處乳癖

陽明之血沸騰故熱甚而化膿又曰昳乳之子口乳嫩熱以致結核謂之吹乳：汁停蓄以致腫硬謂之妬乳產前產後並宜貝散　乳腫核久而脹痛嫩腫寒熱頭痛謂之乳癰未潰者內托升麻湯已潰者十宣散癰瘍八物湯勞產毒氣上衝付之乳頭裂升麻湯升麻葛根連翹各一戔半黃芪當歸甘草節當歸尾皂角刺金銀花橘葉血則代橘皮各五分酒水相半煎　結核久成妳巖積傷憂怒乳房結核不痛不癢數年後外腫紫黑內漸潰爛名曰乳巖急用十六味流氣飲瘡瘍單煎青皮湯虛者清肝解毒湯通用並貝散年過五十婦人乳癰不治男子乳疾亦宜清肝解毒

湯　單煮青皮湯青皮四戔煎三服　清肝解鬱湯當歸白朮一戔貝母赤茯白芍熟半山梔各七分入參柒胡牧丹皮陳皮川芎甘草各五分　並貝散白並貝母等分為末酒調下一戔或加芍歸升柴　單方益母草治拓乳搗爛付之乾則為末　赤小豆下乳汁煎飲又治乳癰研水調付之　治乳腫三　連皮　治乳核為末酒下二戔　牛蒡

腹

腹痛有部分中脘痛太陰也理中湯寒門加味小建中湯芍藥甘草豆久九之類並見胃門腑腹痛小陰也四逆湯五積散並見寒門加吳茱萸主小腹痛厥陰也當歸四逆湯寒門加吳茱萸主之　寒腹痛綿綿痛而無增減者寒痛也宜厚朴溫中湯脾莊積冷宜桂香散胃寒猝痛五積散寒門加吳茱萸主之赤茯草豆久各七分木香甘草炙各五分干姜　桂香散草豆久煨良干炒白朮砂仁甘草炙生干煨厚朴煮肉各一兩青皮炒訶子肉各五戔官桂二戔半劑水一碗同煎令乾杵作末研為細末每三戔沸湯入鹽小許点服　熱腹痛腹中常覺有熱暴痛暴止宜黃芩芍藥湯大便閉窒者調胃承氣湯寒門下之　死血腹痛或因擄損或婦人產後惡瘀痛有常處四物湯去地黃加桃仁大黃紅花又宜失笑散婦人實者桃仁承氣湯寒門加當歸穰木紅花　食積腹痛食滯胸脘作痛脉絃或瀉後痛減乎胃散五莊加山查神曲麥牙砂仁青皮　痰飲腹痛小便不利脉活痛宜芍藥湯痰飲　虫腹痛詳見虫門　腹痛嘔泄寒氣客於腸胃痛無嘔泄宜理中湯寒門上熱下寒并降失常宜黃連湯　黃連湯黃連三戔人參一戔半三夏一戔二分乾干桂枝各一戔甘草五分干姜　腹中挾窄濕痰渴氣攻於心脾升降失常自覺挾窄又曰肥人濕痰蒼朮氣血虛而津液涸者六君子湯痰飲加芍歸又三陳湯加遠志山谷仁麥門冬　腹鳴脾虛則腹滿腸鳴又腹中水鳴乃火之擊動二陳湯加芩連梔子亦藏寒水鳴者宜五積散寒門　腹皮麻痺或痛由腎虛不能行水多煮葱白吃自愈　腹痛通治凡腹痛多屬血澁宜芍并甘草湯脉弦加黃芩洪倍芍并緩加桂枝滿加當歸遲加乾干胯下痛加熟半雜病腹痛通用四物芎歸芍地已化土之理　四物苦練湯四物加玄胡索苦練子一名川練各一戔　單方艾葉　桂枝葱白鹽並治腹痛

臍腰

腰為腎府腰者腎之府腎虛然後邪能湊之房慾傷腎腎不足養筋痛不能舉者六味地黃丸五莊加鹿茸當歸牛膝續斷或八味元五莊宜青蛾元補腎湯　青蛾元杜沖干炒破故紙炒各四兩胡桃三十个薑蜜丸梧子大酒下百丸　補腎湯破古紙炒茴香酒炒玄胡索牛膝當歸酒洗杜沖炒知母黃栢並鹽炒各一戔干三　痰飲腰痛痰飲流注腰背疼痛二陳湯或芍藥湯痰飲加南星蒼朮黃栢　食積腰痛醉飽入房濕熱乘虛入腎腰痛四物湯合二陳湯加麥牙神曲砂仁杜沖黃柏官桂　挫閃腰痛舉重勞傷陡撲以致挫閃作痛宜舒筋散立安散神曲酒　舒筋散玄胡索當歸桂心等分為末溫酒下二戔或加牛膝桃仁續斷　立安散白芷豆赤半生半炒二戔當歸官桂玄胡索杜沖干炒茴香炒各一戔木香五分為末酒下二乞　神曲酒神曲如拳大一塊燒赤

淬好酒二盃飲仰卧小頃　疾血腰痛晝輕夜重如錐刺宜川芎肉桂湯案者桃仁承氣湯寒門久者四物湯加桃仁藕木紅花　川芎肉桂湯羌活一戔半官桂川芎柴胡當歸尾蒼朮甘草各一戔神曲防活各五分酒煎　風腰痛風傷腎而腰痛者或左或右痛無常處為祟順氣散風門加五加皮　寒腰痛寒傷腎腰痛不能轉側遇温則減遇寒則劇五積散寒門加吳茱萸炒桃仁甚加黑丑　濕腰痛胃雨露處卑濕腰痛重如石冷如水五積散寒門加桃仁吳茱萸又宜川芎肉桂湯　濕熱腰痛膏粱厚味之人腰痛多是陰虛濕熱盛遇天陰或久坐而發者是也案者三炒蒼相散足部虛者七味蒼相散　七味蒼相散蒼朮黃柏牽破故紙川芎當歸杜仲各一戔　氣腰痛氣滯腰痛不能久立遠行由憂思傷脾忿怒傷肝而作宜流香降氣湯氣門　腎着疝與濕腰痛全腎着湯主之　腎着湯白朮二戔半乾干炮赤茯令各一戔半甘草五分　單方牛膝治腰脊痛着飲或釀酒飲　五加皮治全上服法全上也　碎尾如栗火燒熱布松葉於梳中置燒尾於松葉上更以松葉覆封梳口貼痛處以布縛住炙汗為度治風濕腰痛

脇

脇痛有五脇痛者肝火盛木氣案也當歧龍膽九五錢注主之又小柴胡湯寒門加青皮川芎芍柴龍膽　氣岙脇痛大怒氣逆謀慮不決令肝火動脇痛甚者當歧龍膽九五錢注輕者小柴胡湯寒門加黃連只角又宜只角散　只角散只角二兩三戔半甘草炙三戔七分半為末葱白湯調下二戔　死血脇痛回思血停留居於脇下作痛按之益甚小柴胡湯寒門合血物湯加桃仁紅花乳香沒藥案者桃仁承氣湯寒門跌撲脇痛宜復元活血湯諸傷　痰飲脇痛痰飲流注於厥陰之經嗽咳氣急引脇作痛宜用青皮只角香附白芥之類輕者芎夏湯重者控涎丹並見痰飲　食積脇痛久有食積一條梗痛或暴傷飲食猝痛拘急以枳案湯吞下神保元氣門當歧龍膽九主之　風寒脇痛外感寒熱脇痛小柴胡湯寒門加吉更枳角　乾脇痛虛甚成損脇下常一点痛不止者是也甚危難治八物湯虛勞加木香青皮桂心有火去桂加山梔　脇痛有虛案左右肝案者小柴胡湯加芎歧白芍蒼朮青皮龍膽肝虛者四物湯加柴胡青皮又曰左脇痛宜只芎散或小柴胡湯加青皮川芎龍膽右脇痛宜推氣散或只角散　只芎散只案川芎各五戔甘草二戔半為末干台湯調下二戔　推氣散只角桂心羌黃各五戔甘草三戔半為末干台湯調下二戔　脇臭亦曰狐臭五更時取猪肉二大片以甘遂末一兩拌之挾脇下至明甘草一兩煎湯飲良久瀉出穢物連用五六次絕根又大田螺一介養水中候匝開以巴豆一介釘桃入螺門仰頓盃內夏一宿冬五六宿自然成水取撲脇下絕根　肥氣及食積詳見積聚　單方青皮治脇痛醋炒只角令上生干治狐臭取汁常塗脇下

皮

痒痛諸痒為虛血不榮飢腠故也當以滋陰養以養陰血又曰痛為案痒為虛燥痒見訂詳見燥門治法亦具醉後身痒搔至血出宜服蟬殼散　蟬殼散蟬殼薄荷等分為末酒下二戔　瘢疹有色点而無顆曰瘢有顆曰疹因胃熱助小陰君火入于太陰肺也傷寒陽毒發瘢宜三黃石膏湯寒門　玄參升麻湯甘草各三戔　犀角玄參湯犀角旁一戔升麻二戔黃芩一戔半香附玄參各一戔人參五分甘草三分或加大青　癮疹屬脾無風熱濕而作當春而發最重即溫毒也宜升麻葛根湯寒門加牛蒡子荊介防風或赤或白防風通聖散風門去芒硝加葱豉倍

麻黃出汗又宜樺皮散屑角消毒飲　樺皮散樺皮消存性只角各二兩杏仁荊芥各一兩甘草二戔半為末酒調下二戔　癗瘂痱勞汗當風薄為癗盅生瘂痱者小癤也大如酸棗或如小豆色赤而內有膿血防風通聖散風門去芒硝倍芍藥當歸暑月汗清肥生紅栗謂之痱瘡宜玉女英又青蒿煎湯洗之　玉女英活石菉豆粉等分為末綿子蘸撲之　丹毒人身忽然變赤如塗丹之狀遊走不定狀如雲氣者是也皆因惡毒熱血瘟蓄於命門遇君大合發也宜藍葉散拔毒散屑角消毒飲凡丹從四肢起入腹者難小兒丹毒詳見小兒門　藍葉散藍葉葛根升麻生半口臣吋吞赤芍川芎杏仁只母栗胡白並甘草各一戔石膏桃子各五分　拔毒散寒水石生石膏各二兩黃栢甘草各五戔為末水調雞羽刷塗　屑角消毒飲鼠粘子四戔荊芥防風各二戔甘草一戔屑角一戔半水磨取汁煎後調服　麻木與風門三痺五痺參治由氣虛而濕痰死血凝滯手指麻宜開結舒結湯渾身宜補中益氣湯內傷加烏藥香附防風川芎小加桂史　開結舒經湯紫蘇陳皮香附芍藥川芎蒼术羌活南星半夏當歸各八分桂枝甘草各四分干三煎後入竹瀝干汁　癜風癍腸風白駁人身皮肉變色赤者謂之紫癜白者謂之白癜通謂之癩風白駁者浸淫漸長色白如癬但無瘡也皆風搏皮膚血氣不和所生宜蒼耳散三黃散　蒼耳散五月採蒼耳葉日乾為末酒下二戔日二或蜜丸服　三黃散雄黃硫黃各五戔黃丹南星枯白礬蜜丸僧各三戔為末先以干汁擦患處以干斤麩薬末擦之以差為度　單方藍湯洗治癢藍葉汁風疹丹毒敷之塗之石灰淋汁洗治瘕風又治瘕疹醋調塗之治丹毒猪肉切片付之　治丹毒地黃黃和塗調之　老瓜腸吾乎塗之治汗疹皆引　黃柏末鷄卵黃調付治白癜吋合　石硫黃作末和醋塗治赤白癜吋引　蚕砂一升水三斗煎半去滓洗浴避風治風疹

肉

食伤證腸移熱於胃善食而瘦與消渴門消中同治　贅肉硫石細研塗之又蜘蛛絲纏之　單方

脉別出脉訣　筋

筋急筋緩大筋受熱則縮而短小筋得濕則引而長又曰血虛則筋不榮而成攣用四物湯加減又酒煮木瓜粥裹筋急痛慶佳　酒煮木瓜粥治脚膝筋急痛大木瓜酒水煮爛研膏熱裹痛處冷易　轉筋有足轉上至腰此因膏粱飲酒感風寒而作四物湯加南星蒼术酒芩紅花霍亂轉筋詳見霍亂　筋痿足部筋痛搦詳見風門　單方木瓜五加皮　薏以仁並益筋治筋病　松節為末木瓜酒調下三戔並治九筋之病

骨

骨寒宜八味丸五味子　骨熱治見大門骨蒸熱　單方牛膝五味子　牛髓並蠹骨　磁石強骨氣為末　骨痛詳見風門　靡節痛

手二木湯半夏干薑茯苓木一戔半皂角南星泡陳皮蔵灵谷各一戔干三水煎服治因於寒者五積散中寒因於風者烏藥順氣散腰膝攣痺湯風濕相搏手足冷痺四肢沉重等症見方

肩臂病因肺心有邪其氣流于兩肘又曰臂為風寒濕所搏則疼痛寒痛宜五積散寒嗽風痛宜烏蒜

順氣散風門濕痛宜觸痺湯風門加蒼朮酒防已氣血凝滯宜羌黃散　羌黃散羌黃三戔白朮一戔半羌活甘草各二分半　痰飲多為臂痛；不能乳或左右轉移由痰伏在中脾氣不得由行故也宜者控涎丹痰最妙宜消痰伏苓朮半夏苓朮湯　消痰伏令丸半夏二兩赤茯一兩只角五戔朴硝二戔半干糊丸梧子大干湯下五十丸無朴硝代硝硝　半夏苓朮湯半夏蒼朮各一戔半酒芩白朮南星香附各七分陳皮赤茯各五分威灵仙甘草各三分干五　十指麻木詳見皮部　代指；頭腫痛膿潰甚者爪甲猶脫亦名天蛇頭瘡雄黃入鷄子內以指浸其中一宿更以蜈蚣燒炟熏指又蒲公英蒼耳等分醋炙浸指又硝湯浸指　單方　地膚子治手足頻痛煎服日三　桑枝茶治臂痛常煮飲　西羊痲痺痛治神當歸川芎白芷羌活防風半夏秦艽妙蒼朮吉更桂枝甘草干三味煎服

足

厥有寒熱寒厥手足寒也熱厥者手足熱也蓋陽衰於下則為寒厥陰衰於下則為熱厥皆由腎精內竭而作也　厥寒從五指至膝上寒脚腎皆冷宜十全大補湯虛勞加附子或當歸四逆湯寒門　熱厥從足心起熱多曰酒色傷損或曰過食脾面詳見火門五心熱宜升陽散火湯火門　脚氣脚腫者名曰濕脚氣不腫者名曰乾脚氣始起甚微傷於濕者下先受之濕由生熱濕相搏其病乃作外症全類傷寒但腿膝脛踝拳急痠疼或熇不熇或腫不腫是為難疾治以宣通之劑甚者刺出惡血去其大勢以茶治之通者清熱滲濕湯濕熱在三陽宜加味敗毒散濕熱在三陰宜羌活續斷湯熱甚宜二炒蒼栢散腫甚宜赤白皮散　清熱滲濕湯蒼朮黃栢鹽酒炒各一戔紫蘇赤芍木瓜澤瀉木通防已挾痛只角香附羌活甘草各七分痛加木香腫加大腹皮熱加黃連大黃　加味敗毒散治赤腫寒熱自汗人參敗毒散寒門加大黃蒼朮各一戔干三薄荷小許也　羌活導滯湯治肢節並痛便尿阻隔大黃酒炒二戔四分羌活防已當歸尾各七分只宗五分　羌活續斷湯益肝腎羌活防風白芷細辛杜沖牛膝秦艽續斷熟羊當歸人參白芍茯令桂心川芎各五分千三　二炒蒼栢散蒼朮鹽炒黃栢酒浸二宿炒焦各四兩剉五戔煎服或丸服名二炒丸　赤白皮散赤茯二戔木香防已大腹子各一戔二分赤白皮郁李仁各一戔穞葉木通椒柳青皮各七分干三　脚氣危症脚氣入腹喘急欲死宜木防己湯又四物湯加黃栢煎服外以附子末津調付湧泉穴以艾灸之　木防己湯木防己椒即各二戔半吳茱萸一戔半便閉加大黃　痿病痿謂手足痿弱宜鹿角膠九濕熱痿弱由血衰不能榮食百骸故手足痿弱不能運動猶秋金旺則草木痿落有無濕者有無熱者有無濕熱者有無氣無痰者隨症治之肝腎損虛筋骨痿弱宜加味二妙丸滋陰養筋湯長夏濕熱成痿宜二妙蒼栢散清燥湯無痰痿弱宜二陳湯加蒼栢芩朮竹瀝干汁血虛四物湯加蒼栢氣虛四君子湯門氣加蒼栢蓋患痿之人若不淡食不能安全　鹿角膠丸鹿角膠一斤鹿角霜乾羊各一兩當歸身四兩牛膝白茯免絲子人參白朮杜沖各二兩虎脛骨龜板並酥炙各一兩為末酒化鹿角膠丸梧子大鹽湯下百丸　加味二妙丸蒼朮四兩黃栢酒浸二兩牛膝當歸尾萆薢防已龜板酥炙各一兩和丸梧子大干湯下百丸　滋血養筋湯熟羊一戔半白芍當歸麥門黃栢炒牛膝酒浸

杜沖酒炒蒼柏薏以仁各八分人參川芎防風知母各五分
耳ヶ杜校
各一戔半蒼朮一戔陳皮澤瀉各七分赤茯苓參升麻各五分當歸
五味子九粒 鶴膝風兩膝腫痛脾脛枯槁如鶴膝之節乃足三陰虛損風邪來之五積散寒門加松節或羌活續斷
湯痢後及癰節痛多有此症宜大防風湯 大防風湯熟羊一戔半白朮防風當歸白芍杜沖黃芪各一戔附子川芎牛
膝羌活人參甘草各五分干薑 甲疽瘡因割甲傷肥宜靴研損炊浸染五指俱爛枯白礬三戔黃丹五分為末搽
之 內刺 立 撐黨宗闡搗付之 單方牛膝松節五加皮並治脚痺弱煎服釀酒服 蠶魚田螺並治脚氣木瓜紫蘇並治脚氣
毛髮 半夏生塗之白髮自落黑髮自生 技去白髮以白蜜塗毛孔生黑髮

前陰

疝病症疝名雖七寒疝即疝之總名也又曰水疝即癰疝之屬氣疝即狐疝之屬血疝即雍節之屬筋疝宰有之
即下疳瘡之類也其症不一外腎小腹引痛或攻刺脹或流走背膂或手足厥冷或寒熱往來有不得大小便
者有泄瀉自汗者有積聚如盂如臂者狐有大小上下不常囊有腫脹痛歌無定挾冷觸怒則上衝心胃心
平氣和則下入囊中蓋諸疝本屬厥陰一經俗謂小腸膀胱腎氣者妄也皆因濕熱在經寒氣外來而作冬走
湊無形者屬氣痛有常處有形者濕痰食積瘀血也治要以流行疎利為先 寒疝囊冷結硬陰莖不
舉控睾而痛得之風寒卑濕宜蟠葱散當歸四逆湯 水疝腎囊腫痛狀如水晶或痒出水得之飲水
醉酒或汗後遇風寒濕之氣而卒發宜三花神祐丸即外用牡蠣丹 筋疝陰莖腫脹或潰濃出裏急筋縮莖
中痛痒或出白物得之房室勞傷宜龍膽瀉肝湯 血疝狐在小腹俗名便雍得之重感大勞氣血溢入脬
囊結雍腫膿小血多或因房欲當泄不泄而成宜桃仁承氣湯 氣疝上連腎俞下及陰囊得之號哭忿
怒宜蟠葱散 狐疝卧則入小腹立則入囊中如狐出入與氣疝大同小異同濕痰成塊宜四炒川練丸 癪疝
得之地氣卑濕故江淮之間多有之陰囊大如升斗不痒不痛又曰癪有四種一曰腸癪即小腸氣也外腎偏墜
腫痒宜天台烏藥散加味通心飲二曰外癪即水疝之類也用藥亦同三曰氣癪睾丸左右相過即氣疝之類用藥
亦同四曰水癪即膀胱氣囊大如升斗不痛不痒宜神保元門氣通用橘核散癪疝中有偏墜木腎別立条 蟠葱散
蒼朮甘草各一戔三稜莪朮白茯青皮各七分砂仁丁香皮梹即各五分玄胡索官桂乾干各三分為麁末作一貼葱一
當歸四逆湯當歸一戔二分附子官桂肉香各一戔白芍柴胡各九分玄胡索川練子茯苓各七分澤瀉五分 牡蠣丹牡蠣
粉黃丹各二兩枯白礬四兩為末遇夜擦於濕痒處 龍膽瀉肝湯主治肝藏濕熱龍胆芦柴胡澤瀉各一戔木通車
前子赤茯生羊當歸並酒炒出梔仁黃芩甘草各五分 天台烏藥散川練十介巴豆十四介同夫炒黑去豆夫不用
烏藥木香肉香良干青皮各五戔梹榔三戔為末酒調下一戔 加味通心飲治小腸疝尿澁難疼木通梔子黃芩
連翹只角川練子甘草各一戔灯心二十並車前草五葉 橘核散治四種癪疝橘核一戔半桃仁十五介梔子仁二戔
川烏炮吳茱萸各五分各炒為麁末作一貼 陰邪偏墜陰邪一邊腫大偏墜牽引或痛宜金鈴子九加臧香令

散左偏多痰血怒火右偏多濕痰食積也　金鈴子丸川練子肉五両剉作五分一用班猫十介同炒去苗二用苗香三戔塩半戔同炒去塩留苗香三用黒丑三戔同炒去故紙三戔同炒去黒丑四用破故紙五用蘿蔔子一戔酒糊丸梧子大酒下五十丸　加味香苓散治始起寒熱只角陳皮香附蒼朮麻黄猪苓澤瀉木通活石車前子三菱莪朮川練子玄胡索甘草各七分干三葱一　木腎外腎脹大作痛頑痺結硬或不痛乃忿火不降腎水不温宜四炒川練丸敗血共入者宜桃仁承氣湯門寒　奔豚疝氣腎之積曰奔豚自腎下奔上衝心最急蓋真氣内虚水結不散隨氣変化也理中湯寒門加官桂茯令去白朮又宜一捏金散疝治並詳積聚　一捏金散玄胡索川練肉全蝎砂苗香炒為末酒調下二戔　陰縦陰縮厥陰之筋傷於寒則並縮傷於熱則並弛又曰外寒則嚢縮外熱則嚢通用龍胆瀉肝湯傷寒嚢縮霍乱嚢縮並見本文　陰痿耗散傷肝七傷之疾治見虚勞　陰冷下部陽虚陰冷如氷宜分味丸五加減内固丸助陽散　加減内固丸巴戟肉蒸暮山茱萸免絲子各三両破故紙二両半石斛胡芦巴各三両苗香一両附子五戔蜜丸梧子大酒下七十丸　助陽散乾干壮蠣各一両為末焼酒調摔両手揉外腎婦人揉両乳陰腫陰嚢腫大或痛不痛即水癕之類宜橘核散又地骨末蛇蜕蠶等分鶏子調付患處布縛　嚢癕詳見癰疽　陰嚢湿痒謂之腎蔵風精血不足風湿毒気従虚入嚢下湿痒或生瘡史脱浸染両脚生瘡癬或耳傷眼昏宜四生散乳香龍骨散　四生散白蒺藜黄芪柿活白附子等分為末薄荷酒調下二戔　乳香龍骨散龍骨

又昇寒則嚢縮外熱則嚢弛

婦人陰戸腫痛　不問寒熱道遙散加牡丹皮車前子茯苓丹参陰痿痛者丹参雄黄　薬宜梔付湯　梔付湯山梔四十九介炒附子一介炮剉取二戔酒水煎入塩一撮温服　諸疝通治通用五苓散膈木香金鈴九四炒川練九烏附通氣湯　木香金鈴九無治外腎腫痛乳香没薬木香附子茴香川練肉玄胡索全蝎人参芽分酒糊九梧子大酒下百九　四炒川練九治会上川練肉作四分一用夫一合班猫四十九介同炒一用夫一合巴豆四十九介同炒一用塩一両茴香一合同炒以夫黄為度只取川練肉加木香破故紙各一両酒糊九梧子大塩湯下剉一条焼末別五十九日三　烏附通氣湯烏薬香附當帰白芍山査肉橘皮各一戔白木七分赤茯澤瀉各五分猪苓木香甘草各三分　陰蝕瘡下疳瘡詳見諸瘡　婦人陰門諸疾陰脱詳見婦人　陰中突出如茴如鶏冠四圍腫痛乃肝経脾虚下陥朝服補中益氣湯内傷晩服龍胆瀉肝湯外塗蕪荑膏　蕪荑膏蕪荑為末猪脂調塗日易　陰腫陰痛眼昏宜四生散乳香龍骨散　四生散白蒺藜黄芪柿活白附子等分為末薄荷酒調下二戔　乳香龍骨散龍骨

痛極便秘枳橘厥之四物湯加柴胡梔子牧丹皮龍胆之又桃葉煎湯洗毒散諸瘡糝以銅系散服加味逍遙散人　陰冷宜助陽散　交接出血宜補中益氣湯内傷　枳橘厥法橘皮枳

陰中之陰屬腎虚冷肉消黒瘦宜四神丸加減八味丸　陰冷宜助陽散　交接出血宜補中益氣湯内傷　銅系散並治男女陰濕

陰中之陽屬胃実熱口乾舌燥宜調胃承氣湯　枳橘厥法橘皮枳

虫痒不可忍牛蝕瘡五倍子五戔白礬一戔乳香銅系各五分軽粉二分半為末先以茶水洗後糝之　單方白礬治陰瘡湯洗之礬末猪脂調塗日易　陰腫陰痛

久出之回縮回出之　蛇床子治男女陰寒與白礬煎湯頻頻洗治陰痒　海藻治癭疝常食　梔白皮治下部濕痒腫膿　黄柏治陰蝕瘡與蛤粉煎湯頻頻洗浴　狠牙治上同濃煎洗浴

陰冷陰痿陰囊偏墜硬痛　川椒治腎氣痛煎服又治陰腫冷布裹着嚢内　桂皮治寒疝四逆為末酒調下一戔　地龍糞治小児嚢腫薄荷汁調付　葱白同炒和醋熨疝又煎服飲

焼末油調付之　服神麹陳久者佳　胡椒牧丹皮各等

後陰

痔病因酒色風氣食五事過度而得又曰濕熱風燥四氣相合而成　脉痔腸口顆㿗發癗且痛且痒宜槐角元逐瘀湯　腸治痔與下脫肛同治　氣痔憂怒腫痛氣散則愈宜加味香蘇散　血痔與下腸風藏毒全治　酒痔飲酒腫痛輒發宜乾葛湯　牡痔肝虛露肉如珠時滴膿血宜秦艽蒼术湯　牡痔肝虛腫潰治同牡痔　瘻痔浸淫濕爛歲積月累虫生其間蝕腸穿穴與下痔漏同治　槐角元槐角四兩地榆黃芩防風當歸各三兩酒糊梧子大米飲下七十丸　逐瘀湯大黃桃仁各二錢川芎白芷並乾羊赤芍只角蓬朮五靈脂阿膠珠赤狀三神朮通甘草各七分干五蜜五匕　加味香蘇散陳皮只角川芎槐花各一錢紫蘇梗即木香桃仁香附甘草各五分干薑　乾葛湯乾葛枳角半夏赤茯生羊杏仁各一錢茶芩甘草各五分黑豆百粒干三棓一秦艽蒼朮湯秦艽皃角仁燒存性桃仁各一錢蒼朮防風各七分黃柏五分當歸尾澤瀉梗即各三分大黃二分除梗即桃仁皃角仁餘水一盞煎至一盞二分去滓入三味末再煎至一盞熱服羌饌壓之　腸風藏毒即血痔也通稱腸澼腸風者血清而鮮必在糞前因邪氣外入隨感隨現治當散風行濕宜敗毒散門藏毒者血濁而黯必在糞後因蘊積熱毒久而始現治當清熱涼血宜香連丸大便脏寒下血無痛用薑柱之屬積熱下血無痛宜三黃丸門脉洪大四物湯合黃連解毒湯寒門下血腹不痛亦為濕毒宜黃連湯腹痛為熱毒宜芍藥黃連湯長夏濕熱太甚宜當歸和血散又曰腸風宜柏葉散藏毒宜槐花散蓋治澼功力止渋兌其訂狀先清其表後攻其裏其血自止　黃連湯黃連當帰各二錢甘草一錢半甘草炙一錢大黃五分桂心二分半　當帰和血散當帰升麻各一錢半槐花炒青皮荊介白朮熟羊各七分川芎五分或為末米飲下二錢　栢葉湯側栢葉當帰乾羊黃連荊介穗枳角槐花炒地榆各一錢甘草五分干三棓一槐花散當帰地榆各一錢槐花炒只角阿膠珠各八分生羊白芍黃芩升麻各七分防風側栢葉各五分痔痛即瘻痔也痔核已破成漏歲月積累虫食其間不堪痒痛所謂之虫痔或肛門射血如線皆由酒色過傷痔久成瘻痔軽痊重痔寒痊虛治痔之法不過涼血清熱治瘻則初宜涼血清熱燥濕久宜渋斂殺虫而無乎溫散可也涼血宜涼血飲久瘻宜猬皮丸秘傳神應膏取虫方　涼血飲人參黃芪黃連生羊當歸川芎槐角条芩枳角升麻各一錢　猬皮丸槐花艾葉炒只角地榆當歸川芎黃芪白芍枯白礬毋貫衆各五錢猬皮燒一兩髮灰三錢豬蹄甲十枚炙焦皃角一錢醋炙蟾丸梧子大米飲下七十九　秘傳神應膏乾蝎蝟甲十枚炙焦皃角一錢醋炙蟾丸梧子大米飲下七十九沒藥各五分為末蝸牛取肉搗成膏每夜洗拭將膏擦患處收貯磁缸不勿令乾　取虫方槐白皮煎湯盛盆中坐其上熏穀道冷易又蜣螂生搗為丸塞孔又猪胆一个苦酒一合煎同三兩沸飲之或灌肛門又棗枣取肉入水銀丸如枣核長三許卧時綿裹納肛門　脫肛即腸痔也肛門翻出也肺與大腸為表裏腎主大便肺腎虛者多有此症參芪湯朴之產婦用力大過及小兒叫號努氣莊久痢不止亦有此症此氣下陷也必須温肺補胃補中益氣湯內加訶子樓根白皮小許外用狗虎散　參芪湯人參黃芪蜜炒當歸白朮生羊白芍酒炒白茯各一錢升麻吉更陳皮乾干五分甘草炙三分　狗虎散五倍五錢水三椀煎半入硝硝荊介各一錢再煎數

沸熏洗又用五倍子末糝之　肛門痒痛虫痔為痒艾葉苦練根煎湯熏洗因以艾葉生干煎服又槐白皮煎湯薰洗肛門痛者火也又大便秘渋亦作痛宜秦艽當歸湯治痔肛痛大黄煨四錢秦艽枳殼各一錢澤瀉當歸尾皂角仁燒皂木各五分紅花二分桃仁二十介　痔病通治宜槐角丸秦艽蒼术湯猬皮丸久痔宜黒地黄丸　黒地黄丸蒼术一斤熟羊一斤五味八両乾干秋冬一両春七錢夏五錢東南丸梧子大酒下百丸　洗痔法槐花荆介只角艾葉煎湯入白礬薰洗又川椒艾葉葱白五倍子煽炲煎湯熏洗又荆芥硝煎湯熏洗　熏痔法猬皮三指大雄黄枣二子大艾葉鶏子大麁末入尾缸内火燒坐其上熏之　塗痔并宜熊氷膏熊胆三分半片腦半分同研白雄鶏胆三介取汁調并以鶏翎蘸塗痔以先以并水洗淨後用之　田螺膏大田螺八九介鍼破頂盖入白礬末小許置地上而下炎埋土中経宿次日取盖上水汁以鶏翎蘸塗痔上　枯痔方雄黄硫黄白礬等分為末用鍮盒先鋪礬末一半次鋪餘并又以礬末盖上火煅候礬枯為度研為末津調付痔上乾落為度仍用石膏五倍子付狡獪口　單方雞冠花治血痔煎飲　猬皮主五痔腸風脫肛燒猪蹄、鼹鼠治法服法同上也　驚頭治脫肛灸末服又塗肛　童尿治脫肛湯化白礬塗惠洗以熱蛰蔑擦入

風

中風微漸拇指及次指麻木或手足少或肥肉微掣此先兆也宜預服愈風湯天麻丸以防之　熟生風濕生痰、生熟二生風非因外来之風亦非肝木之風良由将息失宜心火暴盛神昏厥逆以至仆倒皆曰熟甚故也　肥人多中風由氣虚痰盛先須理氣蠲痰次服防風當歸木香非徒治中風並治中悪中氣　偏枯血氣偏虚半身不遂肥肉枯瘦骨節疼痛治癱瘓　風痱身無痛處四肢不遂志氣不甚或一臂不遠或志乱不能言宜搜骨丹脾実者疎風順氣丸大便脾虚十全大補湯腎八宝回春湯　風有中血脉中府中藏之異中血脉則口眼喎斜中府即肢節痲中臟則性命危二者治各不同中血脉外有六経之形症小續命湯随症加減以發其表如無藏内有便尿之阻則宜滋潤湯外無六経之疤内無便尿之阻則但當養血通氣宜羌活愈風湯養榮湯中藏痰塞昏胃舌瘖宜排風湯又曰手足不遂言語蹇渋當從羌活愈風湯以行中道久服火風悉去小續命湯防風一錢半防已官桂杏仁黄芩白芍人參川芎麻黄甘草各一錢附子炮五分干台有熟去附子代白附子或當改石膏　加減續命湯太陽無汗悪寒倍麻黄防風杏仁有汗悪風倍桂枝芍并杏仁陽明無汗身熱不悪寒倍桂枝黄芩加葛根一錢四分太陰無汗身凉倍附子甘草六経混淆擊在小陽厥陰加羌活連翹各一錢五分　疎風湯羌活防風當歸川芎赤茯陳皮半夏烏薬白芷香附各七分桂枝細辛甘草各三分生干三　養榮湯茯只桑黄連防風羌活秦艽半夏南星甘草各六分干三川芎杏仁白芍防風當歸甘草各八分白鮮皮五分干台、羌活愈風湯一名愈風湯蒼术石膏生半各六分羌活防風當帰夢荆子川芎細辛黄芪只角人參麻黄白芷甘菊薄荷枸杞子柴胡知母地骨皮狗活杜仲秦艽黄芩白芍甘草各四分官桂二分干三朝夕服　滋潤湯當歸生半只角厚朴枳即大黄麻仁杏仁各一

戔羌活七分紅花三分　卒中風救急卒中昏倒牙緊涎嘲喝斜恍惚之際以手大指掐刻人中即醒如未效以三稜針刺手十腊甲角及合谷二穴入中一穴又用取嚏法吐法口噤者用開噤法多灌香油及竹瀝干汁又牛黃清心元龍腦薄荷合元以竹瀝干汁香油童便之屬調灌之省後痰多者用道寺痰湯痰飲火多者防風通聖散調治若口開手散遺尿者為陽暴絕參芪煎湯入竹瀝干汁救之　牛黃清心元方不錄　血虛中風宜加味四物湯熟半二戔半當歸川芎白芍各一戔二分半　腹痛加木香檳郎　痰加南星半夏　頭痛加白芷羌活　四肢不仁加烏蘇獨活　語言不通加石菖蒲南星　熟加黃芩　寒加桂枝　汗多加防風　無汗加蘇葉　脚痛加木香檳郎　渴加烏梅　腹脹黃連枳實　胷痛加吉更　開噤烏梅肉五戔南星細辛各三戔為末指蘸擦牙　取嚏法見角細辛赤或南星半夏末吹入鼻中有嚏可治無嚏難治　吐法見角蘿蔔子半分為末每二戔水煎飲探吐暴瘖腎虛為厲風所傷言語音蹇冗腳弱背痛宜地黃飲子清神解語湯　地黃飲子乾羊巴戟山茱萸肉蓯蓉石斛遠志五味子白茯苓門冬戔附子官桂菖蒲各五分干白薄荷小許　清神解語湯南星半夏二味同白礬生于見角水浸三日只取二味晒乾各一戔當歸川芎白芍生羊參門遠志菖蒲陳皮白茯烏蘇葉原黃連防風羌活甘草各五分干三竹茹一團煎後入童便干汁竹瀝　精神矇昧風中藏府胃宜牛黃清心元口眼喎斜風中血脉則口眼喎斜風邪反緩正氣反急或左或右此胃土之脉為邪也急掐人中按頂髮灸耳垂珠下三五壯外用南星草烏各一兩白芨一戔白干蚕七枚為末干汁調傘喎處正則洗去內用正血蘇白附子白干蚕全蝎等分為末酒下二戔宜蘇羌升麻湯理氣祛風散　蘇羌升麻湯升麻葛根白芍人參甘草各一戔半蘇羌白芷防風桂枝各七分入葱白　理氣祛風散羌活獨活防風荊介白芍甘草各六分干五　手足癱瘓風中府則肢節癈曰氣血虛而痰火流注也血虛則注左為癱宜四物湯氣虛則注右為瘓宜四君子湯氣門俱加竹瀝干汁左宜加減潤燥湯右祛風除濕湯左右俱瘓宜加味大補湯松方加減潤燥湯白芍酒炒二戔當歸一戔二分川芎白茯白朮南星半夏天麻各一戔生羊酒洗熟羊干炒陳皮牛膝黃芩山芦仁各八分桃仁羌活防風薄荷各六分紅花甘草炙各四分黃柏酒炒三分入竹瀝干汁　祛風除濕湯白朮一戔二分白芍當歸陳皮赤芍半夏蒼朮烏蘇只角羌活黃連黃芩並酒炒各一戔川芎人參吉更防風各八分白芷七分甘草炙五分干五加味大補湯黃芪蜜炒人參白朮白茯當歸川芎白芍熟羊各七分烏蘇牛膝杜仲酒炒木瓜防風羌活狗活薏以各五分附子沈香木香官桂甘草各三分干五　秘方牛髓一梳煉一作二味濾過入炒麪一作炒乾干末三兩九如彈子大每日三四九細嚼溫酒送下大效　痰涎壅盛風宿因痰為患故治以開關化痰為先宜導痰湯痰飲加減導痰湯　加減導痰湯治風熱痰盛不能言語南星半夏以皂角白礬生干同煎湯浸透炒白茯令陳皮白朮吉更一戔黃芩黃連瓜婁仁人參當歸各五分甘草三分干三入竹瀝干汁　中熱風疕風回熱生熟膀風動宜以靜勝其躁養血是也宜天麻九若藏府無見表裏並攻宜防風通聖散　天麻九乾羊四兩羌活三兩半當歸二兩半天麻牛膝萆薢玄參杜仲狗活各一兩半附子五戔客九梧子大酒下百九　防風通聖散治諸風熱

活石一戔七分甘草一戔二分石膏黃芩吉更各七分防風川芎當歸
白朮梔子三分半千五　中風虛疕宜八補田春湯　八補田春湯
白芍一戔二分黃芪八分白朮六分茯神半夏各五分
附子人參麻黃黃芩防已香附杏仁川芎當歸陳皮防風官桂乾干熟半乾半甘草
各四分沈香烏茱川烏
各三分千白　中風宜調氣行氣則風亦疏矣宜烏茱順氣散蘇合元八味順氣散
門　烏茱順氣散麻黃
陳皮烏茱各一戔半川芎白芷白干蚕只角吉更各一戔乾干五分甘草三分千白　風非大汗則不除風邪不得汗則不
能治宜搜骨毋若自汗而更用麻黃則反為大害　搜骨毋蒼朮棍窠桑白皮川芎白芷威灵仙人參防風何
首烏蔓荊子各一兩苦參五味木香各五戔龍腦射香各五分以麻黃煎膏和搗丐杵兩作十丸朱砂為衣每一丸
磨酒半盞食後瞑卧嚥一呷衣覆取汗　諸風通治宜通氣駈風湯烏茱順氣散木香保命毋搜骨毋
通氣駈風湯烏茱一戔半川芎白芷吉更陳皮白朮甘草各一戔麻黃只角人參各五分千白　木香保命毋木香白
附子桂皮杜沖厚朴藁本狗活羌活海東皮白芷甘菊牛膝白花蛇代白干全蝎威灵仙天麻當歸蔓荊子虎骨
酒浸酥炙南星防風山茱甘草赤箭各五戔朱砂七戔半半為衣射香一戔半蜜丸彈子大一丸細嚼溫酒送下
風痺之始汗出當風凝血於膚衛氣不行為痺或半身痺或臂痺痛痒不知寒熱不知是謂不仁也　三痺
風寒湿三氣雜至而為痺也風勝者為行痺寒勝者為痛痺湿勝者為著痺行痺宜防風湯痛痺宜
茯苓湯著痺宜三痺湯　防風湯一戔半當歸赤茯狗活杏仁桂心甘草各一戔麻黃五分黃芩蒼艻

葛根各三分千白　茯苓湯赤茯令亲白皮各一戔半防風桂皮川芎芍艻茶麻黃各一戔甘三取汗　三痺湯杜沖牛膝
桂皮細辛人參赤茯白芍防風當帰川芎黃芪續斷甘草各七分狗活羌活半各三分千白　五痺冬為骨痺春
為筋痺夏為脉痺長夏為氣痺秋為皮痺宜五痺湯行湿流氣散蠲痺湯烏茱順氣散　五痺湯羌活白
朮羌黃防已各二戔甘草一戔千七　行湿流氣散蠲痺湯烏茱順氣散　五痺湯羌活白
蠲痺湯當歸赤芍黃芪防風羌黃羌活各一戔半甘草五分千白　歷節風病因亭因血熱自沸後遇涉水處
湿或坐卧當風以致風寒湿之邪遍歷關節與血氣搏而成斯疾其痛如掣者為寒多其腫如脫者為湿多
肢節間黃汗出者為風多如虫咬謂之白虎歷節治宜風痺活血湯二秋散五灵丸神通飲痰飲注痛宜消痰
茯苓丸手部慰烙法宜拈痛散　疎風活血湯當歸川芎威灵仙白芷防已黃柏南星蒼朮羌活桂枝各一戔紅花三
分千五　二秋散黃柏酒浸蒼朮等分為末千湯下一戔　五灵丸五灵旨二兩川烏炮一兩半沒茶一兩乳香五戔水丸彈
子大千湯或溫酒化下丸　神通飲木通二兩劍長流水煎服　拈通散羌活狗活細辛官桂防風白朮良干麻黃天
麻川烏吳茱萸乳香川椒全蝎當歸各五戔白干二戔半為鹿末每一兩半鹽一升同炒極熱帛盛慰痛處易冷
跌傷風多由亡血筋無所榮邪得而襲之是以傷寒汗多過多與病瘡人及產後致斯病可見矣其症寒熱間作
甚則口噤目斜身體強直如角弓反張有汗無柔痓無汗為強痓死在朝夕口瘡口平無汁者為中風自出黃
水者為中水也痛不在瘡處寒熱欲成痓急用玉真散貼之傷在頭面者急用水調膏貼之若口噤背反速灌

小續命湯柔痓去麻黃有熱減桂枝冬月去黃芩身冷手足冷脉沈細宜參歸養榮湯身熱喘嗽脉滑數宜瓜婁只實湯又曰破傷風多死全蝎散最效汗過多成痓宜防風當歸散亡血過多成痓宜當歸拙黃湯

玉真散防風南星等分為末每二戔溫酒和干汁調服以末付瘡口如瘡乾干酒調付　水調膏杏仁研白麪等分水調塗傷處加雄黃尤效　參歸養榮湯人參川芎當歸白芍乾羊白朮白茯陳皮各一戔甘草五分干白　瓜婁只實湯瓜婁仁只實貝母吉更斥芩陳皮梔子茯苓棗門人參當歸籍子各八分甘草三分干三入竹瀝干汁　全蝎散蝎梢七介為末熱酒調下日三破傷非此不除　防風當歸散防風當歸川芎生羊各二戔半　當歸地黃湯當歸生羊白芍川芎膏本防風白芷各一戔細辛五分　破傷風之治同傷寒三法背後擂者太陽也身前擂者陽明也兩　擂者小陽也不論三陰者傳入陰經不治故也在表則以辛擂熱汗散之宜防風湯小續命湯九味羌活湯寒門半表半裏以辛凉和解之宜羌麻湯防風通聖散在裏則寒羊下之宜大芎黃湯破傷風雖宜汗若自汗多則宜白朮防風湯　防風湯防風羌活柴胡活川芎各一戔二分半　羌麻湯羌活麻黃甘菊川芎石古防風前胡黃芩細辛只角白芷蔓荊子甘草各七分白芷薄荷各五分干三　白朮防風湯防風四戔白朮黃芪各二戔　羊方石灰治喝斜醋調一合抑泥右喝塗左三喝塗右　羊麻子去松葉治全上擂爛和清酒温服取汁　竹瀝大治風熱痰右喝斜辟刀腹熱癱瘓多取妙　豆淋酒治諸風倍效癱瘓常飲　鵲肪貼喝後處治拘攣麻痺取煉肪酒調下三匕　葱白治中風面目浮腫煮飲　蜂蜇治破傷風付瘡口舒筋立安散防風羌活獨活蔓荊各川芎蔵天生半桃仁南星羊炙蒼朱砂先草龍腦羊夏白芷本末等分生蒸酒等連翹附子少許末通防己陳皮甘草右剉水煎入牛汁竹瀝服痛甚加乳香没藥末調服治百病破傷風四肢百節痛入銅器亦生湯過

寒

兩感傷寒兩感於寒者一日太陽與小陽俱病則頭痛口乾煩滿二日陽明太陽俱病則腹滿身熱不食譫語三火陽厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入六日危又曰下利不止急先救裏身體疼病急當救表救裏四逆陽救表桂枝湯無表裏之偏之則宜大羌活湯　大羌活湯生羊知母川芎各一戔羌活防風獨活防已黃芩黃連蒼朮白朮各七分細辛甘草各五分左宜陽訂多者　不分陰陽宜陶氏冲和湯以此探知羌活蒼朮防風川芎生羊黃芩柴胡乾葛白芷各一戔細辛甘草各三分干三片二黑豆三七粒　脉浮緊為傷寒又曰大浮數動滑陽也沈濇弱弦微陰也凡陰病見陽脉則吉陽病見陰脉者吉凶也　傷寒傳經一日太陽受之故腹滿頭頂痛腰脊強二日陽明受之故身熱目疼鼻乾不眠三日小陽受之故耳聾脇痛寒熱嘔苦四日太陽受之故腹滿咽乾或自利五日小陰受之故口燥舌乾但欲寐六日厥陰受之故煩滿囊縮舌卷厥逆各日七日太陽病衰頭痛小愈八日陽明病衰身熱小愈九日小陽衰耳有聞十日太陰病衰腹痛減思食十一日小陰病衰渴止而嗽十二日厥陰病衰囊縮腹下又曰寒邪中人無有定處或中於陽而首尾在本經或中於陰而首尾在本經越一經二經而傳之治法發表散邪温中通脉對症處宜

太陽形症用葉肪胱為本小陽為裸其症發熱大惡寒脉浮又曰太陽以皮膚為表以肪胱為裏熱在皮膚則頭痛項強冬宜麻枝黃桂枝湯餘月九味羌活湯熱在肪胱則口渴尿赤宜五苓散　太陽傷風脉浮而弱汗出惡風鼻乾嘔宜桂枝湯　太陽寒傷脉緊頭痛發熱身疼無汗惡風宜麻黃湯

太陽兩偏凡寒脉浮緊而熱惡寒身痛不汗宜大青龍湯　太陽畜血治見於狂無汗而喘者當自解　麻黃桂枝湯桂枝白芍各三戔麻黃一戔二分甘草一戔杏仁八分干白　九味羌活湯羌活防風各一戔半蒼朮川芎白芷黃芩生芎各一戔二分細辛甘草各五分干白葱二　桂枝湯桂枝三戔白芍二戔甘草一戔干白葱二　桂枝羌活湯　麻黃湯麻黃三戔桂枝二戔甘草六分杏仁十枚干三葱二汗出勿再服或加麻　川芎白芷防風羌活膏本　大青龍湯麻黃桂枝各二戔杏仁一戔半石膏四戔甘草一戔干白　陽明症用藥胃為戒大腸為棵微寒大惡熱又曰陽明以肥肉為表以胃為裏熱在表則目疼不眠宜葛根解肌湯熱入裏則潮汗狂譫便閉宜調胃承氣湯自汗煩渴脉洪宜白虎湯竹葉石古湯　陽明寒症宜下自汗大便秘小便赤手足温脉洪數而譫語潮熱承氣湯下之熱不潮者勿輕用　陽明虛症宜補一人傷寒發狂欲走脉虛數用柴胡湯反處以蓌芪破朮陳皮甘草煎湯一服狂定再服安瞑　治　循衣摸床者皆用大補氣血之劑無瞤振脉脉代逆於補劑中畧加桂振止脉和而愈　陽明脾約症小便數大便必難其脾為約宜脾約丸使　陽明病禁忌陽明病不能食攻其熱必噦胃氣虛冷故也又曰自汗小便利者為津液內渴大便雖閉不可攻下審證治通之見大便證法　葛根解肌湯葛根柴胡黃芩白芍羌活石古升麻白芷吉更各一戔甘草五分干白　白虎湯石膏五戔知母二戔甘草七分粳米半合或加人參一戔名曰人參白虎湯加蒼朮一戔名曰蒼朮白虎湯　小陽症用兼三焦為本膽為棵寒熱往來耳聾脇痛嘔而口苦脉絃宜小

柴胡湯又曰太陽為表陽明為裏小陽居中半表半裏禁汗者恐犯太陽禁下恐犯陽明故只角柴胡湯和之裏多則黃芩芍藥湯大便妙　小陽痛壞症若已吐下發汗猶譫語者此為壞症依壞法治之　小陽病脇痛汗出頭痛心下痞硬引脇痛乾嘔不惡寒此表解裏未知也宜十棗湯　小柴胡湯治小陽及汗下後過經不解時氣瘟疫熱入血室等症柴胡三戔黃芩二戔人蔘半夏各一戔甘草五分干白

十棗湯治傷寒有痰飲脇痛芫花微炒丹遂大戰炒等分為末大棗十枚煎湯調下強人一戔弱人五分有妻不可輕用　太陰症用藥脾為本肺為棵腹滿而吐食不下或腹痛自利治法腹滿痛便宻者宜大柴胡湯不宻自利宜理中湯九甚至厥冷宜四逆湯　太陰病腹痛宜桂枝湯倍芍藥便宻痛桂枝湯加大黃汗後脹滿自利宜厚朴半夏湯　太陰病發黃七八月身黃如橘子小便不利腹微滿宜茵蔯蒿湯　理中湯人蔘白朮乾干炮各二戔甘草炙一戔　理中丸用理中湯材窮丸彈子大溫水和下一丸　厚朴半夏湯厚朴三戔人參半夏各一戔半甘草七分干七茵蔯蒿湯茵蔯一兩大黃五戔梔子二戔水三盞先煎脉沈疾宜小承氣湯面寒身青四肢厥冷脇甲青黑宜四逆湯自利而渴者虛故引水自救若小便白而脉遲者宜四逆湯小陰病始得反發熱脉沈者宜麻黃附子細辛湯又小陰病下利四逆脉微欲絕者宜通脉四逆湯　小陰病自利下利小便利者宜真武湯下利便赤口燥煩湯渴脉沈疾者為宜熱痢宜三黃熱

艾湯甚者承氣湯　小陰四逆有
青厥冷脉微而伏宜四逆湯自熱而温
黄附子細辛湯麻黄細辛各二枝附子
分二貼　通脉四逆湯附子二枝半乾
薬伏苓附子炮各三枝白朮二枝千五
甘草炙各等分為末每二枝米飲
舌卷厥逆煩滿囊縮小腹絞痛宜
陰病手足厥冷始得之手足厥冷
湯吳茱萸三枝人參二枝千四呂亦
草甘草各一枝呂二　傷寒陽症小
陽症無熱宜陽旦湯陽症宜汗冬月
神湯　陽旦湯桂枝芍薬各三枝黄
伏屬陰症無熱五積散加附子寒邪
厥冷或吐利腹痛者太陰用附中理中

散不瘦金正氣散　五積散蒼朮二枝
芍半夏桂皮各七分甘草六分千三葱三
人參草果甘草各五分千呂梅二　藿
吉更甘草炙各五分千呂　不瘦金正
熱頭痛惡寒脉浮者表症也屬太陽宜汗
香蘇散小青龍湯十神湯人參敗毒散參
陳皮一枝甘草五分千三葱二　芍並香薷
小青龍湯無治心下停水咳喘嘔逆麻
香附茶薷升麻赤芍麻黄陳皮川芎乾
吉更川芎赤茯人參甘草各一枝千三薄
夏乾葛赤茯各一枝陳皮吉更只用甘
陽明宜下之煩渴潮熱譫語便宗者
湯次之六一承氣湯亦可選用也　小承
芒硝各二枝先煎只朴次下大黄　調

白芍各二㕮半大黃二㕮只㕩半夏各一㕮干㕩　三一承氣湯甘草三㕮大黃厚朴只㕩芒硝柴胡黃芩白芍各一㕮干三六一順氣湯大黃二㕮只㕩厚朴芒硝柴胡黃芩白芍甘草各一㕮干三入鉄銹水三七　傷寒半裏半表訂往來寒熱頭痛脉弦者半表半裏也屬小陽宜小柴胡湯和之若表裏俱熱者欲汗則裏訂已急欲下則表訂尚存通宜大柴胡湯　傷寒陰毒三陰屬病深四肢厥冷吐利不渴靜踡而卧甚則面唇指甲皆青身如被杖外腎水冷其脉附骨取之則有宜回陽救急湯　回陽救急湯人參白朮白芍陳皮半夏乾干炮官桂附子炮五味子甘草炙各一㕮干七　傷寒陽毒三陽病甚狂為狂亂面赤眼紅身體狂班六脉洪大宜三黃石膏湯　三黃石膏湯石古三㕮黃芩黃連黃柏山梔仁各一㕮半麻黃一㕮香豉半合干三細茶一撮　陰極似陽陰症之極火浮於外狂躁擾乱狀若陽症然但身雖煩而引衣自蔽只雖渴而嗽水不啼脉必沈細無力此陰極似陽也以四逆湯理中湯治之凡陰症似陽面赤而脉微也　陽極似陰陽症之極熱伏於內故身涼厥逆狀若陰症然但身雖冷而不欲近衣神雖昏而氣色光潤脉必沈猶有力此陽極似陰也以大胡湯白虎湯治之　傷寒煩渴能飲水者欲愈也唯當小與勿極意也飲水則吐謂之水逆宜五苓散脉浮而渴宜竹葉石膏湯自利而渴宜猪苓湯　猪苓湯赤茯苓猪苓澤瀉阿膠滑石各一㕮先煎四味臨熟入阿膠烊温服　五苓散澤瀉三㕮半赤茯白朮猪苓各一㕮半官桂五分　竹葉石古湯石古四㕮人參三㕮麥門一㕮半ミ夏一㕮甘草七分竹葉七片粳米百粒干汁二七　傷寒潮熱一日一發謂之潮每日晡而作者陽明旺於未申故也承氣湯下之或潮於寅卯者屬小陽或潮巳午者屬太陽俱宜小柴胡湯和之　傷寒發狂熱在胃並於心使神昏不定甚則發狂非大吐下不止表裏俱熱宜三黃石古湯裏熱盛大承氣湯加黃連又宜三白飲凡發狂見陰症陰脉者由　三白飲雞子清一个白蜜一匕芒硝三㕮涼水合調下　傷寒譫語鄭聲寒則譫語虛則鄭聲二便閉澁手足濕温脉洪數者必譫語重調胃承氣湯輕者黃連解毒湯　黃連解毒湯黃連黃芩黃柏梔子各一㕮二分半　傷寒結胸病發於陽反下之曰之作結胸若心下硬痛手不可近燥渴譫語便寒脉沈有力為大結胸用大陷胸湯加只吉下之若心下按之方痛脉浮滑為小結胸宜小陷胸湯不拘寒熱用陷胸湯不愈急用只寒理中九（門應手而愈結胸無火熱者為水結宜半夏瓜令湯（門未經下而胸滿者非結胸也以小柴胡湯合小陷胸湯加只吉（傷寒結胸亦詳胸門大陷胸湯大黃三㕮芒硝二㕮甘遂末五分二貼先煎大黃次入芒硝去滓調甘遂末一㕩煎瓜婁冷次入餘藥一方加只寒黃芩吉更　傷寒痞氣病發於陰而下之早回作痞半夏瀉心湯主之痛只用只角吉更湯（門　半夏瀉心湯半夏二㕮黃芩人參甘草各一㕮半乾干一㕮黃連五分干㕩　傷寒血症太陽病六七月脉微而沈其人如狂者熱在下焦小腹當滿小便自利下血乃愈宜桃仁承氣湯輕者去芒硝入當歸尾芍忌發汗者脉微而虛故也宜犀角地黃湯血（門合小柴胡湯主之若脉浮緊身痛惡寒發熱則雖衄可汗宜麻黃湯桂枝湯　桃仁承氣湯大黃三㕮桂心芒硝各二㕮甘草一㕮桃仁留尖十介　傷寒自利陰症身痛脉沈自利宜真武湯陽症身熱脉數煩渴自利宜柴葛湯益元散署（門太陰自利宜理中湯柴葛令柴胡一㕮

六分澤瀉一㪷三分白朮猪苓赤茯各七分半半夏七分黃芩人參甘草各六分桂心三分干三　傷寒胷腹痛心胷硬痛為結胷若不經下者非結胷也乃邪氣填塞小柴胡加只吉未效合小陷胷湯小腹硬痛心腹利為畜血之症桃仁承氣湯下之小便不利則五苓散利之二便俱澁宜大承氣湯　傷寒吐衄者雖有大熱忌涼藥蓋胃中有寒則衄不安其所而上膈大出之兆也急用理中湯加梅二椒十待衄定却以小柴胡湯退熱　壞症與過經不言解同也小辨陰陽汗下失宜邪氣留連以致壞亂過經不解神昏語錯寒熱如瘧屢表症多者知母麻黃湯半表者小柴胡湯餘熱不解者參胡苓柴湯昏沈毛疵者奪命散汗後惡寒虛也宜芩藥甘草湯下後心煩腹滿宜梔子厚朴湯　知母麻黃湯知母三㪷麻黃赤芩黃芩桂心甘草炙各一㪷只角八分甘草三分干三　奪命散人參二兩濃煎新水沈冷服　芩柴甘草湯桂枝二㪷甘草炙一㪷半芩柴胡芩藥黃芩附子炮各一㪷　梔子厚朴湯梔子一㪷半厚朴三㪷只窠二㪷知母麥門各一㪷只角八分甘草三分干三　百合訂大病未復失於調理餘症在陽醫反下之餘症在陰醫反汗之以此百脉惡病故謂之百合其症常默默然欲食不能食欲行不能行如寒無寒如熱無熱身形似和其脉微澁數只赤便赤宜陶氏柴胡百合湯　陶氏柴胡百合湯無治勞復鱉甲醋炙二㪷柴胡百合知母生芍陳皮人參黃芩甘草各一㪷干�therefore　勞復食復新差未復或疏洗言動思有太過成勞復盖勞則生熱還入經絡宜小柴胡湯麥門冬湯矜熟宜梔豉只窠湯食復者胃氣尚弱恣意飲食不能克化依前矜熟宜梔豉只窠湯飲酒復者宜黃連解毒湯　麥門冬湯麥門二㪷甘草炙三㪷粳米一合右水一盞先煎粳米令熟去米入二藥及東二青竹葉十五片煎至一盞服加人參二㪷无灰　梔豉只窠湯梔子只角柴胡各一㪷香豉五㪷大黃三㪷腹陰加厚朴傷肉加山查傷麵飯加神曲　陰陽易症新差交會其毒相傳其症身熱胷緊頭重肢體拘急小腹絞痛手足皆拳即死無治急用乾干湯汗之亦有不即死之症上熱頭重節解脉緩着床不能動歲月方兜宜燒棍散赤衣散竹皮湯囊編氣欲絶竹皮逍遙散女勞復者不回易而自病復也治亦同易　乾干湯乾干三㪷夜服取汁　燒棍散取近陰處棍檔一片方圓四五寸燒存性温水調服一㪷日三男女互用之　赤衣散取室女月經布燒存性米飲調下　竹皮湯竹茹一升水三升煎半　竹皮逍遙散生羊人參知母黃連滑石甘草柴胡犀角甘草竹茹各一㪷干㕍入棍檔末一㪷煎調服熱入血室訂婦人傷寒與男子無異唯熱入血室及雜脈傷寒則不同也晝日明了夜則譫語如見鬼狀治亦見胞門小柴胡湯加牧丹皮桃仁又宜牛黃膏婦窠滿桃仁承氣湯血結胷刺期門服柱皮紅花湯　柱枝紅花湯治熱入血室及血結胷柱枝芍藥甘草各一㪷半紅花一㪷干㕍　傷寒無脉為欲汗六七日來則無克症迷忽脉靜或無脉此欲汗之兆若喘促無脉者生脉散加杏仁陳皮汗出脉續出則吉無汗脉不至則凶　差後昏沈差後無寒熱雜症二便如常但神昏不語目赤唇焦稀粥與之嚥不與則不思此熱傳心經宜導陶氏導赤各半湯　陶氏導赤各半湯一名瀉心導赤散黃芩黃連梔子知母麥門茯神犀角人

參活石各一錢甘草五分干白灯心一團煎後入生芋汁三匙
砂益元散暑門汗下後熱不退不面有汗無汗白虎湯加蒼朮人參解之最妙　孤感症其候四肢沈重默
默欲眠目不開惡聞食臭此因胃虛虫蝕五莊蝕其候則靜嘶蝕其肝食則呃乾通用黃連犀角湯　黃
連犀角湯黃連犀角烏梅木香桃仁各一錢　傷寒差後雜症虛煩不眠宜酸呂仁湯胃弱不食宜蔘苓
白朮散傷虛煩欲嘔宜竹葉石古湯　酸棗仁湯酸棗仁炒二錢麥門知母各一錢半茯令川芎各一錢乾干甘草
炙各二分半　可汗不可汗症非頭痛項強不可汗非身熱惡寒不可汗虛煩不可汗臍上左右有動氣不可汗咽乾鼻衄小便自利不可汗婦人經來不可汗脉微弱或遲者
不當汗過多為亡陽　亡陽症並汗過多致漏不止者名曰亡陽症治詳見津液可下不可下症反須表症盡罷而反發熱
惡熱譫語便閉方可下之若脉浮緊下之必痞氣若脉浮而虛不可下惡寒及嘔吐不可下小便清
不可下非尿往不可下非痞滿燥屎不可下脉沈實不可下脉不鼓擊不可下後熱不退宜再下
可和不可和症非往來寒熱不可和非脇肋急痛胥和非胃滿而嘔不可和　中寒症中寒邪氣直中三陰卒然昏倒
口噤四肢強直拘急疼痛若不急治死在朝夕先用干汁熱酒調和灌之次用回陽救急湯附子理中湯冷服
附子理中湯附子人參白朮乾干炮甘草灸各一錢一方加吳茱萸官桂當歸陳皮厚朴等分　痼冷積冷不詳解腹
痛泄瀉宜附子理中湯桂香散門腹附子溫中湯便大　感寒及四時傷寒溫不節將理失理宜邪駕侵傷人手

膝理身體侵重肢節痠疼項背拘急頭目不清鼻塞聲重淚出氣塞有表訂宜羌活冲和湯防風冲和湯芎並
香蘇散寒毒入裏吐利者藿香正氣散挾食停痰人參養胃湯痰嗽蒼蘇飲時令感冒宜升麻葛根湯　防風
冲和湯治自汗者羌活防風各一錢半白朮川芎白芷生半黃芩各一錢細辛甘草各五分干三葱二
根二錢白芍藥升麻甘草各一錢干三葱二表熱加柴胡內熱加黃芩吐血班紫加生地牧丹熱甚加山梔黃連或加連翹
天　外感挾內傷寒一訂頭疼身熱惡寒微渴漱然汗出身痛腳痠脉浮無力名曰勞力感寒不可誤作正傷寒大
發汗宜陶氏補中益氣湯　陶氏補中益氣湯人參生半黃芪當歸川芎柴胡陳皮羌活白朮防風各七分細辛甘草各
五分干白葱二乳不足則加升麻三分　孕婦傷寒宜芎蘇散外用井底泥青黛伏龍肝井水調塗臍腹上乾則再濕塗庶免
傷胎孕傷寒兒婦人門感寒參治
有五種有中風有溫濕有傷寒有熱病有溫病皆以脉推之中風之脉陽浮而滑陰濡而弱溫之脉陽濡而弱陰小而急傷寒之脉陰
陽俱盛而緊滿熱病之脉陰陽俱深而滑溫病之脉行在諸經隨其動而治之　傷寒十六名一傷寒二傷風三傷寒見風
四傷風見寒五風濕六中濕二風溫入濕溫九溫毒十中暍十一熱病十二溫病十三晚發十四痓病十五溫瘧十六疫癘
單方莒根　忍冬　蘇葉莊解表　梔子月經水並治傷寒時疫復寒熱葱白　治傷寒肘疫初發同干豉同煎服取汗
犯房傷風寒加豆豉韭白同煎尤效　葱白一握豉一合生干一塊煎服取汗並治傷寒時疫　青布數尺疊摺浸冷
水帖病上胃上須臾更浸更帖貼治大熱發狂　童女小便頓飲治犯房傷寒也

暑

暑病形恐傷暑之疹面垢自汗身熱背寒煩渴倦怠惡寒毛聳或頭疼霍亂或四肢厥冷但身體無痛中暑救急中熱渴死扶在陰涼處取途中熱坐土積死人心又積臍上(作)令人尿其中即活大蒜水研灌之或灌人尿中暍中熱之辨中暍即中暑中暑者陰症也回避暑於深堂大廈得之其症頭痛惡寒拘急肢節疼痛煩心肥熱無汗宜六和湯加羌活川芎蒼朮或二香散中熱者陽症也曰日中勞役得之其症頭痛發躁惡熱大渴引飲汗泄無氣宜竹葉石膏湯(並見寒門)　通宜小柴胡湯白虎湯(並見寒門)　夏宜補氣腹中之陽虛矣宜生脉散清暑益氣湯

生脉散　參門冬二錢人參五味子各一錢或黃芪甘草各一錢或加黃柏二分　清暑益氣湯　蒼朮一錢黃芪升麻各一錢人參白朮陳皮神曲澤瀉各五分黃柏當歸青皮參門乾薑甘草各三分五味子九粒　暑風中暑而復傷風搐搦宜二香散夏月感寒者涼氣傷外生冷傷內頭痛身疼惡寒發熱嘔吐泄瀉宜藿香正氣散(方不錄)加羌活或六和湯加羌活川芎　二香散治身熱頭痛或嘔泄香附子香薷各二錢紫蘇陳皮蒼朮各一錢厚朴白扁豆甘草各五分干三木果二忽二　暑熱煩渴宜益元散醍醐湯竹葉石膏湯香薷散　益元散(方不錄)一名一六散因寒吐瀉反胃加乾干五錢名曰溫六丸濕熱泄瀉加紅麵五錢名曰清六丸俱以陳米飯和丸　醍醐湯(方不錄)暑病吐瀉暑毒入內致腹痛惡心吐瀉宜六和湯香薷湯香朴飲子　六和湯香薷厚朴各一錢半赤茯苓香白扁豆木瓜各一錢縮砂半夏杏仁人參甘草各五分干口加夫炒黃連一錢名曰清暑六和湯　香薷湯香薷三錢白扁豆厚朴赤茯各一錢半甘草五分　香朴飲子香薷一錢半厚朴白扁豆五分干口　伏暑症每於夏月復發者為伏暑宿暑久而藏伏三焦衰出寒熱霍亂瘧痢吐瀉煩渴或腹痛下血宜酒炙黃連丸黃連四兩清酒七合浸之炙乾酒盡為度麵糊丸梧子大敦水下三十丸　注夏病春末夏初頭痛腳弱食小體熱謂之注夏屬陰虛元氣不足也宜補中益氣湯內加南星半夏又宜生脉散參歸益元湯　參歸益元湯當歸白芍敦羊白茯參門各一錢陳皮知母黃柏並酒炒各七分人參五分甘草三分五味子十粒口二米一撮　暑月常食免中暑然不可多食損胃　馬通(臘月馬糞取乾煎湯飲治一切暑病)

濕

濕乃水氣風而雨濕虛山澤承氣人多中濕氵在經則日晡發熱昊塞在關節則一身盡痛在莊府則清濁混而大便濡泄小便反渋腹或脹滿濕熱搏則遍身發黃　霧露之氣為瘴東南山坡水惡瘴毒襲入胃滿不食宜平胃散(五莊)神朮散　神朮散治頭疼項強蒼朮三錢川芎白芷細辛藁本羌活甘草各一錢干三葱二　霧露清濁邪濁邪中於下焦足脛逆冷便尿忘出宜理中湯四逆湯(並見寒門)清邪中於上焦發熱頭痛項強腰痛膝痠宜九味羌活湯藿香正氣散　火熱生濕氵不自生曰火熱承血水液不行停滯而成二陳湯加酒芩羌活防風又宜清燥湯(足部治腳膝疼軟　中溫脉沈而微後腹滿倦怠開節痠疼而煩挾風則

眩暈嘔噦挾寒則痙拳製痛或外感痛氣冒雨涉水卧濕地而得者為外中濕內傷生冷厚味醇酒停滯而得者為內中濕俱宜勝濕除濕湯　勝濕湯白朮三錢人參乾干白芍附子桂枝白茯甘草各七分半干吾　除濕湯蒼朮厚朴半夏各一錢半薑香陳皮各七分半甘草五分干七吾二　風濕風勝則胃虛汗出氣短惡風濕勝則小便不利或身體微腫宜羌附湯除濕羌活湯風濕相搏一身盡痛法當發汗三之不愈者汗太出則但風氣去而濕氣留故也宜微二出汗令風濕俱去　羌附湯無治身痾羌活附子白朮甘草各一錢半　除濕羌活湯蒼朮藁本各二錢羌活一錢半防風升麻柴胡各一錢　寒濕以尿赤有渴為熱濕以尿清不渴為寒濕寒濕交攻身冷痛宜加劑除濕湯　加劑除濕湯赤茯乾干各二錢蒼朮白朮甘草各一錢橘紅桂皮厚朴各五分干吾　濕熱為病十居八九首為諸陽之會濕氣薰蒸則清道大不通似乎蒙胃宜九味羌活湯寒門神朮散濕熱久痼大筋拘攣小筋痿弱實者三花神祐丸下虛者清燥湯門有氣如火從脚下氣起入腹此濕盛成熱而作宜三妙丸加味三妙丸加蒼朮黃柏等分為末水丸服　濕溫兩脛逆冷腹滿頭痛喎斜等症皆治之赤茯白朮乾干澤瀉桂心各一錢　酒濕酒濕為病亦能作痺喎斜不遂舌強語渋津似中風當瀉濕毒不可作風而汗也宜蒼橘湯　蒼橘湯蒼朮二錢陳皮一錢半赤芍赤茯各一錢黃柏威靈仙羌活甘草各五分　破傷濕破傷處入水濕成痙牡蠣粉付瘡口仍取末二錢甘草湯調下濕多身痛暑無身痛暑病無痛者傷氣而不傷形故也濕病多身痛無風一身盡痛　濕病痛治濕莫若生附蒼朮為快宜生附湯通用平胃散五莊二陳湯為主上焦加羌活川芎蒼朮中焦加猪苓茯苓澤瀉下焦加防已木通活石熟則上加黃芩中加黃連下加黃柏　生附湯尤宜寒濕蒼朮杜冲各一錢半生附子牛膝厚朴乾干白朮赤茯甘草各七分干吾　濕病禁汗下及灸濕病忌灼艾灸之濕病誤下則為喘噦誤汗則發痙而死　單方龜肉治濕痹常食煮粥常服　薏苡去濕勝痺煮粥常服　茯苓淡能滲利治濕聖藥

燥

燥病火勝則金衰而風生風能勝濕熱能耗液而為燥又曰燥之為病血液衰火不能榮養百骸故也燥於外則皮膚皴揭瘙痒燥於中則精血枯涸燥於上則咽喉焦乾燥於下則便尿結閉宜當歸承氣湯　燥宜養血積液生氣積氣生液宜瓊玉膏潤身　又以四物湯去川芎合生脉散加天門天花粉知栢紅花甘草之類二門冬人參五味子枸杞子皆生脉潤燥之劑宜天門冬膏生血潤膚飲又防風通聖散能清血潤燥風門　當歸承氣湯當歸大黃各二錢芒硝七分甘草五分　天門冬膏天門生去心搗取汁砂鍋熬膏酒調下一二匙生血潤膚飲天門一錢半生半熟半麥門當歸黃芪各一錢酒苓瓜婁仁桃仁泥各五分升麻二分紅花一分五味子九粒　單方山茶能潤燥蒸食煮粥常食　天麥門冬生熟地黃煎服酒浸煎服皆佳　牛酥作粥常食最妙也

火

火為元氣之賊火之為病其害大其變甚速其熱甚彰其死甚暴人身有二火曰君火者即人火也曰相火者即龍火也在氣交之中多動小靜五性厥陽之火相扇妄動煎熬真陰虛則病陰絕則死　肝熱寅卯間尤甚便難轉筋多怒多驚筋痿不能起宜瀉青丸五柴胡飲子　心熱日中太甚煩心心痛掌中熱宜導赤散五　脾熱遇夜尤甚迫急惕嗜卧四肢無氣實熱瀉黃散五虛熱宜補中益氣湯內傷　肺熱日西尤甚喘咳寒熱輕者瀉白散五重者凉膈散　腎熱遇夜尤甚如虫蝕骨困熱不任滋腎丸小便六味地黃丸五皆佳　柴胡飲子柴胡黃芩人參當歸赤芍大黃甘草各一錢千三　臟腑熱之部分心熱則胃熱肺熱背熱肝胆熱則當脇熱腎熱則腰熱脾胃熱則臍上熱腸熱則臍下熱　大熱虛實能食而熱口舌乾燥大便難者實也以辛苦大寒之劑瀉熱補氣　熱有晝夜之分晝熱行陽宜柴胡飲子夜熱行陰宜四順清凉飲又曰晝發熱者熱在血分四物湯加知柏黃連梔子柴胡收丹晝夜俱發熱者熱在氣血之分四物湯合小柴胡湯加黃連梔子又曰氣分實熱白虎湯血分實熱四順清凉飲氣分虛熱清心蓮子飲消渴血分虛熱滋降火湯　四順清凉飲大黃芩當歸赤芍甘草炙各一錢二分半薄荷十葉　火有三焦之異上焦熱眼目赤頭項痛口舌生瘡宜凉膈散抑青丸清心湯九

骨蒸肉燥筋枯多發於虛勞者陰虛而火炎也

味清心元清金降火丹加減凉膈散中焦熱胃膈煩燥飲食不美宜調胃承氣湯四順清凉飲當歸龍薈丸五白术除濕湯下焦熱小便赤澁大便秘結宜大承氣湯八正散小五苓散防風當歸飲子三焦俱熱即生瘧癇　抑青丸無治酒熱黃連酒炒糊丸白湯下三十九　清心湯甘草一錢七分連翹梔子大黃酒蒸薄荷黃芩黃連各七分朴硝五分竹葉七分　九味清心丸蒲黃二兩半犀角二兩黃芩一兩半牛黃一兩二錢羚羊角射香龍腦各一兩雄黃八錢金箔一千二百片內四百片為衣蜜丸兩作三十九含化下　加減凉膈散連翹二錢甘草一錢半梔子黃芩吉更薄荷竹葉各五分或加防風　清金降火丹治肺虛熱天門冬門蓮實各一兩五味子五錢砂糖五兩龍腦三分蜜丸兩作三十九含化下　白术除濕湯白术一錢三分生羊地骨皮澤瀉知母各一錢赤茯人參柴胡甘草各一錢大黃當歸赤芍防風各五分干薑三　通治三焦火宜三黃湯三黃元三補丸黃連解毒湯防風通聖散　三補丸黃芩黃連黃柏等分糊丸梧子大白湯下五十九　積熱藏府積熱煩赤燥渴口舌生瘡五心煩燥便尿秘澁宜三黃湯三黃元凉膈散炒香丸翹二錢大黃芒硝甘草各一錢薄荷黃芩梔子各五分竹葉七片蜜小許　三黃湯以三黃元材取五錢作湯　凉膈散連龍腦臘粉射香各三錢巴豆三十二介金箔九片黃蠟六錢蜜小許和擣兩作三十九凉水下一九　骨蒸熱五臟六腑皮肉筋脉皆有蒸而獨言骨蒸者陰血不榮骨髓枯涸先從骨熱故曰骨蒸宜五蒸湯

地仙散清骨散婦人骨蒸四物湯加地骨皮牧丹皮　五蒸湯石膏二戋生羊乾葛各一戋半人參知母黃芩赤
茯各一戋甘草五分竹葉七片粳米一合小麥二合　地仙散地骨皮四戋防風二戋人參甘草薄荷各一戋
竹葉五片干三一方加麥門一戋烏梅一戋　清骨散生羊柴胡各二戋熟羊人參防風各一戋薄荷七
分秦艽赤茯胡黃連各五分　五心熱由煩熱者火盛脾土也有血虛而得或曰過食抑遏陽氣於
脾土之中宜升陽散火湯升麻乾葛羌活獨活白芍人參各一戋　升陽散火湯升麻乾葛羌活獨活白芍人參各一戋
柴胡甘草各六分防風五分　潮熱有時而熱不失其時也熱在陽分宜白虎湯　四順清
涼飲氣血兩虛有汗潮熱宜茯苓補心湯　加減逍遙散逍遙散婦人本方加胡
黃連麥門地骨皮黃芩秦艽木通車前子灯心等分　虛煩心虛則煩又肝腎脾虛亦煩其症心胸煩擾不
寧也陰虛之人者及傷寒嘔亂吐瀉後多有此症宜竹葉石膏湯　竹葉石膏湯寒門人參竹葉石膏麥門
人參竹葉湯石膏麥門各二戋半夏一戋人參甘草各五分竹葉七片干五粳米一撮　既濟湯竹葉石膏湯寒門
去石膏加附子二戋　上升之氣屬火病人自言冷氣從下而上者非真冷也此上升之氣中挾相火而上火
挾似水積熱之甚也氣從左邊起宜當歸龍薈丸五粒　氣從腎下起宜滋陰降火
湯　陰虛火動陰虛則生內熱其症潮熱盜汗咳嗽痰血氣力困怠形容消瘦腰痛脚疼遺精夢泄
四物湯加鹽炒知柏甚者加龜板宜滋陰降火湯清離陽坎湯清肺滋陰散六味地黃丸五

滋陰降火湯白芍一戋三分當歸一戋二分熟羊麥門白朮各一戋生羊酒炒八分陳皮七分知母黃柏並鹽
炒甘草炙五分干姜　清熇滋坎湯熟羊乾羊天門麥門當歸白芍山茱萸山藥白茯白朮各七分牧丹澤
瀉黃柏知母並蜜炒甘草炙各五分　清肺滋陰散治火動喘咳虛煩生羊一戋半白芍八分川芎白朮陳
皮黃柏蜜炒知母貝母麥門地骨皮各五分白茯款冬花紫菀遠志各四分五味子山茛仁各三分黃連
炒甘草炙各二分干三煎後調竹瀝五匕　簫除勞熱　常食　童便降火極速或和
鷄子治心胃虛煩鷄子白三个和蜜一合頻服妙　竹葉治同上煮飲　梔子治三焦積熱炒末糊丸服名栀金丸　脂麻油治熱麻油一合雞子清二个攪硝三戋和自服　水芹治熱常食

內傷

食傷訂因多食飲食不能運化或外冒六氣內感七精以致胸腹飽悶惡食不食噯氣作酸或腹痛吐瀉重
則矜熱頭痛右關緊盛莫若消導宜香砂平胃散只朮丸之類也重則攻化宜消滯丸尤重則或吐或
下宜備急丸之類　食傷消導之劑宜只朮丸養黃芪朮丸平胃散五粒香砂平胃散消滯丸香壳丸
枳朮丸白朮二兩只一兩薄荷煎湯打糊丸梧子大白湯下百丸　三黃只朮丸治傷肉食麵澒熟厚
味悶乱黃芩二兩黃連酒炒大黃神曲白朮陳皮各一兩只宗藿香各八分厚朴砂仁各七分木香甘草各五分干三・　香砂平胃
散蒼朮三戋陳皮香附各一戋只宗藿香各八分厚朴砂仁各七分木香甘草各五分干三・　消滯丸
治酒食水氣痞積脹痛等分疝黑丑頭末二兩香附五灵旨各一兩糊丸菜豆大干湯下三十丸　香壳丸

青皮陳皮各二兩只角一兩香附七戔半蘿蔔子木香三枝蓬朮神曲麥芽枳椇只窠山查草果各五戔半夏一兩二戔半陳倉米一升巴豆二十介同炒黃去巴豆醋糊丸梧子大白湯下八十九　食傷補益之劑脾胃虛弱飲食難任宜六君子湯痰飲補中益氣湯醒脾育胃湯健脾保和丸異功散五莊蓼莪壯脾丸　醒脾育胃湯人參白朮白茯各一戔半夏砂仁白芍麥芽蒼朮厚朴薑香陳皮各八分只窠五分干台　健胃保和丸白朮二兩神曲白豆久木香各五戔糊丸梧子大白湯下七十九　蓼莪壯脾丸人參白朮白茯砂仁神曲麥牙山藥白扁豆官桂乾干胡椒各一兩蜜丸彈子大白湯嚼下一丸　酒傷飲食過多嘔吐痰逆手足戰搖精神昏亂宜葛花解醒湯傷酒積熱出血下血宜酒蒸黃連丸門血葛黃丸門血並傷酒食痰盛胃不化宜對金飲子傷酒尒熟煩渴尿赤宜解酒化毒散傷酒膈熱口瘡咽痛宜升麻葛根湯寒門飲酒房勞酒入百脉恍惚失常宜人參散令酒不醉無治酒後頭痛嘔吐煩渴宜三豆解醒湯葛花散　葛花解醒湯葛花砂仁白豆久各五戔青皮三戔白朮乾生半神曲澤瀉各二戔人參豬令赤茯陳皮各一戔半木香五分為末每三戔白湯調下微汗　對金飲子陳皮三戔厚朴蒼朮甘草各七分干三或加乾葛二戔赤茯砂仁神曲各一戔尤妙　解酒化毒散人參散熟半二戔人參白芍天花粉只角茯苓各一戔　三豆解醒湯葛根二戔蒼朮一戔半陳皮赤茯木尒半夏各一戔神曲七分澤瀉五分乾生干三分黑豆菉豆赤豆各二戔渴甚加黃連五分　葛花散葛小豆花等分焙乾為末白湯下二戔一名葛花散

勞倦傷喜怒不節起居不時有所勞倦皆損其氣四肢困熟懶於言動喘冬自汗心煩不安宜補中益氣湯春加川芎防風柴胡夏加乾葛麥門倍升麻秋加羌活防風冬加麻黃桂枝乾干之類又曰飲食失時勞力過度脾胃虛弱中氣不足以補中益氣湯主之益胃升陽湯升陽順氣湯升陽益胃湯皆可選用多汗黃芪建中湯虛勞無外感宜陶氏補中益氣湯寒門又曰飲食七精皆泠令三焦閉塞失其傳化嘔泄痞滿然但傷食則惡食傷七精則雖飽不惡食氣浮心亂為異以朱砂安神丸神門固鎮之　補中益氣湯黃芪一戔半人參白朮陳皮當歸甘草各一戔升麻柴胡各五分或加黃柏三分紅花二分　益胃升陽湯白朮一戔半黃芪一戔人參神曲七分半當歸身陳皮甘草炙五分升麻柴胡各三分黃芩二分　升陽順氣湯治春溫疫無味夏熱惡寒胃滿黃芪二戔半夏一戔二分草豆久八分神曲當飯陳皮人參各六分升麻柴胡甘草各四分黃柏三分干三　升陽益胃湯治秋燥惡食體重口燥惡寒黃芪二戔人參半夏甘草各一戔羌活防風白芍各七分陳皮五分柴胡白朮茯苓澤瀉各三分黃連三分干台　內傷脾胃則惡食陰虛則口中有味陽虛口中無味又曰胃無氣則惡食平胃散加乾干為厚朴湯合五苓散寒門為胃苓湯合六一散為黃柏散加薑香半夏為不換金正氣散　二麵元神曲半夏曲等分干糊丸　香砂六君子湯香附白朮白茯半夏陳皮白豆久厚朴各一戔砂仁人參木香益智仁甘草各五分干台　蔻神湯粟蓼為末四兩入干汴鹽小許和作餅子焙乾砂仁白朮甘草炙各一

兩為末鹽湯點服二戔　食後昏困倦欲瞌者脾弱而升
柴胡一戔半生羊一戔升麻澤瀉白芍防風羌活猪苓甘草各七分厚朴五分干台　不嗜飲食由下元陽衰
宜三神丸便大　吞酸吐酸漚熱在胃口飲食壅遏不化故作酸也宜透膈散薬兼丸蒼連湯平肝順氣保中
丸又曰朝食甘美至晡時心腹刺酸吐出三血虛火盛宜四物湯加陳皮黃芩黃連桃仁紅花麻仁甘草　透膈
湯滯膈吞酸地榖木香白豆久挍即砂仁只角厚朴半夏青皮陳皮甘草大黃芒硝各八分干台　茱連
丸治盍積吞酸吳茱洗陳皮黃芩壁土炒各五戔黃連壁土炒一兩蒼术七戔半神曲糊丸梧子大白湯下七
十丸一方黃連一兩吳茱萸五戔為丸　蒼連湯蒼术黃連干炒陳皮半夏赤茯神曲各一戔吳茱萸炒
仁各五分甘草三分干三　平肝順氣保中丸治盍積吞酸嘈雜能健胃消滯抑肝化痰白术土炒四兩香附
便炒三兩陳皮二兩半川芎只宋黃連干炒神曲炒山查各二兩半夏一兩半梔子干炒蘿蔔子炒白茯乾生干
吳茱萸各一兩麥牙炒七戔青皮油炒六戔砂仁炒甘草炙各四戔木香三戔竹瀝打神曲為糊丸菜豆大白湯
下百丸　嘈雜似飢不飢似痛不痛嗳噫不自寧之況者是也或思暖氣無痞滿或無惡心皆痰火之為患
也宜消食清盍湯平肝順氣保中丸思慮傷心血虛嘈雜宜當歸補血湯　消食清盍湯半夏陳皮白
茯神曲炒山查香附子川芎麥牙炒只角梔子炒黃連干炒蒼术釀香甘草各七分干三　當歸補血湯無治
怔忡白芍當歸生羊熟羊各一戔白术白茯麥門梔子陳皮各八分甘草三分炒末百粒棗二梅二辰砂三分調

服　噫氣噫者轉出食也氣胃中盍火臍上稠痰之作宜二陳湯加蒼术神曲麥牙干炒黃連宜破盍丹　破
盍丹香附醋炒梔子炒各四兩黃連干炒二兩只宋梹榔蓬术青皮瓜蔞仁蘇子各一兩水九梧子大水下五十九
噎嘔　反胃並見吐門　不伏水土病與內傷同腸胃不習疾病必生與癆同源不搜金正氣散藿香正氣散並見寒門隨
水土冷熱加減用之金以扶脾胃為本　內傷調保藥宜參苓白术散太和丸雲林潤身丸異功散五柱丸仙王道糕
還元丹　參苓白术散无宜大病後調理人參白术白茯山藥甘草炙各一戔三分薏苡仁連肉吉更白扁豆砂仁
各七分干台　太和丸白术土炒四兩白茯白芍神曲麥牙各三兩半便香附當歸只宋各二兩龍眼肉無代益智白豆炙各一
兩三戔半夏一兩三戔陳皮黃連干炒山查各一兩甘草炙七戔人參木香各五戔荷葉煎湯打糊丸梧子大米飲
下百丸　雲林潤身丸當歸酒洗白术各六兩白茯陳皮便香附黃連干炒山查神曲各三兩只宋白芍人參山藥
連肉各二兩甘草炙五戔九法服法同上　九仙王道糕蓮肉山藥炒白茯薏以仁各四兩麥芽白扁豆炒炙仁各
二兩柿霜四兩砂糖二斤兩為末入粳米粉五升蒸糕晒乾　還元丹黃牛肉筋膜切作碁子大河水洗四浸一宿
再洗水清為度用好酒同入沙鍋內油紙封口用柔柴火煮一晝夜取出焙乾為末色如黃沙為佳每肉
末半斤入後菜一斤連肉山菜葱鹽同炒去葱鹽白茯前香炒為末各四兩蓯蓉肉入酒和搗梧子大酒
化下七十九日三久則一進　食厥暴傷飲食昏倒不省用薑鹽湯吐之用加味六君子湯　加味
六君子湯香附子一戔半白术白茯陳皮半夏各一戔人參七分木香砂仁各五分甘草三分紫蘇十葉

千吉　食積頭傷寒傷寒杼熱頭痛症似傷寒宜陶氏平胃散　陶氏平胃散蒼朮一戔半厚朴陳皮白朮各一戔黃連只宗各七分草果六分神曲山查乾干朮香甘草各五分干三　內傷飲食宜下飲食猝然滯隔宜除源散備急丸急救傷熱物大便不通宜枳朮大黃湯　除源散以扉食之物燒存性為末一兩生韭一握取調服過一二時以備急丸之類催之　枳朮大黃湯大黃三戔厚朴枳朮炒陳皮甘草各一戔木香五分　單方茶消食燥飲菜豆粉解酒作麵羅當子消麵食毒生與咽之黑糖化胃常食牛膽和酒每朝空心溫飲一盃之治近久士疾

虛勞

虛勞症榮衛俱竭五勞七傷骨蒸潮熱腰背拘急百節痠疼夜多盜汗遺精夢泄心常驚悸咽燥唇焦嗜卧火力肥膚瘦悴咳嗽多淡嗽咯血絲寒熱往來耳鳴氣短頰赤神昏專不進食用熟藥則煩用涼藥則滿最難調治　辨虛氣血虛陽虛陰虛形肥而面浮白者陽虛形瘦而面蒼黑者陰虛房勞思慮傷心腎則陰血虛飢飽勞力傷胃氣則陽氣虛　陰虛用藥則血虛也午後漸淅脉濡而形宜四物湯血門滋陰降火湯清熱滋坎湯二方火門加味補陰丸瀉陽補陰湯　加味補陰丸黃栢知母各四兩牛膝杜冲巴戟熟羊山藥莧各三兩肉蓯容白茯枸杞子遠志山藥鹿茸龜板各二兩蜜丸梧子大鹽湯下九十九　瀉陽補陰湯黃栢鹽炒一戔半天門貝母黃連干炒各一戔杏仁七分半知母生羊各七分紫菀赤芍各六分天花粉吉更斤參當歸白茯各五分白朮二分半五味子九粒梅一灯心一撮　陽虛用藥則氣虛也小氣自汗脉微宜四君子湯氣門益胃升陽湯內傷柱附湯鹿茸大補湯　柱附湯桂皮三戔附子炮二戔干吉白芍白朮附子炮人參官桂半夏石斛五味子各七分鹿茸黃芪當歸白茯熟羊各五分甘草二分半干吉　陽虛俱虛用藥即氣血俱虛也宜遵和湯八物湯十全大補湯固真飲子人參養榮湯古菴心腎丸滋陰大補丸　遵和湯白芍二戔半熟羊黃芪當歸川芎各一戔桂皮甘草各七分半干吉　八物湯人參白朮白茯甘草熟羊白芍川芎當歸各一戔二分　十全大補湯人參白朮白茯甘草熟羊白芍川芎當歸黃芪肉桂各一戔干吉　固真飲子熟羊一戔半人參山藥當歸黃芪蜜炒黃栢鹽酒炒各一戔陳皮白茯各八分杜冲炒甘草炙各七分白朮澤瀉山茱萸破古紙炒各五分五味子十粒　人參養榮湯白芍酒炒二戔當歸人參白朮黃芪蜜炒官桂陳皮甘草炙各一戔熟羊五味子防風各七分半遠志五分干吉　滋陰大補丸熟羊二兩半膝山藥各一兩半杜冲巴戟山茱萸肉蓯蓉五味子白茯菌香遠志各一兩蒿蒲枸杞子各五戔棗肉和蜜丸梧子大溫酒下九十九　心虛心藥血不足宜天王補心丹清心補血湯神門古菴心神丸熟羊乾羊山藥茯神各三兩當歸澤瀉黃栢鹽酒炒各一兩半山茱萸枸杞子龜

枳酥炙牛膝黃連木丹皮鹿茸酥炙各一兩甘草五戔朱砂一兩為衣蜜丸梧子大鹽湯或溫酒下和百丸

肝虛藥面無血色筋緩目暗宜四物湯復和湯黑元　黑元當歸酒浸二兩鹿茸酥炙一兩煮烏梅為膏丸梧子大酒下七十丸等分為歸茸丸加山茱萸佐射香為拱抿丼　脾虛藥飢肉消瘦飲食不進宜還元丹參苓白朮散九仙王道糕三方內傷橘皮煎元橘皮五兩甘草三兩三戔當歸草薢肉蓯蓉吳茱萸厚朴官桂陽起石巴戟石斛附子兒僅子牛膝鹿茸杜沖乾干各一兩為末用酒一升半磁鍋先煎橘皮如糊入諸藥末搗丸梧子大酒下七十九　肺虛藥咳嗽疾盛氣急嗑血宜保和湯　腎虛藥左腎不足則陰虛右腎不足則陽虛陰虛六味地黃丸五莊腎氣丸陽虛八味丸五莊加味八味丸三味安腎丸　腎氣丸六味地黃丸一劑加五味子四兩乃滋肺之源以生腎水也　加減八味丸乾羊二兩山藥微炒山茱萸各一兩澤瀉酒蒸牧丹皮白茯各八戔五味子略炒一兩半官桂五戔蜜丸梧子大酒下七十丸　三味安腎丸令腎氣歸元破古紙苗香乳香蜜丸梧子大鹽湯下五十丸　虛勞通治藥夏用六味地黃丸精秋腎氣丸冬宜八味丸通用二神交濟丹茯神薏苡仁各三兩山芍仁枸杞子白朮神曲各二兩栢子仁炙仁生乾羊麥門當歸人參陳皮白芍白茯砂仁各一兩為末山藥糊蜜丸梧子大米飲下七十丸　小建中湯白芍五戔桂枝二戔或代薄桂甘草炙一戔干五白四煎去滓入黑糖一兩膠化服氣虛自汗加當歸名曰當歸建中湯　血虛自汗加當歸名曰當歸建中湯　天地煎天門二兩熟羊一兩蜜丸梧子大人參湯下百丸　衛生湯黃芪蜜炒二戔白芍酒炒當歸身各一戔半甘草炙七分入酒小許煎氣虛加人參　保和湯治肺痿咳嗽嗢血知母貝母天門麥冬花各一戔麥門天花粉薏以仁杏仁五味子各七分馬兜令紫菀百合吉更阿膠當歸乾羊酒炒甘草炙各三分半紫蘇薄荷各二分干三煎去滓入黑糖一匙熔化服血盛加蒲黃茜根藕節痰盛加南星半夏陳皮只角瓜婁仁喘急加杏白皮葶藶子陳皮熟盛加梔子芒參連翹風盛加防風荊芥金佛草寒盛加人參桂皮　簡方五味子補不足作煎作丸皆可補勞傷釀酒服戊戌酒大補券　猪肚　取一箇洗淨用黃芪熟羊入肚內以竹簽簽之用糟包肚入罐重湯爛熟用建脾補虛

霍亂

霍亂形疤內有乖積外有乖感昇降乖職心腹痞痛吐利並作揮霍變亂祟頭痛轉筋拘急四肢逆冷隨疤治之　乾霍亂說法吐利不得喘脹多危急用干鹽湯吐之續以理中湯加橘紅與之或藿香正氣散不可用冷藥又曰絞腸　者乃乾霍亂之一種詳見拘急亦用鹽湯吐之　薑鹽湯鹽一兩生干五戔功同炒變色童便煎半盞鹽湯亦炒　濕霍亂治法上吐下瀉輕於乾霍熱欲飲水宜五苓散寒門寒多不飲水宜理中湯寒門通用藿香正氣散暑門暑霍宜香薷湯暑門二香黃

連散冷霍吐手足厥冷宜加味羌附湯通宜木臭散前香散又白礬末一戈沸湯點服又袋盛炙
塩三梳胷腹及背帖之以斗火熨之又鍼委中或十指頭出血　吐瀉過多四肢逆冷南星末三戈干五白三
濃煎乘熱飲　二香黄連散藿香厚朴半夏赤茯陳皮白扁豆香薷各一戈黄連澤瀉各八分甘草三分
入干汴一乞　加味薑付湯附子炮乾干炮人參各一戈半甘草七分　木臭散治吐瀉轉筋四逆豆吳茱臭木瓜食塩
各五戈三味同炒焦水三升煎至二升任意用之　回生散藿香陳皮各五戈　霍乱後轉筋大吐瀉津液驟亡宗筋
失真其既养故軽者両脚轉筋重者遍體轉筋入腹手足厥冷急用塩填胳中灼艾灸不計壯数雖死回生
因用木瓜湯或木臭散加菌香甘草紫蘇煎服又用大蒜研爛塗両足心　木瓜湯木瓜四戈吳茱臭二戈菌香
炒一戈甘草炙四分干三紫蘇十葉極一　霍乱後煩渴宜竹葉石膏湯寒門酸棗仁湯夢門水疾吐瀉來船吐瀉飲水
必死只飲童便最好又枯白礬末一戈滞湯煎服亦妙　單方塩湯　生熟湯並宜初發時多飲探吐也　木瓜治霍亂效枝葉同功　香薷治吐瀉轉
筋濃煎飲　炮鹿皮水浸揉取汁服治乾霍妙　秫黍葉治轉筋取葉濃煎飲神效　雞屎炒浸白沸湯取清飲　蒜花多取煮飲　醋一鍾温服尤妙

嘔吐治法諸嘔吐衝逆皆屬於火又曰總屬陽明氣血俱病其中有痰隔中焦者有氣逆者有寒氣盍結於胃口者
有食滞心肺之分新食不得下而反出者有胃有火而嘔者非止一端嘔家雖屬陽明慎不可下逆之故也又面青手
足厥冷食久乃吐者胃寒也宜加減理中湯面赤手足熱食已即吐者胃熱也宜保中湯酒客胃熱也宜葛根

竹茹湯大病後虚煩而吐者竹葉石膏湯寒門加干汴肝火出胃逆上宜抑青丸門火胃虚者宜四味藿香湯久病
胃虚悪食而吐宜比和飲痰飲嘔吐宜茯苓半夏湯停水心下怔忡先渴後嘔者宜二陳湯合五苓散門寒先
嘔後渴及水入即吐者宜五苓散寒門生干治嘔最佳然遇熱嘔不如烏梅　加減理中湯人參白朮赤茯乾
干陳皮藿香丁香半夏砂仁桂皮各一戈干三梅一　保中湯白朮土炒二戈黄芩黄連並土炒藿香梔
子干炒各一戈半夏陳皮赤茯各八分砂仁三分甘草二分干三長流水和黄土取清煎　葛根竹茹湯
葛根三戈半夏二戈甘草竹茹一弹干台非徒酒宿欲宜胃熱嘔者皆佳　四味藿香湯藿香人參陳皮
半夏各二戈干三　比和飲人參白朮白茯神曲各一戈藿香陳皮砂仁甘草各五分陳倉米一合長流水和扶龍肝取清入
干台煎曰三三進　茯苓半夏湯半夏二戈赤茯陳皮蒼朮厚朴各一戈藿香八分砂仁乾干甘草灸各五分干三梅一
悪心乾嘔欲吐不吐見飲食則悪之便嘔有聲無物手足冷者宜生薑橘皮湯有胃熱梔子竹茹湯　生薑橘皮湯橘
皮四両生干八両水七盌煎至三盌時入呷服　梔子竹茹湯梔子炒三戈陳皮二戈竹茹一戈半煎入干汴小許　食痺吐食食已
心下痛陰然不可名吐出痛及止有風痰羈絆于脾胃之間故也宜金花丸　金花丸半夏一両棋即二戈雄黄水飛一戈半薑
糊丸梧子大干湯下五十九　噎噦反胃飲食不下大便閉秘有拒格之意由血液俱耗胃腕乾枯其枯在賁門食入則胃腕痛更
吐出痛及止化上焦之噎噦也其枯在闌門朝食暮吐暮食朝吐此下焦之噎噦也各五噎
者憂食勞氣思也非虚非寒非冷非熱乃神氣中一點病耳又曰大率屬血虚氣虚有痰者熱血虚者四物湯氣虚者四

君子湯門氣 痰用二陳湯熱用黃連解毒湯寒門氣血俱虛八物湯虛勞必皆和以意便斟酌瀝干汁韭汁宜當歸養血湯生津補血湯安胃湯太倉丸　當歸養血湯當歸白芍熟半生半白茯各一錢黃連以吳茱萸同炒去茱萸分貝母炒瓜蔞仁只宜陳皮厚朴香附川芎穞子各七分沈香五分水磨取汁調服干白竹瀝　生津補血湯當歸白芍熟半生半白茯各一錢只宜陳皮黃連炒穞子貝母各七分砂仁沈香水磨取汁各五分干白　安胃湯白朮白茯山藥當歸陳皮半夏蘆香各一錢黃連干炒蓮肉各八分人參砂仁各五分甘草三分干白梅一　太倉丸白豆久砂仁各二兩陳倉米一升黃土炒去土干糊丸梧子大干湯下百丸　嘔吐噎噦反胃宜通大便大小便不秘者當忌利藥而若大小腸膀胱熱結不通上為嘔吐隔食則不用利藥開通而何由止乎宜人參利膈丸大黃湯陰虛邪逆塞嘔噎吐地道不通當用生半當歸桃仁紅花甘草畧加大黃半硝為炒　人參利膈丸人參當歸蘆香只角大黃厚朴甘草各一兩木香檳榔各七錢半水丸梧子大白湯下七十丸　大黃一兩用干汁半盞浸炙汁盡為度為末每三錢陳米一撮葱白三莖水一盞煎至七分先食空白次調藥末服　草方活石治暴吐水調二錢服治反胃干丸服佳蘆根治乾嘔及噦噦水煎服五六次蜈蚣治反胃食食佳杵頭糖治噎食塞丸禽化下酒調下二錢治反胃　鵝矢抱出敲燒炭

咳嗽

咳嗽病因秋傷於濕冬必咳嗽又曰形寒飲冷則傷肺咳嗽則為咳治法春氣上升宜潤肺抑肝夏火上炎宜清金降火秋濕熱甚宜清熱瀉濕冬風寒重宜解表行痰早晨嗽多者胃有食積胃火流入肺中瀉白散秈加知母止半日嗽多者屬胃中有火宜用貝母石古干後嗽多者屬陰虛四物湯合二陳湯加知柧參門黃昏嗽多者肺之浮火宜用五味子飲而降之夜嗽者乃陰虛火動宜降陰火禁忌藥火嗽忌人參半夏陳皮等燥苦氣嗽忌鬰葉南肉豆久等澁苯凡咳嗽口乾咽燥者雖有痰忌半夏南星宜用栝蔞仁貝母　風嗽風來肺則臭寒寢重口乾咽痒語未竟而嗽宜金佛散三拗湯　金佛散荊芥穗二錢旋覆花前胡各一錢半麻黃赤茯各一錢半夏七分半細辛甘草各三分干白梅一　三拗湯麻黃不去根節杏仁不去皮尖甘草各二錢干五　寒嗽寒傷肺者咳則胸緊寢噁寒熱無汗煩燥不渴遇寒而發宜華蓋散橘籣飲人參款花膏治肺胃虛寒久嗽款冬花參橘紅穞葉杏仁白朮半夏茯苓白皮貝母五味子各一錢甘草五分干三　人參款花膏治肺胃虛寒久嗽款冬花參五味子茯苓白皮紫菀各一兩蜜丸芡實大每一丸干湯嚥下　溫肺湯乾干桂皮半夏陳皮五味子杏仁甘草各一錢細辛阿膠珠各五分干白　熱嗽傷於暑熱煩燥引飲或吐沫痰嗽嘶咯血宜洗肺散貝母散　洗肺散半夏三錢黃芩二錢天門冬門冬五味子各一錢半杏仁一錢甘草五分干白或加地骨皮　貝母散杏仁三錢款冬花三錢知母二錢半貝母桑白皮五味子甘草各一錢干三或加黃芩　濕嗽濕勝肺者骨節煩疼四肢重着或有汗小便不利宜白朮湯　白朮湯白朮三錢半夏橘紅白茯五味子各一錢半甘草五分干五　蓋嗽與乾嗽大同有痰痰小面赤乃腎精焦枯火炎傷肺宜瀉白散秈清化丸清金降火湯　清化丸貝母一兩杏仁五錢青黛三錢干糊砂糖

和九彈子大噙下　清金降火湯陳皮杏仁各一戔半赤茯半夏吉更貝母前胡瓜婁仁黃芩石古各一戔只角八分甘草三分干三　勞嗽即虛勞咳嗽也盜汗多痰寒熱宜清金補血湯宜人參清肺湯　補肺湯知母湯滋陰清化膏勞極六味地黃丸莊加橘紅貝母知栢症治病詳虛勞大門　人參清肺湯治久咳嗽血醒臭人參柒白皮地骨皮知母阿膠珠鷰粟壳蜜炒杏仁吉更甘草各一戔台一栢一入蜜一匕　知母湯治嗌膿血黃芪蜜炙一戔半白芍乾羊黃芩麥門人參白茯吉更知母各一戔甘草五分干三竹葉三片小麥一撮　補肺湯柒白皮蜜炒乾羊各三戔人參紫菀黃芪五味子各一戔入蜜一匕　食積嗽因食積生痰咳嗽胃滿噫酸宜瓜婁丸　瓜婁丸瓜婁仁半夏曲山查肉神曲芎分小和瓜婁瓤為丸竹瀝干湯下七十丸　氣嗽七氣積傷痰逆凝結如梅核作咳宜蘇子降氣湯氣門三子養親湯蘇子煎　三子養親湯治氣急養脾進食蘇子蘿蔔子白芥子各一戔紙上微炒研煮湯飲勿過煎　蘇子煎治老虛人上氣咳嗽蘇子一升為末杏仁一升另研干汁生羊汁白蜜各一升尋搗再絞令味盡出乃合蜜調均盛罌中重湯如餉每服二七日三或去生羊汁代竹瀝亦佳　痰嗽溼痰在胃上干於肺便有痰聲痰出則嗽止宜二陳湯加只角吉更瓜婁仁黃芩貝母又宜半夏丸玉芝元　半夏丸治痰半夏瓜婁仁各五兩貝母吉更各二兩只角一兩半知母一兩為末干汁泥煎餅和丸梧子大干湯下五七十丸　玉芝元半夏曲六兩人參薄荷白茯白楷枯南星泔泡炮各三兩為末干汁煮麵糊丸梧子大干湯下五七十丸　乾嗽無痰有聲是也本於氣洪連咳十數聲方有痰出腳中無津液痰火居之用吉更開之多用補陰降火之劑不

然成勞不得志者多有此症四物湯加竹瀝炒黃柏又生羊二升杏仁二兩生干白蜜各四兩搗如泥斂上盛五七度每五更挑三匕嚥下與杏嗽參治　血嗽咳間有腥氣或嗞血曾因打撲傷損而致四物湯加大黃蘇木又宜當飲飲又挑仁七粒細嚼以韭汁送下　當飲飲大黃蘇木乾羊當飲赤芍芎分為末酒調下三戔　酒嗽醉酒引飲寇胃不散生成溫痰祢咳青黛瓜婁仁干蜜丸櫻桃大常含化　久嗽積痰留肺粘滯如膠氣不升降或挾溼回酒而作宜貝母陽九仙散天鼠散加味百花膏　貝母湯貝母干製乾干五味子陳皮半夏柴胡桂心各五戔黃芩柒白皮各二戔半木香甘草各一戔二分半為麤末每五戔入杏仁七介生干七片水煎　九仙散鬻粟壳蜜炒二戔人參款冬花柒白皮吉更阿膠珠五味子各一戔貝母五分干三栢一　天鼠散蝙蝠去翅足燒令焦為末和飲　加味百花膏紫菀款冬花各二兩百附根五戔為末每三戔干三栢一煎湯調下　火嗽有聲痰火面赤或煩渴引飲脉洪數宜清肺散清金降火湯玄霜雪梨膏滋陰清化膏海清丸　清肺飲前胡荊芥柒白皮只角各一戔知母貝母薄荷赤茯吉更蘇葉阿膠珠杏仁天門甘草各七分干三栢一　玄霜雪梨膏雪梨六十介去心皮取汁二干鐘酸者多用藕汁十鐘生羊汁十鐘右汁重濾去滓火上煎入煉蜜十六兩飴錫八兩柿霜八兩干汁半盞火上再熬如糊成膏每服三五匕　滋陰清化膏生羊熟羊并酒浸天門冬麥門各二兩黃栢鹽酒炒一兩五戔白茯山藥枸杞子酒炒知母鹽酒炒玄參薏以仁各一兩五味子七戔甘草五戔蜜九彈子大每一丸空心噙化下痰多加陳皮貝母　海清丸無治肺

脹氣急訶子皮蛤粉瓜婁仁青黛半夏便香附各一兩干糊丸菜豆大干湯下五十丸　夜嗽屬陰虛宜降陰分火忌生干酸辛故也六味地黃丸五加天門知栢貝母橘紅又宜滋陰清化膏滋陰降火湯門　天行嗽時令不正人多感胃陵嗽宜人參飲子人參蘇飲寒門人參飲子寒暑之交忽感微熱若作感胃邪汗則必成大病宜用此藥人參吉更五味子赤茯半夏各一戔半只角甘草各七分干五　喘症有八喘急者氣回火盛而成稠痰在肺胃間喝而食數張口擡肩搖身滾吐又曰寒則息遲熱則息數喘者氣上盛也宜去痰散火亦不可純用苦寒之劑亦有起居如古而息有音者乃肺之絡脉逆而不得隨經上下故也　風寒喘尋常感胃風寒內盛肺脹喘逆宜金佛草散麻黃散參蘇溫肺湯麻黃散麻黃三戔桂皮一戔二分款冬花訶子甘草各一戔杏仁六分細茶一戔　參蘇溫肺湯人參紫宮桂木香五味子陳皮半夏亲白皮白朮白茯各一戔甘草五分干三　痰喘便有痰報肺熱痰壅有上炎之兆宜紫蘇半夏湯大蘿皂丸臨發時宜用吉更只角瓜婁仁杏仁紫蘇前胡菁引出其痰然後調其虛宗　紫蘇半夏湯治痰喘寒熱往來亲白皮二戔杏仁一戔半三夏陳皮紫蘇五味子紫菀各一戔干三　大蘿皂丸治諸般喘蘿蔔子炒三兩皂角燒存性一兩南星半夏杏仁瓜婁仁便香附青黛陳皮各五戔神曲糊丸梧子大干湯下七十九　氣喘七情所傷氣急而無痰宜蘇子降氣湯門氣　定肺湯氣虛短不可用苦寒藥宜用人參麥門地骨皮蜜炒黃栢之類　定肺湯款菀草五味子陳皮蘇子杏仁亲白皮半夏只角甘草各一戔干

五紫蘇五葉　大喘上氣喘喝心煩胃滿皆是衝脉之行于胃中而作也邪於夏不邪於冬宜加減瀉白散加味生脉散滋陰降火湯門又曰大炎於肺胃而喘者得食則減食已則喘蓋胃中有火膈上有痰食入則隘下輸止稍久則反助胃火痰再上升喘反大作医不知此作胃虛用温補之劑益斃必矣　加減瀉白散亲白皮一戔半地骨皮赤茯各一戔二分人參八分陳皮五味子各五分青皮甘草各三分粳米一撮　加味生脉散治脉伏喘促手足厥冷五味子三戔人參麥門杏仁陳皮各二戔干百　水喘漉之有報喘息促仲宜葶棗散喘不得卧倚食短氣謂之支飲亦宜葶棗散又宜神秘湯停飲滿悶腳先腫宜平肺湯　葶棗散無治面浮而喘葶藶炒為末大棗十枚煎湯調下二戔　神秘湯紫蘇橘紅亲白皮各二戔人參赤茯半夏各一戔木香五分干五　平肺湯葶藶子炒研二戔亲白皮炒杏更只角半夏紫蘇各一戔麻黃七分半甘草五分干百　久喘久病氣短不能接續似喘非喘人參單煮湯救之諸喘久不止人參清肺湯人參紫菀各一戔五味子桂枝各五分人參紫菀甘草各四分干五梅一　胃虛喘胃虛拯則氣逆攣肩而喘不休生脉散門暑加杏仁陳皮白朮　陰虛喘血虛則陽無所依上奔於喘四物湯倍芍茱加人參五味子陰虛火動潮熱自汗喘息奄奄不絕報者急則治其標宜玄霜雪梨膏緩則治其本宜滋陰清化膏　諸傷於喘嗽吃酸成喘嗽宜甘胆丸食熱物煎炒及飲酒於喘宜葶藶散仆水夜行有所驚恐於喘杏參散隘攥致嗽宜當歸飲甘胆丸甘草二兩去赤皮切二寸段中劈用豬胆汁五枚浸三日取出炙乾為末蜜丸菜豆大茶湯下五十丸

葶藶散無治肺癰葶藶子炒爪婁仁薏苡亲白皮廿麻莒根吉更各一戔甘草五分干三　杏參散杏仁人參大腹皮陳皮槟郎白朮訶子半夏桂心紫菀亲白皮紫蘇甘草各七分干三　喘嗽通治藥宜雞鳴丸　雞鳴丸治諸般咳嗽哮喘吐血芽疵知母炒四兩旋覆花陳皮馬兜令麻黃甘草各一兩吉更人參各五戔阿膠珠款冬花五味子各四戔杏仁葶藶炒半夏蜜丸彈子大每一丸干呂烏梅煎湯嚥下　咳嗽上氣出於腎虛氣逆喘咳痰散由腎虛不能收氣也毋徒從事於寧肺宜三味安胃丸驩八味丸五莊　哮證哮即痰喘甚而常發者治哮專主乎痰中外皆寒宜蔞蘇溫肺湯寒包熟宜越婢湯加半夏又金佛草散小青龍湯葶藶散定喘湯皆可選用　定喘湯麻黃三戔杏仁一戔半乓苓半夏亲白皮蘇子款冬花甘草各一戔白果雙三十介去壳碎炒黃　肺脹症咳而上氣煩燥者是也其人喘目如脫脉浮大宜疒汗越婢湯加半夏心下有水氣小青龍湯寒門加石膏肺脹宜收斂用訶子青黛杏仁佐以梅粉便香附爪婁半夏曲干蜜為丸唅化越婢湯石膏四戔麻黃二戔甘草一戔干五棗二加半夏二戔　肺痿訂熟在上焦者因咳為肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴重亡津液而得其症寒熱往來自汗咳嗽噬多涎宜知母茯苓湯人參平肺散去涎宜生薑甘草湯將變為癰疽宜紫菀散噬濃血紅絲宜門冬清肺飲　知母茯苓湯知母黃芩赤茯各一戔人參半夏各七分五味子款冬花吉更麥門朱胡各五分白朮甘草各六分川芎阿膠珠各四戔薄荷三分　人參平肺散亲白皮二戔知母人蔘地骨皮甘草炙各一戔天門赤茯各八分陳皮青皮各五分五味二十粒　生干甘草湯生干

五戔人參二戔甘草炙三戔棗五　紫菀散知母貝母各一戔半人參吉更赤茯各一戔阿膠珠甘草各五分五味子三十粒干三　門冬清肺散紫菀茸二戔黃芩白芍甘草各一戔半人參麥門各一戔當歸身六分五味子十五粒　噙化仙方甜梨汁蘿蔔汁干汁砂糖款冬花吉更紫菀各三兩五味子一兩共熬去滓成膏入人參末一兩為丸彈子大臨卧噙化一丸　咳逆訂吃逆乃氣病也又曰諸逆衝上皆屬於火咳逆古作噦逆　咳逆治法　陰症胃寒脉細或吐下後虛極宜橘皮乾干湯丁香柿蒂散三香散　陽症疒熱口苦胸滿脉數宜小柴胡湯寒門加橘皮竹茹或橘皮竹茹湯　傷寒熱病陽明內宗疒噦者宜大柴胡湯寒門便軟者半夏瀉心湯　痢後發噦乃胃虛不能接續宜補中益氣湯倘加竹茹生干寒加附子一片　食寒咳逆宜二陳湯飲痰加只角砂仁紫蘇或三香散且取嚏而通之　痰火忽閉疒噦宜三陳湯加苓連吉更梔子或參蘆煎服吐之虛者宜六君子湯飲痰　水結咳逆宜小陷胸湯或小青龍湯二方寒門去麻黃加附子　過笑咳逆取嚏通之　凡噦噦頻密相連者為宗易治若半時噦一噦為虛難治　橘皮乾干湯橘皮二戔人參二戔半通草乾干桂心甘草各一戔　丁香柿蒂散治大病後胃中虛寒丁香柿蒂人參白茯陳皮良干半夏各五戔甘草二戔半生干七戔半為麁末每三戔水煎熱服或調蘇合元為效一方七味各一戔甘草五分煎服　三香散沈香白豆冬紫蘇葉分為末柿葉湯調下一戔　橘皮竹茹湯橘皮三戔人參二戔竹茹四戔甘草一戔干五棗二或加白朮只宗　取嚏法取皂角末吹鼻得嚏而止又吃又吹　雄黃礬法雄黃二戔酒一盞煎至

七分令患人當臭下嗅其氣　硫黃鼫法硫黃乳香各二戔以酒盞令患人嗅如上法　單方五味子斂肺理咳治咳嗽燒存性米飲　肉調下二戔或作膾食　橘皮治咳嗽咳逆末服煎服　胡桃治痰喘三个生干食　杏仁蕪子並治咳喘磨取汁和米泔作粥和蜜服　楮木煎服四五次魚膠濃煎服治婦人產前產後咳嗽又治諸咳　薏苡十兩研水三升煎取一升入酒小許服治咳嗽噦膿血也

積聚

六畜為積聚癥瘕痃癖之本氣血沖和百病不生一有怫畜諸病生焉氣畜而澀滯澀滯而成瘀ミ畜而成痰ミ滯而血不行血滯而食不化遂成痞塊此六者相因而病通用六畜湯　六畜湯香附二戔川芎蒼朮各一戔半陳皮半夏各一戔赤茯苓各五分干三氣畜加木香檳榔烏藥紫蘇澀畜加白朮羌活防已熟畜加黃連ミ翹痰畜加南星瓜婁仁海粉血畜加桃仁牧丹皮韭汁食畜加山查神曲麥芽氣畜胃滿脇痛脉沈渋宜解畜調胃湯又二陳湯加白芥子蘇子萊菔子各一戔水煎食遠服　調胃湯治七精之火隨氣衝逆梔子鹽炒當歸酒洗各一戔二分白朮陳皮白茯苓各一戔赤芍乾羌酒洗便香附各八分神曲麥芽各七分川芎六分桃仁甘草各四分干三　澀畜關節走痛首如物蒙遇陰便疼脉沈濡宜平胃散五加赤茯苓活防已防風　熟畜目蒙血燥小便赤濁脉數宜升陽散火湯門　痰畜胸膈滿悶動則喘急怠惰嗜臥脉滑宜升疼二陳湯　升疼二陳湯半夏二戔陳皮川芎赤茯各一戔半柴胡防風升麻甘草各一戔干三　血畜能食而四肢無力小便淋大便紅脉芤洪宜生韭飲當歸活血湯　生韭飲治胃脘痰血桃仁七个蓮皮細嚼以韭汁一盞送下　當歸活血湯當歸赤芍川芎桃仁各一戔牧丹皮香附烏藥只角青皮各八分紅花五分桂皮乾干炮甘草各三分干三　食畜噫酸惡食漸成痞塊黃疸脹滿脉緊盛宜香砂平胃散ミ畜湯　香砂平胃散蒼朮厚朴陳皮香附各一戔山查砂仁只角神曲麥芽乾干木香各五分甘草炙三分干三蘿蔔子炒研一撮　散畜湯陳皮赤茯各一戔半蒼朮白芍川芎梔子各一戔二分只角香附各一戔甘草五分干三　痞塊積聚玐屬部分肝之積曰肥氣在左脇下如覆盃有頭足令人疼逆脇痛心之積曰伏梁起臍上至心下大如臂令人煩心脾之積曰肥氣在胃脘如覆盃令人四肢不遂疼黃疸飲食不為肥膚肺之積曰息賁在右脇之下如覆盃令人寒熱喘咳疼肺癰腎之積曰奔豚起於小腹之上至心下升降不常令人喘逆骨痿小氣又曰在中為疼飲在右為食積在左為血積

痞塊疝治塊是有形之物乃痰與食積宛血也一名癥瘕不移動者為癥或有無或上下左右者瘕也俱用潰堅湯化塊丸保化丸開壞散脇下有塊宜當歸煮三稜蓬朮並醋煮桃仁紅花五靈肯香附各一兩石礞五戔醋糊丸梧子大白朮湯下五十丸　化塊丸海粉酒治飲食傷白朮五兩陳皮半夏茯令神曲山查各三兩連翹香附厚朴蘿蔔子炒各二兩只宗麥芽黃連黃芩並酒炒各一兩薑糊丸梧子大茶清下七十九　開壞散治痞悶疼熟柴胡草豆久各一戔三稜

蓬朮並醋炒青皮陳皮半夏白茯香附枳卽只宗紅花甘草各七分干三　積聚疝治積者陰氣也五莊
昧生疥有常處聚者陽氣也六府昧生升降聚散無常當察其昧痛以知有餘不足可補可瀉愼
不可用下藥徒損真氣病亦不退五積宜消積正元散潰緊湯六聚宜散聚湯肝積宜肥氣丸心積伏
梁丸脾積痞氣丸肺積息賁丸腎積奔豚丸丸積聚初疥多汗宜辛溫消導久則熱畜宜辛寒推湯　消
積正元散白朮一戔半神曲香附只宗玄胡索海粉各一戔赤茯陳皮青皮砂仁麥牙山查甘草各七分干三

潰緊湯當歸白朮半夏陳皮只宗山查香附厚朴砂仁各一戔木香五分調服　散聚散厚朴吳
茱萸只角各一戔半陳皮杏仁桂心赤茯各一戔川芎附子炮甘草炙各五分半夏柴柳當歸各四分干
三　肥氣丸柴胡一兩黃連七戔厚朴五戔川椒四戔甘草三戔蓬朮人參昆布各二戔半皂角白茯各一
戔半乾干巴豆霜各五分川烏二分蜜丸梧子大初服二丸漸加大便溏反減　伏梁丸黃連一兩半厚朴人
參各五戔黃芩桂枝茯神丹參各一戔乾干菖蒲巴豆霜川烏各五分紅豆久二分蜜丸梧子大黃連
湯下服如上法　痞氣丸黃連八戔厚朴四戔吳茱萸三戔黃芩二戔砂仁一戔半白茯人參澤瀉各一戔
茵陳乾干各一戔半川烏川椒各五分桂皮巴豆霜各四分白朮二分蜜丸梧子大甘草湯下服如上法　息賁丸
黃連一兩三戔厚朴八戔川烏吉更白豆久陳皮三稜天門人參各二戔乾干白茯川椒紫菀各一戔半青皮巴豆霜
各五分蜜丸梧子大干湯下服同上法　奔豚丸厚朴七戔黃連五戔川練子三戔白茯澤瀉菖蒲各二戔玄胡索一

戔半全蝎附子各一戔川烏干香巴豆霜各五分蜜丸梧子大鹽湯下服同上法　癥瘕疝癖總論癥者
腹中堅硬按之應手瘕者腹中雖硬聚散無常痞者在腸左右各有一條筋脉急痛如引癖者在兩
脇有時作痛大抵痞與痞癖積聚為上中二焦之病多見于男子癥與瘕為下焦之疾常得于婦人
（治同積聚）　腸覃石瘕血蟲訶治皆婦人之疾腸覃者寒邪客於大腸之外久如懷胎按之堅推之移此氣病血未病二陳湯加香附三稜蓬朮蠶甲並醋炒石瘕者血病脫中久則
堅硬如石塞於子門如懷胎月事不下宜通經湯門肥桃仁煎血蟲者即瘕瘕之甚者肚腹堅硬如石
宜醋煮三稜丸　桃仁煎桃仁大黃各一兩虻蟲水蛭炒五戔（無則代氣添炒）　朴硝一兩並為末先以醇酒一升二合銀
石器煎取七合下桃仁大黃虻蟲末極攪次下朴硝乘熱攪取出丸梧子大前一日不吃晚飯五更初溫
酒下五丸以取下惡物為度　醋煮三稜丸三稜四兩醋煮切晒川烏二兩醋煮切黃五戔醋煨醋糊丸
梧子大醋湯下三十丸或加桃仁玄胡索五靈皆官桂
剌宜服磨積元痞行道導引法　磨積元治氣癖於肓膜之外氣逆息難胡椒一百五十粒木香二戔
半全陽干仌栗米飯丸菜豆大橘皮湯下十五丸　導引法以兩手拇指壓無名指本節作拳按髀跌
坐叩齒三十六屏氣二十一息嚥氣三口再屏息再嚥如是三作氣通為効行於子卯午時
養正積自除若專用磨積破結之藥則疾似去而人已衰矣當先補虛補中益氣湯內加三稜蓬朮

青皮香附吉更藿香益智官桂　諸物傷成積脾胃虛弱飲食過常不能克化致成積聚心腹脹滿噫氣吞酸面青肌瘦　食積合不消化成積痞悶宜平胃散五錢加砂仁香附神曲麥芽干蘇宜保化丸

保化丸　魚治酒積山查二兩半夏薑當于炒黃連炒陳皮各五錢神曲炒三錢麥芽炒二錢神曲糊丸梧子大白湯七十丸　酒積傷酒成積面黃黑腹滿時嘔疾水宜對金飲子內傷又方黃連酒浸一宿焙為末橘紅萄根湯調下一錢又萄花解醒湯內傷保化丸並治酒積　麵積食麵過多成積取阿魏元雜當子湯吞下　阿魏元魚治肉積阿魏酒浸化蓬木桂皮神曲麥牙雜當子青皮白木乾干各五錢百草霜三錢已巨二干一介去油糊丸菉豆大肉積干湯下麵積麵湯下三十丸　肉積傷肉成積宜阿魏元

魚臛積傷　魚臛成積香蘇散溫疫加木香生干

為末熟鹽湯調下一錢日三宜桂香丸　桂香丸桂心一兩麝香二錢飯丸菜豆大白湯下十五丸　茶積喜吃茶成癖川椒為末麵糊丸梧子大茶清下十丸　水積傷水成積宿脘引痛溏瀉有聲宜十棗湯內傷芫花湯餘

血積瘀血成積或因撲墜當血宿腹宜桃仁承氣湯內傷增味四物湯　傷味四物湯料加三稜蓬术乾漆炒官桂等分　外貼琥珀膏大黃朴硝各一兩為末大蒜搗為膏作片貼患處或加射香五分

臟癖法吳茱萸三升碎之沈酒炒熱袋盛熨癖上冷易移則逐而熨之　握藥宜積巴豆乾干良干茶子研黃甘遂檳榔等分為末飯丸如中指頭大早朝先以川椒湯洗手麻油塗手掌中握藥一丸移時便瀉欲止瀉冷水洗手　單方牛膝砂暴癖一兩酒煮飲柔耳治血癖積聚燒末酒調服魚膾治積塊和干蒜醋大蒜治食上白馬尿治食上取飲人尿治積聚滿腹常飲一升假梧桐木煎久服治痃癖

浮腫

浮腫症由脾虛溼勝凝閉滲道水漬溢行故通身面目手足皆浮而腫皮薄而光手按成窟者是也若腹大如鼓面目四肢不腫者名曰脹滿又名鼓脹皆土敗溼盛腫喘呼不得卧者標本俱病又曰溼勝則濁泄甚則腑腫又有陽水陰水陽水者外因涉水冒雨感風寒寒暑溼其症先腫上體手熱煩渴二便閉澁陰水者內因飲水及茶酒飢飽勞役房勞其症先從下體腰脛身涼便利　水腫治法治浮腫火法補中行溼則利小便宜補中治溼湯腰以下腫全利小便宜五苓散寒門澤瀉散腰以上腫當發汗宜麻黃甘草湯防已茯苓湯陽水宜八正散小便陰水宜宗脾散胃苓散大便因雨溼平胃散內傷加白术赤茯草豆久因飲水過多宜胃苓湯大便久喘後發腫宜分氣飲瘧痢後發腫通用五皮散瘡疥癰腫宜赤小豆湯水腫泄瀉宜大橘皮湯　補中治溼湯人參白术各一錢蒼术陳皮赤茯參門术通當歸各七分黃芩五分厚朴升麻各三分為末干葱湯調下二錢　麻黃甘草湯麻黃三錢甘草二錢取汗　防已茯苓湯赤茯三錢防已黃芪桂枝各一錢半甘草一錢　實脾散厚朴白术木果草果大腹子附子炮白茯各一錢木香乾干炮甘草炙

各五分干呂　分氣飲吉更赤茯陳皮柔白皮大腹皮只角半夏曲藿子炒藿葉各一戔草果甘草各五分干呂　五皮散大腹皮茯苓皮生干皮柔白皮陳皮各一戔半　赤小豆湯赤小豆豬令柔白皮防己連翹澤瀉當歸商陸赤芍各一戔干呂　大橘皮湯活石三戔陳皮一戔半白朮赤茯豬令澤瀉各一戔桂皮七分枳椇六分木香五分甘草炙四分干五　結陽訂陽受氣於四肢氣痛不通加之溏熱但腫四維宜犀角湯　犀角玄蔘各一戔升麻木通各八分連翹柴胡各六分沈香射干甘草各五分芒硝麥門各四分　婦人產後產前浮腫詳見婦人　外治去水方宜丹房奇術消河餅　丹房奇術巴豆霜四戔水銀粉二戔硫黃一戔同研成餅新綿一斤先布臍上次安餅外用帛縛待瀉下三五次去藥粥補久患者臨日取水　消河餅大田螺四介大蒜五介車前子末三戔同研成餅貼臍中帛縛小時出尿如注　浮腫通治藥宜加減胃苓湯四苓五皮湯集香湯三仁九椒鼓九水疤瘡發宜方　加減胃苓湯蒼朮一戔半陳皮澤瀉白朮赤茯木各一戔厚朴豬令神曲椒椷各八分山查砂仁各七分香附大腹皮各六分甘草炙三分干三灯心一團　四苓五皮湯柔白皮陳皮地骨皮茯苓皮生干皮大腹皮蒼朮白朮澤瀉豬令青皮車前子炒各一戔　藁香湯治虛腫木香藿香川芎赤茯椒即只角甘草各三戔泥香丁香各二戔乳香一戔半射香一戔為麁末每三戔八干三薤五煎　三仁元治三便不利喘急鬱李仁杏仁薏苡仁各一兩糊丸梧子大米飲下三十丸　椒鼓元椒木一戔鼓二七粒巴豆一介去油水丸綠豆大溫水下三丸或五丸以微利為度　一方腫滿後作瘡或發水疤成瘡平胃散傷內細末清油調付

腫溟乾糝　禁忌ㇾ鹽忌鉄鹹忌甘草　箪方柔灰水（煮赤豆作粥常服下水氣）革麻子（去油為霜布木杓飯上蒸篩下每五六戔米飲調下）鯉魚（大者八赤豆二升煮團逐旋服）鷄尿（取乾尿一升炒黃清酒三椀浸尿取清飲大下水氣也）青頭鴨（和五味煮食或作粥飲）猪肝（和乾薑煮食）赤小豆（秋柔白皮或通草煮飲也）無家蝎（巨型ノ如）生吞數枚治腹浮非時則取乾為末和酒飲　蒼朮炒黑為末米飲調下一匙漸加一匙至五六之治浮腫　蝙蝠（ヲヒ）焼存性為末和酒服治浮腫連用三四介

脹滿

脹滿訂七精內傷六淫外侵飲食失房勞致虛脾土受傷轉輸失職胃受水穀不能運化陽自升陷自降成天地不交之否於是清濁相混壅遏氣化濁血盛為熱ㇾ留化溟ㇾ熱相生遂成脹滿面目四肢不腫但腹肚脹起中空似鼓故亦謂之鼓脹其病痊難治療故又曰盛脹濁氣在上則脹濁氣者寒氣也又曰中寒則脹蓋寒脹多熱脹小又曰虛脹此利不食時增時減按之則軟案脹身熱咽乾內痛常脹按之則硬　脹滿治法脹由脾土虛甚宜補中行溟兼以消導須用大劑人蔘白朮佐以茯苓陳皮厚朴之類却鹽味以防助邪絶妄想以保母氣無有不安又曰凡脹須用厚朴初得多因氣盛宜行消導之劑木香枳椇只角陳青皮之類是也久則成水脹宜行溟利水之劑茯苓澤瀉防已蒼白朮之類是也又曰瘦人多熱宜苓連梔子厚朴白人氣虛智半夏木香赤茯升麻各七分半川芎人蔘青皮當歸柴胡生干乾干葛澄茄黃連黃芩吳茱萸草豆久厚朴各五分　順氣木香散砂仁丁香皮良干乾干官桂陳皮厚朴吉更茴香炒蒼朮各一戔甘草五分

干㕮　熱脹陰虛不能宣導飲食如故脉必浮數而脹宜七物厚朴湯中滿分消湯　七物厚朴湯厚朴三戔只宗一戔半大黃甘草各一戔桂心　分干五㕮二　中滿分消丸蕪治鼓脹氣脹不能治寒脹厚朴一兩人蔘白朮羌　黃芩黃連只宗半夏各五戔知母四戔澤瀉陳皮各三戔白茯砂仁乾干生干各二戔豬今甘草各一戔糊丸梧子大熱湯下百丸　穀脹失飢傷飽痞悶停酸穀氣難化不能食而脹宜鷄屎醴散大香散　鷄矢醴散又治氣脹水脹蠱脹鷄矢白乾者大黃桃仁等分為末干湯調下二戔又方鷄矢一升炒黃為末百沸三升淋汁每取一大盞調木香檳榔末各一戔下　大異香散亦治氣脹三稜蓬朮青皮陳皮藿香半夏曲吉更蓋知仁香附只角各一戔甘草二分半干㕮　水脹脾土受溼漬於腸胃溢於皮膚怔忡喘息宜防己椒蘁丸椒蘁丸防己椒目葶藶子炒大黃各一兩蜜丸梧子大白湯下十九日三進　氣脹七精盍結氣道壅塞不得升洚腹肚脹大四肢瘦削宜三和湯分心氣飲門　三和湯白朮陳皮厚朴各一戔檳郎榔蘁各七分半木通大腹皮白茯只角海金炒甘草各五分干三　血脹煩燥漱水痛惘嘔逆迷忘驚狂小便多大便黑婦人多有之宜人蔘芎歸湯　人蔘芎歸湯川芎二戔當歸半夏各一戔半蓬朮木香砂仁烏藥甘草各一戔人蔘桂皮五靈旨各五分干五㕮二　蛊脹宜消脹飲子　消脹飲子豬令澤瀉人蔘白朮赤茯半夏陳皮青皮厚朴紫蘁香附炒仁木香檳郎大腹皮木通羅蔔子甘草各五分干㕮　脹滿通治藥宜廣木漬堅湯洚生紫蘁湯大正氣散分消湯木香分氣九　廣木漬堅湯治回積聚成脹二便不利半夏一戔半黃連厚朴黃芩益智仁草豆當歸各七分陳皮青皮神曲澤瀉柴胡甘草各五分蓬朮升麻吳茱萸各三分紅花二分干三　濟生紫蘁子湯治憂思傷脾青滿喘促二便不利白朮二戔蘁子人蔘各一戔大腹皮草果厚朴木香陳皮只角甘草各五分干㕮　大正氣散治回風寒暑濕成脹白朮蒼朮陳皮厚朴藿香半夏各一戔枳壳檳郎各七分桂枝乾干甘草各五分干㕮　分消湯蒼朮白朮陳皮厚朴枳實赤茯各一戔香附豬苓澤瀉大腹皮各八分砂仁六分木香三分干三燈心一團　木香分氣九治飲食不和喘嗽為脹木香檳郎青皮蓬朮乾生干當歸羌黃玄胡索白朮只壳三稜赤茯陳皮肉豆久麪糊九小豆大干湯下五十九　濁氣在上則生膜脹清氣在下則生飧泄濁氣者寒氣也先灸中脘次用木香順氣湯　木香順氣湯厚朴白茯澤瀉半夏各一戔蒼朮八分青皮陳皮各六分草豆久人蔘當歸各五分益智仁吳茱萸各三分木香乾生干升麻柴胡甘草各四分干三　脹滿泄瀉腹脹經久忽然泄瀉晝夜不止益智濃煎湯眠立愈　外治法蕪治積聚血蛊脹滿等症宜外數藥先用熱水嚼甘草噀下次用大戟莞花甘遂海藻等戔為末每二兩和大蒜椿成膏付患處　外數神膏分為末醋調遍塗腹上神效　單方鷄屎　治諸取白炒黃湯清飲　蘿蔔子　炒研煮湯代茶飲消脹　烏牛屎　溫服一升消久脹　桑枝茶　消脹常服　蝙蝠　取三介燒存性和酒服治脹滿　青頭鴨　煮食六七首治脹滿

消渴

消渴之症脾胃血液不足則生熱消水消穀發飢渴又曰消渴有三熱氣上騰心虛受之膏味煩燥舌赤唇紅大渴引飲小便數小謂之上焦消渴熱蓄於中脾虛受之飲食倍常不生飢肉消穀善飢渴亦不止小便數則甜謂之消中熱伏於下腎虛受之腿膝枯細骨節痠疼精走髓虛引水自救飲水不多隨即尿下小便多則渴謂之消腎又曰消渴輕也消中甚焉消腎又甚焉若強中見下則其死可立待也又曰上消肺也多飲小食小便清利中消胃也飲小而食多小便赤黃下消腎也小便濁淋如膏油　消渴治法上消能食而渴宜人蔘白虎湯（寒門）不能食有渴宜加味錢氏白朮散通宜麥門冬飲子清心蓮子飲生津養血湯黃芩湯中消三黃丸（火門）人蔘散黃連豬肚丸藕汁膏下消六味地黃丸（五莊）加減腎氣丸（虛勞門）鹿茸丸又曰三消多屬血虛不生津液宜四物為主上消加人蔘五味子麥門天花粉煎入牛乳生苧汁藕汁酒酪葛根汁中消加知母熟苧五味子又曰小便反多於所飲腎氣丸（虛勞門）主之　加減錢氏白朮散葛根二錢人蔘白朮白茯苓香甘草各一錢木香紫胡枳角五味子各五分

麥門冬飲子麥門二錢知母天花粉人蔘五味子葛根二錢赤茯人蔘黃芪各一錢黃芩車前子炒麥門地骨皮甘草各七分　生津養血湯當歸白芍生苧麥門各一錢川芎黃連各八分天花粉七分知母黃柏並蜜炒蓮肉烏梅薄荷甘草各五分　黃芩湯

黃芩桅子古更麥門當歸生苧天花粉乾葛人參白芍各一錢梅一　人參散滑石二兩寒水石甘草各一兩石膏五錢人參二錢半為末水調下二錢　黃連豬肚丸豬肚一个黃連五兩麥門知母天花粉各四連天花粉末佐以干汁白蜜為膏鼈拇爛蒸搗爛入蜜丸梧子大米飲下百丸　藕汁膏藕汁生苧汁牛乳入黃茯山茱萸五味子澤瀉鹿茸山藥各一兩官桂沉香各五錢蜜丸梧子大溫湯下八十丸　鹿茸丸麥門二兩鹿茸熟苧黃芪五味子鵪肫胵太炒肉蓯蓉酒浸山茱萸破古紙炒牛膝酒浸人參各七錢半白茯地骨皮玄蔘各五錢蜜丸梧子大米飲下七十丸　食飴訂腸移熱本胃善食而瘦謂之食飴（治同消中）　消渴小便甜腰腎虛冷不能蒸化則穀氣盡下為小便故味甘色不變肥膚枯槁　消渴申坎火衰下小焦陽氣極虛則津不能升故肺乾有渴易飢謂乾上坤下成否之義宜腎氣丸（虛勞）　消渴通治藥宜黃連地黃湯門冬飲子玉泉散五汁玉泉丸生地黃膏荔芰膏　黃連地黃湯生苧黃連天花粉五味子當歸人參葛根白茯麥門甘草各一錢干召竹葉十片　門冬飲子尤宜老虛人麥門二錢五味子人參地骨皮白茯甘草各一錢干三　玉泉散天花粉二錢葛根麥門五味子人蔘生苧五梅肉蓮肉當歸甘草各一兩為末先取人乳牛乳梨汁連乾葛天花粉知母麥門五味子人蔘生苧五味子甘草各一錢糖米一合　五汁玉泉散黃藕汁砂糖八蜜一升半合煎成稀膏入藥末更煎五七沸每五七米飲調下日三服　生地黃膏生苧二升

蜜一椀白茯一兩人參五錢先取生苧汁蜜合煎次入蔘苓末溫水調下　荔支膏乳糖二十六兩清蜜十四兩烏梅肉八兩生干五兩取汁射香五分先取清蜜烏梅肉入水一斗五升煎半去滓下乳糖熬火八千汁再熬乃入射香和勻水調下一大七日三　酒渴嗜酒積熱煩渴引飲全嗜冷物宜烏梅木瓜湯朱砂黃連九酒蒸黃連九（署門）　烏梅木瓜湯烏梅打碎不去仁木瓜各二錢麥牙草果甘草各一錢干五　朱砂黃連九黃連三兩乾苧二兩朱砂一兩蜜九梧子大燈心大束湯下五十九　蟲渴虫在藏府耗其津液成消渴宜苦練根湯　苦練根湯苦練根一握坊培射香小許水二盞煎半空心服下虫為度　強中疝多因耽嗜色慾或服丹石真氣既脫熱邪炽盛飲食如湯消蛊肌膚日削小便如油湯垂與強不交精泄最為難治　消渴傳瘡疕　能食者必發腦疽背瘡宜加減白虎湯不能食者必傳中滿鼓脹宜加減戊白术散末傳癰疽者何也火邪勝也末傳中滿者何也消在上中制之太急寒傷脾胃所謂上熱未除中寒復生也　加減白虎湯石膏二錢半知母一錢人參黃栢各七分玄參甘草各五分五味子十立粳米百立　消渴預防癰疽藥宜加減八味元（虛勞）黃芪六一湯（癰疽）禁忌：飲酒房勞　忌食炙煿辛熱醞釀之物忌用半夏南星又忌鮓忌炙　單方竹葉湯竹瀝　葛根汁　忍冬湯　地骨皮湯　天花粉湯　麥門冬湯（并治消渴）　益元散（亦佳）五倍子（為末溫酒調下二錢神效）石花（治酒渴常食）紅柿梨五味子茶　烏梅茶　菉豆汁　冬菇汁　糯米泔青粱米飲　雄鵝湯（亦止渴）　綠綵湯（亦治渴）　牡蠣肉（白牡）和薑醋生食（亦治田螺（數手淨洗浸缸中每飲一盞又添冷水一盞治渴）

黃瘅

黃瘅之症因濕熱相交民病癉ㇾ即黃陽而無陰又曰諸黃小便皆不利惟瘀血發黃小便自利又曰瘅暴病劇在十八日惟食勞黃宿病也有久不愈者又曰凡病當汗而不汗當利小便而不利腹滿面黃燥不得眡漸成黃瘅蓋五瘅皆是濕熱更無寒熱之異凡時行感冒伏暑未解宿食不消疫癘傷寒皆能發黃　黃瘅治法小便黃赤ㇾ者當作濕熱治之小便色白者當作虛勞治之蓋濕黃色暗熱黃如橘子輕則滲利重則大便小便不利為裏宲宜利宜下用茵陳五苓散下用黃連散無汗為表宲宜汗宜吐汗用麻黃醇酒湯吐用瓜蒂散（吐門）因食積者但下其食積其餘但利小便為先小便利白其黃自退　黃連散大黃醋炒二兩黃芩黃連甘草各一兩為末溫水調下二錢　麻黃醇酒湯麻黃一兩清酒一升半煎半秋冬用酒春夏用水　黃瘅小便面目牙齒亦甲肢體如金因暴熱洗浴熱留胃中食已善飢安卧懶動宜茵陳五苓散陶氏茵陳湯茵陳散　茵陳五苓散（寒門）五錢為末米飲下二錢或一兩水煎服　陶氏茵陳湯治二便不利茵陳二錢大黃梔子厚朴枳宲黃芩甘草各一錢干三燈心一團　茵陳散茵陳梔子赤茯猪令澤瀉蒼朮只宲黃連厚朴活石各一錢燈心一團　酒瘅小便不利足心熱心中煩悶不能食時欲吐宜半溫半熱湯梔子大黃湯葛朮湯酒蒸黃連九（署門）飲酒常多醞釀之毒八百脉寖黑癰腫最難調治　半溫半熱湯半夏赤茯白朮各一錢前胡只甫大戟甘草各七分黃芩

當歸茵蔯各五分千三　梔子大黃湯梔子大黃各二枚豉一合　葛术湯葛根蒼术各二枚豉一合
子甘草各一枚豆豉一合　穀疸食則腹滿疸盍眩
湿中丸　茵蔯梔子湯茵蔯三枚大黃二枚梔子豉各一枚　小湿中丸白术三兩山查肉青皮蒼术神曲各二
兩便香附一兩鍼砂一兩醋糊丸梧子大塩湯下八十丸　脾虛者便以參术陳皮甘草作湯送下　女勞疸
大勞當愈火熱交接以致寒熱微寒手足熱小腹
分為末大麥粥飲調下二枚　腎疸湯治尿赤蒼术一枚升麻羌活防風藁本柿活柴胡葛根白术各
五分猪令四分澤瀉神曲人參甘草各三分黃芩黃栢各二分黃汗身腫發熱汗出染衣如黃栢汁或渴
或不渴因汗出洗浴得之宜茵蔯湯　茵蔯湯石膏二枚黃芪赤芍茵蔯麥門豆豉各一枚甘草五分
千五　黑疸難治脾腎俱病為黑疸女勞小腹滿急足心熱因作黑疸腹滿者難治酒疸久瘦為黑目青
面黑心中如啖蒜韭狀大便黑小便亦黑難治　脹黃脹黃身面俱黃肢體沉重背寒身冷心下痞硬自汗
小便利脉虛細宜茵蔯茯令湯茵蔯橘皮九茵蔯四逆湯　茵蔯茯令湯治小便不利燥渴者茵陳三枚
茯令猪令活石當歸官桂各一枚　茵蔯橘皮湯治噦嘔不渴者茵蔯三枚陳皮白术生干半夏茯令各一
枚　茵蔯四逆湯治逆冷自汗茵蔯三枚附子炮乾干炮甘草炙各一枚　疫癘發黃天行疫癘發黃
謂之發黃殺人最急宜茵蔯瀉黃湯　茵蔯瀉黃湯葛根一枚半茵蔯黃連干炒梔子炒白术
赤茯白芍厚朴木通人參各一枚木香七分千三　濟生茵蔯湯茵蔯四枚大黃二枚梔子一
枚　搐鼻去黃法凡黃疸由湿熱毒氣浸入清道宜納藥鼻中滴出黃水宜搐鼻仍帶散搐
鼻仍帶散二枚丁香一枚黍米四十九介赤小豆半枚為末先舍水臨卧却枚兩鼻孔搐半字便眠
至明取下黃水因服茵蔯五灵散慎不可吹入　黃疸通治藥黃疸之疾脾受湿熱盍而不行亦有腹
脹之候治要疎導湿熱於大小便之中宜胃苓湯大便加茵蔯又茯苓滲湿湯傷寒大熱發黃宜茵蔯大
黃湯　茯苓滲湿湯茵蔯二枚赤茯澤瀉猪令各一枚黃連黃芩梔子防已白术蒼术陳皮青皮只實各
五分　茵蔯大黃湯治傷寒大熱發黃茵蔯梔子柴胡黃栢黃芩升麻大黃各一枚草龍胆五分
疸癖受喫土炭生米茶葉宜四實毋　四實毋使君子肉二兩南星檳郎各一兩喫生米者用麥芽一升
炒過喫茶葉者用茶葉一斤炒過喫土者用壁土一斤炒過食炭者用黑炭一斤炒過蜜丸梧子大砂
糖水下五十丸　禁忌忘薦麥麵猪羊肉再發　單方　鮒魚　鯉魚作膾煮食亦佳　鰱魚治酒疸煮食　水芹車前子取汁
服佳茹服尤佳　梔子湯　葛根湯　萱草根汁並治諸疸仍帶古今方用熾熱自退者乾末入竹筒吹兩鼻孔取下黃水尤妙　治虛者不可輕試也

疫癘

疫癘之源夏傷於暑湿熱閉而不能泄至秋發為癘亦有因風寒感胃而得之者蓋傷之淺者近而暴傷
之重者遠而深在於湯則發熱在於陰則發寒並則病作雜則病止在氣則發早在血則晏淺則日作

深則聞日　六經瘧訂治有中三陽者有中三陰者在太陽者謂之陰瘧治多汗之在陽明者謂之熱瘧治多下之在小陽者謂之風瘧治多和之此三陽受病皆謂暴瘧發在夏至後處暑前在陰經者不分三陰皆謂之溫瘧治宜下之溫之和之其發在處暑後冬至前乃久而深者也太陽虛宜麻黃羌活湯陽明瘧宜人參白虎湯柴苓湯（二方寒門）柴胡知母湯（二方寒門）小陽瘧宜柴胡加桂湯三陰溫瘧宜白虎桂枝湯柴胡四物湯太陽明合病寒熱大作宜桂枝黃芩湯　麻黃羌活湯羌活麻黃防風甘草各一錢半柴胡加桂湯柴胡三錢黃芩桂枝各二錢半夏一錢甘草四分干台　白虎桂枝湯石膏四錢知母二錢桂枝甘草各一錢粳米一合　柴胡四物湯兼治夜發者柴胡乾芐各二錢人蔘半夏黃芩甘草川芎當歸赤芍各一錢干呂桂枝芍藥湯桂枝一錢赤芍知母石膏黃芩各二錢　桂枝黃芩湯用桂枝芍藥湯不愈宜用此柴胡二錢石膏知母各一錢半黃芩人蔘半夏甘草各一錢二分桂枝一錢　瘧發晝夜之異氣虛晝宜補中益氣湯（內傷）加半夏黃芩血虛夜發宜柴胡四物湯　風瘧自感風而得先熱後寒宜散邪湯　散邪湯川芎白芷麻黃白芍防風荊介紫穗羌活各一錢甘草五分干三葱二煎露一宿早晨溫服寒瘧自感寒而得寒多熱小宜人參養胃湯（寒門）嫂解飲子草果飲　嫂解飲子又治瘴瘧內豆久草豆久各二介一介煨一介生厚朴二寸一寸干汴浸炙一寸生大甘草二兩一兩炙一兩生、干二堀一煨一生各剉分作二呂二梅一一名交解　草果飲草果白芷良干青皮川芎紫蘇甘草各一錢　熱瘧因暑熱渴之亦曰暑瘧宜人蔘白虎湯柴苓湯（二方寒門）柴胡知母湯　柴胡知母湯又治瘴瘧柴胡知母各一錢半蒼术黃芩乾葛陳皮半夏川芎各一錢甘草七分炙干三梅二五更服朝食時又服久瘧加蒼故濕瘧因胃兩濕又汗出燥浴得之寒熱相半小便不利五苓散（寒門）加蒼术川芎羌活　痰瘧因外傷內感盍聚成痰頭痛肉跳吐食嘔沫甚則昏倒宜四獸飲冷附湯久不止以露薑絕之　四獸飲人參白术白茯陳皮半夏草果烏梅生干大棗各一錢拌鹽小許掩食頃以紙包裹水浸濕慢火煨香熟取出水煎服未發前連進數貼　冷附湯大附子一介炮分二貼八干十片水煎去滓露一宿五更冷服神效　露薑飲生干四兩連皮搗取自然汁盖似糾片露一宿五更初飲之　食瘧一名胃瘧因飲食失節飢飽有傷寒已復熱、已復寒苦飢不能食、則吐痰支滿宜清脾飲又二陳湯加青皮枳殼仁白豆久　清脾飲柴胡半夏黃芩草果白术赤茯厚朴青皮各一錢甘草五分干召或加常山二錢煎露五更服截瘧最妙　勞瘧即久瘧也寒熱微、最難調治由表裏俱虛真元未復雖或暫止小勞復來經年不差宜六和湯養胃毋脾胃虛弱者但服補中益氣湯（內傷）諸症悉愈　六和湯常山二錢知母貝母人參草果白芷烏梅檳榔柴胡各一錢干呂酒水相半煎一宿早晨服　養胃毋治數年不愈者蒼术常山酒蒸各二兩半夏陳皮厚朴各一兩半赤茯藿香草果各一兩甘草炙五錢烏梅四十九介取肉干糊丸梧子大干湯下七十九　鬼瘧因感尸疰客忤寒熱日作夢寐不詳宜藉合元五十九酒和下或燒人場土作丸塞男

左女右臭中　疫瘧一方長幼相似或染時行瘧成寒熱頭痛煩渴運氣用藥宜不損金正氣散（寒門）瘴瘧挾山溪山瘴蒸毒之氣令人迷困寒熱南方多有此病宜以解飲子羌活蒼朮湯　羌活蒼朮湯羌活一錢半蒼朮柴胡黃芩只實橘紅半夏川芎甘草各一錢干五　痎瘧即老瘧也滿三日一發纏綿不去乃邪入於三陰經也作於寅申巳亥日者厥陰經也作於辰戌丑未日者太陰經也當汗出而愈以參朮等補劑為美以柴葛等發散為佐不可用峻毒之劑此病春夏為易治秋冬為難治者非有他也以汗之難易為異蓋經年不差必有痰水瘀血結成痞塊乃瘧母也雖內虛非常山栝郁決不能除但須製熟則不損胃老瘧丸是也又宜七枣湯和方清脾丸　老瘧丸常山草果各二兩三稜蓬朮青皮陳皮栝郁半夏砂仁烏梅肉各一兩先將常山草果酒醋各一梡浸一宿後入餘同浸半日炭火煅乾為末酒醋糊丸梧子大白湯下四十九日二　七枣湯附子一介鹽水浸炮七次去皮劖作一貼干七召七　和方清脾丸白朮一兩半夏青皮黃芩各一兩人參栝樓草果蓬朮厚朴各五錢羌活甘草各三錢飯丸梧子大白湯下七十九　寒熱似瘧忽覺毛寒股慄嘔不能食轉而發熱有似瘧疫熱多者小柴胡湯（寒門）寒多人參養胃湯（寒門）胃虛者補中益氣湯加山查麥芽白豆久瘧疾通治藥內經主於暑風局方主於傷食丹溪主於痰雖三因雜至然捷經以祛暑消痰為要通用二陳湯（痰飲）無汗加葛根柴胡氣虛加朮參熱甚加芩連寒多加草果口渴加烏梅又曰先熱後寒宜小柴胡湯（寒門）先寒後熱宜柴胡加桂湯多熱白虎桂枝湯多寒草果飲通用草果平胃散駐邪湯　草果平胃散蒼朮二錢厚朴陳皮青皮大卜皮栝郁草果各一錢甘草五分干召　駐邪湯柴胡二錢白朮一錢半乾葛一錢三分蒼朮一錢陳皮七分甘草五分　截瘧法曰凡瘧三四發之後宜截之久則中氣虛弱難治凡瘧須分利陰陽柴苓湯（寒門）最效甚者截之用不二飲勝金丸之類不愈者要挾胃氣養胃毋為效宜截瘧常山飲截瘧飲子人蔘截瘧飲截後用蔘歸養文湯補住　截瘧常山飲常山草果栝郁知母烏梅穿山甲炮甘草炙各一錢酒水煎露一宿早晨溫服得吐　截瘧飲子常山一錢半栝郁一錢丁香五分烏梅不拘麁末浸清酒一盞經宿清晨去滓溫服　人蔘截瘧飲宜用氣虛人人蔘白朮白茯當歸青皮厚朴柴胡黃芩知母常山酒浸草果檳榔甲酷炙各八分柱枝甘草各三分干召梅一桃仁七介煎露一宿五更服毋煎稽滯朝時服　不二飲栝樓二介一雄一雌若重二錢則餘藥各二錢常山知母貝母酒一盞煎至八分不可過熟露一宿五更溫服　勝金丸常山四兩酒浸一宿腳乾蒼朮檳榔草果各二兩為末用浸常山酒炙糊丸梧子大酒下五十九前一日臨卧用當發日五更服七十九　蔘歸養元湯人蔘白朮白茯當歸陳皮砂仁厚朴山藥蓮肉白芍熟半甘草各八分召二　久瘧生常山二錢貝母一錢草果七粒大棗一枚知母一錢栝樓一錢烏梅干三枚一半黃酒半水煎露宿一夜日未出時向東空心服　用此方止去積痰次日用胡椒青菜湯一椀熱服即愈　禁忌凡瘧發時忌熱飲食凡忌豬牛肉犯之必再發

單方

牛膝 治老瘧取一握酒水煎服三劑便差 鼈甲 治全上為末酒調下二錢 白葵花 治痰瘧取花陰乾酒調下一錢 鼠婦 治瘧取三枚溫酒研服右宜小兒也 鶩卵 當痛日早朝生吞一介 田螺去仁三介治唐瘧 石榴黃末 空心和酒服治唐瘧 麝香末 空心和酒服治唐瘧 青魚級草 三四介浪煎當痛日早朝服三四次治唐瘧 滾痰丸 四五九空心茶清吞下連用五六次治唐瘧 鼴鼠 去皮空心塗油炙食治唐瘧 熊膽 小許研細和酒服治諸瘧 中脘 每朝灸七壯以差為度不過七八日有效治唐瘧

瘟疫

瘟疫之因冬傷於寒春必病溫時氣失節人感四時不正之氣疫盛煩熱頭疼身痛增寒壯熱項強睛疼大則流行天下次則一國次則一鄉次則偏着一家長幼相似謂之瘟疫亦謂之天行又曰冬合寒而反暖春發瘟疫其症腰痛項強急脚縮欲絕增寒復熱春合暖而反凉夏發燥疫其症身體戰掉內熱口乾交合熱而反寒秋發寒疫其症頭重頭直皮肉更痺秋合凉而反陰雨冬發濕疫其症乍寒乍熱喘咳發班 瘟疫治法夏至前發謂之溫病夏至後發謂之熱病治法切不可作傷寒正治而大汗大下但當用九味羌活湯小柴胡湯升麻葛根湯三寸寒門分三湯加減治之又曰春發溫疫宜葛根解飢湯夏發燥疫宜調中湯清熱解毒湯秋發寒疫宜柴胡升麻湯冬發濕疫宜加味敗毒散表疹多者荊防敗毒散半表半裏小柴胡湯寒門通宜十神湯香蘇散葛根解飢湯葛根三錢麻黃二錢芩各二錢芍藥一錢半桂枝甘草各八分干呂 調中湯大黃一錢半黃芩芍藥葛根吉更赤茯膏本白朮甘草各一錢清熱解毒散羌活二錢白芍人蔘石膏各一錢二分半黃芩智母并酒炒升麻葛根各一錢甘草七分黃連酒炒生芍酒洗各五分干三 柴胡升麻湯柴胡前胡葛根赤芍荊介石膏各一錢柔白皮黃芩各七分升麻五分干三豆豉十粒 加味敗毒散羌活人參防風荊介蒼朮白朮赤芍當歸生芎各六分薄荷甘草各二分干呂 荊防敗毒散羌活柴胡前胡赤茯人蔘枳殼吉更川芎荊介防風各一錢甘草五分 十神湯葛根二錢赤芍升麻白芷川芎陳皮麻黃紫蘇香附甘草各一錢干五葱三 香蘇散香附三錢紫蘇二錢半陳皮一錢半蒼朮甘草各一錢干三葱二 大頭瘟疫治感瘟疫之氣所着成頭痛腫大如斗者是也冬瘟後多有此病初發惡寒發熱身痛頭痛像如傷寒五七日間乃能發人兩目腫面腫者湯明也耳前後額角腫者小陽也腦後項下腫者太陽也表症多者荊防敗毒散裏訂多者防風通聖散風門加惡宗玄參倶用酒炒微二下之每二用嗽藥數次以泄毒氣左右者病之人久用嗽藥以及傳染又曰經三四不解者用荊防敗毒散未效用牛蒡芩連湯至七八日頭面赤腫高起者宜托裏消毒散癰疽無針出血泄毒氣十日外不治自愈 牛蒡芩連湯黃芩酒洗二錢黃連干炒吉更大黃酒蒸石古各二錢連翹惡宗玄參甘草各一錢荊介防風羌活各五分干三 瘟疫預防法疫病初起取香蘇散煎一大鍋每人服一椀又蘇合丸取九浸一瓶清酒中時二飲之又絳囊盛三九帶之宜聖散子 聖散子草豆久煨猪令蒼蒲赤芍良干獨活赤茯附子麻黃厚朴古本只壳柴胡澤瀉細辛防風白朮藿香半夏吳茱蒼朮甘草各五分干呂平朝

煎一釜老幼各一呂　不傳染法以紙撚探鼻啾之以香油沫塗端又以紙撚蘸香油並雄黃朱砂末探入鼻內　單方　朱砂（辟瘟密丸麻子正朝晨一家大小向東水下三七丸）藍汁（搗根汁猪糞汁並治瘧疫）人屎（治全上取乾者淨汲覆之湯浸取清飲）蒼术（燒之辟瘟布囊盛之正旦四日一并中三日取出一分服男十枚女二十）尾盆（內塗黃土泥一厚許上塗蜜上又塗黃土泥一厚許上塗蜜上又塗蜜如是四五次大上炙乾浸白沸湯飲汁取汗）清心丸（炒紫蘇湯調服）

邪祟

邪祟形忽亂如醉狂言罵詈驚怕夢壓向壁悲啼好言未然禍福或見非常之鬼蓋自己精神不完挾痰火非真有妖邪鬼祟也　十症五尸十症者人死三年之外塊神飄揚著人成病名曰鬼症其種有十令人寒熱神錯久漸委頓五尸者忤同鬼症死後復傳傍人其種有五　邪祟尸症治藥邪祟宜辟邪丗尸症宜十症丸感鬼成胎紫金釘（辟蠱）半錢至一錢磨服瀉下惡物更燒三錠使藥氣滿室又邪祟症忤一切鬼魅成病取蘊合丸二七丸浸一瓶清酒中時々服微醺又帶三丸　辟邪丗人參赤茯神遠志鬼箭羽菖蒲白术蒼术當歸各一兩桃奴五戔雄黃朱砂各三戔牛黃射香各一戔酒糊丸龍眼大金箔為衣臨卧以木香湯和下一丸又絳車盛五七丸懸床帳中　十症丸雄黃巴豆霜各一兩人蔘麥門細辛吉更附子炮皂角川椒甘草各五戔蜜丸梧子大溫水下五丸　單方　雄黃（辟邪佩之服之皆可）射香（同功同用）蚕退紙（治邪祟燒末酒調服）桃仁（治鬼症作祟常服）赤小豆（煮飲）雄黃末（一兩松枝二兩烙化以帛仆攪為丸彈子大燒之用燒籠令病人坐其上蓋定只留頭由不過三丸邪祟自斃）

癰疽

癰疽之源癰發於六腑若燎原之火外潰飢肉疽發於五臟若陶室之燧內削骨髓凡發熱惡寒頭痛惡心筋脉拘攣氣急煩悶或渴多年皆欲發癰疽之候脉必浮散常飲忍冬茶最佳濶一寸至二寸為癰五寸至一尺為疽一尺至二尺為意體疽　癰疽痛痒人近於火微熱則痒熱甚則痛附近灼而為瘡蓋火之用也始發至成膿多痛焉膿潰之後腫退皮寬痛必漸減而反痛者為虛也未潰而痛潰之已潰後痛者補之有穢氣昏觸者和辭風冷昏逼者溫散凡因風寒而發者腫堅色白因熱毒而發者腫燉色赤　癰疽輕重淺深之辨癰者皮上薄而澤疽者皮上堅而天如牛嶺之皮又曰小按即痛者病勢淺大按乃痛者病勢深此癰疽之辨也　癰疽辨濃有無淺深手掩腫上熱者為有濃不熱者為無濃按而後痛者其濃深小按即痛者其濃淺按之軟而即復者有濃按之強而不復者無濃又曰按之半軟而已有濃宜急破之凡穿熱者易治虛寒有邪熱者難治又曰破濃不去加白芷不可白术蓋白术生濃故也　治癰疽大法初覺則散以數之若脉沉窄當先疎其內以絕其源若脉浮大當先托其裡以防其入又曰內消黃連湯千金漏芦湯主陽癰燉腫內托復前散內托十宣散治陰疽蘊毒又外訂宜內消黃連湯清熱消毒飲發表攻裏兼行宜防風通聖散（風門）膿成敗潰宜托裡散　內消黃連湯脉窄煩燥秘渋者宜用大黃二戔連翹赤芍各一戔半黃連黃芩當歸梔子柴胡各一戔木香薄荷吉更甘

草各五分　千金漏芦湯治背癰惡腫熱毒大黃二錢漏芦連翹麻黃升麻赤芍黃芩
甘草各八分　內托復煎散蒼朮八兩防風一兩地骨皮黃芩赤茯赤芍人參黃芪白朮桂心當歸防己
甘草各五錢先將蒼朮水五升煎至三升去滓入諸藥再煎至三四盃分三四次終日飲之又再煎滓如前
服之　托裏散人參黃芪各二錢白朮陳皮當歸乾煎白茯白芍各一錢半甘草一錢　黃連消毒散治
發腦發背及諸腫癤毒又麻木不痛者先灸宜用此黃連羌活各一錢二分黃連黃椪古本防己吉更各
七分生苄知母柴胡防風連翹當歸尾各六分人參甘草各五分薤木陳皮澤瀉黃芪各四分　內托
羌活湯治足太陽經分疔臀發腫羌活酒製衣各二錢黃芪一錢半防風古本當歸尾各一錢連翹蒼朮陳
皮甘草各五分官桂三分酒水煎　清熱消毒飲善治湯金銀花二錢赤芍生苄川芎各一錢半當歸黃連山
梔連翹甘草各一錢　癰疽內托法積毒在臟腑當先助胃壯氣使根本堅固以行經活忽藥為佑參以
經絡使毒外發此內托之意凡腫高起忽痛者是內攻之候急以內托散及內補藥補之最迫透漠、穿十無
一生又曰初生一二日脉沈細而頻聞者宜托裡散癤腫于外形症在表其脉多浮如非氣盛則沉于內直用
托宜復煎散凡托裡宜用十宣散托裡消毒散內托千金散　十宣散人參黃芪當歸酒洗厚朴吉更官桂
川芎防風白止甘草等分為末酒調下三錢不飲者用木香湯冬寒宜用此夏月宜內托復煎散　內托散十全散加
白芍　托裡消毒散金銀花陳皮各三錢黃芪鹽水炒天花粉各三錢防風當歸川芎白芷吉更厚朴穿山甲炒焦皂角刺

炒各一錢分作二貼酒水煎　內托千金散金銀花人參黃芪赤芍當歸川芎白芷吉更厚朴穿山甲天花粉桂
皮吉更防風甘草各二錢水煎去滓入酒半盃日三服　陰疽起發法癰疽陰症頭手向內沉黯不痛渾身
及患處不熱宜用當歸酒炒干宜為佐蕪送鷄血散四味散貼酒煎去滓入乳香末五分　鷄血散赤雄鷄割冠尖小許倒提滴血刨上血盡再搜不過五六鷄痛定毒消內服
疳參湯　四虎散南星草胡半夏生狼毒等分為末醋窑調付開頭出毒氣　癰疽五發症腦發髮發眉發
頤發背發是為五發至險令人頭痛惡心寒熱氣急腦癰腦疽酒及破急用藥至於腦鑽症安黑且厚如
靴不見膿難愈左右髻發額角及太陽穴生者亦危人中及耳下發者亦害人耳後五瞖俞分生者最重
蓋外因血氣食發者宜連翹敗毒散內因七精宜遠志酒因怒大宜柴胡清肝湯因藥毒房勞宜國老膏
因金石藥毒堅硬不痛宜蠟礬元虛勞瘦弱榮衛痞滯患處重着宜托裏散五發癤腫湯宜清熱消毒
飲好飲熱勿為賢虛火熾宜托宜消毒散頭面腫大者宜內疎黃連湯　連翹敗毒散羌活疳活柴胡前胡
吉更川芎赤伏金銀花只角連翹防風荊介薄荷甘草各七分千三　遠志酒遠志泔浸去骨為末溫酒一盞調三錢取
清飲以滓付患處　柴胡清肝湯治三焦風熱怒火以致五發柴胡二錢梔子一錢半黃芩人參川芎青皮各一錢
連翹吉更各八分甘草五分　國老膏大甘草二斤搥碎河水浸一宿揉爛絞去滓銀石器盛汁熬大熟膏
分六次溫酒或白湯調下　蠟礬丸黃蠟二兩白礬四兩研末二兩白眾手作丸梧子大溫酒白湯下三十九又治內疽

膿癰瘰疬瘻惡瘡　癰疽作穴出膿法已作膿頭不破膿不宜替計九透濃散　替針九石灰五合炉灰三合水五合淋取汁入鍋内熬至三合盛貯鍋蓋以炙紙蓋貼汁上濕透以糯米十四粒置紙上住宿取用白丁香研砂沒藥乳香各一字為細末入糯米研勻九如麥粒大每一九用津貼瘡頭即破膿出若膿滯不快則取一粒納瘡口使膿不滯好肉易生　透膿散蜈蚣黄角燒存性好酒調下便出瘡口脹一枚則出一口脹兩枚則出兩口　癰疽排膿生飢法潰後血氣大虛惟恐毒陷托裏之法不可一日決也宜十宣散托裏散托裏消毒飲十全大補湯虛勞使氣血壯而脾窠則膿穢自排毒氣自解死肉自去矣何患肉不生而瘡不斂　托裏消毒飲又治陰疽不發人參黄芪白芍當歸白朮白伏苓炙連翹金銀花各一錢白止甘草各五分　去惡肉方中有惡肉不去則好肉不生宜去惡散鹿角散又白丁香霜梅為末深則紅之淺則滲之　去惡散雄黄一錢巴豆一介同研以乳香沒藥又小許點惡肉上或加白丁香　鹿角散鹿角細末醋熬為糊貼之當頭上開孔使膿自出惡肉自去　湯洗法濃血燃取之時所輒朝夕洗瘡以外叙其毒氣用新綿醲藥水乘熱溻洗患處深則再温餘毒湯又艾葉煎湯柒灰水鹽湯皆可　餘毒湯未破未洗已破用此淨洗然後用藥滲貼黄栢降蘭甘草荊芥赤芍大黄白芷當歸炙各二錢葱五枣五水三升煎去滓薰洗或入猪蹄一隻可先乾洗　糝貼藥瘡腫初生即貼温熱藥引出熱毒火乾燥之義也四畔赤燃處貼寒藥駈逐邪惡撲火之義也未潰宜泥水膏供宝膏已潰斂瘡散桃花散

又神異膏太乙膏萬病雲母膏灵應膏善應膏（已上雜方）泥水膏左宜發背大南星七錢半白芨赤小豆半夏各五錢水蟹子仁乳香沒藥各二錢半雄黄二錢為末蜜水調付炒貼　洪宝膏天花粉三兩白芷赤芍各二兩盖金一兩為末茶調付乾則揩新　斂瘡散浩石煅花蕊石煅鶏内金焙各五錢半白芨三錢半白斂二錢半黄丹乳香各一錢另末乾滲　桃花散白芨白斂黄栢黄連乳香黄丹射香等分另末乾滲　内外分癰疽内疽者因斂食七精之火相盖而外其外在皮裡而裡非肝腸胃　膜也謂之内疽者以其視而不見故名之内用内托之藥外而鍼開之未潰四物湯加吉更香附生後亦用四物湯調理雲母膏太乙膏（雜方）糯米膏皆可選用而辛難製得故不錄其方（癰作九無眼）肺癰中府穴隱隱痛者肺癰也喘咳腥臭出膿胠滿咽燥振寒面風寒之氣内舍於肺先渴苓表宜參蘇飲（寒門）繼用牧丹皮湯後用牧丹皮湯參朮補脾湯　牧丹皮湯牧丹皮升麻吉更薏苡仁地榆黄芩赤芍甘草各一錢麥門冬七分吉更六分甘草五分五味子四分升麻三分千三　心癰巨闕穴隱隱痛者心疽止内微氣者心癰也膏乳間生蜂窠疽狀如斗大由心脾有熱或傷酒或傷熱物盍滯而生不早治則危急用辣導火之心劑宜涼血飲　涼血飲木通瞿麥荊介薄荷白芷天花粉赤伏麥門乾芦橘子車前子連翹甘草各八分灯心卉葉　肝癰期門穴隱隱痛者肝疽上内微者肺肝癰也胠滿鶩腸介於腋下治以柱石由肝心大盛宜柴胡清肝湯潰汶六可清熱托裏忌熱藥　腎癰京門穴隱隱痛者腎疽上内微起

者腎癰也胠下至小腹滿與內腎相對由腎氣衰敗而作突起皮赤者易安黑者難愈宜加減八味元（虛勞）五戟癰疽但宜十六味流氣飲或托裡散加山梔黃芩杏仁連翹　十六味流氣飲並治無名惡腫

人蔘當歸黃芪吉更防風木香以角川芎官桂白芍柮郎白芷厚朴紫蘇烏藥甘草各六分　胃脘癰

中脘穴隱隱痛者胃脘癰也由飲食七精大盛復感風寒使熱濁之氣愎塞而作外症寒熱嘔惡或吐膿

宜內消沃雪湯宜太乙膏作丸服　內消沃雪湯當歸身白芍甘草節黃芪射干連翹白芷貝母陳皮

皂角子天花粉穿山甲金銀花木香青皮乳香沒藥各五分大黃酒洗一戔半酒水煎　腸癰腹癰關元

穴屬小腸天樞穴屬大腸毋田穴屬三焦古穴分隱隱痛者為疽上肉微起者為癰也其症小腹腫而強

按則痛小便數而淋時有汗出惡寒發熱或繞臍生瘡膿從瘡出或有出臍中者有大便下腫膿血者

自愈蓋由溷熱盛積腸內成癰若脈遲緊者宜大黃牡丹湯脈芤澁者四物湯加桃仁紅花玄胡索

木香大卜皮急按之濡身無熱乃陰冷所致宜牡丹散加茯苓大卜皮堅按之痛身有熱乃結熱所成

宜大黃牡丹湯蠐螬䗪九六住腹癰者生於肚腹皮裡膜外腹痛甚治法同腸癰　大黃牡丹湯大黃芒

硝各一戔半牡丹桃仁仙婁各二戔半　牡丹散牡丹皮人參天麻白茯苓黃芪薏苡仁桃仁白芷當

歸川芎各一戔官桂甘草各五分木香三分　臀癰臀上手陽明分生癰傷於風者上先受之宜白

芷升麻湯黃芪酒洗黃芩各四戔黃連三戔白芷一戔半升麻吉更連翹各一戔酒黃紅花甘草各

五分㕮咀作二貼酒水煎　臀癰其道遠其位僻氣運不到血亦罕來便與滋補氣血未成膿者滿蒜

炙堅硬腫痛宜內托羌活湯　鼷癰穀道前後生癰初發如菉豆甚痒漸大數十日後始覺赤腫如桃

即破之大小便皆從出者為難治宜國老膏誤用寒涼藥則危又宜蠐螬䗪九　國老膏大甘草帶節一兩

分四切用長流水一椀薤水文武火上煨之炙之乾則投水再炙水盡為度細切酒二升煎半空心隨量飲三日飲

服一二三服可保無虞勿責速效　便癰窠血疝也一名騎馬癰此奇經衝任為病而癰見於厥陰經之分上

不在腹下不在腿介乎兩者中也或一邊腫或左右俱發或先有疳瘡而發或卒然起核腫痛而發皆熱盛血聚

而成初宜消疎利之宜消毒飲外用生山藥砂糖同搗塗上後用托裏內補　消毒飲皂角刺金銀花防風當

歸大黃仙婁仁甘草各一戔三分酒水煎　囊癰溷熱下注作濃之盡自安勿藥可也或因腹腫流入囊中

而囊裂署九鼷掛水出以熟炭末付之又以箔葉包裹仰卧養之　附骨疽附骨疽與白虎亢尸歷

節皆相類但歷節痛則走注不定白虎亢尸痛淺按之便止附骨疽痛淺按之亦無蓋又曰白虎亢尸亦

能作濃腐潰骨出方愈然則同是一病但淺深不同耳附骨疽之症筋骨之內痛如錐刺外則全無赤腫

因露卧風冷或乘涼浴水寒溷深襲初起痛不能轉寒熱無汗經久寒盛為熱寖而為膿之成則用

火鍼使毒不得內潰又曰初起宜漏芦飲子次用內消升麻湯在元臀宜內托羌活湯在腿肉宜羌活防

已湯在腿外宜黃消毒飲潰後久不愈宜平胃散又曰環跳穴痛不以防生附骨疽急用青草蒼柏湯不愈加麻

黃一錢　涌芦飲子並治他惡瘡大黃一錢半涌芦白飲黃芩麻黃只窠升麻赤芍朴硝甘草各一錢　內消升麻湯大黃麻黃當歸黃芩赤芍只實各一錢半甘草一錢　羌活防己湯羌活川芎蒼朮各一錢二分防己木香連翹射干白芍木通當歸尾藿朮甘草各七分酒水煎　平肥散老狗頭骨煅露蜂房乱髮灰各二錢半柰白皮一錢二分半右為末入輕粉射香各小許溏則乾溼乾則油調付之　青草蒼栢湯青皮各一錢半甘草節五分蒼栢各三錢煎後入千汁三時空心服冬加桂枝夏加條芩虛加牛膝　流注骨疽因痰水大感風寒邪氣流至痰注處而不聚結腫硬成痛或不痛或無血潮或有微紅破之無膿或吐清水紫汁多生四肢或青腹腰臀髀節之處初起宜葱熨法窠者十六味流氣飲通用榮衛返魂湯合二陳湯漬後久不斂以托裡為主膿成以火鍼破之　榮衛返魂湯赤芍木通白芷河首烏只角茴香烏藥當歸甘草各一錢酒水煎感或加忍冬尤妙虛加附子砲窠加大黃痰加南星半夏腫堅不穿加川芎麻黃葱白全蝎穿山甲流注加疒危活　疔疽因食白死牛馬禽獸之肉或恣食辛辣厚味積毒而發無定處在于足頭面膏背骨節間最毒其為緩初發必先痒後痛寒熱頭痛重嘔逆則瘡頭黑如釘四畔大帶赤如火盤根突起深孔透肌或不痛痒但麻木比之癰疽尤毒治法以鍼刺瘡心下四瘡釘子無則代紫金錠于法以艾炷灸之鍼疔四邊出血用前藥紝之上用膏藥貼之乃服千金涌芦湯又法錄之不通無血者以猛火燒鍼通赤烙之令焦取痛為效点紝前藥又用藥之法初發用神仙餘毒丸

十消七八以成瘡腫疔毒內攻黃連當歸煎湯和下紫金錠又宜還魂散逆甚者乳粉托裡散濃漬根出之後用托裡散疔有紅絲魚腸脫疽三腫惡疙紅絲者急有條紅練直上急用鍼於紅練所至之處刺出惡血然後治用上法魚腸者頭黑孔深如魚腸破之滲出黃水蛇退燒灰鵝子清調付內服神仙餘毒九脫疽者發於足脂赤黑者不治急斬也輕者色赤自潰用隔蒜灸乃服還魂散　扶疔法疔瘡有督根在內須拔去乃可救宜面瘡銼又蒼耳莖葉燒灰醋調塗四圍不塗瘡口待根出拔去又白狗屎燒存性和酒服又塗疔上　紫金錠方見餘毒還魂散知母天母白芨半夏天花粉皂角刺治一切毒腫惡瘡每取半錢淡酒和下重者一疔外以凉水調塗患处一日數次神效已潰出膿血者忌服乳香金銀花穿山甲各一錢酒煎温服將滓去搗爛加荷葉一兩蒼朮和數瘡上乾則蜜水潤之　四瘡釘子草合一兩巴豆肉七介鱉酥粳米大七粒射香一半為末麪糊九作釘子　神仙餘毒丸白礬熔和作丸如藥豆大煎朱砂為衣每十九葱白煎湯送下　癰疽雜症有六種　癰疽煩渴此乃熱症津耗八物湯虛勞加黃芪麥門冬山茱萸五味子又宜黃芪六一湯五味子湯忍冬湯　癰疽嘔逆未潰時毒氣攻心發嘔宜粉托裏散生干甘枳湯宜已潰蒼令白朮散內傷癰疽千呂或榮衛返魂湯加半夏南星　癰疽寒熱盛或面胃寒或因熱盛俱宜二陳湯或六君子湯痰加門每一錢乾土水調下　癰疽作痛癰疽不可小痛亦不可大痛未潰時痛而便秘者宜內消黃連湯

已潰虛心痛者十全大補湯(虛勞)加麥門冬五味子穢氣乖觸痛者以乳香芍藥之類和餘之風冷脚
逼疽痛者以防風桂枝之類渴散之湯通宜止痛當歸湯癰疽泄瀉宜粉乳托裏散以木香白茯苓煎湯
調下用加味不換正金散佐之陽氣下陷腹痛泄瀉昏憒理中湯(寒加附子丁香麥門甘草各一戔日進三五服乳粉
托裡散菜豆粉四戔乳香一戔為末每二戔甘草湯調下或新水調下一兩加味朱砂三分名護心散生干甘
吉湯蒸咽膈不利吉更一兩生甘草生干各五戔 加味不換金正氣散蒼朮橘紅半夏曲藿香厚朴各
一戔二分半甘草炙一戔白茯川芎各七分半木香五分干呂 止痛當歸湯人蔘黃芪當歸白芍生芊官
桂甘草各一戔鹿末煎日三服 癰疽通治藥千金漏芦湯榮衛返魂湯紫金釘忍冬肉皆可選用
忍冬肉治一切癰疽內外發乳癰腸癰背癰無不效取忍冬莖葉研爛入酒小許調塗四邊中留一口又取
藤五兩椎碎甘草一兩剉水二劑砂鐺煎半添入好酒一劑更煎數沸分三服加黃芪當歸各二兩為妙
癰疽針法待成濃急用鍼去膿血勿改攻陷又有蚘針法 蚘針法水洗腫安取大筆管安於腫頂取
大水蛭納管中以冷水灌之 癰疽灸法腫破不痛脈沉毒深者宜灸之也痛而安厚有毒
者亦灸在頭小灸餘處多灸但安薄毒淺者及有濃水者不可灸當針之 灸法用大
蒜切斤安頭上以大艾炷灸之三壯即換一蒜痛者灸之不痛不痛者灸之至痛乃至緊
以百壯為準腫頭漫連廣潤者研蒜作薄餅灸之多灸則初服乳粉托裏散防火氣

八心 單方伏龍肝(醋或、鷄子研付加大蒜尤善) 菊葉(治疔撮取汁飲一升又研塗疔上名曰掏瘡通治取花葉根莖新
搗和酒去滓燒服) 槐花(通治炒香四兩酒一升煎服即消) 生龜(通治取血塗之腰毒即消) 雄雀屎(止痛燭
穴出膿非時則櫻桃木煎服治內腫) 蜀葵花根(搗付之) 芋根(治疔背塗付日易) 赤豆(治熱毒鵝
子調付) 田螺肉(榆白皮同搗作餅入瘡口去白生新) 鹽醋(草麻子合三物和研如泥主濃者自消已潰
者已潰治之腳癰) 蜘蛛(先以真油納于竹筒取三个置油中過三日則濃化付瘡上治百取瘡) 食鹽(塗貼治腦後腫及
大小疔瘡惡瘡) 櫻桃(眼四五孕) 老雄鷄(去毛羽頭足及內腸取葉木皮多加鷄腸又葉木皮堅果
鷄舟細于缸中盛水泥鷄蓋以泥黃土泥要果缸

諸瘡

大風瘡脈風成癩其症麻木不仁潰爛成膿邊梁崩塌手足脫落眼斷唇翻聲啞大抵者
瘡者亦難治療粗記二分宜用紫雲風丸以防風通聖散(寒門)調之兼用洗藥數藥紫雲
風丸河首烏四兩五加皮白千蚕苦蔘當歸各二兩全蝎一兩半烏宗羌活獨活白芷細辛
生芊防己黃連赤芍蟬退防風荊介蒼朮各一兩為末酒糊丸梧子大溫酒米飲下七十九
洗藥地骨皮荊介苦蔘細辛各二兩河水煎盛大桶沉浴出血為效 數藥胃象寒水石
硫黃枯礬各二兩蛇床子一兩朴硝五戔為末腦豬脂調付 天疱瘡一名楊梅瘡與癩大同因
男女房室傳染形如楊梅嫩紅濕爛痒痛者屬心多乳膜如鼓釘黃豆者屬脾多生滿

面形如錦花者屬肺多生毛髮形如紫蒲萄緊痛者屬肝腎多兼生於尻臀兩陰之處初起即脈防風通聖散風門一貼去麻黃以去內毒再用一貼去硝黃蒺汗以去外毒復用加減通聖散合脈成瘡後通用茯令湯三黃貼毒散兼用洗搽方　加減通聖散牛蒡子一錢二分防風白蘚皮赤芍連翹黃芩各一錢金銀花五分梔子仁當歸尾各七分荊介梔花各六分白干蚕甘草各四分　茯令湯薏苡仁皂角刺木瓜白芷當歸尾黃栢生苄牛膝白芍防風各一兩白甪川椒紅花各五錢甘草節羌活各七分金銀花二兩土茯苓四兩分作十五貼一日一脈　三黃敗毒散防風荊芥連翹白芷赤芍黃芩黃連梔子地骨皮五加皮白蘚皮木仜苦蒼蟬退金銀花薏苡仁白干蚕皂角刺黃栢白蒺藜川芎上部倍用木通上部倍用甘草各一兩土茯苓一斤半分作二十五貼日一二脈　洗藥方苦蒼蛇床子白礬荊芥細辛各三兩剉以河水煎八大桶薰浴又桃仁柳枝梢濃煎浸俗　茶藥方野菊花棗木根煎湯洗後防風通聖散為末同蚯蚓糞等炒蜜調付之極驗又白礬乳香各一兩輕粉五錢射香五分為末每小許糝之　經驗俗方地榆根搗泥晒乾為末松外皮為末百草霜石文每三合式合置一處滴水搜和乃入生水銀一兩再和極勻晒乾每取胡桃大作一貼每一燖以差為度

燖法如一發瘡燖砒礵法兼用土茯令頻煎服能解水銀毒又常進狗毒北方亦治疥瘡法　鵝掌癬用黃丹輕粉末分為末猪油調搽　瘰癧頸前項側結核初生如豆久大如梅或如鷄子二三成列六七排行形如馬刀者曰馬刀癧宜早治流注癧者婦人多有之初生在項破後流注遍體如梅李狀自破流濃宜和氣調經湯蓋瘰癧由於筋病累及骨髓寒熱燬宜梔子清肝湯主之北疽亦瀉當以木通滑石葷道之通琥珀散貓頭丸蠟礬丸瘡疽重者補中勝毒餅　化氣調經湯橘皮二兩香附子酒製羌活白芷各一兩牡蠣粉玉花粉皂角刺甘草各五錢為末每二錢酒調下　梔子清肝湯柴胡二錢梔子酒炒牧丹皮一錢三分赤茯苓川芎赤芍當歸牛膝子各一錢青皮甘草各五分

琥珀散白丑頭末滑石白干蚕黃芩各一兩木通連翹各七錢枳殼赤芍柴胡各五錢班猫三十九去翅足炒甘草三錢琥珀二錢分作各狀煎服

猫頭丸猫頭骨一介炙蝙幅一介以朱砂三錢填入腹內尾上炙砂南星白礬各一兩為末熔蠟和丸菉豆大臨臥米飲下三十丸　補中勝毒餅黃芪一錢半連翹一錢防風牛蒡子當歸生苄熟苄白芍陳皮人參各三錢為末蒸餅化作餅子二枚晒乾每一餅攙糯為末白湯調下　一方烏鷄卵一枚穿頂細班猫一介紙封其竅蒸熟去猫日一煎服五積散加減下四五枚神效　糝貼苯蝎牛七介以竹簽貫之尾上晒乾燒存性丁香七介並為末入輕粉小許豬髓調勻攤紙貼瘡上

又方大田螺並殼燒存性為末破者乾糁未破者油調付又俗方青蝦蟆生吞數三枚神效　結核與疾㾗癆門同參治查堅硬如核不須破但熬氣散則自消結在頸項二陳湯加阿炒大黃吉更柴胡連翹結在肢體二陳湯加連翹防風川芎阿芩蒼术皂角刺白干蚕又宜含化丹　含化丹大黃阿蒸白干蚕青代貝星末分為末蜜丸彈子大食後磨下　外治方生山茅一㾗草麻三介去皮研勻攤貼又生陸根生南星搗付　癭瘤氣血凝滯而成初如梅李久如盂卵其名有六曰骨瘤濃瘤血瘤石瘤脂瘤不可決破多殺人惟脂瘤次去其脂則愈初起通用十六味流氣飲癭方見久服蠟碧同上外用枯瘤方南星膏　枯瘤方砒礵硼砂黃丹雄黃輕粉各一戈班猫十三介朱砂乳香後茶各一戈為末糯米粥和丸捏作綦子攤累乾先灸三壯於瘤上項以茶餅盖上後以黃梔末水調貼之數日自然枯落　南星膏生南星大者一介研磨醋三五点為膏先將針刺瘤上頂却以茶攤紙貼之頻易以消為度無生代乾者為末醋調付一方加草烏干水調付　一方丸海草皆療癭瘤結核海藻視布亦介為末蜜丸芎含化滴沐　疳瘍諸瘍潰漏也其疮穿孔一深濃汁石盖風冷並入延久成漏有九種之疮溫散風冷為急宜內塞散去惡水清為次宜加味蠟碧丸外治宜黑灵散兼用蒜灸癒方　薰方洗方又有一種心瘍宜心瘍方

人參黃芪當歸白芷防風白芷吉更川弓遠志孕朴官桂赤小豆甘草灸各五戈附子炮一箇為末二戈溫酒調下　加味納碧丸象牙五戈露蜂房白干蚕蛇退燒血竭木香各三戈乳香二戈白碧二両為末黃蠟四両熔化丸梧子大溫酒下二三十丸　黑灵散露蜂房五戈壯蠟粉黃丹硫黃研各二戈半同炒烟盡為末入油髮灰二戈半肪香小許和勻捻付熏方艾葉五倍子白膠香苦練根等分剉燒之以介桶引烟熏之　洗方白芷露蜂房或大腹皮苦參煎熏湯洗拭乾取束行石榴根皮為末糝之殺陰虫心瘍方宜前有孔常西水鹿茸酥炙附子炮鹽花各等分為末棗和丸梧子大溫酒下三十丸　治癬單方取蜂蜡剪去兩頭安口瘡以艾灶灸之七壯二易不過七枚神效又鼈亀燒取膏塗之妙又鰻鱺魚取膏塗之妙　疥癬方血分風熱也皮深痒者為疥淺沈者為癬疥多挾濕疥之傳染者宜硫黃餅癬之頑濕者宜蝎黃二両為末水調成餅貼磁器底覆之用艾葉一両川椒三戈為末燃熏乾硫黃臨用先以茶湯洗拭拭用麻油調硫黃為末擦之　蝎蚱膏全蝎班猫冬十枚巴豆肉二十枚青油一両同熬候色焦者先去之去盡三物子乃入黃蠟一戈候蠟收貯擦之　依方砒礵燭法砒礵和艾葉燃之以紙籠熏二陰熏之飲蓉豆汁解毒　洗藥方何首烏艾葉等分煎湯洗　癜頭瘡頭上生瘡如癜防風通聖散加為末酒浸臨臥三次食忌白湯調下日三外用蜜陀僧硫黃各二戈輕粉小許為末豬脂調付小兒頭

瘡及身瘡黃連五戈蛇床子五倍子各二戈半輕粉小許爲末荊介湯洗後油調付　人面瘡如人面目多在
臂膝內服十六味流氣飲瘢外付貝母末妙陰蝕瘡由腎虛風濕來之瘙痒成瘡
浸淫汁发二曰妬精瘡由忤年忍精敗精停蓄陰生瘡潰爛痛痒三曰陰蝕瘡亦曰下疳瘡由熱結下焦宂由
婦人行經時交合陰蓄連囊腫痛小便淋渋大漸潰爛侵蝕恐成陽痿預服花合湯仍之寒熱尿渋八正散便通
中痒痛或发白津龍膽瀉肝湯並潰後八物湯加柴胡梔子知母六服不及服輕粉毒藥通用消疳蛾毒散氣
用洗瘡藥婦人宂有生於玉門內以似疳蝕但不痛以洗毒散洗之以銅綠散瘡之並　消疳蛾毒散柴胡一戈半黃
栢赤芍赤茯木通草龍膽各九分連翹荊介黃連倉术知母各七分防風獨活各六分甘草三分燈心一團　洗藥
方　洗毒散蛇床子地骨皮大薊麻黃荊介防風枯白礬各三戈葱白三根煎湯洗　瘡付藥　栢蛤散黃栢以礬
鋒刮取末蛤粉石末等分瘡之　鳳衣散鳳凰木黃丹各一戈輕粉尤腦各不許爲末瘡之或鴨子清調付　又方
取月經布燒灰蜜調塗付　臊瘡生於兩腳腫爛憂移內三陰虛宜八圖九痛有內臊瘡有外臊瘡先以三棱針刺
去惡血冷水洗淨貼神捷膏或以槐枝葱白川椒煎湯洗後貼藥　神捷膏清油半斤先煎入黃蠟一兩松脂五戈整
武珠候冷入乳香沒藥輕粉血竭孩兒茶栢白礬龍骨煅各三戈川椒四戈爲末攪均收貯以茅水洗後用油紙貼針
刺孔擁紮貼瘡上日易　一方黃臘一兩猪膽一个輕粉二戈熔化擁油紙貼之　腎臟風瘡膀胱瘡如癬漸大
痛痒淋漓失治則近反遍身由之陰血燥風熱聚之宜腎氣丸虛
方　外付白膠香散或生臊上其瘡口挾內潤与臊瘡

糸治　白膠香散白膠青赤石脂枯白礬各五戈黃丹乳青汶茶輕粉爲末糝之或油調付　一方取韭
由地龍糞爲細末入輕粉清油調付又方石榴根皮煮取濃汁冷洗瘡上　侵淫瘡初生甚小痒痛汁出
浸淫汚爛連至遍身先用苦參大腹皮煎湯洗之乃以苦楝根燒存性爲末豬脂調付爛則乾糝又方胡
麻生嗢付之又鷄冠血付之　凍瘡凍傷成瘡生附子爲主麵水調付　湯火瘡乙湯火上急向火上猛
灸一時妙勿以冷物觸之宜黃栢敬鯽子角黃栢朴硝火黃寒水等分爲末新水調
塗　單方以妙油洗之盬付之又黃蜀葵根敬鯽水搏付又生白礬爲末調塗　單方又白
蜜塗之并桶中白膜貼之又真漿塗之　龜花瘡龜裂歲久而如菌乃服十全大補湯加外用黎芦爲末豬脂
調付或雄黃末付之元氣漸復自愈誤用鍼灸及尼
之　軟癩之癩也大如豆名色赤有膿血枯白礬末油調付之又雞肫卵殼燒灰入輕粉小許油調付之　走皮
癩癜瘡生滿頸項如豆極蔓連兩耳漫爛以艾葉白芷黃連葱白煎湯洗後用白角并等分燒黃栢白芷粗
礬藍葉等分爲末油調付　熱毒瘡遍身生瘡痛以不痒益蒲爲末厚布席上安卧其上敬　諸蟲毒
瘡遍身生瘡及惡瘡皮膿血痛痒宜凉血竹瀝風艦毒敬二黃膏　凉血竹赤爲黃芩川芎荊芥生苦參
門天花粉甘草各一戈燈心十莖竹葉十片　疎風艦毒敬白芷羽辛疾藜子炒麻黃槐即當歸乾苦川芎
赤芍栀佔白附柔白皮蒼术只殼甘草炙各七分黑豆七十粒蜜糖五葉生干五片　二黃膏清油三兩

煎已三向十粒微黑去皂入黃蠟一兩熔化又硫黃雄黃末各一戔化膏以茶水洗後摸付　洗藥方通治諸般惡瘡艾葉細茶葱白桃柳枝川椒濃煎入鹽頓洗　生肥才香油芝麻油枯腊乱髮灰等分熔化貼之　諸瘡中風水蚊痛風入為破傷風溫濕入為破傷風濕實人最宜角刺燒存性研二戔飲碗末五戔和勻貼瘡又以川椒和麵作餅煨火煨熟切合封貼瘡上冷易又蔥白煨研付之黃肉飲之　老嫗草根三四斗濃煎葉溫熏于大桶洗洛良久數次治天疱瘡　酒渾付傷炙治陽火瘡　石菜塞付日三傷口　單方馬蔺莧俱物搗之

黃蠟各末　蜂蜜各等分　何烏首末水調卵塗之　麥門冬治瘡疽生肌末塗之治疔瘡　熊膽大腥塗之　蠟酥各等分　石灰陳久者用之　貝母為末入牛黃硫黃少許醋調之治疔瘡　石灰菌粉酒調如塗腫處治疔　菜麥門冬搗生為末水塗之治疔瘡　真大黃末雞子清調付治陽火瘡

諸傷

金刃傷腸及肚突破者麻纏為線抹花藥石數縫之孔金瘡折傷墮地損者急灌熟尿瘀血傷積出宜鵝鳴散亡血多者宜芎藭湯人婦產後流腸下南楚宜後文活血湯通宜花藥石收血出不止單湯付宜黃丹白礬為末糝之箭箴及金刃入骨湯石出象牙屑和水塗又鼠腦塗之又磁石看其上　花藥石散通治傷損外糝肉服省妙花藥石四兩研黃一兩為入鏟鹽泥固濟晒乾以炭火從午時煅至往宿研細每大一匕童尿入酒煎熟調服　鵝鳴散通治傷損瘀血大黃酒蒸五戔當歸尾三戔桃仁七介酒煎鵝鳴時服　復元活血湯大黃酒炒二戔半當歸一戔七分柴胡一戔半穿山甲炒研花蓌根甘草各一戔桃仁十介紅花五分酒水煎　單方石灰為末付和石榴花研付炒棗葉紫檀香煎宜為末付之

葱白治癰疽出血及中風水散痛焰研付之　艾葉薰烟炒　顛陸壓傷多灌熟尿傷在上宜飲韭汁通宜藕合元童尿調灌吐血者百草霜童尿調灌實者鵝鳴散虛者當歸鬚散痛甚乳香宜痛散瘀血歸肝胁痛復元活血湯當歸鬚散治氣血凝結脅胁痛當歸尾一戔半赤芍藥一戔半赤為昌藥香付藁木各一戔紅花八分桃仁七分桂皮六分甘草五分酒水煎　乳香宜痛散治傷處疾痛白芷當歸生芊牧丹皮赤芍川芎乳香後葉白朮甘草等分為末每二戔温酒和童便調服　搥打傷被打傷處搜打者黑者大黃為末干汁調付患處通治香油清酒各一碗同煎服數沸服之卧燒地上或温炙上一夜痛止腫消並治打撲傷車方大胆熟酒調下　酒糟和醋淳蒸熨之　人尿攻心暈乾熱飲一升　葱白研止痛傷付之　鼠糞止痛燒末猪腸調付　生龜取血和酒飲細研麥付之　白楊樹皮酒煎飲　骨折筋斷骨節損絶蹉跌出臼要用手法整頓歸文處外用活血散二生膏　活血散蒸豆粉炒紫色水調麥付傷處以棄皮縛定　二生膏生芊一斤生干四兩內攪爛入酒糟一斤炒熱一布裹掩傷處冷易又方生芊攪取汁好酒和服二三次又攪爛蒸熟封傷處　車方赤銅屑大蝦蟇去五合清調下細研沒石半戔　自然銅以合上法曰當歸後煮有毒非折骨痛　白蠟各等分研皮攪泥暴乾入傷付　鱉甲攪泥暴乾入傷付　生

栗 生爵付之 萬苣子 畧妙為末 酒服一二戈 烏雄鷄 破腹付傷處 取血和活服同 瘡傷斷耳鼻舌指囊方悉取所斷耳鼻藺髮灰綴定軟帛裹即安 顛仆斷古以鷄羽醋藺刷之使血止用蒲黃杏仁瞗砂小許為末密調嚥化指斷藕本為末斬接定以蚕蛮布縛裹破九罩眩末斷漫托上多取壁錢付貼漸安 杖傷杖畢用童便好酒各一鍾令兩温服更血攻心實者鷄鳴散虛者當歸髮散加柴胡羌活痛心者乳香定痛散外用葱白搗烔炒熟撲患處冷易又宜生肌方諸瘡 又野蒁根軟者洗同塩搗付又鳳仙花蓮葉搗付又豆腐合煮熟鋪之一方末杖前先取白蠟一兩切入碗内温酒服雖打不痛

單方馬糞 治風痛 熬香 熨痛所一戈調下 人咬傷鼈板或螫甲燒大油調付 復藥 上痛所一戈調下 虎傷先飲清油一椀青布緊捲燒一頭納竹筒中向瘡董烟白礬末納傷處又乾干末納常食生鷄内 馬驢騾咬踢傷艾炙傷處取馬屎燒大付又生栗嚼付又益甘草搗和醋付 牛傷牛觸腸出急急送入麻綫縫令糝以血竭末或百草霜 犬傷狂犬傷九死一生急用許去血以小便洗之用胡桃殼半邊填以人屎掩傷處艾炙設熏熏乾則易之曰灸百壯灸三五日常食杏仁又搗貼之又蚯蚓糞封之内治防風五戈大黃黑丑頭末各二戈斑猫一戈射

射三分雄黃二戈半為末每二戈淡水調服五七次並忌食狗肉再發毒者庶骨為末酒調付又艾灸五七張又貝母末酒調盡量飲兼圓調付之 蝎螫傷白礬半夏為末醋調付之 蜈蚣傷烏鶏血及屎塗之又益湯漬之又螳螂滴患處又蚯蚓塗付之 蜂傷醋磨雄黃塗之又油煠塗之 蜘蛛傷人被傷腹大如孕滿身生絲飲羊乳解之又益汁下一椀和雄黃射香右妙 蟹鏡傷有大毒醋磨雄黃塗之 雞色虫傷青黛雄黃水分為末水調服二戈又外塗之 猿取汁飲又塗付傷處治蛇咬 解毒毋

救諸中毒方人遇蠱毒及諸惡物毒宜太乙紫金毋玉樞毋又飲毒者多灌香油吐利煎甘草綠豆或黑豆飲 太乙紫金毋一名紫金疔又名萬病解毒毋蛟蛤五倍子也去虫土三兩山茨菰去皮焙二兩紅芽大戟焙一兩半續隨子去皮油一兩射香三戈糯米粥和千杵分作四十錠 玉樞毋一名追毒毋即紫金釘加入雄黃一兩朱砂五戈也 砒霜毒在上水蒂散吐吐之在下紫金釘下之多灌香油一二升或綠豆磨汁或黑豆磨汁皆佳臘猪膽和水飲妙 菌蕈毒飲地漿酒搖土入酒水漿飲解

香油亦佳　河豚毒多灌香油以吐出又芦葦根取汁飲白礬末白湯調下　川椒毒飲井水童便皆佳
喫石三枚解之　杏仁毒飲香油藍汁地漿亦妙　藜芦毒飲葱白湯香油為佳　巴豆毒黑豆煮飲
又黄連黄栢煎冷飲　沱手冷水忌飲熱物　草烏川烏天雄附子毒黑豆杂豆煮飲冷又宜甘豆湯
班猫芜青毒黑豆杂豆磨汁飲　硇砂毒治全上　硫黄毒取猪羊血飲　雄黄毒防已煎飲　水銀毒煮猪
肉冷食　大戟毒菖蒲煮飲　狼毒、杏仁水研取汁飲　甘遂毒黑豆煮飲　芜花毒桂皮煮飲又甘
草防風煎飲　莨菪毒艾毒並宜甘豆湯　金石茶毒人参煎飲又鴨血飲之　諸鼈肉毒屏角濃
磨一桃飲又飲韭汁食生肉毒飲地漿禽鼈肉毒飲好酒　諸禽肉毒治同上　諸魚及鱉毒魚毒橘皮煎
飲鱉毒藕葉煎飲　鱉毒豉一合浸水取水飲瞻毒干汁飲之　水果毒桂心為末飲九杂豆大水下十九
加射香小許尤妙　柑皮五钱射香一钱又石首魚煮服　銀香毒飲香油甘草湯亦妙　茉莉毒飲香油重便最佳　燒酒毒
推身杂轉便吐之灌以汁　豆腐毒蘿蔔煮飲又杏仁水研取汁飲又赤小豆末
和水服　通治百毒宜紫金钉甘豆湯香油　甘油湯甘草黑豆取五钱煎飲或加干葉　山杏白扁豆等分

救急　煮服清牛湯毒

中恶客忤鬼打卒厥尸厥昏紫各異而卒然危急則一也作地昏塞不省人事但心頭温者用韭合元及
清心丸備急丸以温酒童便干湯和灌之半夏末或皂角末吹入鼻　備急丸大黄乾于巴豆霜去分為末蜜
丸和擣千杵枣豆大温酒和下三丸　鬼壓即夢魘也昏塞不醒乃咬其足眼徐嗅若此不醒則皂角或半
夏末吹鼻又韭汁灌口中　鬱冒平居無疾忽塞如死移時方醒由汗出過年多血小氣虚婦人多有之宜
白薇湯　白薇湯白薇當歸各二两人参五钱甘草二钱半鹿末五钱煎服　脫陽症大出溺汗元氣不接四肢
逆冷汗流氣喘用桂枝二两酒煎服與亡陽同宜桂枝附子湯　陰陽二氣俱脫津液
退紙燒末酒調服　救縊死抱下安頓手掩口鼻待氣回以半夏或皂角末吹鼻口鶏冠血滴口　救水死取
當中熱厌埋身只出頭又矣脐中二三百灼灌入藥回灸灌湯酒干湯　救餓死先以粥清灌入嚥下令咽腸滋潤漸与稀粥
口中男用雌鶏女用雄鶏治中恶卒死

雜方

枸杞酒枸杞子五斤擬清酒三斗研浸七日去滓飲　地黄酒鮮末一斤生苄三斤細切同蒸入麹釀酒　天门冬取
汁釀酒或為末酒調服　戎盐鮮末三斗蒸苄黄雄犬一具去皮腸矢燜搗泥連汁入麹釀二七日取飲夏作
烧酒法或加當歸一斤煎同釀皆佳　煎茶白薑五两桂心二两丁香胡椒各一两半為細末蒸召取肉六
斤阿膠陳醋各九升先熔膠次入衆藥和丸化入茶末匀煎微温下節時呪

婦人

求嗣男子陽弱婦人血衰俱不有孕男宜溫腎丸女亦宜鼓動微陽宜百子附婦丸調往種玉陽

溫腎丸宜山茱萸熟芊各三兩巳戟二兩兔絲子當歸鹿茸蓯蓉智仁杜仲乾芊茯神山茱遠志續斷蛇床子各一兩蜜丸梧子大酒下五七十丸精不固倍鹿茸加龍骨牡蠣煅　百子附歸丸四製香附未十二兩

製法見脫門　川芎白芍當歸熟芊阿膠酒陳艾葉各二兩石榴一介連皮碎煎水打糊丸梧子大醋湯下百丸忌鉄

調往種玉湯熟芊香附子各六戟當歸身酒洗吳茱萸川芎各四戟白芍白茯陳皮去胡索牧丹皮乾干姜各三戟官桂艾葉各二戟分作四貼干三煎服待往至一日服一貼茶盡交媾必驗　一方男兔絲子酒蒸為末雀卵為丸酒下七十丸　一方女用戊戌酒調妊娠脈婦人尺小張脈動甚者有孕又滑疾而按散者已三月又左疾右大為男右疾左大為女　惡阻身重頭眩惡食嘔疾擇食喜酸六十日當有

犀角　金銀泊　大黃　此症宜加味二陳湯　加味二陳半夏干炒黃一戟半陳皮赤茯砂仁各一戟吉更七分甘草五分干姜炮一團干五日二服一熟加黃芩　茶物　附子　芭豆　牛膝　三棱　莪朮　大戟　雄黃　芫花　杜仲　桃仁　薯根　牛蒡　檳花　皂角　半夏　南星　通草　瞿麥　乾干　乾蝎　蛭　神曲　麥芽　又忌鉄矣　胎漏胎動漏動皆下血而漏無腹痛動有腹痛胎漏者屬虛而有熱宜膠艾湯加黃芩白朮砂仁艾葉便香附各一戟糯米一撮〇安胎飲五六月常服數貼妙白朮二戟條芩一戟半當歸白芍熟芊縮砂陳皮各一戟川芎紫蘇各八分甘草四分或加阿膠〇獨聖散砂仁炒為末溫酒或米飲下二戟神效〇安胎散熟芊三戟川芎枳角各一戟半糯米一合干姜〇知母丸知母為末蜜丸梧子大米飲下三五十丸〇半產有虛而有熱枯萎而墮者有驚怒墜撲傷損而墮者必致胞損系斷須加意調治三四五月預用芩朮湯金櫃當歸散以防其患墮胎後心腹痛宜和痛湯〇芩朮湯愈則日三五服緩則五日十日一服子芩條芩三戟白朮一戟半〇金櫃當歸散黃芩白朮當歸川芎白芍各一兩為末酒下三戟或酒糊丸下〇和痛湯當歸川芎白芍酒炒熟芊各一戟三分玄胡索一戟澤蘭便香附青皮各八分桃仁二十粒去皮尖炒黃紅花各五分水五合童便清酒各二合半煎〇驗胎生死孕婦居舌指甲青者知胎死以佛手散救之免面驗並青者母子俱死不治〇下死胎死胎損心悶絕欲死用佛手散不愈者宜奪命丸〇奪命丸桂枝赤茯牧丹赤芍桃仁等分蜜丸彈子大決醋湯化下一丸〇催生易產法臨月孕婦肥盛安逆氣雍宜速生散孕婦困弱胞漿乾涸者宜佛手散難產日久漿已多下胞乾者香油清蜜各一椀火上微沸調活石末一兩服外以油蜜摩母臍腹上妙或入風冷難產牛膝桂心葱白生干煎服難產用如神丹外貼〇交骨不開難產烏梅生干甘草等分煎服〇達生散大腹皮滑洗二戟甘草炙一戟半當歸白朮白芍各一戟人參陳皮蘇葉只用砂仁各五分青葱五葉一名縮胎飲〇佛手散臨月服之縮胎易產當歸六戟川芎四戟水煎臨蓐入酒小許再煎服川芎當歸等分名芎歸湯〇如神丹巴豆三枚草蘇子七枚並去殼

八肘香小許泥作餅子貼臍中分產即以溫湯洗去（横產逆產坐產碍產横產先露脣逆產先露足坐產先
露脣以細鈇刺兒先出處兒驚痛縮入更轉下不縮則以手輕〻推兒碍產者兒頭雖正產門不能住下者因兒
轉之時臍帶牽扯兒肩而致以手輕〻推兒近上按兒兩肩脫臂帶則順下（胞衣不下惡血流入胞衣脹塞不下重上
逼心宜花蕊石散傷一戈童便調下即爛下至死者亦效又宜牛膝湯一字神散當初以線緊緊胎帶然後切斷使惡
血不調胎中則無患（牛膝湯滑石二戈木通當歸川芎白芍熟苧白朮赤茯澤瀉條芩梔子炒麥門厚朴甘草
當歸川芎各七分干五（一方桑白皮五戈赤豆三合煎服（子淋熱積肪胱或胎氣壅滿小便淋瀝作痛宜葵子茯令湯當歸川芎
酒炒生苧陳各七分干五（一方桑白皮五戈赤豆三合煎服（子淋熱積肪胱或胎氣壅滿小便淋瀝作痛宜葵子茯令湯當歸川芎
半夏干姜炒油炒
急各七分干五（一方桑白皮五戈赤豆三合煎服（子淋熱積肪胱或胎氣壅滿小便淋瀝作痛宜葵子茯令湯當歸川芎
急各七分干五（一方桑白皮五戈赤豆三合煎服（子淋熱積肪胱或胎氣壅滿小便淋瀝作痛宜葵子茯令湯當歸川芎
酒炒生苧陳各七分干五（一方桑白皮五戈赤豆三合煎服（子淋熱積肪胱或胎氣壅滿小便淋瀝作痛宜葵子茯令湯當歸川芎
半夏干姜炒油炒

宜犀角地黃湯(血門)荊芥散取緋線一條產母頂心髮二条緊繫產母手中指節妙○喘嗽產後喘急命在須臾宜芎歧湯防己湯(喘門)又蘇木二兩煎湯調人參末二戈名小參蘇飲產後咳嗽由敗血入肺宜二母散感冒嗽宜荊覆花湯○二母散知母貝母白茯人參各一戈桃仁杏仁各二戈○旅覆花湯旅覆花赤芍荊芥穗半夏曲五味子麻黃赤茯杏仁前胡甘草各一戈干薑一戈水煎服二合以手灸火磨背令熱○產後不語敗血于心吉強不語宜七珍散疾熱迷心不語宜孔鳳散失拜宜伏令補心湯(血門)○七珍散人參生半石菖蒲川芎各二戈細辛防風辰砂各一戈為末薄荷湯調下一戈○孔鳳散白礬細末一戈熱水調下○產後見鬼譫妄由敗血迷心顛倒錯乱蘇合元一戈童便調下又宜生地茶連湯(血門)茯苓散(茯苓散人參當歸山茱甘草各一戈半遠志茯神桂心麥門冬七分半干姜一分半干吉或加蒲黃酸棗仁○產後外感宜竹葉防風湯產後熱渴虛渴宜熟地當湯熱入血室通用小柴胡湯(寒熱門)加五靈吉赤茯黃連又曰忤熱有五症去和榮名一無熱下(一云不致重便後蒸熱)不致重便後蒸熱煩燥或譫語振寒昼輕夜重宜柴胡四物湯牛黃膏傷寒熱病熱入血室宜柴胡地黃湯風寒血癥(一物及產後惡露不盡不和榮名一無熱下一云不致重便後蒸熱)血癥(一云產後惡露不盡)血多脉虛大宜芎歸調血飲惡露不盡(一云有塊作)腹痛四物湯加官桂蒲黃乳香沒茶血竭甘草傷飲食者宿消導感風寒者宿忤散蒸乳者乳必脹痛但煎去乳汁○柴胡四物湯柴胡生半各三戈川芎赤芍當歸黃芩各一戈人參半夏甘草各五分干三○牛黃膏朱砂麝香金各三戈牛黃二戈半牧丹皮二戈甘草一戈龍腦五分蚕化皂子大井水和下一丸○柴胡地黃湯柴胡生半各二戈人參半夏黃芩各一戈甘草五分干地一戈半為末付患處又四物湯○芎歸湯加柴胡或加白芷又芎歸湯加荊芥二戈○產後心腹腰脇痛產後心腹疼痛宜桃仁當歸散丸(桃仁當歸散丸桂心赤芍各五戈當歸桃仁沒藥各二戈半蚕虫水蛭並炒各三十枚為末醋糊丸豌豆大醋湯下三十丸(無蚕蛭代三稜莪朮)○產後嘔逆腹滿嘔吐由敗血入脾宜抵聖湯○抵聖湯赤芍半夏澤蘭葉人參陳皮各一戈半甘草五分干姜○產後淋瀝遺尿產理不順致傷遺尿宜豬脬湯(小便不致傷而遺尿不禁宜黃芪芍藥湯)產後淋澁宜導赤湯去白朮尺角加白茅根為君佐以蒲黃灯心(小便)○黃芪芍藥湯黃芪當歸尾白芍各一戈半白朮一戈人參陳皮各五分甘草三分○產後泄痢泄瀉宜(的)奇散痢疾四物湯加桃仁黃連木香泄痢並宜當歸芍藥湯○的奇散荊芥於器內燃火燒存性勿犯油火入麝香小許為末白各一戈半熟半陳皮一戈甘草五分糯米百粒干(一云乳汁)○治渴一方月經水飲之(一云乳汁詳見乳門)○產後陰大脫回勞力太過若脫肛狀逼迫腫痛清水續之小便淋露宜當歸黃芪飲外用硫黃烏賊魚骨各五戈五倍子二戈半為末付患處又四物湯加龍骨(無則代以五倍子)連用數貼外以香油洗患處又香油煎熱熏洗患處為末糝之○當歸黃芪飲黃芪酒炒三戈人參當歸升麻各二戈甘草一戈月三服(一云孕婦有香消孔干一名陳去皮不妨)○孕月產後亡血津液肩不醒移時方悟喎鼻令喫服白薇湯救急(一云孕婦有香消孔干一名陳去皮不妨)○產後風痙產後中風口噤搐搦宜歸荊湯及張涎潮為痙宜豆淋酒產後痙血氣大虛不宜發表但用防風當歸散(風門)又八物湯(虛勞)加減用為可又曰產後汗多風入成痙者難治○敗荊湯荊芥穗微炒當歸等分為末豆淋酒調下三戈(一云豆淋酒黑豆一升炒熟乘熱投三升清酒中蚕封隨量飲)○產後頭痛發熱身痛頭疼不可作外感治之多由血虛或敗血作梗四物湯加柴胡或加白芷又芎歸湯加荊芥二戈○產後心腹腰脇痛產後心腹疼痛全是瘀血宜失笑散產後惡露斷絕腰腹疼痛宜桃桂當歸丸(桃桂當歸丸桂心赤芍各五戈當歸桃仁沒藥各二戈半蚕虫水蛭並炒各三十枚為末醋糊丸豌豆大醋湯下三十九(無蚕蛭代以三稜莪朮)○產後嘔逆腹滿嘔吐由敗血入脾宜抵聖湯○抵聖湯赤芍半夏澤蘭葉人參陳皮各一戈半甘草五分干姜○產後淋瀝遺尿產理不順致傷遺尿宜豬脬湯(小便不致傷而遺尿不禁宜黃芪芍藥湯)產後淋澁宜導赤湯去白朮尺角加白茅根為君佐以蒲黃灯心(小便)○黃芪芍藥湯黃芪當歸尾白芍各一戈半白朮一戈人參陳皮各五分甘草三分○產後泄痢泄瀉宜(的)奇散痢疾四物湯加桃仁黃連木香泄痢並宜當歸芍藥湯○的奇散荊芥於器內燃火燒存性勿犯油火入麝香小許為末白

湯調下一戈〇産後大便秘結血虛汗多致亡津胃燥故大便秘結宜蘇麻粥便大又麥芽末酒調下二合〇産後浮腫由敗血循經流入化水宜五味白朮散風水腫宜澤蘭散〇五味白朮散白朮三戈陳皮一戈半木通川芎赤芍各一戈〇澤蘭散澤蘭防已芍分為末温酒或醋湯調下二戈〇産後吉凶脉沈小者生實大強急者死〇産後調治先逐瘀滯次當大補氣血宜補虛湯切忌汗下〇補虛湯人參白朮各一戈半當歸川芎黃芪陳皮各一戈甘草七分干三熟〇産後虛勞産後過傷於饑飽勞倦七情而生病謂之血虛宜補之輕倍加茯令熱重加酒芩熱甚加乾干焦炒引導入肝生血〇薄勞其病飲食不消寒熱往来盜汗往来發潟頭疼目暈乍起乍卧宜當歸羊肉湯〇當歸羊肉湯羊肉四兩當歸川芎黃芪各一兩二戈半生干一兩半水九盞煎至三盞分三服〇過月不産姙娠經月而漏胎症下血者胎雖不墮其氣亦虧多致逾月又有氣血不足胚胎難長或致逾月並宜大補氣血庶免後患八物湯勞加黃芪鹿角膠珠子四物湯加香附桃仁只角砂仁紫蘇煎服即産〇姙娠通治宜芎歸四物湯當歸芎藭散益母膏〇芎歸湯通治血分諸疾川芎當歸各五戈〇當歸芎藭散治心腹痛及泄利白芍二戈半川芎澤瀉各一戈當歸赤茯白朮各七分半〇益母膏通治姙娠諸疾魚毒催生死胎脆衣横逆産並可下之端午日益母草搗取汁熬炙膏每一大匙溫酒白湯化下〇婦人雜病氣盛於血時以無子産生諸病頭暈腸滿宜抑氣散虛勞宜滋陰百補丸滋血湯血虛心煩寒熱盜汗宜逍遥散加味逍遥散勞嗽無汗宜茯令補心湯門血勞嗽有汗宜滋陰至補湯〇抑氣散便香附四兩陳皮二兩茯神甘草各一兩為末白湯調下二戈〇滋陰百補丸四製香附末八兩脆製法見脆門益母草四兩當歸三兩川芎熟羊白朮各二兩白芍一兩半白茯人參玄胡索各一兩甘草五戈蜜丸梧子大溫酒白湯及醋湯下七十九〇滋血湯當歸白芍山茱黃芪熟羊各一戈半人參川芎白茯各七分〇逍遥散白朮白茯白芍柴胡當歸芍藥門各一戈甘草薄荷各五分干三〇加味逍遥散白朮白芍各一戈二分知母地骨皮當歸各一戈白茯麥門冬生羊各八分梔子黃柏各五分吉更甘草各三分〇滋陰至寶湯當歸白朮各一戈白茯陳皮知母貝母便香附地骨皮麥門白芍酒炒各八分柴胡薄荷甘草各五分干三〇寡婦師尼之病異乎妻妾獨陰鬱抑成病其症惡風體倦乍寒乍熱心煩時或自汗肝脉弦長出寸口宜柴胡抑肝湯或與鬼交神不守舍時痴笑泣宜伏神黃芪湯〇柴胡抑肝湯柴胡一戈半川芎當歸芍藥各一戈甘草各五分干三二戈青皮一戈半赤芍牧丹各一戈地骨皮便香附梔子蒼术各一戈白茯陳皮知母貝母便香附地骨皮麥門白芍酒炒各八分柴胡薄荷甘草各五分干三〇寡婦師尼之病異乎妻妾獨陰鬱抑成病其症惡風體倦乍寒乍熱心煩時或自汗肝脉弦長出寸口宜柴胡抑肝湯或與鬼交神不守舍時痴笑泣宜伏神黃芪湯〇柴胡抑肝湯柴胡一戈半川芎當歸芍藥各一戈甘草各五分干三二戈青皮一戈半赤芍牧丹各一戈地骨皮便香附梔子蒼术各七分川芎神曲各五分生茱連翹各三分甘草二分〇伏神黃芪湯伏神羌活蔓荊子防風薏苡仁黃芪五味子麥門石菖蒲黃芩各一戈甘草五分〇臟燥症婦人臟燥悲傷欲哭欲欠伸如神明所作宜甘麥大棗湯〇甘麥大棗湯甘草一兩小麥三合大棗七枚水二升煎半服〇小兒初生救急〇氣欲絶不能啼必是難産或胎寒所致急以綿絮包置依中勿斷臍帶作大紙撚蘸油点火於臍帶上熏之令火氣入腹更以熱醋湯浸洗臍帶待氣回啼哭方可斷臍〇面青身冷口噤牙脆寒也用白干姜木香官桂陳皮檳榔炙甘草各五分水煎取汁以綿蘸入兒口〇有即死者急看兒口中懸雍前膀上有泡如石榴子以指摘破出血以帛拭去糝以髮灰若惡血入喉則即死〇忽患撮口不飲乳百難一生急看兒齒齦上有小泡如粟米針摘出血或指爪掻破点生蜜又牛黃一分以竹瀝調灌口中〇穀道無孔急用銀玉釵火煮其的處穿孔

初生兒惡風發驚搐搦有時作驚氣寒色青用仁冬一二分磨溫水服下熏之令火氣入腹更以熱醋湯浸洗臍帶待氣回啼哭方可斷臍

以油紙撚紐之不令弄合〇嘔吐不能飲乳乃穢惡入口木果生干煎湯灌口中〇大小便不通腹脹氣欲絕葱白汁乳汁各半調勻抹口中與乳吮下又葱尖紐入肛中〇小便不通急用地龍數条蜜炒許同研均付陰莖上又大葱白一根擣之以乳汁煎之灌口中〇口內白屑滿舌上不能吮乳急以亂髮纏指頭蘸薄荷汁或井華水拭淨合脫〇遍身無皮但是紅肉以米粉撲之〇遍身如水晶破即水流以蜜它僧為末糝之因磨灌蘇合丸〇鼻塞不通天南星為末干汁調貼顖門上〇外腎縮入取硫黃吳茱萸各五戔為末以大蒜汁調抹口中〇遍身蔌丹毒赤腫遊走若入腹必死以細微薰之〇蔌胎驚朱砂雄黃等分為末小許豬油汁調抹口中〇遍身蔌丹毒赤腫遊走若入腹必死以細針隨赤暈周匝刺出惡血因用赤小豆末和鷄子白塗之〇

單方大斧 治產後血瘕痛 伏龍肝 治難產橫逆產死胎燒赤研豆飲下水調下一二戔 **葱白** 安胎甘竹根 **苧根** 治難產及死胎不出取三升煮汁服 **榆白皮** 治同上服一二升臨月為末頻服易產 **葱白** 治產後惡露不盡喘促 **木綿花** 治下胞取一合調服 **韭白** 治產後痢疾羹飲佳 **醋** 治產後腹痛嘔吐脾胃去冷飲佳 **生栗** 治產後蔌熱腰腹痛並 **蛇床子** 治產後陰脫陰腫童便 治產後諸

益母草 治難產及死胎衣不下 **艾葉** 安胎止小腹痛 **醋** 治死胎不出取三升煮汁服 **雞子** 治難產及死胎衣不下 **麻子** 治難產取七枚去殼爛搗塗產母足心 **真油** 治下胞取一合調服 **熟煎服** 治產後蔌熱無汗三合 **粘米** 治產後蔌熱煩悶吐瀉胃虛去冷飲佳 **熊膽** 治同上取五分和清酒一盞溫服 **生栗** 治產後蔌熱腰腹痛並 **蛇床子** 治產後陰脫陰腫童便 治產後諸

疾酒半盞合而溫服
本產後行食之前

小兒 宇醫十丈夫 莫醫一小兒 蓋難問證難察脉故也

初生解毒纔生啼哭前急用軟帛裹指蘸黃連甘草煎汁拭去口中惡物以煉蜜朱砂末一字抹口令嚥又洗浴時用猪膽汁入汁洗之兒瘡疸之患〇初生救急詳見婦人〇 **寢蒸** 候度蒸氣血成就形體十處五蒸每期三十二日輕則

目閉不開 發熱微汗重則壯熱煩亂吐汗專類傷寒但耳冷尻冷為異耳宜以惺〻散微表之不治亦自愈〇繭病鬽病兒生月內不開臍臍或痢名曰繭病並宜伏翼蝙蝠燒末粥飲調下五分日四五或出血者慢研

水瀉之又熬肥 凡猪胆汁安研次又炙熟嗽哺亦可〇噤口撮口臍風症三症具是兒生百日內篤疾〇噤口者眼閉聲微吐沫不乳一名鵝口瘡

蒸米点之肉服白屑滿口舌上如粟用乱髮纏指蘸井水拭去即安如不脫用朱磩散〇 撮口者氣喘聲微口撮如囊血強妨乳

四物加天花粉 急者齒齦上有小泡如粟以枯礬破点審其上自安 治見婦人門小兒救急

甘草 不愈宜宣風散噤口不開南星末一戔兒腦小許研調干汁擦兒齒上立開〇臍風者斷臍後為風濕所乘臍腫突起喘急脹滿甚則蔌搐口噤撮口宜宣風散以至臍腫瘡者枯白礬末煆龍骨末皆可糝之或油調付之又疼硬者田螺三介榴爛入麝香小許搭付其痛立止〇朱礬散朱砂枯白礬等分為末附口舌上日三〇宣風散全蝎二十一介酒炒為末入麝者一字和均温水調下半字〇客忤中惡客忤者忽瞤非常之物或經神祠之傍以致相忤吐沫下水腹痛反側或瘈瘲似癎但

中惡挑虫作法 安息香燒末棗膏搜水調服 **又葱白納肛門及眼不上竄為異急看縣雍左右有小核即刺潰之用醋灰皂角燒烟熏之干湯調下蘇合元無核即只灌蘇合元**

客忤釜底煤中悪者猝然心腹刺痛惘乱欲死極灌蘇合元或觸馬鳴馬汗驚忤者取馬尾烟熏兒面〇夜啼四症一寒

未分和水等如鷄子大貼囟頂 及手足心又李宜導赤散五臟加黃芩口瘡重舌則口到乳上則啼急〻審看頻治之客忤則日驚夜啼必甚宜抱龍丸蘇合之

葉煮湯洗浴 〇冬月慢驚暴啼瘈瘲急噤四支沉冷乳香細研和温水灌下急搐白炒為付臍風之四症

分為麝末各一戈入干召煎〇黃連飲人參二戈黃連一戈半甘草炙五分竹葉十斤干一斤煎下隨量飲〇五臟虛實症虛則補其母實則瀉其子〇心主驚實驚悸吐哭笑熱飲水宜瀉心湯導赤散二方五臟虛則困卧悸動宜生犀散〇肝主風實則目直項急咬牙驚乱宜瀉青丸五臟虛則咬牙呵欠不搐宜六味地黃元五臟〇脾主

中風口噤
天南星末以手指浸水点漱擦困實則困卧厥食煩渴或泄宜瀉黃散五臟虛則吐瀉生風宜白术散〇肺主喘實則喘嗽氣盛宜瀉白散五臟虛則左右牙龈

氣短唇白宜先服益黃散後用補肺湯二方五臟〇腎主虛有虛無實視瞳無光骨體重墮宜六味地黃元五臟驚風諸症總論氣怯神散有熱有疾生驚生風以至手足搐腎制手身反眼竄凡實熱屬陽為急驚治用涼藥虛熱屬陰為慢驚治用温藥又曰身熱力大宜急驚身冷力小為慢驚仆地作聲醒時吐沫為癇頭目仰視為天吊角弓反張風為痙治各不同〇胎驚肝風初生搐制手身直口禁眼斜延潮宜鎮驚散抱龍丸〇

鎮驚散朱砂牛黃麝香各小許同研搐乳汁調稀抹口入令嚥〇急慢風內由實熱外挾風邪或因聞大聲見怪物驚於土熱牛黃末各小許灌之又取汁灌鼻取汁又制汁灌口九四五次之後又灌油和半砂延潮宜視反張搐制手治法不宜把捏用半夏末一戈見角末一戈調勻取豆小許吹入鼻中宜化灌瀉青九睡鎮肝九疾盛以下二之三之多三之少之甘水煮下九初生嘗驚身脈搐搦朱砂牛黃半分末小兒猪乳調抹口牛胆汁者四五次直抱龍九氣壅宜蘇合元通宜牛黃抱龍九小兒清心九內無驚但不勝外感以致搐掣身反邪視而牙開不緊口無疾延者為天吊角弓反張風為痙治各不同〇胎驚肝風初生搐制手身直口禁眼斜延潮宜鎮驚散抱龍九〇

鎮驚散朱砂牛黃麝香各小許同研搐乳汁調稀抹口入令嚥〇急慢風內由實熱外挾風邪或因聞大聲見怪物驚於土熱牛黃末各小許灌之又取汁灌鼻取汁又制汁灌口九四五次之後又灌油和半砂延潮宜視反張搐制手治法不宜把捏用半夏末一戈見角末一戈調勻取豆小許吹入鼻中宜化灌瀉青九睡鎮肝九疾盛以下二之三之多三之少之甘水煮下九初生嘗驚身脈搐搦朱砂牛黃半分末小兒猪乳調抹口牛胆汁者四五次直抱龍九氣壅宜蘇合元通宜牛黃抱龍九小兒清心九內無驚但不勝外感以致搐掣身反邪視而牙開不緊口無疾延者宜人蔘羌活散〇鎮肝九天竺黃乾羊當歸竹葉草龍胆川芎大黃煨羌活防風各二戈半麝九炙庶大砂碾水化下〇抱龍九疾熱驚風四症之聖藥膽製南星一兩無疾星則挫炒熟用天竺黃五戈雄黃朱砂各二戈羊麝香一戈為末甘草煎膏九芡庶大温水化下百日內兒一九作三次服一二歲一九五六歲一二九〇不治症眼睛翻轉口中出血足跳腹動忽大叫摸空

搐蘇不嚏皆不治〇慢驚風得於大病之餘吐瀉之後及過服涼藥其症眼慢騰一時或露睛上視手足瘈瘲渾身清冷默不聲蓋脾虛生風之盛筋惡宜白术散蓋黃散觀音散參术半夏湯吐瀉無作漸成慢驚釀乳方醒脾散逐盛南星散〇白术散葛根二戈人參白术白茯术香藿香甘草各一戈鹿末二戈煎服泄瀉加山藥白扁豆南豆炙已成慢驚加天麻細辛全蝎白附子〇蓋黃散黃芪二戈人參陳安各一戈白芍七分生甘草炙甘草各五分白茯四分黃連二分鹿末煎時入服或加防風冬瓜仁瀉滑青色宜防驚此藥主之〇觀音散人參一戈連肉神曲各三分白茯一分半白术黃芪木香白扁豆甘草各一分藿香三葉干二召一加羌活防風天麻全蝎名曰全蝎觀音散〇參术半夏湯宜母子俱服人參白术各二戈半夏天麻各七分白茯陳安各五分細辛薄荷甘草各二分全蝎三枚干三〇釀乳方人參木香藿香沈香陳安神曲麥芽各一戈丁香五分干五召三紫蘇五葉乳母食後去乳汁盡方服藥仰卧小時令兒吃不可過飽如吐瀉止更宜截風宜醒脾散之類〇醒脾散人參白术白茯白附子白干蜈天麻木香甘草各五分全蝎一分半鹿末干召煎徹服〇南星飲大南星一介炒赤冬瓜仁白扁豆干炒各三戈為末每二戈防風小許煎服〇不治證眼睛不轉口噤氣冷延鳴脇動哭如鴉聲〇急慢驚風通治宜牛黃抱龍丸千金散〇牛黃抱龍丸上抱龍丸加真珠琥珀各一戈牛黃五分金箔十片製法服法同〇千金散黃連天麻朱砂各四分全蝎白干蜈各三分胆南星甘草各二分牛黃龍腦各六里為末每五七里薄荷燈心湯調下〇慢脾風自慢驚傳變漸至脾困氣之真状眼合不開手足微掣手不收渾身或冷或温面青額汗其危如燈無油漸見昏滅急用補脾益真湯救之全蝎觀音散

上觀音散加味亦可○補脾益真湯丁香木香陳皮訶子皮厚朴草果肉豆蔻白茯苓人蔘白朮桂皮桂枝半夏附子炮甘草炙各二分全蝎炒一介半二百一煎灌服訖手揉心下以助藥力○不治症身冷粘汗唇縮涎鳴爪甲青黑四肢垂頼背直口噤疾如牽掣之聲○角弓反張鴨跖瘛疭疾驚風與驚風同症但天吊發時頭目仰視如魚之上鉤故亦曰天鉤兒觸氣而發甚則爪甲亦青宜薄荷合元多由乳母過食骨末詳調即沉遲弦細搖頭露眼口噤牙關項強背反張如痓痌終日不省柔症有汗身軟理中陽附症無汗身訂治詳面帶紫色陽亦見驚風之類而身軟時醒者為驚痌身反如牙不時醒者為痓痙十無一生見風門或先服烏茱萄上氣散風麻黃當歸湯大陽發熱無汗惡寒為柔各三錢一方加乳香五分蓋稍七枚一合薑五片煎服

慢驚成痌至寶來位丹壹薄荷湯下一二九

地依拜醒時吐涎沫急慢驚者不依拜不吐沫痌之症形卒仆目症流涎搐搦脊亂惡吐過汲惺治法雖以驚風食三種陰陽二訂別而治之驚痌者恐怖積驚而發啼叫悲悔宜定魄丸風痌風邪外襲先屈手指而發宜追風祛疾丸神門食痌者乳食時過驚停積或成癖或大便酸臭宜榮霜丸始也身熱搐掣啼叫是為陽痌易治宜龍腦安神丸神門○乏睨丸入蓋茯神琥珀遠志朱砂天麻菖蒲天門冬酸吾仁甘草木分廣丸皂子大朱砂為衣燈心薄荷湯化下一丸○榮霜丸代赭石醋淬七次赤石脂各一兩巴豆三十粒去油杏仁五十介去皮尖泥同搗爛入蜜小許拌勻野葛月內兒麻子大一粒乳汁和下百日內眼小豆大一方石無赤○肥甘不節以致脾胃受傷氣血虛億其症皮急髮焦眼暗鼻乾睿痛體重消渴自汗腹脹泄痢時作潮熱或生瘡瘍小便如油愛喫炙果酸醎土炭生米多飲水者是也初病者宜瘦冷痌當分治而五脾痌病各異一曰肝痌亦風痌眼暗筋青積聚泄痢二曰心痌亦名驚痌口瘡吐痢壯熱虛驚三曰脾痌亦名食痌面黃腹脹愛喫土炭四曰肺

痌咳嗽氣逆寒熱泄痢五曰腎痌亦名走馬牙痌齒齦腐爛腦熱下痢五痌通用消痌丸肥兒丸乾痌心痌吉乾肝痌啼乾脾痌乾痌通用連胆丸○消痌丸蒼术陳皮厚朴枳角枳朮神曲山查麥芽三稜蓬术並煨砂仁茯苓黃連炒胡黃連蕪荑使君子芦薈各等分蒸餅丸彈子大米飲下一丸○連胆丸黃連五戈猪胆汁調胎惠處宜龍胆丸○胥痌虫蝕脊膂鼓鳴宜芦薈丸肥兒丸○走馬痌即腎痌亦名急痌多因痘後餘毒攻注口齒腐爛唇紫吐蛔宜下虫丸○腦痌臭痒髮穗頭瘡額腫用生附子天南星為末醋調貼患

風赤茯苓薤油髮灰青代黃連等分猪胆汁浸糕丸麻子大薄荷紫蘇湯下二十丸〇芦薈丸草龍胆黃連
燕麦各一両先炒燕麦黃連次入二味同炒赤色為末另入芦薈末二戈半餅丸黍米大一歲十丸二歲二十丸米飲下〇立
效散青代黃柏枯白礬五味子各一戈為末先以米汁嗽口糝之〇十全丹陳皮青皮蓬朮川芎五灵脂白豆久柿即芦薈各
五戈木香使君子蝦蟆灰各三戈猪胆浸糕丸麻子大米飲下二三十丸〇洗肺瘡蘇甘草黃柏馬鞭草如益母草而葉圓葱白
荆芥穗煎湯温洗後訶子燒灰入麝香輕粉各小許糝之〇諸府通治宜肥兒丸消府丸〇肥兒丸胡黃連五戈使君
子肉四戈半人參黃連干炒四戈神曲麥芽並炒山查肉各三戈半人參黃連干炒四戈神曲麥芽並炒山查肉各
二戈半黃末糊丸粟豆大米飲下二三十丸〇疳眼崔目或医膜不見物或流澁宜煮肝丸〇煮肝丸夜明砂青蝦粉載精
草等分為末小兒一戈七歲以上三戈猪肝大一斤批開糝蘇麻練縛之米泔米椀猪肝熟取出傾泔椀内薰眼取肝分
三次嚼即訖以肝汁送下一日三服〇諸熱小兒熱症六散署門即妙蘇也通用小兒清心丸天乙丸驚熱痘熱寢蒸熱府熱
丹毒熱五症見上見下〇肝熱尋衣捻物左腮赤宜瀉青丸五莊〇心熱口氣熱眼上窩額赤宜導赤散五藏〇脾熱肚大嗜卧飲
水鼻赤宜瀉黃散五自熱夜甚藏〇腎熱畏明眼下窩額赤宜地黃元五花六味地黃元〇潮熱
每發如期遲時還止宜用通心飲梨漿飲〇胎熱胎中受熱面赤眼閉便秘尿黃宜釀乳方〇骨蒸熱體瘦唇乾吐痰苦煩
心熱盜汗宜地仙散大門生犀散〇疾熱身熱咳喘宜抱龍丸〇瘧熱一日一發寒熱往来宜梨漿飲〇風寒熱發
熱鼻塞宜入參羌活散〇實熱身熱飲水大小便如常宜地骨病後者頻日數三次蒸然不渴自汗困倦不飲乳
皮散〇梨漿飲青蒿便炒晒柴胡人參黃芩前胡秦艽甘草各二分生梨一斤薄荷二葉生羊一寸〇釀乳方
羊一戈半猪苓赤茯茵蔯天花粉甘草各一戈乳母食淡煎服〇生犀散犀角地骨皮赤芍柴胡乾葛甘草各三分鹿末八
薄荷五葉〇人參羌活散羌活柴胡前胡松角吉更人參赤茯甘草川芎各二分天麻地骨皮各一分薄荷三葉〇地
骨皮散知母半夏柴胡人參地骨皮赤茯甘草各三分鹿末一錢七分滑石猪苓各二戈半澤瀉三戈人參一両煎膏丸櫻桃大朱砂為衣金箔裹之以灯心麥門冬或薄荷湯和下丸〇
二戈金箔三十片蜜丸梧子大竹瀝化下二三丸〇天乙丸利水散火通治諸熱無治吐瀉灯心為末入于水取浮二戈半赤伏白伏二神
通心飲連翹木通瞿麥梔子黃芩甘草各四分灯心麥門冬小許〇積癖由乳食不消停辟胠下或中腹痞熱飲水每發
如期或腹滿洩痢口逆治當消磨宜消食丸柴胡丸〇
曲糊丸麻子大一歲取三二丸米飲吞下〇止瀉三法黃傷熟乳
五靈散癎傷冷乳及寒月吐瀉身冷宜益黃散〇消食丸香附子炒五戈砂仁陳皮三稜莪朮神曲麥芽各二戈半神
不止宜木瓜丸吐瀉食耗霧晴者胃虛熟也宜白木散不露晴者胃實熱也宜益元散署門吐瀉久欲成慢驚宜白木散益黃散
二丸至五丸〇木瓜丸豬木香木香檢郎臘粉各一字糊糊丸黍米大甘草湯化下一丸〇和胃丸丁香白朮各一両半夏五戈藿香
竭尾各一戈右糊丸粟豆大一歲兒干湯化下十丸〇感冒風寒熱頭痛身疼咳嗽噴嚏宜入羌活散惺惺散微煎飲〇

喔ㇾ散人參白朮白茯吉更川芎白芍瓜蒌根甘草各二分半細末薄荷各一分半二〇疾遲喘嗽疾厉風凿火靜則伏於脾火動則壅於肺疾大交作咳嗽喘急宜瀉白散五莊合導痰湯疾飲寒嗽宜華蓋散咳嗽熱疾宜清金降火湯嗽疾遲澁碍咽喉宜抱龍丸肺脹喘渴臭張遲潮死在朝夕宜牛黃奪命散〇牛黃奪命散白丑黑丑並半生半炒取頭末各五戈大黃一兩棋即二戈半木香一戈半為末入輕粉一字每一戈或二戈蜜水調下〇泄痢府痢府瀉見上利腳骨疼黃研車前末赤利宜黃芩芍藥湯大便白利宜益元散門暑溫六丸大便赤白利宜小駐車元大便虛滑宜固腸丸大便八利危症宜真人養臟湯大便血痢馬蘭莧取汁一合調蜜二匕痛如錐刺腹乳痛曲腰乳帰面青肢冷大便青滑為蠱腸內吊搗葱白熨臍腹仍用乳香散乳食傷腹痛宜消食散身冷水瀉宜理中湯門腹痛叫哭倒身溫涂時作時止是蛔厥宜安虫散腹脹者由脾胃虛氕攻作宜塌氕丸十全丹〇乳香散乳香沒藥各小許細研另取木香水磨一分煎數沸調乳沒末服〇消食散白朮壁土炒二戈半麥芽砂仁山查肉各一戈橘紅香附子神曲青皮各七分甘草五分麓末二戈千三煎〇安虫散胡粉炒黃棋即苦練根雷丸白礬半生半枯各二戈為末米飲調下三五分〇塌氣丸胡椒全蝎各四十九介稚糊丸粟米大米飲下五七丸至二十丸或加雞當子炒〇顏填顏陷並難治顏填者風熱上攻顏竅突起汗出髮短宜瀉青丸顏陷者血虛不能上交髓海顏陷如坑用黃狗頭骨炙為末雞子清調付顏上〇解顱腎氣不成頭縫不合宜六味地黃丸五莊或鹿茸外用南星炮末醋調塗緋帛上貼顏上炙手頻熨〇五連五硬並難治五軟者項軟天柱骨倒手軟無力以動脚軟見下行遲身軟肉削筋痿口軟見下語遲通用六味地黃丸五莊加鹿茸牛膝五味子從容之屬五硬者強直水冷宜烏梅順氣散風門〇語遲行遲語遲心神

不足舌本不通宜菖蒲丸行遲骨髓不充筋弱不束宜五加皮散六味地黃丸五莊加鹿茸牛膝五味子五加皮久服又有鶴膝二三尺者來食飲服取一二丸煮飲食下度已又食上好土漂淨研重煎取清汁日乾些服即止麥門遠志川芎當歸各二戈乳香朱砂各一戈蜜丸麻子大米飲下一二十丸一三服〇五加皮散五加皮二戈半牛膝木果各一戈二分羊為末米飲調下一戈〇鬚不生蛰不生並宜六味地黃丸五莊加味服蛰不生取大鼠脊骨為末擦齦上日二服〇龜背龜胸又蛲者散

胥龜背者風入脊骨或咗太早背高如龜宜枳角丸旦取黿尿塗脊骨上黿胥者肺脏受熱胥脹如龜宜瀉白散五加臟加清凉中小腹按之如鼓者加大腹皮茯苓木通梔子清熱利小便門四順搏風乘之赤腫遊走自腹出四肢者易治自四肢入腹者難治所走之處急以細針刺出惡血納服犀角地黃湯血門四順清凉飲咽外用拔毒散咽水黃散泥胥之屬塗之又藍葉汁水中半之屬塗〇泥金胥蚯蚓糞一握焰硝半撮井水調付〇諸瘡遍身生瘡服犀角地黃湯血門外用父親熱尿雞羽蘸洗青代赤糝之面瘡猪脂頻塗之癩頭瘡用防風通聖散風門酒煎麓末煎一戈服三十貼又譯諸瘡當參治之凡口瘡重舌重腭咽痺通用牛黃散牛黃六腦腑砂各一分辰熟諸瘡遍身痒痛通用大連翹飲又當頻洗更宜青柳條煎荊芥夏東葉梘枝新枯各煎湯溫洗〇牛黃散牛黃六腦腑砂各一分辰砂雄黃青代各二分黃連黃柏各八分塩硝一戈半為末糝之〇大連翹飲甘草四分柴胡黃芩荊芥各三分連翹車前子瞿麥滑石惡實赤芍梔子木通當歸防風各二分蟬蛻二分半竹葉二斤灯心十莖〇滯顧口角流涎也胃冷者宜用半夏曲丁香白朮乾干陳皮煎服胃熱者用木通梔子連翹黃芩〇痘班疹由胎毒蓋旧胎毒藏本命門遇熱毒流行之年行發作〇稀痘方〇服朱

砂法朱砂水飛煉審調量兒大小溫水送下二三分痘出前後皆可服○兔紅九取臘月兔取血萬麥麪和之小加雄黃三四分使乳九菜豆大初生兒乳汁和下二三九一歲五七九三歲十五九○痘瘡預防法鄉隣有痘預服三豆飲油飲子兔紅

九○三豆飲赤豆黑豆菉豆各一升甘草五戔臙煮逐日飲汁喫豆○油飲子直麻油一升逐日飲之盡○痘瘡治法痘瘡發於肌肉陽明胃氣主之脾土溫和分胃氣隨暢決無隔仗之患又曰諸血不可驟祛宜輕解之盖痘瘡者無熱則不能起發宜

孕九時吐瀉并尾椎用溫平紫治之不可妄下及攻散○發熱三朝與傷寒相類但以呵欠噴嚏耳冷尻冷巨下冷睡中驚動木疹以辨痘瘡先作無妨自汗者無慮

兆○發熱似傷寒殊似未辨之前用升麻葛根湯參蘇飲二方裏門加味敗毒散之屬解表○熱盛驚搐為吉候用紅線散調加味六一

散表之疾拜者薄荷湯化下柁龍丸○發熱欲出痘時腰痛者急脈神解湯出汗以痛止為度免出腎痘○凡發表宜在紅点未显之

前○發熱吉凶痘發熱皆身無大熱腹宿痛或發驚三日後漸生紅点吉勿柔○發熱時面上有一斤胭脂色者凶發熱時腹大痛

腰如被杖者凶發熱一日遍身生点稠密如蚕種者凶○加味敗毒散柴胡前胡羌活柳活防風荊芥薄荷芎藭吉更川芎天麻地骨皮各

三分或加紫草蝉虎薄葉麻黃葱白汗之○紅線散全蝎麻黃荊芥穗天麻甘草各五分或加薄荷蝉虎紫草○加味六一散六一散陽門

一劑加辰砂五戔兒腦三分灯心湯及新汲水調下三五岁兒一戔十岁二戔○神解湯柴胡一戔半乾葛一戔麻黃白伏令升麻防風各八分

甘草五分一服不汗則再進○出痘三朝發熱一日行出痘者太重二日出痘者亦重柔發熱三日後乃出者輕四五日身涼始見痘

外用護眼膏○年壮皮厚者宜透肥湯○痘出而被風寒復入者宜加味四聖散決瘢散○一出腐如蚕種毒盛者宜

連翹升麻湯○頭面上忽生三五介或尺一介高大紫黑似疔似明珠淨者吉○齊出發黑宜惡候保元湯加紫草紅花蝉虎○痘出吉凶症出如栗米黍米或豆

烟保元湯加紫草紅花蝉虎解之痘出時忽紅斑如錦紋者六七日後必危急化毒湯加紅花黃芩升麻救之○消毒飲鼠粘子

二戔荊芥穗一戔甘草防風各五分或加出查酒芩紫草或化犀角磨汁充佳○化毒湯紫草葺一戔升麻甘草各五分糯米十五

粒○解毒防風湯防風一戔地骨皮黃芪白芍只壳荊芥穗鼠粘子各五分○鼠粘子湯地骨皮五分柴胡連翹黃芩各三分半鼠

粘子當歸甘草各二分半○透肥湯紫草白芍升麻各一戔糯米五十粒○加味四聖散紫草葺木通木香黃芪川芎人参甘草各

四分蝉退二分糯米百粒○決瘢散紫草葺蝉退人参白芍各六分木通三分半甘草二分半○連翹升麻湯即升麻葛根湯加連

翹○又方葡萄研酒飲令痘次出無生則用乾者○起脹三朝先出者先起後出者後起至五六日毒氣盛散於表須現虛症疫疱

治之○顴顬乃一身之主若顴上先脹者四肢必順顴上不脹者遍身不脹○上躰先脹下躰緩晚者順反此者逆○漿滯不行瘡

虽防黑陷○出盛身表熱急用鼠粘子湯表裡熱甚煩渴譫狂宜猪尾膏○出盛恐入眼為害消毒飲加酒炒芩連

外用護眼膏○年壮皮厚者宜透肥湯○痘出而被風寒復入者宜加味四聖散決瘢散○一出腐如蚕種毒盛者宜

連翹升麻湯○頭面上忽生三五介或尺一介高大紫黑似疔似明珠淨者吉○齊出發黑宜惡候保元湯加紫草紅花救之痘出時忽紅斑如錦紋者六七日後必危急化毒湯加紅花黃芩升麻救之○消毒飲鼠粘子

二戔荊芥穗一戔甘草防風各五分或加出查酒芩紫草或化犀角磨汁充佳○化毒湯紫草葺一戔升麻甘草各五分糯米十五

粒○解毒防風湯防風一戔地骨皮黃芪白芍只壳荊芥穗鼠粘子各五分○鼠粘子湯地骨皮五分柴胡連翹黃芩各三分半鼠

粘子當歸甘草各二分半○透肥湯紫草葺木通木香黃芪川芎人参甘草各

四分蝉退二分糯米百粒○決瘢散紫草葺蝉退人参白芍各六分木通三分半甘草二分半○連翹升麻湯即升麻葛根湯加連

翹○又方葡萄研酒飲令痘次出無生則用乾者○起脹三朝先出者先起後出者後起至五六日毒氣盛散於表須現虛症疫疱

治之○顴顬乃一身之主若顴上先脹者四肢必順顴上不脹者遍身不脹○上躰先脹下躰緩晚者順反此者逆○漿滯不行瘡

起脹頭湯保元湯加紫草紅花黃芩○凡起脹時毒盛在表須賴裡症無憂若或有瀉則內冷虛毒乘虛攻陷伏宜固真湯○起脹時有痘長大

加紫草紅花黃芩○凡起脹時毒盛在表須賴裡症無憂若或有瀉則內冷虛毒乘虛攻陷伏宜固真湯○起脹時有痘長大

紫黑色痘疔失治則危保元湯加鼠粘子荊芥酒炒黃連服外銀簪挑破疔頭以麵綿裹指捺去惡仍用雄黃末一戔調胭脂

汁點上〇起脹吉凶訂五六日頂滿碍指明潤紅潤沽者吉初不快出直待起脹時陸續出於空隙如粟米圓淨者吉也〇頂陷中黑鉢孔者凶頂陷不起腹脹不食氣促神昏者凶〇內托散人參黃芪鹽炒當歸酒洗厚朴吉更宜桂川芎防風白芷白芍甘草等分內托散加減法紅紫黑陷去桂加紫草茸紅花黃芩淡白厌黑陷伏加丁香當臚不膿倍參芪當歸煎入人乳好酒溫服佳〇毋酒煮絞酒毒飲能肥脹亦能補氣〇蕎麥粥糯

黑陷吐白沫米粥化砂磠飲并能善脹〇貫膿三朝氣血大振毒漿已滿將欲收斂之時也當結膿窠而不結者由血熱相薄毒氣灌注為表虛用米者散米者研必復入心宜猪尾膏〇飲食藥餌極忌寒涼疎淡之物若清氣下陷不能貫膿〇當貫膿之時外若起脹而中空無膿者不治若略有清水根窠紅活者可治內托散倍參芪當歸煎入好酒人乳溫服甚妙〇胃病則不能貫膿若簽吐瀉宜用人參五分丁香三五枚中湯〇七日壯熱毒盛氣弱聲啞宜解防風湯〇凡貫膿時宜食老鷄補之〇貫膿吉凶訂漿行疤裏肥滿黃色或黃練色者吉若色淡者凶虛也保元湯加乾干官桂糯米服頭面先回漿者吉〇收靨三朝漿老疤結如果熟蒂落如葡萄上越以黃生爛無膿肉黑則凶純是清水安薄如水泡搔破者凶乾枯如豆瓠者凶〇收靨吉凶訂疤落後瘢紅者吉白無血色者泡水自要遠圓之五止此時漿滿或為寒所凍一者異功散救之〇當靨不靨漿熟蒸用甘露回天飲〇收靨吉凶訂疤落後瘢紅者吉白無血色者時伴出漆黑如葡萄收不全後必有厄用消毒飲二貼緬用補劑防之乎〇一時盡黑非靨也乃大極攻裏凶陰囊及足先靨者凶遍身臭爛者凶〇氣弱不能起發出疸起脹貫膿頂陷不起俱水揚浴之〇保元湯人參二錢黃芪甘草各一錢干一〇一二日初出乾紅小潤加白芍一甘露回天飲砂磠屑半盞入百沸湯一椀調服〇通用治首尾以保元湯為主〇毒盛不出不起不膿不靨通用猪尾膏〇

錢當歸陳皮各五分玄參鼠粘子各七分〇二三日根窠雖圓而頂陷者加川芎官桂〇四五日根窠雖起而色不光澤兼一撮水盃加白芍官桂糯米〇五六日色甘紅紫加木香當歸川芎〇六七日不能成漿加官桂糯米〇七八日漿不滿加官桂糯米〇九日漿不回宜加糯米〇十二日不飲者加白朮白茯〇十三四五日毒雖盡解或有雜症以此藥隨症加減〇解毒疸疎

酸棗者保元則無毒盛則有毒急用涼藥解之離穀十貼不妨宜消毒飲加酒炒芩連紫草茸或加犀角磨汁〇初發如蛟蛟色或滿如芍藥色

研細末多多炒紫黑色宜猪尾膏〇毒攻腎狂譫或黑陷宜加味六一散〇凡疸疹毒氣壅盛或口舌生瘡宜加味犀角消毒飲〇

七令糯米舂加味犀角消毒飲鼠粘子一錢二分甘草五分防風升麻各三分剃芥麥門冬犀角屑吉更各二分〇辨疸吉凶疸初出淡水蘸

時讀法見兒兒目不看趁吉肢體不熱不寒溫和者吉耳眼臍中不出者吉乳食不減者吉不瀉不渴吉不瀉不渴吉反靨時忽瀉膿血並疝安者吉終始月宜水猪尾

淡紅黃綠色堅滿不陷伏者大吉〇顆粒全白者氣虛灰白者血衰鮮紅者血熱紫者大熱黑者毒滯血枯或三色相

茶污法雜名氣運氣虛品合者凶寒如蔴種地界不分前後手心足心胃寒亦出於耳眼臍中者並凶速出齊出者凶隨出隨沒者倒出倒起顴顬

泄瀉吐食、雲光散花供變壞者凶顆坑陷內無膿血者凶面有一点臙脂色者凶增寒壯熱咬牙痰喘嘔吐泄瀉煩渴痒塌口瘡聲嘶者並凶

見用回聖回天回生多多益善隨症治之〇照灯影看其顆粒紅活漿影深厚則雖重可治血死不活無漿影者雖輕不治白日亦用紙撚蘸麻油照

書回文多多益善石雄黃小豆之〇辨疸虛實自汗聲不出瘡頂陷為氣虛宜保元湯根窠不紅不澤灰白者為血虛四物湯加紫草紅花能食便

末二字閏竹或金有聲之方凡六畫為末退畫為未月沙丸指尾白加用冬附子為末蜜丸如芡實白殺之加白芍為丸白芍為末

里陷心煩狂躁
發見此症秘為裏實身熱無汗為表實表裏俱實顆粒起痛者涼膈散門加升麻葛根紫草荊芥解止吐瀉少食為裏虛
甲金芝蔴者
炒黑無毛者米身涼汗多為表虛表裏俱虛顆粒灰白異功散救之○保護飲食禁忌頻與乳食切忌風冷晏穢外入○能食淡
舌磨水入胃食為佳但貫膿時宜食老雞汁臛時宜食雉鴨豬肉○終始宜菉豆赤豆黑豆豬肉石魚廣魚鯽魚山蘇海松子葡
心見小汙內收不住食為佳但貫膿時宜食老雞汁臛時宜食雉鴨豬肉○終始宜菉豆赤豆黑豆豬肉石魚廣魚鯽魚山蘇海松子葡
收又為屋角
萄煨栗花蒜薤蔥白飯糯米粥泄瀉可禁蕎麥麵起脹可食毋酒同上砂糖○始終忌生冷油膩鹽醋葱蒜魚腥辛辣棗柿
羚羊角二味銷鎔及羊肉豬肝血雞鴨卵○釀乳法嬰兒未能服藥則乳母食後揑去宿乳服藥仰卧要時吮兒○俗法痘
瘡須水收又
入独犬豬條瘡膿伏或為風寒所克宜水揚湯浴之免皮煎湯豬肉煮湯並佳○水楊湯楊柳五斤春冬用枝夏秋用葉洗辟
膿晨後汗盛水洞下回
生起元
辟穢胡荽酒
血疹中及衣蒼术細辛甘松川芎乳香降真香等分鹿末焚之○痘瘡諸症元二十一條○聲音首尾失聲者身温則宜解
被又忌木猪
歸甲乳香毒毒防風湯身浮則內托散陷吉更○咽喉痛咽痛口爛宜如聖飲咽喉痛飲食如鉅堅碍或嘔吐者危惟黃
之
眼脫生翳鬼膿時見此症二便閉者反吉○如聖飲麥門冬吉更各一戈鼠粘子甘草各五分竹葉三片○腰腹痛發熱出痘時
屋漏濕处又腰痛宜用神解散取汗免出腎痘○出痘時腹痛蓋痘在腸胃中出宜升麻葛根湯寒門○收靨時腹痛由熱毒
妙角蜜煎
花木香少許凝滯宜手捻散○凡發熱時腰腹太痛者危○手捻散鼠粘子白芍大黃桃仁各六分紅花四分桂枝二分半○驚搐
皂和塵少許
么拳之倒睫發熱時驚搐非驚風即例症宜用發散兼紅線散加薄荷紫草茸蟬壳葱白○痘出厥若驚搐宜瀉青化莊導
用淨血豹毒清胃之劑

赤散五莊熱毒內熾陷伏發搐宜龍腦膏子先驚後痘者輕呅痘後驚者重○嘔吐痘瘡初出時吐瀉無妨痘出後忌
之○吐瀉宜空中湯○寒甚腹痛吐瀉宜理中湯門寒加木香丁香肉豆久○空中湯真黃土一塊浸沸湯取汁摊黃赤茯苓朱
砂五分調砂糖温服○泄瀉痘出後大忌泄瀉起脹尤忌急用保元湯加肉桂白芍又宜固真湯○痘靨之時泄瀉寒戰
足冷過膝表裏俱虛宜木香散異功散○固真湯黃芪人參白朮白茯白芍炒木香陳皮訶子皮肉豆久煨甘草矣各三分糯
米五十立○異功散木香當歸各三分半桂皮白朮白茯各三分陳皮厚朴人參肉豆久丁香各二分半附子炮半夏各一分半干三召
二○疾喘附咳逆咳嗽痘出後疾喘宜前胡只角湯黑豆疾盛宜花龍丸○咳逆以真黃土熬邊聞之止○咳嗽宜如聖
飲加前胡甚者喘急難治○前胡只角湯前朝只角大黃赤茯甘草各六分○煩渴津液枯渴也保元湯加麥門冬五味
子又用紅花子鼠粘子同煎服又宜烏梅湯大渴宜空中湯渴飲水尿小宜益元散門○泄瀉煩渴足冷宜木香散○木香散丁香
忌冷水○烏梅湯黑豆菜豆一合烏梅三个○腹脹毒陷腹脹回生散酒調下三五分傷冷虛脹宜木香散○木香散丁香
木香桂皮陳皮半夏赤茯人參訶子皮大腹皮前胡甘草各三分干三○自汗初發自汗不妨痘出後忌汗多又難膿靨
急用保元湯止之○痛痒痒者由血不榮肌宜水陽湯浴之又敗草散糝之又鹽和百草霜水拌略抄燒烟薰之回虛發痒
遍身瓜破宜內托散去桂加白芷當歸木香回糝蕎麥粉○痛者痘之善症初出時宜參蘇飲門寒消毒飲將靨硬痛
宜塗酥油潤之○斑爛毒盛表虛易靨肌肉壞爛名曰斑爛敗草散糝之又黃土細末糝之又新瓦研細付患處絹包之加
乾則鴨卵清調付之○觸穢斑爛宜內托散外用辟穢散焚之○暑月痘爛江帶葉柳枝鋪地卧之以水楊湯浴之

敗草散多年壅屋上爛草晒末糝之若遍癢則鋪其末於席上令畦卧○寒戰氣虛保元湯加桂血虛保元湯加芎歸不靨泄瀉異功散○黑陷又寒戰難治○咬牙黑陷口噤咬牙宜宣風散○失血熱盛吐衄便衆諸失血並宜犀角地黃湯血門○尿澁宜通寸赤散五淋紫草木通湯○紫草木通湯紫草茸木通各一分人參赤茯苓各四分甘草二分○便秘三四日不便為秘雖云痘疹不可下若有裏症及便秘者安得不下當九四順清凉飲門又遞用之又用導便法便門又猪肉食之○當歸龙當歸五錢甘草二錢半黃連大黃各一錢半為末先將當歸熬膏入三味和丸桑豆大米飲五七丸漸加以利為度○倒靨不出不起不膿不靨通謂之陷伏倒靨內傷氣虛而不能起發曰陷伏宜內托散保元湯參蔵及鬲蔵而不能起發曰倒靨外感者調解散鬲蔵辟穢散熬之痘出不快倒靨宜加味四聖散通用水楊湯洗○調解散青皮陳皮吉更只角當歸紫蘇半夏川芎紫草茸木通乾葛甘草各三分人參一分半干三召二○黑陷痘瘡不過陷伏倒靨黑陷斑爛四者而黑陷最危○黑陷毒气入裏心神閉昏宜猪尾膏甚至狂亂气喘宜回生散龍腦膏子加味六一散寒戰咬牙喘脹便澁宜宣風散○凡黑陷加味四聖散麻黃湯皆逶用○外治用胡安酒噴身○鬲蔵辟穢散○猪尾膏龍腦一戈取小猪尾尖血和丸小豆大淡酒紫草煎湯化下熱盛井水化下○宣風散黑丑頭末三錢半生半炒陳皮甘草各五分桃即七分為末二三歲兒用五分四五歲兒用一錢○回生散用人落齒煅研為末淡酒或紫草湯調下三五戈○龍腦膏子梅花腦子一戈研末滴猪心血為丸小豆大井水或紫草湯淡酒化下一丸○麻黃湯治倒靨黑陷麻黃去節五錢煎沸去上沫再煎至三分之一去滓乘熱服○一方牛黃清心丸風井水調下○護眼痘瘡成上淡宜消毒飲加酒炒芩連桑

疹三四日不消身大熱具以散解為主而二便秘澁則升麻葛根湯加石膏黃芩二便麻黃湯○疹出三日不消者內有虛熱宜四物湯渴加犀角麥門嗽加於薑痰加貝母陳皮失血加犀角○紅疹雜症○潮熱初痛時升麻葛根湯加蘇葉葱白出汗後上方加黃芩地骨皮消後上方加黃連○煩燥初痛時升麻葛根湯加蘇葉葱白出汗後黃連解毒湯寒門加白虎湯寒門消後上方加麥門冬地骨皮連解毒湯寒門調辰砂益元散服消後灯芯煎湯調辰益元散加吉更地骨皮消後上方加吉更地骨皮五味子○喘急先熱簇喘三柳湯咳嗽加煆石膏○咽喉痛吉更湯加云參牛旁子即鼠粘子○聲啞吉更湯加防風白芍炒只角玄參訶子○吐瀉寒門○嘔吐五灵散門寒加化班湯乾嘔五灵散加竹茹夏加黃連干炒○泄瀉初痛時無妨泄瀉當分新舊寒熱治之初則熱也四苓散五苓散去桂也隨症加減用之久而虛者及傷生冷者宜香砂理中湯然絕無寒泄宜毒治之○食積泄來穀不化是也三白湯大便加陳皮神曲山查肉砂仁黃連○吐瀉並作宜清心九蘇合元之類用五灵散煎湯化下勿宜輕用豆叉冰香乾干○赤白痢黃連解毒湯寒門加便香炒山梔消後涼膈散熱門加山梔犀角通用犀角地黃湯血門又方血竭五灵脂百草霜並為末白茅根煎湯調下○便血初痛升麻葛根湯合犀角地黃湯血門出汗後黃連解毒湯寒門加犀角地黃湯消後上方加白芍酒炒○疹顆未出時面先青黑者急用內托消毒飲○尿血初痛時升麻葛根湯加木通消後五苓散加車前子木通○煩渴宜葱白湯甚者化班湯○消後餘熱不退神朮諸妄宜升麻葛根湯或消毒飲○消後飲食不進

四物湯加神曲麥芽砂仁〇消後牙齒腐爛四物湯加升麻木通犀角使熱毒解小便下〇疹毒成瘡大連翹湯加鼠粘子防風金銀花〇痘厥出疹前後吐沫腹痛者虫乳也宜安蛔理中湯或苦練根湯又方使君子梹郎各一戔雄黃五分並為末用苦練煎湯調下又烏梅三五个單煎服凡忽有難扶之氣上衝胸脇延塞喘急不省人事者亦皆虫毒急治之此病多以飲食虫毒致敗當慎之〇虫症單用雄黃末烏梅調下五七分最佳〇孕婦紅疹初痛時四物湯倍白朮條芩入艾葉小許用三酌若胎氣上衝急以苧根艾葉煎湯調梹郎末服更以四物湯加芩禾絀用〇紅疹預防法鄉鄰有疹預服參蘇飲香蘇散寒門等屬調蘇合元二介服五六貼妙又連服四物湯妙又連進三豆飲妙預忌風寒水溼而靜攝可也〇麻黃湯麻黃二戔官桂甘草各一戔杏仁十介去皮炙炒黃〇吉更湯吉更三戔甘草一戔半〇化斑湯石古四戔知母玄參各一戔半甘草一戔糯米一撮〇香砂理中湯便香附砂仁人參白朮乾干炒甘草各一戔〇安蛔理中湯白朮白茯各一戔人參七分乾干炒五分烏梅二介川椒二十粒〇苦練根湯苦練根二戔赤茯令陳皮半夏各一戔川椒三十粒干三〇內托消毒散人參黃芪白芍白朮當歸白茯陳皮連翹金銀花白芷甘草各五分〇小兒單方〇白礬

治口瘡諸種拈末糝付 **伏龍肝** 治丹毒雜毒井水調塗 **蛙** 治熱瘡癰疽灰調酒水服 **蛭蚓糞** 治同上水和塗 **栗毛殼** 治同上煎湯洗 **蛇蛻** 治諸瘡瘍灰調酒水服 **蛙** 治熱瘡癰疽赤白非泄瀉矣食之 **葡萄** 治瘡疹不出之或研酒服 **乾柿** 治熱瘡癰疽秋痢和米食之 **梨** 治風熱咳嗽去核入蜜矣食 **脂麻** 治頭瘡敗瘍生瘡又治客熱取生油飲之 **赤小豆** 治丹毒敗毒和鷄子白塗之 **冬瓜仁** 服末服佳 **牛黃** 治驚風痰熱為末 **亂髮灰** 治諸瘡油調付 **夜明砂** 治諸瘡油調付 **露蜂房** 治赤白痢及大小便不通燒末和酒水飲之 **竹葉竹瀝** 治驚熱葉則煎飲并佳 **蟹** 治癰腫不全取蟹并白芷末搗爛貼腫上 **蟬殼** 治瘡瘍出疹瘡疹煎飲之 **蟋蟀** 治瘡瘍出疹瘡疹煎飲之 **牡鼠肉** 治諸瘡取肉炙食 **雄鼠糞** 治咳逆粒如麻子二十粒 **蝦** 治赤白遊疹丹毒取雪汁小蝦擦付

大豆汁塞水研灌之 **熊膽** 治用治虫又治用治瘡取大豆許和竹瀝服 **兔肉** 稀煎臘月取肉任意服之 **猪乳汁** 治驚癇天吊取乳三合綿浸入兒口入朱砂牛黃少許和鷄子白塗之 **猪胆汁** 治瘡瘍五倍子為末付之 **猪尿** 治瘡瘍以父尿洗後燒末油調塗之 **猪胆** 治丹毒入葱葉成水塗 **大棗** 治驚癎去核納白礬大豆許于棗中裹黃土泥如胡桃大煨于炭上伺爛取出浸于水中取棗時詞病兒 **雞卵** 治同上破一頭納陳曲末於卯中調勻以濕紙封破頭埋於大中伺熟飼病兒連三日妙 **雞屎** 治同上白為末蜜調詞病兒三四次好 **癲痴** 竹林閒刈竹聞其音心乃悟仙人引之音心乃悟消磨神效之耳

百病單方

〇瘰癧生瘡汁塗其核上則膿汁自流日久添乾作痂自落後亦擦汁又塗其則其核膿爛惡毒盡出即愈神效〇鶴虱風野茨菰也服則得效咬嚼亦好也〇眼疾蠡魚胆和乳入之則差〇火瘡馬蹄根汁塗之則最效〇痢疾粘米清甘水乾柿沈其水待甘服之則神效〇瓜菜所滯穢者散神效少壯則桂心五戔射香二分半老弱則桂心三戔射香五分之一調服也〇傷寒泄瀉仍為霍亂加吐理中湯神效房勞七日內皆用汗即神效〇養生明眼之方五月五日午時桑葉三百六十貫絲陰乾明年元日散煞一藥或連日洗眼則神效〇火瘡即塗川烏土明日塗時去其土死狗頭骨燒之作末真油和食塗之則神效〇咳嗽紅桃花暴乾作末溫水吞下則神效〇食滯泄瀉腹痛虛者則真油二匙醋二匙小兒則水一匙乳兒則水半匙沸煎之服則神效

○岑苎八湯頭則不通煎水調滑石苦硝小許服之則神效○點眼中則以鵝涎磨墨入之最效○胷中咳間有魚骨不下則鵝涎吞之趁效○晏含白醋一鍾子煎至二三匙塗之則痛消若在面部則日梳為好○瘰癧煆杜鵑花瓣醬生清三物交合塗之則神效又烏雞脛骨入砒霜燒灰而上三物交合塗之則神效○乳腫初痛時菊金銀花等分水煎服以其滓付患處即效草蒲公草亦可○疔腫葉一葉代指痛趁效○兩脇凝疾刺痛則胡朴一斤油炙貼之則去神效○肩脾痛桑葉妙香水煎日三服至一月得效肋痛尒效兼續明耳目○女膚間結疾核人切餅塗太末者一个炙令温摩核上久之消之○手足跌蹼而酸痛處以蕈麻子去壳炒大灼最酸處得效○小便淋渋車前草淨洗搗取汁一盞微温入窑小許空心服下○眼疾最赤痛唐黄連小許為末入生螺內小頃煎水入眼中○手足或因他病或跌蹼百節縮不伸木果枝煎服多取葉搗熨即效○小兒痂疥以蟾涂之又用鼠目太浸蟾尿晒乾而復浸如此三次每十五个或二十个空心鹽湯吞下○小兒蜈虫鼠鼠燒存性温酒調服或楮練根煎水調栀即末服之戋隨大小用之趁兒滞食杵糠一撮温水調服杵糠細乱末○小兒重舌蒲黄調竹瀝以鷄羽奎之○脚氣赤腫夏蓮草搗付之趁效○髮際南星為末醋調作餅付之則始終皆好也○口眼喎斜仆蓼根付之緩處木屐以蟾盛之病者桃之則效又鮎魚炙付之○遍頭風苦硝作末以竹管吹入痛邊鼻中○鼻瘡猪肉脂炙而温付之○小兒龜背甘遂末一戋入猪腰子妥吳内以練札定慢火煨熟空心細咋温消送下吐瀉大作以冷粥補之日後更作一次即伸

白安草龍胆服外用護眼膏胆脂膏○回瘀時眼腫不能開之以綿巾渫拭去膿膠以一点風則不致生瞖膜○護眼膏黄栢一両甘草四両紅花二両菉豆粉一両末為末油調泛耳前至両眼四畔厚塗之○胆脂膏乾胆脂蜜調塗而眼瞎○一方出痘時鼠粘子為末水調貼顙上痘不入眼○瘢瘕著痂時用蔓青子油頻々潤之真酥真油白蜜猪脂皆可潤之○痘後雜病愈後身痛或氣虚振搖宜保元湯○愈後身青口噤發搐由氣虚感風宜消風散頭○愈後搖目窜面赤疾盛宜抱龍丸○愈後餘瘡塞鼻宜木筆花散○愈後心痛宜乳香散○愈後失音宜天花散○愈後咽喉腫痛宜七味甘吉湯○痘後餘毒通用消毒飲三豆飲○木筆花散辛夷花為末加射香小許以葱白蘸入鼻中瘀次○乳香散乳香二戋水一盞煎服○天花散天花粉吉更白芨訶子乃昌蒲甘草等分為末用水調半匕在椀内外以小竹七莖黄荆七条縛作一束点火在椀内煎服一方為麁末煎服三三戋○揩牙散白梅肉燒存性白礬枯各二戋半人中白煆五戋研末先以韭根老茶煎水蘸淨刀先去爛處乃付鼻目三爛至喉中者用竹筒吹鼻○七味甘吏湯甘草吉更各五分防風玄參鼠粘子升麻射干各三分○痘後医瞙餘毒入眼生医瞙用瀉青丸五莊二三丸竹葉湯化砂礞化下微利○不宜點蒸逼毒反以為害但活血解毒自愈宜通明散免屎湯蜜蒙花散○通明散當歸川芎赤芍生芐防風乾葛甘菊天花粉蟬壳各二戋半夂精草五分○蜜蒙花散蜜蒙花青箱子草決明車前子等分為末每服二三钱肝搗丸彈子大乍煎湯化下二三九○免屎焙椒茶清調下一戋○點法痘後医忌點蒸

此最妙　魚門云東瑣下取血点目○痘後瘡瘍不腫
宜消毒湯○腫潰用雄黄散糝之○膿血不收用飲肌散○加落後膚乳癩癬苦痒塗猪油○消毒湯　赤芍連翹各
一戔甘草節吉更各五分貝母忍冬白芷花蕎根各三分○雄黄散雄黄一戔銅綠二戔為末糝之○飲肌散　即連黄湯
去五倍子甘草等分為末糝之○痘後痢疾下膿血痢宜薤白湯○薤白湯薤白切半盃豆豉一盃山梔子十枚去皮同煎七
滓飲○附孕婦痘瘡宜單胎散熟甚宜參蘇飲實稠蚤宜內托散倍芍藥當歸去木加香附烏藥胎動宜安胎飲○
單胎散赤茯白朮當歸赤芍柴胡乾葛人參吉更條芩防風陳皮荊芥只殼紫草阿膠川芎芍砂仁甘草各三分糯
米百粒薑一寸棕葉七个苦蒂一个砂鍋荷葉蓋覆煎服無荷葉則闕之○痲疹有色点而無顆粒曰班淳小有顆粒曰疹大如麻子故
芍便省付砂仁縮葉赤茯甘草各三分灯心七莖糯米百粒○痲
曰麻疹俗名曰紅疫又曰紅疹○紅疹專是肺瘍熱毒薰發皮膚
發之三日後消痂○治法與痘瘡大同○初痛時不可大寒只用升麻葛根湯調或加蘇葉葱白或加味敗毒散等
屬二三貼微表之但用葱白湯妙○始終用藥比之痘瘡尤凉當清金瀉火解風熱為主○過用凉劑則疾延虫毒挾
瘀欲拭温發則熱氣燥症益肆可不慎歟○始終切忌飲食酒肉魚腥生冷油膩等物○發疹紅滑者吉黑陷
者凶○瘀熱之時出表之後切忌風寒犯則毒閉黑陷急用消毒飲或麻黄湯○瘀疹色紅紫燥暗者火盛毒
盛宜四物湯去芎加酒芩紅花或六一散調○疹未快出色可，鴻泄神保宜保元湯　　或汝者意散

小兒痢疾百神湯一斗八黄土二升攪均蓋定取澄清水煮粥
時更取地龍數十条塩水洗淨同煮八布袋臨熟去布袋食之即效○痢疾老茶葉生干等分煎服恭云四
月分摘取蒸乾則是為黄茶猶勝於中國来者云琉玖○金刀傷盖水煮木麥糊付患處○火傷經霜桑葉焙為末
蜜水調塗或清油或温水調服○疥癬合摩散攪柳石流黄各一戔唐粳粉則二三分常粳粉則一分以真油調於掌上
入摩擦之令乾則即效○紫白癜風白附子石流黄各一戔醋調白癜用白茄帶紫癜用紫茄帶醜葉塗之則即效○
疔露塗之則亦好云○癮疹風只原煨熟即入清酒一盞畏風之良久徹温服之○流注疾煮鼠水温服即效○小兒慢
驚蚯蚓大者三條洗之竹瀝一碗煎取出蚯蚓更入清蜜轉温而飲之即效若勢急則暖於火上即服○男女陰腫以生苓蜜
點於所言口舌而真中即以十字點之則成濃流之即差○疾咳真油一両蜜一両生芋半両自然汁肩燔研子各二両入釘並至
黒如漆朝二匙空心服積年疾咳痰捲天如吐血疾則加入熟地黄三両作九童便吞下○孕婦治胎三个磨服則神效○
疳滯射香二分麝合九四五个磨服則神効○積年肉滯鼻小木水一椀並半三朝一鬱子式飲之則吐又漫瘡鼻小入並水
連日塗之則即效○又小兒胎癬及頭疹鼻小木白楊木及綿子出油塗之神效○解毒彌留数日則佛数散加柬附
生一戔連用三貼則雖死症即解○痢疾草鞋草一把一握式並服三次見效○乳癌初痛時赤豆並水服其痛付
根亦擂付之神效○楝法牛骨埋土若炙壓之則見效○髮際無豆疹出若雖好無則乾若水潤推付則神效○癮疹
白水服之又　之即愈○小兒重舌膏　草霜盖交合次　一　並冊木紅花赤分百入並入飲○蟹腹小兒止後

…研末調服則不… …細最輕之單… 乃…
炭存性酒調服之則效○引吐法治鉄毒巳引生栗細嚼付之復虜巳取末汁泥塗之浮氣處方效○霍亂四
関三里曲池百會九穴針刺苗香葉○痰多卫吳柿木根煮飲殿杞則疾根下作疾瘧者長飲則亦…
○小兒蚓腹持痛煎服百年草根則即差而不復作○小兒蚓腹持痛煎服百年草根則即差而不復作
分煎水以朱砂一分和服則無驚腹雖痛亦不大段云○霍亂過三四五日吐瀉無效或玄胡索末二戔調
服即效又方甚痛欲死者針用九穴九穴即四關左右三甲曲池及百會也出血即人○積年滯症一掌間
以爐火烘其背臆每朝每夕則永差云○驚腹苦蔘根亂搗付之患處限差○痢疾長魚
青二三次服之神效○小兒胎癬鷄卵菓熟去白煮宝瓶塗之患處二三次神效○点眼藥黄栢楓
皮出椒根皮各二握水十二椀煎至一椀去滓後洗之点之○生荏出油法生荏子數升亂搗盛于柿器則
如服搾搗穴○先以陶缸埋于地中出口員柳器于其上以湿紙封其陶柳器相接處以白紙覆柳
器上又以蓋厚覆其上然後又以祖糠三四斗覆積其上而荏之火盡則出之塗于磨處為妙治
小兒胎癬及風癬湿癬云○滞症単方芎根麩子麥芽并炒研各一握水三椀煎半分二服
神效○治瘧方戊子巳丑日值天動則朱書畫六甲六丁神符藏之病人衣領中則神效○觸傷
青麦處以大蝦末調乳付之則青乳漸去○清水温湯浄洗之則發

日間即差○遶頭風川芎五戔白芷五戔…
用林先生應皓之遺方為可然其中別有二方一日栄胡二朮湯二日加減補中活温湯若十分
用者可謂得妙矣○栄胡二朮湯栄胡白朮各一戔半蒼朮乾葛各一戔陳皮七分甘草炙五分
連用之○加減補中活温湯人蔘白朮各一戔半蒼朮陳皮半夏南星炮常山酒炒木果煨栄
各一戔桂皮七分甘草五分附子三分薑三棗二連用三貼後代用沈蔘七貼亦可哉○瘀
蛇床子炒黒胡黄連各二戔五分石膏寒水石各五戔枯白礬黄連各二戔五分石雄黄一戔七分五
里石硫黄炙茶末各一戔斑猫十二介去頭足石臘豬脂調塗三次○婦人以當帰川
芎為…加白芍酒炒各一戔風加防風湿加滑石熱加黄芩病在…孔加篇蓄於
精道加茯苓在血分加當帰氣分加柴白皮蜜炙頭部酒製…敬去硝黄多
服之咽喉加吉更出反根或加瞿瓜臭梁色癈歌堆者亜食…也黄芩當帰
白芷為君目赤眉腫者亜食肝也青黛板藍當帰龍膽為君耳鳴聾々生磨…
屑痒亜食腎也黄栢去蔘白芨令牛膝為君

豉葉湯 各五分去滓製以王子眼以王子則最妙
小兒驚 脈方

栄胡 酒炒
滑石 各一錢
蘆薈
青皮
蓬朮 並醋炒
縮粉
砂仁 炒
人參
乾薑 炒烟各七分
巴豆 去油四分

右末飯糊丸梧子大一丸日一下

木果四箇切蓋剔空聽用
一黄芪綿 生 不各五錢
一蒼朮陳皮末 千 九
一烏藥黄松節末 九 五錢
一藏靈仙蓽澄子末各五錢

以蓽蓋舊定酒浸八艶肉蒸熟
三晒三蒸細末以楡皮末和木蝴
九梧子大塩湯下七八十九

粳米入便乳糜可
薏苡去殼仁 杵血極便堅乳
鶏雛陳
蓮子水浸去皮者炒乳
真荏子 不拘多少炒令香研取
和水濾汁粳米末小許同煮作粥
候冷乳之
橘杏丸老人虚人氣極便秘
二丸大便自通陳年煮飲
咳嗽
橘皮 去白
杏仁 去皮尖
菜菔子各末分若末蜜丸梧子
大米飲下七十丸 此治晝便難
若便難去杏仁用桃仁
花名 氣之虚人大便
大蒸白 連根三莖
蓮根 五寸 新水一盞煎若心
烟熟去葱蓮入
阿膠珠二手攪白令烙化空
心服忌和蜜
蓮子粥 止渇止利益神安心弥
志益氣聰耳明目補髄腦益
氣力潤皮膚潤毛髪
蓮子炙去皮心 粳米 各等分
右件同和煮粥熟食之
蓮子炙仁伏令三種末和匀每
一両海松子細屑五多水一盞同
入米泔心或碎米心煮成粥和
滓少許食服
杏桃粥通経脉潤血脉令
肥健止咳軟艶身目
杏仁泡去皮尖水浸去毎
胡桃肉 去皮
右末拘多少各末分擂磨作屑
和水下飾取汁煮入粳米粉小
許作粥調清蜜任食之入葵
菜用
種杏粥調中下気利大小便
潤心肺消痰氣益五臓治上
気咳逆 唐静気行風気消腸胃
温血脉潤肌膚種子見
種子水浸去皮 杏仁

蓮子炙仁伏令三種末和匀每
一両海松子細屑五多水一盞同
入米泔心或碎米心煮成粥和
滓少許食服
杏桃粥通経脉潤血脉令
肥健止咳軟艶身目
杏仁泡去皮尖水浸去毎
胡桃肉 去皮
右末拘多少各末分擂磨作屑
和水下飾取汁煮入粳米粉小
許作粥調清蜜任食之入葵
菜用
種杏粥調中下気利大小便
潤心肺消痰氣益五臓治上
気咳逆 唐静気行風気消腸胃
温血脉潤肌膚種子見
種子水浸去皮 杏仁
麥子粥益氣寛脾胃不
食不飢開胃健脾行毒脾
胃長肌肉温中止利止煩渇
橡子水浸去皮不拘多少用水
濾取汁煮粥以粳米作温黄
或粥和蜜長服甚佳
山査粥消食積化痰滞行
留気痰病開胃開膈消
橡子水浸去皮不拘多少用水
濾取汁煮粥以粳米作温黄
或粥和蜜長服甚佳
山査粥消食積化痰滞行
留気痰病開胃開膈消
右件同和煮粥熟食
橡皮煎治鼠咬一切悪瘡
粳米一升淨洗炒存性
粳皮五寸生麁皮並為末毎
一合温蜜水調下
蕎麥皮仁散治脾痛嘔逆霍
咳嗽久近風邪上衝筋脈拘攣
蕎麥皮仁 等分
右為細末毎服二銭匕温水
沫煮入蕎麥皮粥熟和蜜調服
蕎麥皮作末煮粥亦好久服令人
能食
麥嗽糖 補虚治咳逆霍乱
五臓消痰止嗽治肺氣喘嗽
痢痛咳嗽緩心神 百合 両
天門冬一両 杜仲 胡桃肉
吉更各三寸 右細末
手造稀糖同和白 或敷糖
立時頓愈甚
牛膝 青肉補中益氣強筋
骨健行歩益髄填精氣力
生飲煎清肌澤壽益年延
嗽即者 用火炙令
粳米一合 右煮粥
粳即者 用火炙令
粳米一合 右煮粥
許量宜飲下

